



公費人類乳突病毒(HPV)疫苗

接種注意事項

為何要打 HPV 疫苗?

- 子宮頸癌是女性常見癌症，接種 HPV 疫苗預防感染高危險人類乳突病毒(HPV)所造成的子宮頸癌
- 最常見的 HPV 病毒是第 16、18 型，公費 HPV 疫苗可預防 16、18 型感染



接種前 注意事項

- 接種當天有發燒、感染症狀或正在服藥，應主動告知醫師
- 對酵母菌或佐劑有嚴重過敏反應，或先前曾於接種疫苗後產生過敏反應者，必須告知醫師進行評估



接種後 注意事項

- 現場休息 30 分鐘再離開
- 請多喝水、多休息
- 施打部位紅腫疼痛可冰敷緩解



接種 HPV 疫苗可能 有什麼副作用?

- 最常見：注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢、發燒、頭痛、噁心、暈眩等
- 少見：腹瀉、皮疹、蕁麻疹、關節痛、昏厥等
- 罕見：癲癇、免疫系統疾病、神經系統疾病等



接種 HPV 疫苗 出現副作用 如何處理?

- 如有任何不良反應症狀，請儘速至醫療機構診治，並撥打衛生福利部國民健康署 24 小時專線

0800-88-3513 諮詢



 衛生福利部國民健康署
Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare

 臺北市政府衛生局
Department of Health, Taipei City Government

關心您 



臺北市政府衛生局 HPV 專區