

長者肺炎鏈球菌疫苗接種原則

65歲以上長者【以113年為例，**民國48年**以前出生】

可接種1劑PCV13及1劑PPV23

1. 先接種PCV13
2. 2種疫苗應間隔1年以上接種
3. 高風險對象、機構住民及洗腎患者可縮短間隔至8週

65歲以下【55-64歲原住民(以113年為例，**民國49-58年**出生)及63-64歲臺北市民(以113年為例，**民國49-50年**出生)】

可接種1劑PPV23

65歲以上公費肺炎鏈球菌疫苗接種原則

對象	曾接種疫苗	可接種疫苗
全國65歲以上長者 【以113年為例， 民國48年以前出生】	PCV13/15	PPV23 <i>1年*</i>
	X	PCV13
	PPV23	PCV13 <i>1年</i>

*高風險對象、機構住民、洗腎患者可縮短至8週

55-64歲公費肺炎鏈球菌疫苗接種原則

對象	曾接種疫苗	可接種疫苗	
全國55-64歲原住民 【以113年為例， 民國49-58年 出生】 63-64歲臺北市民 【以113年為例， 民國49-50年 出生】	X	PPV23	
全國55-64歲原住民	PPV23	5年 →	PPV23
	PCV13/15	1年* →	PPV23

*高風險對象可縮短至8週



完整接種

13價 及23價 肺炎鏈球菌疫苗

提升長者保護力

