

COVID-19口服抗病毒藥物適用條件

Paxlovid

未使用氧氣且發病 5 天內之成人或12 歲(含)以上且體重40 (含)公斤之輕症病人，並有下列任一重症風險因子者

莫納皮拉韋 (Molnupiravir)

未使用氧氣且於發病 5 天內之18 歲(含)以上輕症病人，且無法使用其他建議藥物者，有下列任一重症風險因子者 (除懷孕或產後 6 週內)

- ◆年齡 ≥ 65歲
- ◆氣喘
- ◆癌症
- ◆糖尿病
- ◆慢性腎病
- ◆心血管疾病 (不含高血壓)
- ◆結核病
- ◆失智症
- ◆吸菸 (或已戒菸者)
- ◆慢性肺疾 (間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)
- ◆慢性肝病 (肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)
- ◆失能 (注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)
- ◆精神疾病 (情緒障礙、思覺失調症)
- ◆懷孕 (或產後6週內)
- ◆BMI ≥ 30 (或12-17 歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位)
- ◆影響免疫功能之疾病 (HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)

註：「吸菸 (或已戒菸者)」，需同時具有任一其他風險因子