



藥物成分

劑型

櫃號

Aceclofenac

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

痛已服膜衣錠 100 毫克/錠 (Tonlief)
 安舒悅膜衣錠 100 毫克/錠 (Aclonac)
 炎立消膜衣錠 100 毫克/錠 (Ascofen)
 痛停錠 100 毫克/錠 (Tonec)

☞ 藥品作用

緩解發炎症狀(如關節炎、脊椎炎)及解熱、鎮痛作用

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒。錠劑應直接吞服不要咬碎。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是最近曾經有發生心臟相關疾病、胃腸出血、消化性潰瘍、中重度腎功能障礙、肝臟疾病、對 aspirin 或其他非類固醇消炎藥物過敏者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑、降血糖藥、利尿劑、methotrexate、其它 NSAIDs 和類固醇、lithium、digoxin、cyclosporin 及 quinolone 抗菌劑。
3. 長期使用者必須定期監測肝、腎功能及血球數。
4. 常見副作用為暈眩；腸胃不適如腹瀉、噁心；皮膚搔癢或紅斑，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**胃腸出血(嘔血、黑便)或呼吸困難、皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛。**
6. 避免在懷孕期間使用，因其在懷孕期間使用可能造成胎兒異常，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。