



藥物成分	劑型	櫃號
Acetylsalicylic Acid	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

阿斯匹林腸溶膜衣錠 100 毫克/錠 (Aspirin Protect)

伯基腸溶微粒膠囊 100 毫克/膠囊 (Bokey E.M.)

安心平腸溶微粒膠囊 100 毫克/膠囊 (Espin E.M.)

☞ 藥品作用

主要用為預防心肌梗塞、血栓栓塞及中風發作的機率。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或是藥師。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，最好飯前配服一大杯開水服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是消化道潰瘍、血友病、氣喘或肝腎方面病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，**本藥常出現在感冒或止痛成藥中**，請小心避免併服。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥(俗名：阿斯匹靈)。
4. 服用此藥期間請勿飲酒。
5. 蠶豆症患者慎用。
6. 兒童及青少年：罹患水痘或流行性感冒不得使用此藥緩解症狀；若使用發生嚴重嘔吐及精神混亂，須立即送醫。
7. 常見副作用為為消化道症狀，若有出現胃不舒服、輕微胃痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. **如果有下列症狀，請立刻就醫：胃痛、嘔吐、頭昏眼花、**

耳鳴或喪失聽力、帶血或黑色糞便、呼吸困難或喘鳴、紅疹及過敏。

9. 對胎兒風險不能排除，懷孕期間未經醫師許可請勿服用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。