



藥物成分	劑型	櫃號
Glucosamine sulfate	口服藥	

商品名及含量

骨多能膠囊 250 毫克/膠囊 (Kudona)

維骨力口服溶液用粉劑 1500 毫克/包 (Viartril-S Powder)

壯骨原加強型口服溶液用粉劑 1500 毫克/包 (Zantal-S Powder)

骨力健膠囊 250 毫克/膠囊 (Glusamin)

藥品作用

增進改善軟骨狀況進而促進骨關節炎病人活動及解除疼痛。

服用方式

1. 膠囊：通常每日 2~3 次，每次 2 粒，飯前 15 分鐘服用。
2. 口服溶液用粉劑：通常每日 1 次，每次 1 包，泡在適量開水後服用，隨餐服用較佳。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾有對 Glucosamine 過敏、嚴重肝腎疾病。
2. 口服溶液用粉劑含阿斯巴甜，有苯酮尿症病人禁用。
3. 常見副作用為腸胃不適、腹瀉、脹氣、便秘、皮疹等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重皮膚過敏、胃痛等症狀，請立刻就醫。
5. 因目前臨床資料不足，對胎兒風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。