

藥物成分

劑型

櫃號

Digoxin

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

隆我心錠 0.25 毫克/錠 (Lanoxin)

## ☞ 藥品作用

可治療充血性心衰竭及心房纖維性顫抖的心律不整。此藥有助於強化心臟功能及控制心律。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日服用 1 次。醫師可能需依據您的症狀調整劑量，請確實遵造醫囑。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺、心律不整或心搏過慢、癌症或腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是利尿劑、胃藥(制酸劑)、鈣片、皮質類固醇或其他心律不整藥物。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 服藥期間請勿飲用大量咖啡或酒精飲料。
5. 長期服用建議需固定每日補充高鉀食物，如：香蕉、木瓜、柳丁、南瓜、菠菜、空心菜、茼蒿、地瓜葉...
6. 副作用可能有無力、疲倦、頭痛、腹瀉、男性女乳症狀(長期罕見)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：不規則心跳或脈搏、食慾差、嚴重噁心嘔吐、腹瀉不止、下腹疼痛、異常疲倦或衰弱、心跳很慢(每分鐘少於 60 次)、視線模糊或看東西有

臺北市立

聯合醫院

**黃色光圈圍繞物體、嚴重嗜睡等。**

8. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師/藥師；有需要哺乳請  
事先諮詢醫師/藥師。