

藥物成分	劑型	櫃號
Gramicidin/ Neomycin/ Nystatin/ Triamcinolone	耳滴劑	

☞ 藥品商品名及含量

美康耳用滴劑 0.25 毫克+2.5 毫克+100,000 單位+1 毫克/毫升 5 毫升/瓶 (Mycomb Otic Drops)

☞ 藥品作用

本品為外用滴耳藥水，具抗炎、止癢殺菌、殺黴菌之作用，用於包含外耳道念珠菌感染、表面細菌感染、皮膚炎等治療。

☞ 使用方式


1. 用肥皂及清水清洗雙手。
2. 用濕的面巾清潔耳朵，再將耳朵擦乾。
3. 將藥劑輕輕滾動或輕握數秒，使藥液溫度接近體溫，減少對耳朵的刺激。
4. 耳滴劑使用前須充分振搖。



5. 側躺或頭傾斜使受感染耳側朝上。
6. **成人可將耳葉拉向後上方，小孩則拉向後下方**，使耳道變直。
7. 滴入適量藥劑，保持耳部朝上使藥液流入。



8. 藥劑滴入後，輕拉耳朵或輕壓耳珠，使氣泡跑出。
9. 保持耳部朝上，讓藥劑停留約 5-10 分鐘後，再讓它自然流出，以紙巾擦拭留出藥液。
10. 用肥皂及清水清潔雙手。



∞ 注意事項

1. 本藥品為耳用滴劑，僅供耳部外用，不得滴眼或內服。
2. 通常每日使用 3~4 次，每次 2~3 滴。劑量依疾病嚴重度及個別反應不同，必須遵照醫師指示常規用藥，不可自行更改劑量或自行停藥。
3. 使用時應避免接觸到滴管頭而造成污染，以保持藥液的清潔。
4. 請依照醫師指示使用，若不慎忘記使用，請立即補滴，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間即可，不可為了補滴而使用雙倍劑量。
5. 儲存方法：室溫 25°C 以下保存，並不建議置於冰箱內冷藏，避免給藥後造成暈眩不適；開瓶後，保存期限為六個月，若藥液出現異常變化請勿使用。
6. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
7. 常見副作用為耳朵疼痛、頭痛、暈眩、嘴內有苦味，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請儘速回診。
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚發疹、過敏反應、聽力異常等。