



藥物成分	劑型	櫃號
Tacrolimus	外用藥膏	

☞ 藥品商品名及含量

普特皮軟膏 0.03% 5 公克 (Protopic Ointment)

普特皮軟膏 0.03% 10 公克 (Protopic Ointment)

☞ 藥品作用

用於治療2歲以上孩童、青少年及成人，對其他傳統治療（如外用的類固醇）反應不充分或無法耐受其他傳統治療的中度至重度異位性皮膚炎。

☞ 使用方式

1. 症狀發作期治療：

每天兩次，在患部皮膚上塗抹薄薄一層。

當症狀消失，便應停止治療。

倘若異位性皮膚炎的症狀（如搔癢、皮疹與發紅）在兩週內未見好轉，則應回診醫師考慮其他的治療方式。

2. 維持治療：

每週兩天（例如星期一與星期四）、每天一次，或間隔 2-3 天塗抹一次，以避免病灶惡化復發。

☞ 注意事項


1. 使用普特皮軟膏後 2 小時內不可於同一個部位使用潤膚劑。不可塗抹於敷料之下。若雙手非治療部位，則使用藥品後應清潔雙手。

2. 避免日曬。應採取適當的防曬方式，例如縮短日曬時間、使用防曬產品以及以適當衣物遮蓋皮膚。

3. 具有皮膚屏障缺陷（如層狀魚鱗癬、全身性紅皮症或皮膚移植物）的病人，不建議使用。

4. 避免塗抹於眼睛與黏膜。若不慎塗抹至這些部位，應以大量清水沖洗。

5. 不可用於 2 歲以下兒童、先天或後天免疫缺乏病人，或正在接受會造成免疫抑制效果之療法的病人。

- 
6. 常見副作用為塗藥部位刺激不適(灼熱感、搔癢等)，通常會於一週內緩解。若出現塗藥部位紅斑、皮疹，局部皮膚感染等症狀持續或嚴重時請回診。
 7. 長期使用本藥引起的局部皮膚免疫抑制可能導致皮膚惡性腫瘤的發生。應依照醫囑，避免長期使用。
 8. 動物試驗證實全身性投藥會造成生殖毒性。對人類的潛在風險仍未知。**懷孕期間不得使用本藥**，除非醫師評估具有明確必要性。
 9. 本藥可能會分泌到母乳裡，**用藥期間不建議哺乳**。
 10. 儲存 25°C 以下環境。