



日本腦炎疫苗接種 Inactivated polio vaccine

一、疫苗介紹：

日本腦炎疫苗為一種不活性病毒疫苗，接種效益及防治成效顯見，為順應疫苗產製技術轉變趨勢，自本（106）年5月22日起改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗，。

二、接種對象及時程：

(一) 幼兒常規接種時程：應接種 2 劑

出生滿 15 個月接種第一劑，間隔 12 個月接種第 2 劑。

(二) 已接種不活化日本腦炎疫苗之幼童，依下列原則接續完成

已接種 1 劑：與前一劑間隔 14 天以上接種第 1 劑，間隔 12 個月接種第 2 劑。

已接種 2 劑：與最後一劑間隔至少 12 個月後接種 1 劑，其後不必再追加。

已接種 3 劑：滿 5 歲至入學前接種 1 劑，與最後一劑間隔至少 12 個月。

三、禁忌症：

(一) 對本疫苗之任何成分曾有嚴重過敏反應者。

(二) 先天或後天免疫不全者，含接受化學治療、使用 ≥ 14 天高劑量全身性皮質類固醇。

(三) 感染人類免疫缺乏病毒，不論有無症狀，其免疫功能有缺損者。

(四) 孕婦(育齡婦女在接種疫苗後四週內宜避免懷孕)。

(五) 授乳母親。

四、接種後反應及注意事項：

(一) 一般為注射部位有疼痛、紅、腫；少數於接種後 3-7 天可能出現輕微或中度全身無力、肌肉痛、易怒、食慾不振、發燒、頭痛等症狀，會在數天內恢復。

(二) 至於嚴重過敏、昏睡或痙攣等症狀則極為罕見。

(三) 如上述症狀持續未獲改善，應盡速就醫處理，並請醫師通報衛生單位。

參考資料

- 台北市政府衛生局(2017) · 預防接種作業與兒童預防接種紀錄檢查及補行辦法
衛生福利部疾病管制署(2017-07-31) · 日本腦炎 · 取至
http://www.cdc.gov.tw/professional/info.aspx?treeid=5B0231BEB94EDFFC&no_wtreeid=639B34B472ACC0CE&tid=4F83D0265075DCF8
賽諾菲股份有限公司(2014) · 巴斯德細胞型日本腦炎活性減毒疫苗說明書

No.C0217

臺北市立聯合醫院 107 年 10 月 29 日修訂