

防範流感 即刻行動

儘早接種流感疫苗



- 完成接種後至少約需2週才產生保護力，所以請儘早接種疫苗。
- 不論疫苗株與流行株是否吻合，接種疫苗均能有效降低流感重症及死亡風險。



臺北市預防接種資訊系統
(接種地點、資格、最新消息)
<http://vaccine.health.gov.tw>

警覺流感症狀，戴上口罩，速就醫



- 如有突發高燒、頭痛、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛等全身性症狀，請優先至鄰近診所就醫，如有危險徵兆再轉診大醫院。
- 看病、探病、陪病要戴口罩，離開醫療院所務必用肥皂洗手。



流感防治一網通
(公費流感抗病毒藥劑合約院所
地點、電話及看診時段查詢)
<https://antiflu.cdc.gov.tw>
點選右上角 選擇 疾病傳染所
再點選 收回視窗，選擇欲查詢的縣市行政區

流感防治措施



- 生病不上班不上課，注意咳嗽禮節，避免傳染他人。
- 請避免或減少出入密閉空間公共場所（電影院、KTV等）及人群壅塞的大型活動場所（演唱會、節慶活動等）。
- 流感流行期間，搭乘大眾運輸交通工具應配戴口罩，並勤洗手。



流感預報站
<https://fluforecast.cdc.gov.tw>



臺北市政府衛生局
Department of Health, Taipei City Government

臺北市政府衛生局防疫專線 ☎ 02-2375 3782

臺北市民當家熱線

衛生福利部疾病管制署疫情通報及關懷專線 ☎ 1922

廣告