

中華民國 108 年
臺北市死因統計年報

臺北市政府衛生局編印

中華民國 109 年 11 月出版

凡例

- 一、本年報編印之目的，係提供臺北市死因統計，以提供政府施政及學術研究之參考。
- 二、本年報內容計分：(一) 提要分析 (二) 人口統計指標 (三) 108 年死因統計 (四) 歷年死因統計 (五) 歷年主要癌症發生率等 5 類，凡 56 表；另附錄 1 至 5 共計 20 表。
- 三、部分資料因尾數四捨五入，計算時仍以原始數據計算，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。
- 四、本年報各表所稱「年」係指全年；「年底」係指當年 12 月底。
- 五、本年報所用符號代表意義如下：
「—」經統計但無數據；「--」有數值，但該數值無意義；「...」數值不明或尚未產生資料；「0」代表有數值而不及半單位；「①」修正數。

目 次

凡例

壹、提要分析

貳、人口統計指標

表A・臺北市人口統計指標—行政區別.....	1
表B・臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C・臺北市近十年各年齡組年中人口數.....	3
表D・臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性.....	4
表E・臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性.....	5
表F・臺北市各行政區年底人口數.....	6
表G・臺北市近十年各行政區年底人口數	7
表H・臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	8
表 I・臺北市近十年各行政區年中人口數.....	9

參、108年死因統計

一、主要死因統計

表 1・臺北市、全國主要死亡原因比較.....	11
表 2・ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3・ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4・ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5・ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6・ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

目 次

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因.....	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因.....	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因.....	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因.....	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因.....	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因.....	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65-74歲)主要死亡原因.....	23
表14 · ICD-10 臺北市老年(75-84歲)主要死亡原因.....	24
表15 · ICD-10 臺北市老年(85歲以上)主要死亡原因.....	25
表16 · ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因.....	26
表17 · ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因.....	27
表18 · ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因.....	28
表19 · ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因.....	29
表20 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因.....	30
表21 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因.....	31
表22 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式.....	32
表23 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式.....	33
表24 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式.....	34
表25 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因.....	35
表26 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況.....	36
表27 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	37
表28 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	38

目 次

二、行政區別死因統計

表29-1~29-12 · ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	39
表30-1~30-12 · ICD-10 臺北市十二區事故傷害死亡原因.....	51
表31-1~31-12 · ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	63
表32-1~32-12 · ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	75

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表33 · 臺北市歷年主要死亡原因	87
表34 · 臺北市歷年男性主要死亡原因	90
表35 · 臺北市歷年女性主要死亡原因	93
表36 · 臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	96
表37 · 臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	97
表38 · 臺北市歷年事故傷害死亡原因	98
表39 · 臺北市歷年男性事故傷害死亡原因.....	101
表40 · 臺北市歷年女性事故傷害死亡原因	104
表41 · 臺北市歷年自殺死亡方式.....	107
表42 · 臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	110
表43 · 臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	113
表44 · 臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	116
表45 · 臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	118
表46 · 臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	120

目 次

表47・臺北市歷年主要癌症死亡原因	122
表48・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因	125
表49・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因	128
表50・臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	131
表51・臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	133
表52・臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	135
二、行政區別死因統計	
表53-1~53-12・臺北市十二區歷年主要死亡原因	137
表54-1~54-12・臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因	173
伍、歷年主要癌症發生率	
表55・臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	209
表56・臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	211
陸、附錄	
【附錄1】108年臺北市十大死因統計結果，慢性疾病囊括7項，癌症續居首席	213
【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較.....	225
【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較.....	229
【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標.....	236
【附錄5】主要名詞解釋與公式.....	241


壹、提要分析

108 年臺北市主要死因提要說明

一、標準化死亡率較上(107)年減少 2.4%，較 99 年則減少 8.5%

108 年臺北市民死亡人數 1 萬 8,024 人，平均每 29 分鐘就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 678.4 人，分別較上年增加 3.9 人(增 0.6%)；如依世界衛生組織(W.H.O.)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 309.9 人，較上年減少 2.4%，較 99 年則減少 8.5%。若與全國相較，108 年臺北市標準化死亡率較全國標準化死亡率每十萬人口 408.2 人低 24.1%，是全國 22 縣市中除連江縣外，標準化死亡率最低的縣市。

依近 10 年資料觀察，剔除人口結構因素影響後臺北市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則反之，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。(詳圖 1)



二、臺北市民十大死因惡性腫瘤蟬連榜首

108 年臺北市民死因分類配合衛生福利部改採「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」，十大死因中惡性腫瘤仍續居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、事故傷害、敗血症、高血壓性疾病；十大死因之死亡人數占總死亡人數 78.0%，其中仍以惡性腫瘤占 29.5%最多，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 15.5%次之，肺炎占 11.0%居三。(詳表 1、圖 2)

表 1 ICD-10 108 年臺北市十大死因

順位	死因	單位：人、%	
		死亡人數	死亡百分比
1	所有死因	18,024	100.0
1	惡性腫瘤	5,326	29.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,793	15.5
3	肺炎	1,981	11.0
4	腦血管疾病	1,146	6.4
5	糖尿病	721	4.0
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	519	2.9
7	慢性下呼吸道疾病	505	2.8
8	事故傷害	387	2.1
9	敗血症	348	1.9
10	高血壓性疾病	339	1.9
	其他	3,959	22.0




圖2. ICD-10 108年臺北市十大死因死亡率及標準化死亡率

病及高血壓性疾病 87 歲次之，最低為事故傷害 67 歲。(詳表 2)

表2 ICD-10 108 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

		單位：歲											
死因別		所有死因	惡性腫瘤	壓性疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓)	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	腎炎、腎病變	慢性下呼吸道疾病	敗血症	事故傷害	高血壓性疾病
死亡年齡平均數	兩性	76.5	71.6	79.4	85.3	78.6	78.2	81.1	84.1	83.2	62.2	83.1	
	男性	75.1	72.0	76.3	84.3	75.9	75.5	80.3	83.9	82.1	60.5	78.9	
	女性	78.4	71.2	83.3	86.6	82.1	81.1	82.0	84.5	84.6	65.2	86.8	
死亡年齡中位數	兩性	80	72	83	88	82	81	84	87	86	67	87	
	男性	78	72	80	87	79	76	84	87	84	64	85	
	女性	82	72	86	88	84	84	84	88	87	71	89	

三、死亡年齡平均數較 99 年增加 3.4 歲

108 年臺北市民死亡年齡平均數為 76.5 歲，較全國高 3.2 歲，與 99 年比較則增加 2.9 歲，其中男性死亡年齡平均數為 75.1 歲，女性為 78.4 歲，男性較女性低 3.3 歲；十大死因中死亡年齡平均數以肺炎 85.3 歲最高，慢性下呼吸道疾病 84.1 歲次之，最低為事故傷害 62.2 歲。

若以死亡年齡中位數來看，108 年臺北市民死亡年齡中位數為 80 歲，較全國高 3 歲，與 99 年比較則增加 2 歲，其中男性死亡年齡中位數為 78 歲，女性為 82 歲，男性較女性低 3 歲；十大死因中死亡年齡中位數以肺炎 88 歲最高，慢性下呼吸道疾


四、臺北市男性十大死因與上年相同，僅順位改變

108 年臺北市男性死亡人數為 10,066 人，死亡率為每十萬男性人口 794.7 人，較上年減少 0.1%；標準化死亡率為每十萬男性人口 394.8 人，較上年減少 2.2%，較 99 年則減少 6.3%。

108 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、事故傷害、蓄意自我傷害(自殺)、敗血症；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 78.8%，其中仍以惡性腫瘤占 29.3%最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 15.3%。(詳表 3、圖 3)

表 3 ICD-10 108 年臺北市男性十大死因

順位	死因	單位：人、%	
		死亡人數	死亡百分比
1	所有死因	10,066	100.0
2	惡性腫瘤	2,946	29.3
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,544	15.3
4	肺炎	1,125	11.2
5	腦血管疾病	654	6.5
6	糖尿病	370	3.7
7	慢性下呼吸道疾病	368	3.7
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	265	2.6
9	事故傷害	249	2.5
10	蓄意自我傷害(自殺)	212	2.1
	敗血症	199	2.0
	其他	2,134	21.2




五、臺北市女性十大死因血管性及未明示之癥呆症進入第 9 名

108 年臺北市女性死亡人數為 7,958 人，死亡率為每十萬女性人口 572.5 人，較上年增加 1.5%；標準化死亡率為每十萬女性人口 239.9 人，較上年減少 2.6%，較 99 年則減少 9.7%。

108 年女性十大死因之首亦為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病、敗血症、血管性及未明示之癥呆症及事故傷害；女性十大死因死亡人數占女性總死亡人數 77.9%，其中亦以惡性腫瘤占 29.9%最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 15.7%。(詳表 4、圖 4)

表 4 ICD-10 108 年臺北市女性十大死因

順位	死因	單位：人、%	
		死亡人數	死亡百分比
1	所有死因	7,958	100.0
2	惡性腫瘤	2,380	29.9
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,249	15.7
4	肺炎	856	10.8
5	腦血管疾病	492	6.2
6	糖尿病	351	4.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	254	3.2
8	高血壓性疾病	179	2.2
9	敗血症	149	1.9
10	血管性及未明示之癥呆症	149	1.9
	事故傷害	138	1.7
	其他	1,761	22.1



六、嬰兒(未滿1歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占5成4

108年臺北市未滿1歲嬰兒死亡人數為72人，死亡率為每十萬人口343.1人，分別較上年減少29人、減少23.0%。男嬰死亡率為每十萬人口414.5人，較上年減少19.5%；女嬰死亡率為266.6人，較上年減少28.4%。嬰兒主要死因前3項分別為(1)源於周產期的特定病況39人占54.2%，(2)先天性畸形變形及染色體異常14人占19.4%，(3)事故傷害9人占12.5%，3者合占嬰兒死亡人數的86.1%。

七、少年(1-14歲)惡性腫瘤居首位死因，占2成4

108年臺北市1-14歲少年死亡人數為41人，死亡率為每十萬人口12.1人，分別較上年增加4人、12.5%。少年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤10人占24.4%，(2)事故傷害5人占12.2%，(3)心臟疾病(高血壓性疾病除外)2人占4.9%，3者合占少年死亡人數的41.5%。

八、青年(15-24歲)蓄意自我傷害(自殺)居死因首位，占3成5

108年臺北市15-24歲青年死亡人數為79人，死亡率為每十萬人口30.0人，分別較上年增加2人、6.9%。青年主要死因前3項分別為(1)蓄意自我傷害(自殺)28人占35.4%，(2)事故傷害21人占26.6%，(3)惡性腫瘤5人占6.3%，3者合占青年死亡人數的68.4%。

九、壯年(25-44歲)死因之前二位為惡性腫瘤、蓄意自我傷害(自殺)

108年臺北市25-44歲壯年死亡人數為539人，死亡率為每十萬人口69.5人，分別較上年增加7人、3.1%。壯年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤176人占32.7%，(2)蓄意自我傷害(自殺)89人占16.5%，(3)心臟疾病(高血壓性疾病除外)57人占10.6%，3者合占壯年死亡人數的59.7%。

十、中年(45-64歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占4成7

108年臺北市45-64歲中年死亡人數為3,099人，死亡率為每十萬人口392.4人，分別較上年增加43人、增加2.2%。中年

主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,451 人占 46.8%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 398 人占 12.8%，(3)腦血管疾病 169 人占 5.5%，3 者合占中年死亡人數的 65.1%。

十一、老年(65-74 歲)死亡率以惡性腫瘤為首，占 4 成 3

108 年臺北市 65-74 歲老年死亡人數為 2,879 人，占總死亡人數的 16.0%，死亡率為每十萬人口 1,028.4 人，較上年減少 5.3%。65-74 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,240 人占 43.1%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 373 人占 13.0%，(3)腦血管疾病 165 人占 5.7%，3 者合占 65-74 歲老年死亡人數的 61.8%。

十二、老年(75-84 歲)死亡率亦以惡性腫瘤為首，占 3 成 1

108 年臺北市 75-84 歲老年死亡人數為 4,279 人，占總死亡人數的 23.7%，死亡率為每十萬人口 3,270.7 人，較上年減少 6.1%。75-84 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,336 人占 31.2%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 680 人占 15.9%，(3)肺炎 477 人占 11.2%，3 者合占 75-84 歲老年死亡人數的 58.3%。


十三、老年(85 歲以上)死亡率以心臟疾病(高血壓性疾病除外)為首，占 1 成 8

108 年臺北市 85 歲以上老年死亡人數為 7,036 人，占總死亡人數的 39.0%，死亡率為每十萬人口 12,235.9 人，較上年增

加 0.5%。85 歲以上老年主要死因前 3 項分別為(1)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 1,280 人占 18.2%，(2)肺炎 1,256 人占 17.9%，(3)惡性腫瘤 1,108 人占 15.7%，3 者合占 85 歲以上老年死亡人數的 51.8%。

十四、行政區以萬華區標準化死亡率最高，大同區次之

108 年臺北市 12 個行政區死亡率以萬華區每十萬人口 876.6 人最高，大同區 797.1 人次之，內湖區 500.7 人最低；標準化後萬華區每十萬人口 372.3 人仍為最高，大同區 369.9 人次之，松山區 263.4 人最低。(詳圖 5)



十四、惡性腫瘤(癌症)

(一)「氣管、支氣管和肺癌」、「女性乳房癌」、「結腸、直腸和肛門癌」續居癌症死因前三位

108 年臺北市惡性腫瘤死亡人數為 5,326 人，占總死亡人數之 29.5%，死亡率為每十萬人口 200.5 人，較上年增加 2.4%；標準化死亡率為每十萬人口 99.5 人，較上年減少 1.0%，較 99 年則減少 9.7%。

108 年臺北市十大癌症死因中氣管、支氣管和肺癌仍居榜首，其次依序為女性乳房癌、結腸、直腸和肛門癌、肝和肝內膽管癌、前列腺(攝護腺)癌、胰臟癌、胃癌、口腔癌、非何杰金氏淋巴瘤、卵巢癌；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數 76.2%，其中氣管、支氣管和肺癌占 19.5%最多，結腸、直腸和肛門癌占 13.5%次之，肝和肝內膽管癌占 12.4%再次之。
(詳表 5、圖 6)


表 5. ICD-10 108 年臺北市十大癌症死因

單位：人、%

順位	癌症死因	死亡人數	死亡百分比
	所有癌症死因	5,326	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	1,040	19.5
2	女性乳房癌	378	7.1
2	結腸、直腸和肛門癌	721	13.5
4	肝和肝內膽管癌	661	12.4
5	前列腺(攝護腺)癌	177	3.3
6	胰臟癌	314	5.9
7	胃癌	295	5.5
8	口腔癌	200	3.8
9	非何杰金氏淋巴癌	186	3.5
10	卵巢癌	86	1.6
	其他	1,268	23.8

圖 6. ICD-10 108 年臺北市十大癌症死因死亡率及標準化死亡率

■ 死亡率 □ 標準化死亡率



(二) 男性癌症標準化死亡率較上年減少 1.8%、女性則增加

0.3%，惟男性癌症標準化死亡率仍為女性的 1.5 倍

108 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性為 2,946 人，女性為 2,380 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 121.2 人、每十萬女性人口 82.2 人，男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性增加 20 人、女性增加 68 人，標準化死亡率男性減少 1.8%，女性增加 0.3%。

108 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 71.6 歲，較全國高 2.4 歲，與 99 年比較則增加 1.8 歲，其中男性死亡年齡平均數為 72.0 歲，女性為 71.2 歲。108 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平均數以前列腺(攝護腺)癌 81.3 歲最高，非何杰金氏淋巴癌 75.2 歲次之，最低為卵巢癌 63.8 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，108 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 72 歲，較全國高 3 歲，與 99 年比較則相同，其中男性死亡年齡中位數為 72 歲，女性為 72 歲。108 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡中位數以前列腺(攝護腺)癌 84 歲最高，非何杰金氏淋巴癌 78 歲次之，最低為卵巢癌 62.5 歲。（詳表 6）

表 6. ICD-10 108 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數
單位：歲

死因別		所有癌症死因	氣管、支氣管和肺癌	女性乳房癌	結腸、直腸和肛門癌	肝和肝內膽管癌	前列腺(攝護腺)癌	胰臟癌	胃癌	口腔癌	非何杰金氏淋巴癌	卵巢癌
死亡年齡平均數	兩性	71.6	73.5	64.8	73.8	72.4	81.3	71.8	74.6	64.6	75.2	63.8
	男性	72.0	73.3	--	73.9	69.8	81.3	72.5	74.7	63.6	74.7	--
	女性	71.2	73.8	64.8	73.8	76.9	--	71.1	74.4	74.0	75.8	63.8
死亡年齡中位數	兩性	72	74	64	76	73	84	71	76	63	78	62.5
	男性	72	74	--	76	70	84	71	75	63	76	--
	女性	72	75	64	75.5	79	--	70.5	78	73	80	62.5

貳、人口統計指標

表A・臺北市人口統計指標—行政區別

中華民國108年

項目	單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積	平方公里	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度	人/平方公里	9,732	21,985	19,631	27,077	16,619	20,772	22,185	21,133	8,626	5,507	9,050	4,545	4,458
年底人口數	人	2,645,041	204,193	220,021	307,631	227,387	158,014	126,043	187,076	271,806	120,297	285,795	283,459	253,319
男性	人	1,260,049	95,492	104,608	143,126	105,570	75,229	61,173	91,630	130,042	58,752	136,210	136,569	121,648
女性		1,384,992	108,701	115,413	164,505	121,817	82,785	64,870	95,446	141,764	61,545	149,585	146,890	131,671
性比例		90.98	87.85	90.64	87.00	86.66	90.87	94.30	96.00	91.73	95.46	91.06	92.97	92.39
出生數	人	21,468	1,488	1,776	2,224	1,892	1,235	1,095	1,580	2,136	1,164	2,545	2,287	2,046
粗出生率	%	8.08	7.26	8.01	7.22	8.28	7.79	8.63	8.39	7.83	9.62	8.88	8.02	8.04
死亡數	人	18,026	1,284	1,630	2,117	1,557	1,074	1,006	1,668	1,792	796	1,423	1,898	1,781
粗死亡率	%	6.78	6.27	7.35	6.87	6.82	6.78	7.93	8.86	6.57	6.58	4.96	6.66	7.00
人口增加率	%o	-8.82	-7.34	-15.15	-3.92	-9.02	-6.20	-12.40	-13.33	-7.14	-11.28	-5.68	-10.77	-8.66
自然增加率		1.30	1.00	0.66	0.35	1.47	1.02	0.70	-0.47	1.26	3.04	3.91	1.36	1.04
社會增加率		-10.11	-8.33	-15.81	-4.27	-10.48	-7.22	-13.10	-12.86	-8.41	-14.33	-9.60	-12.13	-9.70
14歲以下年底 人口數(a)	人 比重(%)	355,500	29,996	26,052	46,669	27,750	25,634	16,314	19,922	36,851	15,631	41,194	35,590	33,897
15-64歲年底 人口數(b)	人 比重(%)	1,811,597	134,188	150,876	197,108	156,563	103,238	86,521	129,969	190,834	85,489	206,148	194,937	175,726
65歲以上年底 人口數(c)	人 比重(%)	477,944	40,009	43,093	63,854	43,074	29,142	23,208	37,185	44,121	19,177	38,453	52,932	43,696
扶養比 (a+c)/b	%	46.01	52.17	45.83	56.07	45.24	53.06	45.68	43.94	42.43	40.72	38.64	45.41	44.16
扶幼比 a/b		19.62	22.35	17.27	23.68	17.72	24.83	18.86	15.33	19.31	18.28	19.98	18.26	19.29
扶老比 c/b		26.38	29.82	28.56	32.40	27.51	28.23	26.82	28.61	23.12	22.43	18.65	27.15	24.87
老化指數 c/a		134.44	133.38	165.41	136.82	155.22	113.68	142.26	186.65	119.73	122.69	93.35	148.73	128.91

資料來源：本府民政局。

附 註：本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B・臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
87	75.76	73.12	78.93	79.11	77.06	81.48
88	75.90	73.33	78.98	79.48	77.47	81.78
89	76.46	73.83	79.56	79.85	77.78	82.24
90	76.75	74.07	79.92	80.08	78.05	82.38
91	77.19	74.58	80.24	80.36	78.34	82.60
94	77.42	74.50	80.80	81.17	78.94	83.55
95	77.90	74.86	81.41	81.58	79.19	84.13
96	78.38	75.46	81.72	81.79	79.41	84.31
97	78.57	75.59	81.94	81.99	79.70	84.38
98	79.01	76.03	82.34	82.16	79.86	84.53
99	79.18	76.13	82.55	82.42	80.06	84.81
100	79.15	75.96	82.63	82.70	80.18	85.25
101	79.51	76.43	82.82	82.66	80.00	85.33
102	80.02	76.91	83.36	82.90	80.18	85.63
103	79.84	76.72	83.19	83.10	80.33	85.89
104	80.20	77.01	83.62	83.43	80.64	86.25
105	80.00	76.81	83.42	83.36	80.54	86.18
106	80.39	77.28	83.70	83.57	80.82	86.29
107	80.69	77.55	84.05	83.63	80.93	86.29
108	80.86	77.69	84.23	83.86	81.19	86.50

資料來源：內政部。

附 註：本市配合內政部縣市數據公布係以近3年合併人口編算，例108年平均餘命採106-108年，107年則採105-107年3年合併人口計算。

表C・臺北市近十年各年齡組年中人口數

年別	總計	0 歲	1 - 4 歲	5 - 14 歲	15-24 歲	25-44 歲	45-64 歲	65 歲以上
人 數 (人)								
99年	2,613,100	18,733	89,279	280,706	313,173	808,277	772,772	330,161
100年	2,634,870	21,842	92,078	269,451	312,649	813,915	789,884	335,053
101年	2,662,097	27,281	96,621	259,149	313,265	821,078	801,277	343,428
102年	2,679,871	27,573	105,081	250,714	309,256	823,715	807,903	355,631
103年	2,694,416	27,029	112,644	243,526	303,418	823,648	812,586	371,566
104年	2,703,563	28,102	118,347	233,663	299,539	819,784	814,274	389,855
105年	2,700,257	27,296	122,333	226,649	293,139	810,848	810,837	409,156
106年	2,689,481	25,463	120,512	226,526	284,355	799,934	803,539	429,153
107年	2,675,915	22,839	116,842	227,084	274,605	789,351	796,289	448,906
108年	2,656,807	20,861	110,774	227,944	263,672	775,537	789,730	468,290
百 分 比 (%)								
99年	100.00	0.72	3.42	10.74	11.98	30.93	29.57	12.63
100年	100.00	0.83	3.49	10.23	11.87	30.89	29.98	12.72
101年	100.00	1.02	3.63	9.73	11.77	30.84	30.10	12.90
102年	100.00	1.03	3.92	9.36	11.54	30.74	30.15	13.27
103年	100.00	1.00	4.18	9.04	11.26	30.57	30.16	13.79
104年	100.00	1.04	4.38	8.64	11.08	30.32	30.12	14.42
105年	100.00	1.01	4.53	8.39	10.86	30.03	30.03	15.15
106年	100.00	0.95	4.48	8.42	10.57	29.74	29.88	15.96
107年	100.00	0.85	4.37	8.49	10.26	29.50	29.76	16.78
108年	100.00	0.79	4.17	8.58	9.92	29.19	29.72	17.63

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D・臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性

年別	男性總計	0 歲	1 - 4 歲	5 - 14 歲	15-24 歲	25-44 歲	45-64 歲	65 歲以上
人 數 (人)								
99年	1,261,502	9,708	46,394	146,399	161,906	377,421	363,045	156,630
100年	1,269,449	11,286	47,666	140,732	161,751	380,130	370,322	157,563
101年	1,280,852	14,085	49,976	135,392	162,067	384,448	374,796	160,090
102年	1,287,653	14,262	54,260	130,921	160,134	386,721	376,956	164,401
103年	1,292,791	13,863	58,061	127,147	157,322	387,679	378,315	170,405
104年	1,295,549	14,457	60,873	121,979	155,310	387,029	378,491	177,413
105年	1,292,486	14,147	62,918	118,216	151,765	384,095	376,393	184,953
106年	1,285,714	13,131	62,088	118,004	147,062	380,032	372,479	192,920
107年	1,277,646	11,728	60,209	118,241	142,059	375,789	368,735	200,886
108年	1,266,712	10,745	57,118	118,460	136,505	369,832	365,246	208,808
百 分 比 (%)								
99年	100.00	0.77	3.68	11.61	12.83	29.92	28.78	12.42
100年	100.00	0.89	3.75	11.09	12.74	29.94	29.17	12.41
101年	100.00	1.10	3.90	10.57	12.65	30.02	29.26	12.50
102年	100.00	1.11	4.21	10.17	12.44	30.03	29.27	12.77
103年	100.00	1.07	4.49	9.84	12.17	29.99	29.26	13.18
104年	100.00	1.12	4.70	9.42	11.99	29.87	29.21	13.69
105年	100.00	1.09	4.87	9.15	11.74	29.72	29.12	14.31
106年	100.00	1.02	4.83	9.18	11.44	29.56	28.97	15.00
107年	100.00	0.92	4.71	9.25	11.12	29.41	28.86	15.72
108年	100.00	0.85	4.51	9.35	10.78	29.20	28.83	16.48

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表E・臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性

年別	女性總計	0 歲	1 - 4 歲	5 - 14 歲	15-24 歲	25-44 歲	45-64 歲	65 歲以上
人 數 (人)								
99年	1,351,598	9,025	42,885	134,307	151,268	430,856	409,727	173,531
100年	1,365,422	10,556	44,412	128,720	150,898	433,785	419,562	177,490
101年	1,381,245	13,196	46,646	123,757	151,199	436,630	426,481	183,338
102年	1,392,218	13,312	50,821	119,793	149,123	436,994	430,947	191,230
103年	1,401,625	13,166	54,583	116,379	146,097	435,969	434,271	201,161
104年	1,408,014	13,645	57,474	111,685	144,230	432,755	435,784	212,442
105年	1,407,771	13,150	59,416	108,433	141,374	426,753	434,444	224,203
106年	1,403,767	12,332	58,424	108,522	137,293	419,903	431,060	236,234
107年	1,398,269	11,111	56,633	108,843	132,546	413,563	427,554	248,020
108年	1,390,095	10,116	53,656	109,485	127,168	405,705	424,484	259,482
百 分 比 (%)								
99年	100.00	0.67	3.17	9.94	11.19	31.88	30.31	12.84
100年	100.00	0.77	3.25	9.43	11.05	31.77	30.73	13.00
101年	100.00	0.96	3.38	8.96	10.95	31.61	30.88	13.27
102年	100.00	0.96	3.65	8.60	10.71	31.39	30.95	13.74
103年	100.00	0.94	3.89	8.30	10.42	31.10	30.98	14.35
104年	100.00	0.97	4.08	7.93	10.24	30.74	30.95	15.09
105年	100.00	0.93	4.22	7.70	10.04	30.31	30.86	15.93
106年	100.00	0.88	4.16	7.73	9.78	29.91	30.71	16.83
107年	100.00	0.79	4.05	7.78	9.48	29.58	30.58	17.74
108年	100.00	0.73	3.86	7.88	9.15	29.19	30.54	18.67

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F・臺北市各行政區年齡別年底人口數

單位：人

年齡別	中華民國108年底												
	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
108年底人口數	2,645,041	204,193	220,021	307,631	227,387	158,014	126,043	187,076	271,806	120,297	285,795	283,459	253,319
0歲	20,160	1,441	1,670	2,146	1,772	1,160	1,035	1,463	1,997	1,087	2,369	2,099	1,921
1-4	106,081	7,757	8,551	12,213	8,791	6,850	5,161	7,162	10,648	5,361	12,507	11,071	10,009
5-9	119,402	10,463	8,594	16,531	9,387	8,836	5,311	6,213	12,201	5,133	13,804	11,580	11,349
10-14	109,857	10,335	7,237	15,779	7,800	8,788	4,807	5,084	12,005	4,050	12,514	10,840	10,618
15-19	118,216	9,188	9,150	13,970	9,038	7,170	5,376	7,545	13,469	5,656	13,696	12,475	11,483
20-24	139,691	10,283	11,292	15,108	11,065	7,638	6,400	9,641	15,991	6,649	16,616	15,412	13,596
25-29	151,496	10,531	13,020	15,005	12,827	7,919	7,174	11,175	16,165	7,323	18,431	16,812	15,114
30-34	169,830	11,792	14,794	16,249	14,831	9,158	8,386	12,576	17,108	8,401	20,682	19,055	16,798
35-39	224,971	15,899	18,783	22,932	19,766	13,006	11,405	16,677	22,480	11,370	25,833	24,462	22,358
40-44	220,766	16,902	17,903	25,039	18,775	13,904	11,018	15,412	22,515	10,813	24,175	22,778	21,532
45-49	195,734	15,541	15,969	22,664	16,935	11,871	9,039	13,438	21,204	9,207	20,671	20,039	19,156
50-54	196,501	14,787	16,482	22,219	17,503	11,006	9,076	14,161	21,917	8,996	21,522	20,603	18,229
55-59	199,019	14,711	16,718	22,164	17,927	10,877	9,386	14,820	20,846	8,792	22,766	21,202	18,810
60-64	195,373	14,554	16,765	21,758	17,896	10,689	9,261	14,524	19,139	8,282	21,756	22,099	18,650
65-69	176,807	14,106	15,678	21,974	16,301	10,061	8,544	13,057	16,447	7,229	16,589	20,086	16,735
70-74	110,846	9,746	10,302	15,348	10,093	6,896	5,110	8,214	10,098	4,478	8,517	12,083	9,961
75-79	78,730	6,724	7,307	10,689	6,892	4,718	3,955	6,493	7,230	3,328	5,377	8,685	7,332
80-84	53,824	4,334	4,684	7,322	4,801	3,548	3,041	4,621	4,779	2,109	3,830	6,010	4,745
85-89	34,072	2,864	2,958	4,852	3,108	2,321	1,663	2,906	3,143	1,245	2,437	3,631	2,944
90-94	17,739	1,639	1,602	2,700	1,454	1,148	659	1,443	1,811	611	1,317	1,845	1,510
95-99	5,036	497	474	828	361	393	186	388	519	154	337	500	399
100歲以上	890	99	88	141	64	57	50	63	94	23	49	92	70

資料來源：本府民政局。

表G・臺北市近十年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	99年底	100年底	101年底	102年底	103年底	104年底	105年底	106年底	107年底	108年底
臺北市	2,618,772	2,650,968	2,673,226	2,686,516	2,702,315	2,704,810	2,695,704	2,683,257	2,668,572	2,645,041
松山區	208,434	209,948	210,905	210,343	210,473	209,714	208,326	206,988	205,702	204,193
信義區	225,092	226,541	227,734	228,496	229,657	229,211	227,823	225,753	223,406	220,021
大安區	311,565	313,846	313,426	313,363	313,693	313,058	311,506	309,969	308,843	307,631
中山區	220,126	224,102	226,659	228,753	230,496	231,350	231,247	230,710	229,456	227,387
中正區	159,536	161,449	162,154	163,140	163,388	162,475	160,403	159,608	159,000	158,014
大同區	124,600	126,640	128,809	129,820	130,973	130,929	130,071	129,278	127,625	126,043
萬華區	189,099	190,855	192,628	193,480	194,715	194,339	193,539	191,850	189,603	187,076
文山區	262,307	266,442	269,310	271,341	273,921	275,367	275,231	274,424	273,762	271,806
南港區	114,023	116,131	118,490	119,752	121,257	122,245	122,516	122,155	121,670	120,297
內湖區	270,245	275,652	280,025	282,842	285,767	287,566	287,733	287,771	287,429	285,795
士林區	284,539	287,072	288,894	289,742	290,455	290,694	289,939	288,295	286,544	283,459
北投區	249,206	252,290	254,192	255,444	257,520	257,862	257,370	256,456	255,532	253,319

資料來源：本府民政局。

表H・臺北市各行政區年齡別年中人口數

單位：人

年齡別	中華民國108年中												
	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
108年中人口數	2,656,807	204,948	221,714	308,237	228,422	158,507	126,834	188,340	272,784	120,984	286,612	285,002	254,426
0歲	20,861	1,475	1,735	2,200	1,843	1,223	1,056	1,523	2,087	1,108	2,432	2,203	1,979
1-4	110,774	8,108	8,991	12,655	9,260	7,072	5,440	7,536	11,079	5,609	12,975	11,535	10,517
5-9	117,955	10,303	8,533	16,223	9,227	8,689	5,262	6,159	12,135	5,074	13,570	11,514	11,268
10-14	109,990	10,276	7,301	15,595	7,790	8,735	4,800	5,219	12,040	4,139	12,523	10,948	10,626
15-19	121,850	9,505	9,451	14,368	9,305	7,386	5,509	7,732	13,929	5,804	14,185	12,841	11,837
20-24	141,823	10,411	11,539	15,270	11,259	7,709	6,511	9,831	16,177	6,725	16,898	15,712	13,784
25-29	151,759	10,584	13,119	14,924	12,827	7,936	7,210	11,203	15,984	7,352	18,565	16,866	15,193
30-34	175,299	12,087	15,206	16,801	15,339	9,489	8,737	13,089	17,582	8,739	21,133	19,694	17,405
35-39	229,910	16,244	19,314	23,412	20,250	13,243	11,719	17,108	22,956	11,659	26,249	24,875	22,883
40-44	218,569	16,773	17,811	24,730	18,617	13,724	10,875	15,275	22,437	10,728	23,759	22,598	21,244
45-49	197,518	15,624	16,187	22,869	17,085	11,913	9,089	13,586	21,522	9,263	20,921	20,241	19,221
50-54	197,461	14,922	16,578	22,332	17,577	11,078	9,157	14,221	21,904	9,026	21,717	20,662	18,290
55-59	199,642	14,748	16,851	22,160	18,054	10,887	9,391	14,863	20,715	8,771	22,862	21,452	18,889
60-64	195,110	14,590	16,744	21,977	17,870	10,715	9,267	14,457	18,996	8,185	21,559	22,157	18,595
65-69	174,550	14,048	15,601	21,878	16,113	10,037	8,425	12,872	16,180	7,201	16,059	19,713	16,425
70-74	105,410	9,326	9,824	14,603	9,504	6,538	4,911	7,861	9,617	4,245	7,987	11,475	9,522
75-79	78,161	6,580	7,232	10,601	6,864	4,727	3,974	6,537	7,136	3,274	5,348	8,664	7,227
80-84	52,667	4,270	4,539	7,171	4,730	3,499	2,991	4,541	4,700	2,050	3,743	5,828	4,607
85-89	34,292	2,885	3,030	4,882	3,083	2,314	1,620	2,896	3,217	1,248	2,479	3,664	2,977
90-94	17,464	1,615	1,600	2,642	1,417	1,160	656	1,406	1,802	618	1,279	1,789	1,484
95-99	4,902	481	455	812	353	386	189	371	501	148	328	489	390
100歲以上	846	98	78	137	60	53	48	59	92	21	45	88	69

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I・臺北市近十年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
臺北市	2,613,100	2,634,870	2,662,097	2,679,871	2,694,416	2,703,563	2,700,257	2,689,481	2,675,915	2,656,807
松山區	208,215	209,191	210,427	210,624	210,408	210,094	209,020	207,657	206,345	204,948
信義區	225,228	225,817	227,138	228,115	229,077	229,434	228,517	226,788	224,580	221,714
大安區	311,589	312,706	313,636	313,395	313,528	313,376	312,282	310,738	309,406	308,237
中山區	219,186	222,114	225,381	227,706	229,625	230,923	231,299	230,979	230,083	228,422
中正區	159,144	160,493	161,802	162,647	163,264	162,932	161,439	160,006	159,304	158,507
大同區	124,000	125,620	127,725	129,315	130,397	130,951	130,500	129,675	128,452	126,834
萬華區	188,768	189,977	191,742	193,054	194,098	194,527	193,939	192,695	190,727	188,340
文山區	261,588	264,375	267,876	270,326	272,631	274,644	275,299	274,828	274,093	272,784
南港區	113,586	115,077	117,311	119,121	120,505	121,751	122,381	122,336	121,913	120,984
內湖區	268,975	272,949	277,839	281,434	284,305	286,667	287,650	287,752	287,600	286,612
士林區	284,197	285,806	287,983	289,318	290,099	290,575	290,317	289,117	287,420	285,002
北投區	248,627	250,748	253,241	254,818	256,482	257,691	257,616	256,913	255,994	254,426

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

參、108 年死因統計

一、主要死因統計

表1・ICD-10 臺北市、全國主要死亡原因比較
中華民國108年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾 病 碼 I C D 10	死 亡 原 因	臺北市					全 國				
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比
				死 亡 率	標準化 死 亡 率				死 亡 率	標準化 死 亡 率	
A00-Y98	所有死亡原因		18,024	678.41	309.90	100.00		175,424	743.45	408.20	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	5,326	200.47	99.46	29.55	1	50,232	212.88	121.33	28.63
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,793	105.13	44.13	15.50	2	19,859	84.16	43.60	11.32
J12-J18	肺炎	3	1,981	74.56	26.91	10.99	3	15,185	64.35	30.03	8.66
I60-I69	腦血管疾病	4	1,146	43.13	18.55	6.36	4	12,176	51.60	26.68	6.94
E10-E14	糖尿病	5	721	27.14	11.64	4.00	5	9,996	42.36	22.26	5.70
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	519	19.53	7.83	2.88	9	5,049	21.40	10.73	2.88
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	505	19.01	7.01	2.80	7	6,301	26.70	12.57	3.59
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	387	14.57	9.90	2.15	6	6,640	28.14	20.03	3.79
A40-A41	敗血症	9	348	13.10	5.11	1.93	12	2,925	12.40	6.15	1.67
I10-I15	高血壓性疾病	10	339	12.76	4.90	1.88	8	6,255	26.51	12.93	3.57
	其他		3,959	149.01	74.47	21.97		40,806	172.94	101.88	23.26
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	339	12.76	10.05	1.88	11	3,864	16.38	12.57	2.20
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓	12	297	11.18	3.56	1.65	13	2,625	11.12	4.74	1.50
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	240	9.03	4.99	1.33	10	4,240	17.97	11.19	2.42
G20-G21	帕金森病	14	182	6.85	2.66	1.01	16	1,365	5.78	2.78	0.78
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	15	139	5.23	2.31	0.77	15	1,447	6.13	3.26	0.82

資料來源：衛生福利部。

表2. ICD-10 全國縣市別死亡概況
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口

縣市別	總 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
總 計	175,424	743.45	408.20	103,004	879.70	531.68	72,420	609.24	297.82
新北市	24,921	621.90	383.52	14,792	754.96	499.58	10,129	494.61	284.14
臺北市	18,024	678.41	309.90	10,066	794.66	394.80	7,958	572.48	239.93
桃園市	13,194	590.35	393.70	8,104	730.03	508.24	5,090	452.50	289.89
臺中市	17,638	627.78	405.43	10,457	756.58	525.92	7,181	503.07	300.59
臺南市	15,379	817.00	422.27	8,831	940.81	548.54	6,548	693.85	308.14
高雄市	21,734	783.67	444.49	12,856	937.78	572.49	8,878	633.03	330.62
宜蘭縣	3,957	870.25	427.08	2,325	1,012.52	563.62	1,632	725.09	298.52
新竹縣	3,793	676.75	404.52	2,244	784.31	511.53	1,549	564.59	299.05
苗栗縣	5,059	924.59	450.50	3,047	1,079.61	595.00	2,012	759.45	306.85
彰化縣	10,472	821.13	413.74	6,041	930.73	547.58	4,431	707.54	288.63
南投縣	4,876	983.91	468.42	2,864	1,129.22	606.04	2,012	831.60	333.09
雲林縣	7,183	1,050.66	469.43	4,105	1,158.95	616.48	3,078	934.24	322.25
嘉義縣	5,542	1,097.23	458.01	3,158	1,203.76	588.41	2,384	982.10	326.23
屏東縣	8,322	1,012.05	512.89	4,981	1,186.87	663.63	3,341	829.81	366.38
臺東縣	2,386	1,095.25	572.97	1,484	1,322.55	768.70	902	853.82	379.24
花蓮縣	3,255	995.09	523.76	2,027	1,223.55	702.34	1,228	760.64	354.61
澎湖縣	950	906.29	421.99	538	995.47	545.80	412	811.37	297.62
基隆市	3,103	839.73	439.39	1,824	988.30	569.31	1,279	691.48	324.05
新竹市	2,752	615.36	389.52	1,605	727.71	506.72	1,147	506.04	288.61
嘉義市	2,040	760.75	403.07	1,152	885.44	523.54	888	643.24	303.28
金門縣	786	562.52	314.48	461	660.91	411.67	325	464.44	217.95
連江縣	58	443.68	279.85	42	561.91	403.20	16	285.82	142.63

資料來源：衛生福利部。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3・ICD-10 臺北市主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	所有死亡原因 惡性腫瘤	18,024 5,326	678.41 200.47	309.90 99.46	100.00 29.55	所有死亡原因 惡性腫瘤	10,066 2,946	794.66 232.57	394.80 121.16	100.00 29.27	所有死亡原因 惡性腫瘤	7,958 2,380	572.48 171.21	239.93 82.22	100.00 29.91
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,793	105.13	44.13	15.50	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,544	121.89	57.98	15.34	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,249	89.85	32.65	15.69
3	肺炎	1,981	74.56	26.91	10.99	肺炎	1,125	88.81	35.52	11.18	肺炎	856	61.58	20.12	10.76
4	腦血管疾病	1,146	43.13	18.55	6.36	腦血管疾病	654	51.63	25.03	6.50	腦血管疾病	492	35.39	13.15	6.18
5	糖尿病	721	27.14	11.64	4.00	糖尿病	370	29.21	14.08	3.68	糖尿病	351	25.25	9.56	4.41
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	519	19.53	7.83	2.88	慢性下呼吸道疾病	368	29.05	11.61	3.66	腎炎、腎病症候群及腎病變	254	18.27	6.85	3.19
7	慢性下呼吸道疾病	505	19.01	7.01	2.80	腎炎、腎病症候群及腎病變	265	20.92	8.96	2.63	高血壓性疾病	179	12.88	4.27	2.25
8	事故傷害	387	14.57	9.90	2.15	事故傷害	249	19.66	13.86	2.47	敗血症	149	10.72	3.88	1.87
9	敗血症	348	13.10	5.11	1.93	蓄意自我傷害（自殺）	212	16.74	13.35	2.11	血管性及未明示之癥狀	149	10.72	3.18	1.87
10	高血壓性疾病	339	12.76	4.90	1.88	敗血症	199	15.71	6.71	1.98	事故傷害	138	9.93	6.33	1.73
	其他	3,959	149.01	74.47	21.97	其他	2,134	168.47	86.54	21.20	其他	1,761	126.68	57.71	22.13
11	蓄意自我傷害（自殺）	339	12.76	10.05	1.88	慢性肝病及肝硬化	170	13.42	8.32	1.69	慢性下呼吸道疾病	137	9.86	3.39	1.72
12	血管性及未明示之癥狀	297	11.18	3.56	1.65	高血壓性疾病	160	12.63	5.63	1.59	蓄意自我傷害（自殺）	127	9.14	7.07	1.60
13	慢性肝病及肝硬化	240	9.03	4.99	1.33	血管性及未明示之癥狀	148	11.68	4.07	1.47	帕金森病	71	5.11	1.83	0.89
14	帕金森病	182	6.85	2.66	1.01	帕金森病	111	8.76	3.73	1.10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	71	5.11	2.65	0.89
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	139	5.23	2.31	0.77	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	74	5.84	2.59	0.74	慢性肝病及肝硬化	70	5.04	2.13	0.88

資料來源：衛生福利部。

附 註：108年年中人口數計 2,656,807人，男性 1,266,712人，女性 1,390,095人。

表4・ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上	
			死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率																
1	A00-Y98	所有死亡原因	18,024	678.41	72	345.15	41	12.10	79	29.96	539	69.50	3,099	392.41	2,879	1,028.36	4,279	3,270.72	7,036	12,235.88
	C00-C97	惡性腫瘤	5,326	200.47	-	-	10	2.95	5	1.90	176	22.69	1,451	183.73	1,240	442.92	1,336	1,021.19	1,108	1,926.86
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,793	105.13	-	-	2	0.59	3	1.14	57	7.35	398	50.40	373	133.23	680	519.77	1,280	2,225.97
3	J12-J18	肺炎	1,981	74.56	-	-	1	0.30	1	0.38	9	1.16	94	11.90	143	51.08	477	364.60	1,256	2,184.23
4	I60-I69	腦血管疾病	1,146	43.13	-	-	-	-	3	1.14	19	2.45	169	21.40	165	58.94	315	240.78	475	826.04
5	E10-E14	糖尿病	721	27.14	-	-	1	0.30	-	-	10	1.29	99	12.54	139	49.65	191	145.99	281	488.67
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	519	19.53	-	-	-	-	-	-	5	0.64	46	5.82	75	26.79	142	108.54	251	436.50
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	505	19.01	-	-	-	-	-	-	3	0.39	36	4.56	43	15.36	122	93.25	301	523.45
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	387	14.57	9	43.14	5	1.48	21	7.96	49	6.32	95	12.03	71	25.36	60	45.86	77	133.91
9	A40-A41	敗血症	348	13.10	1	4.79	-	-	-	-	2	0.26	24	3.04	34	12.14	103	78.73	184	319.98
10	I10-I15	高血壓性疾病	339	12.76	-	-	-	-	-	-	4	0.52	36	4.56	39	13.93	59	45.10	201	349.55
	其他		3,959	149.01	62	297.21	22	6.50	46	17.45	205	26.43	651	82.43	557	198.96	794	606.91	1,622	2,820.72
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	339	12.76	-	-	1	0.30	28	10.62	89	11.48	129	16.33	47	16.79	35	26.75	10	17.39
12	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	297	11.18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.38	9	3.21	48	36.69	237	412.15
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	240	9.03	-	-	1	0.30	-	-	18	2.32	92	11.65	43	15.36	52	39.75	34	59.13
14	G20-G21	帕金森病	182	6.85	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.51	27	9.64	67	51.21	84	146.08
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	139	5.23	-	-	1	0.30	1	0.38	4	0.52	21	2.66	19	6.79	27	20.64	66	114.78

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市年中人口數為 2,656,807人。

表5・ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況
中華民國108年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上	
			死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率																
1	A00-Y98	所有死亡原因	10,066	794.66	45	418.82	20	11.39	48	35.16	322	87.07	2,020	553.05	1,770	1,384.86	2,247	4,105.05	3,594	13,686.21
	C00-C97	惡性腫瘤	2,946	232.57	-	-	4	2.28	-	-	78	21.09	787	215.47	724	566.46	739	1,350.08	614	2,338.16
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高 血壓性疾病除 外）	1,544	121.89	-	-	1	0.57	-	-	43	11.63	318	87.06	250	195.60	341	622.97	591	2,250.57
3	J12-J18	肺炎	1,125	88.81	-	-	1	0.57	-	-	5	1.35	74	20.26	99	77.46	277	506.05	669	2,547.60
4	I60-I69	腦血管疾病	654	51.63	-	-	-	2	1.47	16	4.33	128	35.04	120	93.89	156	285.00	232	883.47	
5	E10-E14	糖尿病	370	29.21	-	-	1	0.57	-	-	5	1.35	75	20.53	86	67.29	82	149.81	121	460.78
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	368	29.05	-	-	-	-	-	-	2	0.54	25	6.84	31	24.25	93	169.90	217	826.35
7	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症 候群及腎病變	265	20.92	-	-	-	-	-	-	3	0.81	31	8.49	43	33.64	57	104.13	131	498.86
8	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	249	19.66	5	46.54	4	2.28	16	11.72	32	8.65	69	18.89	47	36.77	31	56.63	45	171.36
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	212	16.74	-	-	-	-	21	15.38	50	13.52	84	23.00	30	23.47	18	32.88	9	34.27
10	A40-A41	敗血症	199	15.71	-	-	-	-	-	-	2	0.54	19	5.20	22	17.21	58	105.96	98	373.19
		其他	2,134	168.47	40	372.28	9	5.13	9	6.59	86	23.25	410	112.25	318	248.81	395	721.63	867	3,301.60
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	170	13.42	-	-	1	0.57	-	-	17	4.60	83	22.72	28	21.91	27	49.33	14	53.31
12	I10-I15	高血壓性疾病	160	12.63	-	-	-	-	-	-	4	1.08	29	7.94	21	16.43	25	45.67	81	308.45
13	F01-F03	血管性及未明 示之癱瘓症	148	11.68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.27	7	5.48	26	47.50	114	434.12
14	G20-G21	帕金森病	111	8.76	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.82	18	14.08	39	71.25	51	194.21
15	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除 外)	74	5.84	-	-	-	-	-	-	2	0.54	11	3.01	11	8.61	13	23.75	37	140.90

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市男性年中人口數為 1,266,712人。

表6・ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況

中華民國108年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上		
			死 亡 人 數	每 十 萬 女性 人 口 死 亡 率																	
1	A00-Y98	所有死亡原因	7,958	572.48	27	266.90	21	12.87	31	24.38	217	53.49	1,079	254.19	1,109	728.89	2,032	2,670.52	3,442	11,016.87	
	C00-C97	惡性腫瘤	2,380	171.21	-	-	6	3.68	5	3.93	98	24.16	664	156.43	516	339.14	597	784.60	494	1,581.15	
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高 血壓性疾病除 外）	1,249	89.85	-	-	1	0.61	3	2.36	14	3.45	80	18.85	123	80.84	339	445.53	689	2,205.29	
3	J12-J18	肺炎	856	61.58	-	-	-	-	1	0.79	4	0.99	20	4.71	44	28.92	200	262.85	587	1,878.82	
4	I60-I69	腦血管疾病	492	35.39	-	-	-	-	1	0.79	3	0.74	41	9.66	45	29.58	159	208.96	243	777.77	
5	E10-E14	糖尿病	351	25.25	-	-	-	-	-	-	5	1.23	24	5.65	53	34.83	109	143.25	160	512.11	
6	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症 候群及腎病變	254	18.27	-	-	-	-	-	-	2	0.49	15	3.53	32	21.03	85	111.71	120	384.09	
7	I10-I15	高血壓性疾病	179	12.88	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.65	18	11.83	34	44.68	120	384.09	
8	A40-A41	敗血症	149	10.72	1	9.89	-	-	-	-	-	-	-	5	1.18	12	7.89	45	59.14	86	275.26
9	F01-F03	血管性及未明 示之癱瘓症	149	10.72	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.47	2	1.31	22	28.91	123	393.69	
10	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	138	9.93	4	39.54	1	0.61	5	3.93	17	4.19	26	6.13	24	15.77	29	38.11	32	102.42	
		其他	1,761	126.68	22	217.48	13	7.97	16	12.58	74	18.24	195	45.94	240	157.74	413	542.78	788	2,522.16	
11	J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	137	9.86	-	-	-	-	-	-	1	0.25	11	2.59	12	7.89	29	38.11	84	268.86	
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	127	9.14	-	-	1	0.61	7	5.50	39	9.61	45	10.60	17	11.17	17	22.34	1	3.20	
13	G20-G21	帕金森病	71	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.24	9	5.92	28	36.80	33	105.62	
14	M00-M99	骨骼肌肉系統 及結締組織之 疾病	71	5.11	-	-	-	-	3	2.36	3	0.74	18	4.24	12	7.89	13	17.09	22	70.42	
15	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	70	5.04	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	9	2.12	15	9.86	25	32.86	20	64.01

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為 1,390,095人。

表7・ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	P00-P96	所有死亡原因 源於周產期的特定病況	72 39	343.09 185.84	100.00 54.17	P00-P96	所有死亡原因 源於周產期的特定病況	45 23	414.48 211.84	100.00 51.11	P00-P96	所有死亡原因 源於周產期的特定病況	27 16	266.56 157.96	100.00 59.26
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	14	66.71	19.44	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	9	82.90	20.00	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	5	49.36	18.52
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	42.89	12.50	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	46.05	11.11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	39.49	14.81
4	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	4.77	1.39	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	9.21	2.22	A40-A41	敗血症	1	9.87	3.70
5	A40-A41	敗血症	1	4.77	1.39										
6		其他	8	38.12	11.11		其他	7	64.47	15.56		其他	1	9.87	3.70
7															
8															
9															
10															

資料來源：衛生福利部。

附 註：出生發生數為 20,986人，其中男性為 10,857人，女性為 10,129人。

表8・ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因

中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	P00-P96	所有死亡原因 源於周產期的特定病況	72 39	345.15 186.96	100.00 54.17	P00-P96	所有死亡原因 源於周產期的特定病況	45 23	418.82 214.06	100.00 51.11	P00-P96	所有死亡原因 源於周產期的特定病況	27 16	266.90 158.17	100.00 59.26
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	14	67.11	19.44	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	9	83.76	20.00	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	5	49.43	18.52
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	43.14	12.50	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	46.54	11.11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	39.54	14.81
4	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	1	4.79	1.39	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	1	9.31	2.22	A40-A41	敗血症	1	9.89	3.70
5	A40-A41	敗血症	1	4.79	1.39										
6		其他	8	38.35	11.11		其他	7	65.15	15.56		其他	1	9.89	3.70
7															
8															
9															
10															

資料來源：衛生福利部。

附 註：0歲年中人口數為 20,861人，其中男性為 10,745人，女性為 10,116人。

**表9・ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因	41	12.10	100.00	C00-C97	所有死亡原因	20	11.39	100.00	C00-C97	所有死亡原因	21	12.87	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	10	2.95	24.39	C00-C97	惡性腫瘤	4	2.28	20.00	C00-C97	惡性腫瘤	6	3.68	28.57
2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	1.48	12.20	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	2.28	20.00	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1	0.61	4.76
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	0.59	4.88	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	0.57	5.00	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.61	4.76
4	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	0.30	2.44	E10-E14	糖尿病	1	0.57	5.00	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1	0.61	4.76
5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1	0.30	2.44	J12-J18	肺炎	1	0.57	5.00	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	0.61	4.76
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	0.30	2.44	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	0.57	5.00	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	0.61	4.76
7	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.30	2.44	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	0.57	5.00	J10-J11	流行性感冒	1	0.61	4.76
8	E10-E14	糖尿病	1	0.30	2.44										
9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1	0.30	2.44										
10	J12-J18	肺炎	1	0.30	2.44										
	J10-J11	流行性感冒	1	0.30	2.44										
		其他	16	4.72	39.02		其他	7	3.99	35.00		其他	9	5.52	42.86

資料來源：衛生福利部。

附 註：1-14歲年中人口數為 338,718人，其中男性為 175,578人，女性為 163,141人。

**表10・ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	X60-X84, Y87.0	所有死亡原因 蓄意自我傷害（自殺）	79	29.96	100.00	X60-X84, Y87.0	所有死亡原因 蓄意自我傷害（自殺）	48	35.16	100.00	X60-X84, Y87.0	所有死亡原因 蓄意自我傷害（自殺）	31	24.38	100.00
2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	21	7.96	26.58	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	16	11.72	33.33	C00-C97	惡性腫瘤	5	3.93	16.13
3	C00-C97	惡性腫瘤	5	1.90	6.33	I60-I69	腦血管疾病	2	1.47	4.17	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	3.93	16.13
4	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	4	1.52	5.06	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.47	4.17	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	2.36	9.68
5	I60-I69	腦血管疾病	3	1.14	3.80	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	0.73	2.08	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	2.36	9.68
6	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	1.14	3.80						Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.57	6.45
7	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	1.14	3.80						J12-J18	肺炎	1	0.79	3.23
8	J12-J18	肺炎	1	0.38	1.27						I60-I69	腦血管疾病	1	0.79	3.23
9	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	0.38	1.27						D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1	0.79	3.23
10	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1	0.38	1.27										
		其他	9	3.41	11.39		其他	6	4.40	12.50		其他	3	2.36	9.68

資料來源：衛生福利部。

附 註：15-24歲年中人口數為 263,672人，其中男性為 136,505人，女性為 127,168人。

表11・ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
		所有死亡原因	539	69.50	100.00		所有死亡原因	322	87.07	100.00		所有死亡原因	217	53.49	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	176	22.69	32.65	C00-C97	惡性腫瘤	78	21.09	24.22	C00-C97	惡性腫瘤	98	24.16	45.16
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	89	11.48	16.51	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	50	13.52	15.53	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	39	9.61	17.97
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	57	7.35	10.58	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	43	11.63	13.35	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	17	4.19	7.83
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	49	6.32	9.09	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	32	8.65	9.94	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	14	3.45	6.45
5	I60-I69	腦血管疾病	19	2.45	3.53	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	17	4.60	5.28	E10-E14	糖尿病	5	1.23	2.30
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	18	2.32	3.34	I60-I69	腦血管疾病	16	4.33	4.97	J12-J18	肺炎	4	0.99	1.84
7	E10-E14	糖尿病	10	1.29	1.86	J12-J18	肺炎	5	1.35	1.55	I60-I69	腦血管疾病	3	0.74	1.38
8	J12-J18	肺炎	9	1.16	1.67	E10-E14	糖尿病	5	1.35	1.55	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	0.74	1.38
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	0.64	0.93	B20-B24	人類免疫缺乏病毒（HIV）疾病	4	1.08	1.24	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.49	0.92
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	0.64	0.93	I10-I15	高血壓性疾病	4	1.08	1.24	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	2	0.49	0.92
		其他	102	13.15	18.92		其他	68	18.39	21.12		腎炎、腎病症候群及腎病變	2	0.49	0.92
												其他	28	6.90	12.90

資料來源：衛生福利部。

附 註：25-44歲年中人口數為 775,537人，其中男性為 369,832人，女性為 405,705人。

表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	3,099 1,451	392.41 183.73	100.00 46.82	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	2,020 787	553.05 215.47	100.00 38.96	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	1,079 664	254.19 156.43	100.00 61.54
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	398	50.40	12.84	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	318	87.06	15.74	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	80	18.85	7.41
3	I60-I69	腦血管疾病	169	21.40	5.45	I60-I69	腦血管疾病	128	35.04	6.34	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	45	10.60	4.17
4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	129	16.33	4.16	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	84	23.00	4.16	I60-I69	腦血管疾病	41	9.66	3.80
5	E10-E14	糖尿病	99	12.54	3.19	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	83	22.72	4.11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	26	6.13	2.41
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	95	12.03	3.07	E10-E14	糖尿病	75	20.53	3.71	E10-E14	糖尿病	24	5.65	2.22
7	J12-J18	肺炎	94	11.90	3.03	J12-J18	肺炎	74	20.26	3.66	J12-J18	肺炎	20	4.71	1.85
8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	92	11.65	2.97	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	69	18.89	3.42	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	18	4.24	1.67
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	46	5.82	1.48	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	31	8.49	1.53	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	3.53	1.39
10	I10-I15	高血壓性疾病	36	4.56	1.16	I10-I15	高血壓性疾病	29	7.94	1.44	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	11	2.59	1.02
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	36	4.56	1.16										
		其他	454	57.49	14.65		其他	342	93.64	16.93		其他	135	31.80	12.51

資料來源：衛生福利部。

附 註：45-64歲年中人口數為 789,730人，其中男性為 365,246人，女性為 424,484人。

**表13・ICD-10 臺北市老年(65-74歲)主要死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	2,879	1,028.36	100.00	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	1,770	1,384.86	100.00	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	1,109	728.89	100.00
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,240	442.92	43.07	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	724	566.46	40.90	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	516	339.14	46.53
3	I60-I69	腦血管疾病	373	133.23	12.96	I60-I69	腦血管疾病	250	195.60	14.12	E10-E14	糖尿病	123	80.84	11.09
4	J12-J18	肺炎	165	58.94	5.73	J12-J18	肺炎	99	77.46	5.59	I60-I69	腦血管疾病	45	29.58	4.06
5	E10-E14	糖尿病	143	51.08	4.97	E10-E14	糖尿病	86	67.29	4.86	J12-J18	肺炎	44	28.92	3.97
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	139	49.65	4.83	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	47	36.77	2.66	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	21.03	2.89
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	75	26.79	2.61	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	43	33.64	2.43	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	15.77	2.16
8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	47	25.36	2.47	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	31	24.25	1.75	I10-I15	高血壓性疾病	18	11.83	1.62
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	43	16.79	1.63	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	30	23.47	1.69	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	17	11.17	1.53
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	43	15.36	1.49	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	28	21.91	1.58	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	15	9.86	1.35
	其他		540	192.89	18.76	其他		312	244.11	17.63	其他		222	145.91	20.02
11	I10-I15	高血壓性疾病	39	13.93	1.35	A40-A41	敗血症	22	17.21	1.24	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	7.89	1.08
12	A40-A41	敗血症	34	12.14	1.18	I10-I15	高血壓性疾病	21	16.43	1.19	A40-A41	敗血症	12	7.89	1.08
13	G20-G21	帕金森病	27	9.64	0.94	G20-G21	帕金森病	18	14.08	1.02	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	7.89	1.08
14	I71	主動脈瘤及剝離	24	8.57	0.83	I71	主動脈瘤及剝離	14	10.95	0.79	I71	主動脈瘤及剝離	10	6.57	0.90
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	19	6.79	0.66	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	11	8.61	0.62	G20-G21	帕金森病	9	5.92	0.81

資料來源：衛生福利部。

附 註：65-74歲年中人口數為 279,959人，其中男性為 127,811人，女性為 152,149人。

**表14・ICD-10 臺北市老年(75-84歲)主要死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	4,279	3,270.72	100.00		所有死亡原因	2,247	4,105.05	100.00		所有死亡原因	2,032	2,670.52	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,336	1,021.19	31.22	C00-C97	惡性腫瘤	739	1,350.08	32.89	C00-C97	惡性腫瘤	597	784.60	29.38
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	680	519.77	15.89	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	341	622.97	15.18	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	339	445.53	16.68
3	J12-J18	肺炎	477	364.60	11.15	J12-J18	肺炎	277	506.05	12.33	J12-J18	肺炎	200	262.85	9.84
4	I60-I69	腦血管疾病	315	240.78	7.36	I60-I69	腦血管疾病	156	285.00	6.94	I60-I69	腦血管疾病	159	208.96	7.82
5	E10-E14	糖尿病	191	145.99	4.46	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	93	169.90	4.14	E10-E14	糖尿病	109	143.25	5.36
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	142	108.54	3.32	E10-E14	糖尿病	82	149.81	3.65	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	85	111.71	4.18
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	122	93.25	2.85	A40-A41	敗血症	58	105.96	2.58	A40-A41	敗血症	45	59.14	2.21
8	A40-A41	敗血症	103	78.73	2.41	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	57	104.13	2.54	I10-I15	高血壓性疾病	34	44.68	1.67
9	G20-G21	帕金森病	67	51.21	1.57	G20-G21	帕金森病	39	71.25	1.74	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	29	38.11	1.43
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	60	45.86	1.40	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	31	56.63	1.38	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	29	38.11	1.43
		其他	786	600.79	18.37		其他	374	683.26	16.64		其他	406	533.58	19.98
11	I10-I15	高血壓性疾病	59	45.10	1.38	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	27	49.33	1.20	G20-G21	帕金森病	28	36.80	1.38
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	52	39.75	1.22	F01-F03	血管性及未明示之癥狀	26	47.50	1.16	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	25	32.86	1.23
13	F01-F03	血管性及未明示之癥狀	48	36.69	1.12	I10-I15	高血壓性疾病	25	45.67	1.11	F01-F03	血管性及未明示之癥狀	22	28.91	1.08
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	35	26.75	0.82	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	18	32.88	0.80	I71	主動脈瘤及剝離	17	22.34	0.84
15	I71	主動脈瘤及剝離	30	22.93	0.70	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	13	23.75	0.58	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	17	22.34	0.84

資料來源：衛生福利部。

附 註：75-84歲年中人口數為130,828人，其中男性為54,738人，女性為76,090人。

表15・ICD-10 臺北市老年(85歲以上)主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	所有死亡原因 心臟疾病（高血壓性疾病除外）	7,036	12,235.88	100.00	J12-J18	所有死亡原因 肺炎	3,594	13,686.21	100.00	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	所有死亡原因 心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3,442	11,016.87	100.00
2	J12-J18	肺炎	1,256	2,184.23	17.85	C00-C97	惡性腫瘤	614	2,338.16	17.08	J12-J18	肺炎	587	1,878.82	17.05
3	C00-C97	惡性腫瘤	1,108	1,926.86	15.75	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	591	2,250.57	16.44	C00-C97	惡性腫瘤	494	1,581.15	14.35
4	I60-I69	腦血管疾病	475	826.04	6.75	I60-I69	腦血管疾病	232	883.47	6.46	I60-I69	腦血管疾病	243	777.77	7.06
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	301	523.45	4.28	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	217	826.35	6.04	E10-E14	糖尿病	160	512.11	4.65
6	E10-E14	糖尿病	281	488.67	3.99	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	131	498.86	3.64	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	123	393.69	3.57
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	251	436.50	3.57	E10-E14	糖尿病	121	460.78	3.37	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	120	384.09	3.49
8	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	237	412.15	3.37	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	114	434.12	3.17	I10-I15	高血壓性疾病	120	384.09	3.49
9	I10-I15	高血壓性疾病	201	349.55	2.86	A40-A41	敗血症	98	373.19	2.73	A40-A41	敗血症	86	275.26	2.50
10	A40-A41	敗血症	184	319.98	2.62	I10-I15	高血壓性疾病	81	308.45	2.25	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	84	268.86	2.44
		其他	1,462	2,542.48	20.78		其他	726	2,764.66	20.20		其他	736	2,355.73	21.38
11	G20-G21	帕金森病	84	146.08	1.19	G20-G21	帕金森病	51	194.21	1.42	G20-G21	帕金森病	33	105.62	0.96
12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	77	133.91	1.09	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	45	171.36	1.25	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	32	102.42	0.93
13	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	66	114.78	0.94	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	37	140.90	1.03	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	29	92.82	0.84
14	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	44	76.52	0.63	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	22	83.78	0.61	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	22	70.42	0.64
15	I71	主動脈瘤及剝離	34	59.13	0.48	A15-A19	結核病	20	76.16	0.56	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	22	70.42	0.64

資料來源：衛生福利部。

附 註：85歲以上年中人口數為 57,503 人，其中男性為 26,260 人，女性為 31,243 人。

表16・ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
總計	387	14.57	127	4.78	105	3.95	20	0.75	27	1.02	8	0.30	28	1.05	72	2.71
0歲	9	43.14	1	4.79	-	-	-	-	6	28.76	-	-	-	-	2	9.59
1-14歲	5	1.48	2	0.59	1	0.30	2	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	21	7.96	16	6.07	1	0.38	-	-	1	0.38	-	-	2	0.76	1	0.38
25-44歲	49	6.32	23	2.97	6	0.77	4	0.52	1	0.13	2	0.26	9	1.16	4	0.52
45-64歲	95	12.03	34	4.31	24	3.04	8	1.01	6	0.76	1	0.13	11	1.39	11	1.39
65-79歲	98	27.37	38	10.61	30	8.38	5	1.40	4	1.12	4	1.12	4	1.12	13	3.63
80歲以上	110	99.85	13	11.80	43	39.03	1	0.91	9	8.17	1	0.91	2	1.82	41	37.22

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市年中人口數為2,656,807人。

表17・ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率														
總計	249	19.66	85	6.71	73	5.76	15	1.18	16	1.26	3	0.24	19	1.50	38	3.00
0歲	5	46.54	1	9.31	-	-	-	-	4	37.23	-	-	-	-	-	-
1-14歲	4	2.28	1	0.57	1	0.57	2	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	16	11.72	14	10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.47	-	-
25-44歲	32	8.65	15	4.06	6	1.62	3	0.81	-	-	-	-	4	1.08	4	1.08
45-64歲	69	18.89	26	7.12	20	5.48	6	1.64	5	1.37	-	-	7	1.92	5	1.37
65-79歲	61	37.78	20	12.39	23	14.25	3	1.86	1	0.62	3	1.86	4	2.48	7	4.34
80歲以上	62	130.94	8	16.90	23	48.58	1	2.11	6	12.67	-	-	2	4.22	22	46.46

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市男性年中人口數為1,266,712人。

表18・ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死 亡 人 數	每 十 萬 女性 人 口 死 亡 率														
總計	138	9.93	42	3.02	32	2.30	5	0.36	11	0.79	5	0.36	9	0.65	34	2.45
0歲	4	39.54	-	-	-	-	-	-	2	19.77	-	-	-	-	2	-
1-14歲	1	0.61	1	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	5	3.93	2	1.57	1	0.79	-	-	1	0.79	-	-	-	-	1	0.79
25-44歲	17	4.19	8	1.97	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.49	5	1.23	-	-
45-64歲	26	6.13	8	1.88	4	0.94	2	0.47	1	0.24	1	0.24	4	0.94	6	1.41
65-79歲	37	18.81	18	9.15	7	3.56	2	1.02	3	1.53	1	0.51	-	-	6	3.05
80歲以上	48	76.41	5	7.96	20	31.84	-	-	3	4.78	1	1.59	-	-	19	30.24

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市女性年中人口數為1,390,095人。

表19・ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外 事故中受傷		腳踏車騎乘者在 運輸事故傷害中 受傷		摩托車騎乘者在 運輸事故傷害中 受傷		汽車乘員[乘客或 員工(駕駛員)]在 運輸事故傷害中 受傷		小貨(卡)車或箱型車 乘員[乘客或員工(駕 駛員)]在運輸意外事 故中受傷		其他陸路運輸 事故傷害		其他和未特定的運 輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
總計	127	4.78	33	1.24	12	0.45	29	1.09	7	0.26	2	0.08	42	1.58	2	0.08
0歲	1	4.79	-	-	-	-	1	4.79	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	2	0.59	-	-	-	-	-	-	1	0.30	-	-	1	0.30	-	-
15-24歲	16	6.07	-	-	-	-	11	4.17	-	-	-	-	5	1.90	-	-
25-44歲	23	2.97	2	0.26	1	0.13	5	0.64	2	0.26	-	-	13	1.68	-	-
45-64歲	34	4.31	12	1.52	4	0.51	8	1.01	-	-	1	0.13	8	1.01	1	0.13
65-79歲	38	10.61	14	3.91	4	1.12	4	1.12	2	0.56	1	0.28	12	3.35	1	0.28
80歲以上	13	11.80	5	4.54	3	2.72	-	-	2	1.82	-	-	3	2.72	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市年中人口數為2,656,807人。

**表20 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	85	6.71	21	1.66	8	0.63	26	2.05	3	0.24	1	0.08	24	1.89	2	0.16
0歲	1	9.31	-	-	-	-	1	9.31	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.57	-	-
15-24歲	14	10.26	-	-	-	-	10	7.33	-	-	-	-	4	2.93	-	-
25-44歲	15	4.06	1	0.27	1	0.27	4	1.08	2	0.54	-	-	7	1.89	-	-
45-64歲	26	7.12	8	2.19	3	0.82	7	1.92	-	-	-	-	7	1.92	1	0.27
65-79歲	20	12.39	8	4.95	2	1.24	4	2.48	-	-	1	0.62	4	2.48	1	0.62
80歲以上	8	16.90	4	8.45	2	4.22	-	-	1	2.11	-	-	1	2.11	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市男性年中人口數為1,266,712人。

表21 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外 事故中受傷		腳踏車騎乘者在 運輸事故傷害中 受傷		摩托車騎乘者在 運輸事故傷害中 受傷		汽車乘員[乘客或 員工(駕駛員)]在 運輸事故傷害中 受傷		小貨(卡)車或箱型車 乘員[乘客或員工(駕 駛員)]在運輸意外事 故中受傷		其他陸路運輸 事故傷害		其他和未特定的運 輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
總計	42	3.02	12	0.86	4	0.29	3	0.22	4	0.29	1	0.07	18	1.29	-	-
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.61	-	-	-	-	-	-	-	1	0.61	-	-	-	-	-
15-24歲	2	1.57	-	-	-	-	-	1	0.79	-	-	-	-	1	0.79	-
25-44歲	8	1.97	1	0.25	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.48	-
45-64歲	8	1.88	4	0.94	1	0.24	1	0.24	-	-	1	0.24	1	0.24	-	-
65-79歲	18	9.15	6	3.05	2	1.02	-	-	2	1.02	-	-	8	4.07	-	-
80歲以上	5	7.96	1	1.59	1	1.59	-	-	1	1.59	-	-	2	3.18	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市女性年中人口數為1,390,095人。

表22 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上		
		死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率															
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	339	12.76	-	-	1	0.30	28	10.62	89	11.48	129	16.33	69	19.27	23	20.88	
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.28	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	0.19	-	-	-	-	-	-	2	0.26	2	0.25	1	0.28	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	48	1.81	-	-	-	-	3	1.14	18	2.32	23	2.91	4	1.12	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.56	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	0.19	-	-	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	1	0.28	2	1.82	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	128	4.82	-	-	-	-	12	4.55	27	3.48	51	6.46	31	8.66	7	6.35	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	29	1.09	-	-	-	-	-	-	12	1.55	10	1.27	5	1.40	2	1.82	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	5	0.19	-	-	-	-	1	0.38	4	0.52	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	6	0.23	-	-	-	-	-	-	1	0.13	4	0.51	1	0.28	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	15	0.56	-	-	-	-	1	0.38	1	0.13	5	0.63	5	1.40	3	2.72	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	91	3.43	-	-	1	0.30	10	3.79	22	2.84	31	3.93	18	5.03	9	8.17	-
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.08	-	-	-	-	1	0.38	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市年中人口數為2,656,807人。

表23・ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上		
		死 亡	每 十 萬 男 性 人 口 人 數															
		死 亡	死 亡 率	死 亡														
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	212	16.74	-	-	-	-	21	15.38	50	13.52	84	23.00	42	26.01	15	31.68	
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.24	-	-	-	-	-	-	1	0.27	2	0.55	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	35	2.76	-	-	-	-	2	1.47	12	3.24	17	4.65	4	2.48	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.62	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.32	-	-	-	-	-	-	1	0.27	1	0.27	1	0.62	1	2.11	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	86	6.79	-	-	-	-	9	6.59	15	4.06	39	10.68	18	11.15	5	10.56	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	8	0.63	-	-	-	-	-	-	5	1.35	2	0.55	1	0.62	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	5	0.39	-	-	-	-	1	0.73	4	1.08	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	5	0.39	-	-	-	-	-	-	1	0.27	3	0.82	1	0.62	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	9	0.71	-	-	-	-	-	-	1	0.27	3	0.82	3	1.86	2	4.22	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	53	4.18	-	-	-	-	8	5.86	9	2.43	16	4.38	13	8.05	7	14.78	-
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.27	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	-	-	1	0.73	-	-	1	0.27	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市男性年中人口數為1,266,712人。

表24・ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上		
		死 亡	每 十 萬 女 性 人 口 人 數															
		死 亡	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率															
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	127	9.14	-	-	1	0.61	7	5.50	39	9.61	45	10.60	27	13.73	8	12.73	
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.51	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	1	0.51	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.24	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	13	0.94	-	-	-	-	1	0.79	6	1.48	6	1.41	-	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.51	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.59
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	42	3.02	-	-	-	-	3	2.36	12	2.96	12	2.83	13	6.61	2	3.18	
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	21	1.51	-	-	-	-	-	-	7	1.73	8	1.88	4	2.03	2	3.18	
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.24	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器具蓄意自我傷害	6	0.43	-	-	-	-	1	0.79	-	-	2	0.47	2	1.02	1	1.59	
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	38	2.73	-	-	1	0.61	2	1.57	13	3.20	15	3.53	5	2.54	2	3.18	
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市女性年中人口數為1,390,095人。

表25・ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性						
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百分比		
			死 亡 率	標準化死 亡 率			死 亡 率	標準化死 亡 率			死 亡 率	標準化死 亡 率			
	所有癌症死亡原因	5,326	200.47	99.46	100.00	惡性腫瘤	2,946	232.57	121.16	100.00	惡性腫瘤	2,380	171.21	82.22	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	1,040	39.14	18.55	19.53	氣管、支氣管和肺癌	615	48.55	24.65	20.88	氣管、支氣管和肺癌	425	30.57	13.65	17.86
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	378	27.19	14.81	7.10	肝和肝內膽管癌	421	33.24	18.07	14.29	女性乳房癌	378	27.19	14.81	15.88
3	結腸、直腸和肛門癌	721	27.14	12.95	13.54	結腸、直腸和肛門癌	405	31.97	16.38	13.75	結腸、直腸和肛門癌	316	22.73	10.28	13.28
4	肝和肝內膽管癌	661	24.88	12.14	12.41	胃癌	182	14.37	7.08	6.18	肝和肝內膽管癌	240	17.27	7.25	10.08
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	177	13.97	6.02	3.32	口腔癌	181	14.29	8.37	6.14	胰臟癌	154	11.08	5.21	6.47
6	胰臟癌	314	11.82	5.73	5.90	前列腺(攝護腺)癌	177	13.97	6.02	6.01	胃癌	113	8.13	3.59	4.75
7	胃癌	295	11.10	5.14	5.54	胰臟癌	160	12.63	6.35	5.43	非何杰金氏淋巴瘤	91	6.55	2.75	3.82
8	口腔癌	200	7.53	4.15	3.76	食道癌	133	10.50	5.97	4.51	卵巢癌	86	6.19	3.37	3.61
9	非何杰金氏淋巴瘤	186	7.00	3.21	3.49	非何杰金氏淋巴瘤	95	7.50	3.75	3.22	子宮體癌	65	4.68	2.47	2.73
10	卵巢癌 ⁽¹⁾	86	6.19	3.37	1.61	白血病	78	6.16	3.48	2.65	白血病	63	4.53	2.55	2.65
	其他	1,268	47.73	25.04	23.81	其他	499	39.39	21.04	16.94	其他	449	32.30	16.27	18.87
11	食道癌	150	5.65	3.00	2.82	膀胱癌	67	5.29	2.40	2.27	子宮頸及部位未明示子宮癌	62	4.46	2.42	2.61
12	白血病	141	5.31	2.96	2.65	腎臟癌	56	4.42	2.10	1.90	間皮和軟組織癌	42	3.02	1.68	1.76
13	子宮體癌 ⁽¹⁾	65	4.68	2.47	1.22	鼻咽癌	49	3.87	2.52	1.66	腦癌	39	2.81	1.98	1.64
14	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	62	4.46	2.42	1.16	腦癌	48	3.79	2.33	1.63	膀胱癌	33	2.37	0.89	1.39
15	膀胱癌	100	3.76	1.56	1.88	膽囊和其他膽道癌	33	2.61	1.22	1.12	膽囊和其他膽道癌	29	2.09	0.92	1.22

資料來源：衛生福利部。

附 註：1. 臺北市年中人口數為 2,656,807人，其中男性 1,266,712人，女性 1,390,095人。

2. (1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表26 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上	
			死 亡 人 數	每 十 萬 人 口																
			人 數	死 亡 率																
	C00-C97	所有癌症死亡原因	5,326	200.47	-	-	10	2.95	5	1.90	176	22.69	1,451	183.73	1,240	442.92	1,336	1,021.19	1,108	1,926.86
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,040	39.14	-	-	-	-	-	-	9	1.16	254	32.16	258	92.16	292	223.19	227	394.76
2	C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	378	27.19	-	-	-	-	-	-	32	7.89	164	38.64	77	50.61	66	86.74	39	124.83
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	721	27.14	-	-	-	-	1	0.38	25	3.22	151	19.12	161	57.51	204	155.93	179	311.29
4	C22	肝和肝內膽管癌	661	24.88	-	-	-	-	-	-	15	1.93	154	19.50	184	65.72	186	142.17	122	212.16
5	C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	177	13.97	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4.38	28	21.91	52	95.00	81	308.45
6	C25	胰臟癌	314	11.82	-	-	-	-	-	-	5	0.64	89	11.27	91	32.50	73	55.80	56	97.39
7	C16	胃癌	295	11.10	-	-	-	-	-	-	10	1.29	62	7.85	58	20.72	79	60.38	86	149.56
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	200	7.53	-	-	-	-	-	-	4	0.52	107	13.55	48	17.15	23	17.58	18	31.30
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	186	7.00	-	-	1	0.30	-	-	6	0.77	31	3.93	38	13.57	54	41.28	56	97.39
10	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	86	6.19	-	-	-	-	-	-	1	0.25	49	11.54	18	11.83	13	17.09	5	16.00
		其他	1,268	47.73	-	-	9	2.66	4	1.52	69	8.90	374	47.36	279	99.66	294	224.72	239	415.63
11	C15	食道癌	140	5.23	-	-	-	-	-	-	2	0.26	72	9.12	36	12.86	26	19.87	14	24.35
12	C91-C95	白血病	66	4.72	-	-	6	1.77	-	-	8	1.03	24	3.04	34	12.14	40	30.57	29	50.43
13	C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	124	4.63	-	-	-	-	-	-	2	0.49	30	7.07	20	13.15	8	10.51	5	16.00
14	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	109	4.07	-	-	-	-	-	-	7	1.73	24	5.65	10	6.57	12	15.77	9	28.81
15	C67	膀胱癌	54	3.86	-	-	-	-	-	-	1	0.13	15	1.90	13	4.64	29	22.17	42	73.04

資料來源：衛生福利部。

附 註：1.臺北市年中人口數為2,656,807人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表27 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國108年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上	
			死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口																
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,946	232.57	-	-	4	2.28	-	-	78	21.09	787	215.47	724	566.46	739	1,350.08	614	2,338.16
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	615	48.55	-	-	-	-	-	-	4	1.08	151	41.34	156	122.06	173	316.05	131	498.86
2	C22	肝和肝內膽管癌	421	33.24	-	-	-	-	-	-	13	3.52	123	33.68	124	97.02	108	197.31	53	201.83
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	405	31.97	-	-	-	-	-	-	16	4.33	78	21.36	92	71.98	127	232.02	92	350.34
4	C16	胃癌	182	14.37	-	-	-	-	-	-	1	0.27	41	11.23	44	34.43	48	87.69	48	182.79
5	C00-C06, C09-C10,	口腔癌	181	14.29	-	-	-	-	-	-	4	1.08	100	27.38	45	35.21	21	38.36	11	41.89
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	177	13.97	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4.38	28	21.91	52	95.00	81	308.45
7	C25	胰臟癌	160	12.63	-	-	-	-	-	-	4	1.08	37	10.13	51	39.90	32	58.46	36	137.09
8	C15	食道癌	133	10.50	-	-	-	-	-	-	2	0.54	67	18.34	33	25.82	21	38.36	10	38.08
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	95	7.50	-	-	1	0.57	-	-	2	0.54	16	4.38	22	17.21	25	45.67	29	110.43
10	C91-C95	白血病	78	6.16	-	-	3	1.71	-	-	3	0.81	14	3.83	18	14.08	21	38.36	19	72.35
		其他	499	39.39	-	-	-	-	-	-	29	7.84	144	39.43	111	86.85	111	202.79	104	396.04
11	C67	膀胱癌	67	5.29	-	-	-	-	-	-	1	0.27	11	3.01	10	7.82	19	34.71	26	99.01
12	C64	腎臟癌	56	4.42	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.56	15	11.74	10	18.27	18	68.55
13	C11	鼻咽癌	49	3.87	-	-	-	-	-	-	8	2.16	25	6.84	9	7.04	6	10.96	1	3.81
14	C71	腦癌	48	3.79	-	-	-	-	-	-	6	1.62	25	6.84	8	6.26	6	10.96	3	11.42
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	33	2.61	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.19	10	7.82	4	7.31	11	41.89

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為 1,266,712人。

表28・ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國108年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上	
			死 亡	每十萬 女性人口																
			人 數	死 亡率																
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,380	171.21	-	-	6	3.68	5	3.93	98	24.16	664	156.43	516	339.14	597	784.60	494	1,581.15
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	425	30.57	-	-	-	-	-	-	5	1.23	103	24.26	102	67.04	119	156.39	96	307.27
2	C50	女性乳房癌	378	27.19	-	-	-	-	-	-	32	7.89	164	38.64	77	50.61	66	86.74	39	124.83
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	316	22.73	-	-	-	-	1	0.79	9	2.22	73	17.20	69	45.35	77	101.20	87	278.46
4	C22	肝和肝內膽管癌	240	17.27	-	-	-	-	-	-	2	0.49	31	7.30	60	39.44	78	102.51	69	220.85
5	C25	胰臟癌	154	11.08	-	-	-	-	-	-	1	0.25	52	12.25	40	26.29	41	53.88	20	64.01
6	C16	胃癌	113	8.13	-	-	-	-	-	-	9	2.22	21	4.95	14	9.20	31	40.74	38	121.63
7	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	91	6.55	-	-	-	-	-	-	4	0.99	15	3.53	16	10.52	29	38.11	27	86.42
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	86	6.19	-	-	-	-	-	-	1	0.25	49	11.54	18	11.83	13	17.09	5	16.00
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	65	4.68	-	-	-	-	-	-	2	0.49	30	7.07	20	13.15	8	10.51	5	16.00
10	C91-C95	白血病	63	4.53	-	-	3	1.84	-	-	5	1.23	10	2.36	16	10.52	19	24.97	10	32.01
		其他	449	32.30	-	-	3	1.84	4	3.15	28	6.90	116	27.33	84	55.21	116	152.45	98	313.67
11	C54	子宮體癌	54	3.86	-	-	-	-	-	-	7	1.73	24	5.65	10	6.57	12	15.77	9	28.81
12	C71	腦癌	40	2.86	-	-	-	-	1	0.79	5	1.23	13	3.06	5	3.29	12	15.77	6	19.20
13	C67	膀胱癌	38	2.72	-	-	2	1.23	1	0.79	8	1.97	13	3.06	6	3.94	6	7.89	3	9.60
14	C45-C49	間皮和軟組織癌	34	2.43	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.94	3	1.97	10	13.14	16	51.21
15	C64	腎臟癌	33	2.36	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.41	3	1.97	15	19.71	5	16.00

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市女性年中人口數為 1,390,095人。

參、108 年死因統計

二、行政區別死因統計

表29-1 · ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	所有死亡原因	1296	632.36	263.45	100.00	所有死亡原因	721	751.49	339.01	100.00	所有死亡原因	575	527.50	202.96	100.00
1	惡性腫瘤	360	175.65	79.85	27.78	惡性腫瘤	204	212.63	100.92	28.29	惡性腫瘤	156	143.11	63.13	27.13
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	220	107.34	39.20	16.98	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	130	135.50	54.90	18.03	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	90	82.57	26.71	15.65
3	肺炎	140	68.31	22.04	10.80	肺炎	80	83.38	28.92	11.10	肺炎	60	55.04	16.48	10.43
4	腦血管疾病	70	34.16	12.91	5.40	腦血管疾病	41	42.73	18.60	5.69	腦血管疾病	29	26.60	8.56	5.04
5	糖尿病	52	25.37	9.71	4.01	糖尿病	31	32.31	13.41	4.30	糖尿病	21	19.27	6.88	3.65
6	敗血症	34	16.59	5.55	2.62	慢性下呼吸道疾病	23	23.97	8.49	3.19	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	16.51	6.07	3.13
7	慢性下呼吸道疾病	33	16.10	5.29	2.55	敗血症	18	18.76	7.36	2.50	高血壓性疾病	17	15.60	5.48	2.96
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	31	15.13	5.44	2.39	事故傷害	15	15.63	11.10	2.08	敗血症	16	14.68	4.00	2.78
9	事故傷害	31	15.13	10.40	2.39	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	13.55	4.60	1.80	事故傷害	16	14.68	10.33	2.78
10	高血壓性疾病	28	13.66	5.00	2.16	帕金森病	12	12.51	5.36	1.66	血管性及未明示之癱瘓	14	12.84	3.50	2.43
	其他	297	144.92	68.07	22.92	其他	154	160.51	85.35	21.36	其他	138	126.60	51.81	24.00
11	血管性及未明示之癱瘓	22	10.73	2.99	1.70	蓄意自我傷害（自殺）	12	12.51	13.67	1.66	帕金森病	10	9.17	2.98	1.74
12	帕金森病	22	10.73	3.99	1.70	高血壓性疾病	11	11.47	4.29	1.53	慢性下呼吸道疾病	10	9.17	2.83	1.74
13	蓄意自我傷害（自殺）	17	8.29	8.07	1.31	血管性及未明示之癱瘓	8	8.34	2.34	1.11	衰老/老邁	6	5.50	1.31	1.04
14	慢性肝病及肝硬化	12	5.86	3.18	0.93	主動脈瘤及剝離	8	8.34	5.04	1.11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	4.59	1.74	0.87
15	主動脈瘤及剝離	11	5.37	2.69	0.85	慢性肝病及肝硬化	8	8.34	4.59	1.11	蓄意自我傷害（自殺）	5	4.59	2.59	0.87

資料來源：衛生福利部。

表29-2 · ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性						
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百分比		
			死 亡 率	標準化 死 亡 率			死 亡 率	標準化 死 亡 率			死 亡 率	標準化 死 亡 率			
1	所有死亡原因	1,618	729.77	316.75	100.00	所有死亡原因	917	868.93	396.50	100.00	所有死亡原因	701	603.37	250.03	100.00
1	惡性腫瘤	497	224.16	105.50	30.72	惡性腫瘤	262	248.26	120.92	28.57	惡性腫瘤	235	202.27	93.80	33.52
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	249	112.31	44.28	15.39	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	145	137.40	56.27	15.81	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	104	89.52	34.06	14.84
3	肺炎	157	70.81	22.33	9.70	肺炎	97	91.91	30.47	10.58	肺炎	60	51.64	15.58	8.56
4	腦血管疾病	104	46.91	19.60	6.43	腦血管疾病	62	58.75	26.66	6.76	腦血管疾病	42	36.15	13.77	5.99
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	65	29.32	10.73	4.02	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	30.32	11.20	3.49	腎炎、腎病症候群及腎病變	33	28.40	10.16	4.71
6	糖尿病	60	27.06	11.79	3.71	糖尿病	29	27.48	13.77	3.16	糖尿病	31	26.68	9.70	4.42
7	慢性下呼吸道疾病	42	18.94	7.08	2.60	慢性下呼吸道疾病	29	27.48	11.29	3.16	血管性及未明示之癱瘓症	15	12.91	3.87	2.14
8	事故傷害	34	15.34	8.84	2.10	事故傷害	22	20.85	13.27	2.40	慢性下呼吸道疾病	13	11.19	3.85	1.85
9	蓄意自我傷害（自殺）	32	14.43	10.92	1.98	蓄意自我傷害（自殺）	22	20.85	16.95	2.40	事故傷害	12	10.33	4.87	1.71
10	敗血症	28	12.63	3.99	1.73	敗血症	20	18.95	5.96	2.18	高血壓性疾病	11	9.47	2.81	1.57
	其他	350	157.86	71.69	21.63	其他	197	186.67	89.76	21.48	其他	145	124.81	57.55	20.68
11	血管性及未明示之癱瘓症	27	12.18	3.72	1.67	慢性肝病及肝硬化	18	17.06	10.21	1.96	蓄意自我傷害（自殺）	10	8.61	5.07	1.43
12	慢性肝病及肝硬化	25	11.28	5.91	1.55	帕金森病	13	12.32	4.28	1.42	敗血症	8	6.89	2.30	1.14
13	高血壓性疾病	24	10.82	3.68	1.48	高血壓性疾病	13	12.32	4.77	1.42	帕金森病	7	6.03	2.20	1.00
14	帕金森病	20	9.02	3.18	1.24	血管性及未明示之癱瘓症	12	11.37	3.58	1.31	主動脈瘤及剝離	7	6.03	1.95	1.00
15	主動脈瘤及剝離	15	6.77	3.01	0.93	主動脈瘤及剝離	8	7.58	4.19	0.87	慢性肝病及肝硬化	7	6.03	2.20	1.00

資料來源：衛生福利部。

附 註：女性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、6.03人，每十萬人口標準化死亡率為2.56人。

表29-3・ICD-10臺北市大安區主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有死亡原因	2,139	693.95	269.04	100.00	所有死亡原因	1,181	822.62	337.77	100.00	所有死亡原因	958	581.77	214.17	100.00
1	惡性腫瘤	656	212.82	96.05	30.67	惡性腫瘤	364	253.54	116.41	30.82	惡性腫瘤	292	177.32	80.35	30.48
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	339	109.98	37.48	15.85	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	179	124.68	47.54	15.16	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	160	97.16	29.41	16.70
3	肺炎	215	69.75	20.03	10.05	肺炎	120	83.58	25.47	10.16	肺炎	95	57.69	15.65	9.92
4	腦血管疾病	129	41.85	14.33	6.03	腦血管疾病	60	41.79	16.36	5.08	腦血管疾病	69	41.90	12.69	7.20
5	糖尿病	83	26.93	9.49	3.88	糖尿病	47	32.74	12.10	3.98	糖尿病	36	21.86	7.33	3.76
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	66	21.41	7.26	3.09	腎炎、腎病症候群及腎病變	40	27.86	9.67	3.39	血管性及未明示之癱瘓症	28	17.00	4.05	2.92
7	血管性及未明示之癱瘓症	53	17.19	4.33	2.48	慢性下呼吸道疾病	32	22.29	6.25	2.71	高血壓性疾病	28	17.00	4.51	2.92
8	高血壓性疾病	51	16.55	5.86	2.38	血管性及未明示之癱瘓症	25	17.41	4.66	2.12	腎炎、腎病症候群及腎病變	26	15.79	5.34	2.71
9	慢性下呼吸道疾病	45	14.60	3.96	2.10	事故傷害	25	17.41	9.46	2.12	蓄意自我傷害（自殺）	18	10.93	8.89	1.88
10	事故傷害	38	12.33	7.38	1.78	敗血症	24	16.72	5.58	2.03	敗血症	13	7.89	2.24	1.36
	其他	464	150.53	62.88	21.69	其他	265	184.58	84.27	22.44	其他	193	117.20	43.70	20.15
11	敗血症	37	12.00	3.69	1.73	高血壓性疾病	23	16.02	7.55	1.95	慢性下呼吸道疾病	13	7.89	2.11	1.36
12	蓄意自我傷害（自殺）	37	12.00	8.74	1.73	帕金森病	20	13.93	5.21	1.69	事故傷害	13	7.89	5.68	1.36
13	帕金森病	28	9.08	3.00	1.31	蓄意自我傷害（自殺）	19	13.23	8.61	1.61	慢性肝病及肝硬化	9	5.47	1.93	0.94
14	慢性肝病及肝硬化	22	7.14	2.90	1.03	慢性肝病及肝硬化	13	9.06	4.09	1.10	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	4.86	2.15	0.84
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	17	5.52	1.99	0.79	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	9	6.27	1.85	0.76	帕金森病	8	4.86	1.29	0.84

資料來源：衛生福利部。

**表29-4・ICD-10臺北市中山區主要死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	所有死亡原因	1,563	684.26	301.12	100.00	所有死亡原因	822	774.62	375.89	100.00	所有死亡原因	741	605.86	241.75	100.00
1	惡性腫瘤	464	203.13	94.85	29.69	惡性腫瘤	242	228.05	113.91	29.44	惡性腫瘤	222	181.51	79.98	29.96
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	244	106.82	43.37	15.61	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	123	115.91	55.20	14.96	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	121	98.93	33.50	16.33
3	肺炎	184	80.55	29.61	11.77	肺炎	99	93.29	38.37	12.04	肺炎	85	69.50	22.84	11.47
4	腦血管疾病	87	38.09	15.29	5.57	腦血管疾病	52	49.00	22.01	6.33	腦血管疾病	35	28.62	9.87	4.72
5	糖尿病	51	22.33	9.83	3.26	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	30.16	13.78	3.89	糖尿病	25	20.44	7.60	3.37
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	49	21.45	8.79	3.13	糖尿病	26	24.50	12.54	3.16	事故傷害	23	18.81	10.08	3.10
7	事故傷害	47	20.58	12.55	3.01	慢性下呼吸道疾病	26	24.50	9.33	3.16	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	13.90	4.89	2.29
8	慢性下呼吸道疾病	36	15.76	5.43	2.30	事故傷害	24	22.62	15.33	2.92	敗血症	16	13.08	4.55	2.16
9	敗血症	34	14.88	5.63	2.18	蓄意自我傷害（自殺）	20	18.85	13.34	2.43	高血壓性疾病	16	13.08	4.29	2.16
10	高血壓性疾病	32	14.01	5.09	2.05	敗血症	18	16.96	6.96	2.19	蓄意自我傷害（自殺）	12	9.81	7.61	1.62
	其他	335	146.66	70.69	21.43	其他	160	150.78	75.11	19.46	其他	169	138.18	56.53	22.81
11	蓄意自我傷害（自殺）	32	14.01	10.15	2.05	高血壓性疾病	16	15.08	6.15	1.95	血管性及未明示之癱瘓	10	8.18	2.12	1.35
12	血管性及未明示之癱瘓	15	6.57	2.00	0.96	慢性肝病及肝硬化	11	10.37	5.88	1.34	慢性下呼吸道疾病	10	8.18	2.72	1.35
13	慢性肝病及肝硬化	15	6.57	3.67	0.96	帕金森病	6	5.65	2.32	0.73	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	9	7.36	2.40	1.21
14	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	14	6.13	2.17	0.90	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	5	4.71	1.88	0.61	帕金森病	5	4.09	1.57	0.67
15	帕金森病	11	4.82	1.87	0.70	血管性及未明示之癱瘓	5	4.71	1.84	0.61	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	4.09	2.19	0.67

資料來源：衛生福利部。

附 註：男性：主動脈瘤及剝離及流行性感冒死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.71人，每十萬人口標準化死亡率各為2.48人、1.84人。

表29-5・ICD-10臺北市中正區主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性						
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百分比		
			死 亡 率	標準化 死 亡 率			死 亡 率	標準化 死 亡 率			死 亡 率	標準化 死 亡 率			
1	所有死亡原因	1,068	673.79	283.86	100.00	所有死亡原因	633	837.71	382.03	100.00	所有死亡原因	435	524.45	199.03	100.00
1	惡性腫瘤	301	189.90	91.27	28.18	惡性腫瘤	178	235.56	116.73	28.12	惡性腫瘤	123	148.29	69.37	28.28
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	156	98.42	38.30	14.61	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	95	125.72	56.31	15.01	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	61	73.54	23.12	14.02
3	肺炎	135	85.17	27.42	12.64	肺炎	77	101.90	34.00	12.16	肺炎	58	69.93	22.14	13.33
4	腦血管疾病	79	49.84	20.23	7.40	腦血管疾病	52	68.82	30.74	8.21	腦血管疾病	27	32.55	11.18	6.21
5	糖尿病	33	20.82	8.32	3.09	慢性下呼吸道疾病	18	23.82	7.22	2.84	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	24.11	8.53	4.60
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	30	18.93	6.80	2.81	糖尿病	17	22.50	10.25	2.69	糖尿病	16	19.29	6.73	3.68
7	高血壓性疾病	28	17.66	6.36	2.62	血管性及未明示之癱瘓	16	21.17	6.28	2.53	高血壓性疾病	13	15.67	4.82	2.99
8	血管性及未明示之癱瘓	27	17.03	4.80	2.53	蓄意自我傷害（自殺）	16	21.17	19.31	2.53	血管性及未明示之癱瘓	11	13.26	3.58	2.53
9	慢性下呼吸道疾病	27	17.03	4.85	2.53	高血壓性疾病	15	19.85	8.17	2.37	慢性下呼吸道疾病	9	10.85	2.88	2.07
10	蓄意自我傷害（自殺）	23	14.51	12.10	2.15	事故傷害	13	17.20	13.07	2.05	蓄意自我傷害（自殺）	7	8.44	5.20	1.61
	其他	229	144.47	63.41	21.44	其他	136	179.98	79.95	21.48	其他	90	108.51	41.50	20.69
11	事故傷害	19	11.99	8.09	1.78	敗血症	12	15.88	6.25	1.90	敗血症	6	7.23	2.38	1.38
12	敗血症	18	11.36	4.09	1.69	帕金森病	11	14.56	6.09	1.74	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	7.23	3.57	1.38
13	帕金森病	15	9.46	3.81	1.40	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	13.23	4.67	1.58	事故傷害	6	7.23	3.42	1.38
14	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	12	7.57	3.29	1.12	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	9	11.91	4.71	1.42	帕金森病	4	4.82	1.91	0.92
15	慢性肝病及肝硬化	11	6.94	3.55	1.03	慢性肝病及肝硬化	8	10.59	6.40	1.26	主動脈瘤及剝離	4	4.82	1.81	0.92

資料來源：衛生福利部。

表29-6・ICD-10臺北市大同區主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	所有死亡原因 惡性腫瘤	1,011 304	797.10 239.68	369.92 117.10	100.00 30.07	所有死亡原因 惡性腫瘤	589 183	955.23 296.79	499.98 154.10	100.00 31.07	所有死亡原因 惡性腫瘤	422 121	647.50 185.66	259.28 87.36	100.00 28.67
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	156	123.00	51.40	15.43	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	93	150.83	73.73	15.79	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	63	96.67	32.68	14.93
3	肺炎	107	84.36	32.93	10.58	肺炎	63	102.17	47.36	10.70	肺炎	44	67.51	21.21	10.43
4	腦血管疾病	66	52.04	22.18	6.53	腦血管疾病	37	60.01	30.33	6.28	腦血管疾病	29	44.50	14.83	6.87
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	37	29.17	11.45	3.66	慢性下呼吸道疾病	23	37.30	16.61	3.90	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	27.62	9.13	4.27
6	糖尿病	35	27.60	13.33	3.46	事故傷害	21	34.06	21.86	3.57	糖尿病	17	26.08	12.33	4.03
7	慢性下呼吸道疾病	31	24.44	9.44	3.07	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	30.81	14.16	3.23	高血壓性疾病	11	16.88	6.44	2.61
8	事故傷害	28	22.08	12.93	2.77	糖尿病	18	29.19	14.77	3.06	血管性及未明示之癥狀	8	12.27	3.87	1.90
9	高血壓性疾病	17	13.40	5.75	1.68	慢性肝病及肝硬化	14	22.70	13.66	2.38	慢性下呼吸道疾病	8	12.27	4.21	1.90
10	慢性肝病及肝硬化	17	13.40	7.35	1.68	蓄意自我傷害（自殺）	11	17.84	14.92	1.87	敗血症	7	10.74	2.99	1.66
	其他	213	167.94	86.07	21.07	其他	107	173.53	98.49	18.17	其他	96	147.30	64.25	22.75
11	蓄意自我傷害（自殺）	17	13.40	12.12	1.68	敗血症	7	11.35	5.37	1.19	事故傷害	7	10.74	4.63	1.66
12	敗血症	14	11.04	4.12	1.38	高血壓性疾病	6	9.73	4.93	1.02	蓄意自我傷害（自殺）	6	9.21	9.79	1.42
13	血管性及未明示之癥狀	12	9.46	3.21	1.19	帕金森病	5	8.11	3.28	0.85	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	5	7.67	3.09	1.18
14	帕金森病	10	7.88	2.95	0.99	血管性及未明示之癥狀	4	6.49	2.47	0.68	帕金森病	5	7.67	2.96	1.18
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	4.73	2.07	0.59	主動脈瘤及剝離	4	6.49	2.76	0.68	慢性肝病及肝硬化	3	4.60	1.59	0.71

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)總計：主動脈瘤及剝離之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、4.73人，每十萬人口標準化死亡率為1.78人。

(2)男性：源於周產期的特定病況之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、6.49人，每十萬人口標準化死亡率為12.87人。

(3)女性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、4.60人，每十萬人口標準化死亡率為4.00人。

**表29-7・ICD-10臺北市萬華區主要死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	所有死亡原因	1,651	876.61	372.28	100.00	所有死亡原因	949	1,028.17	474.86	100.00	所有死亡原因	702	730.95	281.72	100.00
1	惡性腫瘤	461	244.77	111.97	27.92	惡性腫瘤	262	283.86	138.28	27.61	惡性腫瘤	199	207.21	89.22	28.35
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	253	134.33	53.89	15.32	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	135	146.26	67.03	14.23	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	118	122.87	41.84	16.81
3	肺炎	185	98.23	32.63	11.21	肺炎	103	111.59	41.47	10.85	肺炎	82	85.38	25.00	11.68
4	腦血管疾病	131	69.56	28.52	7.93	腦血管疾病	80	86.67	41.42	8.43	腦血管疾病	51	53.10	16.69	7.26
5	糖尿病	68	36.11	13.82	4.12	慢性下呼吸道疾病	41	44.42	17.41	4.32	糖尿病	35	36.44	12.65	4.99
6	慢性下呼吸道疾病	52	27.61	9.67	3.15	糖尿病	33	35.75	15.00	3.48	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	22.91	7.18	3.13
7	事故傷害	39	20.71	12.76	2.36	事故傷害	32	34.67	22.26	3.37	高血壓性疾病	21	21.87	6.20	2.99
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	37	19.65	6.86	2.24	敗血症	23	24.92	10.39	2.42	蓄意自我傷害（自殺）	13	13.54	11.19	1.85
9	高血壓性疾病	36	19.11	6.52	2.18	蓄意自我傷害（自殺）	22	23.84	15.91	2.32	敗血症	11	11.45	4.20	1.57
10	蓄意自我傷害（自殺）	35	18.58	13.32	2.12	慢性肝病及肝硬化	20	21.67	13.61	2.11	血管性及未明示之癥狀	11	11.45	2.79	1.57
	其他	354	187.96	82.31	21.44	其他	198	214.52	92.08	20.86	其他	139	144.73	64.76	19.80
11	敗血症	34	18.05	6.98	2.06	血管性及未明示之癥狀	18	19.50	5.70	1.90	慢性下呼吸道疾病	11	11.45	3.35	1.57
12	慢性肝病及肝硬化	31	16.46	8.96	1.88	高血壓性疾病	15	16.25	6.95	1.58	慢性肝病及肝硬化	11	11.45	4.30	1.57
13	血管性及未明示之癥狀	29	15.40	4.10	1.76	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	16.25	6.39	1.58	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	8.33	4.99	1.14
14	帕金森病	15	7.96	2.91	0.91	帕金森病	9	9.75	3.77	0.95	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	8.33	4.65	1.14
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	13	6.90	3.54	0.79	胃及十二指腸潰瘍	8	8.67	3.17	0.84	事故傷害	7	7.29	3.74	1.00

資料來源：衛生福利部。

附 註：總計：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為13人、6.90人，每十萬人口標準化死亡率為3.95人。

表29-8 · ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	所有死亡原因	1,790	656.20	313.37	100.00	所有死亡原因	1002	767.27	395.81	100.00	所有死亡原因	788	554.19	245.38	100.00
1	惡性腫瘤	509	186.59	99.03	28.44	惡性腫瘤	274	209.81	118.66	27.35	惡性腫瘤	235	165.27	83.33	29.82
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	287	105.21	44.53	16.03	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	156	119.45	56.97	15.57	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	131	92.13	34.58	16.62
3	肺炎	215	78.82	29.05	12.01	肺炎	128	98.01	38.60	12.77	肺炎	87	61.19	21.42	11.04
4	腦血管疾病	117	42.89	19.79	6.54	腦血管疾病	59	45.18	22.72	5.89	腦血管疾病	58	40.79	17.16	7.36
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	62	22.73	10.42	3.46	慢性下呼吸道疾病	39	29.86	11.97	3.89	糖尿病	34	23.91	9.38	4.31
6	糖尿病	59	21.63	9.75	3.30	腎炎、腎病症候群及腎病變	35	26.80	12.75	3.49	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	18.99	8.56	3.43
7	慢性下呼吸道疾病	55	20.16	7.96	3.07	事故傷害	31	23.74	17.99	3.09	敗血症	20	14.07	4.70	2.54
8	事故傷害	41	15.03	11.16	2.29	糖尿病	25	19.14	10.10	2.50	慢性下呼吸道疾病	16	11.25	4.54	2.03
9	敗血症	38	13.93	5.45	2.12	高血壓性疾病	24	18.38	7.90	2.40	蓄意自我傷害（自殺）	13	9.14	6.56	1.65
10	高血壓性疾病	32	11.73	4.57	1.79	慢性肝病及肝硬化	22	16.85	10.91	2.20	血管性及未明示之癰果症	12	8.44	2.89	1.52
	其他	375	137.47	71.66	20.95	其他	209	160.04	87.25	20.86	其他	155	109.01	52.28	19.67
11	血管性及未明示之癰果症	29	10.63	3.95	1.62	敗血症	18	13.78	6.68	1.80	事故傷害	10	7.03	4.62	1.27
12	慢性肝病及肝硬化	28	10.26	6.09	1.56	血管性及未明示之癰果症	17	13.02	5.51	1.70	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	6.33	4.16	1.14
13	蓄意自我傷害（自殺）	25	9.16	7.28	1.40	帕金森病	12	9.19	3.84	1.20	帕金森病	8	5.63	2.20	1.02
14	帕金森病	20	7.33	2.95	1.12	蓄意自我傷害（自殺）	12	9.19	7.91	1.20	高血壓性疾病	8	5.63	1.80	1.02
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	5.13	3.26	0.78	主動脈瘤及剝離	8	6.13	3.40	0.80	慢性肝病及肝硬化	6	4.22	2.02	0.76

資料來源：衛生福利部。

表29-9 · ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	所有死亡原因 惡性腫瘤	787 246	650.50 203.33	347.36 114.94	100.00 31.26	所有死亡原因 惡性腫瘤	435 142	736.10 240.29	436.86 145.33	100.00 32.64	所有死亡原因 惡性腫瘤	352 104	568.77 168.05	271.61 89.97	100.00 29.55
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	109	90.09	45.89	13.85	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	63	106.61	62.20	14.48	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	46	74.33	31.54	13.07
3	肺炎	79	65.30	28.27	10.04	肺炎	36	60.92	31.48	8.28	肺炎	43	69.48	26.03	12.22
4	腦血管疾病	46	38.02	19.77	5.84	腦血管疾病	28	47.38	27.02	6.44	腦血管疾病	18	29.08	14.28	5.11
5	糖尿病	30	24.80	12.44	3.81	糖尿病	17	28.77	17.20	3.91	糖尿病	13	21.01	8.43	3.69
6	慢性下呼吸道疾病	26	21.49	9.59	3.30	慢性下呼吸道疾病	17	28.77	14.24	3.91	慢性下呼吸道疾病	9	14.54	5.38	2.56
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	15.70	7.87	2.41	慢性肝病及肝硬化	13	22.00	14.03	2.99	敗血症	8	12.93	5.84	2.27
8	慢性肝病及肝硬化	17	14.05	8.36	2.16	事故傷害	13	22.00	18.58	2.99	血管性及未明示之癥狀	8	12.93	4.59	2.27
9	事故傷害	17	14.05	11.77	2.16	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	20.31	11.03	2.76	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	11.31	5.14	1.99
10	血管性及未明示之癥狀	15	12.40	5.10	1.91	蓄意自我傷害（自殺）	8	13.54	11.65	1.84	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	9.69	4.50	1.70
	其他	183	151.26	83.35	23.25	其他	86	145.53	84.08	19.77	其他	90	145.42	75.91	25.57
11	敗血症	14	11.57	5.77	1.78	血管性及未明示之癥狀	7	11.85	5.73	1.61	蓄意自我傷害（自殺）	6	9.69	5.75	1.70
12	蓄意自我傷害（自殺）	14	11.57	8.82	1.78	敗血症	6	10.15	5.51	1.38	慢性肝病及肝硬化	4	6.46	3.12	1.14
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	7.44	3.57	1.14	皮膚及皮下組織疾病	5	8.46	4.13	1.15	事故傷害	4	6.46	5.45	1.14
14	皮膚及皮下組織疾病	8	6.61	3.27	1.02	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	4	6.77	4.32	0.92	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	3	4.85	2.73	0.85
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	7	5.79	3.51	0.89	病毒性肝炎	3	5.08	3.37	0.69	高血壓性疾病	3	4.85	2.04	0.85

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)男性：膽結石及其他膽囊疾患、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、5.08人，
 每十萬人口標準化死亡率各為2.38人、2.39人。

(2)女性：皮膚及皮下組織疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、4.85人，每十萬人口標準化死亡率為2.35人。

表29-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	所有死亡原因	1,435	500.68	303.27	100.00	所有死亡原因	817	597.65	393.91	100.00	所有死亡原因	618	412.25	231.54	100.00
1	惡性腫瘤	450	157.01	97.23	31.36	惡性腫瘤	254	185.80	123.00	31.09	惡性腫瘤	196	130.75	77.54	31.72
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	226	78.85	47.08	15.75	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	127	92.90	63.72	15.54	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	99	66.04	34.19	16.02
3	肺炎	152	53.03	27.28	10.59	肺炎	86	62.91	36.28	10.53	肺炎	66	44.03	20.50	10.68
4	腦血管疾病	84	29.31	17.02	5.85	腦血管疾病	46	33.65	20.78	5.63	腦血管疾病	38	25.35	13.87	6.15
5	糖尿病	70	24.42	13.70	4.88	慢性下呼吸道疾病	38	27.80	16.91	4.65	糖尿病	36	24.01	11.56	5.83
6	慢性下呼吸道疾病	46	16.05	8.90	3.21	糖尿病	34	24.87	16.02	4.16	敗血症	13	8.67	4.77	2.10
7	敗血症	33	11.51	6.35	2.30	敗血症	20	14.63	8.20	2.45	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	7.34	3.67	1.78
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	30	10.47	5.68	2.09	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	13.90	8.16	2.33	事故傷害	10	6.67	7.31	1.62
9	事故傷害	27	9.42	8.54	1.88	事故傷害	17	12.44	10.21	2.08	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	5.34	2.68	1.29
10	蓄意自我傷害（自殺）	24	8.37	6.95	1.67	蓄意自我傷害（自殺）	17	12.44	10.39	2.08	慢性下呼吸道疾病	8	5.34	2.89	1.29
	其他	293	102.23	64.52	20.42	其他	159	116.31	80.26	19.46	其他	133	88.72	52.56	21.52
11	高血壓性疾病	18	6.28	3.67	1.25	慢性肝病及肝硬化	13	9.51	7.20	1.59	高血壓性疾病	7	4.67	2.09	1.13
12	慢性肝病及肝硬化	18	6.28	4.28	1.25	高血壓性疾病	11	8.05	5.72	1.35	蓄意自我傷害（自殺）	7	4.67	3.89	1.13
13	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	13	4.54	2.22	0.91	血管性及未明示之癰呆症	7	5.12	2.58	0.86	血管性及未明示之癰呆症	5	3.34	1.44	0.81
14	血管性及未明示之癰呆症	12	4.19	1.93	0.84	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	4.39	3.22	0.73	慢性肝病及肝硬化	5	3.34	1.81	0.81
15	病毒性肝炎	8	2.79	1.82	0.56	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	5	3.66	1.64	0.61	病毒性肝炎	4	2.67	1.43	0.65

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)總計：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為10人、3.48人，每十萬人口標準化死亡率為1.95人。

(2)男性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、3.64人，每十萬人口標準化死亡率為1.91人。

表29-11・ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因

中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計				男性				女性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	所有死亡原因 惡性腫瘤 心臟疾病（高血壓性疾病除外） 肺炎 腦血管疾病 糖尿病 腎炎、腎病症候群及腎病變 慢性下呼吸道疾病 蓄意自我傷害（自殺） 敗血症 事故傷害 其他	1,890 561 293 220 117 86 50 45 36 35 33 414	663.15 196.84 102.81 77.19 41.05 30.18 17.54 15.79 12.63 12.28 11.58 145.26	302.25 98.25 43.20 28.28 17.53 12.69 6.70 5.70 9.13 4.87 7.84 68.06	100.00 29.68 15.50 11.64 6.19 4.55 2.65 2.38 1.90 1.85 1.75 21.90	所有死亡原因 惡性腫瘤 心臟疾病（高血壓性疾病除外） 肺炎 腦血管疾病 糖尿病 腎炎、腎病症候群及腎病變 慢性下呼吸道疾病 蓄意自我傷害（自殺） 腎炎、腎病症候群及腎病變 事故傷害 敗血症 其他	1,003 311 140 122 64 46 34 21 19 17 15 214	730.39 226.47 101.95 88.84 46.61 33.50 24.76 15.29 13.84 12.38 10.92 155.84	367.40 116.05 50.65 36.86 23.09 15.44 9.91 11.09 5.92 9.97 5.19 83.24	100.00 31.01 13.96 12.16 6.38 4.59 3.39 2.09 1.89 1.69 1.50 21.34	所有死亡原因 惡性腫瘤 心臟疾病（高血壓性疾病除外） 肺炎 腦血管疾病 糖尿病 腎炎、腎病症候群及腎病變 敗血症 血管性及未明示之癥呆症 高血壓性疾病 事故傷害 其他	887 250 153 98 53 40 31 20 18 18 16 190	600.63 169.29 103.60 66.36 35.89 27.09 20.99 13.54 12.19 12.19 10.83 128.66	248.59 85.29 36.61 21.89 12.91 10.35 7.17 4.62 3.58 3.96 5.52 56.69	100.00 28.18 17.25 11.05 5.98 4.51 3.49 2.25 2.03 2.03 1.80 21.42
11	血管性及未明示之癥呆症 高血壓性疾病 慢性肝病及肝硬化 帕金森病 原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	30 28 23 21 17	10.53 9.82 8.07 7.37 5.96	3.31 3.59 3.95 2.58 2.42	1.59 1.48 1.22 1.11 0.90	慢性肝病及肝硬化 血管性及未明示之癥呆症 原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外） 高血壓性疾病 帕金森病	15 12 11 10 9	10.92 8.74 8.01 7.28 6.55	6.36 3.04 3.33 2.99 2.66	1.50 1.20 1.10 1.00 0.90	蓄意自我傷害（自殺） 帕金森病 慢性下呼吸道疾病 肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外） 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15 12 11 10 9	10.16 8.13 7.45 6.77 6.09	7.59 2.45 2.37 2.18 3.28	1.69 1.35 1.24 1.13 1.01

資料來源：衛生福利部。

表29-12 · ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性					
		死 亡	每十萬人口		死 亡	死 亡 原 因	死 亡	每十萬人口		死 亡	死 亡 原 因	死 亡	每十萬人口		
			人 數	死 亡 率				人 數	死 亡 率				人 數	死 亡 率	
1	所有死亡原因	1,776	698.04	346.73	100.00	所有死亡原因	997	815.12	444.02	100.00	所有死亡原因	779	589.65	266.60	100.00
	惡性腫瘤	517	203.20	105.41	29.11	惡性腫瘤	270	220.74	123.06	27.08	惡性腫瘤	247	186.96	91.03	31.71
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	261	102.58	47.58	14.70	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	158	129.18	67.43	15.85	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	103	77.96	31.56	13.22
3	肺炎	192	75.46	30.93	10.81	肺炎	114	93.20	44.77	11.43	肺炎	78	59.04	20.44	10.01
4	腦血管疾病	116	45.59	21.95	6.53	腦血管疾病	73	59.68	31.90	7.32	糖尿病	47	35.58	14.23	6.03
5	糖尿病	94	36.95	16.71	5.29	慢性下呼吸道疾病	48	39.24	16.34	4.81	腦血管疾病	43	32.55	13.60	5.52
6	慢性下呼吸道疾病	67	26.33	10.11	3.77	糖尿病	47	38.43	19.69	4.71	高血壓性疾病	26	19.68	6.96	3.34
7	蓄意自我傷害（自殺）	47	18.47	15.62	2.65	蓄意自我傷害（自殺）	32	26.16	21.64	3.21	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	18.17	7.29	3.08
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	43	16.90	7.07	2.42	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	15.53	6.79	1.91	慢性下呼吸道疾病	19	14.38	5.35	2.44
9	高血壓性疾病	42	16.51	6.51	2.36	事故傷害	19	15.53	11.85	1.91	蓄意自我傷害（自殺）	15	11.35	10.24	1.93
10	事故傷害	33	12.97	10.13	1.86	敗血症	18	14.72	7.18	1.81	事故傷害	14	10.60	8.77	1.80
	其他	364	143.07	74.73	20.50	其他	199	162.70	93.37	19.96	其他	163	123.38	57.13	20.92
11	敗血症	29	11.40	5.93	1.63	血管性及未明示之癰呆症	17	13.90	5.48	1.71	敗血症	11	8.33	5.25	1.41
12	血管性及未明示之癰呆症	26	10.22	3.68	1.46	高血壓性疾病	16	13.08	5.85	1.60	血管性及未明示之癰呆症	9	6.81	2.28	1.16
13	慢性肝病及肝硬化	21	8.25	5.50	1.18	慢性肝病及肝硬化	15	12.26	9.39	1.50	主動脈瘤及剝離	9	6.81	3.34	1.16
14	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	15	5.90	2.68	0.84	帕金森病	9	7.36	3.43	0.90	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	6.06	2.44	1.03
15	主動脈瘤及剝離	15	5.90	3.04	0.84	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	7	5.72	2.98	0.70	慢性肝病及肝硬化	6	4.54	1.97	0.77

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)男性：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.06人，每十萬人口標準化死亡率為2.06人。

(2)女性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、3.77人，每十萬人口標準化死亡率為1.56人。

**表30-1 · ICD-10 臺北市松山區事故傷害死亡原因
中華民國108年**

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性				單位：人，人/每十萬人口，%
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	
		人 數	人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	31	15.13	100.00		15	15.63	100.00		16	14.68	100.00		
V01-V99	運輸事故傷害	12	5.86	38.71		4	4.17	26.67		8	7.34	50.00		
W00-W19	跌倒(落)	7	3.42	22.58		4	4.17	26.67		3	2.75	18.75		
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.98	6.45		2	2.08	13.33		-	-	-		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.98	6.45		1	1.04	6.67		1	0.92	6.25		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.49	3.23		1	1.04	6.67		-	-	-		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.49	3.23		1	1.04	6.67		-	-	-		
	其他	6	2.93	19.35		2	2.08	13.33		4	3.67	25.00		

資料來源：衛生福利部。

**表30-2・ICD-10 臺北市信義區事故傷害死亡原因
中華民國108年**

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性				單位：人，人/每十萬人口，%
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	
		人 數	人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	34	15.34	100.00		22	20.85	100.00		12	10.33	100.00		
V01-V99	運輸事故傷害	11	4.96	32.35		6	5.69	27.27		5	4.30	41.67		
W00-W19	跌倒(落)	11	4.96	32.35		8	7.58	36.36		3	2.58	25.00		
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.35	8.82		3	2.84	13.64		-	-	-		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.45	2.94		1	0.95	4.55		-	-	-		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.45	2.94		1	0.95	4.55		-	-	-		
	其他	7	3.16	20.59		3	2.84	13.64		4	3.44	33.33		

資料來源：衛生福利部。

**表30-3・ICD-10 臺北市大安區事故傷害死亡原因
中華民國108年**

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性				單位：人，人/每十萬人口，%
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	
		人 數	人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	38	12.33	100.00		25	17.41	100.00		13	7.89	100.00		
V01-V99	運輸事故傷害	10	3.24	26.32		7	4.88	28.00		3	1.82	23.08		
W00-W19	跌倒(落)	11	3.57	28.95		8	5.57	32.00		3	1.82	23.08		
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	0.97	7.89		3	2.09	12.00		-	-	-		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.32	2.63		-	-	-		1	0.61	7.69		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.65	5.26		1	0.70	4.00		1	0.61	7.69		
	其他	11	3.57	28.95		6	4.18	24.00		5	3.04	38.46		

資料來源：衛生福利部。

**表30-4・ICD-10 臺北市中山區事故傷害死亡原因
中華民國108年**

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性				單位：人，人/每十萬人口，%
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	
		人 數	人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	47	20.58	100.00		24	22.62	100.00		23	18.81	100.00		
V01-V99	運輸事故傷害	17	7.44	36.17		9	8.48	37.50		8	6.54	34.78		
W00-W19	跌倒(落)	16	7.00	34.04		8	7.54	33.33		8	6.54	34.78		
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.44	2.13		-	-	-		1	0.82	4.35		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.75	8.51		2	1.88	8.33		2	1.64	8.70		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.44	2.13		1	0.94	4.17		-	-	-		
	其他	8	3.50	17.02		4	3.77	16.67		4	3.27	17.39		

資料來源：衛生福利部。

**表30-5・ICD-10 臺北市中正區事故傷害死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	19	11.99	100.00	13	17.20	100.00	6	7.23	100.00	-	-	-
V01-V99	運輸事故傷害	6	3.79	31.58	6	7.94	46.15	-	-	-	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	3	1.89	15.79	3	3.97	23.08	-	-	-	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.63	5.26	-	-	-	-	1	1.21	16.67	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.26	10.53	-	-	-	-	2	2.41	33.33	-	-
	其他	7	4.42	36.84	4	5.29	30.77	3	3.62	50.00	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

**表30-6・ICD-10 臺北市大同區事故傷害死亡原因
中華民國108年**

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性				單位：人，人/每十萬人口，%
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	
		人 數	人 口	死 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口	死 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口	死 率	百 分 比	
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	28	22.08	100.00		21	34.06	100.00		7	10.74	100.00		
V01-V99	運輸事故傷害	7	5.52	25.00		6	9.73	28.57		1	1.53	14.29		
W00-W19	跌倒(落)	11	8.67	39.29		10	16.22	47.62		1	1.53	14.29		
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	1.58	7.14		2	3.24	9.52		-	-	-		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	2.37	10.71		2	3.24	9.52		1	1.53	14.29		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.58	7.14		1	1.62	4.76		1	1.53	14.29		
	其他	3	2.37	10.71		-	-	-		3	4.60	42.86		

資料來源：衛生福利部。

**表30-7・ICD-10 臺北市萬華區事故傷害死亡原因
中華民國108年**

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性				單位：人，人/每十萬人口，%
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	
		人 數	人 口	死 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口	死 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口	死 率	百 分 比	
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	39	20.71	100.00		32	34.67	100.00		7	7.29	100.00		
V01-V99	運輸事故傷害	11	5.84	28.21		10	10.83	31.25		1	1.04	14.29		
W00-W19	跌倒(落)	10	5.31	25.64		8	8.67	25.00		2	2.08	28.57		
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.59	7.69		2	2.17	6.25		1	1.04	14.29		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	7	3.72	17.95		7	7.58	21.88		-	-	-		
	其他	8	4.25	20.51		5	5.42	15.63		3	3.12	42.86		

資料來源：衛生福利部。

表30-8 · ICD-10 臺北市文山區事故傷害死亡原因
中華民國108年

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性				
		死 亡 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 死 亡 率	死 亡 人 數	
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	41	15.03	100.00	31	23.74	100.00		10	7.03	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	11	4.03	26.83	8	6.13	25.81		3	2.11	30.00			
W00-W19	跌倒(落)	12	4.40	29.27	9	6.89	29.03		3	2.11	30.00			
W65-W74	意外溺死和淹沒	5	1.83	12.20	4	3.06	12.90		1	0.70	10.00			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.37	2.44	1	0.77	3.23		-	-	-			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	1.83	12.20	4	3.06	12.90		1	0.70	10.00			
	其他	7	2.57	17.07	5	3.83	16.13		2	1.41	20.00			

資料來源：衛生福利部。

表30-9 · ICD-10 臺北市南港區事故傷害死亡原因
中華民國108年

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性				單位：人，人/每十萬人口，%
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	
		人 數	人 口	死 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口	死 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口	死 率	百 分 比	
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	17	14.05	100.00		13	22.00	100.00		4	6.46	100.00		
V01-V99	運輸事故傷害	9	7.44	52.94		8	13.54	61.54		1	1.62	25.00		
W00-W19	跌倒(落)	3	2.48	17.65		3	5.08	23.08		-	-	-		
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	1.65	11.76		-	-	-		2	3.23	50.00		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	2.48	17.65		2	3.38	15.38		1	1.62	25.00		
	其他	-	-	-		-	-	-		-	-	-		

資料來源：衛生福利部。

**表30-10 · ICD-10 臺北市內湖區事故傷害死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 数	每 十 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 数	每 十 万 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 数	每 十 万 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 数	每 十 万 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	27	9.42	100.00	17	12.44	100.00	10	6.67	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	10	3.49	37.04	8	5.85	47.06	2	1.33	20.00			
W00-W19	跌倒(落)	4	1.40	14.81	1	0.73	5.88	3	2.00	30.00			
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.70	7.41	2	1.46	11.76	-	-	-			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	3	1.05	11.11	1	0.73	5.88	2	1.33	20.00			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.70	7.41	1	0.73	5.88	1	0.67	10.00			
	其他	6	2.09	22.22	4	2.93	23.53	2	1.33	20.00			

資料來源：衛生福利部。

表30-11 · ICD-10 臺北市士林區事故傷害死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	33	11.58	100.00	17	12.38	100.00	16	10.83	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	12	4.21	36.36	8	5.83	47.06	4	2.71	25.00			
W00-W19	跌倒(落)	8	2.81	24.24	3	2.18	17.65	5	3.39	31.25			
W65-W74	意外溺死和淹沒	5	1.75	15.15	3	2.18	17.65	2	1.35	12.50			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.70	6.06	-	-	-	2	1.35	12.50			
	其他	6	2.11	18.18	3	2.18	17.65	3	2.03	18.75			

資料來源：衛生福利部。

**表30-12 · ICD-10 臺北市北投區事故傷害死亡原因
中華民國108年**

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性				單位：人，人/每十萬人口，%
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	
		人 數	人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口	死 亡 率	百 分 比	
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	33	12.97	100.00		19	15.53	100.00		14	10.60	100.00		
V01-V99	運輸事故傷害	11	4.32	33.33		5	4.09	26.32		6	4.54	42.86		
W00-W19	跌倒(落)	9	3.54	27.27		8	6.54	42.11		1	0.76	7.14		
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.39	3.03		1	0.82	5.26		-	-	-		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	7	2.75	21.21		3	2.45	15.79		4	3.03	28.57		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.79	6.06		-	-	-		2	1.51	14.29		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
	其他	3	1.18	9.09		2	1.64	10.53		1	0.76	7.14		

資料來源：衛生福利部。

表31-1 · ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	17	8.29	100.00	12	12.51	100.00	-	5	4.59	100.00	-	-
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.49	5.88	-	-	-	-	1	0.92	20.00	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	1.46	17.65	3	3.13	25.00	-	-	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	3.42	41.18	4	4.17	33.33	3	2.75	60.00	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.49	5.88	1	1.04	8.33	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.49	5.88	1	1.04	8.33	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	1.95	23.53	3	3.13	25.00	1	0.92	20.00	-	-	-
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-2 · ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	32	14.43	100.00	22	20.85	100.00	10	8.61	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	2.71	18.75	5	4.74	22.73	1	0.86	10.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.45	3.13	1	0.95	4.55	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	17	7.67	53.13	12	11.37	54.55	5	4.30	50.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.45	3.13	-	-	-	1	0.86	10.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.45	3.13	1	0.95	4.55	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.90	6.25	1	0.95	4.55	1	0.86	10.00			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	1.35	9.38	1	0.95	4.55	2	1.72	20.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.45	3.13	1	0.95	4.55	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-3 · ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 百分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	37	12.00	100.00	19	13.23	100.00	18	10.93	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.30	10.81	2	1.39	10.53	2	1.21	11.11			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.32	2.70	-	-	-	-	1	0.61	5.56		
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	17	5.52	45.95	8	5.57	42.11	9	5.47	50.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.30	10.81	1	0.70	5.26	3	1.82	16.67			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	11	3.57	29.73	8	5.57	42.11	3	1.82	16.67			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-4・ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 數 死 亡 百 分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	32	14.01	100.00	20	18.85	100.00	-	12	9.81	100.00	-	-
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.44	3.13	-	-	-	-	1	0.82	8.33	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	3.13	1	0.94	5.00	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	2.19	15.63	2	1.88	10.00	3	2.45	25.00	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	10	4.38	31.25	9	8.48	45.00	1	0.82	8.33	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.75	12.50	1	0.94	5.00	3	2.45	25.00	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.44	3.13	1	0.94	5.00	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	10	4.38	31.25	6	5.65	30.00	4	3.27	33.33	-	-	-
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-5・ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 百分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	23	14.51	100.00	16	21.17	100.00	7	8.44	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	1.26	8.70	1	1.32	6.25	1	1.21	14.29			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	1.26	8.70	2	2.65	12.50	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	11	6.94	47.83	8	10.59	50.00	3	3.62	42.86			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.63	4.35	-	-	-	1	1.21	14.29			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.63	4.35	1	1.32	6.25	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.63	4.35	1	1.32	6.25	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	3.15	21.74	3	3.97	18.75	2	2.41	28.57			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-6 · ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	17	13.40	100.00	11	17.84	100.00	6	9.21	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	5.52	41.18	6	9.73	54.55	1	1.53	16.67			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.79	5.88	-	-	-	1	1.53	16.67			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.79	5.88	-	-	-	1	1.53	16.67			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	4.73	35.29	3	4.87	27.27	3	4.60	50.00			
X81	利用跳入或躺在移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.79	5.88	1	1.62	9.09	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.79	5.88	1	1.62	9.09	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-7・ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 百分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	35	18.58	100.00	22	23.84	100.00	13	13.54	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	3.72	20.00	2	2.17	9.09	-	-	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	6.37	34.29	6	6.50	27.27	2	2.08	15.38			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.59	8.57	6	6.50	27.27	5	5.21	38.46			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	1.06	5.71	3	3.25	13.64	1	1.04	7.69			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	11	5.84	31.43	2	2.17	9.09	-	-	-	-	-	-
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-8 · ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	25	9.16	100.00	12	9.19	100.00	-	-	13	9.14	100.00	
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.73	8.00	2	1.53	16.67	-	-	-	-	-	
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.37	4.00	1	0.77	8.33	-	-	-	-	-	
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	9	3.30	36.00	6	4.59	50.00	3	2.11	23.08	-	-	
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.73	8.00	-	-	-	2	1.41	15.38	-	-	
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.73	8.00	-	-	-	2	1.41	15.38	-	-	
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	9	3.30	36.00	3	2.30	25.00	6	4.22	46.15	-	-	
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

資料來源：衛生福利部。

表31-9 · ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	14	11.57	100.00	8	13.54	100.00	-	6	9.69	-	100.00	-
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.83	7.14	1	1.69	12.50	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	1.65	14.29	1	1.69	12.50	1	1.62	16.67	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	2	1.65	14.29	1	1.69	12.50	1	1.62	16.67	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	2.48	21.43	2	3.38	25.00	1	1.62	16.67	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.83	7.14	1	1.69	12.50	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	4.13	35.71	2	3.38	25.00	3	4.85	50.00	-	-	-
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-10・ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 百 分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	24	8.37	100.00	17	12.44	100.00	7	4.67	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	2.09	25.00	4	2.93	23.53	2	1.33	28.57			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	4	1.40	16.67	2	1.46	11.76	2	1.33	28.57			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.05	12.50	1	0.73	5.88	2	1.33	28.57			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.35	4.17	1	0.73	5.88	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.35	4.17	1	0.73	5.88	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	9	3.14	37.50	8	5.85	47.06	1	0.67	14.29			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-11・ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 百 分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	36	12.63	100.00	21	15.29	100.00	-	15	10.16	100.00	-	-
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.35	2.78	-	-	-	-	1	0.68	6.67	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	2.11	16.67	6	4.37	28.57	-	-	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	13	4.56	36.11	8	5.83	38.10	5	3.39	33.33	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.05	8.33	-	-	-	3	2.03	20.00	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.35	2.78	1	0.73	4.76	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.70	5.56	1	0.73	4.76	1	0.68	6.67	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	10	3.51	27.78	5	3.64	23.81	5	3.39	33.33	-	-	-
X81	利用跳入或躺在移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-12 · ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 百 分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 男性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	死 亡 人 數	死 亡 率 女性 人 口 數 死 亡 率 百分 比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	47	18.47	100.00	32	26.16	100.00	15	11.35	100.00	-	-	-
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.39	2.13	1	0.82	3.13	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.39	2.13	-	-	-	1	0.76	6.67	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	1.97	10.64	4	3.27	12.50	1	0.76	6.67	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.39	2.13	-	-	-	1	0.76	6.67	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.39	2.13	1	0.82	3.13	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	19	7.47	40.43	13	10.63	40.63	6	4.54	40.00	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.57	8.51	2	1.64	6.25	2	1.51	13.33	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.39	2.13	1	0.82	3.13	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.79	4.26	1	0.82	3.13	1	0.76	6.67	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	4	1.57	8.51	4	3.27	12.50	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	3.14	17.02	5	4.09	15.63	3	2.27	20.00	-	-	-
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

**表32-1 · ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	360	175.65	79.85	100.00	所有癌症死亡原因	204	212.63	100.92	100.00	所有癌症死亡原因	156	143.11	63.13	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	65	31.72	13.45	18.06	氣管、支氣管和肺癌	38	39.61	17.56	18.63	氣管、支氣管和肺癌	27	24.77	10.25	17.31
2	結腸、直腸和肛門癌	54	26.35	11.45	15.00	結腸、直腸和肛門癌	33	34.40	16.03	16.18	女性乳房癌	27	24.77	12.68	17.31
3	女性乳房癌 ⁽¹⁾	27	24.77	12.68	7.50	肝和肝內膽管癌	29	30.23	15.69	14.22	結腸、直腸和肛門癌	21	19.27	7.68	13.46
4	肝和肝內膽管癌	34	16.59	7.89	9.44	前列腺(攝護腺)癌	14	14.59	4.91	6.86	胰臟癌	12	11.01	5.02	7.69
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	14	14.59	4.91	3.89	胃癌	13	13.55	5.71	6.37	胃癌	11	10.09	3.71	7.05
6	胃癌	24	11.71	4.68	6.67	胰臟癌	10	10.42	4.94	4.90	非何杰金氏淋巴瘤	8	7.34	2.41	5.13
7	胰臟癌	22	10.73	5.02	6.11	口腔癌	9	9.38	5.72	4.41	肝和肝內膽管癌	5	4.59	1.77	3.21
8	非何杰金氏淋巴瘤	15	7.32	3.22	4.17	白血病	8	8.34	3.64	3.92	間皮和軟組織癌	5	4.59	2.96	3.21
9	腦癌	11	5.37	3.80	3.06	腦癌	7	7.30	4.64	3.43	子宮體癌	4	3.67	1.58	2.56
10	口腔癌	9	4.39	2.53	2.50	非何杰金氏淋巴瘤	7	7.30	4.16	3.43	腦癌	4	3.67	3.27	2.56
	其他	85	41.47	18.64	23.61	其他	36	37.52	17.92	17.65	其他	32	29.36	11.80	20.51
11	膀胱癌	9	4.39	1.70	2.50	膽囊和其他膽道癌	6	6.25	3.32	2.94	卵巢癌	3	2.75	1.45	1.92
12	白血病	9	4.39	1.84	2.50	膀胱癌	6	6.25	2.83	2.94	膀胱癌	3	2.75	0.78	1.92
13	膽囊和其他膽道癌	8	3.90	1.96	2.22	食道癌	3	3.13	1.54	1.47	膽囊和其他膽道癌	2	1.83	0.84	1.28
14	子宮體癌 ⁽¹⁾	4	3.67	1.58	1.11	鼻咽癌	2	2.08	1.04	0.98	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	1.83	0.44	1.28
15	間皮和軟組織癌	6	2.93	1.86	1.67	喉癌	2	2.08	0.73	0.98	甲狀腺癌	2	1.83	0.87	1.28

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

**表32-2 · ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	497	224.16	105.50	100.00	所有癌症死亡原因	262	248.26	120.92	100.00	所有癌症死亡原因	235	202.27	93.80	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	100	45.10	20.02	20.12	氣管、支氣管和肺癌	57	54.01	25.73	21.76	氣管、支氣管和肺癌	43	37.01	15.49	18.30
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	40	34.43	18.18	8.05	結腸、直腸和肛門癌	33	31.27	14.23	12.60	結腸、直腸和肛門癌	40	34.43	14.71	17.02
3	結腸、直腸和肛門癌	73	32.93	14.39	14.69	肝和肝內膽管癌	30	28.43	14.16	11.45	女性乳房癌	40	34.43	18.18	17.02
4	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	26	24.64	10.88	5.23	前列腺(攝護腺)癌	26	24.64	10.88	9.92	胰臟癌	20	17.21	8.39	8.51
5	肝和肝內膽管癌	47	21.20	9.73	9.46	胃癌	17	16.11	7.13	6.49	肝和肝內膽管癌	17	14.63	5.88	7.23
6	胰臟癌	34	15.34	7.55	6.84	口腔癌	16	15.16	8.28	6.11	胃癌	11	9.47	3.89	4.68
7	胃癌	28	12.63	5.23	5.63	胰臟癌	14	13.27	6.64	5.34	卵巢癌	9	7.75	4.07	3.83
8	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	7.75	4.07	1.81	白血病	10	9.48	4.91	3.82	子宮體癌	7	6.03	3.00	2.98
9	口腔癌	17	7.67	4.05	3.42	食道癌	8	7.58	4.40	3.05	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	4.30	2.29	2.13
10	子宮體癌 ⁽¹⁾	7	6.03	3.00	1.41	非何杰金氏淋巴瘤	8	7.58	3.65	3.05	膽囊和其他膽道癌	4	3.44	1.18	1.70
	其他	116	52.32	25.93	23.34	其他	43	40.75	20.90	16.41	其他	39	33.57	16.72	16.60
11	白血病	13	5.86	3.73	2.62	膀胱癌	7	6.63	2.86	2.67	間皮和軟組織癌	4	3.44	1.75	1.70
12	非何杰金氏淋巴瘤	12	5.41	2.45	2.41	鼻咽癌	6	5.69	3.61	2.29	腦癌	4	3.44	1.62	1.70
13	食道癌	10	4.51	2.23	2.01	間皮和軟組織癌	5	4.74	2.71	1.91	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.44	1.52	1.70
14	膀胱癌	10	4.51	1.81	2.01	腎臟癌	5	4.74	1.81	1.91	鼻咽癌	3	2.58	1.17	1.28
15	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	5	4.30	2.29	1.01	膽囊和其他膽道癌	3	2.84	0.94	1.15	膀胱癌	3	2.58	0.98	1.28

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：白血病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.58人，每十萬人口標準化死亡率分3.05人。

**表32-3 · ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	656	212.82	96.05	100.00	所有癌症死亡原因	364	253.54	116.41	100.00	所有癌症死亡原因	292	177.32	80.35	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	127	41.20	16.71	19.36	氣管、支氣管和肺癌	68	47.36	19.20	18.68	氣管、支氣管和肺癌	59	35.83	14.74	20.21
2	結腸、直腸和肛門癌	88	28.55	13.04	13.41	結腸、直腸和肛門癌	56	39.01	19.04	15.38	女性乳房癌	43	26.11	13.84	14.73
3	肝和肝內膽管癌	86	27.90	11.80	13.11	肝和肝內膽管癌	54	37.61	18.65	14.84	結腸、直腸和肛門癌	32	19.43	8.30	10.96
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	43	26.11	13.84	6.55	胰臟癌	24	16.72	7.75	6.59	肝和肝內膽管癌	32	19.43	6.32	10.96
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	24	16.72	5.57	3.66	前列腺(攝護腺)癌	24	16.72	5.57	6.59	胰臟癌	14	8.50	3.39	4.79
6	胰臟癌	38	12.33	5.31	5.79	口腔癌	19	13.23	7.07	5.22	胃癌	13	7.89	3.41	4.45
7	胃癌	32	10.38	4.33	4.88	胃癌	19	13.23	5.53	5.22	子宮體癌	13	7.89	4.03	4.45
8	非何杰金氏淋巴瘤	25	8.11	3.01	3.81	非何杰金氏淋巴瘤	16	11.14	4.60	4.40	卵巢癌	11	6.68	3.65	3.77
9	子宮體癌 ⁽¹⁾	13	7.89	4.03	1.98	食道癌	12	8.36	4.37	3.30	腦癌	10	6.07	4.29	3.42
10	口腔癌	21	6.81	3.36	3.20	白血病	12	8.36	4.18	3.30	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	5.47	2.94	3.08
	其他	159	51.58	26.09	24.24	其他	60	41.79	20.46	16.48	其他	56	34.01	15.45	19.18
11	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	6.68	3.65	1.68	膀胱癌	6	4.18	1.55	1.65	非何杰金氏淋巴瘤	9	5.47	1.80	3.08
12	白血病	20	6.49	3.89	3.05	膽囊和其他膽道癌	4	2.79	1.27	1.10	白血病	8	4.86	3.81	2.74
13	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	5.47	2.94	1.37	間皮和軟組織癌	4	2.79	1.78	1.10	間皮和軟組織癌	7	4.25	1.88	2.40
14	腦癌	14	4.54	3.02	2.13	腦癌	4	2.79	1.63	1.10	膀胱癌	5	3.04	0.94	1.71
15	食道癌	12	3.89	1.97	1.83	腎臟癌	3	2.09	0.86	0.82	膽囊和其他膽道癌	3	1.82	0.47	1.03

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

**表32-4 · ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	464	203.13	94.85	100.00	所有癌症死亡原因	242	228.05	113.91	100.00	所有癌症死亡原因	222	181.51	79.98	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	92	40.28	18.75	19.83	氣管、支氣管和肺癌	52	49.00	24.67	21.49	氣管、支氣管和肺癌	40	32.71	14.13	18.02
2	肝和肝內膽管癌	64	28.02	12.60	13.79	肝和肝內膽管癌	36	33.92	17.36	14.88	女性乳房癌	33	26.98	13.55	14.86
3	女性乳房癌 ⁽¹⁾	33	26.98	13.55	7.11	結腸、直腸和肛門癌	30	28.27	12.65	12.40	肝和肝內膽管癌	28	22.89	8.86	12.61
4	結腸、直腸和肛門癌	51	22.33	9.37	10.99	前列腺(攝護腺)癌	20	18.85	8.21	8.26	結腸、直腸和肛門癌	21	17.17	6.90	9.46
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	20	18.85	8.21	4.31	胃癌	14	13.19	6.67	5.79	胰臟癌	13	10.63	4.66	5.86
6	胃癌	25	10.94	4.98	5.39	胰臟癌	12	11.31	5.20	4.96	胃癌	11	8.99	3.72	4.95
7	胰臟癌	25	10.94	4.89	5.39	口腔癌	11	10.37	4.88	4.55	非何杰金氏淋巴瘤	10	8.18	4.25	4.50
8	非何杰金氏淋巴瘤	17	7.44	3.54	3.66	白血病	10	9.42	6.78	4.13	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	6.54	2.88	3.60
9	口腔癌	16	7.00	2.89	3.45	食道癌	9	8.48	4.85	3.72	子宮體癌	7	5.72	2.57	3.15
10	白血病	16	7.00	4.31	3.45	膀胱癌	9	8.48	3.95	3.72	白血病	6	4.91	2.01	2.70
	其他	105	45.97	22.44	22.63	其他	39	36.75	18.69	16.12	其他	45	36.79	16.46	20.27
11	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	8	6.54	2.88	1.72	腎臟癌	7	6.60	3.03	2.89	口腔癌	5	4.09	1.34	2.25
12	子宮體癌 ⁽¹⁾	7	5.72	2.57	1.51	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.60	2.71	2.89	卵巢癌	5	4.09	2.30	2.25
13	膀胱癌	13	5.69	2.35	2.80	鼻咽癌	3	2.83	1.83	1.24	腦癌	5	4.09	1.85	2.25
14	食道癌	10	4.38	2.40	2.16	喉癌	3	2.83	1.27	1.24	間皮和軟組織癌	4	3.27	2.00	1.80
15	卵巢癌 ⁽¹⁾	5	4.09	2.30	1.08	腦癌	2	1.88	1.25	0.83	膀胱癌	4	3.27	1.13	1.80

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

**表32-5・ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	301	189.90	91.27	100.00	所有癌症死亡原因	178	235.56	116.73	100.00	所有癌症死亡原因	123	148.29	69.37	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	52	32.81	15.04	17.28	氣管、支氣管和肺癌	34	45.00	22.05	19.10	氣管、支氣管和肺癌	18	21.70	9.09	14.63
2	結腸、直腸和肛門癌	45	28.39	12.25	14.95	結腸、直腸和肛門癌	31	41.03	19.82	17.42	女性乳房癌	17	20.50	13.02	13.82
3	肝和肝內膽管癌	36	22.71	10.33	11.96	肝和肝內膽管癌	24	31.76	15.59	13.48	結腸、直腸和肛門癌	14	16.88	5.87	11.38
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	17	20.50	13.02	5.65	前列腺(攝護腺)癌	13	17.20	7.10	7.30	肝和肝內膽管癌	12	14.47	5.87	9.76
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	13	17.20	7.10	4.32	口腔癌	11	14.56	10.38	6.18	非何杰金氏淋巴瘤	11	13.26	5.27	8.94
6	胃癌	21	13.25	5.85	6.98	胃癌	11	14.56	7.36	6.18	胃癌	10	12.06	4.46	8.13
7	非何杰金氏淋巴瘤	17	10.73	4.02	5.65	胰臟癌	9	11.91	6.03	5.06	卵巢癌	7	8.44	4.19	5.69
8	胰臟癌	15	9.46	4.59	4.98	白血病	8	10.59	4.46	4.49	胰臟癌	6	7.23	3.31	4.88
9	卵巢癌 ⁽¹⁾	7	8.44	4.19	2.33	食道癌	6	7.94	4.75	3.37	子宮體癌	6	7.23	4.01	4.88
10	白血病	13	8.20	3.38	4.32	非何杰金氏淋巴瘤	6	7.94	2.38	3.37	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	6.03	3.80	4.07
	其他	65	41.01	23.39	21.59	其他	25	33.08	16.81	14.04	其他	17	20.50	10.47	13.82
11	子宮體癌 ⁽¹⁾	6	7.23	4.01	1.99	腎臟癌	5	6.62	3.24	2.81	白血病	5	6.03	2.45	4.07
12	口腔癌	11	6.94	4.81	3.65	膀胱癌	4	5.29	2.02	2.25	腦癌	2	2.41	1.78	1.63
13	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	5	6.03	3.80	1.66	鼻咽癌	3	3.97	2.12	1.69	鼻咽癌	1	1.21	0.55	0.81
14	食道癌	7	4.42	2.60	2.33	腦癌	3	3.97	2.17	1.69	食道癌	1	1.21	0.80	0.81
15	腎臟癌	6	3.79	1.98	1.99	喉癌	2	2.65	1.46	1.12	小腸癌	1	1.21	0.45	0.81

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：膀胱癌、腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.21人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.28、0.90人。

**表32-6・ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	304	239.68	117.10	100.00	所有癌症死亡原因	183	296.79	154.10	100.00	所有癌症死亡原因	121	185.66	87.36	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	62	48.88	22.46	20.39	氣管、支氣管和肺癌	39	63.25	32.30	21.31	氣管、支氣管和肺癌	23	35.29	14.46	19.01
2	結腸、直腸和肛門癌	44	34.69	14.99	14.47	結腸、直腸和肛門癌	28	45.41	21.68	15.30	女性乳房癌	17	26.08	13.75	14.05
3	肝和肝內膽管癌	34	26.81	13.31	11.18	肝和肝內膽管癌	24	38.92	21.42	13.11	結腸、直腸和肛門癌	16	24.55	9.78	13.22
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	17	26.08	13.75	5.59	口腔癌	15	24.33	14.32	8.20	胰臟癌	11	16.88	7.58	9.09
5	胃癌	19	14.98	7.61	6.25	食道癌	11	17.84	9.70	6.01	胃癌	10	15.34	8.18	8.26
6	胰臟癌	17	13.40	6.49	5.59	胃癌	9	14.60	7.27	4.92	肝和肝內膽管癌	10	15.34	6.06	8.26
7	口腔癌	16	12.61	7.44	5.26	前列腺(攝護腺)癌	7	11.35	5.32	3.83	子宮體癌	6	9.21	5.00	4.96
8	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	7	11.35	5.32	2.30	胰臟癌	6	9.73	5.34	3.28	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.60	3.37	2.48
9	子宮體癌 ⁽¹⁾	6	9.21	5.00	1.97	膀胱癌	6	9.73	4.28	3.28	膀胱癌	3	4.60	1.99	2.48
10	食道癌	11	8.67	4.42	3.62	鼻咽癌	5	8.11	4.41	2.73	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.60	1.67	2.48
	其他	71	55.98	28.17	23.36	其他	33	53.52	28.07	18.03	其他	19	29.15	15.51	15.70
11	膀胱癌	9	7.10	2.94	2.96	間皮和軟組織癌	5	8.11	4.53	2.73	白血病	3	4.60	2.02	2.48
12	非何杰金氏淋巴瘤	8	6.31	2.43	2.63	腦癌	5	8.11	5.53	2.73	膽囊和其他膽道癌	2	3.07	1.38	1.65
13	鼻咽癌	6	4.73	2.35	1.97	非何杰金氏淋巴瘤	5	8.11	3.44	2.73	卵巢癌	2	3.07	1.45	1.65
14	間皮和軟組織癌	6	4.73	2.45	1.97	腎臟癌	3	4.87	2.08	1.64	腎臟癌	2	3.07	1.28	1.65
15	腦癌	6	4.73	3.47	1.97	膽囊和其他膽道癌	2	3.24	1.78	1.09	口腔癌	1	1.53	1.16	0.83

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：白血病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.24人，每十萬人口標準化死亡率為1.79人。

(4)女性：小腸癌、主唾液腺癌、甲狀腺癌、骨和關節軟骨癌、間皮和軟組織癌、腦癌、鼻咽癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.53人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.68、0.76、0.95、1.26、0.68、1.66、0.52人。

**表32-7・ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	461	244.77	111.97	100.00	所有癌症死亡原因	262	283.86	138.28	100.00	所有癌症死亡原因	199	207.21	89.22	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	106	56.28	24.53	22.99	氣管、支氣管和肺癌	78	84.51	40.22	29.77	女性乳房癌	35	36.44	17.53	17.59
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	35	36.44	17.53	7.59	結腸、直腸和肛門癌	35	37.92	17.08	13.36	結腸、直腸和肛門癌	31	32.28	12.73	15.58
3	結腸、直腸和肛門癌	66	35.04	14.61	14.32	肝和肝內膽管癌	30	32.50	16.55	11.45	氣管、支氣管和肺癌	28	29.15	11.24	14.07
4	肝和肝內膽管癌	53	28.14	13.14	11.50	口腔癌	22	23.84	13.35	8.40	肝和肝內膽管癌	23	23.95	10.14	11.56
5	胰臟癌	24	12.74	5.74	5.21	食道癌	21	22.75	11.82	8.02	非何杰金氏淋巴瘤	15	15.62	5.47	7.54
6	口腔癌	23	12.21	6.48	4.99	胃癌	12	13.00	6.13	4.58	胰臟癌	12	12.49	5.21	6.03
7	食道癌	23	12.21	5.91	4.99	胰臟癌	12	13.00	6.16	4.58	胃癌	7	7.29	2.91	3.52
8	胃癌	19	10.09	4.48	4.12	前列腺(攝護腺)癌	9	9.75	3.06	3.44	卵巢癌	7	7.29	4.00	3.52
9	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	9	9.75	3.06	1.95	鼻咽癌	5	5.42	3.54	1.91	子宮頸及部位未明 示子宮癌	6	6.25	3.16	3.02
10	非何杰金氏淋巴瘤	18	9.56	3.65	3.90	腎臟癌	4	4.33	1.88	1.53	間皮和軟組織癌	4	4.16	4.01	2.01
	其他	85	45.13	22.68	18.44	其他	34	36.84	18.50	12.98	其他	31	32.28	12.81	15.58
11	卵巢癌 ⁽¹⁾	7	7.29	4.00	1.52	膀胱癌	4	4.33	1.74	1.53	白血病	4	4.16	1.59	2.01
12	子宮頸及部位未明 示子宮癌 ⁽¹⁾	6	6.25	3.16	1.30	腦癌	4	4.33	3.02	1.53	鼻咽癌	3	3.12	1.69	1.51
13	鼻咽癌	8	4.25	2.64	1.74	白血病	4	4.33	2.17	1.53	膽囊和其他膽道癌	3	3.12	1.58	1.51
14	白血病	8	4.25	1.93	1.74	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.25	1.51	1.15	腎臟癌	3	3.12	1.33	1.51
15	腎臟癌	7	3.72	1.57	1.52	主唾液腺癌	2	2.17	0.91	0.76	食道癌	2	2.08	0.69	1.01

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：胸腺癌、喉癌、間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、2.17人，每十萬人口標準化死亡率分別為 0.97、1.01、1.12人。

(4)女性：子宮體癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、2.08人，每十萬人口標準化死亡率為1.46人。

表32-8 · ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因
中華民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	509	186.59	99.03	100.00	所有癌症死亡原因	274	209.81	118.66	100.00	所有癌症死亡原因	235	165.27	83.33	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	103	37.76	20.33	20.24	氣管、支氣管和肺癌	59	45.18	26.31	21.53	女性乳房癌	45	31.65	17.22	19.15
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	45	31.65	17.22	8.84	肝和肝內膽管癌	39	29.86	17.38	14.23	氣管、支氣管和肺癌	44	30.94	15.70	18.72
3	結腸、直腸和肛門癌	65	23.83	12.28	12.77	結腸、直腸和肛門癌	32	24.50	13.94	11.68	結腸、直腸和肛門癌	33	23.21	11.13	14.04
4	肝和肝內膽管癌	61	22.36	11.77	11.98	胰臟癌	22	16.85	8.94	8.03	肝和肝內膽管癌	22	15.47	7.27	9.36
5	胰臟癌	38	13.93	7.17	7.47	非何杰金氏淋巴瘤	19	14.55	8.06	6.93	胰臟癌	16	11.25	5.57	6.81
6	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	13	9.95	4.43	2.55	口腔癌	15	11.49	6.92	5.47	胃癌	10	7.03	3.38	4.26
7	非何杰金氏淋巴瘤	27	9.90	4.91	5.30	食道癌	15	11.49	7.36	5.47	卵巢癌	9	6.33	3.21	3.83
8	胃癌	24	8.80	4.46	4.72	胃癌	14	10.72	5.58	5.11	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.63	2.48	3.40
9	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	6.33	3.21	1.77	前列腺(攝護腺)癌	13	9.95	4.43	4.74	子宮體癌	7	4.92	2.65	2.98
10	口腔癌	16	5.87	3.46	3.14	白血病	6	4.59	2.55	2.19	白血病	7	4.92	2.45	2.98
	其他	108	39.59	21.52	21.22	其他	40	30.63	17.19	14.60	其他	34	23.91	12.28	14.47
11	食道癌	16	5.87	3.42	3.14	腎臟癌	5	3.83	1.97	1.82	子宮頸及部位未明 示子宮癌	6	4.22	2.27	2.55
12	子宮體癌 ⁽¹⁾	7	4.92	2.65	1.38	膀胱癌	4	3.06	1.57	1.46	間皮和軟組織癌	4	2.81	1.38	1.70
13	白血病	13	4.77	2.42	2.55	鼻咽癌	3	2.30	1.89	1.09	膽囊和其他膽道癌	3	2.11	1.03	1.28
14	子宮頸及部位未明 示子宮癌 ⁽¹⁾	6	4.22	2.27	1.18	膽囊和其他膽道癌	3	2.30	1.21	1.09	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	2.11	0.77	1.28
15	腎臟癌	8	2.93	1.42	1.57	喉癌	3	2.30	1.21	1.09	腎臟癌	3	2.11	0.87	1.28

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.30人，每十萬人口標準化死亡率為1.55人。

(4)女性：膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.11人，每十萬人口標準化死亡率為0.96人。

**表32-9 · ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	246	203.33	114.94	100.00	所有癌症死亡原因	142	240.29	145.33	100.00	所有癌症死亡原因	104	168.05	89.97	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	47	38.85	21.52	19.11	氣管、支氣管和肺癌	26	44.00	26.46	18.31	氣管、支氣管和肺癌	21	33.93	16.97	20.19
2	肝和肝內膽管癌	32	26.45	14.15	13.01	肝和肝內膽管癌	21	35.54	20.73	14.79	女性乳房癌	14	22.62	13.80	13.46
3	結腸、直腸和肛門癌	30	24.80	13.30	12.20	結腸、直腸和肛門癌	18	30.46	18.02	12.68	結腸、直腸和肛門癌	12	19.39	10.18	11.54
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	14	22.62	13.80	5.69	胃癌	14	23.69	13.64	9.86	肝和肝內膽管癌	11	17.77	8.69	10.58
5	胃癌	19	15.70	8.29	7.72	胰臟癌	11	18.61	10.65	7.75	胰臟癌	6	9.69	5.52	5.77
6	胰臟癌	17	14.05	7.80	6.91	口腔癌	10	16.92	11.05	7.04	胃癌	5	8.08	3.82	4.81
7	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	7	11.85	5.87	2.85	食道癌	9	15.23	9.97	6.34	卵巢癌	5	8.08	4.73	4.81
8	口腔癌	10	8.27	5.19	4.07	前列腺(攝護腺)癌	7	11.85	5.87	4.93	子宮體癌	4	6.46	3.90	3.85
9	食道癌	10	8.27	5.13	4.07	膽囊和其他膽道癌	5	8.46	4.75	3.52	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.85	2.67	2.88
10	卵巢癌 ⁽¹⁾	5	8.08	4.73	2.03	腦癌	4	6.77	3.98	2.82	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.85	2.29	2.88
	其他	55	45.46	27.28	22.36	其他	17	28.77	20.22	11.97	其他	20	32.32	17.40	19.23
11	子宮體癌 ⁽¹⁾	4	6.46	3.90	1.63	腎臟癌	3	5.08	2.65	2.11	白血病	3	4.85	3.36	2.88
12	膽囊和其他膽道癌	6	4.96	2.60	2.44	白血病	3	5.08	3.48	2.11	主唾液腺癌	1	1.62	1.21	0.96
13	白血病	6	4.96	3.47	2.44	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	2	3.38	2.19	1.41	鼻咽癌	1	1.62	0.77	0.96
14	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	3	4.85	2.67	1.22	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	3.38	2.18	1.41	食道癌	1	1.62	1.01	0.96
15	腦癌	4	3.31	1.87	1.63	鼻咽癌	1	1.69	1.10	0.70	小腸癌	1	1.62	0.95	0.96

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：非何杰金氏淋巴瘤之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、3.31人，每十萬人口標準化死亡率為3.29人。

(4)男性：非何杰金氏淋巴瘤、喉癌、間皮和軟組織癌、膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.69人，每十萬人口標準化死亡率為.29人。

(5)女性：胸腺癌、膀胱癌、膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.62人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.01、0.86、0.73人。

**表32-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性						
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百分比		
			死 亡 率	標準化 死 亡 率			死 亡 率	標準化 死 亡 率			死 亡 率	標準化 死 亡 率			
	所有癌症死亡原因	450	157.01	97.23	100.00	所有癌症死亡原因	254	185.80	123.00	100.00	所有癌症死亡原因	196	130.75	77.54	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	83	28.96	17.43	18.44	氣管、支氣管和肺癌	52	38.04	24.48	20.47	女性乳房癌	38	25.35	15.38	19.39
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	38	25.35	15.38	8.44	結腸、直腸和肛門癌	35	25.60	17.62	13.78	氣管、支氣管和肺癌	31	20.68	12.04	15.82
3	結腸、直腸和肛門癌	59	20.59	12.76	13.11	肝和肝內膽管癌	30	21.95	14.68	11.81	結腸、直腸和肛門癌	24	16.01	9.12	12.24
4	肝和肝內膽管癌	53	18.49	11.62	11.78	胃癌	21	15.36	11.25	8.27	肝和肝內膽管癌	23	15.34	9.27	11.73
5	胃癌	27	9.42	6.09	6.00	口腔癌	16	11.70	7.53	6.30	胰臟癌	15	10.01	5.57	7.65
6	胰臟癌	27	9.42	5.51	6.00	食道癌	13	9.51	6.70	5.12	間皮和軟組織癌	8	5.34	2.97	4.08
7	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	12	8.78	5.46	2.67	胰臟癌	12	8.78	5.19	4.72	胃癌	6	4.00	2.23	3.06
8	口腔癌	20	6.98	4.19	4.44	前列腺(攝護腺)癌	12	8.78	5.46	4.72	子宮體癌	5	3.34	1.97	2.55
9	食道癌	14	4.88	3.13	3.11	膀胱癌	9	6.58	3.68	3.54	卵巢癌	5	3.34	2.10	2.55
10	膀胱癌	13	4.54	2.30	2.89	鼻咽癌	8	5.85	3.91	3.15	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.34	1.84	2.55
	其他	104	36.29	23.41	23.11	其他	46	33.65	22.50	18.11	其他	36	24.01	15.05	18.37
11	間皮和軟組織癌	12	4.19	2.85	2.67	腎臟癌	5	3.66	3.09	1.97	白血病	5	3.34	1.82	2.55
12	非何杰金氏淋巴瘤	10	3.49	2.16	2.22	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.66	2.60	1.97	口腔癌	4	2.67	1.36	2.04
13	子宮體癌 ⁽¹⁾	5	3.34	1.97	1.11	膽囊和其他膽道癌	4	2.93	1.82	1.57	子宮頸及部位未明 示子宮癌	4	2.67	1.75	2.04
14	卵巢癌 ⁽¹⁾	5	3.34	2.10	1.11	間皮和軟組織癌	4	2.93	2.54	1.57	膀胱癌	4	2.67	1.07	2.04
15	鼻咽癌	9	3.14	2.08	2.00	腦癌	4	2.93	1.97	1.57	膽囊和其他膽道癌	2	1.33	0.74	1.02

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：白血病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、3.14人，每十萬人口標準化死亡率為1.75人。

(4)男性：白血病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.93人，每十萬人口標準化死亡率為1.67人。

**表32-11 · ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	561	196.84	98.25	100.00	所有癌症死亡原因	311	226.47	116.05	100.00	所有癌症死亡原因	250	169.29	85.29	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	108	37.89	17.38	19.25	氣管、支氣管和肺癌	64	46.61	23.33	20.58	氣管、支氣管和肺癌	44	29.79	12.73	17.60
2	肝和肝內膽管癌	86	30.18	14.83	15.33	肝和肝內膽管癌	58	42.24	23.22	18.65	女性乳房癌	34	23.02	13.53	13.60
3	結腸、直腸和肛門癌	67	23.51	12.47	11.94	結腸、直腸和肛門癌	37	26.94	14.55	11.90	結腸、直腸和肛門癌	30	20.31	11.00	12.00
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	34	23.02	13.53	6.06	胃癌	23	16.75	8.29	7.40	肝和肝內膽管癌	28	18.96	7.67	11.20
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	20	14.56	6.35	3.57	前列腺(攝護腺)癌	20	14.56	6.35	6.43	卵巢癌	17	11.51	6.40	6.80
6	胃癌	37	12.98	5.75	6.60	口腔癌	19	13.84	7.46	6.11	胃癌	14	9.48	3.69	5.60
7	卵巢癌 ⁽¹⁾	17	11.51	6.40	3.03	食道癌	14	10.19	5.29	4.50	胰臟癌	14	9.48	4.23	5.60
8	胰臟癌	28	9.82	4.34	4.99	胰臟癌	14	10.19	4.57	4.50	白血病	10	6.77	5.15	4.00
9	口腔癌	21	7.37	3.72	3.74	膀胱癌	8	5.83	2.72	2.57	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	5.42	2.54	3.20
10	食道癌	16	5.61	2.70	2.85	腎臟癌	7	5.10	2.47	2.25	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.42	2.65	3.20
	其他	127	44.56	23.68	22.64	其他	47	34.23	17.79	15.11	其他	43	29.12	15.70	17.20
11	白血病	16	5.61	3.67	2.85	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.10	2.23	2.25	腦癌	6	4.06	3.08	2.40
12	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	8	5.42	2.54	1.43	腦癌	6	4.37	2.78	1.93	膽囊和其他膽道癌	4	2.71	1.28	1.60
13	非何杰金氏淋巴瘤	15	5.26	2.44	2.67	白血病	6	4.37	2.20	1.93	間皮和軟組織癌	4	2.71	1.94	1.60
14	膀胱癌	12	4.21	1.91	2.14	鼻咽癌	4	2.91	2.19	1.29	膀胱癌	4	2.71	1.34	1.60
15	腦癌	12	4.21	2.87	2.14	膽囊和其他膽道癌	4	2.91	1.07	1.29	口腔癌	2	1.35	0.48	0.80

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：食道癌、腎臟癌、黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.35人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.57人、0.35人、0.78人。

**表32-12 · ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因
中華民國108年**

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總 計				男 性				女 性					
		死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	517	203.20	105.41	100.00	所有癌症死亡原因	270	220.74	123.06	100.00	所有癌症死亡原因	247	186.96	91.03	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	95	37.34	18.60	18.38	氣管、支氣管和肺癌	48	39.24	21.47	17.78	氣管、支氣管和肺癌	47	35.58	16.40	19.03
2	結腸、直腸和肛門癌	79	31.05	15.18	15.28	肝和肝內膽管癌	46	37.61	22.50	17.04	結腸、直腸和肛門癌	42	31.79	14.62	17.00
3	肝和肝內膽管癌	75	29.48	15.59	14.51	結腸、直腸和肛門癌	37	30.25	16.02	13.70	女性乳房癌	35	26.49	14.27	14.17
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	35	26.49	14.27	6.77	口腔癌	18	14.72	8.49	6.67	肝和肝內膽管癌	29	21.95	9.78	11.74
5	胰臟癌	29	11.40	5.44	5.61	胃癌	15	12.26	5.58	5.56	胰臟癌	15	11.35	4.99	6.07
6	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	12	9.81	4.59	2.32	胰臟癌	14	11.45	5.98	5.19	白血病	8	6.06	2.67	3.24
7	口腔癌	20	7.86	4.26	3.87	食道癌	12	9.81	5.40	4.44	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.30	2.16	2.83
8	胃癌	20	7.86	3.68	3.87	前列腺(攝護腺)癌	12	9.81	4.59	4.44	卵巢癌	6	4.54	2.26	2.43
9	非何杰金氏淋巴瘤	18	7.07	3.47	3.48	非何杰金氏淋巴瘤	11	8.99	5.14	4.07	食道癌	5	3.78	1.75	2.02
10	食道癌	17	6.68	3.50	3.29	鼻咽癌	8	6.54	4.27	2.96	胃癌	5	3.78	2.31	2.02
	其他	117	45.99	25.85	22.63	其他	49	40.06	23.64	18.15	其他	48	36.33	19.82	19.43
11	白血病	13	5.11	3.14	2.51	腎臟癌	8	6.54	3.24	2.96	子宮頸及部位未明 示子宮癌	5	3.78	2.02	2.02
12	卵巢癌 ⁽¹⁾	6	4.54	2.26	1.16	腦癌	7	5.72	3.28	2.59	腦癌	4	3.03	2.42	1.62
13	鼻咽癌	11	4.32	2.81	2.13	白血病	5	4.09	3.39	1.85	鼻咽癌	3	2.27	1.54	1.21
14	腦癌	11	4.32	2.72	2.13	間皮和軟組織癌	4	3.27	2.57	1.48	膽囊和其他膽道癌	3	2.27	1.30	1.21
15	子宮頸及部位未明 示子宮癌 ⁽¹⁾	5	3.78	2.02	0.97	膀胱癌	3	2.45	1.28	1.11	子宮體癌	3	2.27	1.41	1.21

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表33・臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死　亡　原　因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死人數	死亡率	標準化死亡率																
01-56	所有死亡原因		11,551	437.00	473.41		13,733	523.20	392.14		14,339	547.41	392.62		13,875	528.71	364.83		14,486	550.64	363.48
08-14	惡性腫瘤	1	3,180	120.31	126.30	1	4,202	160.09	122.12	1	4,290	163.78	120.21	1	4,423	168.54	118.90	1	4,566	173.56	118.18
25-27- 28*	心臟疾病	3	1,257	47.56	52.39	2	1,732	65.99	46.85	2	1,665	63.56	42.87	2	1,527	58.19	38.38	2	1,642	62.42	39.41
29	腦血管疾病	2	1,306	49.41	53.45	3	1,240	47.24	33.77	3	1,367	52.19	35.74	3	1,182	45.04	29.23	3	1,289	49.00	30.31
181	糖尿病	5	620	23.46	25.12	4	893	34.02	24.96	4	988	37.72	26.19	4	946	36.05	23.79	4	958	36.42	23.27
321	肺炎	7	372	14.07	16.31	7	447	17.03	11.49	5	572	21.84	13.82	5	575	21.91	13.32	5	688	26.15	14.96
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	358	13.54	14.96	5	503	19.16	13.77	6	544	20.77	13.94	6	485	18.48	12.19	6	549	20.87	12.78
E47-E53	事故傷害	4	752	28.45	28.41	6	463	17.64	15.78	8	415	15.84	14.03	8	379	14.44	12.68	7	372	14.14	11.97
E54	自殺	10	206	7.79	7.56	8	346	13.18	10.93	7	467	17.83	14.79	7	454	17.30	14.12	8	364	13.84	11.27
347	慢性肝病及肝硬化	6	380	14.38	14.81	9	333	12.69	9.96	9	323	12.33	9.20	9	317	12.08	8.86	9	331	12.58	8.92
038	敗血症	13	96	3.63	4.04	12	94	3.58	2.52	11	150	5.73	3.78	11	145	5.53	3.48	10	188	7.15	4.07
26	高血壓性疾病	9	292	11.05	12.14	10	167	6.36	4.43	10	162	6.18	4.14	10	176	6.71	4.30	11	141	5.36	3.17
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	190	7.19	7.76	11	113	4.31	2.92	12	109	4.16	2.79	12	92	3.51	2.26	12	97	3.69	2.23
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	76	2.88	3.05	14	70	2.67	1.89	13	77	2.94	2.06	13	79	3.01	1.89	13	80	3.04	1.87
02	結核病	15	80	3.03	3.20	13	74	2.82	2.01	14	60	2.29	1.62	14	68	2.59	1.63	14	57	2.17	1.32
44	先天性畸形	12	99	3.75	5.51	15	48	1.83	3.32	16	39	1.49	2.66	15	42	1.60	2.92	15	48	1.82	3.51
	其他		2,287	86.52	98.40		3,008	114.60	85.42		3,111	118.77	84.77		2,985	113.74	76.88		3,116	118.45	76.24

資料來源：衛生福利部。

附　註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表33・臺北市歷年主要死亡原因（續1）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																		
		97年				100年				101年				102年				103年		
順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	
A00-Y98	所有死亡原因	15,119	575.72	366.18	15,834	600.94	343.47	16,397	615.94	344.34	16,100	600.78	326.27	16,951	629.12	332.35				
C00-C97	惡性腫瘤	1 4,467	170.10	112.87	1 4,732	179.59	109.78	1 4,981	187.11	111.52	1 4,919	183.55	106.98	1 4,902	181.93	103.64				
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2 2,014	76.69	46.14	2 1,905	72.30	38.51	2 2,028	76.181	40.211	2 2,075	77.429	39.811	2 2,489	92.376	46.229				
J12-J18	肺炎	4 950	36.18	20.14	4 942	35.75	16.96	4 905	33.996	15.536	4 883	32.949	14.457	4 1,060	39.341	17.097				
I60-I69	腦血管疾病	3 1,199	45.66	27.26	3 1,137	43.15	23.13	3 1,186	44.551	22.938	3 1,210	45.151	22.336	3 1,212	44.982	22.4				
E10-E14	糖尿病	5 716	27.26	16.89	5 775	29.41	16.39	5 817	30.69	16.63	5 860	32.091	16.843	5 855	31.732	16.169				
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7 491	18.70	11.20	8 448	17.00	8.89	9 531	19.947	10.619	8 488	18.21	9.1304	7 556	20.635	9.8947				
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8 446	16.98	9.27	6 582	22.09	10.48	6 591	22.201	10.305	6 573	21.382	9.7328	6 656	24.347	10.221				
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9 389	14.81	11.94	10 402	15.26	10.92	10 430	16.153	11.312	10 406	15.15	10.467	9 458	16.998	11.229				
A40-A41	敗血症	6 513	19.53	11.27	7 566	21.48	10.81	7 559	20.998	10.471	9 466	17.389	8.1822	10 445	16.516	7.616				
I10-I15	高血壓性疾病	10 374	14.24	8.21	9 446	16.93	8.47	8 536	20.135	9.7371	7 493	18.396	8.6597	8 461	17.109	7.547				
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11 370	14.09	11.40	12 306	11.61	8.98	11 333	12.509	9.8219	12 261	9.7393	7.4021	11 311	11.542	9.0623				
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	17 69	2.63	1.29	14 136	5.16	2.18	15 129	4.8458	1.9365	15 142	5.2988	2.1127	14 198	7.3485	2.7756				
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12 296	11.27	7.69	11 315	11.96	7.65	12 286	10.743	6.7738	11 310	11.568	6.9914	13 284	10.54	6.2914				
G20-G21	帕金森病	15 93	3.54	1.88	16 121	4.59	2.33	14 158	5.9352	2.9182	14 155	5.7839	2.712	15 135	5.0104	2.2266				
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	14 171	6.51	4.05	15 128	4.86	2.68	16 121	4.5453	2.4052	16 137	5.1122	2.6243	16 124	4.6021	2.2987				
	其他	2,561	97.52	64.67	2,893	109.80	65.31	2,806	105.41	61.21	2,722	101.57	57.82	2,805	104.10	57.66				

表33・臺北市歷年主要死亡原因（續2完）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																		
		104年				105年				106年				107年				108年		
順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	
A00-Y98	所有死亡原因	17,160	634.72	325.57	18,039	668.05	332.75	17,634	655.67	316.47	18,050	674.54	317.59	18,024	678.41	309.9				
C00-C97	惡性腫瘤	1 5,025	185.87	102.84	1 5,219	193.28	105.00	1 5,062	188.21	98.692	1 5,238	195.75	100.48	1 5,326	200.47	99.457				
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2 2,381	88.07	42.60	2 2,631	97.44	45.78	2 2,750	102.25	45.827	2 3,000	112.11	47.977	2 2,793	105.13	44.126				
J12-J18	肺炎	4 1,125	41.61	17.37	3 1,274	47.18	19.36	3 1,423	52.91	20.751	3 1,619	60.503	22.319	3 1,981	74.563	26.909				
I60-I69	腦血管疾病	3 1,153	42.65	20.08	4 1,206	44.66	20.76	4 1,197	44.507	20.278	4 1,152	43.051	18.573	4 1,146	43.134	18.547				
E10-E14	糖尿病	5 773	28.59	13.87	5 829	30.70	14.50	5 728	27.068	12.432	5 692	25.86	11.34	5 721	27.138	11.638				
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7 565	20.90	9.68	7 611	22.63	10.24	6 592	22.012	9.5545	6 621	23.207	9.734	6 519	19.535	7.8282				
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6 636	23.52	9.54	6 626	23.18	9.64	7 590	21.937	8.5351	7 514	19.208	7.381	7 505	19.008	7.0138				
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10 435	16.09	11.05	9 457	16.92	11.14	9 443	16.472	11.092	8 455	17.004	10.855	8 387	14.566	9.8975				
A40-A41	敗血症	9 462	17.09	7.49	8 529	19.59	8.15	8 463	17.215	7.2035	9 449	16.779	7.0015	9 348	13.098	5.1139				
I10-I15	高血壓性疾病	8 463	17.13	7.65	10 386	14.29	6.37	10 369	13.72	5.7998	10 386	14.425	5.9698	10 339	12.76	4.9007				
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11 318	11.76	8.72	13 308	11.41	8.38	11 317	11.787	8.8881	11 349	13.042	9.8353	10 339	12.76	10.046				
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓	12 299	11.06	3.97	11 344	12.74	4.40	12 310	11.526	3.8842	13 169	6.3156	2.1001	12 297	11.179	3.5626				
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14 278	10.28	5.96	14 279	10.33	5.97	13 269	10.002	5.5847	12 238	8.8942	4.9727	13 240	9.0334	4.9863				
G20-G21	帕金森病	15 180	6.66	2.95	15 206	7.63	3.29	15 189	7.0274	2.8709	14 147	5.4934	2.1516	14 182	6.8503	2.6643				
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	16 174	6.44	3.24	16 161	5.96	2.81	16 165	6.135	2.7729	15 146	5.4561	2.5855	15 139	5.2318	2.3145				
	其他	2,893	107.01	58.57	2,973	110.10	56.98	2,767	102.88	52.31	2,875	107.44	54.32	2,762	103.96	50.90				

表34・臺北市歷年男性主要死亡原因

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬男性人口																		
		84年				93年				94年				95年				96年		
順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	
01-56	所有死亡原因	7,172	541.89	552.47	8,352	647.93	474.26	8,763	683.06	480.28	8,387	654.67	445.74	8,633	674.39	445.81				
08-14	惡性腫瘤	1 1,977	149.38	148.48	1 2,594	201.24	149.63	1 2,630	205.00	148.15	1 2,695	210.37	146.09	1 2,757	215.37	146.53				
25-27-28*	心臟疾病	3 791	59.77	61.02	2 1,107	85.88	59.64	2 1,060	82.62	54.25	2 971	75.79	49.62	2 1,026	80.15	51.54				
29	腦血管疾病	2 800	60.45	60.80	3 725	56.24	39.19	3 822	64.07	43.39	3 680	53.08	34.17	3 768	59.99	37.36				
181	糖尿病	5 328	24.78	25.13	4 440	34.13	24.46	4 521	40.61	27.75	4 473	36.92	24.11	4 495	38.67	25.11				
321	肺炎	7 245	18.51	20.24	6 300	23.27	14.96	5 370	28.84	17.20	5 373	29.12	17.22	5 446	34.84	19.16				
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8 185	13.98	14.57	7 278	21.57	14.97	6 324	25.26	16.55	8 261	20.37	13.06	6 272	21.25	12.61				
E47-E53	事故傷害	4 535	40.42	39.71	5 342	26.53	23.74	8 312	24.32	21.46	7 281	21.93	19.32	7 265	20.70	17.90				
E54	自殺	11 123	9.29	8.97	8 225	17.46	14.81	7 313	24.40	20.52	6 309	24.12	20.00	8 228	17.81	14.72				
347	慢性肝病及肝硬化	6 273	20.63	20.35	9 222	17.22	13.87	9 192	14.97	11.51	9 210	16.39	12.38	9 222	17.34	12.80				
038	敗血症	14 50	3.78	3.89	13 54	4.19	2.83	11 73	5.69	3.62	11 73	5.70	3.34	10 82	6.41	3.70				
26	高血壓性疾病	9 167	12.62	12.56	10 82	6.36	4.29	10 106	8.26	5.49	10 94	7.34	4.78	11 69	5.39	3.04				
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10 131	9.90	10.03	11 73	5.66	3.64	12 71	5.53	3.57	12 58	4.53	2.83	12 61	4.77	2.83				
02	胃及十二指腸之潰瘍	13 58	4.38	4.31	14 43	3.34	2.25	13 52	4.05	2.78	14 43	3.36	2.06	13 48	3.75	2.30				
02	結核病	12 71	5.36	5.31	12 59	4.58	3.14	14 50	3.90	2.70	13 53	4.14	2.46	14 40	3.12	1.84				
44	先天性畸形	16 48	3.63	5.11	16 25	1.94	3.25	17 17	1.33	2.20	16 16	1.25	2.40	15 23	1.80	3.55				
	其他	1,390	105.02	111.99	1,783	138.32	99.59	1,850	144.20	99.15	1,797	140.27	91.90	1,831	143.03	90.82				

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9) · 97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10) · 108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表34・臺北市歷年男性主要死亡原因（續1）

死因碼 ICD-10	死　　亡　　原　　因	單位：人，人/每十萬男性人口																			
		97年				100年				101年				102年				103年			
順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率		
A00-Y98	所有死亡原因	8,992	705.67	449.24	9,359	737.25	426.54	9,628	751.69	429.77	9,436	732.81	409.56	9,907	766.33	422.54					
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,698	211.73	140.18	1	2,749	216.55	132.95	1	2,937	229.30	138.02	1	2,854	221.64	130.87	1	2,824	218.44	127.74
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,278	100.29	60.74	2	1,155	90.98	50.79	2	1,246	97.28	54.52	2	1,252	97.23	53.17	2	1,480	114.48	61.759
J12-J18	肺炎	4	619	48.58	26.32	4	605	47.66	22.21	4	563	43.96	20.08	4	575	44.65	19.94	4	638	49.351	22.19
I60-I69	腦血管疾病	3	677	53.13	32.56	3	697	54.91	29.93	3	679	53.01	28.56	3	699	54.28	28.22	3	722	55.848	29.484
E10-E14	糖尿病	5	352	27.62	17.36	6	393	30.96	18.33	6	414	32.32	18.20	6	428	33.24	18.44	6	434	33.571	18.298
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	337	26.45	13.76	5	445	35.05	16.00	5	430	33.57	15.24	5	431	33.47	15.30	5	475	36.742	15.801
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	240	18.83	11.24	9	236	18.59	9.68	10	255	19.91	11.13	10	242	18.79	9.69	8	284	21.968	10.975
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	269	21.11	17.19	8	267	21.03	15.84	8	285	22.25	16.23	8	271	21.05	15.04	7	318	24.598	16.978
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	231	18.13	15.00	12	188	14.81	11.63	11	207	16.16	12.59	12	166	12.89	9.96	12	181	14.001	10.853
A40-A41	敗血症	8	263	20.64	11.78	7	337	26.55	13.53	7	308	24.05	11.78	7	274	21.28	10.03	9	269	20.808	9.997
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	197	15.46	10.94	11	211	16.62	11.40	12	187	14.60	9.70	11	198	15.38	10.12	11	188	14.542	9.3417
I10-I15	高血壓性疾病	11	204	16.01	9.43	10	230	18.12	9.32	9	274	21.39	10.76	9	255	19.80	9.82	10	241	18.642	8.7162
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	19	31	2.43	1.15	16	63	4.96	2.10	16	64	5.00	2.00	17	63	4.89	1.88	15	84	6.4976	2.5171
G20-G21	帕金森病	15	56	4.39	2.24	15	70	5.51	2.83	13	96	7.50	3.72	13	94	7.30	3.49	14	91	7.039	3.1633
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	14	101	7.93	4.79	14	75	5.91	3.26	17	60	4.68	2.45	15	80	6.21	3.31	16	74	5.7241	2.8275
	其他		1,439	112.93	74.56		1,638	129.03	76.75		1,623	126.71	74.79		1,554	120.68	70.27		1,604	124.07	71.90

表34・臺北市歷年男性主要死亡原因（續2完）

死因碼 ICD-10	死　　亡　　原　　因	單位：人，人/每十萬男性人口																		
		104年				105年				106年				107年				108年		
順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	
A00-Y98	所有死亡原因	9,932	766.62	414.33	10,369	802.25	424.60	9,974	775.76	399.58	10,160	795.21	403.72	10,066	794.66	394.8				
C00-C97	惡性腫瘤	1 2,855	220.37	127.13	1 2,920	225.92	127.78	1 2,774	215.76	117.67	1 2,926	229.01	123.42	1 2,946	232.57	121.16				
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2 1,415	109.22	56.98	2 1,580	122.25	63.29	2 1,619	125.92	62.84	2 1,715	134.23	63.69	2 1,544	121.89	57.976				
J12-J18	肺炎	3 685	52.87	22.79	3 780	60.35	26.06	3 868	67.51	28.54	3 924	72.32	29.18	3 1,125	88.813	35.515				
I60-I69	腦血管疾病	4 667	51.48	26.11	4 692	53.54	27.20	4 695	54.06	26.70	4 667	52.21	24.20	4 654	51.63	25.031				
E10-E14	糖尿病	6 413	31.88	16.92	6 398	30.79	15.92	6 341	26.52	13.49	6 341	26.69	13.21	5 370	29.209	14.085				
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5 470	36.28	15.00	5 456	35.28	15.27	5 432	33.60	13.73	5 397	31.07	12.71	6 368	29.052	11.614				
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9 282	21.77	10.57	7 334	25.84	12.57	8 289	22.48	10.61	8 294	23.01	10.52	7 265	20.92	8.9612				
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7 303	23.39	16.86	8 304	23.52	16.38	7 303	23.57	16.53	7 294	23.01	15.59	8 249	19.657	13.86				
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11 205	15.82	11.73	11 197	15.24	11.07	10 193	15.01	11.45	10 219	17.14	12.86	9 212	16.736	13.353				
A40-A41	敗血症	8 285	22.00	10.05	9 290	22.44	9.62	9 278	21.62	9.65	9 252	19.72	8.96	10 199	15.71	6.7083				
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12 173	13.35	8.46	12 190	14.70	9.09	12 169	13.14	8.18	12 158	12.37	7.66	11 170	13.421	8.3175				
I10-I15	高血壓性疾病	10 237	18.29	9.34	10 208	16.09	8.07	11 190	14.78	6.95	11 185	14.48	6.65	12 160	12.631	5.6295				
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	13 128	9.88	3.60	13 148	11.45	4.06	13 141	10.97	3.91	15 67	5.24	1.93	13 148	11.684	4.074				
G20-G21	帕金森病	14 116	8.95	4.19	15 130	10.06	4.51	14 106	8.24	3.54	13 88	6.89	2.93	14 111	8.7628	3.7285				
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	16 88	6.79	3.42	16 91	7.04	3.37	15 89	6.92	3.19	14 78	6.10	3.17	15 74	5.8419	2.5862				
	其他	1,610	124.27	71.19	1,651	127.74	70.34	1,487	115.66	62.59	1,555	121.71	67.04	1,471	116.13	62.20				

表35・臺北市歷年女性主要死亡原因

死因碼 ICD-9	死　　亡　原　　因	單位：人，人/每十萬女性人口																		
		84年				93年				94年				95年				96年		
順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	
01-56	所有死亡原因	4,379	331.81	385.49	5,381	402.84	312.67	5,576	417.20	309.11	5,488	408.57	288.49	5,853	433.35	288.22				
08-14	惡性腫瘤	1 1,203	91.16	101.11	1 1,608	120.38	94.63	1 1,660	124.20	93.11	1 1,728	128.65	92.46	1 1,809	133.94	91.74				
25-27-28	心臟疾病	3 466	35.31	42.12	2 625	46.79	34.35	2 605	45.27	31.66	2 556	41.39	27.76	2 616	45.61	28.56				
29	腦血管疾病	2 506	38.34	45.36	3 515	38.55	28.72	3 545	40.78	28.68	3 502	37.37	24.78	3 521	38.57	24.01				
181	糖尿病	4 292	22.13	25.80	4 453	33.91	26.02	4 467	34.94	25.11	4 473	35.21	23.87	4 463	34.28	22.06				
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6 173	13.11	15.50	5 225	16.84	12.63	5 220	16.46	11.53	5 224	16.68	11.39	5 277	20.51	13.06				
321	肺炎	7 127	9.62	11.80	6 147	11.00	7.84	6 202	15.11	10.25	6 202	15.04	9.47	6 242	17.92	10.74				
E54	自殺	10 83	6.29	6.04	7 121	9.06	7.40	7 154	11.52	9.63	7 145	10.80	8.87	7 136	10.07	8.15				
347	慢性肝病及肝硬化	9 107	8.11	9.33	9 111	8.31	6.60	8 131	9.80	7.32	8 107	7.97	5.79	8 109	8.07	5.54				
E47-E53	事故傷害	5 217	16.44	17.14	7 121	9.06	8.26	9 103	7.71	7.05	9 98	7.30	6.30	9 107	7.92	6.42				
038	敗血症	13 46	3.49	4.19	11 40	2.99	2.15	10 77	5.76	4.00	11 72	5.36	3.59	10 106	7.85	4.59				
26	高血壓性疾病	8 125	9.47	11.43	10 85	6.36	4.65	11 56	4.19	2.87	10 82	6.10	3.95	11 72	5.33	3.29				
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11 59	4.47	5.14	11 40	2.99	2.20	12 38	2.84	1.97	13 34	2.53	1.69	12 36	2.67	1.66				
341	胃及十二指腸之潰瘍	15 18	1.36	1.60	13 27	2.02	1.51	13 25	1.87	1.36	12 36	2.68	1.74	13 32	2.37	1.45				
44	先天性畸形	12 51	3.86	5.94	14 23	1.72	3.40	14 22	1.65	3.15	14 26	1.94	3.45	14 25	1.85	3.44				
200	貧血	17 10	0.76	0.82	16 17	1.27	0.99	16 13	0.97	0.76	15 21	1.56	1.06	15 20	1.48	0.96				
	其他	896	67.89	82.17	1,223	91.56	71.32	1,258	94.13	70.66	1,182	88.00	62.32	1,282	94.92	62.55				

資料來源：衛生福利部。

附　　註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表35・臺北市歷年女性主要死亡原因（續1）

死因碼 ICD-10	死　　亡　　原　　因	單位：人，人/每十萬女性人口																			
		97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		6,127	453.23	291.00		6,475	474.21	270.05		6,769	490.07	269.77		6,664	478.66	253.90		7,044	502.56	254.29
C00-C97	惡性腫瘤	1	1,769	130.86	87.54	1	1,983	145.23	89.19	1	2,044	147.98	88.40	1	2,065	148.32	86.24	1	2,078	148.26	83.07
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	736	54.44	32.75	2	750	54.93	27.89	2	782	56.62	28.04	2	823	59.11	28.39	2	1,009	71.99	33.14
J12-J18	肺炎	5	331	24.49	14.14	5	337	24.68	12.06	5	342	24.76	11.42	5	308	22.12	9.54	4	422	30.11	12.67
I60-I69	腦血管疾病	3	522	38.61	22.90	3	440	32.22	17.12	3	507	36.71	18.18	3	511	36.70	17.36	3	490	34.96	16.33
E10-E14	糖尿病	4	364	26.93	16.79	4	382	27.98	14.97	4	403	29.18	15.39	4	432	31.03	15.60	5	421	30.04	14.40
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	251	18.57	11.35	8	212	15.53	8.19	6	276	19.98	10.28	6	246	17.67	8.67	6	272	19.41	9.01
I10-I15	高血壓性疾病	8	170	12.58	7.27	7	216	15.82	7.81	7	262	18.97	8.90	7	238	17.10	7.74	7	220	15.70	6.59
A40-A41	敗血症	7	250	18.49	10.99	6	229	16.77	8.39	8	251	18.17	9.22	8	192	13.79	6.53	9	176	12.56	5.61
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓	15	38	2.81	1.48	14	73	5.35	2.32	14	65	4.71	1.91	14	79	5.67	2.33	13	114	8.13	3.08
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	120	8.88	6.98	10	135	9.89	6.49	10	145	10.50	6.82	10	135	9.70	6.34	11	140	9.99	6.00
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	109	8.06	4.57	9	137	10.03	5.06	9	161	11.66	5.67	9	142	10.20	4.64	8	181	12.91	5.21
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	139	10.28	8.19	12	118	8.64	6.65	11	126	9.12	7.31	13	95	6.82	5.17	12	130	9.27	7.58
G20-G21	帕金森病	17	37	2.74	1.52	16	51	3.74	1.90	15	62	4.49	2.23	15	61	4.38	2.03	16	44	3.14	1.41
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	149	11.02	6.25	10	135	9.89	5.54	13	94	6.81	3.86	12	103	7.40	3.88	10	161	11.49	5.03
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	99	7.32	4.87	13	104	7.62	4.44	12	99	7.17	4.18	11	112	8.04	4.28	14	96	6.85	3.62
	其他		1,043	77.15	53.41		1,173	85.91	52.02		1,150	83.26	47.95		1,122	80.59	45.16		1,090	77.77	41.54

表35・臺北市歷年女性主要死亡原因（續2完）

死因碼 ICD-10	死　亡　原　因	單位：人，人/每十萬女性人口																			
		104年				105年				106年				107年				108年			
順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人數	死亡率	標準化死亡率		
A00-Y98	所有死亡原因	7,228	513.35	250.23	7,670	544.83	255.48	7,660	545.67	247.47	7,890	564.27	246.23	7,958	572.48	239.93					
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,170	154.12	82.57	1	2,299	163.31	85.94	1	2,288	162.99	83.14	1	2,312	165.35	81.96	1	2,380	171.21	82.22
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	966	68.61	30.53	2	1,051	74.66	31.13	2	1,131	80.57	31.74	2	1,285	91.90	34.91	2	1,249	89.85	32.65
J12-J18	肺炎	4	440	31.25	12.64	4	494	35.09	13.78	3	555	39.54	14.43	3	695	49.70	16.80	3	856	61.58	20.12
I60-I69	腦血管疾病	3	486	34.52	15.13	3	514	36.51	15.42	4	502	35.76	15.09	4	485	34.69	13.97	4	492	35.39	13.15
E10-E14	糖尿病	5	360	25.57	11.32	5	431	30.62	13.33	5	387	27.57	11.57	5	351	25.10	9.76	5	351	25.25	9.56
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	283	20.10	8.92	6	277	19.68	8.33	6	303	21.58	8.69	6	327	23.39	9.09	6	254	18.27	6.85
I10-I15	高血壓性疾病	7	226	16.05	6.33	10	178	12.64	4.98	8	179	12.75	4.82	7	201	14.37	5.41	7	179	12.88	4.27
A40-A41	敗血症	9	177	12.57	5.31	7	239	16.98	6.93	7	185	13.18	5.22	8	197	14.09	5.42	8	149	10.72	3.88
F01-F03	血管性及未明示之癥狀	10	171	12.14	4.37	8	196	13.92	4.73	9	169	12.04	3.89	12	102	7.29	2.26	8	149	10.72	3.18
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	132	9.37	5.72	12	153	10.87	6.37	11	140	9.97	6.29	9	161	11.51	6.71	10	138	9.93	6.33
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	11	166	11.79	4.75	11	170	12.08	4.96	10	158	11.26	4.25	11	117	8.37	3.06	11	137	9.86	3.39
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13	113	8.03	6.07	13	111	7.88	6.09	12	124	8.83	6.59	10	130	9.30	7.21	12	127	9.14	7.07
G20-G21	帕金森病	16	64	4.55	1.92	15	76	5.40	2.27	15	83	5.91	2.32	16	59	4.22	1.53	13	71	5.11	1.83
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	185	13.14	5.53	9	182	12.93	5.01	13	101	7.19	3.00	15	66	4.72	2.49	13	71	5.11	2.65
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	105	7.46	3.83	14	89	6.32	3.25	14	100	7.12	3.34	13	80	5.72	2.68	15	70	5.04	2.13
	其他		1,184	84.09	45.31		1,210	85.95	42.95		1,255	89.40	43.09		1,322	94.55	42.97		1,285	92.44	40.63

表36・臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數(人)			死亡率 (%)	死亡人數(人)			死亡率 (%)	死亡人數 (人)	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 96年	56	34	22	2.61	89	57	32	4.15	1	4.66
民國 97年	59	33	26	2.89	95	51	44	4.65	1	4.90
民國 98年	32	18	14	1.64	69	34	35	3.54	-	-
民國 99年	52	30	22	2.78	71	41	30	3.80	1	5.35
民國 100年	63	30	33	2.48	96	50	46	3.77	-	-
民國 101年	71	43	28	2.35	105	62	43	3.47	3	9.92
民國 102年	67	41	26	2.56	100	55	45	3.82	2	7.64
民國 103年①	71	40	31	2.43	109	69	40	3.74	-	-
民國 104年	94	55	39	3.26	137	78	59	4.75	3	10.39
民國 105年	68	42	26	2.45	106	61	45	3.82	1	3.60
民國 106年	62	38	24	2.48	90	51	39	3.60	1	4.00
民國 107年	60	37	23	2.65	101	60	41	4.46	3	13.24
民國 108年	44	26	18	2.10	72	45	27	3.43	1	4.77

資料來源：衛生福利部。

附 註：1.新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數)×1,000。

2.嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數)×1,000。

3.孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數)×100,000。

表37・臺北市歷年年齡結構別死亡率

單位：人／每十萬人口

年別	總計	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
96年	550.64	434.21	20.37	17.43	7.01	25.78	39.69	52.14	56.09	98.39	148.71	246.28	311.48	475.52	708.13	1,171.78	2,041.12	3,320.52	5,341.79	10,629.20
97年	575.72	469.11	23.18	16.16	12.47	19.20	45.78	48.92	66.26	105.37	157.67	230.61	330.13	455.61	699.50	1,124.34	2,016.68	3,257.44	5,549.18	10,992.30
98年	568.60	357.61	21.38	13.08	5.53	26.88	36.77	40.38	63.46	85.57	148.62	225.80	314.22	467.69	638.77	1,116.63	1,912.70	3,080.41	5,353.26	10,468.26
99年	575.83	379.01	17.92	10.66	10.08	23.18	29.30	45.38	63.43	87.69	135.15	207.88	295.07	466.23	627.12	1,073.08	1,722.41	3,119.39	5,172.92	10,733.81
100年	600.94	439.53	17.38	6.91	9.11	23.22	31.96	38.62	61.99	82.84	147.77	212.79	323.21	449.50	647.50	1,009.22	1,742.48	3,149.19	5,256.75	11,145.17
101年	615.94	384.89	30.01	10.62	13.00	22.57	31.22	54.76	55.70	92.04	135.16	209.92	316.51	450.09	642.50	1,046.14	1,634.99	3,111.78	5,368.53	11,362.42
102年	600.78	362.67	15.23	15.26	10.77	27.43	32.79	32.30	39.45	71.26	120.77	221.67	333.36	461.62	598.90	951.72	1,608.36	2,787.57	5,146.12	10,998.33
103年	629.12	403.28	15.98	14.45	12.05	19.73	44.92	33.31	45.32	90.65	131.91	210.82	299.40	453.63	634.57	930.83	1,612.32	2,781.10	5,270.99	11,549.10
104年	634.72	487.52	14.36	4.55	5.65	22.23	33.75	45.47	49.56	68.93	119.14	188.47	315.60	438.19	653.41	919.01	1,564.10	2,713.61	5,014.33	11,595.10
105年	668.05	388.34	17.17	11.82	11.14	22.39	35.94	39.52	46.02	74.97	133.69	202.29	324.95	449.88	643.65	943.09	1,522.98	2,776.81	5,148.48	12,150.42
106年	655.67	353.45	8.30	5.29	14.15	19.30	26.73	42.95	54.93	68.11	116.90	204.11	305.11	432.66	596.45	892.78	1,488.40	2,510.13	4,889.05	11,993.12
107年	674.54	442.23	17.12	6.88	8.12	22.67	32.72	31.86	56.89	65.42	104.18	205.45	302.94	430.33	603.23	909.56	1,393.66	2,612.04	4,791.46	12,173.79
108年	678.41	345.15	19.86	4.24	12.73	30.37	29.61	36.24	48.49	70.03	108.89	203.02	298.29	462.83	607.35	874.82	1,282.62	2,434.72	4,511.41	12,235.88

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表38・臺北市歷年事故傷害死亡原因

死因碼 ICD-9	死亡原因	單位：人，人/每十萬人口									
		93年		94年		95年		96年		97年	
死 人 數	每 死 亡 率	死 人 數	每 死 亡 率	死 人 數	每 死 亡 率	死 人 數	每 死 亡 率	死 人 數	每 死 亡 率	死 人 數	每 死 亡 率
E47-E53		463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14	389	14.81
E47	運輸事故	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54	153	5.83
E48	意外中毒	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91	91	3.47
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0.99
E50	意外墜落	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31	19	0.72
E51	火及火焰所致之事故傷害	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27	6	0.23
E52	其他事故傷害，包括後期影響	140	5.33	83	3.17	90	3.43	82	3.12	25	0.95
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	1	0.04	-	-	69	2.63

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表38・臺北市歷年事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	98年			99年			100年			101年			102年			103年		
		死 人 數	亡 人 數	每 十 萬 口 率															
V01-X59, Y85-Y86		377	14.42	359	13.74	402	15.26	430	16.15	406	15.15	458	17.00						
V01-V99	運輸事故傷害	165	6.31	154	5.89	147	5.58	152	5.71	150	5.60	142	5.27						
W00-W19	跌倒(落)	72	2.75	83	3.18	100	3.80	96	3.61	88	3.28	118	4.38						
W65-W74	意外溺死和淹沒	17	0.65	16	0.61	27	1.02	14	0.53	15	0.56	16	0.59						
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	24	0.92	26	0.99	26	0.99	24	0.90	21	0.78	23	0.85						
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	7	0.27	6	0.23	5	0.19	16	0.60	9	0.34	6	0.22						
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	26	0.99	20	0.77	16	0.61	19	0.71	28	1.04	31	1.15						
	其他	66	2.52	54	2.07	81	3.07	109	4.09	95	3.54	122	4.53						

表38・臺北市歷年事故傷害死亡原因（續2完）

死因碼 ICD-10	死亡原因	單位：人，人/每十萬人口											
		104年		105年		106年		107年		108年			
死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率		
V01-X59, Y85-Y86		435	16.09	457	16.92	443	16.47	455	17.00	386	14.53		
V01-V99	運輸事故傷害	131	4.85	159	5.89	153	5.69	135	5.05	127	4.78		
W00-W19	跌倒(落)	99	3.66	122	4.52	107	3.98	117	4.37	105	3.95		
W65-W74	意外溺死和淹沒	22	0.81	25	0.93	24	0.89	20	0.75	20	0.75		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	34	1.26	32	1.19	20	0.74	29	1.08	27	1.02		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	8	0.30	12	0.44	12	0.45	12	0.45	8	0.30		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	35	1.29	28	1.04	46	1.71	42	1.57	28	1.05		
	其他	106	3.92	79	2.93	81	3.01	100	3.74	71	2.67		

表39・臺北市歷年男性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		97年	
		死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率								
E47-E53		342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70	269	21.11
E47	運輸事故	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06	104	8.16
E48	意外中毒	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25	66	5.18
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1.65
E50	意外墜落	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16	13	1.02
E51	火及火焰所致之事故傷害	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31	5	0.39
E52	其他事故傷害，包括後期影響	110	8.53	68	5.30	70	5.46	63	4.92	17	1.33
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	1	0.08	-	-	43	3.37

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表39・臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續1）

死因碼 ICD-10	死亡原因	單位：人，人/每十萬男性人口											
		98年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率										
V01-X59, Y85-Y86		377	20.54	258	20.45	267	21.03	285	22.25	271	21.05	318	24.60
V01-V99	運輸事故傷害	110	8.69	113	8.96	97	7.64	108	8.43	102	7.92	99	7.66
W00-W19	跌倒(落)	55	4.35	64	5.07	67	5.28	72	5.62	66	5.13	86	6.65
W65-W74	意外溺死和淹沒	13	1.03	11	0.87	19	1.50	10	0.78	10	0.78	14	1.08
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	15	1.19	18	1.43	15	1.18	12	0.94	12	0.93	14	1.08
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	7	0.55	3	0.24	5	0.39	6	0.47	6	0.47	5	0.39
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	14	1.11	14	1.11	14	1.10	12	0.94	22	1.71	27	2.09
	其他	46	3.63	35	2.77	50	3.94	65	5.07	53	4.12	73	5.65

表39・臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續2完）

死因碼 ICD-10	死亡原因	單位：人，人/每十萬男性人口											
		104年		105年		106年		107年		108年			
死 人 數	亡 人 口 率	死 人 數	亡 人 口 率	死 人 數	亡 人 口 率	死 人 數	亡 人 口 率	死 人 數	亡 人 口 率	死 人 數	亡 人 口 率		
V01-X59, Y85-Y86		303	23.39	304	23.52	303	23.57	294	23.01	249	19.66		
V01-V99	運輸事故傷害	83	6.41	105	8.12	103	8.01	91	7.12	85	6.71		
W00-W19	跌倒(落)	71	5.48	88	6.81	76	5.91	78	6.10	73	5.76		
W65-W74	意外溺死和淹沒	20	1.54	18	1.39	19	1.48	16	1.25	15	1.18		
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	26	2.01	16	1.24	10	0.78	15	1.17	16	1.26		
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	4	0.31	6	0.46	8	0.62	6	0.47	3	0.24		
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	28	2.16	22	1.70	35	2.72	30	2.35	19	1.50		
	其他	71	5.48	49	3.79	52	4.04	58	4.54	38	3.00		

表40・臺北市歷年女性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		97年	
		死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率 人	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率 人	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率 人	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率 人	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率 人
E47-E53		121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92	120	8.88
E47	運輸事故	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15	49	3.62
E48	意外中毒	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59	25	1.85
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.37
E50	意外墜落	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55	6	0.44
E51	火及火焰所致之事故傷害	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22	1	0.07
E52	其他事故傷害，包括後期影響	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41	8	0.59
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1.92

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表40・臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	98年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死 人 數	每 十 萬 女性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率								
V01-X59, Y85-Y86		377	8.67	101	7.47	135	9.89	145	10.50	135	9.70	140	9.99
V01-V99	運輸事故傷害	55	4.08	41	3.03	50	3.66	44	3.19	48	3.45	43	3.07
W00-W19	跌倒(落)	17	1.26	19	1.41	33	2.42	24	1.74	22	1.58	32	2.28
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	0.30	5	0.37	8	0.59	4	0.29	5	0.36	2	0.14
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	9	0.67	8	0.59	11	0.81	12	0.87	9	0.65	9	0.64
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	3	0.22	-	-	10	0.72	3	0.22	1	0.07
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	12	0.89	6	0.44	2	0.15	7	0.51	6	0.43	4	0.29
	其他	20	1.48	19	1.41	31	2.27	44	3.19	42	3.02	49	3.50

表40・臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續2完）

死因碼 ICD-10	死亡原因	單位：人，人/每十萬女性人口									
		104年		105年		106年		107年		108年	
死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率	死 人 數	每 人 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		132	9.37	153	10.87	140	9.97	161	11.51	137	9.86
V01-V99	運輸事故傷害	48	3.41	54	3.84	50	3.56	44	3.15	42	3.02
W00-W19	跌倒(落)	28	1.99	34	2.42	31	2.21	39	2.79	32	2.30
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.14	7	0.50	5	0.36	4	0.29	5	0.36
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	8	0.57	16	1.14	10	0.71	14	1.00	11	0.79
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	4	0.28	6	0.43	4	0.28	6	0.43	5	0.36
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	7	0.50	6	0.43	11	0.78	12	0.86	9	0.65
	其他	35	2.49	30	2.13	29	2.07	42	3.00	33	2.37

表41・臺北市歷年自殺死亡方式

死因碼 ICD-9	死亡方式	單位：人，人/每十萬人口									
		84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 死 人 口 率	死 人 數	每 死 人 口 率	死 人 數	每 死 人 口 率	死 人 數	每 死 人 口 率	死 人 數	每 死 人 口 率
E54	自殺總計	206	7.79	346	13.18	467	17.83	454	17.30	364	13.84
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	109	4.12	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	18	0.68	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	1.51	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表41・臺北市歷年自殺死亡方式（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率										
		死 亡 人 數	死 亡 人 數										
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	370	14.09	341	13.04	329	12.59	306	11.61	333	12.51	261	9.74
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	1	0.04	-	-	1	0.04	3	0.11	2	0.07
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	6	0.23	5	0.19	9	0.34	7	0.26	4	0.15
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	-	-	-	-	2	0.08	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	124	4.72	99	3.79	100	3.83	72	2.73	82	3.08	55	2.05
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	6	0.23	9	0.34	11	0.42	6	0.23	4	0.15
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	6	0.23	2	0.08	1	0.04	1	0.04	2	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	109	4.17	113	4.32	126	4.78	103	3.87	77	2.87
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	25	0.96	24	0.92	25	0.95	34	1.28	28	1.04
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	2	0.08	4	0.15
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	5	0.19	4	0.15	1	0.04	4	0.15	5	0.19
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	4	0.15	10	0.38	6	0.23	8	0.30	3	0.11
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	68	2.60	55	2.10	52	1.97	71	2.67	67	2.50
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.11	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	3	0.11	4	0.15	1	0.04	2	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	6	0.23	1	0.04	-	-	4	0.15	6	0.22

表41・臺北市歷年自殺死亡方式（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103年		104年		105年		106年		107年		108年	
		死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率										
		死 亡 人 數	死 亡 率										
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	311	11.54	318	11.76	308	11.41	317	11.79	349	13.04	339	12.76
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森氏(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	7	0.26	5	0.18	4	0.15	6	0.22	3	0.11	1	0.04
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.07	3	0.11	3	0.11	11	0.41	5	0.19	5	0.19
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.04
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	76	2.82	81	3.00	67	2.48	68	2.53	73	2.73	48	1.81
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.26	8	0.30	4	0.15	4	0.15	8	0.30	2	0.08
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	2	0.07	3	0.11	1	0.04	3	0.11	5	0.19
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	104	3.86	105	3.88	104	3.85	105	3.90	136	5.08	128	4.82
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	32	1.19	20	0.74	38	1.41	33	1.23	26	0.97	29	1.09
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2	0.07	5	0.18	1	0.04	4	0.15	4	0.15	5	0.19
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	3	0.11	1	0.04	5	0.19	3	0.11	6	0.23
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器具蓄意自我傷害	6	0.22	9	0.33	8	0.30	10	0.37	10	0.37	15	0.56
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	70	2.60	69	2.55	68	2.52	67	2.49	0	-	91	3.43
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	75	2.80	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.07	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.07	5	0.18	5	0.19	1	0.04	-	-	2	0.08

表42・臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 男 性 人 口 死 亡 率								
E54	自殺總計	123	9.29	225	17.46	313	24.40	309	24.12	228	17.81
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	11	0.83	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	-	-	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	71	5.36	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	8	0.60	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.15	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16
E957	由高處跳下自殺及自傷	24	1.81	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	7	0.53	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表42・臺北市歷年男性自殺死亡方式（續1）

死因碼 ICD-10	死亡方式	單位：人，人/每十萬男性人口											
		97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率										
X60-X84, Y87.0	自殺總計	231	18.13	234	18.49	212	16.81	188	14.81	207	16.16	166	12.89
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	2	0.16
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	3	0.24	2	0.16	6	0.47	3	0.23	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	6.36	72	5.69	70	5.55	43	3.39	59	4.61	40	3.11
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	3	0.24	7	0.55	8	0.63	5	0.39	3	0.23
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.32	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	81	6.40	80	6.34	83	6.54	62	4.84	56	4.35
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	19	1.50	13	1.03	17	1.34	21	1.64	17	1.32
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.16	4	0.31
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	4	0.32	1	0.08	1	0.08	2	0.16	5	0.39
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	2	0.16	7	0.55	3	0.24	5	0.39	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	37	2.92	26	2.06	25	1.97	40	3.12	32	2.49
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.16	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	3	0.24	-	-	1	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	5	0.40	1	0.08	-	-	2.00	0.16	4	0.31

表42・臺北市歷年男性自殺死亡方式（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103年		104年		105年		106年		107年		108年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率										
		死 亡 人 數	死 亡 率										
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	181	14.00	205	15.82	197	15.24	193	15.01	219	17.14	212	16.74
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.08	2	0.15	2	0.15	3	0.23	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	2	0.15	1	0.08	3	0.23	4	0.31	3	0.24
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	52	4.02	56	4.32	42	3.25	46	3.58	53	4.15	35	2.76
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.54	4	0.31	4	0.31	2	0.16	7	0.55	1	0.08
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	3	0.23	-	-	3	0.23	4	0.32
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	67	5.18	72	5.56	67	5.18	66	5.13	80	6.26	86	6.79
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	14	1.08	12	0.93	25	1.93	18	1.40	14	1.10	8	0.63
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2	0.15	5	0.39	-	-	3	0.23	4	0.31	5	0.39
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	2	0.15	1	0.08	4	0.31	3	0.23	5	0.39
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器具蓄意自我傷害	4	0.31	7	0.54	7	0.54	5	0.39	8	0.63	9	0.71
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	32	2.48	38	2.93	39	3.02	40	3.11	41	3.21	53	4.18
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	2	0.15	4	0.31	1	0.08	-	-	2	0.16

表43・臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率								
E54	自殺總計	83	6.29	121	9.06	154	11.52	145	10.80	136	10.07
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	14	1.06	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.08	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	38	2.88	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	10	0.76	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	2	0.15	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表43・臺北市歷年女性自殺死亡方式（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率										
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28	107	7.93	117	8.66	118	8.64	126	9.12	95	6.82
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	3	0.22	3	0.22	3	0.22	4	0.29	4	0.29
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	43	3.18	27	2.00	30	2.22	29	2.12	23	1.67	15	1.08
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	3	0.22	2	0.15	3	0.22	1	0.07	1	0.07
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	2	0.15	1	0.07	-	-	-	-	1	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	28	2.07	33	2.44	43	3.15	41	2.97	21	1.51
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	6	0.44	11	0.81	8	0.59	13	0.94	11	0.79
X74	利用其他及未特定的槍械〔尤指槍炮、火器等軍火〕發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	3	0.22	-	-	2	0.14	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	2	0.15	3	0.22	3	0.22	3	0.22	3	0.22
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	31	2.30	29	2.15	27	1.98	31	2.24	35	2.51
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	3	0.22	1	0.07	1	0.07	1	0.07	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-	2	0.14	2	0.14

表43・臺北市歷年女性自殺死亡方式（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103年		104年		105年		106年		107年		108年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率										
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	130	9.27	113	8.03	111	7.88	124	8.83	130	9.30	127	9.14
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	6	0.43	3	0.21	2	0.14	3	0.21	3	0.21	1	0.07
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	1	0.07	2	0.14	8	0.57	1	0.07	2	0.14
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	24	1.71	25	1.78	25	1.78	22	1.57	20	1.43	13	0.94
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.28	-	-	2	0.14	1	0.07	1	0.07
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-	1	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	37	2.64	33	2.34	37	2.63	39	2.78	56	4.00	42	3.02
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	18	1.28	8	0.57	13	0.92	15	1.07	12	0.86	21	1.51
X74	利用其他及未特定的槍械〔尤指槍炮、火器等軍火〕發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-	1	0.07
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.14	2	0.14	1	0.07	5	0.36	2	0.14	6	0.43
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	38	2.71	31	2.20	29	2.06	27	1.92	34	2.43	38	2.73
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.14	3	0.21	1	0.07	-	-	-	-	-	-

表44・臺北市歷年主要死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎徵候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
95年	528.71	364.83	168.54	118.90	58.19	38.38	45.04	29.23	36.05	23.79	21.91	13.32	18.48	12.19	14.44	12.68
96年	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓 性疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎病徵候群 及腎病變		慢性下呼吸道疾病	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	36.18	20.14	45.66	27.26	27.26	16.89	18.70	11.20	16.98	9.27
98年	568.60	347.27	174.48	111.24	67.61	39.98	32.12	16.59	43.13	24.61	31.55	18.86	17.25	9.72	18.97	9.85
99年	575.83	338.78	177.26	110.14	65.94	36.69	34.40	16.89	40.07	21.91	29.43	16.78	18.14	10.07	17.79	8.87
100年	600.94	343.47	179.59	109.78	72.30	38.51	35.75	16.96	43.15	23.13	29.41	16.39	17.00	8.89	22.09	10.48
101年	615.94	344.34	187.11	111.52	76.18	40.21	34.00	15.54	44.55	22.94	30.69	16.63	19.95	10.62	22.20	10.31
102年	600.78	326.27	183.55	106.98	77.43	39.81	32.95	14.46	45.15	22.34	32.09	16.84	18.21	9.13	21.38	9.73
103年	629.12	332.35	181.93	103.64	92.38	46.23	39.34	17.10	44.98	22.40	31.73	16.17	20.64	9.89	24.35	10.22
104年	634.72	325.57	185.87	102.84	88.07	42.60	41.61	17.37	42.65	20.08	28.59	13.87	20.90	9.68	23.52	9.54
105年	668.05	332.75	193.28	105.00	97.44	45.78	47.18	19.36	44.66	20.76	30.70	14.50	22.63	10.24	23.18	9.64
106年	655.67	316.47	188.21	98.69	102.25	45.83	52.91	20.75	44.51	20.28	27.07	12.43	22.01	9.55	21.94	8.54
107年	674.54	317.59	195.75	100.48	112.11	47.98	60.50	22.32	43.05	18.57	25.86	11.34	23.21	9.73	19.21	7.38
108年	678.41	309.90	200.47	99.46	105.13	44.13	74.56	26.91	43.13	18.55	27.14	11.64	19.53	7.83	19.01	7.01

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表44・臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
95年	17.30	14.12	12.08	8.86	5.53	3.48	6.71	4.30	3.51	2.26	3.01	1.89	2.59	1.63	1.60	2.92
96年	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年別	事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		血管性及未明示之癥狀		帕金森病		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	14.81	11.94	19.53	11.27	14.24	8.21	14.09	11.40	11.27	7.69	2.63	1.29	3.54	1.88	6.51	4.05
98年	14.42	11.20	16.86	9.44	14.72	8.17	13.04	10.39	13.35	8.79	4.28	2.06	3.52	1.89	4.86	2.91
99年	13.74	10.71	17.18	9.25	16.15	8.49	12.59	9.67	12.17	7.90	4.44	2.00	4.25	2.10	4.59	2.60
100年	15.26	10.92	21.48	10.81	16.93	8.47	11.61	8.98	11.96	7.65	5.16	2.18	4.59	2.33	4.86	2.68
101年	16.15	11.31	21.00	10.47	20.13	9.74	12.51	9.82	10.74	6.77	4.85	1.94	5.94	2.92	4.55	2.41
102年	15.15	10.47	17.39	8.18	18.40	8.66	9.74	7.40	11.57	6.99	5.30	2.11	5.78	2.71	5.11	2.62
103年	17.00	11.23	16.52	7.62	17.11	7.55	11.54	9.06	10.54	6.29	7.35	2.78	5.01	2.23	4.60	2.30
104年	16.09	11.05	17.09	7.49	17.13	7.65	11.76	8.72	10.28	5.96	11.06	3.97	6.66	2.95	6.44	3.24
105年	16.92	11.14	19.59	8.15	14.29	6.37	11.41	8.38	10.33	5.97	12.74	4.40	7.63	3.29	5.96	2.81
106年	16.47	11.09	17.22	7.20	13.72	5.80	11.79	8.89	10.00	5.58	11.53	3.88	7.03	2.87	6.14	2.77
107年	17.00	10.85	16.78	7.00	14.42	5.97	13.04	9.84	8.89	4.97	6.32	2.10	5.49	2.15	5.46	2.59
108年	14.57	9.90	13.10	5.11	12.76	4.90	12.76	10.05	9.03	4.99	11.18	3.56	6.85	2.66	5.23	2.31

表45・臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬男性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎臟病及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
95年	654.67	445.74	210.37	146.09	75.79	49.62	53.08	34.17	36.92	24.11	29.12	17.22	20.37	13.06	21.93	19.32
96年	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		慢性下呼吸道疾病		糖尿病		腎炎、腎臟病及腎性病變	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	48.58	26.32	53.13	32.56	26.45	13.76	27.62	17.36	18.83	11.24
98年	693.85	425.20	211.03	134.11	86.99	52.89	41.72	21.04	51.12	29.05	29.79	15.11	33.42	20.41	19.67	10.79
99年	704.08	421.30	219.66	137.29	82.36	47.58	43.44	21.00	47.72	26.99	26.56	12.91	30.44	17.70	18.55	10.57
100年	737.25	426.54	216.55	132.95	90.98	50.79	47.66	22.21	54.91	29.93	35.05	16.00	30.96	18.33	18.59	9.68
101年	751.69	429.77	229.30	138.02	97.28	54.52	43.96	20.08	53.01	28.56	33.57	15.24	32.32	18.20	19.91	11.13
102年	732.81	409.56	221.64	130.87	97.23	53.17	44.65	19.94	54.28	28.22	33.47	15.30	33.24	18.44	18.79	9.69
103年	766.33	422.54	218.44	127.74	114.48	61.76	49.35	22.19	55.85	29.48	36.74	15.80	33.57	18.30	21.97	10.97
104年	766.62	414.33	220.37	127.13	109.22	56.98	52.87	22.79	51.48	26.11	36.28	15.00	31.88	16.92	21.77	10.57
105年	802.25	424.60	225.92	127.78	122.25	63.29	60.35	26.06	53.54	27.20	35.28	15.27	30.79	15.92	25.84	12.57
106年	775.76	399.58	215.76	117.67	125.92	62.84	67.51	28.54	54.06	26.70	33.60	13.73	26.52	13.49	22.48	10.61
107年	795.21	403.72	229.01	123.42	134.23	63.69	72.32	29.18	52.21	24.20	31.07	12.71	26.69	13.21	23.01	10.52
108年	794.66	394.80	232.57	121.16	121.89	57.98	88.81	35.52	51.63	25.03	29.05	11.61	29.21	14.08	20.92	8.96

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表45・臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
95年	24.12	20.00	16.39	12.38	5.70	3.34	7.34	4.78	4.53	2.83	3.36	2.06	4.14	2.46	1.25	2.40
96年	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年別	事故傷害		敗血症		蓄意自我傷害(自殺)		高血壓性疾病		慢性肝病及肝硬化		帕金森病		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)		血管性及未明示之癱瘓	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	21.11	17.19	20.64	11.78	18.13	15.00	16.01	9.43	15.46	10.94	4.39	2.24	7.93	4.79	2.43	1.15
98年	20.54	16.29	18.41	10.28	18.49	14.83	16.28	9.25	18.33	12.76	4.90	2.56	5.77	3.39	3.48	1.58
99年	20.45	16.18	18.23	9.72	16.81	13.01	18.31	9.74	15.70	10.91	5.07	2.28	5.95	3.48	4.36	1.97
100年	21.03	15.84	26.55	13.53	14.81	11.63	18.12	9.32	16.62	11.40	5.51	2.83	5.91	3.26	4.96	2.10
101年	22.25	16.23	24.05	11.78	16.16	12.59	21.39	10.76	14.60	9.70	7.50	3.72	4.68	2.45	5.00	2.00
102年	21.05	15.04	21.28	10.03	12.89	9.96	19.80	9.82	15.38	10.12	7.30	3.49	6.21	3.31	4.89	1.88
103年	24.60	16.98	20.81	10.00	14.00	10.85	18.64	8.72	14.54	9.34	7.04	3.16	5.72	2.83	6.50	2.52
104年	23.39	16.86	22.00	10.05	15.82	11.73	18.29	9.34	13.35	8.46	8.95	4.19	6.79	3.42	9.88	3.60
105年	23.52	16.38	22.44	9.62	15.24	11.07	16.09	8.07	14.70	9.09	10.06	4.51	7.04	3.37	11.45	4.06
106年	23.57	16.53	21.62	9.65	15.01	11.45	14.78	6.95	13.14	8.18	8.24	3.54	6.92	3.19	10.97	3.91
107年	23.01	15.59	19.72	8.96	17.14	12.86	14.48	6.65	12.37	7.66	6.89	2.93	6.10	3.17	5.24	1.93
108年	19.66	13.86	15.71	6.71	16.74	13.35	12.63	5.63	13.42	8.32	8.76	3.73	5.84	2.59	11.68	4.07

表46・臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬女性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎微候群及腎性病變		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
95年	408.57	288.49	128.65	92.46	41.39	27.76	37.37	24.78	35.21	23.87	16.68	11.39	15.04	9.47	10.80	8.87
96年	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓 性疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎病徵候群 及腎病變		高血壓性疾病	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	24.49	14.14	38.61	22.90	26.93	16.79	18.57	11.35	12.58	7.27
98年	451.14	276.88	140.20	90.07	49.43	28.58	23.12	12.35	35.64	20.63	29.79	17.72	14.97	8.70	13.26	7.33
99年	456.13	265.58	137.69	85.62	50.61	27.23	25.97	12.95	32.92	17.61	28.48	16.12	17.76	9.80	14.13	7.43
100年	474.21	270.05	145.23	89.19	54.93	27.89	24.68	12.06	32.22	17.12	27.98	14.97	15.53	8.19	15.82	7.81
101年	490.07	269.77	147.98	88.40	56.62	28.04	24.76	11.42	36.71	18.18	29.18	15.39	19.98	10.28	18.97	8.90
102年	478.66	253.90	148.32	86.24	59.11	28.39	22.12	9.54	36.70	17.36	31.03	15.60	17.67	8.67	17.10	7.74
103年	502.56	254.29	148.26	83.07	71.99	33.14	30.11	12.67	34.96	16.33	30.04	14.40	19.41	9.01	15.70	6.59
104年	513.35	250.23	154.12	82.57	68.61	30.53	31.25	12.64	34.52	15.13	25.57	11.32	20.10	8.92	16.05	6.33
105年	544.83	255.48	163.31	85.94	74.66	31.13	35.09	13.78	36.51	15.42	30.62	13.33	19.68	8.33	12.64	4.98
106年	545.67	247.47	162.99	83.14	80.57	31.74	39.54	14.43	35.76	15.09	27.57	11.57	21.58	8.69	12.75	4.82
107年	564.27	246.23	165.35	81.96	91.90	34.91	49.70	16.80	34.69	13.97	25.10	9.76	23.39	9.09	14.37	5.41
108年	572.48	239.93	171.21	82.22	89.85	32.65	61.58	20.12	35.39	13.15	25.25	9.56	18.27	6.85	12.88	4.27

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表46・臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
95年	7.97	5.79	7.30	6.30	5.36	3.59	6.10	3.95	2.53	1.69	2.68	1.74	1.94	3.45	1.56	1.06
96年	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年別	敗血症		事故傷害		蓄意自我傷害 (自殺)		慢性下呼吸道疾病		血管性及未明示之 癱瘓		慢性肝病及肝硬化		原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)		骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	18.49	10.99	8.88	6.98	10.28	8.19	8.06	4.57	2.81	1.48	7.32	4.87	5.18	3.35	11.02	6.25
98年	15.41	8.77	8.67	6.49	7.93	6.48	8.82	4.61	5.04	2.57	8.67	5.38	4.00	2.43	14.67	7.76
99年	16.20	8.98	7.47	5.74	8.66	6.70	9.62	4.94	4.51	2.11	8.88	5.36	3.33	1.80	15.54	7.61
100年	16.77	8.39	9.89	6.49	8.64	6.65	10.03	5.06	5.35	2.32	7.62	4.44	3.88	2.16	9.89	5.54
101年	18.17	9.22	10.50	6.82	9.12	7.31	11.66	5.67	4.71	1.91	7.17	4.18	4.42	2.40	6.81	3.86
102年	13.79	6.53	9.70	6.34	6.82	5.17	10.20	4.64	5.67	2.33	8.04	4.28	4.09	2.04	7.40	3.88
103年	12.56	5.61	9.99	6.00	9.27	7.58	12.91	5.21	8.13	3.08	6.85	3.62	3.57	1.80	11.49	5.03
104年	12.57	5.31	9.37	5.72	8.03	6.07	11.79	4.75	12.14	4.37	7.46	3.83	6.11	3.10	13.14	5.53
105年	16.98	6.93	10.87	6.37	7.88	6.09	12.08	4.96	13.92	4.73	6.32	3.25	4.97	2.36	12.93	5.01
106年	13.18	5.22	9.97	6.29	8.83	6.59	11.26	4.25	12.04	3.89	7.12	3.34	5.41	2.42	7.19	3.00
107年	14.09	5.42	11.51	6.71	9.30	7.21	8.37	3.06	7.29	2.26	5.72	2.68	4.86	2.16	4.72	2.49
108年	10.72	3.88	9.93	6.33	9.14	7.07	9.86	3.39	10.72	3.18	5.04	2.13	4.68	2.13	5.11	2.65

表47・臺北市歷年主要癌症死亡原因

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口												
		84年			93年			94年			95年			
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因	3,180	120.31	4,202	160.09	4,290	163.78	4,423	168.54	4,566	173.56			
162	肺癌	1	615	23.27	1	880	33.53	1	870	33.21	1	910	34.68	1
155	肝癌	2	570	21.56	2	677	25.79	2	607	23.17	2	702	26.75	2
153 154	結腸直腸癌	3	329	12.45	3	518	19.73	3	542	20.69	3	532	20.27	3
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	5	135	10.23	4	203	15.20	4	224	16.76	4	209	15.56	4
151	胃癌	4	328	12.41	5	311	11.85	5	354	13.51	5	363	13.83	5
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	7	51	3.85	6	122	9.46	6	133	10.37	6	129	10.07	6
200,202,203	非何杰金淋巴癌	10	92	3.48	9	148	5.64	7	181	6.91	8	175	6.67	7
157	胰臟癌	9	97	3.67	8	164	6.25	9	168	6.41	7	178	6.78	8
179 180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	108	8.18	7	87	6.51	8	86	6.43	10	81	6.03	9
156	膽囊癌	15	64	2.42	11	125	4.76	12	120	4.58	12	116	4.42	10
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	44	3.33	12	58	4.34	14	50	3.74	11	73	5.43	11
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	78	2.95	10	138	5.26	10	146	5.57	9	166	6.33	12
150	食道癌	14	75	2.84	14	106	4.04	11	126	4.81	14	97	3.70	13
204-208	白血病	8	100	3.78	13	108	4.11	13	100	3.82	13	98	3.73	14
188	膀胱癌	17	57	2.16	15	92	3.51	16	66	2.52	16	82	3.12	15
	其他		437	16.53		465	17.72		517	19.74		512	19.51	
														523
														19.88

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表47・臺北市歷年主要癌症死亡原因（續1）

死因碼 ICD-10	死　　亡　　原　　因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死　　亡　　人　　數	每十萬人　　口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬人　　口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬人　　口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬人　　口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬人　　口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬人　　口　　死亡率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	4,467	170.10	4,563	174.48	4,632	177.26	4,732	179.59	4,981	187.11	4,919	183.55						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34	1	967	36.98	1	990	37.89	1	1,014	38.48	1	1,018	38.24	1	988	36.87
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	228	16.87	4	236	17.49	4	266	19.68	4	283	20.73	4	243	17.59	4	264	18.96
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59	3	592	22.64	3	570	21.81	3	609	23.11	3	648	24.34	3	631	23.55
C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69	2	665	25.43	2	644	24.65	2	672	25.50	2	697	26.18	2	700	26.12
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	124	9.73	6	142	11.22	6	144	11.41	6	132	10.40	5	176	13.74	5	155	12.04
C25	胰臟癌	7	192	7.31	7	237	9.06	7	211	8.07	7	231	8.77	7	232	8.71	7	231	8.62
C16	胃癌	5	312	11.88	5	319	12.20	5	307	11.75	5	285	10.82	6	329	12.36	6	315	11.75
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	131	4.99	8	148	5.66	9	151	5.78	8	153	5.81	9	169	6.35	8	203	7.57
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	131	4.99	12	119	4.55	8	152	5.82	9	149	5.65	10	147	5.52	10	154	5.75
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	13	58	4.29	11	65	4.82	12	66	4.88	11	65	4.76	8	88	6.37	9	85	6.11
C15	食道癌	12	120	4.57	10	129	4.93	11	137	5.24	12	115	4.36	11	133	5.00	12	121	4.52
C91-C95	白血病	11	121	4.61	13	106	4.05	13	107	4.09	13	112	4.25	13	110	4.13	13	113	4.22
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	17	28	2.07	19	23	1.70	18	29	2.15	18	34	2.49	18	35	2.53	15	39	2.80
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	8	75	5.55	9	69	5.11	10	71	5.25	10	74	5.42	12	63	4.56	11	80	5.75
C67	膀胱癌	15	80	3.05	14	80	3.06	14	95	3.64	14	78	2.96	14	85	3.19	14	84	3.13
	其他		671	25.55		666	25.47		692	26.48		726	27.55		808	30.35		756	28.21

附　　註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表47・臺北市歷年主要癌症死亡原因（續2完）

死因碼 ICD-10	死　亡　原　因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死　亡　人　數	每十萬人　死亡率	順位	死　亡　人　數	每十萬人　死亡率	順位	死　亡　人　數	每十萬人　死亡率	順位	死　亡　人　數	每十萬人　死亡率	順位	死　亡　人　數	每十萬人　死亡率	順位	死　亡　人　數	每十萬人　死亡率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	4,902	181.93	5,025	185.87	5,219	193.28	5,062	188.21	5,238	195.75	5,326	200.47						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	992	36.82	1	984	36.40	1	1,070	39.63	1	1,034	38.45	1	1,053	39.35	1	1,040	39.14
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	289	20.62	4	288	20.45	4	302	21.45	4	323	23.01	4	321	22.96	2	378	27.19
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	666	24.72	2	686	25.37	2	675	25.00	2	670	24.91	2	705	26.35	3	721	27.14
C22	肝和肝內膽管癌	2	666	24.72	3	667	24.67	3	672	24.89	3	658	24.47	3	679	25.37	4	661	24.88
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	151	11.68	5	163	12.58	5	167	12.92	5	177	13.77	5	160	12.52	5	177	13.97
C25	胰臟癌	7	257	9.54	7	273	10.10	7	260	9.63	6	294	10.93	6	308	11.51	6	314	11.82
C16	胃癌	6	312	11.58	6	295	10.91	6	311	11.52	7	278	10.34	7	288	10.76	7	295	11.10
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	174	6.46	8	183	6.77	8	208	7.70	9	166	6.17	8	176	6.58	8	200	7.53
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	155	5.75	9	153	5.66	10	174	6.44	11	133	4.95	9	159	5.94	9	186	7.00
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	84	5.99	10	77	5.47	9	107	7.60	8	89	6.34	10	79	5.65	10	86	6.19
C15	食道癌	11	134	4.97	12	133	4.92	13	123	4.56	12	119	4.42	11	140	5.23	11	150	5.65
C91-C95	白血病	13	98	3.64	14	108	3.99	12	133	4.93	14	115	4.28	13	124	4.63	12	141	5.31
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	17	35	2.50	15	42	2.98	15	47	3.34	15	59	4.20	15	54	3.86	13	65	4.68
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	12	58	4.14	11	70	4.97	11	72	5.11	10	76	5.41	12	66	4.72	14	62	4.46
C67	膀胱癌	14	93	3.45	13	117	4.33	14	108	4.00	13	116	4.31	14	109	4.07	15	100	3.76
	其他		738	27.39		786	29.07		790	29.26		755	28.07		817	30.53		750	28.23

附　註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表48・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬男性人口												
		84年			93年			94年			95年			
順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因	1,977	149.38	2,594	201.24	2,630	205.00	2,695	210.37	2,757	215.37			
162	肺癌	2	414	31.28	1	599	46.47	1	562	43.81	1	608	47.46	1
155	肝癌	1	436	32.94	2	495	38.40	2	445	34.69	2	518	40.43	2
153 154	結腸直腸癌	4	191	14.43	3	306	23.74	3	306	23.85	3	316	24.67	3
151	胃癌	3	212	16.02	4	198	15.36	4	236	18.40	4	240	18.73	4
185	攝護腺癌	11	51	3.85	5	122	9.46	5	133	10.37	6	129	10.07	5
200,202,203	非何杰金淋巴癌	6	66	4.99	7	91	7.06	8	115	8.96	7	112	8.74	6
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	73	5.52	5	122	9.46	6	133	10.37	5	147	11.47	7
150	食道癌	8	64	4.84	7	91	7.06	7	116	9.04	9	87	6.79	8
157	胰臟癌	9	63	4.76	9	89	6.90	9	103	8.03	8	96	7.49	9
156	膽囊癌	16	27	2.04	11	65	5.04	10	70	5.46	11	60	4.68	10
204-208	白血病	7	65	4.91	10	68	5.28	11	59	4.60	12	54	4.22	11
188	膀胱癌	12	42	3.17	12	62	4.81	13	45	3.51	13	50	3.90	12
147	鼻咽癌	9	63	4.76	13	55	4.27	12	59	4.60	10	65	5.07	13
191	腦癌	14	29	2.19	15	26	2.02	14	32	2.49	14	33	2.58	14
161	喉癌	15	28	2.12	16	18	1.40	15	20	1.56	16	20	1.56	15
	其他		153	11.56		187	14.51		196	15.28		160	12.49	202
														15.78

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表48・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死　　亡　　原　　因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死　　亡　　人　　數	每十萬　　男性人口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬　　男性人口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬　　男性人口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬　　男性人口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬　　男性人口　　死亡率	順位	死　　亡　　人　　數	每十萬　　男性人口　　死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73		2,671	211.03		2,771	219.66		2,749	216.55		2,937	229.30		2,854	221.64
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54	1	596	47.09	1	617	48.91	1	639	50.34	1	633	49.42	1	610	47.37
C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30	2	449	35.47	2	443	35.12	2	474	37.34	2	475	37.08	2	485	37.67
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13	3	311	24.57	3	331	26.24	3	325	25.60	3	371	28.97	3	358	27.80
C16	胃癌	4	218	17.11	4	203	16.04	4	197	15.62	4	191	15.05	4	203	15.85	4	189	14.68
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02	7	136	10.75	6	139	11.02	5	132	10.40	6	146	11.40	5	175	13.59
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73	5	142	11.22	5	144	11.41	5	132	10.40	5	176	13.74	6	155	12.04
C25	胰臟癌	7	114	8.95	6	137	10.82	7	126	9.99	7	111	8.74	8	123	9.60	7	123	9.55
C15	食道癌	8	107	8.40	8	109	8.61	8	115	9.12	8	104	8.19	7	127	9.92	8	110	8.54
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96	9	77	6.08	9	102	8.09	9	94	7.40	9	86	6.71	9	80	6.21
C91-C95	白血病	9	76	5.96	10	64	5.06	10	65	5.15	10	63	4.96	10	71	5.54	10	70	5.44
C67	膀胱癌	12	57	4.47	11	56	4.42	11	63	4.99	11	53	4.18	12	55	4.29	11	57	4.43
C64	腎臟癌	14	26	2.04	13	38	3.00	14	39	3.09	12	48	3.78	15	37	2.89	14	39	3.03
C11	鼻咽癌	11	61	4.79	12	49	3.87	12	56	4.44	13	42	3.31	11	56	4.37	12	56	4.35
C71	腦癌	14	26	2.04	15	35	2.77	13	41	3.25	13	42	3.31	13	44	3.44	13	46	3.57
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43	13	38	3.00	15	30	2.38	15	32	2.52	14	40	3.12	15	28	2.17
	其他		253	19.85		231	18.25		263	20.85		267	21.03		294	22.95		273	21.20

表48・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續2完）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬男性人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 人 數	每十萬口死亡率	順位	死 人 數	每十萬口死亡率	順位	死 人 數	每十萬口死亡率	順位	死 人 數	每十萬口死亡率	順位	死 人 數	每十萬口死亡率	順位	死 人 數	每十萬口死亡率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	2,824	218.44	2,855	220.37	2,920	225.92	2,774	215.76	2,926	229.01	2,946	232.57						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	588	45.48	1	589	45.46	1	626	48.43	1	605	47.06	1	629	49.23	1	615	48.55
C22	肝和肝內膽管癌	2	447	34.58	2	429	33.11	2	430	33.27	2	437	33.99	2	432	33.81	2	421	33.24
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	364	28.16	3	361	27.86	3	376	29.09	3	348	27.07	3	391	30.60	3	405	31.97
C16	胃癌	4	199	15.39	4	185	14.28	4	197	15.24	4	180	14.00	6	160	12.52	4	182	14.37
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	152	11.76	6	161	12.43	5	180	13.93	7	146	11.36	5	161	12.60	5	181	14.29
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	151	11.68	5	163	12.58	6	167	12.92	5	177	13.77	6	160	12.52	6	177	13.97
C25	胰臟癌	7	133	10.29	7	140	10.81	7	147	11.37	6	152	11.82	8	158	12.37	7	160	12.63
C15	食道癌	8	124	9.59	8	124	9.57	8	108	8.36	8	104	8.09	9	128	10.02	8	133	10.50
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	92	7.12	9	88	6.79	9	98	7.58	10	72	5.60	10	96	7.51	9	95	7.50
C91-C95	白血病	12	55	4.25	11	68	5.25	11	70	5.42	11	66	5.13	12	65	5.09	10	78	6.16
C67	膀胱癌	10	66	5.11	10	86	6.64	10	76	5.88	9	79	6.14	11	71	5.56	11	67	5.29
C64	腎臟癌	14	32	2.48	13	43	3.32	13	36	2.79	15	32	2.49	13	53	4.15	12	56	4.42
C11	鼻咽癌	11	62	4.80	12	61	4.71	12	45	3.48	13	38	2.96	14	44	3.44	13	49	3.87
C71	腦癌	15	30	2.32	15	31	2.39	15	35	2.71	12	39	3.03	15	41	3.21	14	48	3.79
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	45	3.48	14	37	2.86	13	36	2.79	14	33	2.57	16	29	2.27	15	33	2.61
	其他		284	21.97		289	22.31		293	22.67		266	20.69		308	24.11		246	19.42

表49・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬女性人口														
		84年			93年			94年			95年					
順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	1,203	91.16	1,608	120.38	1,660	124.20	1,728	128.65	1,809	133.94					
162	肺癌	1	201	15.23	1	281	21.04	1	308	23.05	1	302	22.48	1	352	26.06
153 154	結腸直腸癌	2	138	10.46	2	212	15.87	2	236	17.66	2	216	16.08	2	249	18.44
174	女性乳癌	3	135	10.23	3	203	15.20	3	224	16.76	3	209	15.56	3	203	15.03
155	肝癌	4	134	10.15	4	182	13.62	4	162	12.12	4	184	13.70	4	178	13.18
151	胃癌	5	116	8.79	5	113	8.46	5	118	8.83	5	123	9.16	5	115	8.51
179 180	子宮頸癌	6	108	8.18	6	87	6.51	6	86	6.43	7	81	6.03	6	89	6.59
200,202,203	非何杰金淋巴癌	11	26	1.97	10	57	4.27	7	66	4.94	9	63	4.69	7	88	6.52
157	胰臟癌	10	34	2.58	7	75	5.61	8	65	4.86	6	82	6.10	8	87	6.44
183	卵巢癌	7	44	3.33	9	58	4.34	10	50	3.74	8	73	5.43	9	74	5.48
156	膽囊癌	8	37	2.80	8	60	4.49	9	50	3.74	10	56	4.17	10	60	4.44
204-208	白血病	9	35	2.65	11	40	2.99	11	41	3.07	11	44	3.28	11	39	2.89
182	子宮體癌	19	8	0.61	14	22	1.65	13	22	1.65	13	25	1.86	12	26	1.93
188	膀胱癌	15	15	1.14	12	30	2.25	14	21	1.57	15	32	2.38	13	26	1.93
191	腦癌	12	23	1.74	13	24	1.80	12	25	1.87	16	22	1.64	14	20	1.48
150	食道癌	16	11	0.83	18	15	1.12	18	10	0.75	19	10	0.74	15	19	1.41
	其他		138	10.46		149	11.15		176	13.17		206	15.34		184	13.62

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表49・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續1）

死因碼 ICD-10	死　亡　原　因	單位：人，人/每十萬女性人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死　亡 人　數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死　亡 人　數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死　亡 人　數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死　亡 人　數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死　亡 人　數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死　亡 人　數	每十萬 女性人口 死亡率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	1,769	130.86	1,892	140.20	1,861	137.69	1,983	145.23	2,044	147.98	2,065	148.32						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78	1	371	27.49	1	373	27.60	1	375	27.46	1	385	27.87	1	378	27.15
C50	女性乳房癌	3	228	16.87	3	236	17.49	2	266	19.68	3	283	20.73	3	243	17.59	3	264	18.96
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31	2	281	20.82	3	239	17.68	2	284	20.80	2	277	20.05	2	273	19.61
C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76	4	216	16.01	4	201	14.87	4	198	14.50	4	222	16.07	4	215	15.44
C25	胰臟癌	6	78	5.77	6	100	7.41	6	85	6.29	5	120	8.79	6	109	7.89	6	108	7.76
C16	胃癌	5	94	6.95	5	116	8.60	5	110	8.14	6	94	6.88	5	126	9.12	5	126	9.05
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07	9	42	3.11	9	50	3.70	9	55	4.03	9	61	4.42	9	74	5.32
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	8	58	4.29	8	65	4.82	8	66	4.88	8	65	4.76	7	88	6.37	7	85	6.11
C54	子宮體癌	12	28	2.07	14	23	1.70	12	29	2.15	11	34	2.49	12	35	2.53	11	39	2.80
C91-C95	白血病	10	45	3.33	9	42	3.11	10	42	3.11	10	49	3.59	10	39	2.82	10	43	3.09
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	75	5.55	7	69	5.11	7	71	5.25	7	74	5.42	8	63	4.56	8	80	5.75
C45-C49	間皮和軟組織癌	13	26	1.92	18	16	1.19	20	9	0.67	18	20	1.46	14	29	2.10	16	23	1.65
C71	腦癌	14	23	1.70	15	21	1.56	13	28	2.07	13	28	2.05	15	28	2.03	12	29	2.08
C67	膀胱癌	14	23	1.70	13	24	1.78	11	32	2.37	15	25	1.83	13	30	2.17	14	27	1.94
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	11	35	2.59	11	35	2.59	15	22	1.63	11	34	2.49	11	37	2.68	15	25	1.80
	其他		219	16.20		235	17.41		238	17.61		245	17.94		272	19.69		276	19.82

表49・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年			104年			105年			106年			107年			108年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,078	148.26		2,170	154.12		2,299	163.31		2,288	162.99		2,312	165.35		2,380	171.21
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	404	28.82	1	395	28.05	1	444	31.54	1	429	30.56	1	424	30.32	1	425	30.57
C50	女性乳房癌	3	289	20.62	3	288	20.45	2	302	21.45	2	323	23.01	2	321	22.96	2	378	27.19
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	302	21.55	2	325	23.08	3	299	21.24	3	322	22.94	3	314	22.46	3	316	22.73
C22	肝和肝內膽管癌	4	219	15.62	4	238	16.90	4	242	17.19	4	221	15.74	4	247	17.66	4	240	17.27
C25	胰臟癌	5	124	8.85	5	133	9.45	6	113	8.03	5	142	10.12	5	150	10.73	5	154	11.08
C16	胃癌	6	113	8.06	6	110	7.81	5	114	8.10	6	98	6.98	6	128	9.15	6	113	8.13
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	63	4.49	9	65	4.62	8	76	5.40	9	61	4.35	9	63	4.51	7	91	6.55
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	7	84	5.99	7	77	5.47	7	107	7.60	7	89	6.34	7	79	5.65	8	86	6.19
C54	子宮體癌	11	35	2.50	10	42	2.98	11	47	3.34	10	59	4.20	11	54	3.86	9	65	4.68
C91-C95	白血病	10	43	3.07	11	40	2.84	10	63	4.48	11	49	3.49	10	59	4.22	10	63	4.53
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	58	4.14	8	70	4.97	9	72	5.11	8	76	5.41	8	66	4.72	11	62	4.46
C45-C49	間皮和軟組織癌	12	33	2.35	17	20	1.42	17	26	1.85	12	37	2.64	14	34	2.43	12	42	3.02
C71	腦癌	15	25	1.78	15	28	1.99	15	27	1.92	14	35	2.49	12	40	2.86	13	39	2.81
C67	膀胱癌	14	27	1.93	13	31	2.20	13	32	2.27	12	37	2.64	13	38	2.72	14	33	2.37
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.21	12	36	2.56	15	27	1.92	16	27	1.92	16	32	2.29	15	29	2.09
	其他		228	16.27		272	19.32		308	21.88		283	20.16		263	18.81		244	17.45

表50・臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
95年	168.54	118.90	34.68	23.70	26.75	19.75	20.27	14.03	15.56	11.37	13.83	9.15	10.07	5.68	6.67	4.78
96年	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管 和肺癌		結腸、直腸 和肛門癌		肝和肝內膽管癌		女性乳房癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌		胃癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	170.10	112.87	35.34	22.90	21.59	13.90	26.69	18.47	16.87	11.66	9.73	5.35	7.31	4.85	11.88	7.51
98年	174.48	111.24	36.98	22.87	22.64	14.01	25.43	16.63	17.49	11.55	11.22	5.88	9.06	5.74	12.20	7.31
99年	177.26	110.14	37.89	22.60	21.81	13.10	24.65	15.83	19.68	12.87	11.41	5.86	8.07	5.06	11.75	6.67
100年	179.59	109.78	38.48	22.83	23.11	13.85	25.50	15.95	20.73	13.50	10.40	5.12	8.77	5.30	10.82	6.21
101年	187.11	111.52	38.24	22.23	24.34	13.77	26.18	16.07	17.59	10.88	13.74	6.72	8.71	5.19	12.36	6.83
102年	183.55	106.98	36.87	20.72	23.55	13.36	26.12	15.44	18.96	11.90	12.04	5.87	8.62	4.89	11.75	6.27
103年	181.97	103.66	36.82	20.34	24.72	13.54	24.72	14.18	20.62	12.73	11.68	5.14	9.54	5.48	11.58	6.07
104年	185.87	102.84	36.40	19.68	25.37	13.41	24.67	13.72	20.45	12.15	12.58	5.97	10.10	5.60	10.91	5.80
105年	193.28	105.00	39.63	20.84	25.00	12.92	24.89	13.63	21.45	12.52	12.92	5.76	9.63	5.14	11.52	5.83
106年	188.21	98.69	38.45	19.62	24.91	12.56	24.47	12.91	23.01	13.39	13.77	6.11	10.93	5.72	10.34	4.98
107年	195.75	100.48	39.35	19.52	26.35	13.03	25.37	12.82	22.96	12.92	12.52	5.57	11.51	5.81	10.76	5.24
108年	200.47	99.46	39.14	18.55	27.14	12.95	24.88	12.14	27.19	14.81	13.97	6.02	11.82	5.73	11.10	5.14

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表50・臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年別	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
95年	6.78	4.75	6.03	4.26	4.42	3.04	5.43	3.91	6.33	4.81	3.70	2.66	3.73	2.77	3.12	1.97
96年	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年別	口腔癌		非何杰金氏淋巴瘤		卵巢癌		食道癌		子宮頸及部位未 明示子宮癌		白血病		膀胱癌		子宮體癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	4.99	3.43	4.99	3.18	4.29	2.96	4.57	3.16	5.55	3.62	4.61	3.42	3.05	1.83	2.07	1.42
98年	5.66	3.78	4.55	2.85	4.82	3.36	4.93	3.23	5.11	3.31	4.05	2.92	3.06	1.72	1.70	1.15
99年	5.78	3.90	5.82	3.39	4.88	3.21	5.24	3.43	5.25	3.39	4.09	2.78	3.64	1.97	2.15	1.46
100年	5.81	3.86	5.65	3.30	4.76	3.25	4.36	2.71	5.42	3.23	4.25	2.95	2.96	1.57	2.49	1.67
101年	6.35	3.97	5.52	3.30	6.37	4.09	5.00	3.13	4.56	2.87	4.13	2.87	3.19	1.57	2.53	1.53
102年	7.57	4.88	5.75	3.24	6.11	3.79	4.52	2.76	5.75	3.25	4.22	2.89	3.13	1.59	2.80	1.73
103年	6.46	3.97	5.75	3.29	5.99	3.60	5.01	3.04	4.14	2.27	3.64	2.35	3.45	1.72	2.50	1.48
104年	6.77	4.24	5.66	3.09	5.47	3.40	4.92	2.88	4.97	2.73	3.99	2.24	4.33	1.95	2.98	1.76
105年	7.70	4.65	6.44	3.29	7.60	4.52	4.56	2.68	5.11	3.07	4.93	3.01	4.00	1.96	3.34	1.85
106年	6.17	3.51	4.95	2.51	6.34	3.59	4.42	2.47	5.41	3.00	4.28	2.57	4.31	1.88	4.20	2.35
107年	6.58	3.65	5.94	2.89	5.65	3.30	5.23	2.92	4.72	2.53	4.63	2.76	4.07	1.69	3.86	2.03
108年	7.53	4.15	7.00	3.21	6.19	3.37	5.65	3.00	4.46	2.42	5.31	2.96	3.76	1.56	4.68	2.47

表51・臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴癌		口腔癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
95年	210.37	146.09	47.46	31.25	40.43	30.73	24.67	17.02	18.73	11.98	10.07	5.68	8.74	6.09	11.47	9.00
96年	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管 和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸 和肛門癌		口腔癌		胃癌		前列腺 (攝護腺)癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	9.02	6.44	17.11	10.69	9.73	5.35	8.95	6.11
98年	211.03	134.11	47.09	28.32	35.47	24.25	24.57	15.19	10.75	7.48	16.04	9.38	11.22	5.88	10.82	6.77
99年	219.66	137.29	48.91	29.60	35.12	23.28	26.24	15.97	11.02	7.70	15.62	8.91	11.41	5.86	9.99	6.41
100年	216.55	132.95	50.34	30.02	37.34	24.12	25.60	15.83	10.40	7.26	15.05	8.67	10.40	5.12	8.74	5.44
101年	229.30	138.02	49.42	28.92	37.08	24.29	28.97	16.89	11.40	7.44	15.85	8.46	13.74	6.72	9.60	5.89
102年	221.64	130.87	47.37	26.87	37.67	23.37	27.80	16.17	13.59	9.10	14.68	7.83	12.04	5.87	9.55	5.59
103年	218.44	127.74	45.48	25.78	34.58	21.20	28.16	16.21	11.76	7.72	15.39	8.16	11.68	5.14	10.29	6.30
104年	220.37	127.13	45.46	25.93	33.11	19.76	27.86	15.56	12.43	8.20	14.28	7.92	12.58	5.97	10.81	6.52
105年	225.92	127.78	48.43	26.77	33.27	19.73	29.09	15.98	13.93	8.91	15.24	7.96	12.92	5.76	11.37	6.38
106年	215.76	117.67	47.06	25.64	33.99	19.44	27.07	14.86	11.36	6.86	14.00	6.91	13.77	6.11	11.82	6.62
107年	229.01	123.42	49.23	25.77	33.81	18.59	30.60	16.16	12.60	7.36	12.52	6.40	12.52	5.57	12.37	6.92
108年	232.57	121.16	48.55	24.65	33.24	18.07	31.97	16.38	14.29	8.37	14.37	7.08	13.97	6.02	12.63	6.35

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表51・臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
95年	6.79	4.87	7.49	5.21	4.68	3.22	4.22	2.91	3.90	2.30	5.07	4.16	2.58	2.02	1.56	0.99
96年	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99
年別	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		膀胱癌		白血病		腎臟癌		鼻咽癌		腦癌		膽囊和其他 膽道癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	8.40	5.90	5.96	3.65	4.47	2.62	5.96	4.28	2.04	1.37	4.79	3.61	2.04	1.86	2.43	1.62
98年	8.61	5.89	6.08	3.83	4.42	2.44	5.06	3.61	3.00	2.05	3.87	2.83	2.77	2.07	3.00	1.81
99年	9.12	6.19	8.09	4.61	4.99	2.63	5.15	3.38	3.09	1.93	4.44	2.99	3.25	2.40	2.38	1.64
100年	8.19	5.30	7.40	4.35	4.18	2.13	4.96	3.26	3.78	2.13	3.31	2.41	3.31	2.45	2.52	1.41
101年	9.92	6.46	6.71	4.13	4.29	1.98	5.54	3.72	2.89	1.69	4.37	2.97	3.44	2.54	3.12	1.97
102年	8.54	5.40	6.21	3.43	4.43	2.33	5.44	3.73	3.03	1.89	4.35	3.02	3.57	2.43	2.17	1.15
103年	9.59	6.04	7.12	4.12	5.11	2.60	4.25	2.91	2.48	1.44	4.80	3.28	2.32	1.78	3.48	2.09
104年	9.57	5.93	6.79	3.90	6.64	3.08	5.25	3.07	3.32	1.95	4.71	3.19	2.39	1.56	2.86	1.64
105年	8.36	5.13	7.58	4.09	5.88	3.11	5.42	3.38	2.79	1.52	3.48	2.28	2.71	2.10	2.79	1.49
106年	8.09	4.81	5.60	2.88	6.14	2.72	5.13	3.02	2.49	1.25	2.96	1.94	3.03	1.77	2.57	1.29
107年	10.02	5.87	7.51	4.01	5.56	2.53	5.09	3.20	5.56	2.53	3.44	2.27	3.21	2.14	2.27	1.08
108年	10.50	5.97	7.50	3.75	5.29	2.40	6.16	3.48	5.29	2.40	3.87	2.52	3.79	2.33	2.61	1.22

表52・臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
95年	128.65	92.46	22.48	15.97	16.08	11.23	15.56	11.37	13.70	9.88	9.16	6.31	6.03	4.26	4.69	3.44
96年	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管 和肺癌		女性乳房癌		結腸、直腸 和肛門癌		肝和肝內膽管癌		胰臟癌		胃癌		卵巢癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	130.86	87.54	24.78	16.27	16.87	11.66	17.31	11.20	15.76	10.79	5.77	3.76	6.95	4.47	4.29	2.96
98年	140.20	90.07	27.49	17.54	17.49	11.55	20.82	12.92	16.01	9.98	7.41	4.75	8.60	5.30	4.82	3.36
99年	137.69	85.62	27.60	16.36	19.68	12.87	17.68	10.57	14.87	9.27	6.29	3.86	8.14	4.62	4.88	3.21
100年	145.23	89.19	27.46	16.41	20.73	13.50	20.80	12.16	14.50	8.92	8.79	5.20	6.88	3.97	4.76	3.25
101年	147.98	88.40	27.87	16.31	17.59	10.88	20.05	11.11	16.07	9.11	7.89	4.57	9.12	5.32	6.37	4.09
102年	148.32	86.24	27.15	15.36	18.96	11.90	19.61	10.93	15.44	8.66	7.76	4.29	9.05	4.87	6.11	3.79
103年	148.33	83.07	28.82	15.72	20.62	12.73	21.55	11.34	15.62	8.23	8.85	4.80	8.06	4.26	5.99	3.60
104年	154.12	82.57	28.05	14.50	20.45	12.15	23.08	11.66	16.90	8.63	9.45	4.82	7.81	4.04	5.47	3.40
105年	163.31	85.94	31.54	15.98	21.45	12.52	21.24	10.44	17.19	8.52	8.03	4.09	8.10	4.05	7.60	4.52
106年	162.99	83.14	30.56	14.70	23.01	13.39	22.94	10.72	15.74	7.43	10.12	4.97	6.98	3.37	6.34	3.59
107年	165.35	81.96	30.32	14.52	22.96	12.92	22.46	10.47	17.66	8.01	10.73	4.87	9.15	4.27	5.65	3.30
108年	171.21	82.22	30.57	13.65	27.19	14.81	22.73	10.28	17.27	7.25	11.08	5.21	8.13	3.59	6.19	3.37

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表52・臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
95年	6.10	4.35	5.43	3.91	4.17	2.93	3.28	2.52	1.86	1.41	2.38	1.62	1.64	1.30	0.74	0.56
96年	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94
年別	子宮頸及部位未明示 子宮癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		子宮體癌		腦癌		膀胱癌		間皮和軟組織癌		腎臟癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	5.55	3.62	4.07	2.73	3.33	2.61	2.07	1.42	1.70	1.32	1.70	1.05	1.92	1.35	1.63	1.05
98年	5.11	3.31	3.11	1.96	3.11	2.22	1.70	1.15	1.56	1.21	1.78	1.03	1.19	0.81	1.85	1.14
99年	5.25	3.39	3.70	2.25	3.11	2.19	2.15	1.46	2.07	1.75	2.37	1.32	0.67	0.39	1.85	1.12
100年	5.42	3.23	4.03	2.32	3.59	2.67	2.49	1.67	2.05	1.50	1.83	1.03	1.46	1.02	1.98	1.11
101年	4.56	2.87	4.42	2.61	2.82	2.11	2.53	1.53	2.03	1.84	2.17	1.16	2.10	1.72	1.59	0.90
102年	5.75	3.25	5.32	3.09	3.09	2.15	2.80	1.73	2.08	1.26	1.94	0.96	1.65	0.97	1.65	0.92
103年	4.14	2.27	4.49	2.57	3.07	1.81	2.50	1.48	1.78	1.51	1.93	0.95	2.35	1.53	1.78	1.00
104年	4.97	2.73	4.62	2.40	2.84	1.50	2.98	1.76	1.99	1.34	2.20	0.98	1.42	0.77	2.13	1.08
105年	5.11	3.07	5.40	2.59	4.48	2.69	3.34	1.85	1.92	1.33	2.27	1.02	1.85	1.05	2.34	1.20
106年	5.41	3.00	4.35	2.20	3.49	2.23	4.20	2.35	2.49	1.56	2.64	1.17	2.64	1.58	2.21	1.05
107年	4.72	2.53	4.51	1.96	4.22	2.39	3.86	2.03	2.86	1.97	2.72	1.03	2.43	1.33	2.36	1.06
108年	4.46	2.42	6.55	2.75	4.53	2.55	4.68	2.47	2.81	1.98	2.37	0.89	3.02	1.68	1.15	0.49

肆、歷年死因統計

二、行政區別死因統計

表53-1 · 臺北市松山區歷年主要死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		797	375.45	416.72		960	466.52	338.51		1,024	494.61	338.43		963	461.29	311.91		1,011	480.96	304.56
08-14	惡性腫瘤	1	224	105.52	113.20	1	304	147.73	109.05	1	313	151.18	108.08	1	345	165.26	112.76	1	332	157.94	103.23
25-27-28*	心臟疾病	3	91	42.87	49.51	2	101	49.08	33.77	2	134	64.72	42.17	2	104	49.82	31.91	2	108	51.38	31.42
29	腦血管疾病	2	103	48.52	52.72	3	81	39.36	27.79	3	91	43.95	28.56	3	73	34.97	21.58	3	86	40.91	24.13
181	糖尿病	4	42	19.79	21.41	4	62	30.13	20.77	4	67	32.36	21.59	4	65	31.14	18.86	4	79	37.58	22.53
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.25	14.34	7	27	13.12	13.86	7	33	15.94	10.849	8	26	12.45	7.48	5	41	19.50	10.66
321	肺炎	6	27	12.72	14.99	5	42	20.41	12.21	5	41	19.80	12.18	7	28	13.41	7.73	6	37	17.60	8.94
E54	自殺	10	17	8.01	7.75	9	18	8.75	7.03	9	20	9.66	8.07	6	30	14.37	12.01	7	29	13.80	11.28
E47-E53	事故傷害	5	30	14.13	14.38	6	38	18.47	12.94	6	35	16.91	14.15	5	34	16.29	14.98	8	26	12.37	12.27
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	9.89	10.64	8	20	9.72	7.26	8	22	10.63	7.03	8	26	12.45	8.54	9	17	8.09	5.56
038	敗血症	12	7	3.30	3.52	12	9	4.37	3.10	11	10	4.83	3.01	15	3	1.44	0.92	10	14	6.66	3.41
	其他		209	98.45	114.26		258	125.38	90.73		258	124.62	82.74		229	109.69	75.15		242	115.13	71.13

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-1・臺北市松山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,057	502.04	305.11		1,218	582.24	307.51		1,189	565.04	287.52		1,239	588.25	288.15		1,237	587.91	282.34
C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34	90.74	1	386	184.52	109.51	1	369	175.36	96.84	1	389	184.69	101.25	1	380	180.60	94.62
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	140	66.50	37.91	2	165	78.88	36.65	2	160	76.04	34.94	2	139	65.99	32.19	2	195	92.68	43.14
J12-J18	肺炎	4	63	29.92	17.22	4	73	34.90	14.29	4	53	25.19	10.11	5	68	32.29	13.00	4	70	33.27	14.19
I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32	24.08	3	87	41.59	20.06	3	92	43.72	20.30	3	95	45.10	20.54	3	91	43.25	18.27
E10-E14	糖尿病	5	49	23.27	13.53	5	50	23.90	12.69	5	47	22.34	11.00	4	70	33.23	15.94	5	62	29.47	13.07
A40-A41	敗血症	6	46	21.85	12.07	6	42	20.08	9.57	6	38	18.06	8.06	9	34	16.14	6.31	10	25	11.88	4.78
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	27	12.82	6.32	9	29	13.86	6.22	8	33	15.68	5.89	8	39	18.52	7.34	8	35	16.63	5.68
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	31	14.72	8.71	7	36	17.21	8.52	10	29	13.78	6.51	6	50	23.74	11.25	7	39	18.54	7.65
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	22	10.45	8.37	10	21	10.04	8.31	9	32	15.21	11.52	10	25	11.87	6.10	9	26	12.36	7.73
I10-I15	高血壓性疾病	7	37	17.57	9.93	8	32	15.30	7.00	7	37	17.58	6.60	7	46	21.84	8.35	6	43	20.44	8.33
	其他		249	118.27	76.23		297	141.98	74.69		299	142.09	75.75		284	134.84	65.88		271	128.80	64.88

表53-1 · 臺北市松山區歷年主要死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,314	625.44	292.93		1,357	649.22	294.60		1,315	633.26	277.91		1,351	654.73	281.89		1,296	632.36	263.45
C00-C97	惡性腫瘤	1	386	183.73	94.55	1	414	198.07	103.45	1	396	190.70	93.31	1	408	197.73	94.36	1	360	175.65	79.85
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	199	94.72	41.30	2	183	87.55	38.28	2	193	92.94	37.14	2	198	95.96	35.58	2	220	107.34	39.20
J12-J18	肺炎	3	101	48.07	17.06	3	108	51.67	17.81	3	115	55.38	18.76	3	147	71.24	22.28	3	140	68.31	22.04
I60-I69	腦血管疾病	4	92	43.79	17.52	4	93	44.49	18.64	4	82	39.49	16.03	4	95	46.04	19.58	4	70	34.16	12.91
E10-E14	糖尿病	6	48	22.85	10.35	5	55	26.31	9.98	5	52	25.04	10.70	5	52	25.20	8.33	5	52	25.37	9.71
A40-A41	敗血症	8	39	18.56	6.54	6	52	24.88	8.71	6	41	19.74	7.25	10	21	10.18	3.92	6	34	16.59	5.55
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	5	52	24.75	8.89	7	43	20.57	7.57	8	36	17.34	5.59	7	30	14.54	4.88	7	33	16.10	5.29
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	10	26	12.38	5.14	8	36	17.22	6.87	7	40	19.26	7.41	6	33	15.99	5.48	8	31	15.13	5.44
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	22	10.47	7.57	9	35	16.74	12.31	11	24	11.56	6.83	9	22	10.66	6.83	8	31	15.13	10.40
I10-I15	高血壓性疾病	7	40	19.04	6.75	11	27	12.92	4.48	10	29	13.97	4.80	11	20	9.69	3.63	10	28	13.66	5.00
	其他		309	147.08	77.26		311	148.79	66.50		307	147.84	70.10		325	157.50	77.03		297	144.92	68.07

表53-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																						
		84年				93年				94年				95年				96年						
順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
01-56	所有死亡原因	1,176	479.31	492.27	1,331	569.90	390.54	1,366	589.70	386.92	1,271	549.91	341.85	1,363	592.17	355.26								
08-14	惡性腫瘤	1	303	123.50	121.50	1	373	159.71	112.37	1	430	185.63	126.68	1	401	173.50	113.16	1	427	185.51	116.31			
25-27-28*	心臟疾病	2	121	49.32	50.71	2	178	76.22	47.58	3	159	68.64	40.03	2	134	57.98	33.71	2	167	72.55	41.68			
29	腦血管疾病	3	120	48.91	48.82	3	115	49.24	32.06	2	163	70.37	43.54	3	105	45.43	27.28	3	133	57.78	30.89			
181	糖尿病	5	59	24.05	23.40	4	74	31.69	21.30	4	80	34.54	21.74	3	105	45.43	28.66	4	76	33.02	19.69			
321	肺炎	6	48	19.56	20.44	6	52	22.27	13.10	5	51	22.02	12.46	5	61	26.39	13.52	5	65	28.24	14.85			
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	33	13.45	13.33	5	59	25.26	16.94	6	50	21.58	13.21	6	45	19.47	11.14	6	40	17.38	10.28			
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.67	14.26	9	32	13.70	10.13	8	31	13.38	19.42	9	23	9.95	7.05	7	29	12.60	8.38			
E54	自殺	11	16	6.52	5.99	8	35	14.99	11.81	7	45	19.43	15.35	7	40	17.31	13.73	8	27	11.73	8.86			
E47-E53	事故傷害	4	81	33.01	31.34	7	39	16.70	12.87	9	27	11.66	9.75	8	28	12.11	8.83	9	24	10.43	7.17			
26	高血壓性疾病	8	34	13.86	14.56	10	21	8.99	5.56	10	18	7.77	5.02	10	17	7.36	3.49	10	15	6.52	3.79			
	其他		325	132.46	147.92		353	151.15	106.82		312	134.69	79.72		312	134.99	81.28		360	156.40	93.36			

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77	350.41		1,382	612.00	322.46		1,513	666.11	345.11		1,425	624.68	320.26		1,475	643.89	316.23
C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88	110.89	1	441	195.29	114.01	1	455	200.32	109.20	1	447	195.95	107.17	1	433	189.02	104.37
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	181	79.28	43.10	2	147	65.10	31.01	2	184	81.01	39.29	2	172	75.40	34.24	2	191	83.38	39.14
J12-J18	肺炎	4	87	38.10	19.25	4	87	38.53	17.35	4	94	41.38	17.44	4	76	33.32	13.20	3	127	55.44	20.93
I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37	27.10	3	93	41.18	20.10	3	99	43.59	21.34	3	103	45.15	19.20	4	101	44.09	20.21
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	47	20.59	11.95	9	36	15.94	7.57	8	52	22.89	11.17	6	49	21.48	10.04	6	62	27.07	12.10
E10-E14	糖尿病	5	51	22.34	12.74	7	49	21.70	11.33	5	63	27.74	15.04	5	70	30.69	14.99	5	69	30.12	15.06
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	45	19.71	9.97	6	57	25.24	10.95	6	59	25.98	11.23	6	49	21.48	8.64	7	54	23.57	8.62
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	34	14.89	11.03	11	26	11.51	7.08	10	33	14.53	10.92	9	33	14.47	9.82	9	39	17.02	12.21
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	11	33	14.45	10.52	13	16	7.09	5.45	10	33	14.53	11.73	12	27	11.84	10.04	12	22	9.60	6.96
A40-A41	敗血症	6	47	20.59	10.86	5	66	29.23	13.37	7	54	23.77	10.42	6	49	21.48	9.39	8	48	20.95	9.08
	其他		305	133.59	83.00		364	161.19	84.24		387	170.38	87.33		350	153.43	83.53		329	143.62	67.55

表53-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因（續2完）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,476	643.32	319.90		1,635	715.48	333.55		1,567	690.95	308.54		1,592	708.88	308.17		1,618	729.77	316.75
C00-C97	惡性腫瘤	1	436	190.03	102.25	1	488	213.55	109.72	1	445	196.22	95.89	1	464	206.61	98.29	1	497	224.16	105.50
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	176	76.71	34.50	2	224	98.02	44.76	2	237	104.50	43.78	2	266	118.44	47.69	2	249	112.31	44.28
J12-J18	肺炎	3	111	48.38	19.46	3	125	54.70	21.82	3	126	55.56	19.90	3	142	63.23	20.95	3	157	70.81	22.33
I60-I69	腦血管疾病	4	93	40.53	19.12	4	90	39.38	17.52	4	110	48.50	20.81	4	99	44.08	16.73	4	104	46.91	19.60
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	50	21.79	9.19	6	60	26.26	11.10	7	48	21.17	8.53	5	71	31.61	12.24	5	65	29.32	10.73
E10-E14	糖尿病	5	68	29.64	13.39	5	72	31.51	13.81	5	74	32.63	14.03	6	53	23.60	9.64	6	60	27.06	11.79
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	39	17.00	7.36	8	54	23.63	8.83	6	53	23.37	7.94	8	42	18.70	6.17	7	42	18.94	7.08
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	39	17.00	10.13	12	28	12.25	8.44	10	34	14.99	10.24	9	31	13.80	8.34	8	34	15.34	8.84
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	33	14.38	9.08	15	17	7.44	4.31	12	31	13.67	9.15	11	28	12.47	7.36	9	32	14.43	10.92
A40-A41	敗血症	10	36	15.69	6.30	7	57	24.94	8.98	11	32	14.11	5.03	7	43	19.15	7.60	10	28	12.63	3.99
	其他		395	172.16	89.12		420	183.79	84.27		377	166.23	73.25		353	157.18	73.17		350	157.86	71.69

表53-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,416	424.70	386.23		1,584	506.42	319.61		1,638	524.39	311.95		1,546	493.66	282.16		1,598	508.03	276.93
08-14	惡性腫瘤	1	410	122.97	110.66	1	527	168.49	111.30	1	501	160.39	99.34	1	495	158.06	94.53	1	473	150.37	90.00
25-27-28*	心臟疾病	2	184	55.19	49.75	2	210	67.14	37.16	2	225	72.03	38.67	2	174	55.56	29.16	2	194	61.68	29.86
29	腦血管疾病	3	169	50.69	44.05	3	126	40.28	24.35	3	142	45.46	25.58	3	121	38.64	19.87	3	145	46.10	21.44
181	糖尿病	5	74	22.19	19.74	4	107	34.21	20.70	4	106	33.94	18.87	4	105	33.53	17.42	4	118	37.51	20.00
321	肺炎	6	49	14.70	13.12	6	51	16.31	8.49	5	89	28.49	13.64	6	46	14.69	6.57	5	78	24.80	10.89
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	45	13.50	12.67	5	63	20.14	11.99	6	78	24.97	13.24	5	58	18.52	10.25	6	61	19.39	9.48
E47-E53	事故傷害	4	80	23.99	22.73	7	43	13.75	12.35	7	44	14.09	11.96	8	37	11.81	10.00	7	37	11.76	8.98
E54	自殺	9	24	7.20	6.30	8	35	11.19	8.30	8	40	12.81	9.30	7	40	12.77	10.22	8	36	11.45	8.61
038	敗血症	12	10	3.00	2.79	12	11	3.52	2.03	14	6	1.92	0.86	11	22	7.02	3.41	9	25	7.95	3.58
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.60	5.76	9	25	7.99	5.42	9	30	9.60	6.77	8	37	11.81	7.33	10	22	6.99	3.78
	其他		349	104.68	98.66		386	123.41	77.52		377	120.69	73.73		411	131.24	73.39		409	130.03	70.31

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51	288.84		1,816	580.74	275.56		1,818	579.65	270.29		1,846	589.03	265.06		2,054	655.12	289.90
C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36	90.51	1	544	173.97	93.07	1	580	184.93	94.20	1	582	185.71	94.86	1	593	189.14	93.05
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	237	75.39	36.28	2	233	74.51	31.26	2	210	66.96	29.84	2	269	85.83	35.58	2	317	101.11	41.22
J12-J18	肺炎	4	92	29.26	11.80	4	100	31.98	11.50	4	96	30.61	10.66	4	89	28.40	8.98	4	120	38.27	13.38
I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67	20.32	3	129	41.25	17.14	3	153	48.78	20.61	3	136	43.40	16.86	3	148	47.20	19.41
E10-E14	糖尿病	5	74	23.54	12.29	5	79	25.26	10.76	6	70	22.32	9.47	5	87	27.76	11.66	5	96	30.62	12.21
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	55	17.49	8.53	9	51	16.31	6.38	9	60	19.13	7.70	10	43	13.72	5.16	8	58	18.50	6.53
F01-F03	血管性及未明示 之癡呆症	17	12	3.82	1.41	15	15	4.80	1.47	16	14	4.46	1.41	11	24	7.66	2.48	12	28	8.93	2.74
I10-I15	高血壓性疾病	9	45	14.31	6.48	10	43	13.75	6.14	8	67	21.36	7.81	8	46	14.68	5.13	7	67	21.37	7.27
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	63	20.04	8.79	6	72	23.02	8.60	7	68	21.68	7.68	6	72	22.97	8.55	6	85	27.11	9.44
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	45	14.31	10.65	8	55	17.59	10.72	10	46	14.67	8.01	9	44	14.04	9.85	9	44	14.03	9.46
	其他		460	146.32	81.78		495	158.30	78.52		454	144.75	72.90		454	144.87	65.95		498	158.84	75.19

表53-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																						
		104年				105年				106年				107年				108年						
順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因	1,962	626.09	259.39	2,090	669.27	275.35	2,060	662.94	263.06	2,092	676.13	266.08	2,139	693.95	269.04								
C00-C97	惡性腫瘤	1	565	180.29	83.82	1	616	197.26	91.83	1	601	193.41	87.90	1	580	187.46	84.68	1	656	212.82	96.05			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	275	87.75	32.15	2	323	103.43	37.90	2	337	108.45	39.88	2	388	125.40	42.38	2	339	109.98	37.48			
J12-J18	肺炎	4	128	40.85	13.41	3	128	40.99	12.73	3	157	50.52	15.29	3	170	54.94	15.72	3	215	69.75	20.03			
I60-I69	腦血管疾病	3	139	44.36	16.37	4	120	38.43	14.57	4	144	46.34	16.19	4	147	47.51	15.87	4	129	41.85	14.33			
E10-E14	糖尿病	5	80	25.53	9.71	5	90	28.82	11.05	5	81	26.07	9.27	5	65	21.01	7.11	5	83	26.93	9.49			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	72	22.98	8.81	6	78	24.98	8.92	6	64	20.60	6.77	7	54	17.45	6.51	6	66	21.41	7.26			
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	11	35	11.17	3.09	12	35	11.21	2.91	11	38	12.23	3.07	12	24	7.76	1.91	7	53	17.19	4.33			
I10-I15	高血壓性疾病	8	56	17.87	6.33	12	35	11.21	3.57	7	52	16.73	6.21	11	34	10.99	3.62	8	51	16.55	5.86			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	71	22.66	7.81	7	59	18.89	6.29	9	46	14.80	4.22	6	63	20.36	6.06	9	45	14.60	3.96			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	45	14.36	8.07	9	47	15.05	8.34	9	46	14.80	7.13	9	49	15.84	8.76	10	38	12.33	7.38			
	其他		496	158.28	69.82		559	179.00	77.23		494	158.98	67.13		518	167.42	73.46		464	150.53	62.88			

表53-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率
01-56	所有死亡原因		987	440.48	464.15		1,123	517.67	383.52		1,178	543.14	389.31		1,106	506.77	348.65		1,230	561.56	369.71
08-14	惡性腫瘤	1	289	128.97	131.63	1	370	170.56	126.90	1	374	172.44	123.37	1	351	160.83	110.34	1	384	175.32	114.11
25-27-28*	心臟疾病	2	124	55.34	58.98	2	154	70.99	50.46	2	146	67.32	45.60	2	138	63.23	42.24	2	147	67.11	42.14
29	腦血管疾病	3	106	47.31	50.82	3	83	38.26	27.41	3	102	47.03	31.46	3	105	48.11	30.71	3	109	49.76	32.01
181	糖尿病	5	47	20.98	21.96	4	71	32.73	23.36	4	91	41.96	28.41	4	71	32.53	21.35	4	86	39.26	24.71
321	肺炎	7	32	14.28	16.79	5	35	16.13	11.39	5	49	22.59	15.23	6	48	21.99	13.75	5	67	30.59	19.15
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	25	11.16	12.71	7	31	14.29	10.64	7	36	16.60	11.06	7	27	12.37	8.36	6	44	20.09	12.40
E47-E53	事故傷害	4	64	28.56	27.70	9	27	12.45	10.51	8	33	15.22	13.40	8	23	10.54	10.43	7	31	14.15	12.47
E54	自殺	10	20	8.93	7.81	5	35	16.13	12.80	6	44	20.29	17.34	5	49	22.45	18.01	8	29	13.24	10.66
347	慢性肝病及肝硬化	6	37	16.51	16.04	8	30	13.83	10.25	9	27	12.45	9.08	9	22	10.08	7.12	9	23	10.50	7.34
038	敗血症	15	4	1.79	2.11	12	5	2.30	1.58	10	15	6.92	4.44	11	11	5.04	3.61	10	21	9.59	6.23
	其他		239	106.66	117.60		282	129.99	98.22		261	120.34	89.92		261	119.59	82.73		289	131.94	88.49

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,264	578.06	365.58		1,341	603.74	344.73		1,412	626.49	346.62		1,350	592.87	320.24		1,431	623.19	331.74
C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70	114.39	1	418	188.19	111.16	1	430	190.79	112.43	1	412	180.94	103.00	1	427	185.96	103.84
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	167	76.37	45.89	2	156	70.23	36.66	2	153	67.89	36.01	2	173	75.98	40.31	2	208	90.58	47.38
J12-J18	肺炎	4	70	32.01	18.02	4	73	32.87	15.31	4	78	34.61	15.94	4	76	33.38	15.08	4	74	32.23	14.80
I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22	31.21	3	101	45.47	23.70	3	96	42.59	21.64	3	88	38.65	19.42	3	101	43.98	22.72
E10-E14	糖尿病	5	69	31.56	19.49	5	66	29.71	16.69	5	75	33.28	18.00	5	65	28.55	15.01	5	68	29.61	15.11
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	36	16.46	9.55	9	35	15.76	8.84	6	59	26.18	14.46	10	33	14.49	7.41	7	47	20.47	9.35
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	18	8.23	6.75	11	31	13.96	9.25	10	38	16.86	11.08	7	52	22.84	14.73	12	27	11.76	7.11
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	30	13.72	7.78	7	37	16.66	8.08	9	46	20.41	9.97	7	52	22.84	10.29	6	53	23.08	10.20
A40-A41	敗血症	7	37	16.92	9.68	6	61	27.46	14.48	8	51	22.63	11.03	9	36	15.81	8.36	9	37	16.11	7.33
I10-I15	高血壓性疾病	11	25	11.43	6.27	7	37	16.66	8.58	7	54	23.96	11.71	6	57	25.03	12.51	8	42	18.29	8.27
	其他		318	145.43	96.55		326	146.77	91.98		332	147.31	84.35		306	134.38	74.12		347	151.12	85.63

表53-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,416	613.19	316.50		1,527	660.19	318.27		1,542	667.59	322.93		1,595	693.23	321.10		1,563	684.26	301.12
C00-C97	惡性腫瘤	1	424	183.61	101.41	1	486	210.12	110.82	1	467	202.18	103.96	1	464	201.67	100.03	1	464	203.13	94.85
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	179	77.52	39.13	2	220	95.12	43.09	2	250	108.24	46.02	2	265	115.18	49.75	2	244	106.82	43.37
J12-J18	肺炎	4	83	35.94	15.37	3	119	51.45	21.68	3	131	56.72	22.13	3	148	64.32	25.02	3	184	80.55	29.61
I60-I69	腦血管疾病	3	94	40.71	19.04	4	90	38.91	16.02	4	106	45.89	21.22	4	90	39.12	17.20	4	87	38.09	15.29
E10-E14	糖尿病	5	58	25.12	11.55	5	68	29.40	12.97	5	52	22.51	9.71	6	63	27.38	12.79	5	51	22.33	9.83
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	50	21.65	9.96	7	43	18.59	8.27	6	49	21.21	9.25	5	70	30.42	12.67	6	49	21.45	8.79
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	42	18.19	13.30	9	38	16.43	9.16	8	42	18.18	12.50	7	49	21.30	12.47	7	47	20.58	12.55
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	49	21.22	8.48	8	39	16.86	7.03	6	49	21.21	8.13	9	37	16.08	6.06	8	36	15.76	5.43
A40-A41	敗血症	10	36	15.59	6.57	6	45	19.46	8.72	9	41	17.75	7.26	9	37	16.08	6.61	9	34	14.88	5.63
I10-I15	高血壓性疾病	9	39	16.89	7.40	11	33	14.27	6.77	10	32	13.85	6.45	8	38	16.52	7.19	10	32	14.01	5.09
	其他		362	156.76	84.29		346	149.59	73.74		323	139.84	76.30		334	145.17	71.30		335	146.66	70.69

表53-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		786	454.91	404.71		858	539.48	342.76		892	564.88	349.02		843	533.65	316.60		874	549.53	305.47
08-14	惡性腫瘤	1	244	141.22	125.31	1	245	154.05	101.80	1	282	178.58	117.47	1	267	169.02	105.69	1	258	162.22	96.45
25-27-28*	心臟疾病	3	77	44.57	38.37	2	113	71.05	41.02	2	102	64.59	37.30	2	80	50.64	26.31	2	86	54.07	27.11
29	腦血管疾病	2	86	49.77	43.48	3	89	55.96	32.15	3	88	55.73	34.22	3	62	39.25	21.31	3	75	47.16	23.89
181	糖尿病	4	39	22.57	19.47	4	59	37.10	23.32	4	58	36.73	21.53	4	53	33.55	18.87	4	58	36.47	19.78
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	20	11.58	10.08	5	34	21.38	12.02	7	23	14.57	7.59	6	31	19.62	11.00	5	52	32.70	16.17
321	肺炎	7	27	15.63	14.22	6	24	15.09	7.71	5	30	19.00	10.17	5	51	32.28	15.33	6	38	23.89	11.51
E47-E53	事故傷害	5	32	18.52	17.29	8	21	13.20	9.44	6	24	15.20	13.39	8	25	15.83	13.12	7	25	15.72	12.26
E54	自殺	11	8	4.63	4.35	7	22	13.83	11.94	8	19	12.03	9.39	9	24	15.19	14.32	8	22	13.83	11.16
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	15.63	14.81	8	21	13.20	9.72	9	18	11.40	7.39	7	26	16.46	8.94	9	17	10.69	7.29
26	高血壓性疾病	6	30	17.36	15.38	10	11	6.92	3.65	10	10	6.33	3.06	10	14	8.86	4.73	10	10	6.29	2.79
	其他		196	113.44	101.95		219	137.70	89.99		238	150.72	87.49		210	132.94	76.99		233	146.50	77.06

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		957	600.33	331.54		957	596.29	307.13		999	617.42	308.90		892	548.43	264.45		1,093	669.47	321.84
C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07	111.73	1	263	163.87	93.15	1	305	188.50	106.54	1	248	152.48	79.50	1	291	178.24	95.13
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	127	79.67	42.36	2	118	73.52	35.53	2	129	79.73	35.84	2	121	74.39	35.70	2	179	109.64	49.31
J12-J18	肺炎	4	70	43.91	19.59	4	52	32.40	13.63	4	71	43.88	17.63	3	76	46.73	16.61	4	78	47.78	17.15
I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54	21.19	3	54	33.65	16.20	3	73	45.12	19.35	4	57	35.05	15.18	3	94	57.58	25.41
E10-E14	糖尿病	7	30	18.82	10.26	5	38	23.68	12.14	7	39	24.10	10.72	5	47	28.90	13.51	5	45	27.56	12.75
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	35	21.96	10.66	6	31	19.32	8.56	8	32	19.78	9.49	6	31	19.06	8.02	6	33	20.21	8.65
I10-I15	高血壓性疾病	10	19	11.92	5.90	10	27	16.82	7.85	5	42	25.96	11.46	9	23	14.14	6.39	10	28	17.15	6.58
F01-F03	血管性及未明示 之癱瘓症	23	2	1.25	0.48	14	13	8.10	2.99	14	9	5.56	1.81	15	9	5.53	1.68	13	16	9.80	3.21
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	22	13.80	6.08	8	30	18.69	7.82	8	32	19.78	7.95	6	31	19.06	8.15	6	33	20.21	8.31
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	10	19	11.92	9.71	11	20	12.46	9.51	16	8	4.94	4.39	11	19	11.68	9.74	14	11	6.74	5.36
	其他		259	162.47	93.58		311	193.78	99.75		259	160.07	83.72		230	141.41	69.97		285	174.56	89.98

表53-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,097	673.29	314.63		1,088	673.94	307.29		1,052	657.48	285.57		1,043	654.72	291.54		1,068	673.79	283.86
C00-C97	惡性腫瘤	1	317	194.56	100.26	1	314	194.50	102.13	1	295	184.37	91.80	1	298	187.06	92.71	1	301	189.90	91.27
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	148	90.84	39.66	2	151	93.53	37.73	2	167	104.37	41.79	2	157	98.55	37.03	2	156	98.42	38.30
J12-J18	肺炎	3	77	47.26	17.86	4	67	41.50	14.43	3	77	48.12	16.72	3	91	57.12	19.50	3	135	85.17	27.42
I60-I69	腦血管疾病	4	67	41.12	18.43	3	79	48.93	19.99	3	77	48.12	19.73	4	70	43.94	16.30	4	79	49.84	20.23
E10-E14	糖尿病	5	51	31.30	14.19	5	54	33.45	14.41	5	46	28.75	12.03	8	26	16.32	6.97	5	33	20.82	8.32
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	9	29	17.80	7.34	7	36	22.30	8.62	6	41	25.62	9.50	5	44	27.62	10.16	6	30	18.93	6.80
I10-I15	高血壓性疾病	8	31	19.03	6.93	12	18	11.15	5.51	9	25	15.62	5.97	7	29	18.20	7.70	7	28	17.66	6.36
F01-F03	血管性及未明示 之癱瘓症	11	25	15.34	4.48	10	27	16.72	4.67	10	20	12.50	4.28	12	15	9.42	2.30	8	27	17.03	4.80
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	48	29.46	10.52	6	40	24.78	9.15	7	38	23.75	7.41	6	32	20.09	6.66	8	27	17.03	4.85
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	14	19	11.66	9.43	14	13	8.05	5.89	11	18	11.25	9.18	10	23	14.44	13.73	10	23	14.51	12.10
	其他		285	174.92	85.53		289	179.01	84.77		248	154.99	67.18		258	161.95	78.49		229	144.47	63.41

表53-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		733	536.47	552.72		766	593.91	430.17		867	679.14	490.25		802	632.16	431.17		810	640.19	415.86
08-14	惡性腫瘤	1	230	168.33	172.79	1	205	158.94	119.59	1	228	178.60	130.70	1	273	215.19	148.40	1	259	204.70	136.29
25-27-28*	心臟疾病	2	73	53.43	55.15	2	89	69.01	47.71	2	95	74.42	46.89	2	96	75.67	49.95	2	94	74.29	48.80
29	腦血管疾病	3	72	52.70	53.79	3	73	56.60	39.88	3	89	69.72	50.44	4	55	43.35	27.79	3	68	53.74	34.48
181	糖尿病	4	48	35.13	36.22	4	60	46.52	33.65	4	63	49.35	34.45	3	56	44.14	29.38	4	50	39.52	24.78
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	30	21.96	22.93	5	33	25.59	18.87	5	42	32.90	23.19	6	25	19.71	13.26	5	35	27.66	17.33
321	肺炎	8	22	16.10	16.94	6	32	24.81	16.63	7	25	19.58	12.88	5	29	22.86	14.12	6	29	22.92	13.40
E47-E53	事故傷害	5	47	34.40	33.69	8	20	15.51	11.96	8	24	18.80	17.98	8	20	15.76	13.61	7	24	18.97	14.65
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.30	18.40	7	21	16.28	12.64	9	22	17.23	12.65	10	10	7.88	5.50	7	24	18.97	12.70
E54	自殺	11	10	7.32	7.33	9	19	14.73	12.08	6	30	23.50	19.84	7	22	17.34	14.17	9	18	14.23	11.77
038	敗血症	10	12	8.78	9.53	12	6	4.65	3.16	10	18	14.10	8.75	9	11	8.67	5.50	10	13	10.27	5.58
	其他		164	120.03	125.95		208	161.27	114.00		231	180.95	132.47		205	161.59	109.48		196	154.91	96.08

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年								100年								101年								102年							
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率		
A00-Y98	所有死亡原因		893	712.17	452.82		859	683.81	392.95		926	725.00	414.81		889	687.47	383.25		843	646.49	350.58												
C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93	139.52	1	244	194.24	117.42	1	288	225.48	133.64	1	282	218.07	124.15	1	236	180.99	102.39												
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	118	94.11	58.79	2	98	78.01	43.23	2	142	111.18	60.86	2	125	96.66	53.92	2	139	106.60	54.84												
J12-J18	肺炎	4	61	48.65	27.90	4	56	44.58	23.36	5	40	31.32	14.99	5	47	36.35	18.59	4	53	40.65	19.56												
I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84	30.62	3	61	48.56	25.54	3	65	50.89	27.40	3	59	45.63	23.66	3	55	42.18	22.03												
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	23	18.34	11.73	7	26	20.70	11.24	8	25	19.57	10.32	8	25	19.33	9.79	7	25	19.17	9.23												
E10-E14	糖尿病	5	55	43.86	28.02	5	48	38.21	21.30	4	41	32.10	17.49	4	49	37.89	20.13	5	45	34.51	18.52												
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	26	20.74	11.40	8	25	19.90	10.53	7	30	23.49	11.44	6	32	24.75	11.79	6	41	31.44	14.75												
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	16.75	11.45	10	20	15.92	10.46	10	21	16.44	12.21	10	16	12.37	10.28	9	20	15.34	8.96												
I10-I15	高血壓性疾病	9	21	16.75	10.00	9	22	17.51	8.53	12	15	11.74	6.33	9	20	15.47	8.31	8	23	17.64	8.04												
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	12	16	12.76	8.80	11	17	13.53	7.95	10	21	16.44	10.72	11	15	11.60	6.81	13	13	9.97	6.20												
	其他		220	175.45	114.59		242	192.64	113.39		238	186.34	109.41		219	169.35	95.82		193	148.01	86.06												

表53-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		986	752.95	400.99		963	737.93	393.81		998	769.62	382.60		987	768.38	375.54		1,011	797.10	369.92
C00-C97	惡性腫瘤	1	300	229.09	127.23	1	270	206.90	111.16	1	298	229.81	120.04	1	303	235.89	121.22	1	304	239.68	117.10
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	151	115.31	60.97	2	150	114.94	59.19	2	155	119.53	56.46	2	169	131.57	59.36	2	156	123.00	51.40
J12-J18	肺炎	4	57	43.53	21.09	4	68	52.11	25.44	3	88	67.86	29.21	3	80	62.28	24.92	3	107	84.36	32.93
I60-I69	腦血管疾病	3	75	57.27	27.91	3	72	55.17	27.93	4	68	52.44	25.41	4	55	42.82	20.66	4	66	52.04	22.18
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	5	43	32.84	16.42	6	30	22.99	10.70	5	43	33.16	15.35	5	35	27.25	11.70	5	37	29.17	11.45
E10-E14	糖尿病	5	43	32.84	16.08	5	43	32.95	16.85	7	33	25.45	12.42	7	31	24.13	10.27	6	35	27.60	13.33
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	29	22.15	9.40	6	30	22.99	10.29	6	34	26.22	11.38	8	26	20.24	10.07	7	31	24.44	9.44
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	25	19.09	11.90	8	27	20.69	13.33	8	24	18.51	14.79	5	35	27.25	17.60	8	28	22.08	12.93
I10-I15	高血壓性疾病	11	18	13.75	6.03	10	21	16.09	7.66	14	10	7.71	3.38	10	20	15.57	6.49	9	17	13.40	5.75
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	10	21	16.04	8.80	12	17	13.03	7.66	13	11	8.48	4.71	11	19	14.79	8.49	9	17	13.40	7.35
	其他		224	171.06	95.16		235	180.08	103.61		234	180.45	89.44		214	134.33	84.75		213	167.94	86.07

表53-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,094	506.93	512.04		1,391	699.50	473.22		1,454	741.48	472.87		1,428	733.02	451.74		1,493	770.88	449.83
08-14	惡性腫瘤	1	270	125.11	121.67	1	414	208.19	142.34	1	431	219.79	142.95	1	427	219.19	140.31	1	458	236.48	142.80
25-27-28*	心臟疾病	2	136	63.02	66.08	2	160	80.46	52.18	2	142	72.41	43.14	2	149	76.48	44.31	2	160	82.61	48.02
29	腦血管疾病	3	127	58.85	59.62	3	125	62.86	39.07	3	139	70.88	43.19	3	138	70.84	41.15	3	126	65.06	37.54
181	糖尿病	5	57	26.41	26.00	4	92	46.26	30.19	4	113	57.63	36.08	4	119	61.08	36.71	4	109	56.28	31.57
321	肺炎	8	30	13.90	15.91	8	43	21.62	12.59	5	60	30.60	16.82	6	49	25.15	12.86	5	87	44.92	21.89
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	35	16.22	16.24	6	54	27.16	17.23	7	45	22.95	13.06	5	58	29.77	17.75	6	63	32.53	16.74
347	慢性肝病及肝硬化	6	43	19.93	19.40	7	53	26.65	20.28	9	28	14.28	9.28	8	35	17.97	12.60	7	42	21.69	13.72
E54	自殺	11	19	8.80	8.27	9	33	16.59	13.23	6	58	29.58	23.44	6	49	25.15	19.60	8	37	19.10	14.47
E47-E53	事故傷害	4	73	33.83	32.04	5	60	30.17	25.38	8	37	18.87	15.47	9	32	16.43	13.17	9	34	17.56	13.70
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	9	24	11.12	10.43	13	11	5.53	3.69	11	16	8.16	4.86	13	7	3.59	1.92	10	14	7.23	3.76
	其他		280	129.74	136.38		346	174.00	117.04		385	196.33	124.58		365	187.36	111.37		363	187.43	105.62

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68	450.30		1,578	830.63	426.38		1,616	842.80	427.68		1,604	830.86	409.75		1,651	850.60	405.16
C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83	122.62	1	426	224.24	121.90	1	448	233.65	127.77	1	464	240.35	128.59	1	458	235.96	121.04
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	203	106.05	56.99	2	185	97.38	45.99	2	207	107.96	50.58	2	215	111.37	49.65	2	253	130.35	59.90
J12-J18	肺炎	3	111	57.99	28.01	4	110	57.90	24.84	4	102	53.20	21.15	5	85	44.03	17.24	3	108	55.64	21.57
I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29	28.82	3	116	61.06	31.08	3	121	63.11	30.02	3	123	63.71	28.28	3	108	55.64	23.79
E10-E14	糖尿病	5	88	45.97	24.11	5	108	56.85	27.65	5	90	46.94	22.73	4	88	45.58	21.54	5	100	51.52	24.77
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	50	26.12	12.13	6	62	32.64	13.30	6	66	34.42	14.17	7	57	29.53	11.93	7	61	31.43	10.63
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	45	23.51	17.52	12	34	17.90	11.84	9	43	22.43	15.38	10	42	21.76	13.41	8	52	26.79	16.86
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	61	31.87	16.89	8	50	26.32	12.08	9	43	22.43	11.20	8	45	23.31	10.51	6	66	34.00	14.98
I10-I15	高血壓性疾病	11	39	20.37	9.94	7	57	30.00	13.98	7	61	31.81	15.24	6	60	31.08	13.48	9	49	25.25	10.47
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	8	47	24.55	19.96	11	36	18.95	14.40	##	31	16.17	11.09	12	28	14.50	10.12	12	29	14.94	10.10
	其他		362	189.12	113.31		394	207.39	109.32		404	210.70	108.35		397	205.64	105.00		367	189.08	91.05

表53-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,716	882.14	412.09		1,743	898.74	413.96		1,666	864.58	383.17		1,768	926.98	394.23		1,651	876.61	372.28
C00-C97	惡性腫瘤	1	459	235.96	120.66	1	456	235.13	117.14	1	438	227.30	113.66	1	468	245.38	114.65	1	461	244.77	111.97
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	268	137.77	60.94	2	277	142.83	62.50	2	289	149.98	60.40	2	315	165.16	64.63	2	253	134.33	53.89
J12-J18	肺炎	3	126	64.77	23.98	3	137	70.64	27.55	3	128	66.43	22.44	3	165	86.51	28.44	3	185	98.23	32.63
I60-I69	腦血管疾病	4	119	61.17	25.82	4	129	66.52	28.18	4	113	58.64	24.06	4	110	57.67	22.37	4	131	69.56	28.52
E10-E14	糖尿病	5	92	47.29	21.97	5	96	49.50	21.90	5	80	41.52	18.36	5	87	45.62	20.01	5	68	36.11	13.82
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	67	34.44	11.34	7	66	34.03	14.30	6	67	34.77	12.41	6	51	26.74	8.60	6	52	27.61	9.67
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	52	26.73	17.56	10	37	19.08	11.76	8	53	27.50	17.49	10	40	20.97	10.10	7	39	20.71	12.76
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	54	27.76	11.30	6	68	35.06	15.06	7	63	32.69	13.08	9	48	25.17	9.45	8	37	19.65	6.86
I10-I15	高血壓性疾病	10	49	25.19	10.62	8	42	21.66	9.51	10	38	19.72	7.43	7	49	25.69	10.13	9	36	19.11	6.52
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	12	31	15.94	12.64	11	34	17.53	12.39	11	26	13.49	9.85	12	30	15.73	10.16	10	35	18.58	13.32
	其他		399	205.11	95.26		401	206.77	93.67		371	192.53	84.01		405	212.35	95.69		354	187.96	82.31

表53-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,041	461.94	512.44		1,277	496.35	392.35		1,297	501.74	377.83		1,301	500.03	360.44		1,402	536.05	368.85
08-14	惡性腫瘤	1	274	121.59	129.12	1	406	157.81	128.43	1	384	148.55	113.36	1	411	157.96	117.84	1	411	157.15	113.05
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.16	47.41	2	165	64.13	48.62	2	148	57.25	40.41	2	133	51.12	33.87	2	168	64.23	42.38
29	腦血管疾病	2	121	53.69	58.88	3	133	51.70	39.73	3	113	43.71	31.45	3	119	45.74	31.14	3	116	44.35	29.52
181	糖尿病	5	70	31.06	33.39	4	79	30.71	22.83	4	79	30.56	23.60	4	71	27.29	19.76	4	84	32.12	20.84
321	肺炎	8	30	13.31	16.05	6	41	15.94	10.85	5	57	22.05	14.27	5	59	22.68	14.74	5	74	28.29	16.39
E54	自殺	12	11	4.88	4.77	7	35	13.60	12.05	7	44	17.02	14.99	7	42	16.14	13.27	6	51	19.50	15.91
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	43	19.08	20.79	5	42	16.32	12.41	6	51	19.73	13.80	6	49	18.83	13.21	7	47	17.97	12.11
E47-E53	事故傷害	4	88	39.05	40.11	9	27	10.49	9.97	8	42	16.25	14.70	8	33	12.68	10.79	8	35	13.38	11.25
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	12.87	13.43	8	30	11.66	9.72	9	29	11.22	8.88	9	27	10.38	8.25	9	29	11.09	8.64
038	敗血症	14	9	3.99	4.61	13	7	2.72	1.96	11	15	5.80	4.05	11	17	6.53	4.51	10	20	7.65	4.55
	其他		271	120.25	143.88		312	121.27	95.78		335	129.59	98.32		340	130.68	93.04		367	140.32	94.21

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)・97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因（續1）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39	355.06		1,551	586.67	340.24		1,619	604.38	349.18		1,514	560.07	319.09		1,678	615.48	342.44
C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79	118.80	1	449	169.83	106.17	1	486	181.43	114.23	1	403	149.08	93.22	1	462	169.46	102.13
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	188	71.84	44.69	2	193	73.00	41.56	2	171	63.84	34.40	2	201	74.35	38.66	2	236	86.56	45.71
J12-J18	肺炎	4	86	32.86	19.04	4	90	34.04	15.64	4	103	38.45	18.42	4	96	35.51	17.02	3	117	42.92	19.61
I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98	24.05	3	125	47.28	27.89	3	125	46.66	25.55	3	122	45.13	24.50	4	109	39.98	21.44
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	46	17.58	11.13	9	42	15.89	8.55	8	58	21.65	11.96	8	54	19.98	10.97	6	66	24.21	12.28
E10-E14	糖尿病	5	60	22.93	14.47	5	81	30.64	17.71	5	81	30.24	17.29	5	91	33.66	18.89	5	82	30.08	16.46
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	38	14.52	8.46	6	71	26.86	12.89	6	66	24.64	11.30	9	45	16.65	8.41	7	65	23.84	10.14
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	41	15.67	13.19	10	37	14.00	10.78	10	41	15.31	9.21	10	39	14.43	9.53	9	52	19.07	12.02
A40-A41	敗血症	7	45	17.20	11.44	7	67	25.34	12.56	9	57	21.28	11.23	7	59	21.83	10.51	8	59	21.64	10.54
I10-I15	高血壓性疾病	10	35	13.37	8.59	8	59	22.32	11.22	7	61	22.77	11.71	6	61	22.57	10.82	10	39	14.31	6.01
	其他		321	122.66	81.20		337	127.47	75.27		370	138.12	83.88		343	126.88	76.56		391	143.42	86.10

表53-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,617	588.76	307.80		1,809	657.10	338.63		1,654	601.83	303.54		1,675	611.11	300.33		1,790	656.20	313.37
C00-C97	惡性腫瘤	1	453	164.94	95.06	1	485	176.17	99.56	1	427	155.37	86.51	1	452	164.91	90.69	1	509	186.59	99.03
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	229	83.38	40.74	2	283	102.80	49.25	2	246	89.51	42.65	2	297	108.36	47.97	2	287	105.21	44.53
J12-J18	肺炎	3	119	43.33	18.06	3	133	48.31	20.79	3	153	55.67	22.62	3	155	56.55	22.15	3	215	78.82	29.05
I60-I69	腦血管疾病	4	95	34.59	17.82	4	128	46.49	22.26	4	104	37.84	17.85	4	97	35.39	16.54	4	117	42.89	19.79
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	63	22.94	11.38	7	67	24.34	12.55	9	47	17.10	8.49	7	55	20.07	9.36	5	62	22.73	10.42
E10-E14	糖尿病	5	70	25.49	12.39	6	73	26.52	13.65	5	65	23.65	11.52	5	79	28.82	13.25	6	59	21.63	9.75
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	62	22.57	9.79	5	74	26.88	12.17	6	61	22.20	8.61	8	47	17.15	6.85	7	55	20.16	7.96
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	38	13.84	8.47	10	48	17.44	10.89	8	50	18.19	12.74	10	38	13.86	8.57	8	41	15.03	11.16
A40-A41	敗血症	8	52	18.93	8.66	8	59	21.43	9.22	7	51	18.56	8.91	6	61	22.26	10.61	9	38	13.93	5.45
I10-I15	高血壓性疾病	9	45	16.38	8.71	9	52	18.89	8.85	10	45	16.37	7.71	9	45	16.42	7.14	10	32	11.73	4.57
	其他		391	142.37	76.72		407	147.84	79.45		405	147.37	75.92		349	127.33	67.21		375	137.47	71.66

表53-9 · 臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		469	415.37	546.64		567	501.54	440.30		587	519.39	432.63		649	573.55	463.19		596	525.17	407.61
08-14	惡性腫瘤	1	139	123.11	156.95	1	193	170.72	146.42	1	186	164.58	138.32	1	206	182.05	149.20	1	195	171.83	132.30
25-27-28*	心臟疾病	3	43	38.08	53.74	2	78	68.99	60.74	2	66	58.40	48.04	2	68	60.09	47.94	2	64	56.39	41.90
29	腦血管疾病	2	49	43.40	59.01	3	48	42.46	36.54	3	55	48.67	38.94	3	61	53.91	41.50	3	60	52.87	39.39
181	糖尿病	5	27	23.91	30.41	4	34	30.07	26.64	4	44	38.93	32.92	4	41	36.23	28.65	4	27	23.79	17.44
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	8	7.09	9.02	6	22	19.46	16.67	7	23	20.35	16.87	8	17	15.02	11.78	5	25	22.03	15.92
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	20.37	24.52	7	17	15.04	13.32	9	10	8.85	7.83	9	15	13.26	10.66	6	22	19.39	14.95
E47-E53	事故傷害	4	32	28.34	30.47	5	30	26.54	24.59	5	25	22.12	20.42	5	30	26.51	23.81	7	19	16.74	17.59
E54	自殺	8	11	9.74	10.82	8	13	11.50	10.27	6	24	21.24	17.91	5	30	26.51	21.67	8	14	12.34	10.40
321	肺炎	13	7	6.20	9.81	9	10	8.85	7.46	8	11	9.73	7.74	7	28	24.74	18.57	8	14	12.34	8.60
038	敗血症	14	5	4.43	6.19	11	3	2.65	2.41	12	5	4.42	3.87	11	7	6.19	5.30	10	10	8.81	6.31
	其他		125	110.71	155.70		119	105.26	95.24		138	122.11	99.76		146	129.03	104.10		146	128.65	102.81

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-9・臺北市南港區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年				
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	
A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24	404.97		662	575.27	384.04		703	599.26	389.06		689	578.40	365.11		744	617.40	379.17	
C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60	121.11	1	195	169.45	116.63	1	222	189.24	127.96	1	226	189.72	128.04	1	228	189.20	122.64	
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	75	65.97	44.97	2	91	79.08	50.10	2	83	70.75	45.08	2	85	71.36	42.12	2	94	78.01	44.88	
J12-J18	肺炎	3	58	51.01	35.70	4	43	37.37	22.15	4	48	40.92	22.37	4	43	36.10	19.21	4	46	38.17	20.77	
I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74	32.00	3	48	41.71	26.24	3	52	44.33	27.32	3	62	52.05	29.15	3	70	58.09	34.78	
E10-E14	糖尿病	5	31	27.27	20.03	5	36	31.28	20.87	5	39	33.24	20.86	5	32	26.86	17.24	5	39	32.36	19.71	
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	20	17.59	11.63	6	28	24.33	14.96	7	28	23.87	15.04	7	20	16.79	8.93	6	25	20.75	10.06	
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	9	19	16.71	12.35	7	19	16.51	10.35	12	17	14.49	9.71	11	13	10.91	6.96	7	23	19.09	11.18	
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	11	15	13.19	9.75	9	17	14.77	11.31	9	19	16.20	11.20	7	20	16.79	10.96	10	17	14.11	9.48	
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	24	21.11	17.83	9	17	14.77	11.79	11	18	15.34	10.17	10	14	11.75	10.07	8	20	16.60	11.72	
F01-F03	血管性及未明示 之癱瘓症	14	3	2.64	1.68	15	5	4.34	2.22	18	3	2.56	1.57	13	8	6.72	3.15	15	5	4.15	1.85	
	其他		146	128.41	97.92		163	141.64	97.42		174	148.32	97.78		166	139.35	89.28		177	146.88	92.10	

表53-9 · 臺北市南港區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		722	593.01	361.83		780	637.36	373.37		721	589.36	327.93		821	673.43	375.89		787	650.50	347.36
C00-C97	惡性腫瘤	1	231	189.73	120.52	1	213	174.05	107.15	1	204	166.75	97.93	1	280	229.67	132.46	1	246	203.33	114.94
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	108	88.71	53.42	2	122	99.69	55.93	2	116	94.82	50.79	2	108	88.59	43.28	2	109	90.09	45.89
J12-J18	肺炎	4	43	35.32	17.58	3	55	44.94	22.80	3	54	44.14	23.35	3	58	47.58	21.66	3	79	65.30	28.27
I60-I69	腦血管疾病	3	51	41.89	23.28	3	55	44.94	24.21	3	54	44.14	23.43	4	57	46.75	24.57	4	46	38.02	19.77
E10-E14	糖尿病	6	28	23.00	14.16	5	35	28.60	16.50	5	27	22.07	11.20	6	28	22.97	11.34	5	30	24.80	12.44
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	11	14	11.50	5.37	6	33	26.97	13.81	8	20	16.35	8.36	7	27	22.15	11.56	6	26	21.49	9.59
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	5	35	28.75	15.47	8	25	20.43	11.47	7	21	17.17	8.69	5	29	23.79	12.56	7	19	15.70	7.87
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	9	17	13.96	8.82	13	14	11.44	6.99	9	19	15.53	9.40	9	16	13.12	8.05	8	17	14.05	8.36
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	14	11.50	10.77	9	24	19.61	13.60	6	23	18.80	13.24	8	21	17.23	14.93	8	17	14.05	11.77
F01-F03	血管性及未明示 之癱瘓症	15	5	4.11	1.61	10	19	15.53	6.93	13	11	8.99	3.86	13	11	9.02	3.42	10	15	12.40	5.10
	其他		176	144.56	90.83		185	151.17	93.99		172	140.60	77.67		186	152.57	92.07		183	151.26	83.35

表53-10・臺北市內湖區歷年主要死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		84年				93年				94年				95年				96年			
順位	死人 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 數	死 亡 率	標準化 死亡率		
01-56	所有死亡原因	782	350.67	533.92	1,097	421.12	440.93	1,048	400.74	403.33	1,044	396.61	378.76	1,107	417.62	378.58					
08-14	惡性腫瘤	1	198	88.79	126.68	1	314	120.54	128.00	1	306	117.01	117.36	1	357	135.62	126.93	1	373	140.72	127.74
25-27-28*	心臟疾病	2	84	37.67	61.13	2	160	61.42	62.42	2	115	43.97	44.19	2	105	39.89	39.44	2	134	50.55	45.09
29	腦血管疾病	3	71	31.84	53.36	3	90	34.55	35.90	3	107	40.91	41.26	3	104	39.51	38.27	3	96	36.22	33.17
181	糖尿病	5	41	18.39	31.21	4	65	24.95	27.88	4	74	28.30	27.85	4	60	22.79	21.50	4	73	27.54	25.69
321	肺炎	8	24	10.76	20.36	8	31	11.90	12.28	9	35	13.38	12.80	7	37	14.06	13.51	5	51	19.24	17.07
E54	自殺	7	26	11.66	13.75	6	39	14.97	12.99	6	39	14.91	13.18	5	43	16.34	16.08	6	34	12.83	11.20
E47-E53	事故傷害	4	56	25.11	27.25	5	52	19.96	19.36	8	36	13.77	13.82	8	35	13.30	12.36	6	34	12.83	12.42
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	20	8.97	14.06	7	33	12.67	13.66	7	39	14.91	14.97	6	42	15.96	15.46	8	33	12.45	10.91
347	慢性肝病及肝硬化	6	30	13.45	17.26	9	28	10.75	11.17	5	41	15.68	15.55	9	34	12.92	12.24	9	30	11.32	9.99
26	高血壓性疾病	11	16	7.17	12.08	11	11	4.22	4.96	10	23	8.79	8.94	10	14	5.32	4.77	10	15	5.66	5.15
	其他		216	96.86	156.78		274	105.18	112.31		233	89.09	93.41		213	80.92	78.20		234	88.28	80.15

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-10 · 臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死人數	死亡率	標準化死亡率																
A00-Y98	所有死亡原因	1,183	444.46	378.30		1,238	453.56	352.86		1,382	497.41	376.04		1,322	469.74	340.25		1,364	479.77	338.86	
C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51	118.35	1	376	137.75	113.21	1	418	150.45	118.25	1	403	143.20	105.15	1	398	139.99	103.82
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血 壓性疾病除外)	2	153	57.48	49.08	2	129	47.26	37.64	2	152	54.71	39.03	2	161	57.21	41.46	2	209	73.51	50.04
J12-J18	肺炎	5	63	23.67	19.12	5	54	19.78	13.31	5	65	23.39	15.99	5	58	20.61	11.98	6	59	20.75	12.93
I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95	31.77	3	95	34.81	25.67	3	105	37.79	27.47	3	109	38.73	26.89	3	105	36.93	25.50
E10-E14	糖尿病	4	68	25.55	22.23	4	69	25.28	19.67	4	77	27.71	21.25	4	66	23.45	17.63	4	61	21.46	14.81
A40-A41	敗血症	6	42	15.78	12.45	9	31	11.36	7.90	7	45	16.20	12.19	8	37	13.15	8.59	11	29	10.20	5.90
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	33	12.40	11.36	7	40	14.65	11.00	9	43	15.48	12.77	9	34	12.08	8.83	7	43	15.12	11.56
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	33	12.40	10.01	10	30	10.99	8.06	7	45	16.20	12.62	7	38	13.50	10.23	10	30	10.55	7.45
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	28	10.52	8.83	6	46	16.85	11.02	6	47	16.92	12.06	6	56	19.90	13.19	4	61	21.46	13.37
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自 殺)	7	38	14.28	12.89	12	24	8.79	7.11	11	31	11.16	9.17	12	26	9.24	7.39	8	36	12.66	10.99
	其他		258	96.93	82.21		344	126.03	98.27		354	127.41	95.24		334	118.68	88.91		333	117.13	82.49

表53-10・臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,423	496.40	340.19		1,491	518.34	345.19		1,409	489.66	311.64		1,412	490.96	305.05		1,435	500.68	303.27
C00-C97	惡性腫瘤	1	458	159.77	112.15	1	461	160.26	109.90	1	409	142.14	94.43	1	416	144.65	94.29	1	450	157.01	97.23
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	176	61.40	40.23	2	200	69.53	45.98	2	215	74.72	45.19	2	218	75.80	46.38	2	226	78.85	47.08
J12-J18	肺炎	4	68	23.72	13.65	4	82	28.51	16.12	3	123	42.75	24.69	3	128	44.51	23.37	3	152	53.03	27.28
I60-I69	腦血管疾病	3	105	36.63	23.64	3	114	39.63	26.16	4	100	34.75	21.49	4	98	34.08	18.90	4	84	29.31	17.02
E10-E14	糖尿病	8	42	14.65	9.89	5	69	23.99	16.59	6	50	17.38	11.65	5	54	18.78	11.96	5	70	24.42	13.70
A40-A41	敗血症	7	44	15.35	10.00	6	53	18.43	11.05	5	52	18.07	10.06	6	44	15.30	8.76	7	33	11.51	6.35
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	48	16.74	13.73	7	47	16.34	11.84	9	34	11.82	9.08	7	42	14.60	11.44	9	27	9.42	8.54
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	10	33	11.51	7.14	10	39	13.56	9.20	6	50	17.38	11.31	7	42	14.60	8.30	8	30	10.47	5.68
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	5	58	20.23	12.38	8	44	15.30	8.75	8	45	15.64	8.79	9	38	13.21	7.40	6	46	16.05	8.90
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	36	12.56	10.04	13	23	8.00	6.35	10	27	9.38	7.39	10	36	12.52	9.39	10	24	8.37	6.95
	其他		355	123.84	87.34		359	124.80	83.25		304	105.68	67.57		296	102.87	64.85		293	102.23	64.52

表53-11・臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,192	399.07	480.62		1,462	505.78	409.93		1,588	550.74	424.34		1,527	530.24	389.46		1,569	545.49	385.22
08-14	惡性腫瘤	1	322	107.80	123.59	1	476	164.67	131.52	1	456	158.15	122.44	1	489	169.80	126.48	1	533	185.31	133.51
25-27-28*	心臟疾病	3	129	43.19	53.54	2	161	55.70	43.66	2	171	59.31	44.17	2	171	59.38	41.99	2	162	56.32	37.83
29	腦血管疾病	2	163	54.57	66.78	3	150	51.89	40.14	3	135	46.82	34.83	3	107	37.16	25.87	3	137	47.63	31.29
181	糖尿病	5	65	21.76	27.61	4	107	37.02	28.91	4	105	36.42	26.71	4	105	36.46	25.84	4	107	37.20	25.08
321	肺炎	7	40	13.39	18.36	7	42	14.53	11.00	5	77	26.70	19.19	5	71	24.65	17.35	5	76	26.42	16.12
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	37	12.39	15.15	6	44	15.22	11.71	6	61	21.16	15.58	6	53	18.40	12.71	6	60	20.86	13.84
E47-E53	事故傷害	4	85	28.46	29.23	5	63	21.79	19.64	8	43	14.91	13.56	7	45	15.63	14.32	7	43	14.95	12.86
E54	自殺	9	26	8.70	9.29	8	30	10.38	9.03	7	49	16.99	14.16	8	43	14.93	11.86	8	38	13.21	11.18
347	慢性肝病及肝硬化	6	41	13.73	15.18	9	24	8.30	6.69	9	36	12.49	9.64	9	30	10.42	8.23	9	31	10.78	8.03
038	敗血症	13	8	2.68	3.16	10	13	4.50	3.51	10	19	6.59	4.92	11	18	6.25	4.20	10	19	6.61	4.00
	其他		276	92.40	118.73		352	121.77	104.12		436	151.21	119.15		395	137.16	100.60		363	126.20	91.48

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-11 · 臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				100年				101年				102年				103年			
		順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死人 亡數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50	389.90		1,710	598.31	362.26		1,708	593.09	347.26		1,809	625.26	351.82		1,805	622.20	335.93
C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76	113.15	1	546	191.04	118.60	1	498	172.93	105.87	1	600	207.38	122.24	1	537	185.11	106.70
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	231	80.61	51.65	2	190	66.48	37.56	2	227	78.82	43.55	2	208	71.89	38.91	2	252	86.87	44.38
J12-J18	肺炎	4	97	33.85	20.06	3	113	39.54	21.12	5	96	33.34	16.86	5	90	31.11	14.00	4	104	35.85	15.74
I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02	28.91	4	106	37.09	21.44	3	110	38.20	20.21	3	147	50.81	26.94	3	124	42.74	21.62
E10-E14	糖尿病	5	75	26.17	17.02	5	83	29.04	16.93	4	102	35.42	19.33	4	106	36.64	20.04	5	91	31.37	16.27
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	53	18.50	11.53	8	51	17.84	10.25	7	58	20.14	10.77	6	62	21.43	10.53	8	53	18.27	8.99
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	46	16.05	9.28	6	63	22.04	10.82	6	60	20.83	10.04	7	58	20.05	9.68	6	76	26.20	11.36
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	46	16.05	13.39	12	28	9.80	7.66	11	38	13.20	11.17	12	30	10.37	7.25	12	39	13.44	10.10
A40-A41	敗血症	6	59	20.59	12.75	6	63	22.04	11.70	10	47	16.32	8.74	10	41	14.17	7.08	9	49	16.89	8.30
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	49	17.10	15.45	10	43	15.05	12.14	9	48	16.67	12.83	9	46	15.90	12.37	7	59	20.34	13.42
	其他		392	136.80	96.71		424	148.35	94.04		424	147.23	87.89		421	145.51	82.78		421	145.12	79.05

表53-11 · 臺北市士林區歷年主要死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,800	619.46	320.83		1,861	641.02	324.26		1,963	678.96	333.19		1,958	681.23	322.71		1,890	663.15	302.25
C00-C97	惡性腫瘤	1	509	175.17	98.15	1	566	194.96	105.59	1	576	199.23	105.14	1	578	201.10	100.78	1	561	196.84	98.25
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	250	86.04	43.50	2	236	81.29	38.26	2	276	95.46	44.21	2	333	115.86	50.54	2	293	102.81	43.20
J12-J18	肺炎	4	109	37.51	16.20	3	124	42.71	18.10	3	161	55.69	21.44	3	166	57.76	21.65	3	220	77.19	28.28
I60-I69	腦血管疾病	3	114	39.23	17.91	4	111	38.23	18.62	4	125	43.24	20.48	4	119	41.40	19.17	4	117	41.05	17.53
E10-E14	糖尿病	5	106	36.48	17.28	5	90	31.00	14.37	6	84	29.05	13.17	5	89	30.97	13.83	5	86	30.18	12.69
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	73	25.12	12.06	7	68	23.42	10.08	7	71	24.56	10.61	6	81	28.18	11.34	6	50	17.54	6.70
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	85	29.25	12.53	6	75	25.83	10.76	5	89	30.78	12.28	8	50	17.40	6.87	7	45	15.79	5.70
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	14	32	11.01	7.69	14	26	8.96	6.83	10	41	14.18	10.93	10	42	14.61	10.32	8	36	12.63	9.13
A40-A41	敗血症	10	39	13.42	5.99	9	48	16.53	7.13	9	46	15.91	7.01	9	48	16.70	6.71	9	35	12.28	4.87
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	42	14.45	10.14	8	58	19.98	13.41	8	55	19.02	13.14	7	56	19.48	13.48	10	33	11.58	7.84
	其他		441	151.77	79.38		459	158.10	81.09		439	151.84	74.80		396	137.78	68.04		414	145.26	68.06

表53-12・臺北市北投區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率	順位	死 人	死 亡 數	死 亡 率	標準化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,078	443.77	525.00		1,317	528.90	428.42		1,400	563.46	441.02		1,395	560.68	423.62		1,433	573.60	424.32
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.03	129.94	1	375	150.60	123.14	1	399	160.59	127.39	1	401	161.17	121.33	1	463	185.33	138.24
25-27-28*	心臟疾病	3	100	41.17	50.55	2	163	65.46	50.99	2	168	67.62	51.55	2	175	70.34	52.55	2	158	63.24	45.28
29	腦血管疾病	2	119	48.99	58.76	3	127	51.00	39.93	3	137	55.14	40.95	3	132	53.05	38.66	3	138	55.24	37.42
181	糖尿病	5	51	20.99	24.62	4	83	33.33	27.29	4	108	43.47	32.61	4	95	38.18	26.50	4	91	36.43	26.67
321	肺炎	7	36	14.82	18.81	6	48	19.28	15.08	7	47	18.92	13.31	5	68	27.33	18.90	5	72	28.82	18.74
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.82	17.49	7	46	18.47	14.65	5	63	25.36	18.55	6	54	21.70	16.30	6	48	19.21	13.04
347	慢性肝病及肝硬化	6	46	18.94	20.87	8	32	12.85	9.94	9	29	11.67	9.24	9	32	12.86	10.28	7	45	18.01	13.82
E47-E53	事故傷害	4	84	34.58	35.77	5	54	21.69	20.71	8	45	18.11	15.40	8	37	14.87	13.44	8	40	16.01	12.86
E54	自殺	10	18	7.41	7.68	8	32	12.85	10.80	6	55	22.14	18.94	7	42	16.88	13.32	9	29	11.61	10.02
038	敗血症	14	12	4.94	6.09	12	9	3.61	2.97	10	15	6.04	4.56	10	18	7.23	4.51	10	18	7.21	4.62
	其他		299	123.09	154.42		348	139.75	112.92		334	134.43	108.52		341	137.05	107.83		331	132.49	103.61

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-12 · 臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年					100年					101年					102年					103年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化 死亡率		
A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13	426.24		1,522	606.98	384.65		1,512	597.06	367.35		1,521	596.90	352.92		1,578	615.25	355.76							
C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70	131.99	1	444	177.07	116.33	1	482	190.33	120.29	1	463	181.70	113.59	1	460	179.35	110.46							
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	194	77.64	51.94	2	200	79.76	47.65	2	210	82.92	50.01	2	206	80.84	45.47	2	216	84.22	45.56							
J12-J18	肺炎	4	92	36.82	22.98	4	91	36.29	18.91	5	59	23.30	11.23	5	79	31.00	16.15	4	104	40.55	18.88							
I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83	34.85	3	122	48.65	28.81	3	95	37.51	20.93	3	109	42.78	22.80	3	106	41.33	22.59							
E10-E14	糖尿病	5	66	26.41	17.15	5	68	27.12	16.38	4	93	36.72	22.15	4	89	34.93	19.01	5	96	37.43	20.21							
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	51	20.41	12.66	6	62	24.73	13.48	6	56	22.11	11.29	6	62	24.33	12.49	6	68	26.51	13.19							
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	43	17.21	14.33	10	40	15.95	12.79	11	28	11.06	9.28	12	26	10.20	7.72	11	37	14.43	11.22							
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	52	20.81	13.80	9	41	16.35	9.73	7	53	20.93	12.27	8	45	17.66	9.93	7	54	21.05	11.79							
I10-I15	高血壓性疾病	10	38	15.21	10.01	11	34	13.56	7.05	8	43	16.98	9.10	7	51	20.01	10.36	8	51	19.88	9.95							
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	36	14.41	11.60	7	48	19.14	14.99	8	43	16.98	12.80	11	37	14.52	10.81	9	47	18.32	13.69							
	其他		369	147.68	104.93		372	148.36	98.53		350	138.21	88.00		354	138.92	84.59		339	132.17	78.22							

表53-12・臺北市北投區歷年主要死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		104年				105年				106年				107年				108年			
		順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率	順位	死 人	亡 數	死 亡 率	標準化 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,631	632.93	354.18		1,695	657.96	352.36		1,687	656.64	353.11		1,756	685.95	349.35		1,776	698.04	346.73
C00-C97	惡性腫瘤	1	487	188.99	111.14	1	450	174.68	100.96	1	506	196.95	109.09	1	527	205.86	112.17	1	517	203.20	105.41
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	222	86.15	44.42	2	262	101.70	52.30	2	269	104.70	51.09	2	286	111.72	53.88	2	261	102.58	47.58
J12-J18	肺炎	4	103	39.97	18.40	3	128	49.69	21.07	4	110	42.82	19.31	3	169	66.02	27.06	3	192	75.46	30.93
I60-I69	腦血管疾病	3	109	42.30	22.12	4	125	48.52	24.26	3	114	44.37	22.59	4	115	44.92	20.91	4	116	45.59	21.95
E10-E14	糖尿病	5	87	33.76	18.67	5	84	32.61	16.28	5	84	32.70	16.43	6	65	25.39	12.13	5	94	36.95	16.71
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	62	24.06	10.15	6	69	26.78	11.38	7	52	20.24	9.49	5	71	27.74	11.22	6	67	26.33	10.11
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	39	15.13	10.61	8	43	16.69	13.26	11	34	13.23	10.02	11	32	12.50	10.02	7	47	18.47	15.62
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	11	37	14.36	7.29	7	61	23.68	11.31	6	55	21.41	9.76	7	59	23.05	10.60	8	43	16.90	7.07
I10-I15	高血壓性疾病	7	43	16.69	8.20	9	41	15.92	8.02	10	35	13.62	6.36	9	43	16.80	6.91	9	42	16.51	6.51
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	40	15.52	11.37	10	38	14.75	10.93	8	42	16.35	11.82	8	46	17.97	12.51	10	33	12.97	10.13
	其他		402	156.00	91.81		394	152.94	82.60		386	150.25	87.14		343	133.99	71.95		364	143.07	74.73

表54-1・臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		224	105.52		304	147.73		313	151.18		345	165.26		332	157.94
162	肺癌	1	38	17.90	1	76	36.93	1	66	31.88	1	61	29.22	1	86	40.91
155	肝癌	2	34	16.02	4	37	17.98	2	51	24.63	2	50	23.95	2	44	20.93
153,154	結腸直腸癌	2	34	16.02	3	40	19.44	3	42	20.29	3	43	20.60	3	40	19.03
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	4	9	8.30	2	21	19.65	4	17	15.77	4	20	18.34	4	18	16.34
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	11	3	2.89	7	8	8.09	5	10	10.08	6	14	14.04	5	11	11.00
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	7	6	5.53	22	1	0.94	15	3	2.78	14	4	3.67	6	12	10.89
151	胃癌	5	16	7.54	5	19	9.23	7	15	7.25	5	34	16.29	7	21	9.99
200,202,203	非何杰金淋巴癌	10	7	3.30	5	19	9.23	6	15	7.25	8	17	8.14	8	20	9.51
157	胰臟癌	9	8	3.77	9	10	4.86	8	12	5.80	8	17	8.14	9	16	7.61
204-208	白血病	14	5	2.36	13	6	2.92	18	2	0.97	12	9	4.31	10	12	5.71
	其他		64	30.15		67	32.56		80	38.64		76	36.41		52	24.74

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-1・臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	306	145.34	331	158.34	352	169.06	386	184.52	369	175.36	389	184.69						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92	1	81	38.75	1	77	36.98	1	81	38.72	1	82	38.97	1	65	30.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10	2	54	25.83	3	46	22.09	3	54	25.81	2	49	23.29	2	52	24.69
C22	肝和肝內膽管癌	4	16	14.47	4	15	13.66	2	25	22.85	4	22	19.99	4	25	22.57	3	26	23.44
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	2	44	20.90	3	51	24.40	4	35	16.81	2	57	27.25	3	48	22.81	4	47	22.31
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	14	14.00	6	7	7.06	10	7	7.09	5	14	14.12	5	16	16.06	6	15	15.05
C16	胃癌	6	22	10.45	5	18	8.61	5	21	10.09	6	26	12.43	6	18	8.55	5	35	16.62
C25	胰臟癌	7	20	9.50	7	12	5.74	12	11	5.28	7	17	8.13	6	18	8.55	7	19	9.02
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	12	5.70	13	7	3.35	8	15	7.20	8	13	6.21	9	10	4.75	10	14	6.65
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	21	1	0.47	16	4	2	15	6	2.88	9	11	5.26	15	5	2.38	16	6	2.85
C67	膀胱癌	12	8	3.80	14	5	2.39	13	10	4.80	11	9	4.30	13	8	3.80	11	11	5.22
	其他		70	33.25		77	36.83		99	47.55		82	39.20		90	42.77		99	47.00

表54-1・臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	380	180.60	386	183.73	414	198.07	396	190.70	408	197.73	360	175.65						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	73	34.69	1	82	39.03	1	73	34.92	1	74	35.64	1	89	43.13	1	65	31.72
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	57	27.09	2	52	24.75	4	49	23.44	4	48	23.12	2	64	31.02	2	54	26.35
C22	肝和肝內膽管癌	4	27	24.34	3	26	23.43	3	29	26.22	3	26	23.61	4	28	25.55	3	27	24.77
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	3	52	24.71	4	46	21.90	2	62	29.66	2	52	25.04	3	55	26.65	4	34	16.59
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	19	19.10	5	21	21.18	5	17	17.28	5	20	20.51	5	17	17.57	5	14	14.59
C16	胃癌	6	23	10.93	7	21	10.00	7	20	9.57	7	20	9.63	6	28	13.57	6	24	11.71
C25	胰臟癌	7	18	8.55	6	24	11.42	6	27	12.92	6	23	11.08	7	19	9.21	7	22	10.73
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	14	7	3.33	10	11	5.24	8	19	9.09	12	11	5.30	8	14	6.78	8	15	7.32
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	18	3	1.43	19	3	1	18	5	2.39	15	5	2.41	17	4	1.94	9	11	5.37
C67	膀胱癌	12	8	3.80	8	17	8.09	10	16	7.65	18	4	1.93	9	10	4.85	10	9	4.39
	其他		93	44.20		83	39.51		97	46.41		113	54.42		80	38.77		85	41.47

表54-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口														
		84年			93年			94年			95年					
順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	303	123.50	373	159.71	430	185.63	401	173.50	427	185.51					
162	肺癌	1	65	26.49	1	71	30.40	1	81	34.97	1	84	36.34	1	103	44.75
155	肝癌	2	56	22.82	2	66	28.26	2	63	27.20	2	55	23.80	2	54	23.46
153,154	結腸直腸癌	3	30	12.23	3	41	17.56	5	51	22.02	3	50	21.63	3	48	20.85
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	6	8	6.62	7	9	7.62	3	28	23.80	4	21	17.81	4	24	20.35
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	15	3	2.41	5	12	10.40	6	12	10.53	6	11	9.71	5	17	15.14
151	胃癌	4	25	10.19	4	29	12.42	4	52	22.45	5	38	16.44	6	30	13.03
200,202,203	非何杰金淋巴癌	7	10	4.08	6	19	8.14	7	24	10.36	10	14	6.06	7	21	9.12
156	膽囊癌	9	9	3.67	12	10	4.28	15	7	3.02	9	15	6.49	8	18	7.82
157	胰臟癌	7	10	4.08	9	15	6.42	8	17	7.34	7	18	7.79	9	16	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	8	3.26	10	12	5.14	9	14	6.04	7	18	7.79	10	12	5.21
	其他		79	32.20		89	38.11		81	34.97		77	33.31		84	36.49

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	397	173.88	437	192.88	424	188.25	441	195.29	455	200.32	447	195.95						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60	1	87	38.40	1	84	37.30	1	85	37.64	1	108	47.55	1	87	38.14
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	23	19.59	4	25	21.39	4	22	18.87	2	38	32.44	5	23	19.50	3	29	24.46
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02	2	67	29.57	3	43	19.09	4	54	23.91	3	55	24.21	4	43	18.85
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	11	9.92	6	16	14.59	6	12	11.04	9	9	8.28	4	24	21.98	5	17	15.52
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15	3	54	23.83	2	61	27.08	3	61	27.01	2	58	25.54	2	60	26.30
C25	胰臟癌	7	22	9.64	7	26	11.48	5	30	13.32	5	28	12.40	8	18	7.92	10	17	7.45
C16	胃癌	5	27	11.83	5	40	17.65	7	23	10.21	7	26	11.51	6	29	12.77	6	34	14.90
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	15	4	3.41	10	5	4.28	16	4	3.43	6	14	11.95	7	14	11.87	7	11	9.28
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	15	6.57	14	8	3.53	9	12	5.33	11	13	5.76	10	14	6.16	8	20	8.77
C54	子宮體癌(1)	12	5	4.26	10	5	4.28	21	2	1.72	16	4	3.41	11	6	5.09	16	4	3.37
	其他	101	44.24		104	45.90		131	58.16		109	48.27		106	46.67		125	54.80	

表54-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口															
		103年			104年			105年			106年			107年			
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因	433	189.02	436	190.03	488	213.55	445	196.22	464	206.61	497	224.16				
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	82	35.80	1	82	35.74	1	103	45.07	1	91	40.13	1	103	45.86	1
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	25	20.98	2	32	26.79	3	33	27.70	4	28	23.64	4	22	18.73	2
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	57	24.88	4	50	21.79	2	70	30.63	2	66	29.10	2	62	27.61	3
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	7	10	9.10	9	8	7.27	7	10	9.14	5	16	14.77	5	18	16.80	4
C22	肝和肝內膽管癌	3	54	23.57	3	56	24.41	4	45	19.69	3	59	26.02	3	59	26.27	5
C25	胰臟癌	8	20	8.73	6	22	9.59	5	32	14.00	7	20	8.82	7	21	9.35	6
C16	胃癌	5	32	13.97	5	26	11.33	6	30	13.13	6	25	11.02	6	27	12.02	7
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	13	6	5.04	10	8	6.70	9	10	8.39	11	6	5.07	11	7	5.96	8
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.67	11	13	5.67	8	20	8.75	8	16	7.06	14	9	4.01	9
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	18	2	1.68	15	4	3.35	18	3	2.52	14	5	4.22	11	7	5.96	10
	其他		132	57.62		135	58.84		132	57.76		113	49.83		129	57.44	116
																52.32	

表54-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口														
		84年			93年			94年			95年					
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	410	122.97	527	168.49	501	160.39	495	158.06	473	150.37					
162	肺癌	1	85	25.49	1	113	36.13	1	105	33.62	1	110	35.12	1	96	30.52
153,154	結腸直腸癌	4	45	13.50	2	77	24.62	3	64	20.49	3	58	18.52	2	66	20.98
155	肝癌	2	72	21.59	3	69	22.06	2	73	23.37	2	84	26.82	3	64	20.35
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	3	24	14.17	4	26	15.96	4	30	18.39	6	19	11.59	4	20	12.11
151	胃癌	5	34	10.20	6	39	12.47	5	46	14.73	4	42	13.41	5	37	11.76
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	7	10	6.09	5	22	14.67	6	18	12.06	5	19	12.74	6	16	10.71
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	8	8	4.72	7	11	6.75	12	7	4.29	7	12	7.32	7	14	8.48
200,202,203	非何杰金淋巴癌	9	13	3.90	13	13	4.16	9	17	5.44	8	20	6.39	8	26	8.27
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	11	6.50	8	10	6.14	8	9	5.52	10	8	4.88	9	12	7.27
156	膽囊癌	20	3	0.90	11	15	4.80	10	15	4.80	11	12	3.83	10	22	6.99
	其他		105	31.49		132	42.20		117	37.46		111	35.44		100	31.79

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	501	159.36	549	175.55	572	183.58	544	173.97	580	184.93	582	185.71						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40	1	116	37.09	1	119	38.19	1	107	34.22	1	116	36.99	1	124	39.57
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86	2	71	22.70	2	70	22.47	2	83	26.54	4	65	20.72	2	91	29.04
C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63	3	70	22.38	5	58	18.61	4	68	21.75	2	83	26.46	3	69	22.02
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	24	14.50	4	35	21.20	3	36	21.84	3	37	22.34	5	31	18.64	4	36	21.64
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	18	12.10	5	19	12.87	4	28	19.08	5	23	15.64	3	31	21.04	6	16	10.88
C25	胰臟癌	7	23	7.32	6	36	11.51	6	40	12.84	6	23	7.36	7	37	11.80	7	33	10.53
C16	胃癌	6	30	9.54	7	35	11.19	6	40	12.84	7	22	7.04	6	46	14.67	5	41	13.08
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45	9	18	5.76	8	32	10.27	9	18	5.76	8	19	6.06	10	17	5.42
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	15	5	3.02	20	3	1.82	16	5	3.03	21	2	1.21	25	1	0.60	16	4	2.40
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	12	3.82	10	15	4.80	10	14	4.49	13	9	2.88	11	14	4.46	14	9	2.87
	其他		127	40.40		131	41.89		130	41.72		152	48.61		137	43.68		142	45.31

表54-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	593	189.14	565	180.29	616	197.26	601	193.41	580	187.46	656	212.82						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	122	38.91	1	126	40.21	1	134	42.91	1	116	37.33	1	111	35.88	1	127	41.20
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	78	24.88	4	68	21.70	2	80	25.62	3	85	27.35	2	82	26.50	2	88	28.55
C22	肝和肝內膽管癌	4	76	24.24	3	74	23.61	3	71	22.74	4	75	24.14	3	68	21.98	3	86	27.90
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	3	41	24.61	2	40	24.00	4	34	20.45	2	54	32.62	4	34	20.60	4	43	26.11
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	17	11.57	7	14	9.54	5	21	14.38	6	19	13.09	6	20	13.85	5	24	16.72
C25	胰臟癌	5	44	14.03	5	31	9.89	7	31	9.93	7	33	10.62	5	50	16.16	6	38	12.33
C16	胃癌	7	31	9.89	8	25	7.98	6	41	13.13	5	43	13.84	8	29	9.37	7	32	10.38
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	26	8.29	5	31	9.89	8	25	8.01	11	14	4.51	10	14	4.52	8	25	8.11
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	17	4	2.40	10	9	5.40	14	6	3.61	9	8	4.83	12	6	3.64	9	13	7.89
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	9	2.87	15	9	2.87	9	21	6.72	11	14	4.51	11	13	4.20	10	21	6.81
	其他		145	46.25		138	44.04		152	48.67		140	45.05		153	49.45		159	51.58

表54-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口														
		84年			93年			94年			95年					
順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	289	128.97	370	170.56	374	172.44	351	160.83	384	175.32					
162	肺癌	1	50	22.31	1	70	32.27	1	80	36.89	1	62	28.41	1	84	38.35
155	肝癌	2	42	18.74	2	64	29.50	3	46	21.21	2	61	27.95	2	64	29.22
153,154	結腸直腸癌	4	37	16.51	4	45	20.74	2	56	25.82	3	43	19.70	3	41	18.72
151	胃癌	5	26	11.60	5	24	11.06	5	29	13.37	5	26	11.91	4	37	16.89
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	6	11	9.68	3	29	25.77	4	21	18.63	4	19	16.70	5	14	12.21
200,202,203	非何杰金淋巴癌	10	10	4.46	13	7	3.23	7	19	8.76	6	21	9.62	6	20	9.13
157	胰臟癌	11	9	4.02	6	19	8.76	9	14	6.45	7	16	7.33	7	18	8.22
150	食道癌	12	6	2.68	10	12	5.53	10	12	5.53	10	13	5.96	8	15	6.85
156	膽囊癌	12	6	2.68	10	12	5.53	12	7	3.23	12	10	4.58	9	14	6.39
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	8	6	5.43	8	7	6.71	6	11	10.56	9	7	6.70	10	5	4.79
	其他		86	38.38		81	37.34		79	36.42		73	33.45		72	32.87

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	382	174.70	417	190.81	402	183.41	418	188.19	430	190.79	412	180.94						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47	1	85	38.89	1	85	38.78	1	84	37.82	1	85	37.71	1	91	39.96
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35	2	62	28.37	2	63	28.74	2	68	30.61	3	54	23.96	2	59	25.91
C50	女性乳房癌(1)	5	14	12.19	3	25	21.70	4	26	22.44	4	23	19.54	4	22	18.38	4	18	14.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78	4	42	19.22	3	54	24.64	3	52	23.41	2	58	25.73	3	54	23.71
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	8	7.71	7	11	10.65	5	17	16.45	5	13	12.45	5	16	15.14	5	13	12.20
C16	胃癌	4	33	15.09	6	26	11.90	6	20	9.12	7	24	10.81	7	21	9.32	6	26	11.42
C25	胰臟癌	8	14	6.40	5	30	13.73	7	14	6.39	6	25	11.26	6	22	9.76	8	19	8.34
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	11	5.03	11	11	5.03	10	12	5.47	10	12	5.40	9	15	6.66	9	15	6.59
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	12	5.49	9	14	6.41	12	11	5.02	8	21	9.45	8	16	7.10	7	21	9.22
C91-C95	白血病	6	17	7.77	12	9	4.12	10	12	5.47	13	6	2.70	9	15	6.66	11	9	3.95
	其他		88	40.24		102	46.67		88	40.15		90	40.52		106	47.03		87	38.21

表54-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	427	185.96	424	183.61	486	210.12	467	202.18	464	201.67	464	464.00						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	78	33.97	1	84	36.38	1	101	43.67	1	80	34.64	1	104	45.20	1	92	92.00
C22	肝和肝內膽管癌	2	65	28.31	3	56	24.25	3	65	28.10	4	58	25.11	3	62	26.95	2	64	64.00
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	23	18.81	5	17	13.81	4	23	18.64	2	34	27.55	4	32	25.99	3	33	33.00
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	60	26.13	2	69	29.88	2	68	29.40	3	60	25.98	2	63	27.38	4	51	51.00
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	14	13.04	4	18	16.69	11	6	5.56	7	14	13.02	6	12	11.22	5	20	20.00
C16	胃癌	6	22	9.58	6	19	8.23	5	31	13.40	5	33	14.29	7	23	10.00	6	25	25.00
C25	胰臟癌	7	21	9.15	8	17	7.36	6	24	10.38	6	32	13.85	5	31	13.47	6	25	25.00
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	14	6.10	9	16	6.93	8	19	8.21	10	14	6.06	8	16	6.95	8	17	17.00
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	16	6.97	6	19	8.23	8	19	8.21	8	16	6.93	10	12	5.22	9	16	16.00
C91-C95	白血病	18	5	2.18	10	14	6.06	12	10	4.32	9	15	6.49	14	9	3.91	9	16	16.00
	其他		109	47.47		95	41.14		120	51.88		111	48.06		100	43.46		105	45.97

表54-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口														
		84年			93年			94年			95年					
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	244	141.22	245	154.05	282	178.58	267	169.02	258	162.22					
162	肺癌	1	48	27.78	1	53	33.32	1	53	33.56	1	57	36.08	1	64	40.24
153,154	結腸直腸癌	4	30	17.36	2	41	25.78	4	32	20.26	3	31	19.62	2	39	24.52
155	肝癌	2	41	23.73	3	34	21.38	3	34	21.53	2	41	25.95	3	32	20.12
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	5	7	8.17	9	5	6.17	18	2	2.48	8	6	7.41	4	9	11.01
151	胃癌	3	34	19.68	4	21	13.20	5	25	15.83	5	20	12.66	5	12	7.55
200,202,203	非何杰金淋巴癌	17	3	1.74	8	10	6.29	6	20	12.67	7	13	8.23	6	11	6.92
150	食道癌	11	6	3.47	12	6	3.77	10	9	5.70	12	6	3.80	6	11	6.92
157	胰臟癌	9	8	4.63	7	12	7.55	7	11	6.97	9	9	5.70	8	10	6.29
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	6	6	7.00	6	9	11.11	2	19	23.55	4	14	17.28	9	5	6.12
204-208	白血病	12	5	2.89	14	5	3.14	13	8	5.07	11	7	4.43	10	9	5.66
	其他		56	32.41		49	30.81		69	43.70		63	39.88		56	35.21

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	303	190.07	276	173.54	278	174.68	263	163.87	305	188.50	248	152.48						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64	1	57	35.84	1	64	40.22	1	56	34.89	1	62	38.32	1	51	31.36
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48	2	33	20.75	3	37	23.25	2	38	23.68	2	51	31.52	2	42	25.82
C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70	3	31	19.49	2	41	25.76	3	32	19.94	3	45	27.81	4	30	18.44
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	16	19.48	4	15	18.27	4	14	17.01	4	15	18.04	5	11	13.10	3	19	22.46
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	9	11.65	9	5	6.50	7	5	6.51	5	9	11.63	4	13	16.70	6	7	8.97
C16	胃癌	5	29	18.19	5	25	15.72	5	19	11.94	7	11	6.85	6	18	11.12	5	15	9.22
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	8	5.02	14	5	3.14	8	9	5.66	11	6	3.74	9	10	6.18	8	10	6.15
C25	胰臟癌	9	9	5.65	7	13	8.17	6	16	10.05	6	16	9.97	7	13	8.03	7	14	8.61
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	7	6	7.30	8	6	7.31	12	3	3.65	13	3	3.61	12	3	3.57	16	2	2.36
C91-C95	白血病	8	11	6.90	14	5	3.14	9	8	5.03	7	11	6.85	10	7	4.33	17	3	1.84
	其他		75	47.05		81	50.93		62	38.96		66	41.12		72	44.50		55	33.82

表54-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年					
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	291	178.24	317	194.56	314	194.50	295	184.37	298	187.06	301	189.90						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	45	27.56	1	59	36.21	1	54	33.45	1	55	34.37	1	43	26.99	1	52	32.81
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	42	25.73	3	42	25.78	4	42	26.02	2	40	25.00	2	39	24.48	2	45	28.39
C22	肝和肝內膽管癌	2	43	26.34	4	40	24.55	3	43	26.64	5	25	15.62	3	36	22.60	3	36	22.71
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	14	16.45	2	22	25.87	2	27	32.02	3	17	20.33	4	17	20.42	4	17	20.50
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	11	14.07	5	11	14.12	5	10	12.97	4	13	17.02	7	10	13.15	5	13	17.20
C16	胃癌	7	21	12.86	7	19	11.66	6	16	9.91	7	18	11.25	5	23	14.44	6	21	13.25
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	10	6.13	9	8	4.91	7	15	9.29	9	12	7.50	12	9	5.65	7	17	10.73
C25	胰臟癌	5	24	14.70	6	21	12.89	9	13	8.05	6	20	12.50	6	21	13.18	8	15	9.46
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	8	8	9.40	8	8	9.41	10	5	5.93	16	2	2.39	10	5	6.01	9	7	8.44
C91-C95	白血病	14	5	3.06	14	6	3.68	11	9	5.57	11	8	5.00	8	12	7.53	10	13	8.20
	其他		68	41.65		81	49.71		80	49.55		85	52.65		83	51.41		65	41.01

表54-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口														
		84年			93年			94年			95年					
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	230	168.33	205	158.94	228	178.60	273	215.19	259	204.70					
162	肺癌	1	45	32.93	1	40	31.01	1	41	32.12	2	51	40.20	1	54	42.68
155	肝癌	2	39	28.54	1	40	31.01	3	34	26.63	1	57	44.93	2	40	31.61
153,154	結腸直腸癌	4	22	16.10	3	26	20.16	4	29	22.72	3	30	23.65	3	35	27.66
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	5	10	14.75	5	7	10.87	2	18	28.19	4	13	20.44	4	14	22.02
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	12	3	4.36	13	3	4.64	10	4	6.27	7	6	9.48	5	10	15.89
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	11	3	4.43	9	3	4.66	11	3	4.70	10	5	7.86	6	8	12.58
151	胃癌	3	30	21.96	4	15	11.63	5	14	10.97	8	12	9.46	7	14	11.06
157	胰臟癌	6	9	6.59	7	8	6.20	13	5	3.92	6	13	10.25	8	12	9.48
200,202,203	非何杰金淋巴癌	6	9	6.59	7	8	6.20	7	11	8.62	11	9	7.09	9	9	7.11
150	食道癌	9	8	5.86	14	3	2.33	6	14	10.97	9	11	8.67	10	8	6.32
	其他		52	38.06		52	40.32		55	43.08		66	52.02		55	43.47

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	267	212.93	255	205.60	255	205.65	244	194.24	288	225.49	282	218.07						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66	1	56	45.15	1	56	45.16	1	60	47.76	1	56	43.84	1	59	45.63
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91	3	29	23.38	3	35	28.23	3	26	20.70	2	48	37.58	3	33	25.52
C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47	2	36	29.03	2	47	37.90	2	36	28.66	3	39	30.53	2	53	40.99
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	16	25.32	4	11	17.55	4	9	14.33	4	12	18.81	4	11	16.93	4	9	13.65
C16	胃癌	5	14	11.17	5	21	16.93	6	14	11.29	5	16	12.74	5	16	12.53	5	14	10.83
C25	胰臟癌	15	5	3.99	8	12	9.68	9	7	5.65	7	10	7.96	6	14	10.96	5	14	10.83
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	8	6.38	7	15	12.09	9	7	5.65	6	14	11.14	6	14	10.96	7	11	8.51
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	13	3	4.82	6	8	13.04	7	5	8.17	9	4	6.47	8	6	9.56	12	3	4.73
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	20	1	1.58	14	2	3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	6.07
C15	食道癌	6	9	7.18	11	7	5.64	5	15	12.10	12	5	3.98	9	10	7.83	8	9	6.96
	其他		68	54.23		58	46.76		60	48.39		61	48.56		74	57.94		73	56.45

表54-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	236	180.99	300	229.09	270	206.90	298	229.81	303	235.89	304	239.68						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	57	43.71	2	48	36.65	1	66	50.57	1	65	50.13	3	38	29.58	1	62	48.88
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	37	28.37	1	51	38.95	3	33	25.29	3	39	30.08	4	34	26.47	2	44	34.69
C22	肝和肝內膽管癌	3	36	27.61	3	45	34.36	4	32	24.52	2	45	34.70	1	54	42.04	3	34	26.81
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	11	16.51	4	12	17.92	6	9	13.48	4	17	25.60	2	22	33.41	4	17	26.08
C16	胃癌	5	15	11.50	5	22	16.80	5	20	15.33	7	13	10.03	8	14	10.90	5	19	14.98
C25	胰臟癌	8	6	4.60	6	19	14.51	7	15	11.49	5	21	16.19	7	16	12.46	6	17	13.40
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	11	8.44	11	8	6.11	8	10	7.66	11	7	5.40	9	12	9.34	7	16	12.61
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	6	9.41	7	8	12.50	2	17	26.67	8	5	7.90	5	14	22.36	8	7	11.35
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	15	2	3.00	-	-	-	14	2	3	20	1	2	16	2	3	9	6	9.21
C15	食道癌	13	5	3.83	9	11	8.40	9	9	6.90	6	16	12.34	11	10	7.79	10	11	8.67
	其他		50	38.34		76	58.04		57	43.68		69	53.21		87	67.73		71	55.98

表54-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口														
		84年			93年			94年			95年					
順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	270	125.11	414	208.19	431	219.79	427	219.19	458	236.48					
155	肝癌	1	50	23.17	2	71	35.70	2	55	28.05	2	72	36.96	1	94	48.54
162	肺癌	2	48	22.24	1	75	37.72	1	88	44.88	1	84	43.12	2	84	43.37
153,154	結腸直腸癌	4	26	12.05	3	47	23.64	3	42	21.42	3	67	34.39	3	55	28.40
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	6	8	7.60	5	15	15.35	4	19	19.68	5	15	15.60	4	18	18.77
151	胃癌	3	42	19.46	4	36	18.10	5	37	18.87	4	32	16.43	5	35	18.07
200,202,203	非何杰金淋巴癌	9	9	4.17	12	13	6.54	13	10	5.10	11	10	5.13	6	24	12.39
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	8	5	4.52	8	10	9.89	7	12	12.05	6	14	14.19	7	9	9.21
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	12	5.56	7	20	10.06	6	27	13.77	8	22	11.29	8	16	8.26
150	食道癌	16	4	1.85	10	14	7.04	11	18	9.18	15	6	3.08	9	16	8.26
156	膽囊癌	10	6	2.78	15	7	3.52	9	22	11.22	17	5	2.57	10	15	7.74
	其他		60	27.80		106	53.30		101	51.51		100	51.33		92	47.50

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因	394	205.83	419	221.23	446	236.27	426	224.24	448	233.65	464	240.35								
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54	1	79	41.71	1	86	45.56	1	91	47.90	1	90	46.94	1	101	52.32		
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	7	9	9.47	6	15	15.90	4	24	25.41	4	24	25.15	5	14	14.50	4	23	23.63		
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08	3	57	30.10	3	50	26.49	3	52	27.37	2	64	33.38	3	59	30.56		
C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70	1	79	41.71	2	77	40.79	2	61	32.11	3	60	31.29	2	82	42.48		
C25	胰臟癌	5	20	10.45	8	17	8.98	8	21	11.12	7	17	8.95	7	22	11.47	8	17	8.81		
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75	7	20	10.56	7	23	12.18	7	17	8.95	6	23	12.00	5	27	13.99		
C15	食道癌	16	6	3.13	8	17	8.98	14	8	4.24	11	10	5.26	9	16	8.34	10	15	7.77		
C16	胃癌	4	25	13.06	4	35	18.48	5	38	20.13	5	34	17.90	4	33	17.21	5	27	13.99		
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	10	10.37	5	16	16.83	13	4	4.24	6	16	16.92	8	10	10.50	7	13	13.58		
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	9	4.70	14	7	3.70	10	11	5.83	9	14	7.37	11	13	6.78	11	10	5.18		
	其他		89	46.50		77	40.65		104	55.09		90	47.37		103	53.72		90	46.62		

表54-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年					
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	458	235.96	459	235.96	456	235.13	438	227.30	468	245.38	461	244.77						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	100	51.52	1	91	46.78	1	84	43.31	1	99	51.38	1	95	49.81	1	106	56.28
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	25	25.49	4	29	29.45	4	26	26.43	5	19	19.39	3	26	26.77	2	35	36.44
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	60	30.91	2	65	33.41	3	57	29.39	3	59	30.62	4	47	24.64	3	66	35.04
C22	肝和肝內膽管癌	2	65	33.49	2	65	33.41	2	63	32.48	2	66	34.25	2	70	36.70	4	53	28.14
C25	胰臟癌	8	20	10.30	9	17	8.74	7	23	11.86	7	19	9.86	6	24	12.58	5	24	12.74
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	28	14.43	7	21	10.80	8	20	10.31	7	19	9.86	9	20	10.49	6	23	12.21
C15	食道癌	9	15	7.73	8	19	9.77	9	15	7.73	14	8	4.15	8	21	11.01	6	23	12.21
C16	胃癌	6	29	14.94	6	26	13.37	5	34	17.53	6	23	11.94	7	22	11.53	8	19	10.09
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	16	16.66	5	15	15.62	6	12	12.56	4	19	20.06	5	18	19.23	9	9	9.75
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	14	7.21	10	14	7.20	10	13	6.70	10	14	7.27	14	10	5.24	10	18	9.56
	其他		86	44.31		97	49.86		109	56.20		93	48.26		115	60.30		85	45.13

表54-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口														
		84年			93年			94年			95年					
順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	274	121.59	406	157.81	384	148.55	411	157.96	411	157.15					
162	肺癌	1	53	23.52	1	90	34.98	1	84	32.50	1	88	33.82	1	85	32.50
155	肝癌	2	51	22.63	2	63	24.49	3	43	16.63	3	45	17.30	2	53	20.26
153,154	結腸直腸癌	5	28	12.42	4	45	17.49	2	44	17.02	2	53	20.37	3	43	16.44
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	3	16	14.36	3	25	19.18	4	19	14.47	4	21	15.83	4	19	14.20
151	胃癌	4	29	12.87	6	24	9.33	5	36	13.93	5	34	13.07	5	33	12.62
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	8	5	4.39	5	12	9.45	6	14	11.01	6	16	12.55	6	13	10.18
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	9	8.08	9	8	6.14	10	7	5.33	12	6	4.52	7	11	8.22
157	胰臟癌	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	7	24	9.22	8	16	6.12
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	4	3.59	15	4	3.07	16	3	2.28	8	9	6.78	9	8	5.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	9	16	6.15	10	15	5.74
	其他		65	28.84		211	82.01		202	78.14		203	78.02		215	82.20

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	426	162.79	394	150.79	417	159.41	449	169.83	486	181.43	403	149.08						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83	1	82	31.38	1	95	36.32	1	104	39.34	1	96	35.84	1	69	25.52
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	3	28	20.87	4	19	14.15	3	27	20.03	4	27	19.79	4	26	18.79	6	17	12.16
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34	3	47	17.99	2	58	22.17	2	68	25.72	3	57	21.28	3	53	19.61
C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46	2	58	22.20	4	49	18.73	3	56	21.18	2	70	26.13	2	57	21.09
C25	胰臟癌	7	18	6.88	7	16	6.12	8	15	5.73	10	17	6.43	7	23	8.59	7	24	8.88
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	9	7.06	5	16	12.60	6	17	13.41	6	11	8.60	6	14	10.81	5	16	12.26
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	12	4.59	10	12	4.59	7	17	6.50	9	19	7.19	8	17	6.35	9	15	5.55
C16	胃癌	5	21	8.02	6	29	11.10	5	43	16.44	5	30	11.35	5	46	17.17	4	35	12.95
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	7	5.22	13	5	3.72	9	6	4.45	7	11	8.06	10	6	4.34	12	5	3.58
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	11	4.20	14	9	3.44	11	9	3.44	11	11	4.16	9	14	5.23	10	12	4.44
	其他		109	41.65		101	38.65		81	30.96		95	35.93		117	43.68		100	36.99

表54-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	462	169.46	453	164.94	485	176.17	427	155.37	452	164.91	509	186.59						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	93	34.11	1	85	30.95	1	85	30.88	1	92	33.48	1	93	33.93	1	103	37.76
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	2	41	29.03	4	28	19.66	2	36	25.18	4	24	16.80	2	34	23.83	2	45	31.65
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	63	23.11	2	60	21.85	3	62	22.52	2	51	18.56	3	60	21.89	3	65	23.83
C22	肝和肝內膽管癌	3	69	25.31	3	56	20.39	4	50	18.16	3	48	17.47	4	50	18.24	4	61	22.36
C25	胰臟癌	7	19	6.97	10	16	5.83	8	27	9.81	6	28	10.19	6	22	8.03	5	38	13.93
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	10	7.61	5	23	17.40	5	20	15.12	5	17	12.89	7	8	6.09	6	13	9.95
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	13	4.77	12	10	3.64	10	20	7.26	13	7	2.55	10	12	4.38	7	27	9.90
C16	胃癌	5	33	12.10	6	32	11.65	6	30	10.90	7	24	8.73	5	34	12.40	8	24	8.80
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	15	4	2.83	8	12	8.42	7	15	10.49	8	9	6.30	14	5	3.50	9	9	6.89
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	17	6.24	9	18	6.55	8	27	9.81	10	14	5.09	9	13	4.74	10	16	5.87
	其他		100	36.68		113	41.14		113	41.05		113	41.12		121	44.15		108	39.59

表54-9・臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因		139	123.11		193	170.72		186	164.58		206	182.05		195	171.83					
162	肺癌	1	28	24.80	2	36	31.84	2	34	30.08	2	33	29.16	1	41	36.13					
155	肝癌	2	23	20.37	1	37	32.73	1	39	34.51	1	38	33.58	2	30	26.43					
153,154	結腸直腸癌	5	12	10.63	6	17	15.04	3	22	19.47	3	24	21.21	3	24	21.15					
151	胃癌	3	16	14.17	4	19	16.81	6	12	10.62	4	19	16.79	4	15	13.22					
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	4	6	10.80	3	10	17.73	4	9	15.96	5	8	14.14	5	7	12.30					
200,202,203	非何杰金淋巴癌	8	6	5.31	15	4	3.54	9	6	5.31	7	8	7.07	6	11	9.69					
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	14	1	1.74	11	3	5.30	7	4	7.07	7	4	7.07	7	5	8.84					
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	10	8.86	8	8	7.08	12	5	4.42	6	10	8.84	8	8	7.05					
156	膽囊癌	10	4	3.54	8	8	7.08	9	6	5.31	11	5	4.42	8	8	7.05					
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	5	9.00	5	9	15.96	5	7	12.41	17	1	1.77	10	4	7.03					
	其他		28	24.80		42	37.15		42	37.16		56	49.49		42	37.01					

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-9・臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	186	163.60	206	181.64	215	189.28	195	169.45	222	189.24	226	189.72						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66	1	52	45.85	1	51	44.90	1	44	38.24	1	48	40.92	1	43	36.10
C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87	3	22	19.40	2	37	32.57	2	30	26.07	2	36	30.69	2	32	26.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47	2	28	24.69	4	25	22.01	3	23	19.99	4	30	25.57	4	22	18.47
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	2	14	24.46	4	8	13.97	3	15	26.05	4	10	17.09	3	18	30.12	3	13	21.38
C16	胃癌	3	26	22.87	5	13	11.46	6	13	11.45	5	12	10.43	6	11	9.38	6	13	10.91
C25	胰臟癌	7	8	7.04	5	13	11.46	9	7	6.16	6	10	8.69	8	8	6.82	9	9	7.56
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	4	7.09	7	6	10.69	8	4	7.14	9	3	5.30	5	8	13.90	7	6	10.29
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	5	4.40	9	7	6.17	5	15	13	6	10	8.69	8	8	6.82	5	15	12.59
C15	食道癌	7	8	7.04	14	4	3.53	7	9	7.92	13	3	2.61	7	9	7.67	10	7	5.88
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	10	3	5.24	12	3	5.24	0	0	0.00	18	1	1.71	10	4	6.69	11	3	4.93
	其他		35	30.78		50	44.09		39	34.34		49	42.58		42	35.80		63	52.89

表54-9・臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	228	189.20	231	189.73	213	174.05	204	166.75	280	229.67	246	203.33						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	45	37.34	1	45	36.96	1	44	35.95	1	44	35.97	1	63	51.68	1	47	38.85
C22	肝和肝內膽管癌	2	36	29.87	2	33	27.10	2	35	28.60	3	31	25.34	3	34	27.89	2	32	26.45
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	24	19.92	3	30	24.64	4	29	23.70	4	29	23.71	2	36	29.53	3	30	24.80
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	5	10	16.23	4	10	16.05	3	15	23.97	2	18	28.79	4	14	22.46	4	14	22.62
C16	胃癌	6	19	15.77	5	19	15.61	7	6	4.90	6	11	8.99	12	8	6.56	5	19	15.70
C25	胰臟癌	8	8	6.64	6	14	11.50	7	6	4.90	9	7	5.72	5	14	11.48	6	17	14.05
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	4	10	16.98	10	3	5.05	6	4	6.69	5	7	11.70	10	5	8.39	7	7	11.85
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	7	5.81	7	8	6.57	7	6	5	9	7	5.72	7	13	10.66	8	10	8.27
C15	食道癌	9	7	5.81	8	7	5.75	7	6	4.90	7	8	6.54	9	11	9.02	8	10	8.27
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	7	7	11.36	21	1	1.61	5	6	9.59	12	2	3.20	8	6	9.62	10	5	8.08
	其他		55	45.64		61	50.10		56	45.76		40	32.70		76	62.34		55	45.46

表54-10 · 臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口														
		84年			93年			94年			95年					
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	198	88.79	314	120.54	306	117.01	357	135.62	373	140.72					
162	肺癌	2	29	13.00	2	55	21.11	1	56	21.41	1	87	33.05	1	71	26.79
153,154	結腸直腸癌	4	19	8.52	3	41	15.74	3	41	15.68	4	33	12.54	2	52	19.62
155	肝癌	1	42	18.83	1	58	22.27	2	43	16.44	2	53	20.13	3	47	17.73
151	胃癌	3	25	11.21	6	19	7.29	7	24	9.18	4	33	12.54	4	33	12.45
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	5	8	7.20	4	13	9.80	4	15	11.22	3	19	14.08	5	16	11.74
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	18	2	1.79	5	12	9.39	6	12	9.39	9	7	5.46	6	15	11.65
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.79	9	13	4.99	15	5	1.91	10	10	3.80	7	16	6.04
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	8	3	2.70	15	4	3.01	10	6	4.49	11	5	3.70	8	8	5.87
200,202,201	非何杰金淋巴癌	9	6	2.69	10	11	4.22	9	12	4.59	8	16	6.08	9	15	5.66
157	胰臟癌	11	5	2.24	8	14	5.37	12	9	3.44	6	19	7.22	9	15	5.66
	其他		55	24.66		74	28.41		83	31.74		75	28.49		85	32.07

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-10・臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	366	137.51	365	136.57	364	135.33	376	137.75	418	150.45	403	143.20						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55	1	74	27.69	1	77	28.63	1	85	31.14	1	71	25.55	1	89	31.62
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	3	21	15.32	4	16	11.60	4	20	14.37	4	19	13.43	4	23	15.95	4	20	13.67
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28	2	60	22.45	2	48	17.85	3	37	13.56	3	56	20.16	3	55	19.54
C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80	3	59	22.08	3	46	17.10	2	56	20.52	2	63	22.68	2	69	24.52
C16	胃癌	5	25	9.39	5	21	7.86	6	21	7.81	6	21	7.69	8	20	7.20	7	21	7.46
C25	胰臟癌	7	16	6.01	7	17	6.36	9	12	4.46	7	20	7.33	9	18	6.48	10	14	4.97
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	9	6.97	6	9	6.96	5	11	8.48	5	16	12.17	7	10	7.48	5	15	11.10
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	11	4.13	9	14	5.24	11	10	3.72	11	8	2.93	9	18	6.48	10	14	4.97
C15	食道癌	9	12	4.51	10	10	3.74	7	16	5.95	10	11	4.03	11	16	5.76	13	9	3.20
C67	膀胱癌	15	6	2.25	14	7	2.62	12	9	3.35	18	5	1.83	16	6	2.16	20	3	1.07
	其他		86	32.31		78	29.19		94	34.95		98	35.90		117	42.11		94	33.40

表54-10・臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	398	139.99	458	159.77	461	160.26	409	142.14	416	144.65	450	157.01						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	88	30.95	1	84	29.30	1	85	29.55	1	83	28.84	1	87	30.25	1	83	28.96
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	19	12.84	4	26	17.41	4	24	16.00	3	27	17.98	2	34	22.63	2	38	25.35
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	48	16.88	3	54	18.84	2	62	21.55	4	43	14.94	4	43	14.95	3	59	20.59
C22	肝和肝內膽管癌	3	46	16.18	2	63	21.98	3	61	21.21	2	65	22.59	3	53	18.43	4	53	18.49
C16	胃癌	5	28	9.85	5	30	10.47	6	24	8.34	8	19	6.60	9	17	5.91	5	27	9.42
C25	胰臟癌	14	10	3.52	6	26	9.07	11	17	5.91	6	25	8.69	5	28	9.74	5	27	9.42
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	13	9.54	7	10	7.28	5	14	10.17	5	15	10.90	10	6	4.37	7	12	8.78
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	17	5.98	8	18	6.28	6	24	8.34	9	18	6.26	6	19	6.61	8	20	6.98
C15	食道癌	12	11	3.87	8	18	6.28	13	10	3.48	13	8	2.78	13	10	3.48	9	14	4.88
C67	膀胱癌	12	11	3.87	12	13	4.53	14	9	3.13	10	16	5.56	16	6	2.09	10	13	4.54
	其他	107	37.64		116	40.47		131	45.54		90	31.28		113	39.29		104	36.29	

表54-11 · 臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口												
		84年			93年			94年			95年			
順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因	322	107.80	476	164.67	456	158.15	489	169.80	533	185.31			
162	肺癌	1	74	24.77	1	120	41.51	1	99	34.33	1	101	35.07	1
155	肝癌	2	62	20.76	2	66	22.83	2	67	23.24	2	83	28.82	2
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	5	10	6.67	4	26	17.74	6	13	8.87	3	28	19.09	3
153,154	結腸直腸癌	4	28	9.37	3	56	19.37	2	67	23.24	4	54	18.75	4
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	7	7	4.70	6	15	10.53	4	18	12.69	6	15	10.62	5
151	胃癌	3	29	9.71	5	32	11.07	5	32	11.10	5	39	13.54	6
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	6	4.00	8	9	6.14	15	4	2.73	8	9	6.14	7
200,202,201	非何杰金淋巴癌	11	9	3.01	12	14	4.84	9	16	5.55	10	16	5.56	8
157	胰臟癌	10	11	3.68	11	15	5.19	7	22	7.63	12	15	5.21	9
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	6	2.01	7	24	8.30	9	16	5.55	7	19	6.60	10
	其他		80	26.78		99	34.25		102	35.38		110	38.20	
														132
														45.89

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-11・臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	475	165.76	482	169.15	483	169.95	546	191.04	498	172.93	600	207.38						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15	1	114	40.01	1	99	34.83	1	125	43.74	1	107	37.15	1	114	39.40
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82	2	86	30.18	2	71	24.98	2	74	25.89	2	71	24.65	3	70	24.19
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38	4	45	15.79	3	59	20.76	3	67	23.44	3	54	18.75	2	73	25.23
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	27	18.43	3	24	16.44	4	20	13.71	4	27	18.36	4	22	14.84	4	30	20.12
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	15	10.71	5	15	10.79	6	11	7.96	12	6	4.32	5	14	10.02	5	19	13.55
C16	胃癌	5	33	11.52	6	29	10.18	5	32	11.26	5	34	11.90	6	27	9.38	6	33	11.41
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	8	5.46	12	6	4.11	10	7	4.80	18	4	2.72	8	9	6.07	9	12	8.05
C25	胰臟癌	8	18	6.28	7	28	9.83	7	21	7.39	6	31	10.85	7	18	6.25	6	33	11.41
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93	8	14	4.91	9	17	5.98	7	20	7.00	12	13	4.51	8	31	10.71
C15	食道癌	7	19	6.63	13	10	3.51	8	20	7.04	8	17	5.95	10	15	5.21	10	23	7.95
	其他		102	35.60		111	38.95		126	44.34		141	49.33		148	51.39		162	55.99

表54-11 · 臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	537 185.11			509 175.17			566 194.96			576 199.23			578 201.10			561 196.84		
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	125	43.09	1	105	36.14	1	134	46.16	1	142	49.12	1	112	38.97	1	108	37.89
C22	肝和肝內膽管癌	3	66	22.75	3	65	22.37	2	83	28.59	3	70	24.21	4	74	25.75	2	86	30.18
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	25.85	2	81	27.88	3	69	23.77	2	74	25.60	2	98	34.10	3	67	23.51
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	31	20.71	4	22	14.66	4	26	17.32	4	31	20.73	3	39	26.20	4	34	23.02
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	7	11	7.83	5	17	12.10	5	23	16.40	6	16	11.47	6	18	12.99	5	20	14.56
C16	胃癌	6	29	10.00	7	30	10.32	6	35	12.06	7	26	8.99	7	26	9.05	6	37	12.98
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	7	4.68	9	7	4.66	8	12	8.00	9	10	6.69	11	7	4.70	7	17	11.51
C25	胰臟癌	5	35	12.06	6	34	11.70	7	24	8.27	5	38	13.14	5	44	15.31	8	28	9.82
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	21	7.24	8	20	6.88	9	18	6.20	8	22	7.61	8	20	6.96	9	21	7.37
C15	食道癌	9	16	5.52	10	13	4.47	11	16	5.51	12	16	5.53	9	15	5.22	10	16	5.61
	其他	121 41.71			115 39.58			126 43.40			131 45.31			125 43.49			127 44.56		

表54-12 · 臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年						93年						94年						95年						
		順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		277	114.03		375	150.60		399	160.59		401	161.17		463	185.33										
162	肺癌	2	52	21.41	1	81	32.53	1	78	31.39	1	92	36.98	1	106	42.43										
155	肝癌	1	58	23.88	2	72	28.91	2	64	25.76	2	63	25.32	2	61	24.42										
153,154	結腸直腸癌	5	18	7.41	3	42	16.87	3	52	20.93	3	46	18.49	3	59	23.62										
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	3	19	15.73	5	13	10.30	5	16	12.67	6	12	9.47	4	19	14.89										
151	胃癌	4	22	9.06	4	34	13.65	4	32	12.88	4	34	13.67	5	33	13.21										
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	18	2	1.64	6	9	7.33	6	13	10.64	7	8	6.56	6	15	12.28										
200,202,201	非何杰金淋巴癌	11	6	2.47	11	11	4.42	8	16	6.44	8	15	6.03	7	26	10.41										
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	8	6.62	7	8	6.34	9	8	6.34	5	13	10.25	8	9	7.05										
157	胰臟癌	7	10	4.12	9	13	5.22	11	12	4.83	10	13	5.22	9	17	6.80										
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.65	10	12	4.82	7	17	6.84	10	13	5.22	10	16	6.40										
	其他		78	32.11		80	32.13		91	36.63		92	36.98		102	40.83										

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-12・臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	464	185.70	432	173.56	424	170.54	444	177.07	482	190.33	463	181.70						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82	1	84	33.75	1	97	39.01	1	92	36.69	1	97	38.30	1	95	37.28
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81	2	59	23.70	5	45	18.10	4	55	21.93	3	61	24.09	3	54	21.19
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62	3	57	22.90	2	59	23.73	2	73	29.11	2	70	27.64	2	72	28.26
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	20	15.62	4	28	21.92	3	28	21.90	3	29	22.46	5	17	13.03	4	24	18.27
C25	胰臟癌	8	19	7.60	8	17	6.83	8	17	6.84	6	17	6.78	7	21	8.29	8	18	7.06
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	14	11.49	5	14	11.56	4	23	19.04	7	8	6.58	6	14	11.40	5	15	12.15
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.20	7	20	8.04	9	15	6.03	8	16	6.38	8	16	6.32	6	28	10.99
C16	胃癌	6	27	10.81	6	27	10.85	6	23	9.25	5	29	11.57	4	44	17.37	7	21	8.24
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	19	7.60	11	13	5.22	10	14	5.63	11	10	3.99	11	12	4.74	10	15	5.89
C15	食道癌	10	13	5.20	8	17	6.83	11	12	4.83	8	16	6.38	13	11	4.34	12	12	4.71
	其他		116	46.43		96	38.57		91	36.60		99	39.48		119	46.99		109	42.78

表54-12・臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		103年			104年			105年			106年			107年			108年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	460	179.35	487	188.99	450	174.68	506	196.95	527	205.86	517	203.20						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	84	32.75	1	93	36.09	1	107	41.53	1	93	36.20	1	115	44.92	1	95	37.34
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	65	25.34	3	64	24.84	3	54	20.96	2	76	29.58	2	77	30.08	2	79	31.05
C22	肝和肝內膽管癌	3	58	22.61	2	68	26.39	2	62	24.07	3	64	24.91	3	64	25.00	3	75	29.48
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	22	16.62	4	24	18.02	4	20	15.01	4	28	21.04	5	19	14.31	4	35	26.49
C25	胰臟癌	5	32	12.48	5	32	12.42	7	21	8.15	6	28	10.90	8	18	7.03	5	29	11.40
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	7	14	11.28	6	15	12.05	5	13	10.46	5	16	12.92	6	14	11.36	6	12	9.81
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	19	7.41	8	25	9.70	12	12	4.66	8	23	8.95	7	23	8.98	7	20	7.86
C16	胃癌	6	30	11.70	7	26	10.09	6	24	9.32	8	23	8.95	4	37	14.45	7	20	7.86
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	13	5.07	9	14	5.43	10	14	5.43	11	15	5.84	10	12	4.69	9	18	7.07
C15	食道癌	9	18	7.02	10	11	4.27	16	7	2.72	12	14	5.45	10	12	4.69	10	17	6.68
	其他		105	40.94		115	44.63		116	45.03		126	49.04		136	53.13		117	45.99

伍、歷年主要癌症發生率

表55・臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人／每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率
87年	287.79	231.95	43.41	33.25	44.57	37.95	39.66	32.28	25.24	19.54	24.55	17.05	16.87	14.86	6.98	5.35
88年	306.62	268.49	43.38	36.36	46.89	42.54	42.84	38.20	24.29	20.45	29.10	23.72	18.40	16.97	6.95	5.66
89年	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90年	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91年	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92年	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93年	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94年	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95年	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26
96年	378.22	269.92	52.91	35.29	50.72	37.87	59.72	41.30	25.13	16.59	43.60	29.51	25.05	19.30	9.16	6.40
97年	419.14	290.36	57.04	37.19	53.42	38.00	70.42	48.07	26.67	16.95	55.16	34.93	28.80	21.56	9.99	6.85
98年	433.34	291.45	62.83	39.86	52.76	36.30	72.20	47.48	26.10	15.81	57.60	36.28	30.62	22.30	10.23	6.38
99年	456.61	303.85	61.07	38.75	54.41	37.43	80.47	53.22	26.61	15.61	58.37	36.42	28.59	20.26	9.82	6.30
100年	451.05	299.70	63.31	39.63	53.90	36.30	79.13	52.15	25.62	15.72	59.08	37.28	31.10	21.88	11.20	7.18
101年	459.72	298.65	61.77	37.67	52.36	34.50	83.56	53.18	24.66	14.53	57.65	35.21	30.89	21.68	10.97	6.89
102年	451.49	289.90	62.33	38.00	51.48	33.25	76.59	48.40	23.49	13.85	57.99	35.00	35.27	24.12	11.32	6.88
103年	450.13	284.34	61.75	37.69	49.63	31.14	82.04	51.02	23.15	13.21	52.25	31.00	32.26	21.93	11.35	6.95
104年	456.98	285.34	68.70	40.69	43.85	27.77	81.05	49.39	23.47	13.03	57.35	33.43	33.50	22.41	14.28	8.64
105年	460.64	280.31	68.01	39.96	44.28	27.28	79.02	46.85	22.57	12.09	58.32	32.88	30.86	20.37	11.09	6.75
106年	476.01	282.54	72.08	41.47	47.98	27.79	79.57	46.31	20.67	11.67	66.38	36.16	31.59	20.41	13.89	7.97

資料來源：國民健康署。

附 註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表55・臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人／每十萬男性人口

年別	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率
87年	7.06	5.71	5.37	5.20	7.29	6.22	12.66	9.50	2.91	2.31	5.98	5.06	2.53	2.46	3.61	2.86
88年	9.39	8.39	5.04	4.86	8.94	8.06	13.52	11.32	2.67	2.19	3.89	3.34	3.67	3.68	4.89	4.26
89年	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90年	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91年	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92年	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93年	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94年	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95年	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69
96年	10.96	7.94	9.78	8.19	10.02	7.85	11.19	7.32	4.07	2.78	6.18	4.67	3.13	2.59	4.07	2.97
97年	12.75	9.08	9.13	7.31	8.81	7.04	13.06	8.79	3.86	2.54	7.55	5.34	3.78	3.51	4.48	3.04
98年	11.19	7.77	9.84	7.76	10.00	7.84	13.41	8.28	3.57	2.21	6.51	4.63	3.25	2.95	4.60	3.33
99年	12.59	8.33	12.83	9.34	9.82	7.59	13.15	8.02	4.75	3.15	9.43	6.48	4.59	3.50	5.54	3.49
100年	10.89	7.25	11.83	9.23	9.25	7.21	14.10	8.70	4.39	2.49	7.99	5.77	2.90	2.25	4.54	2.94
101年	12.37	8.03	11.20	8.01	9.96	7.35	12.91	7.80	4.59	2.75	10.43	7.03	3.73	3.17	3.97	2.60
102年	11.55	7.43	11.40	8.32	8.06	6.00	13.95	8.19	4.34	2.59	9.77	6.54	3.57	2.86	4.42	2.83
103年	14.20	9.03	10.65	7.25	9.34	6.89	13.20	7.60	5.71	3.24	11.65	7.80	3.16	2.49	4.17	2.70
104年	11.58	7.18	10.11	7.12	7.56	5.59	13.05	7.48	4.79	2.70	10.34	6.87	3.94	3.15	4.32	2.53
105年	11.48	7.22	11.17	7.73	7.06	5.13	13.96	7.55	6.20	3.50	9.62	6.03	3.10	2.27	5.12	3.18
106年	13.50	8.20	13.26	8.93	7.41	5.38	15.52	8.11	4.45	2.30	12.17	7.64	3.04	2.08	5.54	3.33

表56・臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率
87年	282.48	240.29	21.06	18.80	31.62	27.55	55.26	45.34	16.12	14.77	12.39	10.47	3.34	2.97	24.48	20.76
88年	293.65	268.19	20.05	19.10	32.44	30.93	65.92	57.65	18.77	18.27	13.66	12.77	3.53	3.31	22.15	19.72
89年	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90年	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91年	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92年	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93年	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94年	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95年	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21
96年	328.84	236.19	32.11	22.18	48.16	33.66	92.48	66.76	19.53	13.51	14.06	9.49	5.62	3.78	12.06	8.53
97年	351.41	244.08	34.99	23.40	49.63	32.68	96.16	67.67	22.56	15.27	14.20	9.24	6.51	4.29	12.94	8.79
98年	396.37	269.25	43.95	28.41	54.34	35.37	109.65	76.05	21.68	13.79	15.29	9.64	8.54	5.54	14.11	9.59
99年	394.55	262.64	43.06	26.78	55.96	35.31	110.60	75.15	21.90	14.11	13.49	8.15	7.23	4.39	13.12	8.74
100年	408.04	269.40	41.47	25.97	60.89	37.26	113.70	76.63	23.13	14.31	15.06	9.29	9.89	6.18	13.53	9.05
101年	413.08	268.08	46.83	28.44	60.31	36.11	115.93	78.19	21.04	12.94	15.20	8.71	9.08	5.43	12.54	8.44
102年	418.53	266.57	46.69	27.57	58.07	33.93	121.15	80.63	21.27	12.16	13.82	8.11	9.17	5.18	10.88	6.94
103年	443.53	278.02	50.97	29.83	61.78	35.23	125.26	82.07	21.47	12.00	15.21	8.62	9.31	5.07	10.45	6.77
104年	467.02	286.23	56.34	31.79	61.59	34.27	134.96	87.46	21.64	11.66	14.40	8.20	10.71	5.49	11.85	7.70
105年	458.26	278.50	59.45	33.22	61.66	33.61	133.13	85.84	21.55	11.24	10.74	5.69	9.96	5.28	10.03	6.34
106年	490.32	290.06	70.93	38.10	59.80	31.72	144.29	90.97	20.98	10.38	14.27	7.32	11.49	6.18	10.42	6.28

資料來源：國民健康署。

附 註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表56・臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎臟癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率	發生率	標準化 發生率
87年	9.58	8.15	4.03	3.95	3.27	2.69	8.44	7.49	2.58	2.32	4.03	3.41	2.05	1.83	3.65	3.11
88年	9.54	8.62	3.00	3.06	2.10	2.08	6.76	6.17	2.18	2.16	3.23	2.73	2.25	2.13	5.41	5.18
89年	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90年	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91年	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92年	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93年	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94年	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95年	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67
96年	11.61	8.93	5.03	4.55	3.18	2.09	13.76	10.11	2.44	1.79	2.89	2.15	2.22	2.04	5.40	3.52
97年	12.35	9.00	5.25	4.19	3.85	2.48	16.79	11.52	3.55	2.64	3.40	2.60	2.96	2.61	5.18	3.21
98年	12.62	9.16	7.28	5.54	3.49	2.15	16.26	11.06	3.86	2.61	2.08	1.53	1.71	1.50	5.57	3.38
99年	13.79	9.96	6.19	4.66	4.20	2.58	19.76	13.57	3.83	2.44	3.02	2.13	2.51	2.17	4.65	2.88
100年	14.11	10.06	6.47	5.33	4.00	2.33	18.77	12.58	3.49	2.31	2.69	2.02	3.27	2.62	5.24	3.05
101年	11.89	8.56	7.49	5.79	3.75	2.21	19.81	13.16	3.82	2.48	2.52	1.80	2.52	1.94	4.76	2.73
102年	13.25	9.12	7.80	5.91	3.08	1.65	20.69	13.61	4.15	2.74	2.94	2.04	2.65	2.38	4.08	2.34
103年	15.21	10.91	8.67	6.37	3.55	1.90	24.38	15.79	4.27	2.71	3.34	2.37	2.27	1.70	5.19	2.79
104年	14.26	9.60	6.74	4.44	4.54	2.36	23.56	14.93	6.31	3.95	1.99	1.34	2.98	2.25	5.11	2.60
105年	14.86	10.06	8.82	7.11	4.41	2.14	25.96	16.24	4.05	2.36	1.49	1.00	3.63	2.76	6.12	3.05
106年	15.49	11.14	8.35	5.95	3.78	1.72	24.41	15.17	5.85	3.29	2.43	1.68	3.35	2.61	5.28	2.46

陸、附錄

【附錄 1】108 年臺北市十大死因統計結果 慢性疾病囊括 7 項，癌症續居首席

108 年臺北市十大死因出爐，慢性疾病囊括 7 項，每 100 人中約有 63.0 人死於慢性疾病，惡性腫瘤則續居首席，而十大死因排名順序與上(107)年相較，完全一致。至於十大癌症死因仍以肺癌連續 34 年蟬聯首席，而女性乳房癌躍身為次席。

108 年臺北市民死亡人數為 1 萬 8,024 人，較上年微減 0.1% (或減 26 人)，近 10 年平均年增率 1.9%；死亡率則為每十萬人口 678.4 人，較上年微增 0.6% (或增 3.9 人)，近 10 年平均年增率 1.8%，死亡者年齡中位數為 80 歲，較全國 77 歲為高。如依世界衛生組織(WHO)公布 2000 年世界標準人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 309.9 人，較上年減 2.4% (或減 7.7 人)，近 10 年則平均年降 1.1%，並低於全國標準化死亡率 408.2 人，是全國 22 縣市中除連江縣之外，標準化死亡率最低的縣市。

108 年起我國死因統計改依「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」，而臺北市在此分類基準下，十大主要死因死亡人數占總死亡人數的 7 成 8，其中包括慢性疾病 7 項(占 63.0%)，而惡性腫瘤(占 29.5%)仍居首位，其餘依序為心臟疾病(占 15.5%)；肺炎(占 11.0%)；腦血管疾病(占 6.4%)；糖尿病(占 4.0%)；腎炎、腎病症候群及腎病變(占 2.9%)；慢性下呼吸道疾病(占 2.8%)；事故傷害(占 2.1%)；敗血症(占 1.9%)；高血壓性疾病(占 1.9%)。若與「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」之 107 年死因統計比較，其排名順位完全與上(107)年相同。

108 年臺北市十大主要死因標準化死亡率較上年增加者計 2 項，分別為肺炎(增 14.2%)、心臟疾病(高血壓性疾病除外)(增 0.4%)；而減少者有 8 項，為高血壓性疾病(減 19.6%)、慢性下呼吸道疾病(減 12.9%)、事故傷害(減 8.8%)、腎炎、腎病症候群及腎病變(減 7.7%)、腦血管疾病(減 7.6%)、敗血症(減 6.6%)、糖尿病(減 2.1%)及惡性腫瘤(減 2.0%)。

依性別觀察，死亡人數、死亡率與標準化死亡率結果呈現男高於女，分別是女性的 1.3 倍、1.4 倍與 1.6 倍。108 年兩性死因前五名皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病，若與上年相較，男性十大死因部分以糖尿病及自殺皆上升 1 名，分別為第 5 名及第 9 名，而慢性下呼吸道疾病與敗血症皆退後 1 名，分別為第 6 名及第 10 名，其餘與上年相同；女性死因部分，僅血管性及未明示之癡呆症上升 3 名為第 9 名，事故傷害則下滑 1 名為第 10 名，其餘與上年相同。男、女性標準化死亡率分別較上年減 2.2% 及減 2.6%，其中增幅最顯著分別為男性肺炎增 16.3%，女性肺炎增 11.8%，而減幅最大為男性慢性下呼吸道疾病減 16.4%，女性高血壓性疾病減 21.7%。

依年齡層觀察，108 年臺北市 15-24 歲青少年死因前三名分別為自殺(占 35.4%)、事故傷害(占 26.6%)及惡性腫瘤(占 6.3%)；25-44 歲壯年則以惡性腫瘤(占 32.7%)為首、自殺(占 16.5%)及心臟疾病(占 10.6%)次之；45-64 歲中年仍以惡性腫瘤(占 46.8%)居首、心臟疾病(占 12.8%)及腦血管疾病(占 5.5%)次之；65 歲以上老年則以惡性腫瘤(占 26.0%)、心臟疾病(占 16.4%)及肺炎(占 13.2%)分列前三名。

108 年臺北市民因自殺死亡人數為 339 人，較上年減 2.9%(或減 10 人)，其死亡人數依年齡層分以 45-64 歲最多占 38.1%，65 歲以上次之占 27.1%。108 年自殺死亡率為每十萬人口 12.8 人，相較上年減 2.2%，為全國自殺死亡率，除金門縣(10.7 人)與連江縣(7.6 人)外之最低縣市。

108 年臺北市民癌症死亡人數為 5,326 人，較上年增 30 人，平均每日死於癌症人數約有 14.6 位市民；死亡率為每十萬人口 200.5 人，死亡者平均年齡為 71.6 歲；若經標準化後之死亡率為每十萬人口 99.5 人，較上年減 2.0%，但低於全國標準化死亡率 121.3 人，在全國 22 縣市中除連江縣(76.6 人)之外，為標準化死亡率的最低縣市。

十大癌症死因仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為 2.女性乳房癌、3.結腸、直腸和肛門癌、4.肝和肝內膽管癌、5.前列腺(攝護腺)癌、6.胰臟癌、7.胃癌、8.口腔癌、9.非何杰金氏淋巴瘤、10.卵巢癌；與上年相較，僅女性乳房癌前進 2 名，為第 2 名，而結腸、直腸和肛門癌與肝和肝內膽管癌分別退後 1 名，為第 3 名與第 4 名。其中十大癌症死因標準化死亡率較上年增加者有 4 項，增幅較多者為女性乳房癌(增 10.6%)、非何杰金氏淋巴瘤(增 8.2%)；減少者有 6 項，減幅較多者為肝和肝內膽管癌(減 6.1%)、氣管、支氣管和肺癌(減 5.8%)。

依性別觀察，108 年臺北市男性十大癌症死因，以胃癌與白血病上升 1 名，分別為第 4 名與第 10 名，而口腔癌退後 1 名，為第 5 名，其餘死因及順位與上年相同；而男性標準化死亡率較上年減 2.8%，其中以胰臟癌減幅 9.7%最顯著，而增幅則以白血病 5.8%最多。108 年女性十大癌症死因排名變化，以非何杰金氏淋巴瘤與子宮體癌上升 2 名，分別為第 7 名與第 9 名，而卵巢癌退後 1 名為第 8 名，其餘死因順位與上年相同；而女性標準化死亡率較上年減 0.8%，其中以胃癌減幅 18.4%最顯著，增幅以非何杰金氏淋巴瘤增 36.3%最多。

臺北市政府衛生局呼籲，癌症已分別蟬聯 38 年國人死因第 1 名與 48 年臺北市十大死因之首，落實健康飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳的健康生活型態，可預防癌症的發生。為了照護女性市民健康，自 107 年 6 月 1 日起提供設籍臺北市 30 歲以下有性生活史之女性市民，每年 1 次免費子宮頸抹片檢查服務，並同時提供篩檢疑似陽性個案追蹤及轉介服務，相關資訊請至臺北市政府衛生局網站(<https://health.gov.taipei/Default.aspx>)查詢。

四項癌症篩檢資格一覽表

篩檢項目	篩檢資格
乳房 X 光攝影檢查	45–69 歲婦女、40–44 歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每 2 年 1 次
子宮頸抹片檢查	30 歲以上婦女，建議每 3 年進行 1 次
糞便潛血檢查	50 至未滿 75 歲民眾，每 2 年 1 次
口腔黏膜檢查	30 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每 2 年 1 次

資料來源：衛生福利部國民健康署

表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因

民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男性				女性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比%	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比%	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比%
	所有死亡原因	18,024	678.4	100.0	所有死亡原因	10,066	794.7	100.0	所有死亡原因	7,958	572.5	100.0
1	惡性腫瘤	5,326	200.5	29.5	惡性腫瘤	2,946	232.6	29.3	惡性腫瘤	2,380	171.2	29.9
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,793	105.1	15.5	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,544	121.9	15.3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,249	89.9	15.7
3	肺炎	1,981	74.6	11.0	肺炎	1,125	88.8	11.2	肺炎	856	61.6	10.8
4	腦血管疾病	1,146	43.1	6.4	腦血管疾病	654	51.6	6.5	腦血管疾病	492	35.4	6.2
5	糖尿病	721	27.1	4.0	糖尿病	370	29.2	3.7	糖尿病	351	25.3	4.4
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	519	19.5	2.9	慢性下呼吸道疾病	368	29.1	3.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	254	18.3	3.2
7	慢性下呼吸道疾病	505	19.0	2.8	腎炎、腎病症候群及腎病變	265	20.9	2.6	高血壓性疾病	179	12.9	2.2
8	事故傷害	387	14.6	2.1	事故傷害	249	19.7	2.5	敗血症	149	10.7	1.9
9	敗血症	348	13.1	1.9	蓄意自我傷害（自殺）	212	16.7	2.1	血管性及未明示之癥狀	149	10.7	1.9
10	高血壓性疾病	339	12.8	1.9	敗血症	199	15.7	2.0	事故傷害	138	9.9	1.7
	其他	3,959	149.0	22.0	其他	2,134	168.5	21.2	其他	1,761	126.7	22.1

資料來源：衛生福利部。

表2 ICD-10 臺北市10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	107年		108年		較上年增減率(%)
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	
	所有死亡原因	317.6	所有死亡原因	309.9	-2.4
1	惡性腫瘤	101.5	惡性腫瘤	99.5	-2.0
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	44.0	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	44.1	0.4
3	肺炎	23.6	肺炎	26.9	14.2
4	腦血管疾病	20.1	腦血管疾病	18.5	-7.6
5	糖尿病	11.9	糖尿病	11.6	-2.1
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.5	腎炎、腎病症候群及腎病變	7.8	-7.7
7	慢性下呼吸道疾病	8.1	慢性下呼吸道疾病	7.0	-12.9
8	事故傷害	10.9	事故傷害	9.9	-8.8
9	敗血症	5.5	敗血症	5.1	-6.6
10	高血壓性疾病	6.1	高血壓性疾病	4.9	-19.6

資料來源：衛生福利部。

說 明：107年係依「2016年版ICD-10死因選取準則」之計算資料，非原發布數。

表3 ICD-10 臺北市男性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	107年		108年		
	死亡原因	標準化 死亡率	死亡原因	標準化 死亡率	較上年增減 率(%)
	所有死亡原因	403.7	所有死亡原因	394.8	-2.2
1	惡性腫瘤	124.7	惡性腫瘤	121.2	-2.8
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	58.4	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	58.0	-0.7
3	肺炎	30.5	肺炎	35.5	16.3
4	腦血管疾病	26.0	腦血管疾病	25.0	-3.6
5	慢性下呼吸道疾病	13.9	糖尿病	14.1	2.0
6	糖尿病	13.8	慢性下呼吸道疾病	11.6	-16.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.2	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.0	-2.2
8	事故傷害	15.6	事故傷害	13.9	-11.1
9	敗血症	6.9	蓄意自我傷害（自殺）	13.4	3.8
10	蓄意自我傷害（自殺）	12.9	敗血症	6.7	-2.7

資料來源：衛生福利部。

說明：107年係依「2016年版ICD-10死因選取準則」之計算資料，非原發布數。

表4 ICD-10 臺北市女性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	107年		108年		
	死亡原因	標準化 死亡率	死亡原因	標準化 死亡率	較上年增減 率(%)
	所有死亡原因	246.2	所有死亡原因	239.9	-2.6
1	惡性腫瘤	82.8	惡性腫瘤	82.2	-0.8
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	31.9	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	32.7	2.3
3	肺炎	18.0	肺炎	20.1	11.8
4	腦血管疾病	15.2	腦血管疾病	13.2	-13.7
5	糖尿病	10.3	糖尿病	9.6	-6.8
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7.9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6.9	-13.4
7	高血壓性疾病	5.5	高血壓性疾病	4.3	-21.7
8	敗血症	4.3	敗血症	3.9	-10.7
9	事故傷害	6.7	血管性及未明示之癡呆症	3.2	-2.3
10	蓄意自我傷害（自殺）	7.2	事故傷害	6.3	-5.6

資料來源：衛生福利部。

說 明：107年係依「2016年版ICD-10死因選取準則」之計算資料，非原發布數。

表5 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因

民國108年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男性				女性			
	死亡原因	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數 百 分 比 %	死亡原因	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數 百 分 比 %	死亡原因	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數 百 分 比 %
	所有癌症死亡原因	5,326	200.5	100.0	所有癌症死亡原因	2,946	232.6	100.0	所有癌症死亡原因	2,380	171.2	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	1,040	39.1	19.5	氣管、支氣管和肺癌	615	48.6	20.9	氣管、支氣管和肺癌	425	30.6	17.9
2	女性乳癌①	378	27.2	7.1	肝和肝內膽管癌	421	33.2	14.3	女性乳癌①	378	27.2	15.9
3	結腸、直腸和肛門癌	721	27.1	13.5	結腸、直腸和肛門癌	405	32.0	13.7	結腸、直腸和肛門癌	316	22.7	13.3
4	肝和肝內膽管癌	661	24.9	12.4	胃癌	182	14.4	6.2	肝和肝內膽管癌	240	17.3	10.1
5	前列腺(攝護腺)癌②	177	14.0	3.3	口腔癌	181	14.3	6.1	胰臟癌	154	11.1	6.5
6	胰臟癌	314	11.8	5.9	前列腺(攝護腺)癌②	177	14.0	6.0	胃癌	113	8.1	4.7
7	胃癌	295	11.1	5.5	胰臟癌	160	12.6	5.4	非何杰金氏淋巴瘤	91	6.5	3.8
8	口腔癌	200	7.5	3.8	食道癌	133	10.5	4.5	卵巢癌①	86	6.2	3.6
9	非何杰金氏淋巴瘤	186	7.0	3.5	非何杰金氏淋巴瘤	95	7.5	3.2	子宮體癌①	65	4.7	2.7
10	卵巢癌①	86	6.2	1.6	白血病	78	6.2	2.6	白血病	63	4.5	2.6
	其他	1,268	47.7	23.8	其他	499	39.4	16.9	其他	449	32.3	18.9

資料來源：衛生福利部。

說 明：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表6 ICD-10 臺北市10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	107年		108年		
	死亡原因	標準化 死亡率	死亡原因	標準化 死亡率	較上年增減 率(%)
	所有癌症死因	101.5	惡性腫瘤	99.5	-2.0
1	氣管、支氣管和肺癌	19.7	氣管、支氣管和肺癌	18.6	-5.8
2	結腸、直腸和肛門癌	13.6	女性乳癌①	14.8	10.6
3	肝和肝內膽管癌	12.9	結腸、直腸和肛門癌	12.9	-4.9
4	女性乳癌①	13.4	肝和肝內膽管癌	12.1	-6.1
5	前列腺(攝護腺)癌②	5.9	前列腺(攝護腺)癌②	6.0	2.4
6	胰臟癌	5.9	胰臟癌	5.7	-2.9
7	胃癌	5.4	胃癌	5.1	-5.6
8	口腔癌	3.9	口腔癌	4.2	5.1
9	非何杰金氏淋巴瘤	3.0	非何杰金氏淋巴瘤	3.2	8.2
10	卵巢癌①	3.4	卵巢癌①	3.4	-0.8

資料來源：衛生福利部。

附 註:1. ①每十萬女性人口死亡率；②每十萬男性人口死亡率。

2. 107年係依「2016年版ICD-10死因選取準則」之計算資料，非原發布數。

表7 ICD-10 臺北市男性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	107年		108年		
	死亡原因	標準化 死亡率	死亡原因	標準化 死亡率	較上年增減 率(%)
	所有癌症死亡原因	124.7	所有癌症死亡原因	121.2	-2.8
1	氣管、支氣管和肺癌	26.0	氣管、支氣管和肺癌	24.7	-5.1
2	肝和肝內膽管癌	18.7	肝和肝內膽管癌	18.1	-3.6
3	結腸、直腸和肛門癌	17.0	結腸、直腸和肛門癌	16.4	-3.5
4	口腔癌	8.0	胃癌	7.1	5.7
5	胃癌	6.7	口腔癌	8.4	4.9
6	前列腺(攝護腺)癌	5.9	前列腺(攝護腺)癌	6.0	2.4
7	胰臟癌	7.0	胰臟癌	6.3	-9.7
8	食道癌	6.2	食道癌	6.0	-3.5
9	非何杰金氏淋巴瘤	4.1	非何杰金氏淋巴瘤	3.7	-8.9
10	膀胱癌	2.7	白血病	3.5	5.8

資料來源：衛生福利部。

說明：107年係依「2016年版ICD-10死因選取準則」之計算資料，非原發布數。

表8 ICD-10 臺北市女性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	107年		108年		較上年增減率(%)
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	82.8	所有癌症死亡原因	82.2	-0.8
1	氣管、支氣管和肺癌	14.7	氣管、支氣管和肺癌	13.7	-6.9
2	女性乳癌	13.4	女性乳癌	14.8	10.6
3	結腸、直腸和肛門癌	10.9	結腸、直腸和肛門癌	10.3	-5.5
4	肝和肝內膽管癌	8.1	肝和肝內膽管癌	7.3	-10.3
5	胰臟癌	4.9	胰臟癌	5.2	5.5
6	胃癌	4.4	胃癌	3.6	-18.4
7	卵巢癌	3.4	非何杰金氏淋巴瘤	2.7	36.3
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	2.6	卵巢癌	3.4	-0.8
9	非何杰金氏淋巴瘤	2.0	子宮體癌	2.5	17.5
10	白血病	2.5	白血病	2.6	3.8

資料來源：資料來源：衛生福利部。

說 明：107年係依「2016年版ICD-10死因選取準則」之計算資料，非原發布數。

【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較

順位	臺北市 108					新北市 108					桃園市 108				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有死亡原因	18,024	678.41	309.90	100.00	所有死亡原因	24,921	621.90	383.52	100.00	所有死亡原因	13,194	590.35	393.70	100.00
1	惡性腫瘤	5,326	200.47	99.46	29.55	惡性腫瘤	7,449	185.89	112.97	29.89	惡性腫瘤	3,610	161.52	110.22	27.36
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,793	105.13	44.13	15.50	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3,533	88.17	51.85	14.18	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,421	63.58	41.31	10.77
3	肺炎	1,981	74.56	26.91	10.99	肺炎	2,571	64.16	36.29	10.32	腦血管疾病	1,057	47.29	30.48	8.01
4	腦血管疾病	1,146	43.13	18.55	6.36	腦血管疾病	1,497	37.36	22.20	6.01	肺炎	845	37.81	22.65	6.40
5	糖尿病	721	27.14	11.64	4.00	糖尿病	1,215	30.32	18.08	4.88	高血壓性疾病	805	36.02	22.24	6.10
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	519	19.53	7.83	2.88	事故傷害	751	18.74	14.42	3.01	糖尿病	680	30.43	20.00	5.15
7	慢性下呼吸道疾病	505	19.01	7.01	2.80	慢性下呼吸道疾病	725	18.09	10.25	2.91	慢性下呼吸道疾病	507	22.69	13.51	3.84
8	事故傷害	387	14.57	9.90	2.15	腎炎、腎病症候群及腎病變	679	16.94	9.81	2.72	事故傷害	505	22.60	18.33	3.83
9	敗血症	348	13.10	5.11	1.93	蓄意自我傷害（自殺）	632	15.77	12.10	2.54	慢性肝病及肝硬化	331	14.81	10.61	2.51
10	高血壓性疾病	339	12.76	4.90	1.88	高血壓性疾病	541	13.50	7.93	2.17	蓄意自我傷害（自殺）	314	14.05	11.70	2.38
	其他	3,959	149.01	74.47	21.97	其他	5,328	132.96	87.62	21.38	其他	3,119	139.56	92.65	23.64
11	蓄意自我傷害（自殺）	339	12.76	10.05	1.88	慢性肝病及肝硬化	510	12.73	7.99	2.05	腎炎、腎病症候群及腎病變	281	12.57	7.98	2.13
12	血管性及未明示之癰呆症	297	11.18	3.56	1.65	敗血症	426	10.63	6.10	1.71	敗血症	225	10.07	6.20	1.71
13	慢性肝病及肝硬化	240	9.03	4.99	1.33	血管性及未明示之癰呆症	243	6.06	3.18	0.98	血管性及未明示之癰呆症	200	8.95	4.95	1.52
14	帕金森病	182	6.85	2.66	1.01	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	200	4.99	3.00	0.80	衰老/老邁	176	7.87	4.25	1.33
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	139	5.23	2.31	0.77	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	166	4.14	2.69	0.67	帕金森病	121	5.41	3.27	0.92

資料來源：衛生福利部。

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較(續)

順位	臺中市 108					臺南市 108					高雄市 108				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有死亡原因	17,638	627.78	405.43	100.00	所有死亡原因	15,379	817.00	422.27	100.00	所有死亡原因	21,734	783.67	444.49	100.00
1	惡性腫瘤	5,228	186.08	121.81	29.64	惡性腫瘤	4,496	238.85	129.88	29.23	惡性腫瘤	6,399	230.73	131.14	29.44
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,505	53.57	33.58	8.53	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,562	82.98	41.39	10.16	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,901	68.54	37.01	8.75
3	肺炎	1,324	47.12	27.73	7.51	肺炎	1,320	70.12	30.32	8.58	肺炎	1,874	67.57	34.08	8.62
4	糖尿病	1,285	45.74	28.75	7.29	腦血管疾病	1,144	60.77	29.46	7.44	腦血管疾病	1,436	51.78	27.81	6.61
5	腦血管疾病	1,163	41.39	25.67	6.59	糖尿病	963	51.16	25.44	6.26	糖尿病	1,322	47.67	25.65	6.08
6	事故傷害	745	26.52	20.29	4.22	事故傷害	613	32.57	22.49	3.99	高血壓性疾病	928	33.46	17.05	4.27
7	高血壓性疾病	701	24.95	14.95	3.97	慢性下呼吸道疾病	577	30.65	13.48	3.75	事故傷害	783	28.23	20.15	3.60
8	慢性下呼吸道疾病	634	22.57	13.49	3.59	高血壓性疾病	522	27.73	12.58	3.39	慢性下呼吸道疾病	656	23.65	11.93	3.02
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	612	21.78	13.32	3.47	腎炎、腎病症候群及腎病變	400	21.25	10.48	2.60	腎炎、腎病症候群及腎病變	649	23.40	12.30	2.99
10	蓄意自我傷害（自殺）	447	15.91	12.52	2.53	慢性肝病及肝硬化	385	20.45	11.75	2.50	慢性肝病及肝硬化	535	19.29	11.62	2.46
	其他	3,994	142.16	93.33	22.64	其他	3,397	180.46	95.01	22.09	其他	5,251	189.34	115.74	24.16
11	慢性肝病及肝硬化	401	14.27	9.64	2.27	衰老/老邁	354	18.81	7.60	2.30	衰老/老邁	518	18.68	8.66	2.38
12	敗血症	289	10.29	6.15	1.64	血管性及未明示之癰呆症	345	18.33	7.19	2.24	蓄意自我傷害（自殺）	506	18.24	13.78	2.33
13	血管性及未明示之癰呆症	276	9.82	5.51	1.56	蓄意自我傷害（自殺）	290	15.41	11.48	1.89	敗血症	389	14.03	7.58	1.79
14	衰老/老邁	240	8.54	4.48	1.36	敗血症	183	9.72	4.32	1.19	血管性及未明示之癰呆症	229	8.26	3.95	1.05
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	163	5.80	3.91	0.92	帕金森病	153	8.13	3.61	0.99	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	210	7.57	4.14	0.97

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較

順位	臺北市 108					新北市 108					桃園市 108				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	惡性腫瘤 氣管、支氣管和肺癌	5,326 1,040	200.47 39.14	99.46 18.55	100.00 19.53	惡性腫瘤 氣管、支氣管和肺癌	7,449 1,489	185.89 37.16	112.97 22.15	100.00 19.99	惡性腫瘤 氣管、支氣管和肺癌	3,610 717	161.52 32.08	110.22 21.71	100.00 19.86
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	378	27.19	14.81	7.10	肝和肝內膽管癌	1,018	25.40	15.37	13.67	肝和肝內膽管癌	491	21.97	14.98	13.60
3	結腸、直腸和肛門癌	721	27.14	12.95	13.54	結腸、直腸和肛門癌	879	21.94	13.16	11.80	結腸、直腸和肛門癌	437	19.55	12.95	12.11
4	肝和肝內膽管癌	661	24.88	12.14	12.41	女性乳房癌 ⁽¹⁾	410	20.02	11.89	5.50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	195	17.34	11.58	5.40
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	177	13.97	6.02	3.32	口腔癌	515	12.85	7.97	6.91	口腔癌	235	10.51	7.33	6.51
6	胰臟癌	314	11.82	5.73	5.90	胃癌	424	10.58	6.33	5.69	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	115	10.36	6.60	3.19
7	胃癌	295	11.10	5.14	5.54	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	204	10.41	6.55	2.74	胰臟癌	201	8.99	6.16	5.57
8	口腔癌	200	7.53	4.15	3.76	胰臟癌	377	9.41	5.64	5.06	胃癌	169	7.56	4.96	4.68
9	非何杰金氏淋巴瘤	186	7.00	3.21	3.49	食道癌	294	7.34	4.35	3.95	食道癌	154	6.89	4.65	4.27
10	卵巢癌 ⁽¹⁾	86	6.19	3.37	1.61	卵巢癌 ⁽¹⁾	119	5.81	3.52	1.60	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	60	5.33	3.57	1.66
	其他	1,268	47.73	25.04	23.81	其他	1,720	42.92	26.85	23.09	其他	836	37.41	26.43	23.16
11	食道癌	150	5.65	3.00	2.82	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	118	5.76	3.40	1.58	卵巢癌 ⁽¹⁾	55	4.89	3.28	1.52
12	白血病	141	5.31	2.96	2.65	非何杰金氏淋巴瘤	194	4.84	3.04	2.60	非何杰金氏淋巴瘤	97	4.34	3.01	2.69
13	子宮體癌	65	4.68	2.47	1.22	白血病	173	4.32	2.82	2.32	膀胱癌	85	3.80	2.48	2.35
14	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	62	4.46	2.42	1.16	膀胱癌	145	3.62	2.12	1.95	白血病	83	3.71	2.67	2.30
15	膀胱癌	100	3.76	1.56	1.88	子宮體癌	63	3.08	1.84	0.85	鼻咽癌	63	2.82	2.00	1.75

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較(續)

順位	臺中市 108					臺南市 108					高雄市 108				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
1	惡性腫瘤 氣管、支氣管和肺癌	5,228 961	186.08 34.20	121.81 22.14	100.00 18.38	惡性腫瘤 氣管、支氣管和肺癌	4,496 874	238.85 46.43	129.88 24.42	100.00 19.44	惡性腫瘤 氣管、支氣管和肺癌	6,399 1,230	230.73 44.35	131.14 24.65	100.00 19.22
2	肝和肝內膽管癌	774	27.55	17.84	14.80	肝和肝內膽管癌	817	43.40	23.43	18.17	肝和肝內膽管癌	1,071	38.62	21.58	16.74
3	結腸、直腸和肛門癌	663	23.60	15.35	12.68	結腸、直腸和肛門癌	619	32.88	17.21	13.77	結腸、直腸和肛門癌	876	31.59	17.38	13.69
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	308	21.58	14.06	5.89	女性乳房癌 ⁽¹⁾	219	23.21	13.39	4.87	女性乳房癌 ⁽¹⁾	334	23.82	13.78	5.22
5	口腔癌	353	12.56	8.30	6.75	口腔癌	272	14.45	8.73	6.05	口腔癌	429	15.47	9.22	6.70
6	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	167	12.08	8.00	3.19	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	124	13.21	6.94	2.76	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	174	12.69	7.18	2.72
7	胰臟癌	266	9.47	6.08	5.09	胰臟癌	238	12.64	6.89	5.29	胰臟癌	313	11.29	6.36	4.89
8	胃癌	261	9.29	5.86	4.99	胃癌	174	9.24	4.85	3.87	胃癌	261	9.41	5.29	4.08
9	食道癌	229	8.15	5.39	4.38	食道癌	142	7.54	4.48	3.16	食道癌	235	8.47	5.03	3.67
10	非何杰金氏淋巴瘤	153	5.45	3.55	2.93	膀胱癌	127	6.75	3.19	2.82	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	92	6.56	3.79	1.44
	其他	1,093	38.90	26.27	20.91	其他	890	47.28	26.73	19.80	其他	1,384	49.90	29.20	21.63
11	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	77	5.39	3.42	1.47	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	55	5.83	3.20	1.22	膀胱癌	169	6.09	3.20	2.64
12	白血病	138	4.91	3.52	2.64	非何杰金氏淋巴瘤	96	5.10	2.72	2.14	非何杰金氏淋巴瘤	146	5.26	2.96	2.28
13	卵巢癌 ⁽¹⁾	69	4.83	3.27	1.32	卵巢癌 ⁽¹⁾	47	4.98	2.97	1.05	卵巢癌 ⁽¹⁾	72	5.13	2.99	1.13
14	膀胱癌	101	3.59	2.22	1.93	白血病	71	3.77	2.20	1.58	白血病	132	4.76	2.95	2.06
15	子宮體癌	39	2.73	1.69	0.75	膽囊和其他膽道癌	66	3.51	1.78	1.47	子宮體癌	58	4.14	2.43	0.91

【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

表1.臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2019				全國 2019				日本 2018(平成30年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	18,024	678.41	100.00	所有死亡原因	175,424	743.45	100.00	所有死亡原因	1,362,470	1094.94	100.00
1	惡性腫瘤	5,326	200.47	29.55	惡性腫瘤	50,232	212.88	28.63	惡性腫瘤	373,584	300.23	27.42
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,793	105.13	15.50	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	19,859	84.16	11.32	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	208,221	167.34	15.28
3	肺炎	1,981	74.56	10.99	肺炎	15,185	64.35	8.66	腦血管疾病	108,186	86.94	7.94
4	腦血管疾病	1,146	43.13	6.36	腦血管疾病	12,176	51.60	6.94	老邁	109,605	88.08	8.04
5	糖尿病	721	27.14	4.00	糖尿病	9,996	42.36	5.70	肺炎	94,661	76.07	6.95
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	519	19.53	2.88	事故傷害	6,640	28.14	3.79	事故傷害	41,238	33.14	3.03
7	慢性下呼吸道疾病	505	19.01	2.80	慢性下呼吸道疾病	6,301	26.70	3.59	腎衰竭	26,081	20.96	1.91
8	事故傷害	387	14.57	2.15	高血壓性疾病	6,255	26.51	3.57	血管性及未明示之癥狀	20,521	16.49	1.51
9	敗血症	348	13.10	1.93	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,049	21.40	2.88	慢性下呼吸道疾病	20,194	16.23	1.48
10	高血壓性疾病	339	12.76	1.88	慢性肝病及肝硬化	4,240	17.97	2.42	自殺	20,031	16.10	1.47
	其他	3,959	149.01	21.97	其他	39,491	167.36	22.51	其他	340,148	273.36	24.97
11	蓄意自我傷害（自殺）	339	12.76	1.88	蓄意自我傷害（自殺）	3,864	16.38	2.20	阿茲海默病	19,095	15.35	1.40
12	血管性及未明示之癥狀	297	11.18	1.65	敗血症	2,925	12.40	1.67	主動脈瘤及剝離	18,803	15.11	1.38
13	慢性肝病及肝硬化	240	9.03	1.33	血管性及未明示之癥狀	2,625	11.12	1.50	肝臟疾病	17,275	13.88	1.27
14	帕金森病	182	6.85	1.01	衰老/老邁	2,199	9.32	1.25	糖尿病	14,181	11.40	1.04
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	139	5.23	0.77	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,447	6.13	0.82	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	13,096	10.52	0.96

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2019				全國 2019				日本 2018(平成30年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	72	343.09	100.00	所有死亡原因	671	383.27	100.00	所有死亡原因	1,748	190.33	100.00
1	源於周產期的特定病況	39	185.84	54.17	先天性畸形、變形及染色體異常	141	80.54	21.01	先天性畸形變形及染色體異常	623	67.84	35.64
2	先天性畸形變形及染色體異常	14	66.71	19.44	源於周產期的呼吸性疾病	74	42.27	11.03	源於周產期的特定病況	460	50.09	26.32
3	事故傷害	9	42.89	12.50	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	70	39.98	10.43	事故傷害	64	6.97	3.66
4	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	4.77	1.39	事故傷害	46	26.27	6.86	嬰兒猝死症候群(SIDS)	57	6.21	3.26
5	敗血症	1	4.77	1.39	特發於周產期的感染	27	15.42	4.02	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	4.57	2.40
6					胎兒及新生兒出血及血液疾患	26	14.85	3.87	敗血症	21	2.29	1.20
7					嬰兒猝死症候群(SIDS)	24	13.71	3.58	肺炎	21	2.29	1.20
8					母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	18	10.28	2.68	惡性腫瘤	13	1.42	0.74
9					腦之其他疾患	9	5.14	1.34	肝臟疾病	13	1.42	0.74
10					肺炎	6	3.43	0.89	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	12	1.31	0.69
	其他	8	38.12	11.11	其他	230	131.37	34.28	其他	422	45.95	24.14

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

附註：(1)源於周產期的特定病況包含胎兒及新生兒受母體因素和妊娠、產程[臨產]及分娩併發症的影響、妊娠期長短和胎兒生長有關的疾患、生產創傷、特發於周產期的呼吸和心臟血管疾患、特發於周產期的感染(症)、胎兒及新生兒出血和血液疾患、特發於胎兒及新生兒的短暫性內分泌和(新陳)代謝(性)疾患、胎兒和新生兒消化系統疾患、侵及(侵犯、涉及)胎兒及新生兒體被[被膜、皮膚]和體溫調節的病況。

表3. 少年（1-14歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2019				全國 2019				日本 2018(平成30年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	41	12.10	100.00	所有死亡原因	370	12.94	100.00	所有死亡原因	1,471	10.17	100.00
1	惡性腫瘤	10	2.95	24.39	事故傷害	72	2.52	19.46	惡性腫瘤	269	1.86	18.29
2	事故傷害	5	1.48	12.20	惡性腫瘤	70	2.45	18.92	事故傷害	223	1.54	15.16
3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	0.59	4.88	先天性畸形變形及染色體異常	31	1.08	8.38	先天性畸形變形及染色體異常	214	1.48	14.55
4	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	0.30	2.44	流感	19	0.66	5.13	自殺	99	0.68	6.73
5	蓄意自我傷害（自殺）	1	0.30	2.44	加害（他殺）	15	0.52	4.05	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	66	0.46	4.49
6	慢性肝病及肝硬化	1	0.30	2.44	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12	0.42	3.24	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	34	0.24	2.31
7	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.30	2.44	蓄意自我傷害（自殺）	10	0.35	2.70	肺炎	29	0.20	1.97
8	糖尿病	1	0.30	2.44	肺炎	9	0.31	2.43	敗血症	27	0.19	1.84
9	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1	0.30	2.44	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	0.21	1.62	腦血管疾病	23	0.16	1.56
10	肺炎	1	0.30	2.44	敗血症	5	0.17	1.35	流行性感冒	22	0.15	1.50
	流行性感冒	1	0.30	2.44								
	其他	16	4.72	39.02	其他	121	4.23	32.71	其他	465	3.22	31.61

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2019				全國 2019				日本 2018(平成30年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	79	29.96	100.00	所有死亡原因	1,164	41.28	100.00	所有死亡原因	3,149	26.65	100.00
1	蓄意自我傷害（自殺）	28	10.62	35.44	事故傷害	495	17.55	42.53	自殺	1,548	13.10	49.16
2	事故傷害	21	7.96	26.58	蓄意自我傷害（自殺）	257	9.11	22.08	事故傷害	553	4.68	17.56
3	惡性腫瘤	5	1.90	6.33	惡性腫瘤	120	4.26	10.31	惡性腫瘤	271	2.29	8.61
4	先天性畸形變形及染色體異常	4	1.52	5.06	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	33	1.17	2.84	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	99	0.84	3.14
5	腦血管疾病	3	1.14	3.80	腦血管疾病	22	0.78	1.89	腦血管疾病	43	0.36	1.37
6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	1.14	3.80	先天性畸形變形及染色體異常	15	0.53	1.29	先天性畸形變形及染色體異常	37	0.31	1.17
7	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	1.14	3.80	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	0.43	1.03	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	28	0.24	0.89
8	肺炎	1	0.38	1.27	肺炎	11	0.39	0.95	肺炎	19	0.16	0.60
9	胃及十二指腸潰瘍	1	0.38	1.27	加害（他殺）	11	0.39	0.95	他殺	14	0.12	0.44
10	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1	0.38	1.27	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	0.21	0.52	糖尿病	11	0.09	0.35
	其他	9	3.41	11.39	其他	182	6.45	15.64	其他	526	4.45	16.70

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2019				全國 2019				日本 2018(平成30年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	539	69.50	100.00	所有死亡原因	7,781	108.66	100.00	所有死亡原因	18,278	61.24	100.00
1	惡性腫瘤	176	22.69	32.65	惡性腫瘤	1,889	26.38	24.28	自殺	5,156	17.28	28.21
2	蓄意自我傷害（自殺）	89	11.48	16.51	蓄意自我傷害（自殺）	1,157	16.16	14.87	惡性腫瘤	4,376	14.66	23.94
3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	57	7.35	10.58	事故傷害	992	13.85	12.75	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,682	5.64	9.20
4	事故傷害	49	6.32	9.09	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	704	9.83	9.05	事故傷害	1,437	4.81	7.86
5	腦血管疾病	19	2.45	3.53	慢性肝病及肝硬化	533	7.44	6.85	腦血管疾病	1,211	4.06	6.63
6	慢性肝病及肝硬化	18	2.32	3.34	腦血管疾病	362	5.06	4.65	肝臟疾病	580	1.94	3.17
7	糖尿病	10	1.29	1.86	糖尿病	183	2.56	2.35	主動脈瘤及剝離原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	169	0.57	0.92
8	肺炎	9	1.16	1.67	肺炎	139	1.94	1.79	糖尿病	161	0.54	0.88
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	0.64	0.93	高血壓性疾病	122	1.70	1.57	糖尿病	149	0.50	0.82
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	0.64	0.93	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	91	1.27	1.17	肺炎	147	0.49	0.80
	其他	102	13.15	18.92	其他	1,609	22.47	20.68	其他	3,210	10.76	17.56

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2019				全國 2019				日本 2018(平成30年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	3,099	392.41	100.00	所有死亡原因	37,977	537.46	100.00	所有死亡原因	104,221	320.00	100.00
1	惡性腫瘤	1,451	183.73	46.82	惡性腫瘤	16,402	232.12	43.19	惡性腫瘤	43,920	134.85	42.14
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	398	50.40	12.84	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3,801	53.79	10.01	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12,831	39.40	12.31
3	腦血管疾病	169	21.40	5.45	腦血管疾病	2,087	29.54	5.50	腦血管疾病	7,919	24.31	7.60
4	蓄意自我傷害（自殺）	129	16.33	4.16	慢性肝病及肝硬化	1,904	26.95	5.01	自殺	6,582	20.21	6.32
5	糖尿病	99	12.54	3.19	事故傷害	1,845	26.11	4.86	肝臟疾病	4,486	13.77	4.30
6	事故傷害	95	12.03	3.07	糖尿病	1,810	25.62	4.77	事故傷害	4,131	12.68	3.96
7	肺炎	94	11.90	3.03	蓄意自我傷害（自殺）	1,484	21.00	3.91	肺炎	1,875	5.76	1.80
8	慢性肝病及肝硬化	92	11.65	2.97	肺炎	1,084	15.34	2.85	主動脈瘤及剝離	1,728	5.31	1.66
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	46	5.82	1.48	高血壓性疾病	872	12.34	2.30	糖尿病	1,385	4.25	1.33
10	高血壓性疾病	36	4.56	1.16	腎炎、腎病症候群及腎病變	651	9.21	1.71	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	894	2.74	0.86
	慢性下呼吸道疾病	36	4.56	1.16								
	其他	454	57.49	14.65	其他	6,037	85.44	15.90	其他	18,470	56.71	17.72

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表7.老年人口(65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2019				全國 2019				日本 2018(平成30年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	14,194	3,031.03	100.00	所有死亡原因	127,461	3,620.72	100.00	所有死亡原因	1,233,204	3,522.77	100.00
1	惡性腫瘤	3,684	786.69	25.95	惡性腫瘤	31,750	901.91	24.91	惡性腫瘤	324,719	927.59	26.33
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,333	498.20	16.44	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15,304	434.73	12.01	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	193,468	552.66	15.69
3	肺炎	1,876	400.61	13.22	肺炎	13,936	395.87	10.93	老邁	109,572	313.00	8.89
4	腦血管疾病	955	203.93	6.73	腦血管疾病	9,702	275.60	7.61	腦血管疾病	98,976	282.73	8.03
5	糖尿病	611	130.47	4.30	糖尿病	7,997	227.17	6.27	肺炎	92,568	264.43	7.51
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	468	99.94	3.30	慢性下呼吸道疾病	5,850	166.18	4.59	事故傷害	34,802	99.42	2.82
7	慢性下呼吸道疾病	466	99.51	3.28	高血壓性疾病	5,260	149.42	4.13	腎衰竭	25,206	72.00	2.04
8	敗血症	321	68.55	2.26	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,311	122.46	3.38	血管性及未明示之癥呆症	20,445	58.40	1.66
9	高血壓性疾病	299	63.85	2.11	事故傷害	3,190	90.62	2.50	慢性下呼吸道疾病	19,663	56.17	1.59
10	血管性及未明示之癥呆症	294	62.78	2.07	血管性及未明示之癥呆症	2,592	73.63	2.03	阿茲海默病	18,978	54.21	1.54
	其他	2,887	616.50	20.34	其他	27,569	783.14	21.63	其他	294,807	842.15	23.91

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標

表1.臺北市行政區別衛生統計指標 — 人口統計

中華民國108年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km ²	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km ²	9,732	21,985	19,631	27,077	16,619	20,772	22,185	21,133	8,626	5,507	9,050	4,545	4,458
年底人口數	總計	人	2,645,041	204,193	220,021	307,631	227,387	158,014	126,043	187,076	271,806	120,297	285,795	283,459	253,319
	男性	人	1,260,049	95,492	104,608	143,126	105,570	75,229	61,173	91,630	130,042	58,752	136,210	136,569	121,648
	女性	人	1,384,992	108,701	115,413	164,505	121,817	82,785	64,870	95,446	141,764	61,545	149,585	146,890	131,671
	性比例		91.27	88.18	91.03	87.36	86.87	91.33	94.92	96.21	91.96	95.51	91.32	93.00	92.78
人口變動	出生數	人	21,468	1,488	1,776	2,224	1,892	1,235	1,095	1,580	2,136	1,164	2,545	2,287	2,046
	死亡數	人	18,026	1,284	1,630	2,117	1,557	1,074	1,006	1,668	1,792	796	1,423	1,898	1,781
	粗出生率	%	8.08	7.26	8.01	7.22	8.28	7.79	8.63	8.39	7.83	9.62	8.88	8.02	8.04
	粗死亡率	%	6.78	6.27	7.35	6.87	6.82	6.78	7.93	8.86	6.57	6.58	4.96	6.66	7.00
	人口增加率	%	-5.47	-6.21	-10.40	-3.63	-5.44	-3.81	-12.79	-11.71	-2.41	-3.97	-1.19	-6.07	-3.60
	自然增加率	%	1.30	1.00	0.66	0.35	1.47	1.02	0.70	-0.47	1.26	3.04	3.91	1.36	1.04
	社會增加率	%	-10.15	-8.36	-15.93	-4.28	-10.52	-7.24	-13.17	-12.95	-8.43	-14.39	-9.62	-12.19	-9.74
生育率	一般生育率		33	30	33	31	34	31	35	35	31	37	34	33	33
	總生育率		1,085	1,015	1,060	1,045	1,085	1,060	1,140	1,140	1,055	1,210	1,080	1,060	1,095
	15-19歲	%	1	0	1	1	1	1	0	3	2	3	1	1	2
	20-24歲	%	10	6	9	5	8	9	14	16	9	14	9	10	13
	25-29歲	%	42	35	42	29	44	41	48	46	42	50	40	43	46
	30-34歲	%	90	89	86	94	90	89	93	91	85	97	91	88	89
	35-39歲	%	59	59	59	62	60	60	58	57	59	60	60	56	55
	40-44歲	%	14	13	14	17	13	12	14	14	13	17	14	13	13
	45-49歲	%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
人口組成	14歲以下(a)	人	355,500	29,996	26,052	46,669	27,750	25,634	16,314	19,922	36,851	15,631	41,194	35,590	33,897
(年底)	15-64歲(b)	人	1,811,597	134,188	150,876	197,108	156,563	103,238	86,521	129,969	190,834	85,489	206,148	194,937	175,726
	65歲以上(c)	人	477,944	40,009	43,093	63,854	43,074	29,142	23,208	37,185	44,121	19,177	38,453	52,932	43,696
人口組成結構比(年底)	14歲以下	%	13.44	14.69	11.84	15.17	12.20	16.22	12.94	10.65	13.56	12.99	14.41	12.56	13.38
	15-64歲	%	68.49	65.72	68.57	64.07	68.85	65.33	68.64	69.47	70.21	71.06	72.13	68.77	69.37
	65歲以上	%	18.07	19.59	19.59	20.76	18.94	18.44	18.41	19.88	16.23	15.94	13.45	18.67	17.25
	扶養比(a+c)/b	%	46.01	52.17	45.83	56.07	45.24	53.06	45.68	43.94	42.43	40.72	38.64	45.41	44.16
	老化指數c/a	%	134.44	133.38	165.41	136.82	155.22	113.68	142.26	186.65	119.73	122.69	93.35	148.73	128.91

表2.臺北市行政區別衛生統計指標 — 醫療資源

中華民國108年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家	36	5	1	6	4	3	1	4	2	-	3	1	6
	診所		3,626	301	299	851	485	293	170	178	199	82	252	315	201
	護產機構		145	16	9	20	21	17	9	6	8	4	11	14	10
	精神復建機構		50	3	1	4	11	5	3	1	4	1	3	6	8
	其他醫療及醫事機構		565	53	52	89	88	52	29	33	31	21	42	48	27
	非醫事機構		1,176	90	114	111	130	109	66	80	95	63	112	105	101
病床數	藥商		12,336	1,146	1,174	1,920	2065	1,127	894	588	488	392	1,263	768	511
	總計	床	25,382	1,759	1,583	3,738	2,344	3,760	669	638	1,021	489	2,632	1,565	5,184
	醫院病床		19,645	1,250	1,259	2,069	1,255	3,255	436	440	861	411	2,259	1,287	4,863
	一般急性病床		13,704	704	896	1,516	805	2,282	324	169	592	281	1,620	876	3,639
	一般慢性病床		619	103	133	-	20	-	-	79	-	-	-	-	284
	特殊病床		5,322	443	230	553	430	973	112	192	269	130	639	411	940
	診所病床		5,737	509	324	1,669	1,089	505	233	198	160	78	373	278	321
(醫療及醫事機構)	醫事人力	人	58,726	4,137	3,753	8,490	6,237	8,867	1,578	1,593	2,889	1,256	5,598	4,286	10,042
	醫師		15,050	1,010	1,011	2,398	1,716	2,298	385	436	822	261	1,347	1,089	2,277
	西醫師		10,711	588	652	1,535	1,199	1,883	213	259	549	160	984	726	1,963
	中醫師		1,014	83	83	192	157	94	67	56	59	23	52	81	67
	牙醫師		3,325	339	276	671	360	321	105	121	214	78	311	282	247
	藥事人員		7,180	600	546	990	860	830	274	315	366	203	710	525	961
	護產人員		29,153	2,024	1,712	3,794	2,815	4,711	619	616	1,367	604	2,939	2,075	5,877
	醫檢人員		2,236	121	94	378	227	517	75	32	70	53	207	100	362
平均 每萬人 醫療資源	其他		5,107	382	390	930	619	511	225	194	264	135	395	497	565
	醫院	家	0.14	0.24	0.05	0.19	0.18	0.19	0.08	0.21	0.07	0.00	0.10	0.04	0.24
	診所		13.65	14.69	13.49	27.61	21.23	18.48	13.40	9.45	7.30	6.78	8.79	11.05	7.90
	病床數	床	95.54	85.83	71.40	121.27	102.62	237.21	52.75	33.87	37.43	40.42	91.83	54.91	203.75
	醫事人員數		221.04	201.86	169.27	275.44	273.05	559.41	124.41	84.58	105.91	103.82	195.32	150.39	394.69
	醫師	人	56.65	49.28	45.60	77.80	75.12	144.98	30.35	23.15	30.13	21.57	47.00	38.21	89.50
	西醫師		40.32	28.69	29.41	49.80	52.49	118.80	16.79	13.75	20.13	13.22	34.33	25.47	77.15
	中醫師	人	3.82	4.05	3.74	6.23	6.87	5.93	5.28	2.97	2.16	1.90	1.81	2.84	2.63
	牙醫師		12.52	16.54	12.45	21.77	15.76	20.25	8.28	6.42	7.85	6.45	10.85	9.89	9.71
	藥事人員	人	27.02	29.28	24.63	32.12	37.65	52.36	21.60	16.73	13.42	16.78	24.77	18.42	37.77
	護產人員		109.73	98.76	77.22	123.09	123.24	297.21	48.80	32.71	50.11	49.92	102.54	72.81	230.99
	醫檢人員	人	8.42	5.90	4.24	12.26	9.94	32.62	5.91	1.70	2.57	4.38	7.22	3.51	14.23
	其他		19.22	18.64	17.59	30.17	27.10	32.24	17.74	10.30	9.68	11.16	13.78	17.44	22.21

表3.臺北市行政區別衛生統計指標—ICD-10死因統計

中華民國108年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	肺炎		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	腦血管疾病		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	糖尿病		5	5	6	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		6	8	5	6	6	5	8	5	7	8	6	8	
	慢性下呼吸道疾 病		7	7	7	9	8	8	7	6	7	6	6	7	6
	事故傷害		8	8	8	10	7	11	8	7	8	8	9	10	10
	敗血症		9	6	10	11	9	12	12	11	9	11	7	9	11
	高血壓性疾病		10	10	13	8	10	7	9	9	10	17	11	12	9
十大死因 死亡率	所有死亡原因	人/每十 萬人口	678.41	632.36	729.77	693.95	684.26	673.79	797.10	876.61	656.20	650.50	500.68	663.15	698.04
	惡性腫瘤		200.47	175.65	224.16	212.82	203.13	189.90	239.68	244.77	186.59	203.33	157.01	196.84	203.20
	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）		105.13	107.34	112.31	109.98	106.82	98.42	123.00	134.33	105.21	90.09	78.85	102.81	102.58
	肺炎		74.56	68.31	70.81	69.75	80.55	85.17	84.36	98.23	78.82	65.30	53.03	77.19	75.46
	腦血管疾病		43.13	34.16	46.91	41.85	38.09	49.84	52.04	69.56	42.89	38.02	29.31	41.05	45.59
	糖尿病		27.14	25.37	27.06	26.93	22.33	20.82	27.60	36.11	21.63	24.80	24.42	30.18	36.95
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		19.53	15.13	29.32	21.41	21.45	18.93	29.17	19.65	22.73	15.70	10.47	17.54	16.90
	慢性下呼吸道疾 病		19.01	16.10	18.94	14.60	15.76	17.03	24.44	27.61	20.16	21.49	16.05	15.79	26.33
	事故傷害		14.57	15.13	15.34	12.33	20.58	11.99	22.08	20.71	15.03	14.05	9.42	11.58	12.97
	敗血症		13.10	16.59	12.63	12.00	14.88	11.36	11.04	18.05	13.93	11.57	11.51	12.28	11.40
	高血壓性疾病		12.76	13.66	10.82	16.55	14.01	17.66	13.40	19.11	11.73	2.48	6.28	9.82	16.51

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續1)

中華民國108年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	309.90	263.45	316.75	269.04	301.12	283.86	369.92	372.28	313.37	347.36	303.27	302.25	346.73
	惡性腫瘤		99.46	79.85	105.50	96.05	94.85	91.27	117.10	111.97	99.03	114.94	97.23	98.25	105.41
	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）		44.13	39.20	44.28	37.48	43.37	38.30	51.40	53.89	44.53	45.89	47.08	43.20	47.58
	肺炎		26.91	22.04	22.33	20.03	29.61	27.42	32.93	32.63	29.05	28.27	27.28	28.28	30.93
	腦血管疾病		18.55	12.91	19.60	14.33	15.29	20.23	22.18	28.52	19.79	19.77	17.02	17.53	21.95
	糖尿病		11.64	9.71	11.79	9.49	9.83	8.32	13.33	13.82	9.75	12.44	13.70	12.69	16.71
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		7.83	5.44	10.73	7.26	8.79	6.80	11.45	6.86	10.42	7.87	5.68	6.70	7.07
	慢性下呼吸道疾 病		7.01	5.29	7.08	3.96	5.43	4.85	9.44	9.67	7.96	9.59	8.90	5.70	10.11
	事故傷害		9.90	10.40	8.84	7.38	12.55	8.09	12.93	12.76	11.16	11.77	8.54	7.84	10.13
	敗血症		5.11	5.55	3.99	3.69	5.63	4.09	4.12	6.98	5.45	5.77	6.35	4.87	5.93
	高血壓性疾病		4.90	5.00	3.68	5.86	5.09	6.36	5.75	6.52	4.57	1.11	3.67	3.59	6.51
十大死因 標準化 死亡率 區排名	所有死亡原因	區排名	12	5	11	9	10	2	1	6	3	7	8	4	
	惡性腫瘤		12	4	9	10	11	1	3	6	2	8	7	5	
	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）		10	7	12	8	11	2	1	6	5	4	9	3	
	肺炎		11	10	12	4	8	1	2	5	7	9	6	3	
	腦血管疾病		12	7	11	10	4	2	1	5	6	9	8	3	
	糖尿病		10	7	11	8	12	4	2	9	6	3	5	1	
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		12	2	6	4	9	1	8	3	5	11	10	7	
	慢性下呼吸道疾 病		10	7	12	9	11	4	2	6	3	5	8	1	
	事故傷害		6	8	12	3	10	1	2	5	4	9	11	7	
	敗血症		6	11	12	5	10	9	1	7	4	2	8	3	
	高血壓性疾病		7	9	4	6	3	5	1	8	12	10	11	2	

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續2完)

中華民國108年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	全部	人/每十 萬人口	678.41	632.36	729.77	693.95	684.26	673.79	797.10	876.61	656.20	650.50	500.68	663.15	698.04
	0歲		345.15	406.92	345.92	181.82	162.78	163.60	473.71	393.96	191.71	270.76	411.27	454.03	656.90
	1-4歲		19.86	12.33	33.37	23.71	43.20	-	36.76	13.27	18.05	17.83	23.12	8.67	9.51
	5-14歲		8.34	4.86	18.95	3.14	5.88	5.74	-	-	4.14	21.71	11.50	13.36	13.70
	15-24歲		29.96	20.08	28.59	30.37	14.59	39.75	41.60	28.47	36.54	47.89	19.30	35.02	31.23
	25-44歲		69.50	57.46	68.76	78.88	64.15	65.33	70.06	75.87	64.59	77.97	57.97	59.50	96.45
	45-64歲		392.41	295.58	415.92	333.57	383.94	381.24	514.86	574.17	392.13	502.21	314.73	377.47	390.70
	65歲以上		3,031.03	2,735.33	3,019.54	2,807.56	2,939.08	2,995.26	3,427.79	3,470.07	3,225.92	3,020.79	2,916.87	2,895.08	3,241.33
年齡別 死亡率 區排名	全部	區排名	11	3	5	6	7	2	1	9	10	12	8	4	
	0歲		5	7	10	12	11	2	6	9	8	4	3	1	
	1-4歲		9	3	4	1	12	2	8	6	7	5	11	10	
	5-14歲		8	2	10	6	7	11	11	9	1	5	4	3	
	15-24歲		10	8	7	12	3	2	9	4	1	11	5	6	
	25-44歲		12	6	2	9	7	5	4	8	3	11	10	1	
	45-64歲		12	4	10	7	8	2	1	5	3	11	9	6	
	65歲以上		12	6	11	8	7	2	1	4	5	9	10	3	

【附錄 5】主要名詞解釋與公式

本死因統計摘要係依據世界衛生組織所公告之「國際疾病與死因分類標準第十版（ICD-10）」加註死因碼，所統計之死因為原死因（Underlying causes of death）。

一、原（肇始）死因

死亡證明書上所填之死因係指所有導致死亡或與死亡相關的疾病、罹病狀況、或是造成這些傷害的意外或暴力環境等。

原死因係指(a)可引起一連串病症而導致直接死亡之疾病或傷害；(b)造成致命傷害之事故或暴力之環境。

二、孕產婦死亡

孕產婦死亡係指在懷孕期間或懷孕終止後 42 天內之婦女死亡，而不論其懷孕期長短或懷孕的位置為何；或任何與懷孕有關或因懷孕而加重之原因所導致之死亡。但不包括因事故或偶發原因所致之死亡。

孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡數／活產嬰兒數 * 100,000。

三、嬰兒死亡

嬰兒死亡係指嬰兒出生後未滿一歲之死亡數。

嬰兒死亡率 = 嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數 * 1,000。

四、新生兒死亡

新生兒死亡率指係指嬰兒出生後，在未滿四週（28天）內之死亡數。

新生兒死亡率 = 新生兒死亡數 / 活產嬰兒數 * 1,000。

五、年齡別死亡率

年齡別死亡率 = 年齡別死亡數 / 該年齡別年中人口數 * 100,000。

六、標準化死亡率

標準化死亡率是將兩國或兩地不同性別、年齡、城鄉、所得、職業、婚姻、種族等項組合，化成為同一的基礎，用以剔除其人口在組合上之差異，俾可受到純正而客觀的比較。本書刊所用的標準化死亡率是指去除年齡組成影響、以 WHO 2000 年世界人口結構為基準的死亡率。

標準化死亡率 = $[\Sigma (\text{年齡別死亡率} * \text{標準組年齡別人口數})] / \text{標準組總人口數}$ 。