

中華民國 103 年
臺北市死因統計年報

臺北市政府衛生局編印

中華民國 104 年 9 月出版

凡　　例

- 一、本年報編印之目的，係提供臺北市死因統計，以提供政府施政及學術研究之參考。
- 二、本年報內容計分：(一) 提要分析 (二) 人口統計指標 (三) 103 年死因統計 (四) 歷年死因統計 (五) 歷年主要癌症發生率等 5 類，凡 64 表；另附錄 7 表。
- 三、部分資料因尾數四捨五入，計算時仍以原始數據計算，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。
- 四、本年報各表所稱「年」係指全年；「年底」係指當年 12 月底。
- 五、本年報所用符號代表意義如下：
「-」經統計但無數據；「- -」有數值，但該數值無意義；「...」數值不明或尚未產生資料；「0」代表有數值而不及半單位；「①」修正數。

目 次

凡例

壹、提要分析

貳、人口統計指標

表A・臺北市人口統計指標—行政區別.....	1
表B・臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C・臺北市近十年各年齡組年中人口數.....	3
表D・臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性.....	4
表E・臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性.....	5
表F・臺北市各行政區年底人口數.....	6
表G・臺北市近十年各行政區年底人口數.....	7
表H・臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	8
表 I・臺北市近十年各行政區年中人口數.....	9

參、103年死因統計

一、主要死因統計

表 1・臺北市、全國主要死亡原因比較.....	11
表 2・ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3・ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4・ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5・ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6・ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

目 次

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因.....	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因.....	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因.....	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因.....	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因.....	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因.....	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因.....	23
表14 · ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因.....	24
表15 · ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因.....	25
表16 · ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因.....	26
表17 · ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因.....	27
表18 · ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因.....	28
表19 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因.....	29
表20 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因.....	30
表21 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式.....	31
表22 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式.....	32
表23 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式.....	33
表24 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因.....	34
表25 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況.....	35
表26 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	36
表27 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	37

目 次

二、行政區別死因統計

表28-1~28-12 · ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	39
表29-1~29-12 · ICD-10 臺北市十二區事故傷害死亡原因.....	51
表30-1~30-12 · ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	63
表31-1~31-12 · ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	75

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表32 · 臺北市歷年主要死亡原因	87
表33 · 臺北市歷年男性主要死亡原因	91
表34 · 臺北市歷年女性主要死亡原因	95
表35 · 臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	99
表36 · 臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	100
表37 · 臺北市歷年事故傷害死亡原因	101
表38 · 臺北市歷年男性事故傷害死亡原因	105
表39 · 臺北市歷年女性事故傷害死亡原因	109
表40 · 臺北市歷年自殺死亡方式.....	113
表41 · 臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	117
表42 · 臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	121
表43 · 臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	125
表44 · 臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	127
表45 · 臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	129

目 次

表46・臺北市歷年主要癌症死亡原因	131
表47・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因	135
表48・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因	139
表49・臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	143
表50・臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	145
表51・臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	147
二、行政區別死因統計	
表52-1~52-12・臺北市十二區歷年主要死亡原因	149
表53-1~53-12・臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因	197
伍、歷年主要癌症發生率	
表54・臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	245
表55・臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	247
陸、附錄	
【附錄1】103年臺北市十大死因出爐了癌症續居首位，慢性疾病占了7項	249
【附錄2】ICD-10 新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較.....	260
【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較.....	262
【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標.....	269
【附錄5】主要名詞解釋與公式.....	274


壹、提要分析

103 年臺北市主要死因提要說明

一、標準化死亡率較上年增加 1.9%，較 94 年則減少 15.3%

103 年臺北市民死亡人數 1 萬 6,953 人，平均每 31 分鐘就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 629.2 人，分別較 102 年增加 28.4 人、4.7%；如依世界衛生組織(W.H.O.)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 332.5 人，較上年增加 1.9%，較 94 年則減少 15.3%。若與全國相較，103 年臺北市標準化死亡率較全國標準化死亡率每十萬人口 443.6 人低 25.0%，並在全國 22 縣市中，僅高於金門縣，為死亡率第二低的縣市。

依近 10 年資料觀察，剔除人口結構因素影響後臺北市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則反之，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。（詳圖 1）



二、臺北市民十大死因惡性腫瘤蟬連榜首

103 年臺北市民十大死因中惡性腫瘤仍續居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病、事故傷害、敗血症；十大死因之死亡人數占總死亡人數 77.2%，其中仍以惡性腫瘤占 28.9%最多，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 14.7%次之，腦血管疾病占 7.1%居三。（詳表 1、圖 2）

表 1 ICD-10 103 年臺北市十大死因

單位：人、%

順位	死因	死亡人數	死亡百分比
1	所有死因	16,953	100.0
2	惡性腫瘤	4,903	28.9
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,489	14.7
4	腦血管疾病	1,212	7.1
5	肺炎	1,060	6.3
6	糖尿病	854	5.0
7	慢性下呼吸道疾病	657	3.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	556	3.3
9	高血壓性疾病	461	2.7
10	事故傷害	458	2.7
	敗血症	445	2.6
	其他	3,858	22.8




圖2. ICD-10 103年臺北市十大死因死亡率及標準化死亡率

高，高血壓性疾病 85 歲次之，最低為事故傷害 68 歲。(詳表 2)

表 2 ICD-10 103 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

		單位：歲											
死因別		所有死因	惡性腫瘤	壓性疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓)	腦血管疾病	肺炎	糖尿病	慢性下呼吸道	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	事故傷害	敗血症
死亡年齡平均數	兩性	75.0	70.7	77.2	77.5	83.4	77.1	84.1	79.6	82.8	64.4	80.9	
	男性	73.8	71.3	74.7	75.8	82.4	74.7	83.6	79.0	80.4	62.0	80.0	
	女性	76.5	69.9	80.8	80.1	85.1	79.5	85.3	80.3	85.6	69.8	82.3	
死亡年齡中位數	兩性	80	73	81	81	86	79	86	82	85	68	84	
	男性	78	73	78	80	85	77	86	82	84	64	83	
	女性	81	72	84	83	88	82	87	83	87	75	85	

四、臺北市男性十大死因與上年同，僅順位改變

103 年臺北市男性死亡人數為 9,908 人，死亡率為每十萬男性人口 766.4 人，較上年增加 4.6%；標準化死亡率為每十萬男性人口 422.8 人，較上年增加 3.2%，較 94 年則減少 12.0%。

103 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、慢性下呼吸道疾病、糖尿病、事故傷害、腎炎、腎病症候群及腎病變、敗血症、高血壓性疾病；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 77.6%，其中仍以惡性腫瘤占 28.5%最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 14.9%。(詳表 3、圖 3)


三、死亡年齡平均數較 94 年增加 4 歲

103 年臺北市民死亡年齡平均數為 75.0 歲，較全國高 3.2 歲，與 94 年比較則增加 4.3 歲，其中男性死亡年齡平均數為 73.8 歲，女性為 76.5 歲，男性較女性低 2.7 歲；十大死因中死亡年齡平均數以慢性下呼吸道疾病 84.1 歲最高，肺炎 83.4 歲次之，最低為事故傷害 64.4 歲。

若以死亡年齡中位數來看，103 年臺北市民死亡年齡中位數為 80 歲，較全國高 4 歲，與 94 年比較則增加 4 歲，其中男性死亡年齡中位數為 78 歲，女性為 81 歲，男性較女性低 3 歲；十大死因中死亡年齡中位數以肺炎、慢性下呼吸道疾病 86 歲最

表 3 ICD-10 103 年臺北市男性十大死因

順位	死因	單位：人、%	
		死亡人數	死亡百分比
1	所有死因	9,908	100.0
2	惡性腫瘤	2,824	28.5
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,480	14.9
4	腦血管疾病	722	7.3
5	肺炎	638	6.4
6	慢性下呼吸道疾病	476	4.8
7	糖尿病	433	4.4
8	事故傷害	318	3.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	284	2.9
10	敗血症	269	2.7
	高血壓性疾病	241	2.4
	其他	2,223	22.4



五、臺北市女性十大死因與上年比較，骨骼肌肉系統及結締組織之

疾病躍居 10 大

103 年臺北市女性死亡人數為 7,045 人，死亡率為每十萬女性人口 502.6 人，較上年增加 5.0%；標準化死亡率為每十萬女性人口 254.3 人，較上年增加 0.2%，較 94 年則減少 17.7%。

103 年女性十大死因之首亦為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、敗血症及骨骼肌肉系統及結締組織之疾病；女性十大死因死亡人數占女性總死亡人數 77.1%，其中亦以惡性腫瘤占 29.5% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 14.3%。(詳表 4、圖 4)

表 4 ICD-10 103 年臺北市女性十大死因

順位	死因	單位：人、%	
		死亡人數	死亡百分比
1	所有死因	7,045	100.0
2	惡性腫瘤	2,079	29.5
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,009	14.3
4	腦血管疾病	490	7.0
5	肺炎	422	6.0
6	糖尿病	421	6.0
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	272	3.9
8	高血壓性疾病	220	3.1
9	慢性下呼吸道疾病	181	2.6
10	敗血症	176	2.5
	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	161	2.3
	其他	1,614	22.9




圖4. ICD-10 103年臺北市女性十大死因死亡率及標準化死亡率

七、少年(1-14 歲)惡性腫瘤居首位死因，占 3 成 2

103 年臺北市 1-14 歲少年死亡人數為 50 人，死亡率為每十萬人口 14.0 人，分別較上年增加 2 人、3.7%。少年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 16 人占 32.0 %，(2)先天性畸形變形及染色體異常、事故傷害各 7 人，分占 14.0 %，3 者合占少年死亡人數的 60.0 %。

八、青年(15-24 歲)事故傷害仍居死因首位，占 2 成 6

103 年臺北市 15-24 歲青年死亡人數為 99 人，死亡率為每十萬人口 32.6 人，分別較上年增加 6 人、8.3%。青年主要死因前 3 項分別為(1)事故傷害 26 人占 26.3 %，(2)蓄意自我傷害(自殺) 25 人占 25.3 %，(3)惡性腫瘤 14 人占 14.1 %，3 者合占青年死亡人數的 65.7 %。

九、壯年(25-44 歲)死因之前二位為惡性腫瘤、蓄意自我傷害(自殺)

103 年臺北市 25-44 歲壯年死亡人數為 638 人，死亡率為每十萬人口 77.5 人，分別較上年增加 83 人、15.0%。壯年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 194 人占 30.4 %，(2)蓄意自我傷害(自殺) 96 人占 15.1 %，(3)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 81 人占 12.7 %，3 者合占壯年死亡人數的 58.2 %。

十、中年(45-64 歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占 4 成 5

103 年臺北市 45-64 歲中年死亡人數為 3,187 人，死亡率為每十萬人口 392.2 人，分別較上年減少 3 人、0.7%。中年主要

六、嬰兒(未滿 1 歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占 5 成

103 年臺北市未滿 1 歲嬰兒死亡人數為 110 人，死亡率為每十萬人口 377.1 人，分別較上年增加 10 人、減少 1.3%。男嬰死亡率為每十萬人口 467.9 人，較上年增加 15.1%；女嬰死亡率為 281.4 人，則較上年減少 21.0%。嬰兒主要死因前 3 項分別為(1)源於周產期的特定病況 55 人占 50.0 %，(2)先天性畸形變形及染色體異常 25 人占 22.7 %，(3)嬰兒猝死症候群(SIDS)、事故傷害各 5 人，分占 4.6 %，4 者合占嬰兒死亡人數的 81.9 %。

死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,438 人占 45.1 %，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 400 人占 12.6 %，(3)腦血管疾病 183 人占 5.7 %，3 者合占中年死亡人數的 63.4 %。

十一、老年(65-79 歲)死亡率以惡性腫瘤為首，占 3 成 7

103 年臺北市 65-79 歲老年死亡人數為 4,351 人，占總死亡人數的 25.7%，死亡率為每十萬人口 1,609.0 人，較上年減少 1.5%。65-79 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,611 人占 37.0 %，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 625 人占 14.4%，(3)腦血管疾病 315 人占 7.2 %，3 者合占 65-79 歲老年死亡人數的 58.6 %。


十二、老年(80 歲以上)死亡率亦以惡性腫瘤為首，占 1 成 9

103 年臺北市 80 歲以上老年死亡人數為 8,518 人，占總死亡人數的 50.2%，死亡率為每十萬人口 8,421.6 人，較上年增加 5.4%。80 歲以上老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,630 人占 19.1 %，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 1,373 人占 16.1%，(3)肺炎 799 人占 9.4%，3 者合占 80 歲以上老年死亡人數的 44.6 %。

十三、12 行政區以萬華區標準化死亡率最高，南港區次之

103 年臺北市 12 行政區死亡率以萬華區每十萬人口 850.6 人最高，中正區 669.5 人次之，內湖區 479.8 人最低；標準化後萬華區每十萬人口 405.2 人仍為最高，南港區 379.2 人次之，松

山區 282.3 人最低。(詳圖 5)



十四、惡性腫瘤(癌症)

(一)「氣管、支氣管和肺癌」、「結腸、直腸和肛門癌」、「肝和肝內膽管癌」續居癌症死因前三位


103 年臺北市惡性腫瘤死亡人數為 4,903 人，占總死亡人數之 28.9%，死亡率為每十萬人口 182.0 人，較上年減少 0.9%；標準化死亡率為每十萬人口 103.7 人，較上年則減少 3.1%，較 94 年亦減少 13.7 %。

103 年臺北市十大癌症死因中氣管、支氣管和肺癌仍居榜首，其次依序為結腸、直腸和肛門癌、肝和肝內膽管癌、女性

乳房癌、前列腺(攝護腺)癌、胃癌、胰臟癌、口腔癌、卵巢癌、非何杰金氏淋巴瘤；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數 76.4%，其中氣管、支氣管和肺癌占 20.2%最多，結腸、直腸和肛門癌及肝和肝內膽管癌各占 13.6%次之。（詳表 5、圖 6）

表 5. ICD-10 103 年臺北市十大癌症死因

順位	癌症死因	單位：人、%	
		死亡人數	死亡百分比
1	所有癌症死因	4,903	100.0
	氣管、支氣管和肺癌	992	20.2
2	結腸、直腸和肛門癌	666	13.6
2	肝和肝內膽管癌	666	13.6
4	女性乳房癌	289	5.9
5	前列腺(攝護腺)癌	151	3.1
6	胃癌	312	6.4
7	胰臟癌	257	5.2
8	口腔癌	174	3.5
9	卵巢癌	84	1.7
10	非何杰金氏淋巴瘤	155	3.2
	其他	1,157	23.6



（二）男性癌症標準化死亡率較上年減少 2.4%、女性則減少

3.6%，惟男性癌症標準化死亡率仍為女性的 1.5 倍

103 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性為 2,824 人，女性為 2,079 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 127.7 人、每十萬女性人口 83.1 人，男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性減少 1.1%、女性增加 0.7%，標準化死亡率男性亦減少 2.4%，女性則減少 3.6%。

103 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 70.7 歲，較全國高 2.6 歲，與 94 年比較則增加 2.1 歲，其中男性死亡年齡平均數為 71.3 歲，女性為 69.9 歲。103 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平

均數以前列腺(攝護腺)癌 82.3 歲最高，胃癌 75.4 歲次之，最低為女性乳房癌 60.9 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，103 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 73 歲，較全國高 4 歲，與 94 年比較則增加 1 歲，其中男性死亡年齡中位數為 73 歲，女性為 72 歲。103 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡中位數以前列腺(攝護腺)癌 85 歲最高，胃癌 79 歲次之，最低為女性乳房癌 59 歲。(詳表 6)

表 6. ICD-10 103 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數
單位：歲

死因別		所有癌症死因	氣管、支氣管和肺癌	結腸、直腸和肛門癌	肝和肝內膽管癌	女性乳房癌	前列腺攝護腺癌	胃癌	胰臟癌	口腔癌	卵巢癌	非何杰金氏淋巴瘤
死亡年齡平均數	兩性	70.7	73.2	72.8	70.4	60.9	82.3	75.4	70.9	64.2	61.8	71.3
	男性	71.3	74.3	72.9	68.4	--	82.3	76.7	69.8	62.4	--	71.2
	女性	69.9	71.6	72.8	74.6	60.9	--	73.1	72.1	76.6	61.8	71.3
死亡年齡中位數	兩性	73	75	75	71	59	85	79	71	62	60	76
	男性	73	77	74.5	67	--	85	80	71	59	--	75
	女性	72	74	75.5	76	59	--	78	73	79	60	76

貳、人口統計指標

表A・臺北市人口統計指標—行政區別

中華民國103年

項目	單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積	平方公里	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度	人/平方公里	9,942	22,661	20,491	27,610	16,847	21,478	23,053	21,996	8,693	5,551	9,049	4,657	4,532
年底人口數	人	2,702,315	210,473	229,657	313,693	230,496	163,388	130,973	194,715	273,921	121,257	285,767	290,455	257,520
男性	人	1,295,636	99,430	110,182	146,903	107,664	78,158	64,003	96,205	131,932	59,213	136,922	140,510	124,514
女性		1,406,679	111,043	119,475	166,790	122,832	85,230	66,970	98,510	141,989	62,044	148,845	149,945	133,006
性比例		92.11	89.54	92.22	88.08	87.65	91.70	95.57	97.66	92.92	95.44	91.99	93.71	93.62
出生數	人	29,024	2,046	2,505	2,974	2,622	1,674	1,535	2,260	2,830	1,467	3,171	3,113	2,827
粗出生率	%	10.77	9.72	10.94	9.49	11.42	10.25	11.77	11.64	10.38	12.17	11.15	10.73	11.02
死亡數	人	17,177	1,265	1,469	2,101	1,442	1,139	880	1,687	1,685	743	1,369	1,822	1,575
粗死亡率	%	6.38	6.01	6.41	6.70	6.28	6.98	6.75	8.69	6.18	6.17	4.82	6.28	6.14
人口增加率	%o	5.88	0.62	5.08	1.05	7.62	1.52	8.88	6.38	9.51	12.57	10.34	2.46	8.13
自然增加率		4.40	3.71	4.52	2.78	5.14	3.28	5.02	2.95	4.20	6.01	6.34	4.45	4.88
社會增加率		1.47	-3.09	0.55	-1.73	2.45	-1.76	3.82	3.41	5.26	6.48	3.95	-1.99	3.21
14歲以下年底	人	382,795	32,232	29,633	47,848	29,539	27,058	17,989	22,945	40,444	16,847	42,772	38,813	36,675
人口數(a)	比重(%)	14.17	15.31	12.90	15.25	12.82	16.56	13.73	11.78	14.76	13.89	14.97	13.36	14.24
15-64歲年底	人	1,938,993	145,842	165,070	213,434	167,469	111,717	93,945	140,366	198,462	89,468	215,427	210,702	187,091
人口數(b)	比重(%)	71.75	69.29	71.88	68.04	72.66	68.38	71.73	72.09	72.45	73.78	75.39	72.54	72.65
65歲以上年底	人	380,527	32,399	34,954	52,411	33,488	24,613	19,039	31,404	35,015	14,942	27,568	40,940	33,754
人口數(c)	比重(%)	14.08	15.39	15.22	16.71	14.53	15.06	14.54	16.13	12.78	12.32	9.65	14.10	13.11
扶養比 (a+c)/b	%	39.37	44.32	39.13	46.97	37.64	46.25	39.41	38.72	38.02	35.53	32.65	37.85	37.64
扶幼比 a/b		19.74	22.10	17.95	22.42	17.64	24.22	19.15	16.35	20.38	18.83	19.85	18.42	19.60
扶老比 c/b		19.62	22.22	21.18	24.56	20.00	22.03	20.27	22.37	17.64	16.70	12.80	19.43	18.04
老化指數 c/a		99.41	100.52	117.96	109.54	113.37	90.96	105.84	136.87	86.58	88.69	64.45	105.48	92.04

資料來源：本府民政局。

附註：本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B・臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
87	75.76	73.12	78.93	79.11	77.06	81.48
88	75.90	73.33	78.98	79.48	77.47	81.78
89	76.46	73.83	79.56	79.85	77.78	82.24
90	76.75	74.07	79.92	80.08	78.05	82.38
91	77.19	74.58	80.24	80.36	78.34	82.60
92	77.35	74.77	80.33	80.61	78.64	82.76
93	77.48	74.68	80.75	80.99	78.92	83.20
94	77.42	74.50	80.80	81.17	78.94	83.55
95	77.90	74.86	81.41	81.58	79.19	84.13
96	78.38	75.46	81.72	81.79	79.41	84.31
97	78.57	75.59	81.94	81.99	79.70	84.38
98	79.01	76.03	82.34	82.16	79.86	84.53
99	79.18	76.13	82.55	82.42	80.06	84.81
100	79.15	75.96	82.63	82.70	80.18	85.25
101	79.51	76.43	82.82	82.66	80.00	85.33
102	80.02	76.91	83.36	82.90	80.18	85.63

資料來源：內政部。

附 註：本市配合內政部縣市數據公布係以近3年合併人口編算，例102年平均餘命採100-102年，101年則採99-101年3年合併人口計算。

表C・臺北市近十年各年齡組年中人口數

年別	總計	0歲	1-4歲	5-14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
人 數 (人)								
94年	2,619,424	20,858	106,020	329,182	354,222	841,903	676,350	290,888
95年	2,624,309	20,255	97,844	322,973	344,320	839,559	698,492	300,867
96年	2,630,756	20,497	93,288	314,682	334,216	837,173	720,426	310,474
97年	2,626,096	20,251	90,589	304,529	325,271	827,928	738,785	318,745
98年	2,615,176	19,295	88,872	292,745	317,673	815,122	755,775	325,696
99年	2,613,100	18,733	89,279	280,706	313,173	808,277	772,772	330,161
100年	2,634,870	21,842	92,078	269,451	312,649	813,915	789,884	335,053
101年	2,662,097	27,281	96,621	259,149	313,265	821,078	801,277	343,428
102年	2,679,871	27,573	105,081	250,714	309,256	823,715	807,903	355,631
103年	2,694,416	27,029	112,644	243,526	303,418	823,648	812,586	371,566
百 分 比 (%)								
94年	100.00	0.80	4.05	12.57	13.52	32.14	25.82	11.11
95年	100.00	0.77	3.73	12.31	13.12	31.99	26.62	11.46
96年	100.00	0.78	3.55	11.96	12.70	31.82	27.38	11.80
97年	100.00	0.77	3.45	11.60	12.39	31.53	28.13	12.14
98年	100.00	0.74	3.40	11.19	12.15	31.17	28.90	12.45
99年	100.00	0.72	3.42	10.74	11.98	30.93	29.57	12.63
100年	100.00	0.83	3.49	10.23	11.87	30.89	29.98	12.72
101年	100.00	1.02	3.63	9.73	11.77	30.84	30.10	12.90
102年	100.00	1.03	3.92	9.36	11.54	30.74	30.15	13.27
103年	100.00	1.00	4.18	9.04	11.26	30.57	30.16	13.79

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D・臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性

年別	男性總計	0 歲	1 - 4 歲	5 - 14 歲	15-24 歲	25-44 歲	45-64 歲	65 歲以上
人 數 (人)								
94年	1,282,908	11,007	55,113	172,464	181,326	395,113	321,267	146,618
95年	1,281,102	10,599	51,037	168,671	176,781	393,448	331,205	149,362
96年	1,280,124	10,599	48,784	163,958	171,984	391,825	340,865	152,110
97年	1,274,252	10,466	47,357	158,589	167,692	387,224	348,609	154,316
98年	1,265,699	9,980	46,379	152,510	164,019	381,047	355,766	156,000
99年	1,261,502	9,708	46,394	146,399	161,906	377,421	363,045	156,630
100年	1,269,449	11,286	47,666	140,732	161,751	380,130	370,322	157,563
101年	1,280,852	14,085	49,976	135,392	162,067	384,448	374,796	160,090
102年	1,287,653	14,262	54,260	130,921	160,134	386,721	376,956	164,401
103年	1,292,791	13,863	58,061	127,147	157,322	387,679	378,315	170,405
百 分 比 (%)								
94年	100.00	0.86	4.30	13.44	14.13	30.80	25.04	11.43
95年	100.00	0.83	3.98	13.17	13.80	30.71	25.85	11.66
96年	100.00	0.83	3.81	12.81	13.43	30.61	26.63	11.88
97年	100.00	0.82	3.72	12.45	13.16	30.39	27.36	12.11
98年	100.00	0.79	3.66	12.05	12.96	30.11	28.11	12.33
99年	100.00	0.77	3.68	11.61	12.83	29.92	28.78	12.42
100年	100.00	0.89	3.75	11.09	12.74	29.94	29.17	12.41
101年	100.00	1.10	3.90	10.57	12.65	30.02	29.26	12.50
102年	100.00	1.11	4.21	10.17	12.44	30.03	29.27	12.77
103年	100.00	1.07	4.49	9.84	12.17	29.99	29.26	13.18

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表E・臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性

年別	女性總計	0 歲	1 - 4 歲	5 - 14 歲	15-24 歲	25-44 歲	45-64 歲	65 歲以上
人 數 (人)								
94年	1,336,516	9,850	50,907	156,718	172,896	446,790	355,084	144,270
95年	1,343,207	9,656	46,807	154,302	167,539	446,111	367,287	151,505
96年	1,350,632	9,898	44,504	150,725	162,232	445,348	379,562	158,364
97年	1,351,844	9,786	43,232	145,940	157,579	440,704	390,176	164,429
98年	1,349,477	9,316	42,493	140,235	153,654	434,075	400,009	169,696
99年	1,351,598	9,025	42,885	134,307	151,268	430,856	409,727	173,531
100年	1,365,422	10,556	44,412	128,720	150,898	433,785	419,562	177,490
101年	1,381,245	13,196	46,646	123,757	151,199	436,630	426,481	183,338
102年	1,392,218	13,312	50,821	119,793	149,123	436,994	430,947	191,230
103年	1,401,625	13,166	54,583	116,379	146,097	435,969	434,271	201,161
百 分 比 (%)								
94年	100.00	0.74	3.81	11.73	12.94	33.43	26.57	10.79
95年	100.00	0.72	3.48	11.49	12.47	33.21	27.34	11.28
96年	100.00	0.73	3.30	11.16	12.01	32.97	28.10	11.73
97年	100.00	0.72	3.20	10.80	11.66	32.60	28.86	12.16
98年	100.00	0.69	3.15	10.39	11.39	32.17	29.64	12.57
99年	100.00	0.67	3.17	9.94	11.19	31.88	30.31	12.84
100年	100.00	0.77	3.25	9.43	11.05	31.77	30.73	13.00
101年	100.00	0.96	3.38	8.96	10.95	31.61	30.88	13.27
102年	100.00	0.96	3.65	8.60	10.71	31.39	30.95	13.74
103年	100.00	0.94	3.89	8.30	10.42	31.10	30.98	14.35

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F・臺北市各行政區年齡別年底人口數

單位：人

年齡別	總計	中華民國103年底											
		松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
103年底人口數	2,702,315	210,473	229,657	313,693	230,496	163,388	130,973	194,715	273,921	121,257	285,767	290,455	257,520
0歲	28,420	2,026	2,471	2,956	2,541	1,675	1,498	2,196	2,769	1,434	3,122	3,020	2,712
1-4	114,834	8,759	9,669	13,256	9,685	7,244	5,822	8,130	11,618	5,610	12,294	11,692	11,055
5-9	110,705	9,699	8,312	14,533	8,266	8,170	4,927	6,045	11,829	4,682	12,452	11,197	10,593
10-14	128,836	11,748	9,181	17,103	9,047	9,969	5,742	6,574	14,228	5,121	14,904	12,904	12,315
15-19	150,084	11,729	11,789	17,452	11,330	9,277	6,946	9,395	16,887	6,766	18,071	16,028	14,414
20-24	151,655	10,875	12,868	15,701	12,306	8,264	7,054	10,869	16,060	7,265	18,496	16,889	15,008
25-29	159,329	10,987	14,015	15,270	13,582	8,468	7,896	12,046	15,765	7,775	19,148	18,282	16,095
30-34	223,964	15,109	19,535	21,529	19,642	12,180	11,679	17,798	22,072	11,512	24,948	25,161	22,799
35-39	231,803	17,038	19,829	24,557	20,231	13,729	11,998	17,465	23,250	11,715	24,927	24,417	22,647
40-44	207,951	16,890	17,145	23,887	17,691	12,967	9,794	14,199	22,233	9,625	22,003	21,344	20,173
45-49	208,584	16,501	17,480	24,375	17,992	12,486	9,673	14,254	22,908	9,266	22,954	21,631	19,064
50-54	210,733	16,007	17,854	23,928	18,723	12,017	9,911	15,220	21,957	9,113	24,098	22,228	19,677
55-59	206,727	15,670	17,813	23,297	18,665	11,504	9,835	15,207	19,985	8,695	23,133	23,349	19,574
60-64	188,163	15,036	16,742	23,438	17,307	10,825	9,159	13,913	17,345	7,736	17,649	21,373	17,640
65-69	120,816	10,674	11,325	16,675	10,939	7,591	5,707	8,996	10,970	4,836	9,174	13,098	10,831
70-74	90,105	7,600	8,472	12,067	7,876	5,424	4,688	7,569	8,078	3,787	6,286	9,934	8,324
75-79	67,536	5,341	5,887	8,983	6,031	4,509	3,958	5,977	5,956	2,689	4,836	7,451	5,918
80-84	50,074	4,117	4,394	6,766	4,541	3,393	2,611	4,510	4,634	1,831	3,609	5,346	4,322
85-89	34,009	2,959	3,199	4,970	2,776	2,280	1,364	2,925	3,491	1,235	2,512	3,362	2,936
90-94	14,049	1,304	1,286	2,252	1,034	1,078	541	1,142	1,508	451	955	1,379	1,119
95-99	3,192	318	307	557	239	255	122	232	335	101	171	298	257
100歲以上	746	86	84	141	52	83	48	53	43	12	25	72	47

資料來源：本府民政局。

表G・臺北市近十年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	94年底	95年底	96年底	97年底	98年底	99年底	100年底	101年底	102年底	103年底
臺北市	2,616,375	2,632,242	2,629,269	2,622,923	2,607,428	2,618,772	2,650,968	2,673,226	2,686,516	2,702,315
松山區	208,101	209,422	210,986	210,097	207,995	208,434	209,948	210,905	210,343	210,473
信義區	230,780	231,476	228,868	227,770	225,364	225,092	226,541	227,734	228,496	229,657
大安區	312,166	314,171	314,924	313,848	311,612	311,565	313,846	313,426	313,363	313,693
中山區	216,906	219,582	218,483	218,841	218,245	220,126	224,102	226,659	228,753	230,496
中正區	157,335	158,604	159,486	159,337	158,752	159,536	161,449	162,154	163,140	163,388
大同區	126,810	126,923	126,128	124,653	123,399	124,600	126,640	128,809	129,820	130,973
萬華區	194,743	194,879	192,470	190,361	188,437	189,099	190,855	192,628	193,480	194,715
文山區	258,953	261,417	261,666	261,719	260,869	262,307	266,442	269,310	271,341	273,921
南港區	113,052	113,258	113,716	113,672	113,149	114,023	116,131	118,490	119,752	121,257
內湖區	261,837	264,624	265,518	266,808	267,704	270,245	275,652	280,025	282,842	285,767
士林區	287,753	288,212	287,048	286,065	283,855	284,539	287,072	288,894	289,742	290,455
北投區	247,939	249,674	249,976	249,752	248,047	249,206	252,290	254,192	255,444	257,520

資料來源：本府民政局。

表H・臺北市各行政區年齡別年中人口數

單位：人

年齡別	中華民國103年中												
	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
103年中人口數	2,694,416	210,408	229,077	313,528	229,625	163,264	130,397	194,098	272,631	120,505	284,305	290,099	256,482
0歲	27,029	1,881	2,326	2,803	2,436	1,580	1,392	2,083	2,660	1,384	3,004	2,869	2,613
1-4	112,644	8,631	9,485	13,041	9,408	7,129	5,747	7,950	11,399	5,479	12,023	11,513	10,842
5-9	110,751	9,739	8,298	14,530	8,248	8,170	4,897	6,105	11,854	4,653	12,466	11,245	10,549
10-14	132,775	12,145	9,465	17,630	9,358	10,266	5,911	6,726	14,636	5,240	15,411	13,294	12,696
15-19	152,038	11,837	12,008	17,618	11,519	9,369	7,003	9,607	17,034	6,848	18,312	16,333	14,553
20-24	151,381	10,836	12,933	15,536	12,276	8,218	7,087	10,870	15,861	7,248	18,565	16,913	15,041
25-29	162,112	11,160	14,208	15,623	13,801	8,636	8,047	12,321	15,991	7,968	19,220	18,704	16,434
30-34	225,060	15,214	19,623	21,743	19,915	12,227	11,739	17,970	22,093	11,543	24,962	25,153	22,881
35-39	227,246	16,897	19,440	24,170	19,780	13,464	11,655	16,993	22,921	11,428	24,269	24,086	22,146
40-44	209,231	16,987	17,317	24,220	17,710	13,049	9,836	14,215	22,477	9,616	22,155	21,470	20,182
45-49	209,661	16,681	17,537	24,548	18,096	12,646	9,696	14,347	22,856	9,249	23,188	21,680	19,140
50-54	211,424	16,091	17,952	23,967	18,816	12,070	9,924	15,260	21,841	9,100	24,162	22,511	19,733
55-59	206,338	15,729	17,811	23,533	18,668	11,470	9,824	15,150	19,787	8,578	22,834	23,425	19,531
60-64	185,164	14,935	16,546	23,318	17,029	10,780	8,993	13,646	17,016	7,659	17,025	20,950	17,269
65-69	114,736	10,206	10,788	15,860	10,329	7,202	5,469	8,608	10,391	4,555	8,543	12,458	10,329
70-74	89,561	7,475	8,366	12,003	7,840	5,462	4,726	7,598	8,005	3,735	6,226	9,900	8,228
75-79	66,125	5,253	5,722	8,792	5,938	4,456	3,877	5,894	5,840	2,623	4,724	7,263	5,745
80-84	50,370	4,144	4,506	6,819	4,491	3,402	2,558	4,497	4,730	1,843	3,670	5,365	4,348
85-89	33,449	2,924	3,155	4,898	2,691	2,275	1,331	2,888	3,448	1,226	2,463	3,292	2,861
90-94	13,527	1,273	1,222	2,203	999	1,060	522	1,089	1,446	428	894	1,322	1,073
95-99	3,079	296	296	542	231	255	122	235	307	94	168	290	244
100歲以上	720	79	78	136	50	84	46	52	43	12	26	68	48

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I・臺北市近十年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年
臺北市	2,619,424	2,624,309	2,630,756	2,626,096	2,615,176	2,613,100	2,634,870	2,662,097	2,679,871	2,694,416
松山區	207,032	208,762	210,204	210,542	209,046	208,215	209,191	210,427	210,624	210,408
信義區	231,643	231,128	230,172	228,319	226,567	225,228	225,817	227,138	228,115	229,077
大安區	312,360	313,169	314,548	314,386	312,730	311,589	312,706	313,636	313,395	313,528
中山區	216,887	218,244	219,033	218,662	218,543	219,186	222,114	225,381	227,706	229,625
中正區	157,911	157,970	159,045	159,412	159,045	159,144	160,493	161,802	162,647	163,264
大同區	127,661	126,867	126,526	125,391	124,026	124,000	125,620	127,725	129,315	130,397
萬華區	196,094	194,811	193,675	191,416	189,399	188,768	189,977	191,742	193,054	194,098
文山區	258,500	260,185	261,542	261,693	261,294	261,588	264,375	267,876	270,326	272,631
南港區	113,017	113,155	113,487	113,694	113,411	113,586	115,077	117,311	119,121	120,505
內湖區	261,519	263,231	265,071	266,163	267,256	268,975	272,949	277,839	281,434	284,305
士林區	288,337	287,983	287,630	286,557	284,960	284,197	285,806	287,983	289,318	290,099
北投區	248,464	248,807	249,825	249,864	248,900	248,627	250,748	253,241	254,818	256,482

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

參、103 年死因統計

一、主要死因統計

表1・ICD-10 臺北市、全國主要死亡原因比較
中華民國103年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾病碼 ICD 10	死 亡 原 因	臺北市				全 國			
		順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比
A00-Y98	所有死亡原因		16,953	629.19	100.00		162,911	696.09	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,903	181.97	28.92	1	46,094	196.95	28.29
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,489	92.38	14.68	2	19,400	82.89	11.91
I60-I69	腦血管疾病	3	1,212	44.98	7.15	3	11,736	50.15	7.20
J12-J18	肺炎	4	1,060	39.34	6.25	4	10,352	44.23	6.35
E10-E14	糖尿病	5	854	31.70	5.04	5	9,845	42.07	6.04
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	657	24.38	3.88	7	6,430	27.47	3.95
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	556	20.64	3.28	10	4,868	20.80	2.99
I10-I15	高血壓性疾病	8	461	17.11	2.72	8	5,459	23.33	3.35
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	458	17.00	2.70	6	7,123	30.44	4.37
A40-A41	敗血症	10	445	16.52	2.62	12	3,434	14.67	2.11
	其他		3,858	143.19	22.76		38,170	163.10	23.43
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	311	11.54	1.83	11	3,546	15.15	2.18
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	309	11.47	1.82	13	1,606	6.86	0.99
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	284	10.54	1.68	9	4,962	21.20	3.05
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	14	198	7.35	1.17	16	1,142	4.88	0.70
G20-G21	帕金森病	15	135	5.01	0.80	17	948	4.05	0.58

資料來源：衛生福利部。

表2. ICD-10 全國縣市別死亡概況

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口

縣市別	總 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
總 計	162,911	696.09	443.60	97,994	838.18	569.24	64,917	554.26	327.31
新北市	21,711	548.14	408.57	13,265	679.94	524.62	8,446	420.20	304.55
臺北市	16,953	629.19	332.49	9,908	766.40	422.76	7,045	502.63	254.34
臺中市	15,888	586.11	441.87	9,568	712.24	558.05	6,320	462.20	335.78
臺南市	14,333	760.88	457.25	8,323	881.38	579.97	6,010	639.75	344.24
高雄市	20,167	725.58	483.64	12,405	896.03	620.35	7,762	556.42	356.72
宜蘭縣	3,751	817.90	462.79	2,250	966.05	598.39	1,501	665.01	333.47
桃園縣	11,854	577.91	437.16	7,526	730.93	552.32	4,328	423.68	328.04
新竹縣	3,630	679.70	451.60	2,207	806.73	571.34	1,423	546.29	330.44
苗栗縣	4,814	850.02	475.34	2,889	988.94	610.21	1,925	702.01	339.65
彰化縣	9,754	753.94	446.26	5,749	868.27	587.45	4,005	634.08	314.08
南投縣	4,726	916.30	506.21	2,813	1,062.77	647.18	1,913	761.90	366.35
雲林縣	7,093	1,003.86	524.15	4,127	1,122.46	687.76	2,966	875.19	360.92
嘉義縣	5,554	1,053.88	518.03	3,272	1,191.96	680.40	2,282	903.76	351.68
屏東縣	8,033	944.95	557.28	4,837	1,109.82	709.20	3,196	771.49	404.76
臺東縣	2,479	1,103.52	644.69	1,547	1,326.31	838.68	932	862.92	445.58
花蓮縣	3,302	989.68	576.91	2,100	1,230.44	746.24	1,202	737.54	409.84
澎湖縣	910	900.29	479.56	558	1,072.02	636.02	352	717.96	327.11
基隆市	2,844	760.44	458.71	1,668	886.64	576.44	1,176	632.71	350.60
新竹市	2,481	576.66	406.37	1,475	692.46	514.36	1,006	463.11	311.23
嘉義市	1,931	712.87	446.63	1,099	829.25	563.36	832	601.38	344.72
金門縣	641	516.03	316.90	370	593.32	422.13	271	438.10	221.59
連江縣	62	502.61	362.39	38	539.93	424.17	24	453.04	288.84

資料來源：衛生福利部。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3・ICD-10 臺北市主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬男 性人 口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬女 性人 口死 亡 率	死 亡 百 分 比
1	所有死亡原因	16,953	629.19	100.00	所有死亡原因	9,908	766.40	100.00	所有死亡原因	7,045	502.63	100.00
2	惡性腫瘤	4,903	181.97	28.92	惡性腫瘤	2,824	218.44	28.50	惡性腫瘤	2,079	148.33	29.51
3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,489	92.38	14.68	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,480	114.48	14.94	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,009	71.99	14.32
4	腦血管疾病	1,212	44.98	7.15	腦血管疾病	722	55.85	7.29	腦血管疾病	490	34.96	6.96
5	肺炎	1,060	39.34	6.25	肺炎	638	49.35	6.44	肺炎	422	30.11	5.99
6	糖尿病	854	31.70	5.04	慢性下呼吸道疾病	476	36.82	4.80	糖尿病	421	30.04	5.98
7	慢性下呼吸道疾病	657	24.38	3.88	糖尿病	433	33.49	4.37	腎炎、腎病症候群及腎病變	272	19.41	3.86
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	556	20.64	3.28	事故傷害	318	24.60	3.21	高血壓性疾病	220	15.70	3.12
9	高血壓性疾病	461	17.11	2.72	腎炎、腎病症候群及腎病變	284	21.97	2.87	慢性下呼吸道疾病	181	12.91	2.57
10	事故傷害	458	17.00	2.70	敗血症	269	20.81	2.71	敗血症	176	12.56	2.50
11	敗血症	445	16.52	2.62	高血壓性疾病	241	18.64	2.43	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	161	11.49	2.29
12	其他	3,858	143.19	22.76	其他	2,223	171.95	22.44	其他	1,614	115.15	22.91
13	蓄意自我傷害（自殺）	311	11.54	1.83	慢性肝病及肝硬化	188	14.54	1.90	事故傷害	140	9.99	1.99
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	309	11.47	1.82	蓄意自我傷害（自殺）	181	14.00	1.83	蓄意自我傷害（自殺）	130	9.27	1.85
15	慢性肝病及肝硬化	284	10.54	1.68	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	148	11.45	1.49	血管性及未明示之癥狀	114	8.13	1.62
16	血管性及未明示之癥狀	198	7.35	1.17	帕金森病	91	7.04	0.92	慢性肝病及肝硬化	96	6.85	1.36
17	帕金森病	135	5.01	0.80	血管性及未明示之癥狀	84	6.50	0.85	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	50	3.57	0.71

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為 2,694,416人，其中男性為 1,292,791人，女性為 1,401,625人。

表4・ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病 碼	死 亡 原 因	總 計		0 歲		1 - 14 歲		15 - 24 歲		25 - 44 歲		45 - 64 歲		65 - 79 歲		80 歲 以 上		
			死 亡 人 數	每十萬人數死 亡 率	死 亡 人 數	每十萬人數死 亡 率	死 亡 人 數	每十萬人數死 亡 率	死 亡 人 數	每十萬人數死 亡 率	死 亡 人 數	每十萬人數死 亡 率	死 亡 人 數	每十萬人數死 亡 率	死 亡 人 數	每十萬人數死 亡 率	死 亡 人 數	每十萬人數死 亡 率	
	A00-Y98	所有死亡原因	16,953	629.19	110	406.98	50	14.04	99	32.63	638	77.46	3,187	392.20	4,351	1,608.97	8,518	8,421.61	
1	C00-C97	惡性腫瘤	4,903	181.97	-	-	16	4.49	14	4.61	194	23.55	1,438	176.97	1,611	595.74	1,630	1,611.56	
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,489	92.38	3	11.10	5	1.40	2	0.66	81	9.83	400	49.23	625	231.12	1,373	1,357.46	
3	I60-I69	腦血管疾病	1,212	44.98	1	3.70	1	0.28	2	0.66	33	4.01	183	22.52	315	116.48	677	669.34	
4	J12-J18	肺炎	1,060	39.34	2	7.40	2	0.56	2	0.66	11	1.34	61	7.51	183	67.67	799	789.96	
5	E10-E14	糖尿病	854	31.70	-	-	-	-	-	-	12	1.46	138	16.98	284	105.02	420	415.25	
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	657	24.38	-	-	1	0.28	2	0.66	4	0.49	32	3.94	99	36.61	519	513.13	
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	556	20.64	-	-	-	-	-	-	7	0.85	62	7.63	158	58.43	329	325.28	
8	I10-I15	高血壓性疾病	461	17.11	-	-	-	-	-	-	3	0.36	38	4.68	89	32.91	331	327.25	
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	458	17.00	5	18.50	7	1.97	26	8.57	51	6.19	121	14.89	93	34.39	155	153.25	
10	A40-A41	敗血症	445	16.52	-	-	1	0.28	-	-	3	0.36	48	5.91	106	39.20	287	283.75	
		其他	3,858	143.19	99	366.28	17	4.77	51	16.81	239	29.02	666	81.96	788	291.40	1,998	1,975.39	
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	311	11.54	-	-	-	-	25	8.24	96	11.66	103	12.68	60	22.19	27	26.69	
12	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	309	11.47	-	-	-	-	2	0.66	6	0.73	23	2.83	50	18.49	228	225.42	
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	284	10.54	-	-	-	-	-	-	19	2.31	119	14.64	75	27.73	71	70.20	
14	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓	198	7.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6.66	180	177.96	
15	G20-G21	帕金森病	135	5.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.62	30	11.09	100	98.87

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為人 2,694,416。

表5・ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況

中華民國103年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病 碼	死 亡 原 因	總 計		0 歲		1 - 14 歲		15 - 24 歲		25 - 44 歲		45 - 64 歲		65 - 79 歲		80 歲 以 上	
			死 亡 人 數	每十萬男性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬男性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬男性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬男性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬男性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬男性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬男性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬男性人口死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	9,908	766.40	70	504.96	30	16.20	71	45.13	407	104.98	2,072	547.69	2,527	2,091.98	4,731	9,536.29
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,824	218.44	-	-	8	4.32	7	4.45	100	25.79	801	211.73	921	762.45	987	1,989.50
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,480	114.48	3	22	1	1	2	1.27	66	17.02	306	80.89	400	331.14	702	1,415.02
3	I60-I69	腦血管疾病	722	55.85	1	7	1	1	2	1	20	5.16	139	36.74	188	155.64	371	747.83
4	J12-J18	肺炎	638	49.35	1	7	1	1	2	1	7	1.81	46	12.16	119	98.51	462	931.25
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	476	36.82	-	-	1	1	2	1	2	0.52	25	6.61	75	62.09	371	747.83
6	E10-E14	糖尿病	433	33.49	-	-	-	-	-	-	6	1.55	105	27.75	138	114.24	184	370.89
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	318	24.60	4	28.85	5	3	21	13.35	39	10.06	96	25.38	55	45.53	98	197.54
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	284	21.97	-	-	-	-	-	-	5	1.29	34	8.99	79	65.40	166	334.61
9	A40-A41	敗血症	269	20.81	-	-	-	-	-	-	2	0.52	34	8.99	68	56.29	165	332.59
10	I10-I15	高血壓性疾病	241	18.64	-	-	-	-	-	-	3	0.77	34	8.99	47	38.91	157	316.47
		其他	2,223	171.95	61	440.04	13	7.02	35	22.25	157	40.50	452	119.48	437	361.77	1,068	2,152.77
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	188	14.54	-	-	-	-	-	-	18	4.64	100	26.43	34	28.15	36	72.57
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	181	14.00	-	-	-	-	12	7.63	53	13.67	53	14.01	43	35.60	20	40.31
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	148	11.45	-	-	-	-	1	1	2	0.52	10	2.64	25	20.70	110	221.73
14	G20-G21	帕金森病	91	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.79	21	17.38	67	135.05
15	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓	84	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9.11	73	147.15

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,292,791人。

表6・ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況

中華民國103年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病 碼	死 亡 原 因	總 計		0 歲		1 - 14 歲		15 - 24 歲		25 - 44 歲		45 - 64 歲		65 - 79 歲		80 歲 以 上		
			死 亡 人 數	每十萬女性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬女性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬女性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬女性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬女性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬女性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬女性人口死亡率	死 亡 人 數	每十萬女性人口死亡率	
	A00-Y98	總計	7,045	502.63	40	303.81	20	11.70	28	19.17	231	52.99	1,115	256.75	1,824	1,219.03	3,787	7,348.55	
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,079	148.33	-	-	8	4.68	7	4.79	94	21.56	637	146.68	690	461.15	643	1,247.72	
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,009	71.99	-	-	4	2.34	-	-	15	3.44	94	21.65	225	150.37	671	1,302.05	
3	I60-I69	腦血管疾病	490	34.96	-	-	-	-	-	-	13	2.98	44	10.13	127	84.88	306	593.78	
4	J12-J18	肺炎	422	30.11	1	7.60	1	0.58	-	-	4	0.92	15	3.45	64	42.77	337	653.94	
5	E10-E14	糖尿病	421	30.04	-	-	-	-	-	-	6	1.38	33	7.60	146	97.58	236	457.95	
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	272	19.41	-	-	-	-	-	-	2	0.46	28	6.45	79	52.80	163	316.30	
7	I10-I15	高血壓性疾病	220	15.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.92	42	28.07	174	337.64
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	181	12.91	-	-	-	-	-	-	2	0.46	7	1.61	24	16.04	148	287.19	
9	A40-A41	敗血症	176	12.56	-	-	1	0.58	-	-	1	0.23	14	3.22	38	25.40	122	236.74	
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結織組織之疾病	161	11.49	-	-	-	-	1	0.68	4	0.92	13	2.99	25	16.71	118	228.98	
		其他	1,614	115.15	39	296.22	6	3.51	20	13.69	90	20.64	226	52.04	364	243.27	869	1,686.27	
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	140	9.99	1	7.60	2	1.17	5	3.42	12	2.75	25	5.76	38	25.40	57	110.61	
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	130	9.27	-	-	-	-	13	8.90	43	9.86	50	11.51	17	11.36	7	13.58	
13	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓	114	8.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4.68	107	207.63	
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	96	6.85	-	-	-	-	-	-	1	0.23	19	4.38	41	27.40	35	67.92	
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	50	3.57	-	-	-	-	-	-	2	0.46	8	1.84	17	11.36	23	44.63	

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,401,625人。

表7・ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	110	377.05	100.00		所有死亡原因	70	467.91	100.00		所有死亡原因	40	281.41	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	55	188.52	50.00	P00-P96	源於周產期的特定病況	31	207.22	44.29	P00-P96	源於周產期的特定病況	24	168.85	60.00
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	25	85.69	22.73	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	18	120.32	25.71	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	7	49.25	17.50
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	17.14	4.55	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	26.74	5.71	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	3	21.11	7.50
4	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	5	17.14	4.55	I01-I02.0, I05-I09, I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	20.05	4.29	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	7.04	2.50
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	10.28	2.73	G12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	13.37	2.86	J12-J18	肺炎	1	7.04	2.50
6	J12-J18	肺炎	2	6.86	1.82	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	13.37	2.86					
7	G12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	6.86	1.82	J12-J18	肺炎	1	6.68	1.43					
8	I60-I69	腦血管疾病	1	3.43	0.91	I60-I69	腦血管疾病	1	6.68	1.43					
		其他	12	41.13	10.91		其他	8	53.48	11.43		其他	4	28.14	10.00

資料來源：衛生福利部。

附 註：出生發生數為29,174人，其中男性為14,960人，女性為14,214人。

表8・ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	P00-P96	所有死亡原因	110	406.98	100.00	P00-P96	所有死亡原因	70	504.96	100.00	P00-P96	所有死亡原因	40	303.81	100.00
2	Q00-Q99	源於周產期的特定病況	55	203.49	50.00	Q00-Q99	源於周產期的特定病況	31	223.62	44.29	Q00-Q99	源於周產期的特定病況	24	182.29	60.00
3	V01-X59, Y85-Y86	先天性畸形變形及染色體異常	25	92.49	22.73	V01-X59, Y85-Y86	先天性畸形變形及染色體異常	18	129.85	25.71	R95	先天性畸形變形及染色體異常	7	53.17	17.50
4	R95	事故傷害	5	18.50	4.55	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	28.85	5.71	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	3	22.79	7.50
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	5	18.50	4.55	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	3	21.64	4.29	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	7.60	2.50
6	J12-J18	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	3	11.10	2.73	G12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	14.43	2.86	J12-J18	肺炎	1	7.60	2.50
7	J12-J18	肺炎	2	7.40	1.82	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	2	14.43	2.86					
8	G12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	7.40	1.82	J12-J18	肺炎	1	7.21	1.43					
	I60-I69	其他	1	3.70	0.91	I60-I69	腦血管疾病	1	7.21	1.43					
		其他	12	44.40	10.91		其他	8	57.71	11.43		其他	4	30.38	10.00

資料來源：衛生福利部。

附 註：0歲年中人口數為27,029人，其中男性為13,863人，女性為13,166人。

表9・ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	50 16	14.04 4.49	100.00 32.00	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	30 8	16.20 4.32	100.00 26.67	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	20 8	11.70 4.68	100.00 40.00
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染色體異常	7	1.97	14.00	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染色體異常	5	2.70	16.67	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血 壓性疾病除外)	4	2.34	20.00
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	1.97	14.00	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	5	2.70	16.67	Q00-Q99	先天性畸形變形 及染色體異常	2	1.17	10.00
4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓 性疾病除外)	5	1.40	10.00	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓 性疾病除外)	1	0.54	3.33	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	1.17	10.00
5	J12-J18	肺炎	2	0.56	4.00	X85-Y09, Y87.1	加害 (他殺)	1	0.54	3.33	J12-J18	肺炎	1	0.58	5.00
6	X85-Y09, Y87.1	加害 (他殺)	1	0.28	2.00	J12-J18	肺炎	1	0.54	3.33	A40-A41	敗血症	1	0.58	5.00
7	A40-A41	敗血症	1	0.28	2.00	D50-D64	貧血	1	0.54	3.33					
8	D50-D64	貧血	1	0.28	2.00	I60-I69	腦血管疾病	1	0.54	3.33					
9	I60-I69	腦血管疾病	1	0.28	2.00	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.54	3.33					
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.28	2.00										
		其他	8	2.25	16.00		其他	6	3.24	20.00		其他	2	1.17	10.00

資料來源：衛生福利部。

附 註：1-14歲年中人口數為356,170人，其中男性為185,208人，女性為170,962人。

表10・ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	99	32.63	100.00		所有死亡原因	71	45.13	100.00		所有死亡原因	28	19.17	100.00
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	26	8.57	26.26	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	21	13.35	29.58	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	13	8.90	46.43
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	25	8.24	25.25	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	12	7.63	16.90	C00-C97	惡性腫瘤	7	4.79	25.00
3	C00-C97	惡性腫瘤	14	4.61	14.14	C00-C97	惡性腫瘤	7	4.45	9.86	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	3.42	17.86
4	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	6	1.98	6.06	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	6	3.81	8.45	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.68	3.57
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	0.66	2.02	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1.27	2.82					
6	J12-J18	肺炎	2	0.66	2.02	J12-J18	肺炎	2	1.27	2.82					
7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	0.66	2.02	I60-I69	腦血管疾病	2	1.27	2.82					
8	I60-I69	腦血管疾病	2	0.66	2.02	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	1.27	2.82					
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	0.66	2.02	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	0.64	1.41					
10	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	0.33	1.01	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.64	1.41					
		其他	17	5.60	17.17		其他	15	9.53	21.13		其他	2	1.37	7.14

資料來源：衛生福利部。

附 註：15-24歲年中人口數為303,418人，其中男性為157,322人，女性為146,097人。

表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因	638	77.46	100.00	C00-C97	所有死亡原因	407	104.98	100.00	C00-C97	所有死亡原因	231	52.99	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	194	23.55	30.41	C00-C97	惡性腫瘤	100	25.79	24.57	C00-C97	惡性腫瘤	94	21.56	40.69
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	96	11.66	15.05	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	66	17.02	16.22	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	43	9.86	18.61
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	81	9.83	12.70	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	53	13.67	13.02	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	15	3.44	6.49
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	51	6.19	7.99	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	39	10.06	9.58	I60-I69	腦血管疾病	13	2.98	5.63
5	I60-I69	腦血管疾病	33	4.01	5.17	I60-I69	腦血管疾病	20	5.16	4.91	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	2.75	5.19
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	19	2.31	2.98	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	18	4.64	4.42	E10-E14	糖尿病	6	1.38	2.60
7	E10-E14	糖尿病	12	1.46	1.88	J12-J18	肺炎	7	1.81	1.72	J12-J18	肺炎	4	0.92	1.73
8	J12-J18	肺炎	11	1.34	1.72	B20-B24	人類免疫缺乏病毒（HIV）疾病	6	1.55	1.47	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	0.92	1.73
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	0.85	1.10	E10-E14	糖尿病	6	1.55	1.47	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.46	0.87
10	B20-B24	人類免疫缺乏病毒（HIV）疾病	6	0.73	0.94	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	1.29	1.23	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	2	0.46	0.87
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	0.73	0.94						B15-B19	病毒性肝炎	2	0.46	0.87
	其他	其他	122	14.81	19.12	其他	其他	87	22.44	21.38	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	0.46	0.87
	其他	其他	87	22.44	21.38	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	0.46	0.87					
	其他	其他	30	6.88	12.99	其他	其他	30	6.88	12.99					

資料來源：衛生福利部。

附 註：25-44歲年中人口數為 823,648人，其中男性為387,679人，女性為 435,969人。

表12・ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十人 口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	3,187	392.20	100.00		所有死亡原因	2,072	547.69	100.00		所有死亡原因	1,115	256.75	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,438	176.97	45.12	C00-C97	惡性腫瘤	801	211.73	38.66	C00-C97	惡性腫瘤	637	146.68	57.13
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	400	49.23	12.55	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	306	80.89	14.77	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	94	21.65	8.43
3	I60-I69	腦血管疾病	183	22.52	5.74	I60-I69	腦血管疾病	139	36.74	6.71	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	50	11.51	4.48
4	E10-E14	糖尿病	138	16.98	4.33	E10-E14	糖尿病	105	27.75	5.07	I60-I69	腦血管疾病	44	10.13	3.95
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	121	14.89	3.80	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	100	26.43	4.83	E10-E14	糖尿病	33	7.60	2.96
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	119	14.64	3.73	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	96	25.38	4.63	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	28	6.45	2.51
7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	103	12.68	3.23	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	53	14.01	2.56	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	25	5.76	2.24
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	62	7.63	1.95	J12-J18	肺炎	46	12.16	2.22	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	19	4.38	1.70
9	J12-J18	肺炎	61	7.51	1.91	I10-I15	高血壓性疾病	34	8.99	1.64	J12-J18	肺炎	15	3.45	1.35
10	A40-A41	敗血症	48	5.91	1.51	A40-A41	敗血症	34	8.99	1.64	A40-A41	敗血症	14	3.22	1.26
		其他	514	63.25	16.13		其他	324	85.64	15.64		其他	156	35.92	13.99

資料來源：衛生福利部。

附 註：45-64歲年中人口數為812,586人，其中男性為378,315人，女性為434,271人。

表13・ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	4,351 1,611	1,608.97 595.74	100.00 37.03	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	2,527 921	2,091.98 762.45	100.00 36.45	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	1,824 690	1,219.03 461.15	100.00 37.83
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	625	231.12	14.36	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	400	331.14	15.83	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	225	150.37	12.34
3	I60-I69	腦血管疾病	315	116.48	7.24	I60-I69	腦血管疾病	188	155.64	7.44	E10-E14	糖尿病	146	97.58	8.00
4	E10-E14	糖尿病	284	105.02	6.53	E10-E14	糖尿病	138	114.24	5.46	I60-I69	腦血管疾病	127	84.88	6.96
5	J12-J18	肺炎	183	67.67	4.21	J12-J18	肺炎	119	98.51	4.71	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	79	52.80	4.33
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	158	58.43	3.63	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	79	65.40	3.13	J12-J18	肺炎	64	42.77	3.51
7	A40-A41	敗血症	106	39.20	2.44	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	75	62.09	2.97	I10-I15	高血壓性疾病	42	28.07	2.30
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	99	36.61	2.28	A40-A41	敗血症	68	56.29	2.69	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	41	27.40	2.25
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	93	34.39	2.14	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	55	45.53	2.18	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	38	25.40	2.08
10	I10-I15	高血壓性疾病	89	32.91	2.05	I10-I15	高血壓性疾病	47	38.91	1.86	A40-A41	敗血症	38	25.40	2.08
	其他	其他	788	291.40	18.11	其他	其他	437	361.77	17.29	其他	其他	334	223.22	18.31
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	75	27.73	1.72	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	43	35.60	1.70	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	16.71	1.37
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	60	22.19	1.38	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	34	28.15	1.35	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	24	16.04	1.32
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	50	18.49	1.15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	20.70	0.99	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)	17	11.36	0.93
14	G20-G21	帕金森病	30	11.09	0.69	G20-G21	帕金森病	21	17.38	0.83	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	17	11.36	0.93
15	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)	29	10.72	0.67	I71	主動脈瘤及剝離	14	11.59	0.55	G20-G21	帕金森病	9	6.01	0.49

資料來源：衛生福利部。

附 註：65-79歲年中人口數為270,422人，其中男性為120,795人，女性為149,627人。

表14 · ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	8,518	8,421.61	100.00		所有死亡原因	4,731	9,536.29	100.00		所有死亡原因	3,787	7,348.55	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,630	1,611.56	19.14	C00-C97	惡性腫瘤	987	1,989.50	20.86	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	671	1,302.05	17.72
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,373	1,357.46	16.12	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	702	1,415.02	14.84	C00-C97	惡性腫瘤	643	1,247.72	16.98
3	J12-J18	肺炎	799	789.96	9.38	J12-J18	肺炎	462	931.25	9.77	J12-J18	肺炎	337	653.94	8.90
4	I60-I69	腦血管疾病	677	669.34	7.95	I60-I69	腦血管疾病	371	747.83	7.84	I60-I69	腦血管疾病	306	593.78	8.08
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	519	513.13	6.09	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	371	747.83	7.84	E10-E14	糖尿病	236	457.95	6.23
6	E10-E14	糖尿病	420	415.25	4.93	E10-E14	糖尿病	184	370.89	3.89	I10-I15	高血壓性疾病	174	337.64	4.59
7	I10-I15	高血壓性疾病	331	327.25	3.89	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	166	334.61	3.51	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	163	316.30	4.30
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	329	325.28	3.86	A40-A41	敗血症	165	332.59	3.49	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	148	287.19	3.91
9	A40-A41	敗血症	287	283.75	3.37	I10-I15	高血壓性疾病	157	316.47	3.32	A40-A41	敗血症	122	236.74	3.22
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 其他	228	225.42	2.68	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 其他	110	221.73	2.33	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 其他	118	228.98	3.12
			1,925	1,903.22	22.60			1,056	2,128.58	22.32			869	1,686.27	22.95
11	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓	180	177.96	2.11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	98	197.54	2.07	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓	107	207.63	2.83
12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	155	153.25	1.82	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓	73	147.15	1.54	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	57	110.61	1.51
13	G20-G21	帕金森病	100	98.87	1.17	G20-G21	帕金森病	67	135.05	1.42	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	35	67.92	0.92
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	71	70.20	0.83	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	42	84.66	0.89	G20-G21	帕金森病	33	64.04	0.87
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	65	64.26	0.76	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	42	84.66	0.89	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	23	44.63	0.61

資料來源：衛生福利部。

附 註：80歲以上年中人口數為101,145人，其中男性為49,611人，女性為51,534人。

表15・ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
總計	458	17.00	142	5.27	118	4.38	16	0.59	23	0.85	6	0.22	31	1.15	122	4.53
0歲	5	18.50	1	3.70	-	-	-	-	4	14.80	-	-	-	-	-	-
1-14歲	7	1.97	-	-	2	0.56	3	0.84	1	0.28	-	-	-	-	1	0.28
15-24歲	26	8.57	21	6.92	2	0.66	2	0.66	-	-	-	-	-	1	0.33	-
25-44歲	51	6.19	24	2.91	6	0.73	3	0.36	-	-	1	0.12	10	1.21	7	0.85
45-64歲	121	14.89	37	4.55	36	4.43	4	0.49	6	0.74	2	0.25	20	2.46	16	1.97
65-79歲	93	34.39	36	13.31	23	8.51	2	0.74	7	2.59	-	-	-	-	25	9.24
80歲以上	155	153.25	23	22.74	49	48.45	2.00	1.98	5	4.94	3	2.97	-	-	73	72.17

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,694,416人。

表16・ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他		
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49				
	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率															
總計	318	24.60	99	7.66	86	6.65	14	1.08	14	1.08	5	0.39	27	2.09	73	5.65	
0歲	4	28.85	1	7.21	-	-	-	-	-	3	21.64	-	-	-	-	-	-
1-14歲	5	2.70	-	-	2	1.08	3	1.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	21	13.35	18	11.44	1	0.64	2	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44歲	39	10.06	15	3.87	6	1.55	3	0.77	-	-	1	0.26	8	2.06	6	1.55	
45-64歲	96	25.38	26	6.87	30	7.93	2	0.53	5	1.32	2	0.53	19	5.02	12	3.17	
65-79歲	55	45.53	19	15.73	14	11.59	2	1.66	4	3.31	-	-	-	-	16	13.25	
80歲以上	98	197.54	20	40.31	33	66.52	2.00	4.03	2	4.03	2	4.03	-	-	39	78.61	

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,292,791人。

表17・ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他		
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49				
	死 亡 人 數	每 十 萬 女性 人 口 死 亡 率															
總計	140	9.99	43	3.07	32	2.28	2	0.14	9	0.64	1	0.07	4	0.29	49	3.50	
0歲	1	7.60	-	-	-	-	-	-	1	7.60	-	-	-	-	-	-	
1-14歲	2	1.17	-	-	-	-	-	-	1	0.58	-	-	-	-	1	0.58	
15-24歲	5	3.42	3	2.05	1	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.68	
25-44歲	12	2.75	9	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.46	1	0.23
45-64歲	25	5.76	11	2.53	6	1.38	2	0.46	1	0.23	-	-	1	0.23	4	0.92	
65-79歲	38	25.40	17	11.36	9	6.01	-	-	3	2.00	-	-	-	-	9	6.01	
80歲以上	57	110.61	3	5.82	16	31.05	-	-	3	5.82	1	1.94	-	-	34	65.98	

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,401,625人。

表18・ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
總計	142	5.27	37	1.37	13	0.48	27	1.00	6	0.22	2	0.07	52	1.93	5	0.19
0歲	1	3.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.70
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	21	6.92	-	-	1	0.33	8	2.64	-	-	-	-	-	12	3.95	-
25-44歲	24	2.91	2	0.24	-	-	7	0.85	1	0.12	1	0.12	12	1.46	1	0.12
45-64歲	37	4.55	9	1.11	2	0.25	6	0.74	4	0.49	1	0.12	13	1.60	2	0.25
65-79歲	36	13.31	13	4.81	9	3.33	4	1.48	1	0.37	-	-	-	9	3.33	-
80歲以上	23	22.74	13	12.85	1	0.99	2	1.98	-	-	-	-	-	6	5.93	1

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,694,416人。

表19 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因

中華民國103年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	99	7.66	20	1.55	11	0.85	20	1.55	4	0.31	1	0.08	38	2.94	5	0.39
0歲	1	7.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.21
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	18	11.44	-	-	1	0.64	6	3.81	-	-	-	-	11	6.99	-	-
25-44歲	15	3.87	-	-	-	-	5	1.29	1	0.26	-	-	8	2.06	1	0.26
45-64歲	26	6.87	5	1.32	2	0.53	4	1.06	2	0.53	1	0.26	10	2.64	2	0.53
65-79歲	19	15.73	4	3.31	7	5.79	3	2.48	1	0.83	-	-	4	3.31	-	-
80歲以上	20	40.31	11	22.17	1	2.02	2	4.03	-	-	-	-	5	10.08	1	2.02

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,292,791人。

表20 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	43	3.07	17	1.21	2	0.14	7	0.50	2	0.14	1	0.07	14	1.00	-	-
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	3	2.05	-	-	-	-	2	1.37	-	-	-	-	1	0.68	-	-
25-44歲	9	2.06	2	0.46	-	-	2	0.46	-	-	1	0.23	4	0.92	-	-
45-64歲	11	2.53	4	0.92	-	-	2	0.46	2	0.46	-	-	3	0.69	-	-
65-79歲	17	11.36	9	6.01	2	1.34	1	0.67	-	-	-	-	5	3.34	-	-
80歲以上	3	5.82	2	3.88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.94	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,401,625人。

表21 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	311	11.54	-	-	-	-	25	8.24	96	11.66	103	12.68	60	22.19	27	26.69
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	7	0.26	-	-	-	-	1	0.33	3	0.36	3	0.37	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-	1	0.99
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	76	2.82	-	-	-	-	6	1.98	35	4.25	28	3.45	7	2.59	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.26	-	-	-	-	-	-	2	0.24	1	0.12	4	1.48	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.99
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	104	3.86	-	-	-	-	7	2.31	29	3.52	31	3.81	22	8.14	15	14.83
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	32	1.19	-	-	-	-	-	-	7	0.85	16	1.97	9	3.33	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.12	1	0.12	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	6	0.22	-	-	-	-	1	0.33	-	-	4	0.49	1	0.37	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	70	2.60	-	-	-	-	10	3.30	18	2.19	17	2.09	15	5.55	10	9.89
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	1	0.37	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	1	0.37	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市年中人口數為2,694,416人。

表22 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式
中華民國103年

單位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上		
		死 亡	每 十 萬 男 性 人 口 人 數															
		死 亡	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率															
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	181	14.00	-	-	-	-	12	7.63	53	13.67	53	14.01	43	35.60	20	40.31	
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.02	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	52	4.02	-	-	-	-	4	2.54	22	5.67	19	5.02	7	5.79	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.54	-	-	-	-	-	-	2	0.52	1	0.26	4	3.31	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	67	5.18	-	-	-	-	4	2.54	17	4.39	19	5.02	16	13.25	11	22.17	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	14	1.08	-	-	-	-	-	-	2	0.52	5	1.32	7	5.79	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2	0.15	-	-	-	-	-	-	1	0.26	1	0.26	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	4	0.31	-	-	-	-	1	0.64	-	-	2	0.53	1	0.83	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	32	2.48	-	-	-	-	3	1.91	9	2.32	4	1.06	8	6.62	8	16.13	-
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市男性年中人口數為1,292,791人。

表23・ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式
中華民國103年

單位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	130	9.27	-	-	-	-	13	8.90	43	9.86	50	11.51	17	11.36	7	13.58
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	6	0.43	-	-	-	-	1	0.68	3	0.69	2	0.46	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	24	1.71	-	-	-	-	2	1.37	13	2.98	9	2.07	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.94
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	37	2.64	-	-	-	-	3	2.05	12	2.75	12	2.76	6	4.01	4	7.76
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	18	1.28	-	-	-	-	-	-	5	1.15	11	2.53	2	1.34	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.46	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	38	2.71	-	-	-	-	7	4.79	9	2.06	13	2.99	7	4.68	2	3.88
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.67	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	1	0.67	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：臺北市女性年中人口數為1,401,625人。

表24・ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 男性人 口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 女性人 口死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	4,903	181.97	100.00	惡性腫瘤	2,824	218.44	100.00	惡性腫瘤	2,079	148.33	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	992	36.82	20.23	氣管、支氣管和肺癌	588	45.48	20.82	氣管、支氣管和肺癌	404	28.82	19.43
2	結腸、直腸和肛門癌	666	24.72	13.58	肝和肝內膽管癌	447	34.58	15.83	結腸、直腸和肛門癌	302	21.55	14.53
3	肝和肝內膽管癌	666	24.72	13.58	結腸、直腸和肛門癌	364	28.16	12.89	女性乳房癌	289	20.62	13.90
4	女性乳房癌(1)	289	20.62	5.89	胃癌	199	15.39	7.05	肝和肝內膽管癌	219	15.62	10.53
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	151	11.68	3.08	口腔癌	152	11.76	5.38	胰臟癌	124	8.85	5.96
6	胃癌	312	11.58	6.36	前列腺(攝護腺)癌	151	11.68	5.35	胃癌	113	8.06	5.44
7	胰臟癌	257	9.54	5.24	胰臟癌	133	10.29	4.71	卵巢癌	84	5.99	4.04
8	口腔癌	174	6.46	3.55	食道癌	124	9.59	4.39	非何杰金氏淋巴瘤	63	4.49	3.03
9	卵巢癌(1)	84	5.99	1.71	非何杰金氏淋巴瘤	92	7.12	3.26	子宮頸及部位未明示子宮癌	58	4.14	2.79
10	非何杰金氏淋巴瘤	155	5.75	3.16	膀胱癌	66	5.11	2.34	白血病	43	3.07	2.07
	其他	1,157	42.94	23.60	其他	508	39.29	17.99	其他	380	27.11	18.28
11	食道癌	135	5.01	2.75	鼻咽癌	62	4.80	2.20	子宮體癌	35	2.50	1.68
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	58	4.14	1.18	白血病	55	4.25	1.95	間皮和軟組織癌	33	2.35	1.59
13	白血病	98	3.64	2.00	膽囊和其他膽道癌	45	3.48	1.59	膽囊和其他膽道癌	31	2.21	1.49
14	膀胱癌	93	3.45	1.90	腎臟癌	32	2.48	1.13	膀胱癌	27	1.93	1.30
15	鼻咽癌	76	2.82	1.55	腦癌	30	2.32	1.06	腎臟癌	25	1.78	1.20

資料來源：衛生福利部。

附註：1.臺北市年中人口數為2,694,416人，其中男性1,292,791人，女性1,401,625人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表25・ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病 碼	死 亡 原 因	總 計		0 歲		1 - 14 歲		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65-79 歲		80 歲 以 上		
			死 亡	每十萬人 口	死 亡	每十萬人 口	死 亡	每十萬人 口	死 亡	每十萬人 口	死 亡	每十萬人 口	死 亡	每十萬人 口	死 亡	每十萬人 口	死 亡	每十萬人 口	
			人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	
	C00-C97	所有癌症死亡原因	4,903	181.97	-	-	16	4.49	14	4.61	194	23.55	1,438	176.97	1,611	595.74	1,630	1,611.56	
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	992	36.82	-	-	-	-	-	-	25	3.04	226	27.81	370	136.82	371	366.80	
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	666	24.72	-	-	-	-	-	-	22	2.67	163	20.06	233	86.16	248	245.19	
2	C22	肝和肝內膽管癌	666	24.72	-	-	1	0.28	-	-	20	2.43	205	25.23	248	91.71	192	189.83	
4	C50	女性乳房癌(1)	289	20.62	-	-	-	-	-	-	29	6.65	157	36.15	67	44.78	36	69.86	
5	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	151	11.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.70	28	23.18	109	219.71
6	C16	胃癌	312	11.58	-	-	-	-	-	-	12	1.46	56	6.89	95	35.13	149	147.31	
7	C25	胰臟癌	257	9.54	-	-	-	-	-	-	6	0.73	71	8.74	109	40.31	71	70.20	
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	174	6.46	-	-	-	-	-	-	8	0.97	89	10.95	46	17.01	31	30.65	
9	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	84	5.99	-	-	-	-	-	-	8	1.83	48	11.05	16	10.69	12	23.29	
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	155	5.75	-	-	2	0.56	2	0.66	6	0.73	37	4.55	45	16.64	63	62.29	
		其他	1,157	42.94	-	-	13	3.65	12	3.95	58	7.04	372	45.78	354	130.91	348	344.06	
11	C15	食道癌	135	5.01	-	-	-	-	-	-	5	0.61	68	8.37	38	14.05	24	23.73	
12	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	58	4.14	-	-	-	-	-	-	4	0.92	21	4.84	10	6.68	23	44.63	
13	C91-C95	白血病	98	3.64	-	-	4	1.12	3	0.99	10	1.21	21	2.58	29	10.72	31	30.65	
14	C67	膀胱癌	93	3.45	-	-	-	-	-	-	1	0.12	14	1.72	27	9.98	51	50.42	
15	C11	鼻咽癌	76	2.82	-	-	-	-	-	-	12	1.46	39	4.80	17	6.29	8	7.91	

資料來源：衛生福利部。

附註：1.臺北市年中人口數為2,694,416人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表26 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國103年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡	每十萬 男性人口														
			人 數	死 亡 率														
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,824	218.44	-	-	8	4.32	7	4.45	100	25.79	801	211.73	921	762.45	987	1,989.50
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	588	45.48	-	-	-	-	-	-	16	4.13	114	30.13	211	174.68	247	497.88
2	C22	肝和肝內膽管癌	447	34.58	-	-	-	-	-	-	17	4.39	166	43.88	160	132.46	104	209.63
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	364	28.16	-	-	-	-	-	-	11	2.84	85	22.47	137	113.42	131	264.06
4	C16	胃癌	199	15.39	-	-	-	-	-	-	6	1.55	29	7.67	63	52.15	101	203.59
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	152	11.76	-	-	-	-	-	-	8	2.06	85	22.47	38	31.46	21	42.33
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	151	11.68	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.70	28	23.18	109	219.71
7	C25	胰臟癌	133	10.29	-	-	-	-	-	-	6	1.55	38	10.04	55	45.53	34	68.53
8	C15	食道癌	124	9.59	-	-	-	-	-	-	4	1.03	65	17.18	34	28.15	21	42.33
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	92	7.12	-	-	1	0.54	1	0.64	3	0.77	26	6.87	23	19.04	38	76.60
10	C67	膀胱癌	66	5.11	-	-	-	-	-	-	1	0.26	11	2.91	19	15.73	35	70.55
		其他	508	39.29	-	-	7	3.78	6	3.81	28	7.22	168	44.41	153	126.66	146	294.29
11	C11	鼻咽癌	62	4.80	-	-	-	-	-	-	9	2.32	35	9.25	12	9.93	6	12.09
12	C91-C95	白血病	55	4.25	-	-	3	1.62	3	1.91	7	1.81	9	2.38	14	11.59	19	38.30
13	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	45	3.48	-	-	-	-	-	-	1	0.26	12	3.17	18	14.90	14	28.22
14	C64	腎臟癌	32	2.48	-	-	-	-	-	-	1	0.26	7	1.85	13	10.76	11	22.17
15	C71	腦癌	30	2.32	-	-	2	1.08	-	-	5	1.29	12	3.17	9	7.45	2	4.03

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,292,791人。

表27 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國103年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病 碼	死 亡 原 因	總 計		0 歲		1 - 14 歲		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65-79 歲		80 歲 以 上	
			死 亡	每十萬 女性人口	死 亡	每十萬 女性人口	死 亡	每十萬 女性人口	死 亡	每十萬 女性人口	死 亡	每十萬 女性人口	死 亡	每十萬 女性人口	死 亡	每十萬 女性人口	死 亡	每十萬 女性人口
			人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,079	148.33	-	-	8	4.68	7	4.79	94	21.56	637	146.68	690	461.15	643	1,247.72
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	404	28.82	-	-	-	-	-	-	9	2.06	112	25.79	159	106.26	124	240.62
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	302	21.55	-	-	-	-	-	-	11	2.52	78	17.96	96	64.16	117	227.03
3	C50	女性乳房癌	289	20.62	-	-	-	-	-	-	29	6.65	157	36.15	67	44.78	36	69.86
4	C22	肝和肝內膽管癌	219	15.62	-	-	1	0.58	-	-	3	0.69	39	8.98	88	58.81	88	170.76
5	C25	胰臟癌	124	8.85	-	-	-	-	-	-	-	-	33	7.60	54	36.09	37	71.80
6	C16	胃癌	113	8.06	-	-	-	-	-	-	6	1.38	27	6.22	32	21.39	48	93.14
7	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	84	5.99	-	-	-	-	-	-	8	1.83	48	11.05	16	10.69	12	23.29
8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	63	4.49	-	-	1	0.58	1	0.68	3	0.69	11	2.53	22	14.70	25	48.51
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	58	4.14	-	-	-	-	-	-	4	0.92	21	4.84	10	6.68	23	44.63
10	C91-C95	白血病	43	3.07	-	-	1	0.58	-	-	3	0.69	12	2.76	15	10.02	12	23.29
		其他	380	27.11	-	-	5	2.92	6	4.11	18	4.13	99	22.80	131	87.55	121	234.80
11	C54	子宮體癌	35	2.50	-	-	-	-	-	-	1	0.23	20	4.61	12	8.02	2	3.88
12	C45-C49	間皮和軟組織癌	33	2.35	-	-	-	-	2	1.37	3	0.69	11	2.53	12	8.02	5	9.70
13	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	31	2.21	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.38	16	10.69	9	17.46
14	C67	膀胱癌	27	1.93	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.69	8	5.35	16	31.05
15	C64	腎臟癌	25	1.78	-	-	1	0.58	-	-	1	0.23	6	1.38	4	2.67	13	25.23

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,401,625人。

參、103 年死因統計

二、行政區別死因統計

表28-1・ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡 原 因	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡 原 因	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	人 口	百 分 比		人 數	男 人 死 亡	性 口 率		人 數	女 人 死 亡	性 口 率
	所有死亡原因	1,237	587.91	100.00	所有死亡原因	658	661.59	100.00	所有死亡原因	579	521.85	100.00
1	惡性腫瘤	380	180.60	30.72	惡性腫瘤	205	206.12	31.16	惡性腫瘤	175	157.73	30.22
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	195	92.68	15.76	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	109	109.60	16.57	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	86	77.51	14.85
3	腦血管疾病	91	43.25	7.36	腦血管疾病	40	40.22	6.08	腦血管疾病	51	45.97	8.81
4	肺炎	70	33.27	5.66	肺炎	34	34.19	5.17	肺炎	36	32.45	6.22
5	糖尿病	62	29.47	5.01	糖尿病	32	32.17	4.86	糖尿病	30	27.04	5.18
6	高血壓性疾病	43	20.44	3.48	高血壓性疾病	23	23.13	3.50	高血壓性疾病	20	18.03	3.45
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	39	18.54	3.15	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	22.12	3.34	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	15.32	2.94
8	慢性下呼吸道疾病	35	16.63	2.83	慢性下呼吸道疾病	20	20.11	3.04	慢性下呼吸道疾病	15	13.52	2.59
9	事故傷害	26	12.36	2.10	蓄意自我傷害（自殺）	16	16.09	2.43	血管性及未明示之癡呆症	12	10.82	2.07
10	敗血症	25	11.88	2.02	事故傷害	15	15.08	2.28	敗血症	12	10.82	2.07
	其他	271	128.80	21.91	其他	142	142.78	21.58	其他	125	112.66	21.59
11	蓄意自我傷害（自殺）	20	9.51	1.62	敗血症	13	13.07	1.98	事故傷害	11	9.91	1.90
12	慢性肝病及肝硬化	18	8.55	1.46	慢性肝病及肝硬化	9	9.05	1.37	慢性肝病及肝硬化	9	8.11	1.55
13	血管性及未明示之癡呆症	17	8.08	1.37	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	7	7.04	1.06	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	7.21	1.38
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	7.13	1.21	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	7.04	1.06	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	5	4.51	0.86
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）(1)	9	4.28	0.73	血管性及未明示之癡呆症(2)	5	5.03	0.76	帕金森病(3)	4	3.61	0.69

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、4.28。

(2)男性：結核病之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、5.03。

(3)女性：蓄意自我傷害(自殺)之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、3.61。

表28-2 · ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,475	643.89	100.00	所有死亡原因	885	805.12	100.00	所有死亡原因	590	495.16	100.00
1	惡性腫瘤	433	189.02	29.36	惡性腫瘤	253	230.16	28.59	惡性腫瘤	180	151.06	30.51
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	191	83.38	12.95	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	118	107.35	13.33	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	73	61.26	12.37
3	肺炎	127	55.44	8.61	肺炎	79	71.87	8.93	肺炎	48	40.28	8.14
4	腦血管疾病	101	44.09	6.85	腦血管疾病	59	53.67	6.67	腦血管疾病	42	35.25	7.12
5	糖尿病	69	30.12	4.68	慢性下呼吸道疾病	41	37.30	4.63	糖尿病	34	28.53	5.76
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	62	27.07	4.20	糖尿病	35	31.84	3.95	腎炎、腎病症候群及腎病變	28	23.50	4.75
7	慢性下呼吸道疾病	54	23.57	3.66	腎炎、腎病症候群及腎病變	34	30.93	3.84	敗血症	19	15.95	3.22
8	敗血症	48	20.95	3.25	敗血症	29	26.38	3.28	高血壓性疾病	16	13.43	2.71
9	事故傷害	39	17.02	2.64	事故傷害	28	25.47	3.16	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	11.75	2.37
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	31	13.53	2.10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	15.47	1.92	慢性下呼吸道疾病	13	10.91	2.20
	其他	320	139.69	21.69	其他	192	174.67	21.69	其他	123	103.23	20.85
11	高血壓性疾病	31	13.53	2.10	慢性肝病及肝硬化	16	14.56	1.81	事故傷害	11	9.23	1.86
12	慢性肝病及肝硬化	22	9.60	1.49	高血壓性疾病	15	13.65	1.69	蓄意自我傷害（自殺）	11	9.23	1.86
13	蓄意自我傷害（自殺）	22	9.60	1.49	蓄意自我傷害（自殺）	11	10.01	1.24	血管性及未明示之癡呆症	7	5.87	1.19
14	血管性及未明示之癡呆症	15	6.55	1.02	主動脈瘤及剝離	8	7.28	0.90	胃及十二指腸潰瘍	6	5.04	1.02
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	13	5.67	0.88	血管性及未明示之癡呆症	8	7.28	0.90	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）(1)	6	5.04	1.02

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：慢性肝病及肝硬化之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、5.04。

表28-3・ICD-10 臺北市大安區主要死亡原因

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	2,054	655.12	100.00	所有死亡原因	1,176	800.45	100.00	所有死亡原因	878	526.98	100.00
1	惡性腫瘤	593	189.14	28.87	惡性腫瘤	323	219.85	27.47	惡性腫瘤	270	162.06	30.75
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	317	101.11	15.43	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	194	132.05	16.50	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	123	73.83	14.01
3	腦血管疾病	148	47.20	7.21	肺炎	78	53.09	6.63	腦血管疾病	72	43.21	8.20
4	肺炎	120	38.27	5.84	腦血管疾病	76	51.73	6.46	肺炎	42	25.21	4.78
5	糖尿病	96	30.62	4.67	糖尿病	56	38.12	4.76	糖尿病	40	24.01	4.56
6	慢性下呼吸道疾病	85	27.11	4.14	慢性下呼吸道疾病	54	36.76	4.59	高血壓性疾病	33	19.81	3.76
7	高血壓性疾病	67	21.37	3.26	腎炎、腎病症候群及腎病變	38	25.86	3.23	慢性下呼吸道疾病	31	18.61	3.53
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	58	18.50	2.82	高血壓性疾病	34	23.14	2.89	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	12.00	2.28
9	事故傷害	44	14.03	2.14	事故傷害	30	20.42	2.55	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19	11.40	2.16
10	敗血症	42	13.40	2.04	敗血症	27	18.38	2.30	血管性及未明示之癰呆症	16	9.60	1.82
	其他	484	154.37	23.56	其他	266	181.05	22.62	其他	212	127.24	24.15
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	37	11.80	1.80	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	18	12.25	1.53	敗血症	15	9.00	1.71
12	血管性及未明示之癰呆症	28	8.93	1.36	帕金森病	17	11.57	1.45	事故傷害	14	8.40	1.59
13	蓄意自我傷害（自殺）	26	8.29	1.27	慢性肝病及肝硬化	17	11.57	1.45	蓄意自我傷害（自殺）	14	8.40	1.59
14	慢性肝病及肝硬化	25	7.97	1.22	血管性及未明示之癰呆症	12	8.17	1.02	慢性肝病及肝硬化	8	4.80	0.91
15	帕金森病	24	7.65	1.17	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）(1)	12	8.17	1.02	帕金森病(2)	7	4.20	0.80

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：蓄意自我傷害(自殺)之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為12人、8.17。

(2)女性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、4.20。

表28-4 · ICD-10 臺北市中山區主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,431	623.19	100.00	所有死亡原因	817	761.20	100.00	所有死亡原因	614	502.07	100.00
1	惡性腫瘤	427	185.96	29.84	惡性腫瘤	230	214.29	28.15	惡性腫瘤	197	161.09	32.08
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	208	90.58	14.54	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	116	108.08	14.20	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	92	75.23	14.98
3	腦血管疾病	101	43.98	7.06	腦血管疾病	67	62.42	8.20	腦血管疾病	34	27.80	5.54
4	肺炎	74	32.23	5.17	肺炎	42	39.13	5.14	肺炎	32	26.17	5.21
5	糖尿病	68	29.61	4.75	糖尿病	42	39.13	5.14	糖尿病	26	21.26	4.23
6	慢性下呼吸道疾病	53	23.08	3.70	慢性下呼吸道疾病	37	34.47	4.53	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	20.44	4.07
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	47	20.47	3.28	高血壓性疾病	26	24.22	3.18	敗血症	17	13.90	2.77
8	高血壓性疾病	42	18.29	2.94	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	20.50	2.69	高血壓性疾病	16	13.08	2.61
9	敗血症	37	16.11	2.59	事故傷害	21	19.57	2.57	慢性下呼吸道疾病	16	13.08	2.61
10	蓄意自我傷害（自殺）	30	13.06	2.10	慢性肝病及肝硬化	21	19.57	2.57	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	11.45	2.28
	其他	344	149.81	24.04	其他	193	179.82	23.62	其他	145	118.57	23.62
11	慢性肝病及肝硬化	29	12.63	2.03	敗血症	20	18.63	2.45	蓄意自我傷害（自殺）	13	10.63	2.12
12	事故傷害	27	11.76	1.89	蓄意自我傷害（自殺）	17	15.84	2.08	血管性及未明示之癡呆症	9	7.36	1.47
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	23	10.02	1.61	帕金森病	10	9.32	1.22	慢性肝病及肝硬化	8	6.54	1.30
14	帕金森病	16	6.97	1.12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	8.39	1.10	事故傷害	6	4.91	0.98
15	血管性及未明示之癡呆症	15	6.53	1.05	主動脈瘤及剝離(1)	6	5.59	0.73	帕金森病	6	4.91	0.98

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：血管性及未明示之癡呆症死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、5.59。

表28-5 · ICD-10 臺北市中正區主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,093	669.47	100.00	所有死亡原因	639	817.32	100.00	所有死亡原因	454	533.60	100.00
1	惡性腫瘤	291	178.24	26.62	惡性腫瘤	159	203.37	24.88	惡性腫瘤	132	155.14	29.07
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	179	109.64	16.38	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	114	145.81	17.84	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	65	76.40	14.32
3	腦血管疾病	94	57.58	8.60	腦血管疾病	56	71.63	8.76	腦血管疾病	38	44.66	8.37
4	肺炎	78	47.78	7.14	肺炎	52	66.51	8.14	糖尿病	27	31.73	5.95
5	糖尿病	45	27.56	4.12	慢性下呼吸道疾病	26	33.26	4.07	肺炎	26	30.56	5.73
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	33	20.21	3.02	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	26.86	3.29	高血壓性疾病	15	17.63	3.30
7	慢性下呼吸道疾病	33	20.21	3.02	敗血症	19	24.30	2.97	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	16.45	3.08
8	敗血症	31	18.99	2.84	事故傷害	18	23.02	2.82	敗血症	12	14.10	2.64
9	事故傷害	29	17.76	2.65	糖尿病	18	23.02	2.82	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	14.10	2.64
10	高血壓性疾病	28	17.15	2.56	慢性肝病及肝硬化	16	20.47	2.50	血管性及未明示之癰呆症	11	12.93	2.42
	其他	252	154.35	23.06	其他	140	179.07	21.91	其他	102	119.88	22.47
11	慢性肝病及肝硬化	25	15.31	2.29	高血壓性疾病	13	16.63	2.03	事故傷害	11	12.93	2.42
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	12.86	1.92	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	8.95	1.10	慢性肝病及肝硬化	9	10.58	1.98
13	血管性及未明示之癰呆症	16	9.80	1.46	帕金森病	6	7.67	0.94	慢性下呼吸道疾病	7	8.23	1.54
14	蓄意自我傷害（自殺）	11	6.74	1.01	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	7.67	0.94	蓄意自我傷害（自殺）	7	8.23	1.54
15	帕金森病(1)	9	5.51	0.82	血管性及未明示之癰呆症(2)	5	6.40	0.78	帕金森病(3)	3	3.53	0.66

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、5.51。

(2)男性：胃及十二指腸潰瘍之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、6.40。

(3)女性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）、肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、3.53。

表28-6 · ICD-10 臺北市大同區主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	843	646.49	100.00	所有死亡原因	525	823.02	100.00	所有死亡原因	318	477.43	100.00
1	惡性腫瘤	236	180.99	28.00	惡性腫瘤	146	228.88	27.81	惡性腫瘤	90	135.12	28.30
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	139	106.60	16.49	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	77	120.71	14.67	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	62	93.08	19.50
3	腦血管疾病	55	42.18	6.52	腦血管疾病	40	62.71	7.62	糖尿病	21	31.53	6.60
4	肺炎	53	40.65	6.29	肺炎	34	53.30	6.48	肺炎	19	28.53	5.97
5	糖尿病	45	34.51	5.34	慢性下呼吸道疾病	31	48.60	5.90	腦血管疾病	15	22.52	4.72
6	慢性下呼吸道疾病	41	31.44	4.86	糖尿病	24	37.62	4.57	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	18.02	3.77
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	19.17	2.97	事故傷害	16	25.08	3.05	高血壓性疾病	11	16.51	3.46
8	高血壓性疾病	23	17.64	2.73	敗血症	14	21.95	2.67	慢性下呼吸道疾病	10	15.01	3.14
9	事故傷害	20	15.34	2.37	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	20.38	2.48	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	12.01	2.52
10	敗血症	20	15.34	2.37	蓄意自我傷害（自殺）	13	20.38	2.48	敗血症	6	9.01	1.89
	其他	186	142.64	22.06	其他	117	183.42	22.29	其他	64	96.09	20.13
11	蓄意自我傷害（自殺）	18	13.80	2.14	高血壓性疾病	12	18.81	2.29	血管性及未明示之癱瘓症	5	7.51	1.57
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	13.04	2.02	慢性肝病及肝硬化	11	17.24	2.10	蓄意自我傷害（自殺）	5	7.51	1.57
13	慢性肝病及肝硬化	13	9.97	1.54	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	14.11	1.71	事故傷害	4	6.01	1.26
14	血管性及未明示之癱瘓症	8	6.14	0.95	先天性畸形變形及染色體異常	4	6.27	0.76	帕金森病	2	3.00	0.63
15	帕金森病	6	4.60	0.71	帕金森病(1)	4	6.27	0.76	流行性感冒(2)	2	3.00	0.63

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：結核病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、6.27。

(2)女性：貧血、慢性肝病及肝硬化之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.00。

表28-7 · ICD-10 臺北市萬華區主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,651	850.60	100.00	所有死亡原因	1,017	1,059.22	100.00	所有死亡原因	634	646.39	100.00
1	惡性腫瘤	458	235.96	27.74	惡性腫瘤	274	285.38	26.94	惡性腫瘤	184	187.60	29.02
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	253	130.35	15.32	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	159	165.60	15.63	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	94	95.84	14.83
3	肺炎	108	55.64	6.54	肺炎	70	72.91	6.88	糖尿病	53	54.04	8.36
4	腦血管疾病	108	55.64	6.54	腦血管疾病	65	67.70	6.39	腦血管疾病	43	43.84	6.78
5	糖尿病	100	51.52	6.06	慢性下呼吸道疾病	47	48.95	4.62	肺炎	38	38.74	5.99
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	66	34.00	4.00	糖尿病	47	48.95	4.62	腎炎、腎病症候群及腎病變	34	34.66	5.36
7	慢性下呼吸道疾病	61	31.43	3.69	事故傷害	38	39.58	3.74	高血壓性疾病	21	21.41	3.31
8	事故傷害	52	26.79	3.15	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	33.33	3.15	敗血症	15	15.29	2.37
9	高血壓性疾病	49	25.25	2.97	高血壓性疾病	28	29.16	2.75	事故傷害	14	14.27	2.21
10	敗血症	43	22.15	2.60	敗血症	28	29.16	2.75	慢性下呼吸道疾病	14	14.27	2.21
	其他	353	181.87	21.38	其他	229	238.51	22.52	其他	124	126.42	19.56
11	慢性肝病及肝硬化	33	17.00	2.00	慢性肝病及肝硬化	26	27.08	2.56	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	13.25	2.05
12	蓄意自我傷害（自殺）	29	14.94	1.76	蓄意自我傷害（自殺）	19	19.79	1.87	蓄意自我傷害（自殺）	10	10.20	1.58
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	12.88	1.51	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	12.50	1.18	血管性及未明示之癡呆症	7	7.14	1.10
14	血管性及未明示之癡呆症	17	8.76	1.03	血管性及未明示之癡呆症	10	10.42	0.98	慢性肝病及肝硬化	7	7.14	1.10
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	9	4.64	0.55	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	8.33	0.79	衰老/老邁	5	5.10	0.79

資料來源：衛生福利部。

表28-8・ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡 原 因	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡 原 因	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	人 口	百 分 比		人 數	男 人 死 亡	性 口 率		人 數	女 人 死 亡	性 口 率
1	所有死亡原因	1,678	615.48	100.00	所有死亡原因	964	733.58	100.00	所有死亡原因	714	505.59	100.00
1	惡性腫瘤	462	169.46	27.53	惡性腫瘤	262	199.38	27.18	惡性腫瘤	200	141.62	28.01
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	236	86.56	14.06	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	140	106.54	14.52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	96	67.98	13.45
3	肺炎	117	42.92	6.97	肺炎	64	48.70	6.64	肺炎	53	37.53	7.42
4	腦血管疾病	109	39.98	6.50	腦血管疾病	63	47.94	6.54	腦血管疾病	46	32.57	6.44
5	糖尿病	82	30.08	4.89	慢性下呼吸道疾病	50	38.05	5.19	糖尿病	44	31.16	6.16
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	66	24.21	3.93	糖尿病	38	28.92	3.94	腎炎、腎病症候群及腎病變	35	24.78	4.90
7	慢性下呼吸道疾病	65	23.84	3.87	敗血症	37	28.16	3.84	高血壓性疾病	23	16.29	3.22
8	敗血症	59	21.64	3.52	事故傷害	34	25.87	3.53	敗血症	22	15.58	3.08
9	事故傷害	52	19.07	3.10	腎炎、腎病症候群及腎病變	31	23.59	3.22	事故傷害	18	12.75	2.52
10	高血壓性疾病	39	14.31	2.32	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20	15.22	2.07	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	12.04	2.38
	其他	391	143.42	23.30	其他	225	171.22	23.34	其他	160	113.30	22.41
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	37	13.57	2.21	慢性肝病及肝硬化	19	14.46	1.97	慢性下呼吸道疾病	15	10.62	2.10
12	慢性肝病及肝硬化	32	11.74	1.91	蓄意自我傷害（自殺）	17	12.94	1.76	慢性肝病及肝硬化	13	9.21	1.82
13	蓄意自我傷害（自殺）	27	9.90	1.61	高血壓性疾病	16	12.18	1.66	血管性及未明示之癡呆症	12	8.50	1.68
14	血管性及未明示之癡呆症	20	7.34	1.19	帕金森病	9	6.85	0.93	蓄意自我傷害（自殺）	10	7.08	1.40
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	15	5.50	0.89	血管性及未明示之癡呆症(1)	8	6.09	0.83	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	7	4.96	0.98

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、6.09。

表28-9・ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	744	617.40	100.00	所有死亡原因	447	758.81	100.00	所有死亡原因	297	482.17	100.00
1	惡性腫瘤	228	189.20	30.65	惡性腫瘤	144	244.45	32.21	惡性腫瘤	84	136.37	28.28
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	94	78.01	12.63	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	53	89.97	11.86	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	41	66.56	13.80
3	腦血管疾病	70	58.09	9.41	腦血管疾病	46	78.09	10.29	腦血管疾病	24	38.96	8.08
4	肺炎	46	38.17	6.18	肺炎	28	47.53	6.26	糖尿病	20	32.47	6.73
5	糖尿病	39	32.36	5.24	慢性下呼吸道疾病	20	33.95	4.47	肺炎	18	29.22	6.06
6	慢性下呼吸道疾病	25	20.75	3.36	糖尿病	19	32.25	4.25	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	24.35	5.05
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	23	19.09	3.09	事故傷害	15	25.46	3.36	敗血症	9	14.61	3.03
8	事故傷害	20	16.60	2.69	慢性肝病及肝硬化	12	20.37	2.68	蓄意自我傷害（自殺）	6	9.74	2.02
9	敗血症	18	14.94	2.42	蓄意自我傷害（自殺）	10	16.98	2.24	事故傷害	5	8.12	1.68
10	慢性肝病及肝硬化	17	14.11	2.28	敗血症	9	15.28	2.01	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	8.12	1.68
	其他	164	136.09	22.04	其他	91	154.48	20.36	其他	70	113.64	23.57
11	蓄意自我傷害（自殺）	16	13.28	2.15	高血壓性疾病	8	13.58	1.79	慢性下呼吸道疾病	5	8.12	1.68
12	高血壓性疾病	12	9.96	1.61	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	13.58	1.79	慢性肝病及肝硬化	5	8.12	1.68
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	6.64	1.08	帕金森病	5	8.49	1.12	血管性及未明示之癱瘓症	4	6.49	1.35
14	帕金森病	6	4.98	0.81	主動脈瘤及剝離	3	5.09	0.67	高血壓性疾病	4	6.49	1.35
15	血管性及未明示之癱瘓症(1)	5	4.15	0.67	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）(2)	3	5.09	0.67	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）(3)	2	3.25	0.67

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）、肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.15。

(2)男性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病、塵肺症、肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、5.09。

(3)女性：貧血、結核病、源於周產期的特定病況、肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.25。

表28-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡 原 因	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡 原 因	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	人 口	百 分 比		人 數	男 人 死 亡	性 口 率		人 數	女 人 死 亡	性 口 率
	所有死亡原因	1,364	479.77	100.00	所有死亡原因	806	591.26	100.00	所有死亡原因	558	377.07	100.00
1	惡性腫瘤	398	139.99	29.18	惡性腫瘤	238	174.59	29.53	惡性腫瘤	160	108.12	28.67
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	209	73.51	15.32	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	136	99.77	16.87	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	73	49.33	13.08
3	腦血管疾病	105	36.93	7.70	腦血管疾病	66	48.42	8.19	腦血管疾病	39	26.35	6.99
4	慢性下呼吸道疾病	61	21.46	4.47	慢性下呼吸道疾病	44	32.28	5.46	糖尿病	38	25.68	6.81
5	糖尿病	61	21.46	4.47	肺炎	37	27.14	4.59	肺炎	22	14.87	3.94
6	肺炎	59	20.75	4.33	事故傷害	27	19.81	3.35	高血壓性疾病	18	12.16	3.23
7	事故傷害	43	15.12	3.15	糖尿病	23	16.87	2.85	慢性下呼吸道疾病	17	11.49	3.05
8	蓄意自我傷害（自殺）	36	12.66	2.64	蓄意自我傷害（自殺）	21	15.40	2.61	事故傷害	16	10.81	2.87
9	高血壓性疾病	32	11.26	2.35	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	13.20	2.23	蓄意自我傷害（自殺）	15	10.14	2.69
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	30	10.55	2.20	敗血症	15	11.00	1.86	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	9.46	2.51
	其他	330	116.07	24.19	其他	181	132.78	22.46	其他	146	98.66	26.16
11	敗血症	29	10.20	2.13	高血壓性疾病	14	10.27	1.74	敗血症	14	9.46	2.51
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	27	9.50	1.98	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	9.54	1.61	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	8.11	2.15
13	慢性肝病及肝硬化	23	8.09	1.69	慢性肝病及肝硬化	11	8.07	1.36	慢性肝病及肝硬化	12	8.11	2.15
14	血管性及未明示之癰呆症	19	6.68	1.39	帕金森病	9	6.60	1.12	血管性及未明示之癰呆症	11	7.43	1.97
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	15	5.28	1.10	血管性及未明示之癰呆症	8	5.87	0.99	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	5.41	1.43

資料來源：衛生福利部。

表28-11 · ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,805	622.20	100.00	所有死亡原因	1,021	727.02	100.00	所有死亡原因	784	523.84	100.00
1	惡性腫瘤	537	185.11	29.75	惡性腫瘤	321	228.57	31.44	惡性腫瘤	216	144.32	27.55
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	252	86.87	13.96	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	144	102.54	14.10	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	108	72.16	13.78
3	腦血管疾病	124	42.74	6.87	腦血管疾病	77	54.83	7.54	肺炎	48	32.07	6.12
4	肺炎	104	35.85	5.76	肺炎	56	39.88	5.48	腦血管疾病	47	31.40	5.99
5	糖尿病	91	31.37	5.04	慢性下呼吸道疾病	55	39.16	5.39	糖尿病	46	30.74	5.87
6	慢性下呼吸道疾病	76	26.20	4.21	糖尿病	45	32.04	4.41	腎炎、腎病症候群及腎病變	39	26.06	4.97
7	事故傷害	59	20.34	3.27	事故傷害	41	29.19	4.02	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	16.70	3.19
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	53	18.27	2.94	敗血症	30	21.36	2.94	高血壓性疾病	24	16.04	3.06
9	敗血症	49	16.89	2.71	高血壓性疾病	20	14.24	1.96	慢性下呼吸道疾病	21	14.03	2.68
10	高血壓性疾病	44	15.17	2.44	蓄意自我傷害（自殺）	19	13.53	1.86	蓄意自我傷害（自殺）	20	13.36	2.55
	其他	416	143.40	23.05	其他	213	151.67	20.86	其他	190	126.95	24.23
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	43	14.82	2.38	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	18	12.82	1.76	敗血症	19	12.70	2.42
12	蓄意自我傷害（自殺）	39	13.44	2.16	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	9.97	1.37	事故傷害	18	12.03	2.30
13	慢性肝病及肝硬化	23	7.93	1.27	慢性肝病及肝硬化	13	9.26	1.27	血管性及未明示之癰呆症	12	8.02	1.53
14	帕金森病	21	7.24	1.16	帕金森病	12	8.54	1.18	慢性肝病及肝硬化	10	6.68	1.28
15	血管性及未明示之癰呆症	20	6.89	1.11	血管性及未明示之癰呆症	8	5.70	0.78	帕金森病(1)	9	6.01	1.15

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、6.01。

表28-12 · ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,578	615.25	100.00	所有死亡原因	953	767.90	100.00	所有死亡原因	625	472.13	100.00
1	惡性腫瘤	460	179.35	29.15	惡性腫瘤	269	216.75	28.23	惡性腫瘤	191	144.28	30.56
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	216	84.22	13.69	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	120	96.69	12.59	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	96	72.52	15.36
3	腦血管疾病	106	41.33	6.72	腦血管疾病	67	53.99	7.03	糖尿病	42	31.73	6.72
4	肺炎	104	40.55	6.59	肺炎	64	51.57	6.72	肺炎	40	30.22	6.40
5	糖尿病	96	37.43	6.08	糖尿病	54	43.51	5.67	腦血管疾病	39	29.46	6.24
6	慢性下呼吸道疾病	68	26.51	4.31	慢性下呼吸道疾病	51	41.09	5.35	腎炎、腎病症候群及腎病變	23	17.37	3.68
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	54	21.05	3.42	事故傷害	35	28.20	3.67	高血壓性疾病	19	14.35	3.04
8	高血壓性疾病	51	19.88	3.23	高血壓性疾病	32	25.78	3.36	慢性下呼吸道疾病	17	12.84	2.72
9	事故傷害	47	18.32	2.98	腎炎、腎病症候群及腎病變	31	24.98	3.25	敗血症	16	12.09	2.56
10	敗血症	44	17.16	2.79	敗血症	28	22.56	2.94	蓄意自我傷害（自殺）	15	11.33	2.40
	其他	332	129.44	21.04	其他	202	162.77	21.20	其他	127	95.94	20.32
11	蓄意自我傷害（自殺）	37	14.43	2.34	蓄意自我傷害（自殺）	22	17.73	2.31	事故傷害	12	9.06	1.92
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	9.75	1.58	慢性肝病及肝硬化	17	13.70	1.78	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	7.55	1.60
13	慢性肝病及肝硬化	24	9.36	1.52	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	12.09	1.57	血管性及未明示之癰果症	8	6.04	1.28
14	血管性及未明示之癰果症	18	7.02	1.14	主動脈瘤及剝離	10	8.06	1.05	慢性肝病及肝硬化	7	5.29	1.12
15	主動脈瘤及剝離	12	4.68	0.76	血管性及未明示之癰果症	10	8.06	1.05	結核病	5	3.78	0.80

資料來源：衛生福利部。

表29-1・ICD-10 臺北市松山區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	26	12.36	100.00	15	15.08	100.00	11	9.91	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	5	2.38	19.23	4	4.02	26.67	1	0.90	9.09			
W00-W19	跌倒(落)	7	3.33	26.92	4	4.02	26.67	3	2.70	27.27			
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.43	11.54	2	2.01	13.33	1	0.90	9.09			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.95	7.69	1	1.01	6.67	1	0.90	9.09			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	其他	9	4.28	34.62	4	4.02	26.67	5	4.51	45.45			

資料來源：衛生福利部。

表29-2 · ICD-10 臺北市信義區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	39	17.02	100.00	28	25.47	100.00	11	9.23	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	16	6.98	41.03	10	9.10	35.71	6	5.04	54.55			
W00-W19	跌倒(落)	13	5.67	33.33	12	10.92	42.86	1	0.84	9.09			
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.44	2.56	-	-	-	-	0.84	9.09			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.31	7.69	2	1.82	7.14	1	0.84	9.09			
	其他	6	2.62	15.38	4	3.64	14.29	2	1.68	18.18			

資料來源：衛生福利部。

表29-3・ICD-10 臺北市大安區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	44	14.03	100.00	30	20.42	100.00	14	8.40	100.00	-	-	-
V01-V99	運輸事故傷害	10	3.19	22.73	7	4.76	23.33	3	1.80	21.43	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	17	5.42	38.64	8	5.45	26.67	9	5.40	64.29	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.64	4.55	2	1.36	6.67	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.64	4.55	2	1.36	6.67	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	1.28	9.09	3	2.04	10.00	1	0.60	7.14	-	-	-
	其他	9	2.87	20.45	8	5.45	26.67	1	0.60	7.14	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表29-4・ICD-10 臺北市中山區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	27	11.76	100.00	21	19.57	100.00	6	4.91	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	11	4.79	40.74	10	9.32	47.62	1	0.82	16.67			
W00-W19	跌倒(落)	5	2.18	18.52	4	3.73	19.05	1	0.82	16.67			
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.44	3.70	1	0.93	4.76	-	-	-			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.87	7.41	1	0.93	4.76	1	0.82	16.67			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.44	3.70	1	0.93	4.76	-	-	-			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.44	3.70	1	0.93	4.76	-	-	-			
	其他	6	2.61	22.22	3	2.80	14.29	3	2.45	50.00			

資料來源：衛生福利部。

表29-5・ICD-10 臺北市中正區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	29	17.76	100.00	18	23.02	100.00	11	12.93	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	8	4.90	27.59	4	5.12	22.22	4	4.70	36.36			
W00-W19	跌倒(落)	9	5.51	31.03	7	8.95	38.89	2	2.35	18.18			
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.61	3.45	1	1.28	5.56	-	-	-			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	2.45	13.79	3	3.84	16.67	1	1.18	9.09			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.61	3.45	1	1.28	5.56	-	-	-			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	其他	6	3.68	20.69	2	2.56	11.11	4	4.70	36.36			

資料來源：衛生福利部。

表29-6・ICD-10 臺北市大同區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	20	15.34	100.00	16	25.08	100.00	4	6.01	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	3	2.30	15.00	2	3.14	12.50	1	1.50	25.00			
W00-W19	跌倒(落)	6	4.60	30.00	5	7.84	31.25	1	1.50	25.00			
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.53	10.00	2	3.14	12.50	-	-	-			
	其他	9	6.90	45.00	7	10.97	43.75	2	3.00	50.00			

資料來源：衛生福利部。

表29-7・ICD-10 臺北市萬華區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	52	26.79	100.00	38	39.58	100.00	14	14.27	100.00	-	-	-
V01-V99	運輸事故傷害	13	6.70	25.00	13	13.54	34.21	-	-	-	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	8	4.12	15.38	6	6.25	15.79	2	2.04	14.29	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.55	5.77	3	3.12	7.89	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	1.03	3.85	1	1.04	2.63	1	1.02	7.14	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.52	1.92	-	-	-	1	1.02	7.14	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	8	4.12	15.38	7	7.29	18.42	1	1.02	7.14	-	-	-
	其他	17	8.76	32.69	8	8.33	21.05	9	9.18	64.29	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表29-8 · ICD-10 臺北市文山區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	52	19.07	100.00	34	25.87	100.00	18	12.75	100.00	-	-	-
V01-V99	運輸事故傷害	14	5.14	26.92	8	6.09	23.53	6	4.25	33.33	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	11	4.03	21.15	10	7.61	29.41	1	0.71	5.56	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.10	5.77	2	1.52	5.88	1	0.71	5.56	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.73	3.85	1	0.76	2.94	1	0.71	5.56	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.37	1.92	1	0.76	2.94	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.10	5.77	3	2.28	8.82	-	-	-	-	-	-
	其他	18	6.60	34.62	9	6.85	26.47	9	6.37	50.00	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表29-9 · ICD-10 臺北市南港區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	20	16.60	100.00	15	25.46	100.00	5	8.12	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	7	5.81	35.00	5	8.49	33.33	2	3.25	40.00			
W00-W19	跌倒(落)	6	4.98	30.00	5	8.49	33.33	1	1.62	20.00			
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.83	5.00	1	1.70	6.67	-	-	-			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	其他	6	4.98	30.00	4	6.79	26.67	2	3.25	40.00			

資料來源：衛生福利部。

表29-10 · ICD-10 臺北市內湖區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	43	15.12	100.00	27	19.81	100.00	16	10.81	100.00			
V01-V99	運輸事故傷害	17	5.98	39.53	9	6.60	33.33	8	5.41	50.00			
W00-W19	跌倒(落)	10	3.52	23.26	6	4.40	22.22	4	2.70	25.00			
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.41	9.30	2	1.47	7.41	2	1.35	12.50			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	1.76	11.63	5	3.67	18.52	-	-	-			
	其他	7	2.46	16.28	5	3.67	18.52	2	1.35	12.50			

資料來源：衛生福利部。

表29-11 · ICD-10 臺北市士林區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	59	20.34	100.00	41	29.19	100.00	18	12.03	100.00	-	-	-
V01-V99	運輸事故傷害	21	7.24	35.59	15	10.68	36.59	6	4.01	33.33	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	11	3.79	18.64	8	5.70	19.51	3	2.00	16.67	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.34	1.69	1	0.71	2.44	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.69	3.39	1	0.71	2.44	1	0.67	5.56	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.69	3.39	2	1.42	4.88	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.03	5.08	2	1.42	4.88	1	0.67	5.56	-	-	-
	其他	19	6.55	32.20	12	8.54	29.27	7	4.68	38.89	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表29-12 · ICD-10 臺北市北投區事故傷害死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	總 計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每十萬人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬男性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每十萬女性人口死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害總計	47	18.32	100.00	35	28.20	100.00	12	9.06	100.00	-	-	-
V01-V99	運輸事故傷害	17	6.63	36.17	12	9.67	34.29	5	3.78	41.67	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	15	5.85	31.91	11	8.86	31.43	4	3.02	33.33	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.39	2.13	1	0.81	2.86	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.78	4.26	2	1.61	5.71	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.78	4.26	2	1.61	5.71	-	-	-	-	-	-
	其他	10	3.90	21.28	7	5.64	20.00	3	2.27	25.00	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-1・ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	20	9.51	100.00	16	16.09	100.00	4	3.61	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	2.38	25.00	2	2.01	12.50	3	2.70	75.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	3.33	35.00	7	7.04	43.75	-	-	-	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.95	10.00	2	2.01	12.50	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	2.85	30.00	5	5.03	31.25	1	0.90	25.00			
X81	利用跳入或躺在移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-2・ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人	亡 人	每十萬人	死 亡	死 人	亡 人	每十萬男性	死 亡	死 人	亡 人	每十萬女性	死 亡
		數	死	率	百	分	比	數	死	率	百	分	比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	22		9.60	100.00	11		10.01	100.00	11		9.23	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1		0.44	4.55	-		-	-	1		0.84	9.09
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3		1.31	13.64	3		2.73	27.27	-		-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5		2.18	22.73	2		1.82	18.18	3		2.52	27.27
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4		1.75	18.18	2		1.82	18.18	2		1.68	18.18
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1		0.44	4.55	1		0.91	9.09	-		-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7		3.06	31.82	3		2.73	27.27	4		3.36	36.36
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1		0.44	4.55	-		-	-	1		0.84	9.09
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-3・ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	26	8.29	100.00	12	8.17	100.00	14	8.40	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	9	2.87	34.62	6	4.08	50.00	3	1.80	21.43			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	6	1.91	23.08	3	2.04	25.00	3	1.80	21.43			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.32	3.85	1	0.68	8.33	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	10	3.19	38.46	2	1.36	16.67	8	4.80	57.14			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-4・ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人	亡 人	每十萬人	死 亡 百 分 比	死 人	亡 人	每十萬男性	死 亡 百 分 比	死 人	亡 人	每十萬女性	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	30		13.06	100.00	17		15.84	100.00	13		10.63	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2		0.87	6.67	-		-	-	2		1.64	15.38
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1		0.44	3.33	-		-	-	1		0.82	7.69
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7		3.05	23.33	6		5.59	35.29	1		0.82	7.69
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7		3.05	23.33	4		3.73	23.53	3		2.45	23.08
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3		1.31	10.00	1		0.93	5.88	2		1.64	15.38
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1		0.44	3.33	1		0.93	5.88	-		-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8		3.48	26.67	5		4.66	29.41	3		2.45	23.08
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1		0.44	3.33	-		-	-	1		0.82	7.69

資料來源：衛生福利部。

表30-5・ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人	亡 人	每十萬人	死 亡	死 人	亡 人	每十萬男性	死 亡	死 人	亡 人	每十萬女性	死 亡
		數	死	率	百	分	比	數	死	率	百	分	比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	11		6.74		100.00		4		5.12		100.00	
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-		-		-		-		-	
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-		-		-		-		-	
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1		0.61		9.09		1		1.28		25.00	
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-	
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-	
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1		0.61		9.09		1		1.28		25.00	
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-	
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-	
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5		3.06		45.45		2		2.56		50.00	
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4		2.45		36.36		-		-		4	
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	

資料來源：衛生福利部。

表30-6・ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	18	13.80	100.00	13	20.38	100.00	5	7.51	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	5.37	38.89	5	7.84	38.46	2	3.00	40.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.77	5.56	1	1.57	7.69	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	3	2.30	16.67	2	3.14	15.38	1	1.50	20.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	2.30	16.67	2	3.14	15.38	1	1.50	20.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	3.07	22.22	3	4.70	23.08	1	1.50	20.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-7・ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人	亡 人	每十萬人	死 亡	死 人	亡 人	每十萬男性	死 亡	死 人	亡 人	每十萬女性	死 亡
		數	死	率	百	分	比	數	死	率	百	分	比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	29		14.94		100.00		19		19.79		100.00	
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1		0.52		3.45		1		1.04		5.26	
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-		-		-		-		-	
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-	
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-	
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-	
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2		1.03		6.90		2		2.08		10.53	
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-	
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-	
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	13		6.70		44.83		8		8.33		42.11	
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	6		3.09		20.69		3		3.12		15.79	
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1		0.52		3.45		-		-		1	
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6		3.09		20.69		5		5.21		26.32	
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-	

資料來源：衛生福利部。

表30-8・ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	27	9.90	100.00	17	12.94	100.00	10	7.08	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	9	3.30	33.33	7	5.33	41.18	2	1.42	20.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	13	4.77	48.15	8	6.09	47.06	5	3.54	50.00			
X71	利用淹死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.37	3.70	-	-	-	1	0.71	10.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	1.47	14.81	2	1.52	11.76	2	1.42	20.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-9・ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性					
		死 人	亡 人	每十萬人	死 亡	死 人	亡 人	每十萬男性	死 亡	死 人	亡 人	每十萬女性	死 亡		
		數	死	率	百	分	比	數	死	率	百	分	比		
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	16		13.28		100.00		10	16.98		100.00		6	9.74	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	4.98	37.50		4	6.79		40.00		2	3.25		33.33	
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	4	3.32	25.00		3	5.09		30.00		1	1.62		16.67	
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	2.49	18.75		1	1.70		10.00		2	3.25		33.33	
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	2.49	18.75		2	3.40		20.00		1	1.62		16.67	
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

資料來源：衛生福利部。

表30-10 · ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死 人 數	每 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	36	12.66	100.00	21	15.40	100.00	15	10.14	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	2.81	22.22	6	4.40	28.57	2	1.35	13.33			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.70	5.56	2	1.47	9.52	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	15	5.28	41.67	10	7.34	47.62	5	3.38	33.33			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.70	5.56	1	0.73	4.76	1	0.68	6.67			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.35	2.78	1	0.73	4.76	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	2.81	22.22	1	0.73	4.76	7	4.73	46.67			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-11 · ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性			
		死 人	亡 人	每十萬人	死 亡 百 分 比	死 人	亡 人	每十萬男性人口	死 亡 百 分 比	死 人	亡 人	每十萬女性人口	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	39		13.44	100.00	19		13.53	100.00	20		13.36	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3		1.03	7.69	-		-	-	3		2.00	15.00
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8		2.76	20.51	5		3.56	26.32	3		2.00	15.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3		1.03	7.69	3		2.14	15.79	-		-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1		0.34	2.56	-		-	-	1		0.67	5.00
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	10		3.45	25.64	6		4.27	31.58	4		2.67	20.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	5		1.72	12.82	-		-	-	5		3.34	25.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1		0.34	2.56	1		0.71	5.26	-		-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2		0.69	5.13	1		0.71	5.26	1		0.67	5.00
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4		1.38	10.26	2		1.42	10.53	2		1.34	10.00
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1		0.34	2.56	1		0.71	5.26	-		-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-		-	-	-		-	-	-		-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1		0.34	2.56	-		-	-	1		0.67	5.00

資料來源：衛生福利部。

表30-12 · ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	總 計				男 性				女 性				
		死 人	亡 人	每十萬人	死 亡	死 人	亡 人	每十萬男性	死 亡	死 人	亡 人	每十萬女性	死 亡	
		數	死	率	百	分	比	數	死	率	百	分	比	
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	37		14.43		100.00		22	17.73		100.00	15	11.33	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	11		4.29		29.73		5	4.03		22.73	6	4.53	40.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1		0.39		2.70		1	0.81		4.55	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	16		6.24		43.24		12	9.67		54.55	4	3.02	26.67
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3		1.17		8.11		2	1.61		9.09	1	0.76	6.67
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6		2.34		16.22		2	1.61		9.09	4	3.02	26.67
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-		-		-		-	-		-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-		-		-		-	-		-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-1・ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性																	
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分	
	所有癌症死亡原因	380	180.60	100.00	所有癌症死亡原因	205	206.12	100.00	所有癌症死亡原因	175	157.73	100.00																
1	氣管、支氣管和肺癌	73	34.69	19.21	氣管、支氣管和肺癌	41	41.22	20.00	氣管、支氣管和肺癌	32	28.84	18.29																
2	結腸、直腸和肛門癌	57	27.09	15.00	肝和肝內膽管癌	35	35.19	17.07	結腸、直腸和肛門癌	31	27.94	17.71																
3	肝和肝內膽管癌	52	24.71	13.68	結腸、直腸和肛門癌	26	26.14	12.68	女性乳房癌	27	24.34	15.43																
4	女性乳房癌(1)	27	24.34	7.11	前列腺(攝護腺)癌	19	19.10	9.27	肝和肝內膽管癌	17	15.32	9.71																
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	19	19.10	5.00	胃癌	13	13.07	6.34	胃癌	10	9.01	5.71																
6	胃癌	23	10.93	6.05	食道癌	13	13.07	6.34	卵巢癌	9	8.11	5.14																
7	胰臟癌	18	8.55	4.74	胰臟癌	12	12.07	5.85	胰臟癌	6	5.41	3.43																
8	卵巢癌(1)	9	8.11	2.37	膀胱癌	8	8.04	3.90	膽囊和其他膽道癌	6	5.41	3.43																
9	食道癌	14	6.65	3.68	口腔癌	7	7.04	3.41	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.61	2.29																
10	膀胱癌	10	4.75	2.63	白血病	6	6.03	2.93	白血病	4	3.61	2.29																
	其他	78	37.07	20.53	其他	25	25.14	12.20	其他	29	26.14	16.57																
11	白血病	10	4.75	2.63	腎臟癌	4	4.02	1.95	腦癌	3	2.70	1.71																
12	口腔癌	8	3.80	2.11	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.02	1.46	間皮和軟組織癌	3	2.70	1.71																
13	膽囊和其他膽道癌	8	3.80	2.11	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	2.01	0.98	甲狀腺癌	3	2.70	1.71																
14	非何杰金氏淋巴瘤	7	3.33	1.84	膽囊和其他膽道癌	2	2.01	0.98	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	1.80	1.14																
15	腎臟癌(3)	5	2.38	1.32	間皮和軟組織癌	2	2.01	0.98	膀胱癌	2	1.80	1.14																

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、2.38。

表31-2 · ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性				
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
	所有癌症死亡原因	433	189.02	100.00	所有癌症死亡原因	253	230.16	100.00	所有癌症死亡原因	180	151.06	100.00	
1	氣管、支氣管和肺癌	82	35.80	18.94	氣管、支氣管和肺癌	46	41.85	18.18	氣管、支氣管和肺癌	36	30.21	20.00	
2	結腸、直腸和肛門癌	57	24.88	13.16	肝和肝內膽管癌	40	36.39	15.81	結腸、直腸和肛門癌	29	24.34	16.11	
3	肝和肝內膽管癌	54	23.57	12.47	結腸、直腸和肛門癌	28	25.47	11.07	女性乳房癌	25	20.98	13.89	
4	女性乳房癌(1)	25	20.98	5.77	胃癌	19	17.28	7.51	肝和肝內膽管癌	14	11.75	7.78	
5	胃癌	32	13.97	7.39	非何杰金氏淋巴瘤	15	13.65	5.93	胃癌	13	10.91	7.22	
6	非何杰金氏淋巴瘤	22	9.60	5.08	食道癌	13	11.83	5.14	胰臟癌	10	8.39	5.56	
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	10	9.10	2.31	口腔癌	11	10.01	4.35	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	5.87	3.89	
8	胰臟癌	20	8.73	4.62	前列腺(攝護腺)癌	10	9.10	3.95	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.87	3.89	
9	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	5.87	1.62	胰臟癌	10	9.10	3.95	卵巢癌	6	5.04	3.33	
10	口腔癌	13	5.67	3.00	鼻咽癌	7	6.37	2.77	白血病	6	5.04	3.33	
	其他	111	48.46	25.64	其他	54	49.13	21.34	其他	27	22.66	15.00	
11	食道癌	13	5.67	3.00	白血病	6	5.46	2.37	膀胱癌	3	2.52	1.67	
12	白血病	12	5.24	2.77	膽囊和其他膽道癌	6	5.46	2.37	口腔癌	2	1.68	1.11	
13	卵巢癌(1)	6	5.04	1.39	腦癌	5	4.55	1.98	子宮體癌	2	1.68	1.11	
14	鼻咽癌	8	3.49	1.85	膀胱癌	3	2.73	1.19	腎臟癌	2	1.68	1.11	
15	膽囊和其他膽道癌	8	3.49	1.85	喉癌	2	1.82	0.79	膽囊和其他膽道癌(3)	2	1.68	1.11	

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.68。

表31-3・ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性													
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬	男 性 人 口	死 亡	百 分	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬	女 性 人 口	死 亡	百 分	
	所有癌症死亡原因	593	189.14	100.00	所有癌症死亡原因	323	219.85	100.00	所有癌症死亡原因	270	162.06	100.00												
1	氣管、支氣管和肺癌	122	38.91	20.57	氣管、支氣管和肺癌	69	46.96	21.36	氣管、支氣管和肺癌	53	31.81	19.63												
2	結腸、直腸和肛門癌	78	24.88	13.15	肝和肝內膽管癌	47	31.99	14.55	女性乳房癌	41	24.61	15.19												
3	女性乳房癌(1)	41	24.61	6.91	結腸、直腸和肛門癌	44	29.95	13.62	結腸、直腸和肛門癌	34	20.41	12.59												
4	肝和肝內膽管癌	76	24.24	12.82	胰臟癌	25	17.02	7.74	肝和肝內膽管癌	29	17.41	10.74												
5	胰臟癌	44	14.03	7.42	胃癌	23	15.65	7.12	胰臟癌	19	11.40	7.04												
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	17	11.57	2.87	前列腺(攝護腺)癌	17	11.57	5.26	卵巢癌	13	7.80	4.81												
7	胃癌	31	9.89	5.23	非何杰金氏淋巴瘤	17	11.57	5.26	非何杰金氏淋巴瘤	9	5.40	3.33												
8	非何杰金氏淋巴瘤	26	8.29	4.38	口腔癌	8	5.45	2.48	胃癌	8	4.80	2.96												
9	卵巢癌(1)	13	7.80	2.19	食道癌	7	4.76	2.17	白血病	8	4.80	2.96												
10	白血病	14	4.47	2.36	膽囊和其他膽道癌	7	4.76	2.17	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	4.20	2.59												
	其他	131	41.78	22.09	其他	59	40.16	18.27	其他	49	29.41	18.15												
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	4.20	1.18	白血病	6	4.08	1.86	膽囊和其他膽道癌	5	3.00	1.85												
12	膽囊和其他膽道癌	12	3.83	2.02	腦癌	6	4.08	1.86	腎臟癌	4	2.40	1.48												
13	口腔癌	9	2.87	1.52	膀胱癌	5	3.40	1.55	子宮體癌	4	2.40	1.48												
14	腦癌	9	2.87	1.52	鼻咽癌	5	3.40	1.55	腦癌	3	1.80	1.11												
15	腎臟癌(3)	8	2.55	1.35	腎臟癌(4)	4	2.72	1.24	膀胱癌(5)	2	1.20	0.74												

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：食道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、2.55。

(4)男性：間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.72。

(5)女性：鼻咽癌、間皮和軟組織癌、心臟、縱隔和胸(肋)膜癌、骨和關節軟骨癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.20。

表31-4・ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性								
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡	率	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡	率	死 亡	百 分 比
	所有癌症死亡原因	427	185.96	100.00		所有癌症死亡原因	230	214.29	100.00		所有癌症死亡原因	197	161.09	100.00			
1	氣管、支氣管和肺癌	78	33.97	18.27	肝和肝內膽管癌	42	39.13	18.26	氣管、支氣管和肺癌	37	30.26	18.78					
2	肝和肝內膽管癌	65	28.31	15.22	氣管、支氣管和肺癌	41	38.20	17.83	結腸、直腸和肛門癌	33	26.98	16.75					
3	結腸、直腸和肛門癌	60	26.13	14.05	結腸、直腸和肛門癌	27	25.16	11.74	肝和肝內膽管癌	23	18.81	11.68					
4	女性乳房癌(1)	23	18.81	5.39	胃癌	15	13.98	6.52	女性乳房癌	23	18.81	11.68					
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	14	13.04	3.28	口腔癌	15	13.98	6.52	胰臟癌	14	11.45	7.11					
6	胃癌	22	9.58	5.15	前列腺(攝護腺)癌	14	13.04	6.09	卵巢癌	9	7.36	4.57					
7	胰臟癌	21	9.15	4.92	食道癌	11	10.25	4.78	胃癌	7	5.72	3.55					
8	卵巢癌(1)	9	7.36	2.11	胰臟癌	7	6.52	3.04	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.72	3.55					
9	口腔癌	16	6.97	3.75	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.52	3.04	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	5.72	3.55					
10	非何杰金氏淋巴瘤	14	6.10	3.28	白血病	4	3.73	1.74	子宮體癌	6	4.91	3.05					
	其他	105	45.73	24.59	其他	47	43.79	20.43	其他	31	25.35	15.74					
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	5.72	1.64	腎臟癌	4	3.73	1.74	間皮和軟組織癌	4	3.27	2.03					
12	子宮體癌(1)	6	4.91	1.41	鼻咽癌	4	3.73	1.74	膀胱癌	3	2.45	1.52					
13	食道癌	11	4.79	2.58	膀胱癌	4	3.73	1.74	腎臟癌	2	1.64	1.02					
14	膀胱癌	7	3.05	1.64	膽囊和其他膽道癌	4	3.73	1.74	腦癌	2	1.64	1.02					
15	間皮和軟組織癌	7	3.05	1.64	間皮和軟組織癌(3)	3	2.80	1.30	膽囊和其他膽道癌	2	1.64	1.02					

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：喉癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.80。

表31-5・ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性								
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	
	所有癌症死亡原因	291	178.24	100.00			所有癌症死亡原因	159	203.37	100.00		所有癌症死亡原因	132	155.14	100.00		
1	氣管、支氣管和肺癌	45	27.56	15.46	氣管、支氣管和肺癌	26	33.26	16.35	結腸、直腸和肛門癌	20	23.51	15.15					
2	肝和肝內膽管癌	43	26.34	14.78	肝和肝內膽管癌	26	33.26	16.35	氣管、支氣管和肺癌	19	22.33	14.39					
3	結腸、直腸和肛門癌	42	25.73	14.43	結腸、直腸和肛門癌	22	28.14	13.84	肝和肝內膽管癌	17	19.98	12.88					
4	女性乳房癌(1)	14	16.45	4.81	胃癌	14	17.91	8.81	女性乳房癌	14	16.45	10.61					
5	胰臟癌	24	14.70	8.25	前列腺(攝護腺)癌	11	14.07	6.92	胰臟癌	13	15.28	9.85					
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	11	14.07	3.78	胰臟癌	11	14.07	6.92	卵巢癌	8	9.40	6.06					
7	胃癌	21	12.86	7.22	食道癌	8	10.23	5.03	胃癌	7	8.23	5.30					
8	卵巢癌(1)	8	9.40	2.75	口腔癌	6	7.67	3.77	非何杰金氏淋巴瘤	5	5.88	3.79					
9	非何杰金氏淋巴瘤	10	6.13	3.44	非何杰金氏淋巴瘤	5	6.40	3.14	膀胱癌	3	3.53	2.27					
10	食道癌	10	6.13	3.44	膀胱癌	4	5.12	2.52	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	3.53	2.27					
	其他	63	38.59	21.65	其他	26	33.26	16.35	其他	23	27.03	17.42					
11	口腔癌	8	4.90	2.75	白血病	4	5.12	2.52	腦癌	2	2.35	1.52					
12	膀胱癌	7	4.29	2.41	膽囊和其他膽道癌	3	3.84	1.89	食道癌	2	2.35	1.52					
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	3.53	1.03	腦癌	2	2.56	1.26	口腔癌	2	2.35	1.52					
14	白血病	5	3.06	1.72	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	1.28	0.63	間皮和軟組織癌	2	2.35	1.52					
15	腦癌(3)	4	2.45	1.37	鼻咽癌(4)	1	1.28	0.63	甲狀腺癌	2	2.35	1.52					

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.45。

(4)男性：間皮和軟組織癌、胸腺癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.28。

表31-6・ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因

中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性							
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	236	180.99	100.00			所有癌症死亡原因	146	228.88	100.00		所有癌症死亡原因	90	135.12	100.00	
1	氣管、支氣管和肺癌	57	43.71	24.15	氣管、支氣管和肺癌	37	58.00	25.34	氣管、支氣管和肺癌	20	30.03	22.22				
2	結腸、直腸和肛門癌	37	28.37	15.68	肝和肝內膽管癌	27	42.33	18.49	結腸、直腸和肛門癌	15	22.52	16.67				
3	肝和肝內膽管癌	36	27.61	15.25	結腸、直腸和肛門癌	22	34.49	15.07	女性乳房癌	11	16.51	12.22				
4	女性乳房癌(1)	11	16.51	4.66	口腔癌	11	17.24	7.53	肝和肝內膽管癌	9	13.51	10.00				
5	胃癌	15	11.50	6.36	胃癌	9	14.11	6.16	胃癌	6	9.01	6.67				
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9.41	2.54	前列腺(攝護腺)癌	6	9.41	4.11	白血病	6	9.01	6.67				
7	口腔癌	11	8.44	4.66	食道癌	5	7.84	3.42	胰臟癌	4	6.01	4.44				
8	胰臟癌	6	4.60	2.54	非何杰金氏淋巴瘤	5	7.84	3.42	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.50	3.33				
9	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.60	2.54	鼻咽癌	4	6.27	2.74	子宮體癌	2	3.00	2.22				
10	膀胱癌	6	4.60	2.54	膀胱癌	4	6.27	2.74	膀胱癌	2	3.00	2.22				
	其他	45	34.51	19.07	其他	16	25.08	10.96	其他	12	18.02	13.33				
11	白血病	6	4.60	2.54	胰臟癌	2	3.14	1.37	卵巢癌	2	3.00	2.22				
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	4.50	1.27	間皮和軟組織癌	1	1.57	0.68	間皮和軟組織癌	2	3.00	2.22				
13	食道癌	5	3.83	2.12	膽囊和其他膽道癌	1	1.57	0.68	膽囊和其他膽道癌	2	3.00	2.22				
14	鼻咽癌	5	3.83	2.12	甲狀腺癌	1	1.57	0.68	鼻咽癌	1	1.50	1.11				
15	子宮體癌(1)(3)	2	3.00	0.85	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌(4)	1	1.57	0.68	非何杰金氏淋巴瘤	1	1.50	1.11				

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：卵巢癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.00。

(4)男性：喉癌、骨和關節軟骨癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.57。

表31-7・ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性																				
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	每 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	每 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡		
	所有癌症死亡原因	458	235.96	100.00	所有癌症死亡原因	274	285.38	100.00	所有癌症死亡原因	184	187.60	100.00																	
1	氣管、支氣管和肺癌	100	51.52	21.83	氣管、支氣管和肺癌	61	63.53	22.26	氣管、支氣管和肺癌	39	39.76	21.20																	
2	肝和肝內膽管癌	65	33.49	14.19	肝和肝內膽管癌	48	49.99	17.52	結腸、直腸和肛門癌	25	25.49	13.59																	
3	結腸、直腸和肛門癌	60	30.91	13.10	結腸、直腸和肛門癌	35	36.45	12.77	女性乳房癌	25	25.49	13.59																	
4	女性乳房癌(1)	25	25.49	5.46	口腔癌	27	28.12	9.85	肝和肝內膽管癌	17	17.33	9.24																	
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	16	16.66	3.49	前列腺(攝護腺)癌	16	16.66	5.84	胃癌	15	15.29	8.15																	
6	胃癌	29	14.94	6.33	食道癌	15	15.62	5.47	胰臟癌	13	13.25	7.07																	
7	口腔癌	28	14.43	6.11	胃癌	14	14.58	5.11	非何杰金氏淋巴瘤	8	8.16	4.35																	
8	胰臟癌	20	10.30	4.37	鼻咽癌	8	8.33	2.92	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	7.14	3.80																	
9	食道癌	15	7.73	3.28	胰臟癌	7	7.29	2.55	卵巢癌	5	5.10	2.72																	
10	非何杰金氏淋巴瘤	14	7.21	3.06	非何杰金氏淋巴瘤	6	6.25	2.19	膀胱癌	4	4.08	2.17																	
	其他	86	44.31	18.78	其他	37	38.54	13.50	其他	26	26.51	14.13																	
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	7.14	1.53	膀胱癌	5	5.21	1.82	子宮體癌	4	4.08	2.17																	
12	卵巢癌(1)	5	5.10	1.09	白血病	4	4.17	1.46	腦癌	2	2.04	1.09																	
13	膀胱癌	9	4.64	1.97	腦癌	2	2.08	0.73	腎臟癌	2	2.04	1.09																	
14	鼻咽癌	9	4.64	1.97	腎臟癌	1	1.04	0.36	間皮和軟組織癌	2	2.04	1.09																	
15	子宮體癌(1)	4	4.08	0.87	黑色素瘤和其他皮膚癌(3)	1	1.04	0.36	膽囊和其他膽道癌	2	2.04	1.09																	

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：膽囊和其他膽道癌、甲狀腺癌、喉癌、胸腺癌、骨和關節軟骨癌、鼻腔、中耳和副鼻竇癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.04。

表31-8 · ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性						
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 男 性 人 口 死 亡 率	十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 女 性 人 口 死 亡 率	十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	462	169.46	100.00	所有癌症死亡原因	262	199.38	100.00	所有癌症死亡原因	200	141.62	100.00			
1	氣管、支氣管和肺癌	93	34.11	20.13	氣管、支氣管和肺癌	55	41.85	20.99	女性乳房癌	41	29.03	20.50			
2	女性乳房癌(1)	41	29.03	8.87	肝和肝內膽管癌	45	34.24	17.18	氣管、支氣管和肺癌	38	26.91	19.00			
3	肝和肝內膽管癌	69	25.31	14.94	結腸、直腸和肛門癌	36	27.40	13.74	結腸、直腸和肛門癌	27	19.12	13.50			
4	結腸、直腸和肛門癌	63	23.11	13.64	胃癌	24	18.26	9.16	肝和肝內膽管癌	24	16.99	12.00			
5	胃癌	33	12.10	7.14	口腔癌	13	9.89	4.96	胃癌	9	6.37	4.50			
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	10	7.61	2.16	前列腺(攝護腺)癌	10	7.61	3.82	胰臟癌	9	6.37	4.50			
7	胰臟癌	19	6.97	4.11	胰臟癌	10	7.61	3.82	膽囊和其他膽道癌	8	5.66	4.00			
8	口腔癌	17	6.24	3.68	非何杰金氏淋巴瘤	10	7.61	3.82	口腔癌	4	2.83	2.00			
9	非何杰金氏淋巴瘤	13	4.77	2.81	鼻咽癌	9	6.85	3.44	卵巢癌	4	2.83	2.00			
10	膽囊和其他膽道癌	11	4.03	2.38	白血病	7	5.33	2.67	子宮體癌	4	2.83	2.00			
	其他	93	34.11	20.13	其他	43	32.72	16.41	其他	32	22.66	16.00			
11	鼻咽癌	11	4.03	2.38	食道癌	7	5.33	2.67	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.12	1.50			
12	白血病	8	2.93	1.73	腎臟癌	6	4.57	2.29	膀胱癌	3	2.12	1.50			
13	膀胱癌	8	2.93	1.73	膀胱癌	5	3.80	1.91	間皮和軟組織癌	3	2.12	1.50			
14	腎臟癌	8	2.93	1.73	腦癌	3	2.28	1.15	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	1.42	1.00			
15	卵巢癌(1)(3)	4	2.83	0.87	膽囊和其他膽道癌	3	2.28	1.15	鼻咽癌(4)	2	1.42	1.00			

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：子宮體癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.83。

(4)女性：腎臟癌、甲狀腺癌、黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.42。

表31-9 · ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性																	
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分	
	所有癌症死亡原因	228	189.20	100.00	所有癌症死亡原因	144	244.45	100.00	所有癌症死亡原因	84	136.37	100.00																
1	氣管、支氣管和肺癌	45	37.34	19.74	氣管、支氣管和肺癌	34	57.72	23.61	肝和肝內膽管癌	16	25.98	19.05																
2	肝和肝內膽管癌	36	29.87	15.79	肝和肝內膽管癌	20	33.95	13.89	氣管、支氣管和肺癌	11	17.86	13.10																
3	結腸、直腸和肛門癌	24	19.92	10.53	結腸、直腸和肛門癌	14	23.77	9.72	女性乳房癌	10	16.23	11.90																
4	前列腺(攝護腺)癌	10	16.98	4.39	胃癌	14	23.77	9.72	結腸、直腸和肛門癌	10	16.23	11.90																
5	女性乳房癌(1)	10	16.23	4.39	前列腺(攝護腺)癌	10	16.98	6.94	卵巢癌	7	11.36	8.33																
6	胃癌	19	15.77	8.33	食道癌	7	11.88	4.86	胃癌	5	8.12	5.95																
7	卵巢癌(1)	7	11.36	3.07	鼻咽癌	6	10.19	4.17	胰臟癌	3	4.87	3.57																
8	胰臟癌	8	6.64	3.51	口腔癌	5	8.49	3.47	白血病	3	4.87	3.57																
9	口腔癌	7	5.81	3.07	胰臟癌	5	8.49	3.47	口腔癌	2	3.25	2.38																
10	食道癌	7	5.81	3.07	膽囊和其他膽道癌	4	6.79	2.78	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.25	2.38																
	其他	55	45.64	24.12	其他	25	42.44	17.36	其他	15	24.35	17.86																
11	鼻咽癌	6	4.98	2.63	非何杰金氏淋巴瘤	3	5.09	2.08	非何杰金氏淋巴瘤	2	3.25	2.38																
12	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.15	2.19	喉癌	3	5.09	2.08	子宮體癌	2	3.25	2.38																
13	白血病	5	4.15	2.19	白血病	2	3.40	1.39	腦癌	1	1.62	1.19																
14	膽囊和其他膽道癌	4	3.32	1.75	膀胱癌	2	3.40	1.39	間皮和軟組織癌	1	1.62	1.19																
15	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)(3)	2	3.25	0.88	間皮和軟組織癌(4)	2	3.40	1.39	黑色素瘤和其他皮膚癌(5)	1	1.62	1.19																

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：子宮體癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.25。

(4)男性：黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.40。

(5)女性：小腸癌、鼻腔、中耳和副鼻竇癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.62。

表31-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性														
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	死 亡	百分 比	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡	率	死 亡	百分 比	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡	率	死 亡	百分 比		
	所有癌症死亡原因	398	139.99	100.00	所有癌症死亡原因	238	174.59	100.00	所有癌症死亡原因	160	108.12	100.00											
1	氣管、支氣管和肺癌	88	30.95	22.11	氣管、支氣管和肺癌	52	38.15	21.85	氣管、支氣管和肺癌	36	24.33	22.50											
2	結腸、直腸和肛門癌	48	16.88	12.06	結腸、直腸和肛門癌	32	23.47	13.45	女性乳房癌	19	12.84	11.88											
3	肝和肝內膽管癌	46	16.18	11.56	肝和肝內膽管癌	31	22.74	13.03	結腸、直腸和肛門癌	16	10.81	10.00											
4	女性乳房癌(1)	19	12.84	4.77	胃癌	16	11.74	6.72	肝和肝內膽管癌	15	10.14	9.38											
5	胃癌	28	9.85	7.04	口腔癌	14	10.27	5.88	胃癌	12	8.11	7.50											
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	9.54	3.27	前列腺(攝護腺)癌	13	9.54	5.46	白血病	7	4.73	4.38											
7	口腔癌	17	5.98	4.27	非何杰金氏淋巴瘤	11	8.07	4.62	卵巢癌	6	4.05	3.75											
8	非何杰金氏淋巴瘤	16	5.63	4.02	膀胱癌	10	7.34	4.20	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	4.05	3.75											
9	白血病	14	4.92	3.52	胰臟癌	8	5.87	3.36	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.38	3.13											
10	卵巢癌(1)	6	4.05	1.51	食道癌	8	5.87	3.36	腦癌	5	3.38	3.13											
	其他	103	36.23	25.88	其他	43	31.54	18.07	其他	33	22.30	20.63											
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	4.05	1.51	白血病	7	5.13	2.94	腎臟癌	4	2.70	2.50											
12	食道癌	11	3.87	2.76	鼻咽癌	6	4.40	2.52	間皮和軟組織癌	4	2.70	2.50											
13	膀胱癌	11	3.87	2.76	腎臟癌	5	3.67	2.10	口腔癌	3	2.03	1.88											
14	胰臟癌	10	3.52	2.51	膽囊和其他膽道癌	4	2.93	1.68	食道癌	3	2.03	1.88											
15	腎臟癌	9	3.17	2.26	間皮和軟組織癌(3)	2	1.47	0.84	子宮體癌(4)	2	1.35	1.25											

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：小腸癌、喉癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.47。

(4)女性：胰臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.35。

表31-11 · ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性																
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人	死 亡	十 萬	口 率	死 亡	百 分
	所有癌症死亡原因	537	185.11	100.00	所有癌症死亡原因	321	228.57	100.00	所有癌症死亡原因	216	144.32	100.00															
1	氣管、支氣管和肺癌	125	43.09	23.28	氣管、支氣管和肺癌	77	54.83	23.99	氣管、支氣管和肺癌	48	32.07	22.22															
2	結腸、直腸和肛門癌	75	25.85	13.97	肝和肝內膽管癌	47	33.47	14.64	結腸、直腸和肛門癌	33	22.05	15.28															
3	肝和肝內膽管癌	66	22.75	12.29	結腸、直腸和肛門癌	42	29.91	13.08	女性乳房癌	31	20.71	14.35															
4	女性乳房癌(1)	31	20.71	5.77	胰臟癌	18	12.82	5.61	肝和肝內膽管癌	19	12.70	8.80															
5	胰臟癌	35	12.06	6.52	口腔癌	18	12.82	5.61	胰臟癌	17	11.36	7.87															
6	胃癌	29	10.00	5.40	胃癌	17	12.11	5.30	胃癌	12	8.02	5.56															
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	11	7.83	2.05	食道癌	15	10.68	4.67	卵巢癌	7	4.68	3.24															
8	口腔癌	21	7.24	3.91	膀胱癌	12	8.54	3.74	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	4.68	3.24															
9	食道癌	16	5.52	2.98	前列腺(攝護腺)癌	11	7.83	3.43	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.34	2.31															
10	膀胱癌	15	5.17	2.79	鼻咽癌	7	4.98	2.18	間皮和軟組織癌	5	3.34	2.31															
	其他	113	38.95	21.04	其他	57	40.59	17.76	其他	32	21.38	14.81															
11	卵巢癌(1)	7	4.68	1.30	膽囊和其他膽道癌	7	4.98	2.18	腎臟癌	5	3.34	2.31															
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	4.68	1.30	間皮和軟組織癌	6	4.27	1.87	口腔癌	3	2.00	1.39															
13	間皮和軟組織癌	11	3.79	2.05	白血病	5	3.56	1.56	膀胱癌	3	2.00	1.39															
14	非何杰金氏淋巴瘤	9	3.10	1.68	非何杰金氏淋巴瘤	4	2.85	1.25	白血病	3	2.00	1.39															
15	鼻咽癌(3)	9	3.10	1.68	腦癌(4)	4	2.85	1.25	腦癌(5)	2	1.34	0.93															

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：腎臟癌死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、3.10。

(4)男性：腎臟癌死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.85。

(5)女性：鼻咽癌死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.34。

表31-12 · ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因
中華民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性							
	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人	亡 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	460	179.35	100.00			所有癌症死亡原因	269	216.75	100.00		所有癌症死亡原因	191	144.28	100.00	
1	氣管、支氣管和肺癌	84	32.75	18.26	氣管、支氣管和肺癌	49	39.48	18.22	氣管、支氣管和肺癌	35	26.44	18.32				
2	結腸、直腸和肛門癌	65	25.34	14.13	肝和肝內膽管癌	39	31.43	14.50	結腸、直腸和肛門癌	29	21.91	15.18				
3	肝和肝內膽管癌	58	22.61	12.61	結腸、直腸和肛門癌	36	29.01	13.38	女性乳房癌	22	16.62	11.52				
4	女性乳房癌(1)	22	16.62	4.78	胃癌	21	16.92	7.81	肝和肝內膽管癌	19	14.35	9.95				
5	胰臟癌	32	12.48	6.96	胰臟癌	18	14.50	6.69	胰臟癌	14	10.58	7.33				
6	胃癌	30	11.70	6.52	口腔癌	17	13.70	6.32	胃癌	9	6.80	4.71				
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	14	11.28	3.04	食道癌	15	12.09	5.58	卵巢癌	8	6.04	4.19				
8	口腔癌	19	7.41	4.13	前列腺(攝護腺)癌	14	11.28	5.20	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.29	3.66				
9	食道癌	18	7.02	3.91	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.83	2.23	子宮體癌	7	5.29	3.66				
10	卵巢癌(1)	8	6.04	1.74	腦癌	6	4.83	2.23	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	3.78	2.62				
	其他	110	42.89	23.91	其他	48	38.68	17.84	其他	36	27.19	18.85				
11	子宮體癌(1)	7	5.29	1.52	白血病	4	3.22	1.49	白血病	3	2.27	1.57				
12	非何杰金氏淋巴瘤	13	5.07	2.83	鼻咽癌	4	3.22	1.49	食道癌	3	2.27	1.57				
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	5	3.78	1.09	膀胱癌	4	3.22	1.49	腦癌	3	2.27	1.57				
14	腦癌	9	3.51	1.96	腎臟癌	4	3.22	1.49	間皮和軟組織癌	3	2.27	1.57				
15	白血病	7	2.73	1.52	膽囊和其他膽道癌(3)	3	2.42	1.12	口腔癌(4)	2	1.51	1.05				

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：喉癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.42。

(4)女性：膽囊和其他膽道癌、腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.51。

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表32・臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年				
		順位	死 人 數	每十萬人死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		11,551	437.00		11,989	457.75		12,054	463.27		12,205	465.98		12,424	470.49		12,799	484.10							
08-14	惡性腫瘤	1	3,180	120.31	1	3,366	128.52	1	3,504	134.67	1	3,489	133.21	1	3,564	134.97	1	3,738	141.38							
25-27-28*	心臟疾病	3	1,257	47.56	2	1,384	52.84	2	1,453	55.84	2	1,331	50.82	2	1,428	54.08	3	1,252	47.35							
29	腦血管疾病	2	1,306	49.41	3	1,361	51.96	3	1,326	50.96	3	1,303	49.75	3	1,209	45.78	2	1,380	52.20							
181	糖尿病	5	620	23.46	5	634	24.21	4	755	29.02	5	647	24.70	4	863	32.68	4	1,004	37.97							
321	肺炎	7	372	14.07	8	332	12.68	9	276	10.61	8	330	12.60	8	396	15.00	8	316	11.95							
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	358	13.54	6	368	14.05	6	378	14.53	6	413	15.77	6	419	15.87	6	457	17.29							
E47-E53	事故傷害	4	752	28.45	4	772	29.48	5	683	26.25	4	692	26.42	5	658	24.92	5	599	22.66							
E54	自殺	10	206	7.79	10	224	8.55	10	214	8.22	10	201	7.67	10	212	8.03	9	237	8.96							
347	慢性肝病及肝硬化	6	380	14.38	7	367	14.01	7	349	13.41	7	389	14.85	7	404	15.30	7	373	14.11							
038	敗血症	13	96	3.63	12	132	5.04	13	129	4.96	13	116	4.43	16	70	2.65	14	85	3.21							
26	高血壓性疾病	9	292	11.05	9	328	12.52	8	286	10.99	9	281	10.73	9	250	9.47	10	191	7.22							
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	190	7.19	11	183	6.99	11	182	6.99	11	200	7.64	11	156	5.91	11	142	5.37							
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	76	2.88	16	87	3.32	16	63	2.42	16	59	2.25	14	81	3.07	12	111	4.20							
02	結核病	15	80	3.03	13	107	4.09	12	180	6.92	12	122	4.66	12	99	3.75	12	111	4.20							
44	先天性畸形	12	99	3.75	14	92	3.51	14	106	4.07	15	71	2.71	13	82	3.11	15	81	3.06							
	其他		2,287	86.52		2,252	85.98		2,170	83.40		2,561	97.78		2,533	95.92		2,722	102.95							

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表32・臺北市歷年主要死亡原因（續1）

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																											
		90年				91年				92年				93年				94年				95年				96年			
順位	死 人 數	死 亡 每十萬人 口率	順位	死 人 數	死 亡 每十萬人 口率	順位	死 人 數	死 亡 每十萬人 口率	順位	死 人 數	死 亡 每十萬人 口率	順位	死 人 數	死 亡 每十萬人 口率	順位	死 人 數	死 亡 每十萬人 口率	順位	死 人 數	死 亡 每十萬人 口率	順位	死 人 數	死 亡 每十萬人 口率	順位	死 人 數	死 亡 每十萬人 口率			
01-56	所有死亡原因	13,222		500.81		13,279		503.41		13,631		517.40		13,733		523.20		14,339		547.41		13,875		528.71		14,486		550.64	
08-14	惡性腫瘤	1	4,089	154.88	1	4,169	158.05	1	4,001	151.87	1	4,202	160.09	1	4,290	163.78	1	4,423	168.54	1	4,566	173.56							
25-27-28*	心臟疾病	3	1,383	52.38	2	1,450	54.97	2	1,642	62.33	2	1,732	65.99	2	1,665	63.56	2	1,527	58.19	2	1,642	62.42							
29	腦血管疾病	2	1,397	52.91	3	1,233	46.74	3	1,325	50.29	3	1,240	47.24	3	1,367	52.19	3	1,182	45.04	3	1,289	49.00							
181	糖尿病	4	903	34.20	4	889	33.70	4	946	35.91	4	893	34.02	4	988	37.72	4	946	36.05	4	958	36.42							
321	肺炎	7	367	13.90	7	448	16.98	5	567	21.52	7	447	17.03	5	572	21.84	5	575	21.91	5	688	26.15							
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	490	18.56	6	456	17.29	6	503	19.09	5	503	19.16	6	544	20.77	6	485	18.48	6	549	20.87							
E47-E53	事故傷害	5	506	19.17	5	514	19.49	7	455	17.27	6	463	17.64	8	415	15.84	8	379	14.44	7	372	14.14							
E54	自殺	9	290	10.98	8	325	12.32	9	320	12.15	8	346	13.18	7	467	17.83	7	454	17.30	8	364	13.84							
347	慢性肝病及肝硬化	8	365	13.83	9	305	11.56	8	367	13.93	9	333	12.69	9	323	12.33	9	317	12.08	9	331	12.58							
038	敗血症	12	116	4.39	12	109	4.13	13	93	3.53	12	94	3.58	11	150	5.73	11	145	5.53	10	188	7.15							
26	高血壓性疾病	10	167	6.33	10	179	6.79	10	142	5.39	10	167	6.36	10	162	6.18	10	176	6.71	11	141	5.36							
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	149	5.64	11	123	4.66	11	115	4.37	11	113	4.31	12	109	4.16	12	92	3.51	12	97	3.69							
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	75	2.84	16	61	2.31	14	64	2.43	14	70	2.67	13	77	2.94	13	79	3.01	13	80	3.04							
02	結核病	13	89	3.37	13	82	3.11	12	98	3.72	13	74	2.82	14	60	2.29	14	68	2.59	14	57	2.17							
44	先天性畸形	16	67	2.54	15	64	2.43	15	41	1.56	15	48	1.83	16	39	1.49	15	42	1.60	15	48	1.82							
	其他		2,769	104.88		2,872	108.88		2,952	112.05		3,008	114.60		3,111	118.77		2,985	113.74		3,116	118.45							

表32・臺北市歷年主要死亡原因（續2）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率		
A00-Y98	所有死亡原因		15,119	575.72		14,870	568.60		15,047	575.83		15,834	600.94		16,397	615.94		16,100	600.78		
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10	1	4,563	174.48	1	4,632	177.26	1	4,732	179.59	1	4,981	187.11	1	4,919	183.55		
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,014	76.69	2	1,768	67.61	2	1,723	65.94	2	1,905	72.30	2	2,028	76.18	2	2,075	77.43		
I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66	3	1,128	43.13	3	1,047	40.07	3	1,137	43.15	3	1,186	44.55	3	1,210	45.15		
J12-J18	肺炎	4	950	36.18	4	840	32.12	4	899	34.40	4	942	35.75	4	905	34.00	4	883	32.95		
E10-E14	糖尿病	5	716	27.26	5	825	31.55	5	769	29.43	5	775	29.41	5	817	30.69	5	860	32.09		
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98	6	496	18.97	7	465	17.79	6	582	22.09	6	591	22.20	6	573	21.38		
I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24	9	385	14.72	9	422	16.15	9	446	16.93	8	536	20.13	7	493	18.40		
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	491	18.70	7	451	17.25	6	474	18.14	8	448	17.00	9	531	19.95	8	488	18.21		
A40-A41	敗血症	6	513	19.53	8	441	16.86	8	449	17.18	7	566	21.48	7	559	21.00	9	466	17.39		
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	389	14.81	10	377	14.42	11	359	13.74	10	402	15.26	10	430	16.15	10	406	15.15		
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27	11	349	13.35	13	318	12.17	11	315	11.96	12	286	10.74	11	310	11.57		
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	370	14.09	12	341	13.04	12	329	12.59	12	306	11.61	11	333	12.51	12	261	9.74		
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	281	10.70	13	340	13.00	10	380	14.54	13	217	8.24	13	167	6.27	13	191	7.13		
G20-G21	帕金森病	15	93	3.54	16	92	3.52	16	111	4.25	16	121	4.59	14	158	5.94	14	155	5.78		
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	17	69	2.63	15	112	4.28	15	116	4.44	14	136	5.16	15	129	4.85	15	142	5.30		
	其他		2,451	93.34		2,362	90.30		2,554	97.74		2,804	106.42		2,760	103.68		2,668	99.56		

表32・臺北市歷年主要死亡原因（續3完）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				單位：人，人/每十萬人口 萬口率
		順位	死 人	亡 每 人 數 死	十 亡	
A00-Y98	所有死亡原因			16,953		629.19
C00-C97	惡性腫瘤	1		4,903		181.97
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		2,489		92.38
I60-I69	腦血管疾病	3		1,212		44.98
J12-J18	肺炎	4		1,060		39.34
E10-E14	糖尿病	5		854		31.70
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6		657		24.38
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7		556		20.64
I10-I15	高血壓性疾病	8		461		17.11
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9		458		17.00
A40-A41	敗血症	10		445		16.52
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11		311		11.54
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12		309		11.47
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13		284		10.54
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	14		198		7.35
G20-G21	帕金森病	15		135		5.01
	其他			2,621		97.28

表33・臺北市歷年男性主要死亡原因

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬男性人口															
		84年			85年			86年			87年			88年			89年
順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因	7,172	541.89	7,451	568.85	7,351	565.92	7,546	578.81	7,593	579.35	7,841	598.84				
08-14	惡性腫瘤	1 1,977	149.38	1 2,118	161.70	1 2,135	164.36	1 2,154	165.22	1 2,235	170.53	1 2,356	179.93				
25-27-28*	心臟疾病	3 791	59.77	2 892	68.10	2 910	70.06	2 817	62.67	2 895	68.29	2 824	62.93				
29	腦血管疾病	2 800	60.45	3 822	62.76	3 798	61.43	3 783	60.06	3 699	53.33	3 805	61.48				
181	糖尿病	5 328	24.78	5 309	23.59	5 390	30.02	5 323	24.78	5 415	31.66	4 506	38.64				
321	肺炎	7 245	18.51	7 226	17.25	8 189	14.55	8 231	17.72	7 269	20.52	8 192	14.66				
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8 185	13.98	8 194	14.81	7 224	17.24	7 232	17.80	8 213	16.25	7 242	18.48				
E47-E53	事故傷害	4 535	40.42	4 560	42.75	4 491	37.80	4 494	37.89	4 437	33.34	5 426	32.53				
E54	自殺	11 123	9.29	10 155	11.83	11 125	9.62	11 125	9.59	9 143	10.91	9 143	10.92				
347	慢性肝病及肝硬化	6 273	20.63	6 253	19.32	6 247	19.02	6 277	21.25	6 306	23.35	6 253	19.32				
038	敗血症	14 50	3.78	13 78	5.95	13 74	5.70	13 64	4.91	15 38	2.90	15 41	3.13				
26	高血壓性疾病	9 167	12.62	9 190	14.51	9 158	12.16	9 159	12.20	9 143	10.91	10 117	8.94				
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10 131	9.90	11 110	8.40	12 119	9.16	10 133	10.20	11 94	7.17	11 99	7.56				
02	胃及十二指腸之潰瘍	13 58	4.38	14 63	4.81	16 39	3.00	15 37	2.84	13 54	4.12	13 76	5.80				
02	結核病	12 71	5.36	12 80	6.11	10 141	10.85	12 92	7.06	12 78	5.95	12 86	6.57				
44	先天性畸形	16 48	3.63	15 54	4.12	14 60	4.62	15 37	2.84	16 37	2.82	14 47	3.59				
	其他	1,390	105.02	1,347	102.84	1,251	96.31	1,588	121.81	1,537	117.27	1,628	124.33				

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表33・臺北市歷年男性主要死亡原因（續1）

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬男性人口																95年				96年							
		90年				91年				92年				93年				94年				95年							
順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率			
01-56	所有死亡原因	8,056	617.44	8,001	615.07	8,213	633.43	8,352	647.93	8,763	683.06	8,387	654.67	8,633	674.39														
08-14	惡性腫瘤	1 2,565	196.59	1 2,520	193.72	1 2,430	187.41	1 2,594	201.24	1 2,630	205.00	1 2,695	210.37	1 2,757	215.37														
25-27-28*	心臟疾病	2 906	69.44	2 896	68.88	2 996	76.82	2 1,107	85.88	2 1,060	82.62	2 971	75.79	2 1,026	80.15														
29	腦血管疾病	3 820	62.85	3 734	56.43	3 818	63.09	3 725	56.24	3 822	64.07	3 680	53.08	3 768	59.99														
181	糖尿病	4 450	34.49	4 464	35.67	4 463	35.71	4 440	34.13	4 521	40.61	4 473	36.92	4 495	38.67														
321	肺炎	8 233	17.86	6 314	24.14	5 369	28.46	6 300	23.27	5 370	28.84	5 373	29.12	5 446	34.84														
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6 257	19.70	7 246	18.91	7 261	20.13	7 278	21.57	6 324	25.26	8 261	20.37	6 272	21.25														
E47-E53	事故傷害	5 365	27.97	5 359	27.60	6 316	24.37	5 342	26.53	8 312	24.32	7 281	21.93	7 265	20.70														
E54	自殺	9 192	14.72	8 214	16.45	9 203	15.66	8 225	17.46	7 313	24.40	6 309	24.12	8 228	17.81														
347	慢性肝病及肝硬化	7 239	18.32	9 209	16.07	8 249	19.20	9 222	17.22	9 192	14.97	9 210	16.39	9 222	17.34														
038	敗血症	13 59	4.52	13 53	4.07	13 61	4.70	13 54	4.19	11 73	5.69	11 73	5.70	10 82	6.41														
26	高血壓性疾病	11 88	6.74	10 99	7.61	11 70	5.40	10 82	6.36	10 106	8.26	10 94	7.34	11 69	5.39														
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10 95	7.28	11 75	5.77	12 68	5.24	11 73	5.66	12 71	5.53	12 58	4.53	12 61	4.77														
341	胃及十二指腸之潰瘍	14 50	3.83	15 35	2.69	14 42	3.24	14 43	3.34	13 52	4.05	14 43	3.36	13 48	3.75														
02	結核病	12 76	5.82	12 67	5.15	10 75	5.78	12 59	4.58	14 50	3.90	13 53	4.14	14 40	3.12														
44	先天性畸形	16 33	2.53	16 34	2.61	15 23	1.77	16 25	1.94	17 17	1.33	16 16	1.25	15 23	1.80														
	其他	1,628	124.78	1,682	129.30	1,769	136.43	1,783	138.32	1,850	144.20	1,797	140.27	1,831	143.03														

表33・臺北市歷年男性主要死亡原因（續2）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬男性人口																					
		97年				98年				99年				100年				101年				102年	
順位	死 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率			
A00-Y98	所有死亡原因	8,992	705.67	8,782	693.85	8,882	704.08	9,359	737.25	9,628	751.69	9,436	732.81										
C00-C97	惡性腫瘤	1 2,698	211.73	1 2,671	211.03	1 2,771	219.66	1 2,749	216.55	1 2,937	229.30	1 2,854	221.64										
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2 1,278	100.29	2 1,101	86.99	2 1,039	82.36	2 1,155	90.98	2 1,246	97.28	2 1,252	97.23										
I60-I69	腦血管疾病	3 677	53.13	3 647	51.12	3 602	47.72	3 697	54.91	3 679	53.01	3 699	54.28										
J12-J18	肺炎	4 619	48.58	4 528	41.72	4 548	43.44	4 605	47.66	4 563	43.96	4 575	44.65										
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6 337	26.45	6 377	29.79	6 335	26.56	5 445	35.05	5 430	33.57	5 431	33.47										
E10-E14	糖尿病	5 352	27.62	5 423	33.42	5 384	30.44	6 393	30.96	6 414	32.32	6 428	33.24										
A40-A41	敗血症	8 263	20.64	10 233	18.41	10 230	18.23	7 337	26.55	7 308	24.05	7 274	21.28										
V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	7 269	21.11	7 260	20.54	7 258	20.45	8 267	21.03	8 285	22.25	8 271	21.05										
I10-I15	高血壓性疾病	11 204	16.01	12 206	16.28	9 231	18.31	10 230	18.12	9 274	21.39	9 255	19.80										
N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9 240	18.83	8 249	19.67	8 234	18.55	9 236	18.59	10 255	19.91	10 242	18.79										
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12 197	15.46	11 232	18.33	12 198	15.70	11 211	16.62	12 187	14.60	11 198	15.38										
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10 231	18.13	9 234	18.49	11 212	16.81	12 188	14.81	11 207	16.16	12 166	12.89										
G20-G21	帕金森病	15 56	4.39	15 62	4.90	16 64	5.07	15 70	5.51	13 96	7.50	13 94	7.30										
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13 132	10.36	13 142	11.22	13 170	13.48	13 82	6.46	14 73	5.70	14 88	6.83										
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	14 101	7.93	14 73	5.77	14 75	5.95	14 75	5.91	17 60	4.68	15 80	6.21										
	其他	1,338	105.01	1,344	106.17	1,531	121.36	1,619	127.54	1,614	126.01	1,529	118.74										

表33・臺北市歷年男性主要死亡原因（續3完）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年					單位：人，人/每十萬人口 萬口率
		順位	死 人	亡 每 人 數	死	十 亡	
A00-Y98	所有死亡原因			9,908			766.40
C00-C97	惡性腫瘤	1		2,824			218.44
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		1,480			114.48
I60-I69	腦血管疾病	3		722			55.85
J12-J18	肺炎	4		638			49.35
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5		476			36.82
E10-E14	糖尿病	6		433			33.49
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7		318			24.60
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8		284			21.97
A40-A41	敗血症	9		269			20.81
I10-I15	高血壓性疾病	10		241			18.64
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11		188			14.54
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12		181			14.00
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13		148			11.45
G20-G21	帕金森病	14		91			7.04
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	15		84			6.50
	其他			1,531			118.43

表34・臺北市歷年女性主要死亡原因

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬女性人口															
		84年			85年			86年			87年			88年			89年
順位	死 人 數	每十萬女性人口死亡率	順位	死 人 數	每十萬女性人口死亡率	順位	死 人 數	每十萬女性人口死亡率	順位	死 人 數	每十萬女性人口死亡率	順位	死 人 數	每十萬女性人口死亡率	順位	死 人 數	每十萬女性人口死亡率
01-56	所有死亡原因	4,379	331.81	4,538	346.60	4,703	360.94	4,659	354.16	4,831	363.23	4,958	371.52				
08-14	惡性腫瘤	1 1,203	91.16	1 1,248	95.32	1 1,369	105.07	1 1,335	101.48	1 1,329	99.92	1 1,382	103.56				
25-27-28*	心臟疾病	3 466	35.31	3 492	37.58	2 543	41.67	3 514	39.07	2 533	40.07	4 428	32.07				
29	腦血管疾病	2 506	38.34	2 539	41.17	3 528	40.52	2 520	39.53	3 510	38.35	2 575	43.09				
181	糖尿病	4 292	22.13	4 325	24.82	4 365	28.01	4 324	24.63	4 448	33.68	3 498	37.32				
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6 173	13.11	6 174	13.29	6 154	11.82	6 181	13.76	6 206	15.49	5 215	16.11				
321	肺炎	7 127	9.62	9 106	8.10	10 87	6.68	9 99	7.53	7 127	9.55	7 124	9.29				
E54	自殺	10 83	6.29	11 69	5.27	9 89	6.83	10 76	5.78	10 69	5.19	9 94	7.04				
347	慢性肝病及肝硬化	9 107	8.11	8 114	8.71	8 102	7.83	8 112	8.51	9 98	7.37	8 120	8.99				
E47-E53	事故傷害	5 217	16.44	5 212	16.19	5 192	14.74	5 198	15.05	5 221	16.62	6 173	12.96				
038	敗血症	13 46	3.49	12 54	4.12	12 55	4.22	12 52	3.95	14 32	2.41	11 44	3.30				
26	高血壓性疾病	8 125	9.47	7 138	10.54	7 128	9.82	7 122	9.27	8 107	8.05	10 74	5.55				
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11 59	4.47	10 73	5.58	11 63	4.84	11 67	5.09	11 62	4.66	12 43	3.22				
341	胃及十二指腸之潰瘍	15 18	1.36	16 24	1.83	16 24	1.84	16 22	1.67	15 27	2.03	13 35	2.62				
44	先天性畸形	12 51	3.86	13 38	2.90	13 46	3.53	13 34	2.58	12 45	3.38	14 34	2.55				
200	貧血	17 10	0.76	19 6	0.46	18 9	0.69	18 7	0.53	17 6	0.45	17 17	1.27				
	其他	896	67.89	926	70.73	949	72.83	996	75.71	1,011	76.01	1,102	82.58				

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表34・臺北市歷年女性主要死亡原因（續1）

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬女性人口																95年		96年			
		90年				91年				92年				93年				94年					
順位	死 人	亡 人	每十萬女性人口	順位	死 人	亡 人	每十萬女性人口	順位	死 人	亡 人	每十萬女性人口	順位	死 人	亡 人	每十萬女性人口	順位	死 人	亡 人	每十萬女性人口	順位	死 人	亡 人	每十萬女性人口
01-56	所有死亡原因	5,166	386.85	5,278	394.76	5,418	404.96	5,381	402.84	5,576	417.20	5,488	408.57	5,853	433.35								
08-14	惡性腫瘤	1	1,524	114.12	1	1,649	123.33	1	1,571	117.42	1	1,608	120.38	1	1,660	124.20	1	1,728	128.65	1	1,809	133.94	
25-27-28*	心臟疾病	3	477	35.72	2	554	41.44	2	646	48.28	2	625	46.79	2	605	45.27	2	556	41.39	2	616	45.61	
29	腦血管疾病	2	577	43.21	3	499	37.32	3	507	37.90	3	515	38.55	3	545	40.78	3	502	37.37	3	521	38.57	
181	糖尿病	4	453	33.92	4	425	31.79	4	483	36.10	4	453	33.91	4	467	34.94	4	473	35.21	4	463	34.28	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	233	17.45	5	210	15.71	5	242	18.09	5	225	16.84	5	220	16.46	5	224	16.68	5	277	20.51	
321	肺炎	7	134	10.03	7	134	10.02	6	198	14.80	6	147	11.00	6	202	15.11	6	202	15.04	6	242	17.92	
E54	自殺	9	98	7.34	8	111	8.30	9	117	8.75	7	121	9.06	7	154	11.52	7	145	10.80	7	136	10.07	
347	慢性肝病及肝硬化	8	126	9.44	9	96	7.18	8	118	8.82	9	111	8.31	8	131	9.80	8	107	7.97	8	109	8.07	
E47-E53	事故傷害	6	141	10.56	6	155	11.59	7	139	10.39	7	121	9.06	9	103	7.71	9	98	7.30	9	107	7.92	
038	敗血症	11	57	4.27	11	56	4.19	12	32	2.39	11	40	2.99	10	77	5.76	11	72	5.36	10	106	7.85	
26	高血壓性疾病	10	79	5.92	10	80	5.98	10	72	5.38	10	85	6.36	11	56	4.19	10	82	6.10	11	72	5.33	
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	54	4.04	12	48	3.59	11	47	3.51	11	40	2.99	12	38	2.84	13	34	2.53	12	36	2.67	
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	25	1.87	15	26	1.94	15	22	1.64	13	27	2.02	13	25	1.87	12	36	2.68	13	32	2.37	
44	先天性畸形	14	34	2.55	13	30	2.24	16	18	1.35	14	23	1.72	14	22	1.65	14	26	1.94	14	25	1.85	
200	貧血	16	13	0.97	17	9	0.67	17	14	1.05	16	17	1.27	16	13	0.97	15	21	1.56	15	20	1.48	
	其他		1,141	85.44		1,196	89.45		1,192	89.10		1,223	91.56		1,258	94.13		1,182	88.00		1,282	94.92	

表34・臺北市歷年女性主要死亡原因（續2）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬女性人口															
		97年			98年			99年			100年			101年			
順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因	6,127	453.23	6,088	451.14	6,165	456.13	6,475	474.21	6,769	490.07	6,664	478.66				
C00-C97	惡性腫瘤	1 1,769	130.86	1 1,892	140.20	1 1,861	137.69	1 1,983	145.23	1 2,044	147.98	1 2,065	148.32				
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病 除外）	2 736	54.44	2 667	49.43	2 684	50.61	2 750	54.93	2 782	56.62	2 823	59.11				
I60-I69	腦血管疾病	3 522	38.61	3 481	35.64	3 445	32.92	3 440	32.22	3 507	36.71	3 511	36.70				
E10-E14	糖尿病	4 364	26.93	4 402	29.79	4 385	28.48	4 382	27.98	4 403	29.18	4 432	31.03				
J12-J18	肺炎	5 331	24.49	5 312	23.12	5 351	25.97	5 337	24.68	5 342	24.76	5 308	22.12				
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	6 251	18.57	7 202	14.97	6 240	17.76	8 212	15.53	6 276	19.98	6 246	17.67				
I10-I15	高血壓性疾病	8 170	12.58	9 179	13.26	9 191	14.13	7 216	15.82	7 262	18.97	7 238	17.10				
A40-A41	敗血症	7 250	18.49	6 208	15.41	7 219	16.20	6 229	16.77	8 251	18.17	8 192	13.79				
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12 109	8.06	10 119	8.82	10 130	9.62	9 137	10.03	9 161	11.66	9 142	10.20				
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11 120	8.88	11 117	8.67	13 101	7.47	10 135	9.89	10 145	10.50	10 135	9.70				
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	9 149	11.02	8 198	14.67	8 210	15.54	10 135	9.89	13 94	6.81	11 112	8.04				
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	10 139	10.28	13 107	7.93	12 117	8.66	12 118	8.64	11 126	9.12	12 103	7.40				
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13 99	7.32	11 117	8.67	11 120	8.88	13 104	7.62	12 99	7.17	13 95	6.82				
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	15 38	2.81	14 68	5.04	14 61	4.51	14 73	5.35	14 65	4.71	14 79	5.67				
G20-G21	帕金森病	17 37	2.74	17 30	2.22	15 47	3.48	16 51	3.74	15 62	4.49	15 61	4.38				
	其他	1,043	77.15	989	73.30	1,003	74.21	1,173	85.89	1,150	83.26	1,122	80.59				

表34・臺北市歷年女性主要死亡原因（續3完）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				單位：人，人/每十萬人口 萬口率
		順位	死 人	亡 每 人 數 死	十 亡	
A00-Y98	所有死亡原因			7,045		502.63
C00-C97	惡性腫瘤	1		2,079		148.33
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		1,009		71.99
I60-I69	腦血管疾病	3		490		34.96
J12-J18	肺炎	4		422		30.11
E10-E14	糖尿病	5		421		30.04
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6		272		19.41
I10-I15	高血壓性疾病	7		220		15.70
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8		181		12.91
A40-A41	敗血症	9		176		12.56
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10		161		11.49
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11		140		9.99
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12		130		9.27
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	13		114		8.13
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14		96		6.85
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	15		50		3.57
	其他			1,084		77.34

表35・臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數(人)			死亡率 (%)	死亡人數(人)			死亡率 (%)	死亡人數 (人)	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 84年	111	63	48	3.26	202	112	90	5.93	-	-
民國 85年	104	58	46	3.07	216	111	105	6.37	2	5.89
民國 86年	98	53	45	2.80	212	117	95	6.05	3	8.57
民國 87年	79	45	34	2.65	166	100	66	5.58	3	10.08
民國 88年	81	44	37	2.54	168	90	78	5.27	2	6.27
民國 89年	86	50	36	2.54	153	89	64	4.52	-	-
民國 90年	88	46	42	3.31	149	75	74	5.60	3	11.27
民國 91年	68	41	27	2.67	111	62	49	4.35	1	3.92
民國 92年	46	22	24	1.97	89	42	47	3.80	3	12.82
民國 93年	56	29	27	2.52	100	58	42	4.50	-	-
民國 94年	51	27	24	2.44	89	44	45	4.26	1	4.79
民國 95年	40	20	20	1.88	69	30	39	3.24	1	4.70
民國 96年	56	34	22	2.61	89	57	32	4.15	1	4.66
民國 97年	59	33	26	2.89	95	51	44	4.65	1	4.90
民國 98年	32	18	14	1.64	69	34	35	3.54	-	-
民國 99年	52	30	22	2.78	71	41	30	3.80	1	5.35
民國 100年	63	30	33	2.48	96	50	46	3.77	-	-
民國 101年	71	43	28	2.35	105	62	43	3.47	3	9.92
民國 102年	67	41	26	2.56	100	55	45	3.82	2	7.64
民國 103年	71	40	31	2.43	110	70	40	3.77	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註:1.新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數)×1,000。

2.嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數)×1,000

3.孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數)×100,000。

表36・臺北市歷年年齡結構別死亡率

年別	總計	單位：人 / 每十萬人口																		
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
84年	437.00	682.71	32.62	18.42	27.06	60.57	77.17	65.05	90.99	113.30	160.75	261.74	386.95	681.57	1,081.85	1,676.13	2,664.91	4,267.21	7,274.45	11,039.79
85年	457.75	673.86	45.78	17.30	22.78	47.79	69.88	74.81	89.43	121.56	175.14	270.34	402.54	688.84	1,105.93	1,573.56	2,674.67	4,300.10	6,908.85	11,667.37
86年	463.27	633.97	46.94	15.83	14.87	39.99	48.43	68.09	84.34	131.22	184.72	273.57	392.13	626.42	1,050.42	1,650.66	2,469.82	4,285.18	6,565.16	11,540.95
87年	465.98	519.20	47.91	21.16	12.41	35.07	53.31	66.86	72.52	130.10	160.17	246.88	379.54	634.67	975.66	1,630.90	2,443.44	4,064.66	6,730.79	11,230.74
88年	470.49	554.05	30.48	12.65	20.64	37.55	42.38	57.00	69.13	113.03	159.35	251.56	350.49	566.77	968.13	1,472.13	2,409.57	3,959.08	6,641.81	11,953.77
89年	484.10	477.82	34.20	14.45	17.16	47.15	44.74	49.58	75.59	119.57	153.35	242.18	350.33	575.30	925.06	1,530.22	2,402.38	3,923.90	6,530.01	11,437.54
90年	500.81	508.22	31.83	15.72	15.49	35.56	44.36	46.11	67.09	118.49	168.75	242.39	391.39	564.51	938.44	1,527.54	2,418.31	3,807.86	6,329.57	11,330.28
91年	503.41	437.72	41.40	13.99	14.90	30.58	36.58	53.21	69.89	117.86	163.49	244.55	353.34	564.14	903.31	1,399.37	2,330.38	3,611.06	6,167.56	11,169.46
92年	517.40	372.82	24.52	11.92	14.46	34.85	36.65	54.73	77.59	112.50	146.43	233.45	339.14	511.37	829.43	1,415.81	2,269.54	3,555.13	6,175.39	11,670.54
93年	523.20	452.52	32.87	11.12	14.57	27.91	46.19	53.77	77.28	107.85	159.51	227.93	349.91	545.62	850.44	1,253.79	2,119.75	3,456.63	6,116.51	10,769.36
94年	547.41	426.71	21.69	15.85	13.42	41.51	38.86	53.63	86.38	104.37	164.56	240.15	350.28	464.27	850.95	1,295.29	2,034.07	3,557.58	6,002.50	11,305.33
95年	528.71	340.67	29.64	11.84	15.21	34.40	44.62	63.55	65.17	112.92	155.35	237.33	365.65	507.15	721.45	1,150.53	2,001.99	3,249.51	5,306.01	10,046.38
96年	550.64	434.21	20.37	17.43	7.01	25.78	39.69	52.14	56.09	98.39	148.71	246.28	311.48	475.52	708.13	1,171.78	2,041.12	3,320.52	5,341.79	10,629.20
97年	575.72	469.11	23.18	16.16	12.47	19.20	45.78	48.92	66.26	105.37	157.67	230.61	330.13	455.61	699.50	1,124.34	2,016.68	3,257.44	5,549.18	10,992.30
98年	568.60	357.61	21.38	13.08	5.53	26.88	36.77	40.38	63.46	85.57	148.62	225.80	314.22	467.69	638.77	1,116.63	1,912.70	3,080.41	5,353.26	10,468.26
99年	575.83	379.01	17.92	10.66	10.08	23.18	29.30	45.38	63.43	87.69	135.15	207.88	295.07	466.23	627.12	1,073.08	1,722.41	3,119.39	5,172.92	10,733.81
100年	600.94	439.53	17.38	6.91	9.11	23.22	31.96	38.62	61.99	82.84	147.77	212.79	323.21	449.50	647.50	1,009.22	1,742.48	3,149.19	5,256.75	11,145.17
101年	615.94	384.89	30.01	10.62	13.00	22.57	31.22	54.76	55.70	92.04	135.16	209.92	316.51	450.09	642.50	1,046.14	1,634.99	3,111.78	5,368.53	11,362.42
102年	600.78	362.67	15.23	15.26	10.77	27.43	32.79	32.30	39.45	71.26	120.77	221.67	333.36	461.62	598.90	951.72	1,608.36	2,787.57	5,146.12	10,998.33
103年	629.19	406.98	15.98	14.45	12.05	20.39	44.92	33.31	45.32	90.65	131.91	210.82	299.87	453.63	634.57	930.83	1,612.32	2,781.10	5,270.99	11,547.13

資料來源：衛生福利部。

表37・臺北市歷年事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		死 亡 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 人 數	死 亡 人 數	死 亡 率																			
E47-E53		752	28.45	772	29.48	683	26.25	692	26.42	658	24.92	599	22.66												
E47	運輸事故	393	14.87	391	14.93	351	13.49	335	12.79	221	8.37	225	8.51												
E48	意外中毒	39	1.48	32	1.22	33	1.27	21	0.80	24	0.91	28	1.06												
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	2	0.08	-	-	-	-	1	0.04	3	0.11	1	0.04												
E50	意外墜落	97	3.67	112	4.28	110	4.23	115	4.39	146	5.53	144	5.45												
E51	火及火焰所致之事故傷害	30	1.13	40	1.53	35	1.35	35	1.34	21	0.80	20	0.76												
E52	其他事故傷害，包括後期影響	191	7.23	197	7.52	153	5.88	185	7.06	243	9.20	181	6.85												
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-												

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表37・臺北市歷年事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率												
E47-E53		506	19.17	514	19.49	455	17.27	463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14
E47	運輸事故	195	7.39	249	9.44	189	7.17	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54
E48	意外中毒	24	0.91	27	1.02	26	0.99	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	109	4.13	86	3.26	103	3.91	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31
E51	火及火焰所致之事故傷害	13	0.49	12	0.45	19	0.72	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27
E52	其他事故傷害，包括後期影響	165	6.25	139	5.27	118	4.48	140	5.33	83	3.17	91	3.47	82	3.12
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表37・臺北市歷年事故傷害死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				98年				99年				100年				101年				102年				
		死 人 數	亡 死 人 數	每 十 萬 口 人	死 亡 率																					
V01-X59, Y85-Y86		389	14.81	377	14.42	359	13.74	402	15.26	430	16.15	406	15.15													
V01-V99	運輸事故傷害	153	5.83	165	6.31	154	5.89	147	5.58	152	5.71	150	5.60													
W00-W19	跌倒(落)	91	3.47	72	2.75	83	3.18	100	3.80	96	3.61	88	3.28													
W65-W74	意外溺死和淹沒	26	0.99	17	0.65	16	0.61	27	1.02	14	0.53	15	0.56													
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	19	0.72	24	0.92	26	0.99	26	0.99	24	0.90	21	0.78													
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	6	0.23	7	0.27	6	0.23	5	0.19	16	0.60	9	0.34													
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	25	0.95	26	0.99	20	0.77	16	0.61	19	0.71	28	1.04													
	其他	69	2.63	66	2.52	54	2.07	81	3.07	109	4.09	95	3.54													

表37・臺北市歷年事故傷害死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年			
		死 人	亡 數	每 人 死 亡	萬 口 率
V01-X59, Y85-Y86			458		17.00
V01-V99	運輸事故傷害		142		5.27
W00-W19	跌倒(落)		118		4.38
W65-W74	意外溺死和淹沒		16		0.59
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅		23		0.85
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		6		0.22
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		31		1.15
	其他		122		4.53

表38・臺北市歷年男性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率										
E47-E53		535	40.42	560	42.75	491	37.80	494	37.89	437	33.34	426	32.53
E47	運輸事故	278	21.00	289	22.06	261	20.09	228	17.49	152	11.60	165	12.60
E48	意外中毒	32	2.42	22	1.68	25	1.92	13	1.00	17	1.30	20	1.53
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-
E50	意外墜落	69	5.21	83	6.34	74	5.70	83	6.37	88	6.71	101	7.71
E51	火及火焰所致之事故傷害	21	1.59	24	1.83	23	1.77	24	1.84	11	0.84	9	0.69
E52	其他事故傷害，包括後期影響	134	10.12	142	10.84	108	8.31	145	11.12	168	12.82	131	10.00
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表38・臺北市歷年男性事故傷害死亡原因(續1)

死因碼 ICD-9	死亡原因	單位：人，人/每十萬男性人口													
		90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
死因碼 ICD-9	死亡原因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率												
E47-E53		365	27.97	359	27.60	316	24.37	342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70
E47	運輸事故	146	11.19	161	12.38	137	10.57	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06
E48	意外中毒	14	1.07	20	1.54	19	1.47	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25
E49	內科醫療之事故 傷害，異常反應 及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	74	5.67	70	5.38	67	5.17	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16
E51	火及火焰所致之 事故傷害	8	0.61	10	0.77	13	1.00	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31
E52	其他事故傷害， 包括後期影響	123	9.43	98	7.53	80	6.17	110	8.53	68	5.30	71	5.54	63	4.92
E53	治療用之藥品， 藥物所致之不良 影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表38・臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率										
V01-X59, Y85-Y86		269	21.11	377	20.54	258	20.45	267	21.03	285	22.25	271	21.05
V01-V99	運輸事故傷害	104	8.16	110	8.69	113	8.96	97	7.64	108	8.43	102	7.92
W00-W19	跌倒(落)	66	5.18	55	4.35	64	5.07	67	5.28	72	5.62	66	5.13
W65-W74	意外溺死和淹沒	21	1.65	13	1.03	11	0.87	19	1.50	10	0.78	10	0.78
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	13	1.02	15	1.19	18	1.43	15	1.18	12	0.94	12	0.93
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	5	0.39	7	0.55	3	0.24	5	0.39	6	0.47	6	0.47
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	17	1.33	14	1.11	14	1.11	14	1.10	12	0.94	22	1.71
	其他	43	3.37	46	3.63	35	2.77	50	3.94	65	5.07	53	4.12

表38・臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年			
		死 人	亡 數	每 人 死 亡	萬 口 率
V01-X59, Y85-Y86			318		24.60
V01-V99	運輸事故傷害		99		7.66
W00-W19	跌倒(落)		86		6.65
W65-W74	意外溺死和淹沒		14		1.08
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅		14		1.08
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		5		0.39
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		27		2.09
	其他		73		5.65

表39・臺北市歷年女性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率										
E47-E53		217	16.44	212	16.19	192	14.74	198	15.05	221	16.62	173	12.96
E47	運輸事故	115	8.71	102	7.79	90	6.91	107	8.13	69	5.19	60	4.50
E48	意外中毒	7	0.53	10	0.76	8	0.61	8	0.61	7	0.53	8	0.60
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.15	1	0.07
E50	意外墜落	28	2.12	29	2.21	36	2.76	32	2.43	58	4.36	43	3.22
E51	火及火焰所致之事故傷害	9	0.68	16	1.22	12	0.92	11	0.84	10	0.75	11	0.82
E52	其他事故傷害，包括後期影響	57	4.32	55	4.20	45	3.45	40	3.04	75	5.64	50	3.75
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表39・臺北市歷年女性事故傷害死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女性 人 口 死 亡 率												
E47-E53		141	10.56	155	11.59	139	10.39	121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92
E47	運輸事故	49	3.67	88	6.58	52	3.89	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15
E48	意外中毒	10	0.75	7	0.52	7	0.52	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59
E49	內科醫療之事故 傷害，異常反應 及後期併發症	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	35	2.62	16	1.20	36	2.69	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55
E51	火及火焰所致之 事故傷害	5	0.37	2	0.15	6	0.45	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22
E52	其他事故傷害， 包括後期影響	42	3.15	41	3.07	38	2.84	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41
E53	治療用之藥品， 藥物所致之不良 影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表39・臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 人 數	每 十 萬 女性 人 口 死 亡 率										
V01-X59, Y85-Y86		120	8.88	377	8.67	101	7.47	135	9.89	145	10.50	135	9.70
V01-V99	運輸事故傷害	49	3.62	55	4.08	41	3.03	50	3.66	44	3.19	48	3.45
W00-W19	跌倒(落)	25	1.85	17	1.26	19	1.41	33	2.42	24	1.74	22	1.58
W65-W74	意外溺死和淹沒	5	0.37	4	0.30	5	0.37	8	0.59	4	0.29	5	0.36
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	0.44	9	0.67	8	0.59	11	0.81	12	0.87	9	0.65
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.07	-	-	3	0.22	-	-	10	0.72	3	0.22
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	8	0.59	12	0.89	6	0.44	2	0.15	7	0.51	6	0.43
	其他	26	1.92	20	1.48	19	1.41	31	2.27	44	3.19	42	3.02

表39・臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年			
		死 人	亡 數	每 人 死 亡	萬 口 率
V01-X59, Y85-Y86			140		9.99
V01-V99	運輸事故傷害		43		3.07
W00-W19	跌倒(落)		32		2.28
W65-W74	意外溺死和淹沒		2		0.14
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅		9		0.64
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		1		0.07
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		4		0.29
	其他		49		3.50

表40・臺北市歷年自殺死亡方式

死因碼 ICD-9	死亡方式	單位：人，人/每十萬人口																	
		84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 人	死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 人	死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 人	死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 人	死 人 數	每 人 死 亡 率	十 萬 口 人			
E54	自殺總計	206	7.79	224	8.55	214	8.22	201	7.67	212	8.03	237	8.96						
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	30	1.15	22	0.85	26	0.99	21	0.8	17	0.64						
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	1	0.04	1	0.04						
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	5	0.19	7	0.26						
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	109	4.12	125	4.77	141	5.42	89	3.40	103	3.90	134	5.07						
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	18	0.68	9	0.34	7	0.27	14	0.53	12	0.45	15	0.57						
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	3	0.11	1	0.04	2	0.08	-	-	-	-						
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	14	0.53	6	0.23	5	0.19	9	0.34	5	0.19						
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	1.51	32	1.22	28	1.08	54	2.06	47	1.78	46	1.74						
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	9	0.34	9	0.35	10	0.38	14	0.53	12	0.45						
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表40・臺北市歷年自殺死亡方式（續1）

死因碼 ICD-9	死亡方式	單位：人，人/每十萬人口																				
		90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		死 人 數	每 十 萬 口 人 數	死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 人 數	死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 人 數	死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 人 數	死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 人 數	死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 人 數	死 亡 率			
E54	自殺總計	290	10.98	325	12.32	320	12.15	346	13.18	467	17.83	454	17.30	364	13.84							
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	27	1.02	30	1.14	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80							
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	2	0.08	2	0.08	2	0.08	-	-	1	0.04	-	-	-	-							
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	25	0.95	82	3.11	56	2.13	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84							
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	122	4.62	116	4.40	113	4.29	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79							
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	26	0.98	21	0.80	22	0.84	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25							
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	2	0.08	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08							
E956	切穿工具自殺及自傷	7	0.27	6	0.23	4	0.15	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15							
E957	由高處跳下自殺及自傷	60	2.27	54	2.05	78	2.96	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66							
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	21	0.80	16	0.61	15	0.57	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27							
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

表40・臺北市歷年自殺死亡方式（續2）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102	
		死 人 數	每 十 萬 死 亡 率										
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	370	14.09	341	13.04	329	12.59	306	11.61	333	12.51	261	9.74
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	1	0.04	-	-	1	0.04	3	0.11	2	0.07
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	6	0.23	5	0.19	9	0.34	7	0.26	4	0.15
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	-	-	-	-	2	0.08	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	124	4.72	99	3.79	100	3.83	72	2.73	82	3.08	55	2.05
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	6	0.23	9	0.34	11	0.42	6	0.23	4	0.15
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	6	0.23	2	0.08	1	0.04	1	0.04	2	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	109	4.17	113	4.32	126	4.78	103	3.87	77	2.87
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	25	0.96	24	0.92	25	0.95	34	1.28	28	1.04
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	2	0.08	4	0.15
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	5	0.19	4	0.15	1	0.04	4	0.15	5	0.19
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	4	0.15	10	0.38	6	0.23	8	0.30	3	0.11
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	68	2.60	55	2.10	52	1.97	71	2.67	67	2.50
X81	利用跳入或躺在移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.11	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	3	0.11	4	0.15	1	0.04	2	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	6	0.23	1	0.04	-	-	4	0.15	6	0.22

表40・臺北市歷年自殺死亡方式（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103			
		死 人	亡 數 死	每 人 死	十 萬 口 率
X60-X84,Y87.0	自殺總計		311		11.54
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		7		0.26
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		-		-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		2		0.07
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-		-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-		-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		76		2.82
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露		7		0.26
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露		1		0.04
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害		104		3.86
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害		32		1.19
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害		2		0.07
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害		-		-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害		-		-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害		6		0.22
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害		70		2.60
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害		-		-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害		2		0.07
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害		-		-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害		2		0.07

表41・臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		死 人 數	亡 死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 率															
E54	自殺總計	123	9.29	155	11.83	125	9.62	125	9.59	143	10.91	143	10.92						
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	11	0.83	20	1.53	11	0.85	14	1.07	15	1.14	9	0.69						
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08						
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	-	-	5	0.38	6	0.46						
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	71	5.36	88	6.72	84	6.47	61	4.68	80	6.10	87	6.64						
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	8	0.60	5	0.38	6	0.46	10	0.77	7	0.53	8	0.61						
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	2	0.15	1	0.08	2	0.15	-	-	-	-						
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.15	10	0.76	5	0.38	4	0.31	8	0.61	3	0.23						
E957	由高處跳下自殺及自傷	24	1.81	21	1.60	12	0.92	27	2.07	19	1.45	24	1.83						
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	7	0.53	7	0.53	6	0.46	6	0.46	8	0.61	5	0.38						
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表41・臺北市歷年男性自殺死亡方式（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率												
E54	自殺總計	192	14.72	214	16.45	203	15.66	225	17.46	313	24.40	309	24.12	228	17.81
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	15	1.15	17	1.31	17	1.31	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	2	0.15	2	0.15	1	0.08	-	-	1	0.08	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	18	1.38	62	4.77	43	3.32	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	82	6.28	79	6.07	76	5.86	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	17	1.30	12	0.92	11	0.85	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	2	0.15	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	6	0.46	4	0.31	3	0.23	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16
E957	由高處跳下自殺及自傷	37	2.84	27	2.08	40	3.08	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	13	1.00	10	0.77	12	0.93	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表41・臺北市歷年男性自殺死亡方式（續2）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率										
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	231	18.13	234	18.49	212	16.81	188	14.81	207	16.16	166	12.89
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	2	0.16
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	3	0.24	2	0.16	6	0.47	3	0.23	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	6.36	72	5.69	70	5.55	43	3.39	59	4.61	40	3.11
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	3	0.24	7	0.55	8	0.63	5	0.39	3	0.23
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.32	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	81	6.40	80	6.34	83	6.54	62	4.84	56	4.35
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	19	1.50	13	1.03	17	1.34	21	1.64	17	1.32
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.16	4	0.31
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	4	0.32	1	0.08	1	0.08	2	0.16	5	0.39
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	2	0.16	7	0.55	3	0.24	5	0.39	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	37	2.92	26	2.06	25	1.97	40	3.12	32	2.49
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.16	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	3	0.24	-	-	1	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	5	0.40	1	0.08	-	-	2.00	0.16	4	0.31

表41・臺北市歷年男性自殺死亡方式（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103			
		死 人	亡 每 人 數 死	十 亡	萬 口 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計		181		14.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		1		0.08
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		-		-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		1		0.08
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-		-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-		-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	52			4.02
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7			0.54
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-			-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	67			5.18
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	14			1.08
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2			0.15
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-			-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-			-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	4			0.31
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	32			2.48
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-			-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1			0.08
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-			-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-			-

表42・臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率										
E54	自殺總計	83	6.29	69	5.27	89	6.83	76	5.78	69	5.19	94	7.04
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	14	1.06	10	0.76	11	0.84	12	0.91	6	0.45	8	0.60
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸氣自殺及自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	38	2.88	37	2.83	57	4.37	28	2.13	23	1.73	47	3.52
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	10	0.76	4	0.31	1	0.08	4	0.30	5	0.38	7	0.52
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	4	0.31	1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	11	0.84	16	1.23	27	2.05	28	2.11	22	1.65
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	2	0.15	2	0.15	3	0.23	4	0.30	6	0.45	7	0.52
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表42・臺北市歷年女性自殺死亡方式（續1）

死因碼 ICD-9	死亡方式	單位：人，人/每十萬女性人口													
		90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率												
E54	自殺總計	98	7.34	111	8.30	117	8.75	121	9.06	154	11.52	145	10.80	136	10.07
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	10	0.75	10	0.75	13	0.97	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	7	0.52	20	1.50	13	0.97	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	40	3.00	37	2.77	37	2.77	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	9	0.67	9	0.67	11	0.82	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.07	2	0.15	1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	23	1.72	27	2.02	38	2.84	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	8	0.60	6	0.45	3	0.22	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表42・臺北市歷年女性自殺死亡方式（續2）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率										
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28	107	7.93	117	8.66	118	8.64	126	9.12	95	6.82
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	3	0.22	3	0.22	3	0.22	4	0.29	4	0.29
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	43	3.18	27	2.00	30	2.22	29	2.12	23	1.67	15	1.08
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	3	0.22	2	0.15	3	0.22	1	0.07	1	0.07
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	2	0.15	1	0.07	-	-	-	-	1	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	28	2.07	33	2.44	43	3.15	41	2.97	21	1.51
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	6	0.44	11	0.81	8	0.59	13	0.94	11	0.79
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	3	0.22	-	-	2	0.14	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	2	0.15	3	0.22	3	0.22	3	0.22	3	0.22
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	31	2.30	29	2.15	27	1.98	31	2.24	35	2.51
X81	利用跳入或躺在移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	3	0.22	1	0.07	1	0.07	1	0.07	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-	2	0.14	2	0.14

表42・臺北市歷年女性自殺死亡方式（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103			
		死 人	亡 每 人 數 死	十 亡	萬 口 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計		130		9.27
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		6		0.43
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		-		-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		1		0.07
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-		-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-		-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		24		1.71
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-		-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露		1		0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害		37		2.64
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害		18		1.28
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害		-		-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害		-		-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害		-		-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害		2		0.14
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害		38		2.71
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害		-		-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害		1		0.07
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害		-		-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害		2		0.14

表43・臺北市歷年主要死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎徵候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
85年	457.75	474.91	128.52	130.61	52.84	55.12	51.96	53.52	24.21	25.00	12.68	13.77	14.05	14.78	29.48	29.19
86年	463.27	459.89	134.67	131.73	55.84	55.60	50.96	50.27	29.02	28.60	10.61	10.84	14.53	14.27	26.25	25.33
87年	465.98	445.91	133.21	125.92	50.82	48.32	49.75	47.19	24.70	23.24	12.60	12.10	15.77	15.04	26.42	25.48
88年	470.49	434.03	134.97	123.57	54.08	49.01	45.78	41.26	32.68	29.91	15.00	13.84	15.87	14.72	24.92	23.86
89年	484.10	428.95	141.38	125.80	47.35	41.22	52.20	45.46	37.97	32.88	11.95	10.32	17.29	15.08	22.66	21.42
90年	500.81	426.61	154.88	132.24	52.38	43.72	52.91	43.95	34.20	28.60	13.90	11.26	18.56	15.45	19.17	17.72
91年	503.41	410.73	158.05	129.89	54.97	43.43	46.74	37.24	33.70	26.67	16.98	12.98	17.29	13.45	19.49	17.86
92年	517.40	402.53	151.87	120.46	62.33	46.71	50.29	37.85	35.91	27.21	21.52	15.83	19.09	14.36	17.27	15.35
93年	523.20	392.14	160.09	122.12	65.99	46.85	47.24	33.77	34.02	24.96	17.03	11.49	19.16	13.77	17.64	15.78
94年	547.41	392.62	163.78	120.21	63.56	42.87	52.19	35.74	37.72	26.19	21.84	13.82	20.77	13.94	15.84	14.03
95年	528.71	364.83	168.54	118.90	58.19	38.38	45.04	29.23	36.05	23.79	21.91	13.32	18.48	12.19	14.44	12.68
96年	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		慢性下呼吸道疾病		腎炎、腎病徵候群及腎病變	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	45.66	27.26	36.18	20.14	27.26	16.89	16.98	9.27	18.70	11.20
98年	568.60	347.27	174.48	111.24	67.61	39.98	43.13	24.61	32.12	16.59	31.55	18.86	18.97	9.85	17.25	9.72
99年	575.83	338.78	177.26	110.14	65.94	36.69	40.07	21.91	34.40	16.89	29.43	16.78	17.79	8.87	18.14	10.07
100年	600.94	343.47	179.59	109.78	72.30	38.51	43.15	23.13	35.75	16.96	29.41	16.39	22.09	10.48	17.00	8.89
101年	615.94	344.34	187.11	111.52	76.18	40.21	44.55	22.94	34.00	15.54	30.69	16.63	22.20	10.31	19.95	10.62
102年	600.78	326.27	183.55	106.98	77.43	39.81	45.15	22.34	32.95	14.46	32.09	16.84	21.38	9.73	18.21	9.13
103年	629.19	332.49	181.97	103.66	92.38	46.23	44.98	22.40	39.34	17.10	31.70	16.16	24.38	10.28	20.64	9.89

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表43・臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
85年	8.55	8.14	14.01	13.91	5.04	5.31	12.52	13.16	6.99	7.33	3.32	3.52	4.09	4.18	3.51	4.84
86年	8.22	7.65	13.41	12.87	4.96	4.93	10.99	10.90	6.99	6.88	2.42	2.46	6.92	6.88	4.07	5.46
87年	7.67	7.20	14.85	13.92	4.43	4.39	10.73	10.24	7.64	7.07	2.25	2.18	4.66	4.42	2.71	3.58
88年	8.03	7.12	15.30	14.31	2.65	2.45	9.47	8.60	5.91	5.32	3.07	2.73	3.75	3.34	3.11	4.40
89年	8.96	7.94	14.11	12.45	3.21	2.76	7.22	6.23	5.37	4.62	4.20	3.55	4.20	3.61	3.06	4.20
90年	10.98	9.70	13.83	11.89	4.39	3.57	6.33	5.24	5.64	4.72	2.84	2.28	3.37	2.80	2.54	3.64
91年	12.32	10.72	11.56	9.55	4.13	3.22	6.79	5.21	4.66	3.66	2.31	1.80	3.11	2.33	2.43	3.59
92年	12.15	10.29	13.93	11.22	3.53	2.56	5.39	3.98	4.37	3.21	2.43	1.79	3.72	2.74	1.56	2.41
93年	13.18	10.93	12.69	9.96	3.58	2.52	6.36	4.43	4.31	2.92	2.67	1.89	2.82	2.01	1.83	3.32
94年	17.83	14.79	12.33	9.20	5.73	3.78	6.18	4.14	4.16	2.79	2.94	2.06	2.29	1.62	1.49	2.66
95年	17.30	14.12	12.08	8.86	5.53	3.48	6.71	4.30	3.51	2.26	3.01	1.89	2.59	1.63	1.60	2.92
96年	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年別	高血壓性疾病		事故傷害		敗血症		蓄意自我傷害(自殺)		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		慢性肝病及肝硬化		血管性及未明示之癥狀		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	14.24	8.21	14.81	11.94	19.53	11.27	14.09	11.40	10.70	5.87	11.27	7.69	2.63	1.29	3.54	1.88
98年	14.72	8.17	14.42	11.20	16.86	9.44	13.04	10.39	13.00	6.39	13.35	8.79	4.28	2.06	3.52	1.89
99年	16.15	8.49	13.74	10.71	17.18	9.25	12.59	9.67	14.54	6.79	12.17	7.90	4.44	2.00	4.25	2.10
100年	16.93	8.47	15.26	10.92	21.48	10.81	11.61	8.98	8.24	4.45	11.96	7.65	5.16	2.18	4.59	2.33
101年	20.13	9.74	16.15	11.31	21.00	10.47	12.51	9.82	6.27	3.41	10.74	6.77	4.85	1.94	5.94	2.92
102年	18.40	8.66	15.15	10.47	17.39	8.18	9.74	7.40	7.13	3.62	11.57	6.99	5.30	2.11	5.78	2.71
103年	17.11	7.55	17.00	11.23	16.52	7.62	11.54	9.06	11.47	5.02	10.54	6.29	7.35	2.78	5.01	2.23

表44・臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎徵候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
85年	568.85	558.35	161.70	155.99	68.10	66.65	62.76	60.47	23.59	23.04	17.25	17.64	14.81	14.80	42.75	41.78
86年	565.92	534.47	164.36	153.91	70.06	65.79	61.43	57.33	30.02	27.73	14.55	13.94	17.24	15.80	37.80	35.96
87年	578.81	528.10	165.22	148.86	62.67	56.32	60.06	53.70	24.78	22.12	17.72	16.10	17.80	16.00	37.89	36.44
88年	579.35	510.34	170.53	149.76	68.29	58.54	53.33	45.15	31.66	27.51	20.52	17.75	16.25	14.54	33.34	31.57
89年	598.84	508.07	179.93	153.80	62.93	52.48	61.48	51.02	38.64	31.91	14.66	11.83	18.48	15.35	32.53	30.28
90年	617.44	506.38	196.59	160.95	69.44	56.05	62.85	49.69	34.49	27.60	17.86	13.72	19.70	15.75	27.97	25.64
91年	615.07	486.19	193.72	154.72	68.88	53.03	56.43	43.79	35.67	27.07	24.14	17.44	18.91	14.60	27.60	25.21
92年	633.43	478.70	187.41	144.63	76.82	55.94	63.09	46.02	35.71	26.53	28.46	19.91	20.13	14.57	24.37	21.59
93年	647.93	474.26	201.24	149.63	85.88	59.64	56.24	39.19	34.13	24.46	23.27	14.96	21.57	14.97	26.53	23.74
94年	683.06	480.28	205.00	148.15	82.62	54.25	64.07	43.39	40.61	27.75	28.84	17.20	25.26	16.55	24.32	21.46
95年	654.67	445.74	210.37	146.09	75.79	49.62	53.08	34.17	36.92	24.11	29.12	17.22	20.37	13.06	21.93	19.32
96年	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		慢性下呼吸道疾病		糖尿病		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	53.13	32.56	48.58	26.32	26.45	13.76	27.62	17.36	21.11	17.19
98年	693.85	425.20	211.03	134.11	86.99	52.89	51.12	29.05	41.72	21.04	29.79	15.11	33.42	20.41	20.54	16.29
99年	704.08	421.30	219.66	137.29	82.36	47.58	47.72	26.99	43.44	21.00	26.56	12.91	30.44	17.70	20.45	16.18
100年	737.25	426.54	216.55	132.95	90.98	50.79	54.91	29.93	47.66	22.21	35.05	16.00	30.96	18.33	21.03	15.84
101年	751.69	429.77	229.30	138.02	97.28	54.52	53.01	28.56	43.96	20.08	33.57	15.24	32.32	18.20	22.25	16.23
102年	732.81	409.56	221.64	130.87	97.23	53.17	54.28	28.22	44.65	19.94	33.47	15.30	33.24	18.44	21.05	15.04
103年	766.40	422.76	218.44	127.74	114.48	61.76	55.85	29.48	49.35	22.19	36.82	15.91	33.49	18.27	24.60	16.98

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表44・臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
85年	11.83	11.21	19.32	18.61	5.95	5.88	14.51	13.75	8.40	8.04	4.81	4.78	6.11	5.87	4.12	5.30
86年	9.62	8.91	19.02	17.91	5.70	5.31	12.16	11.49	9.16	8.45	3.00	2.81	10.85	10.11	4.62	6.03
87年	9.59	9.06	21.25	19.75	4.91	4.58	12.20	11.07	10.20	8.76	2.84	2.69	7.06	6.37	2.84	3.57
88年	10.91	9.73	23.35	21.96	2.90	4.77	10.91	9.57	7.17	5.78	4.12	3.40	5.95	4.84	2.82	3.87
89年	10.92	9.42	19.32	16.79	3.13	2.44	8.94	7.24	7.56	6.10	5.80	4.57	6.57	5.39	3.59	4.74
90年	14.72	13.27	18.32	15.79	4.52	3.58	6.74	5.51	7.28	5.95	3.83	2.94	5.82	4.56	2.53	3.42
91年	16.45	13.99	16.07	13.27	4.07	2.97	7.61	5.58	5.77	4.35	2.69	2.07	5.15	3.60	2.61	3.72
92年	15.66	13.42	19.20	15.43	4.70	3.22	5.40	4.00	5.24	3.69	3.24	2.24	5.78	4.09	1.77	2.62
93年	17.46	14.81	17.22	13.87	4.19	2.83	6.36	4.29	5.66	3.64	3.34	2.25	4.58	3.14	1.94	3.25
94年	24.40	20.52	14.97	11.51	5.69	3.62	8.26	5.49	5.53	3.57	4.05	2.78	3.90	2.70	1.33	2.20
95年	24.12	20.00	16.39	12.38	5.70	3.34	7.34	4.78	4.53	2.83	3.36	2.06	4.14	2.46	1.25	2.40
96年	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年別	腎炎、腎病徵候群及腎病變		敗血症		高血壓性疾病		慢性肝病及肝硬化		蓄意自我傷害(自殺)		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		帕金森病		血管性及未明示之癡呆症	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	18.83	11.24	20.64	11.78	16.01	9.43	15.46	10.94	18.13	15.00	10.36	5.63	4.39	2.24	2.43	1.15
98年	19.67	10.79	18.41	10.28	16.28	9.25	18.33	12.76	18.49	14.83	11.22	5.05	4.90	2.56	3.48	1.58
99年	18.55	10.57	18.23	9.72	18.31	9.74	15.70	10.91	16.81	13.01	13.48	6.09	5.07	2.28	4.36	1.97
100年	18.59	9.68	26.55	13.53	18.12	9.32	16.62	11.40	14.81	11.63	6.46	3.30	5.51	2.83	4.96	2.10
101年	19.91	11.13	24.05	11.78	21.39	10.76	14.60	9.70	16.16	12.59	5.70	2.96	7.50	3.72	5.00	2.00
102年	18.79	9.69	21.28	10.03	19.80	9.82	15.38	10.12	12.89	9.96	6.83	3.32	7.30	3.49	4.89	1.88
103年	21.97	10.97	20.81	10.00	18.64	8.72	14.54	9.34	14.00	10.85	11.45	5.05	7.04	3.16	6.50	2.52

表45・臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎微候群及腎性病變		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
85年	346.60	384.85	95.32	102.11	37.58	42.33	41.17	46.07	24.82	27.76	13.29	14.93	8.10	9.40	5.27	5.03
86年	360.94	381.88	105.07	108.40	41.67	44.63	40.52	43.01	28.01	29.90	11.82	12.55	6.68	7.30	6.83	6.47
87年	354.16	359.17	101.48	100.73	39.07	39.75	39.53	40.17	24.63	25.10	13.76	13.97	7.53	7.74	5.78	5.41
88年	363.23	354.77	99.92	95.83	40.07	38.68	38.35	37.28	33.68	32.98	15.49	15.09	9.55	9.41	5.19	4.62
89年	371.52	347.71	103.56	96.02	32.07	29.71	43.09	39.97	37.32	34.73	16.11	14.98	9.29	8.60	7.04	6.37
90年	386.85	346.12	114.12	101.60	35.72	31.32	43.21	38.11	33.92	30.31	17.45	15.28	10.03	8.53	7.34	6.33
91年	394.76	336.33	123.33	105.00	41.44	34.13	37.32	30.92	31.79	26.66	15.71	13.06	10.02	8.19	8.30	7.14
92年	404.96	328.28	117.42	96.19	48.28	37.79	37.90	29.85	36.10	28.60	18.09	14.30	14.80	11.55	8.75	7.39
93年	402.84	312.67	120.38	94.63	46.79	34.35	38.55	28.72	33.91	26.02	16.84	12.63	11.00	7.84	9.06	8.26
94年	417.20	309.11	124.20	93.11	45.27	31.66	40.78	28.68	34.94	25.11	16.46	11.53	15.11	10.25	11.52	9.63
95年	408.57	288.49	128.65	92.46	41.39	27.76	37.37	24.78	35.21	23.87	16.68	11.39	15.04	9.47	10.80	8.87
96年	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		腎炎、腎病徵候群及腎病變		高血壓性疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	38.61	22.90	24.49	14.14	26.93	16.79	18.57	11.35	12.58	7.27
98年	451.14	276.88	140.20	90.07	49.43	28.58	35.64	20.63	23.12	12.35	29.79	17.72	14.97	8.70	13.26	7.33
99年	456.13	265.58	137.69	85.62	50.61	27.23	32.92	17.61	25.97	12.95	28.48	16.12	17.76	9.80	14.13	7.43
100年	474.21	270.05	145.23	89.19	54.93	27.89	32.22	17.12	24.68	12.06	27.98	14.97	15.53	8.19	15.82	7.81
101年	490.07	269.77	147.98	88.40	56.62	28.04	36.71	18.18	24.76	11.42	29.18	15.39	19.98	10.28	18.97	8.90
102年	478.66	253.90	148.32	86.24	59.11	28.39	36.70	17.36	22.12	9.54	31.03	15.60	17.67	8.67	17.10	7.74
103年	502.63	254.34	148.33	83.12	71.99	33.14	34.96	16.33	30.11	12.67	30.04	14.40	19.41	9.01	15.70	6.59

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表45・臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
85年	8.71	9.53	16.19	16.85	4.12	4.65	10.54	12.06	5.58	6.32	1.83	2.11	2.90	4.36	0.46	0.50
86年	7.83	8.20	14.74	14.94	4.22	4.57	9.82	10.47	4.84	5.11	1.84	2.02	3.53	4.85	0.69	0.79
87年	8.51	8.65	15.05	14.87	3.95	4.06	9.27	9.49	5.09	5.10	1.67	1.71	2.58	3.61	0.53	0.56
88年	7.37	7.15	16.62	16.43	2.41	2.42	8.05	7.76	4.66	4.58	2.03	1.95	3.38	4.95	0.45	0.45
89年	8.99	8.51	12.96	12.93	3.30	3.02	5.55	5.14	3.22	2.95	2.62	2.40	2.55	3.64	1.27	1.13
90年	9.44	8.56	10.56	10.05	4.27	3.70	5.92	5.13	4.04	3.49	1.87	1.60	2.55	3.86	0.97	0.86
91年	7.18	6.18	11.59	11.02	4.19	3.46	5.98	4.82	3.59	2.95	1.94	1.56	2.24	3.45	0.67	0.58
92年	8.82	7.44	10.39	9.44	2.39	1.84	5.38	4.13	3.51	2.70	1.64	1.31	1.35	2.20	1.05	0.84
93年	8.31	6.60	9.06	7.40	2.99	2.15	6.36	4.65	2.99	2.20	2.02	1.51	1.72	3.40	1.27	0.99
94年	9.80	7.32	7.71	7.05	5.76	4.00	4.19	2.87	2.84	1.97	1.87	1.36	1.65	3.15	0.97	0.76
95年	7.97	5.79	7.30	6.30	5.36	3.59	6.10	3.95	2.53	1.69	2.68	1.74	1.94	3.45	1.56	1.06
96年	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年別	慢性下呼吸道疾病		敗血症		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		事故傷害		蓄意自我傷害(自殺)		血管性及未明示之癱瘓症		慢性肝病及肝硬化		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	8.06	4.57	18.49	10.99	11.02	6.25	8.88	6.98	10.28	8.19	2.81	1.48	7.32	4.87	5.18	3.35
98年	8.82	4.61	15.41	8.77	14.67	7.76	8.67	6.49	7.93	6.48	5.04	2.57	8.67	5.38	4.00	2.43
99年	9.62	4.94	16.20	8.98	15.54	7.61	7.47	5.74	8.66	6.70	4.51	2.11	8.88	5.36	3.33	1.80
100年	10.03	5.06	16.77	8.39	9.89	5.54	9.89	6.49	8.64	6.65	5.35	2.32	7.62	4.44	3.88	2.16
101年	11.66	5.67	18.17	9.22	6.81	3.86	10.50	6.82	9.12	7.31	4.71	1.91	7.17	4.18	4.42	2.40
102年	10.20	4.64	13.79	6.53	7.40	3.88	9.70	6.34	6.82	5.17	5.67	2.33	8.04	4.28	4.09	2.04
103年	12.91	5.21	12.56	5.61	11.49	5.03	9.99	6.00	9.27	7.58	8.13	3.08	6.85	3.62	3.57	1.80

表46・臺北市歷年主要癌症死亡原因

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																							
		84年			85年			86年			87年			88年			89年								
順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率								
08-14	所有癌症死亡原因	3,180		120.31		3,366		128.52		3,504		134.67		3,489		133.21		3,564		134.97		3,738		141.38	
162	肺癌	1	615	23.27	1	645	24.63	1	718	27.59	1	729	27.83	1	750	28.40	1	751	28.41						
155	肝癌	2	570	21.56	2	581	22.18	2	606	23.29	2	588	22.45	2	564	21.36	2	562	21.26						
153 154	結腸直腸癌	3	329	12.45	3	386	14.74	3	366	14.07	3	398	15.20	3	417	15.79	3	462	17.47						
174	女性乳癌(1)	5	135	10.23	5	153	11.69	4	182	13.97	5	164	12.47	4	162	12.18	4	169	12.66						
151	胃癌	4	328	12.41	4	356	13.59	5	346	13.30	4	327	12.48	5	317	12.00	5	328	12.41						
185	攝護腺癌(2)	7	51	3.85	7	68	5.19	8	65	5.00	8	66	5.06	7	91	6.94	7	93	7.10						
200,202,203	非何杰金淋巴癌	10	92	3.48	8	133	5.08	7	133	5.11	7	136	5.19	8	143	5.42	9	136	5.14						
157	胰臟癌	9	97	3.67	9	111	4.24	10	109	4.19	9	112	4.28	9	122	4.62	8	138	5.22						
179 180	子宮頸癌(1)	6	108	8.18	6	102	7.79	6	128	9.82	6	102	7.75	6	113	8.50	6	97	7.27						
156	膽囊癌	15	64	2.42	14	81	3.09	16	71	2.73	11	93	3.55	12	94	3.56	12	104	3.93						
183	卵巢癌(1)	11	44	3.33	12	44	3.36	15	36	2.76	14	42	3.19	13	41	3.08	14	42	3.15						
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	78	2.95	13	88	3.36	9	113	4.34	15	79	3.02	10	98	3.71	10	113	4.27						
150	食道癌	14	75	2.84	14	81	3.09	11	102	3.92	12	88	3.36	11	97	3.67	11	108	4.08						
204-208	白血病	8	100	3.78	11	89	3.40	12	94	3.61	10	99	3.78	14	76	2.88	13	99	3.74						
188	膀胱癌	17	57	2.16	17	55	2.10	17	56	2.15	16	66	2.52	16	66	2.50	15	83	3.14						
	其他		437	16.53		393	15.01		379	14.57		400	15.27		413	15.64		453	17.13						

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表46・臺北市歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因	4,089	154.88		4,169	158.05		4,001	151.87		4,202	160.09		4,290	163.78		4,423	168.54		4,566	173.56		
162	肺癌	1	883	33.45	1	889	33.70	1	847	32.15	1	880	33.53	1	870	33.21	1	910	34.68	1	987	37.52	
155	肝癌	2	671	25.42	2	661	25.06	2	664	25.20	2	677	25.79	2	607	23.17	2	702	26.75	2	666	25.32	
153,154	結腸直腸癌	3	444	16.82	3	490	18.58	3	436	16.55	3	518	19.73	3	542	20.69	3	532	20.27	3	557	21.17	
174	女性乳癌(1)	4	199	14.90	4	192	14.36	4	208	15.55	4	203	15.20	4	224	16.76	4	209	15.56	4	203	15.03	
151	胃癌	5	349	13.22	5	374	14.18	5	294	11.16	5	311	11.85	5	354	13.51	5	363	13.83	5	329	12.51	
185	攝護腺癌(2)	6	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	6	122	9.46	6	133	10.37	6	129	10.07	6	136	10.62	
200,202,203	非何杰金淋巴癌	8	130	4.92	8	172	6.52	8	166	6.30	9	148	5.64	7	181	6.91	8	175	6.67	7	217	8.25	
157	胰臟癌	9	124	4.70	9	157	5.95	9	146	5.54	8	164	6.25	9	168	6.41	7	178	6.78	8	178	6.77	
179,180	子宮頸癌(1)	7	110	8.24	7	105	7.85	7	85	6.35	7	87	6.51	8	86	6.43	10	81	6.03	9	89	6.59	
156	膽囊癌	12	106	4.01	11	119	4.51	13	101	3.83	11	125	4.76	12	120	4.58	12	116	4.42	10	149	5.66	
183	卵巢癌(1)	11	56	4.19	12	53	3.96	14	49	3.66	12	58	4.34	14	50	3.74	11	73	5.43	11	74	5.48	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	113	4.28	14	92	3.49	10	125	4.74	10	138	5.26	10	146	5.57	9	166	6.33	12	134	5.09	
150	食道癌	13	103	3.90	10	123	4.66	12	104	3.95	14	106	4.04	11	126	4.81	14	97	3.70	13	126	4.79	
204-208	白血病	14	97	3.67	13	94	3.56	11	109	4.14	13	108	4.11	13	100	3.82	13	98	3.73	14	107	4.07	
188	膀胱癌	16	76	2.88	17	60	2.27	16	56	2.13	15	92	3.51	16	66	2.52	16	82	3.12	15	91	3.46	
	其他		508	19.24		482	18.27		504	19.13		465	17.72		517	19.74		512	19.51		523	19.88	

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表46・臺北市歷年主要癌症死亡原因（續2）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	4,467	170.10	4,563	174.48	4,632	177.26	4,732	179.59	4,981	187.11	4,919	183.55						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34	1	967	36.98	1	990	37.89	1	1,014	38.48	1	1,018	38.24	1	988	36.87
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59	3	592	22.64	3	570	21.81	3	609	23.11	3	648	24.34	3	631	23.55
C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69	2	665	25.43	2	644	24.65	2	672	25.50	2	697	26.18	2	700	26.12
C50	女性乳房癌(1)	4	228	16.87	4	236	17.49	4	266	19.68	4	283	20.73	4	243	17.59	4	264	18.96
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	124	9.73	6	142	11.22	6	144	11.41	6	132	10.40	5	176	13.74	5	155	12.04
C16	胃癌	5	312	11.88	5	319	12.20	5	307	11.75	5	285	10.82	6	329	12.36	6	315	11.75
C25	胰臟癌	7	192	7.31	7	237	9.06	7	211	8.07	7	231	8.77	7	232	8.71	7	231	8.62
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	131	4.99	8	148	5.66	9	151	5.78	8	153	5.81	9	169	6.35	8	203	7.57
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	13	58	4.29	11	65	4.82	12	66	4.88	11	65	4.76	8	88	6.37	9	85	6.11
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	131	4.99	12	119	4.55	8	152	5.82	9	149	5.65	10	147	5.52	10	154	5.75
C15	食道癌	12	120	4.57	10	129	4.93	11	137	5.24	12	115	4.36	11	133	5.00	12	121	4.52
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	75	5.55	9	69	5.11	10	71	5.25	10	74	5.42	12	63	4.56	11	80	5.75
C91-C95	白血病	11	121	4.61	13	106	4.05	13	107	4.09	13	112	4.25	13	110	4.13	13	113	4.22
C67	膀胱癌	15	80	3.05	14	80	3.06	14	95	3.64	14	78	2.96	14	85	3.19	14	84	3.13
C11	鼻咽癌	14	84	3.20	16	70	2.68	16	67	2.56	19	65	2.47	17	70	2.63	17	69	2.57
	其他		615	23.42		619	23.67		654	25.03		695	26.38		773	29.04		726	27.09

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表46・臺北市歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順位	死 人	亡 數	每 人 死 亡	十 萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因			4,903		181.97
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		992		36.82
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		666		24.72
C22	肝和肝內膽管癌	2		666		24.72
C50	女性乳房癌(1)	4		289		20.62
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5		151		11.68
C16	胃癌	6		312		11.58
C25	胰臟癌	7		257		9.54
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8		174		6.46
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	9		84		5.99
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10		155		5.75
C15	食道癌	11		135		5.01
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	12		58		4.14
C91-C95	白血病	13		98		3.64
C67	膀胱癌	14		93		3.45
C11	鼻咽癌	15		76		2.82
	其他			697		25.87

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表47・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		1,977	149.38		2,118	161.70		2,135	164.36		2,154	165.22		2,235	170.53		2,356	179.93
162	肺癌	2	414	31.28	1	448	34.20	1	471	36.26	1	482	36.97	1	542	41.35	1	514	39.26
155	肝癌	1	436	32.94	2	445	33.97	2	458	35.26	2	460	35.28	2	430	32.81	2	432	32.99
153 154	結腸直腸癌	4	191	14.43	4	236	18.02	4	226	17.40	4	220	16.87	3	240	18.31	3	264	20.16
151	胃癌	3	212	16.02	3	255	19.47	3	228	17.55	3	228	17.49	4	203	15.49	4	218	16.65
185	攝護腺癌	11	51	3.85	8	68	5.19	8	65	5.00	9	66	5.06	5	91	6.94	7	93	7.10
200,202,203	非何杰金淋巴癌	6	66	4.99	5	80	6.11	7	79	6.08	6	74	5.68	6	86	6.56	8	91	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	73	5.52	6	77	5.88	5	101	7.78	6	74	5.68	7	82	6.26	6	94	7.18
150	食道癌	8	64	4.84	7	69	5.27	6	90	6.93	5	79	6.06	7	82	6.26	5	100	7.64
157	胰臟癌	9	63	4.76	10	63	4.81	10	58	4.47	8	72	5.52	9	73	5.57	9	84	6.42
156	膽囊癌	16	27	2.04	12	40	3.05	14	34	2.62	12	56	4.30	11	52	3.97	11	55	4.20
204-208	白血病	7	65	4.91	11	55	4.20	11	53	4.08	10	64	4.91	12	49	3.74	10	68	5.19
188	膀胱癌	12	42	3.17	12	40	3.05	12	41	3.16	13	51	3.91	13	48	3.66	12	54	4.12
147	鼻咽癌	9	63	4.76	9	67	5.12	9	64	4.93	11	57	4.37	10	54	4.12	13	51	3.89
191	腦癌	14	29	2.19	14	37	2.82	12	41	3.16	15	33	2.53	15	27	2.06	15	26	1.99
161	喉癌	15	28	2.12	16	17	1.30	17	12	0.92	16	21	1.61	16	25	1.91	16	24	1.83
	其他		153	11.56		121	9.24		114	8.78		117	8.97		151	11.52		188	14.36

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表47・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續1）

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬男性人口																				
		90年				91年				92年				93年				94年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因	2,565	196.59	2,520	193.72	2,430	187.41	2,594	201.24	2,630	205.00	2,695	210.37	2,757	215.37							
162	肺癌	1	619	47.44	1	588	45.20	1	572	44.12	1	599	46.47	1	562	43.81	1	608	47.46	1	635	49.60
155	肝癌	2	491	37.63	2	492	37.82	2	477	36.79	2	495	38.40	2	445	34.69	2	518	40.43	2	488	38.12
153 154	結腸直腸癌	3	261	20.00	3	285	21.91	3	246	18.97	3	306	23.74	3	306	23.85	3	316	24.67	3	308	24.06
151	胃癌	4	244	18.70	4	231	17.76	4	185	14.27	4	198	15.36	4	236	18.40	4	240	18.73	4	214	16.72
185	攝護腺癌	5	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	5	122	9.46	5	133	10.37	6	129	10.07	5	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴癌	8	90	6.90	7	97	7.46	8	92	7.10	7	91	7.06	8	115	8.96	7	112	8.74	6	129	10.08
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	6	96	7.36	9	82	6.30	5	111	8.56	5	122	9.46	6	133	10.37	5	147	11.47	7	117	9.14
150	食道癌	7	92	7.05	5	116	8.92	7	96	7.40	7	91	7.06	7	116	9.04	9	87	6.79	8	107	8.36
157	胰臟癌	9	71	5.44	8	96	7.38	9	86	6.63	9	89	6.90	9	103	8.03	8	96	7.49	9	91	7.11
156	膽囊癌	13	52	3.99	10	61	4.69	12	52	4.01	11	65	5.04	10	70	5.46	11	60	4.68	10	89	6.95
204-208	白血病	10	62	4.75	12	48	3.69	10	66	5.09	10	68	5.28	11	59	4.60	12	54	4.22	11	68	5.31
188	膀胱癌	11	61	4.68	13	46	3.54	13	41	3.16	12	62	4.81	13	45	3.51	13	50	3.90	12	65	5.08
147	鼻咽癌	11	61	4.68	11	52	4.00	11	54	4.16	13	55	4.27	12	59	4.60	10	65	5.07	13	63	4.92
191	腦癌	16	28	2.15	15	28	2.15	16	21	1.62	15	26	2.02	14	32	2.49	14	33	2.58	14	26	2.03
161	喉癌	15	36	2.76	16	17	1.31	14	33	2.55	16	18	1.40	15	20	1.56	16	20	1.56	15	19	1.48
	其他		181	13.87		175	13.45		191	14.73		187	14.51		196	15.28		160	12.49		202	15.78

表47・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				98年				99年				100年				101年				102年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73		2,671	211.03		2,771	219.66		2,749	216.55		2,937	229.30		2,854	221.64							
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54	1	596	47.09	1	617	48.91	1	639	50.34	1	633	49.42	1	610	47.37							
C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30	2	449	35.47	2	443	35.12	2	474	37.34	2	475	37.08	2	485	37.67							
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13	3	311	24.57	3	331	26.24	3	325	25.60	3	371	28.97	3	358	27.80							
C16	胃癌	4	218	17.11	4	203	16.04	4	197	15.62	4	191	15.05	4	203	15.85	4	189	14.68							
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02	7	136	10.75	6	139	11.02	5	132	10.40	6	146	11.40	5	175	13.59							
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73	5	142	11.22	5	144	11.41	5	132	10.40	5	176	13.74	6	155	12.04							
C25	胰臟癌	7	114	8.95	6	137	10.82	7	126	9.99	7	111	8.74	8	123	9.60	7	123	9.55							
C15	食道癌	8	107	8.40	8	109	8.61	8	115	9.12	8	104	8.19	7	127	9.92	8	110	8.54							
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96	9	77	6.08	9	102	8.09	9	94	7.40	9	86	6.71	9	80	6.21							
C67	膀胱癌	12	57	4.47	11	56	4.42	11	63	4.99	11	53	4.18	12	55	4.29	11	57	4.43							
C11	鼻咽癌	11	61	4.79	12	49	3.87	12	56	4.44	13	42	3.31	11	56	4.37	12	56	4.35							
C91-C95	白血病	9	76	5.96	10	64	5.06	10	65	5.15	10	63	4.96	10	71	5.54	10	70	5.44							
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43	13	38	3.00	15	30	2.38	15	32	2.52	14	40	3.12	15	28	2.17							
C64	腎臟癌	14	26	2.04	13	38	3.00	14	39	3.09	12	48	3.78	15	37	2.89	14	39	3.03							
C71	腦癌	14	26	2.04	15	35	2.77	13	41	3.25	13	42	3.31	13	44	3.44	13	46	3.57							
	其他		253	19.85		231	18.25		263	20.85		267	21.03		294	22.95		273	21.20							

表47・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
C00-C97	所有癌症死亡原因			2,824		218.44
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		588		45.48
C22	肝和肝內膽管癌	2		447		34.58
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3		364		28.16
C16	胃癌	4		199		15.39
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5		152		11.76
C61	前列腺(攝護腺)癌	6		151		11.68
C25	胰臟癌	7		133		10.29
C15	食道癌	8		124		9.59
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9		92		7.12
C67	膀胱癌	10		66		5.11
C11	鼻咽癌	11		62		4.80
C91-C95	白血病	12		55		4.25
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13		45		3.48
C64	腎臟癌	14		32		2.48
C71	腦癌	15		30		2.32
	其他			284		21.97

表48・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬女性人口															
		84年			85年			86年			87年			88年			89年
順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因	1,203	91.16	1,248	95.32	1,369	105.07	1,335	101.48	1,329	99.92	1,382	103.56				
162	肺癌	1 201	15.23	1 197	15.05	1 247	18.96	1 247	18.78	1 208	15.64	1 237	17.76				
153 154	結腸直腸癌	2 138	10.46	3 150	11.46	4 140	10.74	2 178	13.53	2 177	13.31	2 198	14.84				
174	女性乳癌	3 135	10.23	2 153	11.69	2 182	13.97	3 164	12.47	3 162	12.18	3 169	12.66				
155	肝癌	4 134	10.15	4 136	10.39	3 148	11.36	4 128	9.73	4 134	10.08	4 130	9.74				
151	胃癌	5 116	8.79	6 101	7.71	6 118	9.06	6 99	7.53	5 114	8.57	5 110	8.24				
179 180	子宮頸癌	6 108	8.18	5 102	7.79	5 128	9.82	5 102	7.75	6 113	8.50	6 97	7.27				
200,202,203	非何杰金淋巴癌	11 26	1.97	7 53	4.05	7 54	4.14	7 62	4.71	7 57	4.29	9 45	3.37				
157	胰臟癌	10 34	2.58	8 48	3.67	8 51	3.91	9 40	3.04	8 49	3.68	7 54	4.05				
183	卵巢癌	7 44	3.33	9 44	3.36	11 36	2.76	8 42	3.19	10 41	3.08	10 42	3.15				
156	膽囊癌	8 37	2.80	10 41	3.13	10 37	2.84	10 37	2.81	9 42	3.16	8 49	3.67				
204-208	白血病	9 35	2.65	11 34	2.60	9 41	3.15	11 35	2.66	11 27	2.03	11 31	2.32				
182	子宮體癌	19 8	0.61	18 7	0.53	- -	-	25 1	0.08	12 20	1.50	15 17	1.27				
188	膀胱癌	15 15	1.14	15 15	1.15	15 15	1.15	15 15	1.14	13 18	1.35	12 29	2.17				
191	腦癌	12 23	1.74	12 23	1.76	12 31	2.38	12 27	2.05	17 12	0.90	16 15	1.12				
150	食道癌	16 11	0.83	16 12	0.92	16 12	0.92	18 9	0.68	16 15	1.13	18 8	0.60				
	其他	138	10.46	132	10.08	129	9.90	149	11.33	140	10.53	151	11.31				

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表48・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		1,524	114.12		1,649	123.33		1,571	117.42		1,608	120.38		1,660	124.20		1,728	128.65		1,809	133.94
162	肺癌	1	264	19.77	1	301	22.51	1	275	20.55	1	281	21.04	1	308	23.05	1	302	22.48	1	352	26.06
153 154	結腸直腸癌	3	183	13.70	2	205	15.33	3	190	14.20	2	212	15.87	2	236	17.66	2	216	16.08	2	249	18.44
174	女性乳癌	2	199	14.90	3	192	14.36	2	208	15.55	3	203	15.20	3	224	16.76	3	209	15.56	3	203	15.03
155	肝癌	4	180	13.48	4	169	12.64	4	187	13.98	4	182	13.62	4	162	12.12	4	184	13.70	4	178	13.18
151	胃癌	6	105	7.86	5	143	10.70	5	109	8.15	5	113	8.46	5	118	8.83	5	123	9.16	5	115	8.51
179 180	子宮頸癌	5	110	8.24	6	105	7.85	6	85	6.35	6	87	6.51	6	86	6.43	7	81	6.03	6	89	6.59
200,202,203	非何杰金淋巴癌	10	40	3.00	7	75	5.61	7	74	5.53	10	57	4.27	7	66	4.94	9	63	4.69	7	88	6.52
157	胰臟癌	9	53	3.97	8	61	4.56	8	60	4.48	7	75	5.61	8	65	4.86	6	82	6.10	8	87	6.44
183	卵巢癌	7	56	4.19	10	53	3.96	9	49	3.66	9	58	4.34	10	50	3.74	8	73	5.43	9	74	5.48
156	膽囊癌	8	54	4.04	9	58	4.34	9	49	3.66	8	60	4.49	9	50	3.74	10	56	4.17	10	60	4.44
204-208	白血病	11	35	2.62	11	46	3.44	11	43	3.21	11	40	2.99	11	41	3.07	11	44	3.28	11	39	2.89
182	子宮體癌	16	16	1.20	13	23	1.72	15	16	1.20	14	22	1.65	13	22	1.65	13	25	1.86	12	26	1.93
188	膀胱癌	17	15	1.12	16	14	1.05	16	15	1.12	12	30	2.25	14	21	1.57	15	32	2.38	13	26	1.93
191	腦癌	14	22	1.65	15	18	1.35	12	23	1.72	13	24	1.80	12	25	1.87	16	22	1.64	14	20	1.48
150	食道癌	18	11	0.82	21	7	0.52	21	8	0.60	18	15	1.12	18	10	0.75	19	10	0.74	15	19	1.41
	其他		181	13.55		179	13.39		180	13.45		149	11.15		176	13.17		206	15.34		184	13.62

表48・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續2）

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬女性人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年					
		順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率			
C00-C97	所有癌症死亡原因	1769	130.86		1892	140.20		1861	137.69		1983	145.23		2044	147.98	2065	148.32		
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78	1	371	27.49	1	373	27.60	1	375	27.46	1	385	27.87	1	378	27.15
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31	2	281	20.82	3	239	17.68	2	284	20.80	2	277	20.05	2	273	19.61
C50	女性乳房癌	3	228	16.87	3	236	17.49	2	266	19.68	3	283	20.73	3	243	17.59	3	264	18.96
C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76	4	216	16.01	4	201	14.87	4	198	14.50	4	222	16.07	4	215	15.44
C25	胰臟癌	6	78	5.77	6	100	7.41	6	85	6.29	5	120	8.79	6	109	7.89	6	108	7.76
C16	胃癌	5	94	6.95	5	116	8.60	5	110	8.14	6	94	6.88	5	126	9.12	5	126	9.05
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	8	58	4.29	8	65	4.82	8	66	4.88	8	65	4.76	7	88	6.37	7	85	6.11
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07	9	42	3.11	9	50	3.70	9	55	4.03	9	61	4.42	9	74	5.32
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	75	5.55	7	69	5.11	7	71	5.25	7	74	5.42	8	63	4.56	8	80	5.75
C91-C95	白血病	10	45	3.33	9	42	3.11	10	42	3.11	10	49	3.59	10	39	2.82	10	43	3.09
C54	子宮體癌	12	28	2.07	14	23	1.70	12	29	2.15	11	34	2.49	12	35	2.53	11	39	2.80
C45-C49	間皮和軟組織癌	13	26	1.92	18	16	1.19	20	9	0.67	18	20	1.46	14	29	2.10	16	23	1.65
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	11	35	2.59	11	35	2.59	15	22	1.63	11	34	2.49	11	37	2.68	15	25	1.80
C67	膀胱癌	14	23	1.70	13	24	1.78	11	32	2.37	15	25	1.83	13	30	2.17	14	27	1.94
C64	腎臟癌	17	22	1.63	12	25	1.85	14	25	1.85	14	27	1.98	17	22	1.59	16	23	1.65
	其他		242	17.90		256	18.97		266	19.68		273	19.99		300	21.72		282	20.26

表48・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順位	死 人	亡 數	每 人 死 亡	十 萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因			2,079		148.33
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		404		28.82
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		302		21.55
C50	女性乳房癌	3		289		20.62
C22	肝和肝內膽管癌	4		219		15.62
C25	胰臟癌	5		124		8.85
C16	胃癌	6		113		8.06
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	7		84		5.99
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8		63		4.49
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	9		58		4.14
C91-C95	白血病	10		43		3.07
C54	子宮體癌	11		35		2.50
C45-C49	間皮和軟組織癌	12		33		2.35
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13		31		2.21
C67	膀胱癌	14		27		1.93
C64	腎臟癌	15		25		1.78
	其他			229		16.34

表49・臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
85年	128.52	130.61	24.63	25.11	22.18	22.54	14.74	15.13	11.69	11.54	13.59	13.65	5.19	4.70	5.08	5.21
86年	134.67	131.73	27.59	26.66	23.29	22.95	14.07	13.85	13.97	13.25	13.30	12.96	5.00	4.66	5.11	5.10
87年	133.21	125.92	27.83	25.93	22.45	21.54	15.20	14.56	12.47	11.87	12.48	11.57	5.06	4.30	5.19	5.01
88年	134.97	123.57	28.40	25.63	21.36	19.93	15.79	14.44	12.18	11.19	12.00	10.83	6.94	5.68	5.42	4.86
89年	141.38	125.80	28.41	24.95	21.26	19.43	17.47	15.37	12.66	11.48	12.41	10.71	7.10	5.68	5.14	4.61
90年	154.88	132.24	33.45	28.02	25.42	22.35	16.82	14.23	14.90	12.94	13.22	11.07	9.20	6.83	4.92	4.15
91年	158.05	129.89	33.70	27.17	25.06	21.27	18.58	15.06	14.36	12.05	14.18	11.21	8.15	5.70	6.52	5.31
92年	151.87	120.46	32.15	25.14	25.20	20.37	16.55	12.76	15.55	12.66	11.16	8.52	8.25	5.53	6.30	5.13
93年	160.09	122.12	33.53	25.03	25.79	20.05	19.73	14.86	15.20	11.80	11.85	8.66	9.46	5.88	5.64	4.32
94年	163.78	120.21	33.21	23.58	23.17	17.60	20.69	14.85	16.76	12.67	13.51	9.41	10.37	6.14	6.91	5.12
95年	168.54	118.90	34.68	23.70	26.75	19.75	20.27	14.03	15.56	11.37	13.83	9.15	10.07	5.68	6.67	4.78
96年	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管 和肺癌		結腸、直腸 和肛門癌		肝和肝內膽管癌		女性乳房癌		前列腺(攝護腺)癌		胃癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	170.10	112.87	35.34	22.90	21.59	13.90	26.69	18.47	16.87	11.66	9.73	5.35	11.88	7.51	7.31	4.85
98年	174.48	111.24	36.98	22.87	22.64	14.01	25.43	16.63	17.49	11.55	11.22	5.88	12.20	7.31	9.06	5.74
99年	177.26	110.14	37.89	22.60	21.81	13.10	24.65	15.83	19.68	12.87	11.41	5.86	11.75	6.67	8.07	5.06
100年	179.59	109.78	38.48	22.83	23.11	13.85	25.50	15.95	20.73	13.50	10.40	5.12	10.82	6.21	8.77	5.30
101年	187.11	111.52	38.24	22.23	24.34	13.77	26.18	16.07	17.59	10.88	13.74	6.72	12.36	6.83	8.71	5.19
102年	183.55	106.98	36.87	20.72	23.55	13.36	26.12	15.44	18.96	11.90	12.04	5.87	11.75	6.27	8.62	4.89
103年	181.97	103.66	36.82	20.34	24.72	13.54	24.72	14.18	20.62	12.73	11.68	5.14	11.58	6.07	9.54	5.48

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表49・臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年別	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
85年	4.24	4.31	7.79	8.16	3.09	3.24	3.36	3.51	3.36	3.49	3.09	3.20	3.40	3.51	2.10	2.13
86年	4.19	4.01	9.82	10.16	2.73	2.76	2.76	2.82	4.34	4.20	3.92	3.80	3.61	3.61	2.15	2.12
87年	4.28	4.00	7.75	7.32	3.55	3.45	3.19	3.00	3.02	2.76	3.36	3.16	3.78	3.66	2.52	2.37
88年	4.62	4.19	8.50	7.95	3.56	3.28	3.08	2.90	3.71	3.51	3.67	3.49	2.88	2.79	2.50	2.25
89年	5.22	4.57	7.27	6.51	3.93	3.55	3.15	2.85	4.27	3.84	4.08	3.62	3.74	3.48	3.14	2.78
90年	4.70	3.91	8.24	7.39	4.01	3.40	4.19	3.62	4.28	3.71	3.90	3.42	3.67	3.19	2.88	2.28
91年	5.95	4.89	7.85	6.60	4.51	3.72	3.96	3.31	3.49	3.00	4.66	3.88	3.56	3.15	2.27	1.80
92年	5.54	4.31	6.35	5.09	3.83	2.96	3.66	3.05	4.74	3.93	3.95	3.16	4.14	3.70	2.13	1.58
93年	6.25	4.84	6.51	4.90	4.76	3.56	4.34	3.38	5.26	4.26	4.04	3.19	4.11	3.43	3.51	2.44
94年	6.41	4.61	6.43	4.89	4.58	3.44	3.74	2.76	5.57	4.30	4.81	3.76	3.82	3.07	2.52	1.74
95年	6.78	4.75	6.03	4.26	4.42	3.04	5.43	3.91	6.33	4.81	3.70	2.66	3.73	2.77	3.12	1.97
96年	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年別	口腔癌		卵巢癌		非何杰金氏淋巴瘤		食道癌		子宮頸及部位未明示子宮癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	4.99	3.43	4.29	2.96	4.99	3.18	4.57	3.16	5.55	3.62	4.61	3.42	3.05	1.83	3.20	2.35
98年	5.66	3.78	4.82	3.36	4.55	2.85	4.93	3.23	5.11	3.31	4.05	2.92	3.06	1.72	2.68	1.91
99年	5.78	3.90	4.88	3.21	5.82	3.39	5.24	3.43	5.25	3.39	4.09	2.78	3.64	1.97	2.56	1.73
100年	5.81	3.86	4.76	3.25	5.65	3.30	4.36	2.71	5.42	3.23	4.25	2.95	2.96	1.57	2.47	1.75
101年	6.35	3.97	6.37	4.09	5.52	3.30	5.00	3.13	4.56	2.87	4.13	2.87	3.19	1.57	2.63	1.76
102年	7.57	4.88	6.11	3.79	5.75	3.24	4.52	2.76	5.75	3.25	4.22	2.89	3.13	1.59	2.57	1.72
103年	6.46	3.97	5.99	3.60	5.75	3.29	5.01	3.04	4.14	2.27	3.64	2.35	3.45	1.72	2.82	1.86

表50・臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴癌		口腔癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
85年	161.70	155.99	34.20	32.85	33.97	33.64	18.02	17.08	19.47	18.18	5.19	4.70	6.11	5.84	5.88	6.16
86年	164.36	153.91	36.26	32.50	35.26	33.96	17.40	16.38	17.55	16.28	5.00	4.66	6.08	5.66	7.78	7.49
87年	165.22	148.86	36.97	31.79	35.28	32.90	16.87	15.20	17.49	15.13	5.06	4.30	5.68	5.32	5.68	5.23
88年	170.53	149.76	41.35	35.19	32.81	29.90	18.31	15.99	15.49	13.17	6.94	5.68	6.56	5.54	6.26	6.04
89年	179.93	153.80	39.26	32.31	32.99	29.86	20.16	16.82	16.65	13.60	7.10	5.68	6.95	5.93	7.18	6.62
90年	196.59	160.95	47.44	37.48	37.63	32.68	20.00	16.23	18.70	14.79	9.20	6.83	6.90	5.62	7.36	6.51
91年	193.72	154.72	45.20	34.72	37.82	32.06	21.91	17.15	17.76	13.19	8.15	5.70	7.46	5.76	6.30	5.62
92年	187.41	144.63	44.12	33.18	36.79	29.57	18.97	14.09	14.27	10.49	8.25	5.53	7.10	5.52	8.56	7.37
93年	201.24	149.63	46.47	33.20	38.40	30.08	23.74	17.23	15.36	10.60	9.46	5.88	7.06	5.28	9.46	7.95
94年	205.00	148.15	43.81	30.08	34.69	26.89	23.85	16.86	18.40	12.46	10.37	6.14	8.96	6.51	10.37	8.18
95年	210.37	146.09	47.46	31.25	40.43	30.73	24.67	17.02	18.73	11.98	10.07	5.68	8.74	6.09	11.47	9.00
96年	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管 和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸 和肛門癌		胃癌		口腔癌		前列腺 (攝護腺)癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	17.11	10.69	9.02	6.44	9.73	5.35	8.95	6.11
98年	211.03	134.11	47.09	28.32	35.47	24.25	24.57	15.19	16.04	9.38	10.75	7.48	11.22	5.88	10.82	6.77
99年	219.66	137.29	48.91	29.60	35.12	23.28	26.24	15.97	15.62	8.91	11.02	7.70	11.41	5.86	9.99	6.41
100年	216.55	132.95	50.34	30.02	37.34	24.12	25.60	15.83	15.05	8.67	10.40	7.26	10.40	5.12	8.74	5.44
101年	229.30	138.02	49.42	28.92	37.08	24.29	28.97	16.89	15.85	8.46	11.40	7.44	13.74	6.72	9.60	5.89
102年	221.64	130.87	47.37	26.87	37.67	23.37	27.80	16.17	14.68	7.83	13.59	9.10	12.04	5.87	9.55	5.59
103年	218.44	127.74	45.48	25.78	34.58	21.20	28.16	16.21	15.39	8.16	11.76	7.72	11.68	5.14	10.29	6.30

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表50 · 臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率								
84年	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
85年	5.27	5.11	4.81	4.51	3.05	3.09	4.20	4.09	3.05	2.94	5.12	4.97	2.82	2.58	1.30	1.19
86年	6.93	6.52	4.47	3.94	2.62	2.49	4.08	3.97	3.16	2.95	4.93	4.81	3.16	3.31	0.92	0.86
87年	6.06	5.53	5.52	4.87	4.30	4.04	4.91	4.67	3.91	3.40	4.37	4.25	2.53	2.44	1.61	1.43
88年	6.26	5.88	5.57	4.66	3.97	3.50	3.74	3.61	3.66	3.12	4.12	3.78	2.06	1.89	1.91	1.78
89年	7.64	6.64	6.42	5.28	4.20	3.54	5.19	4.62	4.12	3.52	3.89	3.66	1.99	1.82	1.83	1.60
90年	7.05	6.06	5.44	4.27	3.99	3.21	4.75	4.16	4.68	4.03	4.68	3.42	2.15	1.80	2.76	2.35
91年	8.92	7.40	7.38	6.10	4.69	3.73	3.69	3.21	3.54	2.61	4.00	3.50	2.15	1.84	1.31	1.05
92年	7.40	5.96	6.63	5.08	4.01	2.99	5.09	4.35	3.16	2.26	4.16	3.52	1.62	1.34	2.55	2.01
93年	7.06	5.68	6.90	5.20	5.04	3.74	5.28	4.16	4.81	3.12	4.27	3.39	2.02	1.75	1.40	1.00
94年	9.04	7.40	8.03	5.72	5.46	4.02	4.60	3.50	3.51	2.20	4.60	3.67	2.49	2.11	1.56	1.04
95年	6.79	4.87	7.49	5.21	4.68	3.22	4.22	2.91	3.90	2.30	5.07	4.16	2.58	2.02	1.56	0.99
96年	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99
年別	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		膀胱癌		鼻咽癌		白血病		膽囊和其他 膽道癌		腎臟癌		腦癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率								
97年	8.40	5.90	5.96	3.65	4.47	2.62	4.79	3.61	5.96	4.28	2.43	1.62	2.04	1.37	2.04	1.86
98年	8.61	5.89	6.08	3.83	4.42	2.44	3.87	2.83	5.06	3.61	3.00	1.81	3.00	2.05	2.77	2.07
99年	9.12	6.19	8.09	4.61	4.99	2.63	4.44	2.99	5.15	3.38	2.38	1.64	3.09	1.93	3.25	2.40
100年	8.19	5.30	7.40	4.35	4.18	2.13	3.31	2.41	4.96	3.26	2.52	1.41	3.78	2.13	3.31	2.45
101年	9.92	6.46	6.71	4.13	4.29	1.98	4.37	2.97	5.54	3.72	3.12	1.97	2.89	1.69	3.44	2.54
102年	8.54	5.40	6.21	3.43	4.43	2.33	4.35	3.02	5.44	3.73	2.17	1.15	3.03	1.89	3.57	2.43
103年	9.59	6.04	7.12	4.12	5.11	2.60	4.80	3.28	4.25	2.91	3.48	2.09	2.48	1.44	2.32	1.78

表51・臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
85年	95.32	102.11	15.05	16.32	11.46	12.60	11.69	11.54	10.39	11.19	7.71	8.31	7.79	8.16	4.05	4.52
86年	105.07	108.40	18.96	19.84	10.74	11.24	13.97	13.25	11.36	11.98	9.06	9.12	9.82	10.16	4.14	4.58
87年	101.48	100.73	18.78	18.93	13.53	13.74	12.47	11.87	9.73	9.98	7.53	7.45	7.75	7.32	4.71	4.70
88年	99.92	95.83	15.64	15.01	13.31	12.87	12.18	11.19	10.08	9.99	8.57	8.16	8.50	7.95	4.29	4.14
89年	103.56	96.02	17.76	16.76	14.84	13.81	12.66	11.48	9.74	9.23	8.24	7.39	7.27	6.51	3.37	3.15
90年	114.12	101.60	19.77	17.50	13.70	12.12	14.90	12.94	13.48	12.35	7.86	6.94	8.24	7.39	3.00	2.70
91年	123.33	105.00	22.51	19.16	15.33	12.92	14.36	12.05	12.64	11.00	10.70	8.90	7.85	6.60	5.61	4.83
92年	117.42	96.19	20.55	16.75	14.20	11.38	15.55	12.66	13.98	11.62	8.15	6.45	6.35	5.09	5.53	4.79
93年	120.38	94.63	21.04	16.41	15.87	12.42	15.20	11.80	13.62	10.67	8.46	6.55	6.51	4.90	4.27	3.40
94年	124.20	93.11	23.05	16.99	17.66	12.94	16.76	12.67	12.12	9.11	8.83	6.35	6.43	4.89	4.94	3.79
95年	128.65	92.46	22.48	15.97	16.08	11.23	15.56	11.37	13.70	9.88	9.16	6.31	6.03	4.26	4.69	3.44
96年	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管 和肺癌		結腸、直腸 和肛門癌		女性乳房癌		肝和肝內膽管癌		胰臟癌		胃癌		卵巢癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	130.86	87.54	24.78	16.27	17.31	11.20	16.87	11.66	15.76	10.79	5.77	3.76	6.95	4.47	4.29	2.96
98年	140.20	90.07	27.49	17.54	20.82	12.92	17.49	11.55	16.01	9.98	7.41	4.75	8.60	5.30	4.82	3.36
99年	137.69	85.62	27.60	16.36	17.68	10.57	19.68	12.87	14.87	9.27	6.29	3.86	8.14	4.62	4.88	3.21
100年	145.23	89.19	27.46	16.41	20.80	12.16	20.73	13.50	14.50	8.92	8.79	5.20	6.88	3.97	4.76	3.25
101年	147.98	88.40	27.87	16.31	20.05	11.11	17.59	10.88	16.07	9.11	7.89	4.57	9.12	5.32	6.37	4.09
102年	148.32	86.24	27.15	15.36	19.61	10.93	18.96	11.90	15.44	8.66	7.76	4.29	9.05	4.87	6.11	3.79
103年	148.33	83.12	28.82	15.72	21.55	11.34	20.62	12.73	15.62	8.23	8.85	4.80	8.06	4.26	5.99	3.60

資料來源：衛生福利部。

附 註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51 · 臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
84年	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
85年	3.67	4.07	3.36	3.51	3.13	3.47	2.60	2.82	0.53	0.59	1.15	1.26	1.76	1.84	0.92	1.04
86年	3.91	4.15	2.76	2.82	2.84	3.08	3.15	3.26	0.00	0.00	1.15	1.22	2.38	2.48	0.92	0.91
87年	3.04	3.07	3.19	3.00	2.81	2.90	2.66	2.63	0.08	0.07	1.14	1.20	2.05	2.08	0.68	0.70
88年	3.68	3.64	3.08	2.90	3.16	3.12	2.03	1.96	1.50	1.46	1.35	1.25	0.90	0.86	1.13	1.09
89年	4.05	3.77	3.15	2.85	3.67	3.51	2.32	2.26	1.27	1.21	2.17	2.03	1.12	1.06	0.60	0.55
90年	3.97	3.50	4.19	3.62	4.04	3.59	2.62	2.46	1.20	1.12	1.12	0.98	1.65	1.63	0.82	0.73
91年	4.56	3.82	3.96	3.31	4.34	3.80	3.44	3.11	1.72	1.46	1.05	0.91	1.35	1.21	0.52	0.44
92年	4.48	3.58	3.66	3.05	3.66	2.97	3.21	3.00	1.20	0.99	1.12	0.88	1.72	1.44	0.60	0.48
93年	5.61	4.50	4.34	3.38	4.49	3.43	2.99	2.65	1.65	1.34	2.25	1.66	1.80	1.70	1.12	0.86
94年	4.86	3.55	3.74	2.76	3.74	2.88	3.07	2.58	1.65	1.33	1.57	1.20	1.87	1.63	0.75	0.52
95年	6.10	4.35	5.43	3.91	4.17	2.93	3.28	2.52	1.86	1.41	2.38	1.62	1.64	1.30	0.74	0.56
96年	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94
年別	非何杰金氏淋巴瘤		子宮頸及部位未明 示子宮癌		白血病		子宮體癌		間皮和軟組織癌		膽囊和其他 膽道癌		膀胱癌		腎臟癌	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率
97年	4.07	2.73	5.55	3.62	3.33	2.61	2.07	1.42	1.92	1.35	2.59	1.68	1.70	1.05	1.63	1.05
98年	3.11	1.96	5.11	3.31	3.11	2.22	1.70	1.15	1.19	0.81	2.59	1.67	1.78	1.03	1.85	1.14
99年	3.70	2.25	5.25	3.39	3.11	2.19	2.15	1.46	0.67	0.39	1.63	1.02	2.37	1.32	1.85	1.12
100年	4.03	2.32	5.42	3.23	3.59	2.67	2.49	1.67	1.46	1.02	2.49	1.52	1.83	1.03	1.98	1.11
101年	4.42	2.61	4.56	2.87	2.82	2.11	2.53	1.53	2.10	1.72	2.68	1.48	2.17	1.16	1.59	0.90
102年	5.32	3.09	5.75	3.25	3.09	2.15	2.80	1.73	1.65	0.97	1.80	0.98	1.94	0.96	1.65	0.92
103年	4.49	2.57	4.14	2.27	3.07	1.81	2.50	1.48	2.35	1.53	2.21	1.15	1.93	0.95	1.78	1.00

肆、歷年死因統計
二、行政區別死因統計

表52-1 · 臺北市松山區歷年主要死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		797	375.45		837	397.63		832	400.24		838	404.81		894	430.00		901	434.30
08-14	惡性腫瘤	1	224	105.52	1	254	120.67	1	256	123.15	1	261	126.08	1	249	119.77	1	309	148.95
25-27-28*	心臟疾病	3	91	42.87	2	104	49.41	2	85	40.89	2	93	44.93	2	91	43.77	3	75	36.15
29	腦血管疾病	2	103	48.52	3	99	47.03	3	83	39.93	3	92	44.44	4	82	39.44	2	104	50.13
181	糖尿病	4	42	19.79	5	41	19.48	4	57	27.42	4	47	22.70	4	82	39.44	4	64	30.85
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.25	8	19	9.03	7	22	10.58	7	23	11.11	7	25	12.02	6	31	14.94
321	肺炎	6	27	12.72	6	32	15.20	8	20	9.62	7	23	11.11	6	29	13.95	9	16	7.71
E54	自殺	10	17	8.01	11	15	7.13	10	13	6.25	6	24	11.59	10	12	5.77	10	14	6.75
E47-E53	事故傷害	5	30	14.13	4	50	23.75	5	47	22.61	4	47	22.70	3	89	42.81	5	39	18.80
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	9.89	8	19	9.03	9	19	9.14	10	17	8.21	8	23	11.06	7	23	11.09
038	敗血症	12	7	3.30	13	7	3.33	13	9	4.33	14	5	2.42	14	4	1.92	13	5	2.41
	其他		209	98.45		197	93.59		221	106.31		206	99.51		208	100.05		221	106.53

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-1・臺北市松山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		913	442.84		938	457.20		936	455.61		960	466.52		1,024	494.61		963	461.29		1,011	480.96	
08-14	惡性腫瘤	1	299	145.03	1	280	136.48	1	307	149.43	1	304	147.73	1	313	151.18	1	345	165.26	1	332	157.94	
25-27-28*	心臟疾病	3	89	43.17	2	121	58.98	2	92	44.78	2	101	49.08	2	134	64.72	2	104	49.82	2	108	51.38	
29	腦血管疾病	2	96	46.56	3	88	42.89	4	66	32.13	3	81	39.36	3	91	43.95	3	73	34.97	3	86	40.91	
181	糖尿病	4	56	27.16	4	63	30.71	3	79	38.45	4	62	30.13	4	67	32.36	4	65	31.14	4	79	37.58	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.61	5	37	18.03	7	29	14.12	7	27	13.12	7	33	15.94	8	26	12.45	5	41	19.50	
321	肺炎	5	39	18.92	6	34	16.57	6	31	15.09	5	42	20.41	5	41	19.80	7	28	13.41	6	37	17.60	
E54	自殺	9	20	9.70	7	24	11.70	9	19	9.25	9	18	8.75	9	20	9.66	6	30	14.37	7	29	13.80	
E47-E53	事故傷害	6	34	16.49	8	23	11.21	5	41	19.96	6	38	18.47	6	35	16.91	5	34	16.29	8	26	12.37	
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	10.19	10	13	6.34	8	23	11.20	8	20	9.72	8	22	10.63	8	26	12.45	9	17	8.09	
038	敗血症	12	7	3.40	11	9	4.39	11	10	4.87	12	9	4.37	11	10	4.83	15	3	1.44	10	14	6.66	
	其他		226	109.62		246	119.91		239	116.34		258	125.38		258	124.62		229	109.69		242	115.13	

表52-1・臺北市松山區歷年主要死亡原因（續2）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																		
		97年				98年				99年				100年				101年		
順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因	1,057	502.04	1,044	499.41	1,085	521.10	1,218	582.24	1,189	565.04	1,239	588.25							
C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34	1	331	158.34	1	352	169.06	1	386	184.52	1	369	175.36	1	389	184.69	
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	140	66.50	2	124	59.32	2	145	69.64	2	165	78.88	2	160	76.04	2	139	65.99	
I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32	3	78	37.31	3	70	33.62	3	87	41.59	3	92	43.72	3	95	45.10	
J12-J18	肺炎	4	63	29.92	5	48	22.96	5	56	26.90	4	73	34.90	4	53	25.19	5	68	32.29	
E10-E14	糖尿病	5	49	23.27	4	72	34.44	4	59	28.34	5	50	23.90	5	47	22.34	4	70	33.23	
I10-I15	高血壓性疾病	7	37	17.57	6	34	16.26	8	28	13.45	8	32	15.30	7	37	17.58	7	46	21.84	
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	31	14.72	10	21	10.05	7	30	14.41	7	36	17.21	10	29	13.78	6	50	23.74	
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	27	12.82	8	33	15.79	6	32	15.37	9	29	13.86	8	33	15.68	8	39	18.52	
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	22	10.45	11	20	9.57	11	24	11.53	10	21	10.04	9	32	15.21	10	25	11.87	
A40-A41	敗血症	6	46	21.85	6	34	16.26	8	28	13.45	6	42	20.08	6	38	18.06	9	34	16.14	
	其他		249	118.27		249	119.11		261	125.35		297	141.98		299	142.09		284	134.84	

表52-1・臺北市松山區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			1,237		587.91
C00-C97	惡性腫瘤	1		380		180.60
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		195		92.68
I60-I69	腦血管疾病	3		91		43.25
J12-J18	肺炎	4		70		33.27
E10-E14	糖尿病	5		62		29.47
I10-I15	高血壓性疾病	6		43		20.44
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7		39		18.54
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8		35		16.63
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9		26		12.36
A40-A41	敗血症	10		25		11.88
	其他			271		128.80

表52-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,176	479.31		1,172	484.31		1,208	503.23		1,305	541.06		1,230	507.83		1,239	513.88
08-14	惡性腫瘤	1	303	123.50	1	306	126.45	1	327	136.22	1	371	153.82	1	343	141.61	1	351	145.58
25-27-28*	心臟疾病	2	121	49.32	2	135	55.79	2	159	66.24	2	141	58.46	2	145	59.87	2	132	54.75
29	腦血管疾病	3	120	48.91	3	128	52.89	3	134	55.82	3	134	55.56	3	108	44.59	3	124	51.43
181	糖尿病	5	59	24.05	4	71	29.34	4	93	38.74	4	67	27.78	4	89	36.75	4	92	38.16
321	肺炎	6	48	19.56	6	47	19.42	8	30	12.50	8	38	15.75	5	63	26.01	8	30	12.44
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	33	13.45	7	45	18.60	6	33	13.75	7	46	19.07	7	45	18.58	7	36	14.93
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.67	9	31	12.81	7	31	12.91	6	51	21.14	8	36	14.86	6	39	16.18
E54	自殺	11	16	6.52	10	30	12.40	12	16	6.67	9	26	10.78	10	26	10.73	9	21	8.71
E47-E53	事故傷害	4	81	33.01	5	63	26.03	5	57	23.75	5	56	23.22	6	58	23.95	5	54	22.40
26	高血壓性疾病	8	34	13.86	8	34	14.05	9	29	12.08	10	25	10.37	9	29	11.97	10	17	7.05
	其他		325	132.46		282	116.53		299	124.56		350	145.11		288	118.91		343	142.26

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				96年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
01-56	所有死亡原因		1,355	567.15		1,308	550.86		1,353	573.36		1,331	569.90		1,366	589.70		1,271	549.91		1,363	592.17								
08-14	惡性腫瘤	1	410	171.61	1	383	161.30	1	367	155.52	1	373	159.71	1	430	185.63	1	401	173.50	1	427	185.51								
25-27-28*	心臟疾病	2	151	63.20	2	161	67.80	2	166	70.35	2	178	76.22	3	159	68.64	2	134	57.98	2	167	72.55								
29	腦血管疾病	3	141	59.02	3	111	46.75	3	128	54.24	3	115	49.24	2	163	70.37	3	105	45.43	3	133	57.78								
181	糖尿病	4	90	37.67	5	52	21.90	4	106	44.92	4	74	31.69	4	80	34.54	3	105	45.43	4	76	33.02								
321	肺炎	6	41	17.16	4	73	30.74	5	52	22.04	6	52	22.27	5	51	22.02	5	61	26.39	5	65	28.24								
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	35	14.65	7	43	18.11	6	50	21.19	5	59	25.26	6	50	21.58	6	45	19.47	6	40	17.38								
347	慢性肝病及肝硬化	8	34	14.23	9	25	10.53	9	32	13.56	9	32	13.70	8	31	13.38	9	23	9.95	7	29	12.60								
E54	自殺	9	31	12.98	8	36	15.16	7	39	16.53	8	35	14.99	7	45	19.43	7	40	17.31	8	27	11.73								
E47-E53	事故傷害	5	49	20.51	6	44	18.53	8	37	15.68	7	39	16.70	9	27	11.66	8	28	12.11	9	24	10.43								
26	高血壓性疾病	12	12	5.02	10	20	8.42	10	15	6.36	10	21	8.99	10	18	7.77	10	17	7.36	10	15	6.52								
	其他		361	151.10		360	151.61		361	152.98		353	151.15		312	134.69		312	134.99		360	156.40								

表52-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因（續2）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77		1,357	598.94		1,336	593.18		1,382	612.00		1,513	666.11		1,425	624.68
C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88	1	437	192.88	1	424	188.25	1	441	195.29	1	455	200.32	1	447	195.95
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	2	181	79.28	2	142	62.67	2	143	63.49	2	147	65.10	2	184	81.01	2	172	75.40
J12-J18	肺炎	4	87	38.10	5	74	32.66	3	93	41.29	4	87	38.53	4	94	41.38	4	76	33.32
I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37	3	111	48.99	4	82	36.41	3	93	41.18	3	99	43.59	3	103	45.15
E10-E14	糖尿病	5	51	22.34	4	81	35.75	5	56	24.86	7	49	21.70	5	63	27.74	5	70	30.69
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	6	47	20.59	9	42	18.54	6	45	19.98	9	36	15.94	8	52	22.89	6	49	21.48
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	45	19.71	6	49	21.63	7	42	18.65	6	57	25.24	6	59	25.98	6	49	21.48
A40-A41	敗血症	6	47	20.59	7	48	21.19	9	36	15.98	5	66	29.23	7	54	23.77	6	49	21.48
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	34	14.89	10	34	15.01	10	35	15.54	11	26	11.51	10	33	14.53	9	33	14.47
M00-M99	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	12	32	14.02	11	30	13.24	8	38	16.87	12	19	8.41	14	9	3.96	13	21	9.21
	其他		306	134.02		309	136.38		342	151.85		361	159.86		411	180.95		356	156.06

表52-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			1,475		643.89
C00-C97	惡性腫瘤	1		433		189.02
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		191		83.38
J12-J18	肺炎	3		127		55.44
I60-I69	腦血管疾病	4		101		44.09
E10-E14	糖尿病	5		69		30.12
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6		62		27.07
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7		54		23.57
A40-A41	敗血症	8		48		20.95
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9		39		17.02
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10		31		13.53
	其他			320		139.69

表52-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,416	424.70		1,431	442.54		1,435	454.53		1,414	446.61		1,471	462.50		1,448	456.72
08-14	惡性腫瘤	1	410	122.97	1	455	140.71	1	444	140.64	1	410	129.50	1	438	137.71	1	409	129.00
25-27-28*	心臟疾病	2	184	55.19	2	154	47.63	2	176	55.75	2	181	57.17	2	177	55.65	3	151	47.63
29	腦血管疾病	3	169	50.69	3	148	45.77	3	143	45.29	3	140	44.22	3	151	47.48	2	157	49.52
181	糖尿病	5	74	22.19	5	74	22.88	4	85	26.92	5	65	20.53	4	102	32.07	4	112	35.33
321	肺炎	6	49	14.70	6	43	13.30	9	35	11.09	8	42	13.27	7	43	13.52	8	35	11.04
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	45	13.50	8	41	12.68	7	49	15.52	6	54	17.06	6	49	15.41	6	54	17.03
E47-E53	事故傷害	4	80	23.99	4	79	24.43	5	57	18.05	4	70	22.11	5	66	20.75	5	62	19.56
E54	自殺	9	24	7.20	13	10	3.09	10	28	8.87	13	13	4.11	11	13	4.09	10	21	6.62
038	敗血症	12	10	3.00	11	16	4.95	12	15	4.75	11	15	4.74	16	5	1.57	14	9	2.84
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.60	9	37	11.44	8	37	11.72	9	29	9.16	8	39	12.26	7	38	11.99
	其他		349	104.68		374	115.66		366	115.93		395	124.76		388	121.99		400	126.17

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																						
		90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年				
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	
01-56	所有死亡原因	1,507	476.30	1,509	477.89	1,570	499.42	1,584	506.42	1,638	524.39	1,546	493.66	1,598	508.03									
08-14	惡性腫瘤	1	481	152.02	1	514	162.78	1	488	155.23	1	527	168.49	1	501	160.39	1	495	158.06	1	473	150.37		
25-27-28*	心臟疾病	2	179	56.57	2	158	50.04	2	198	62.98	2	210	67.14	2	225	72.03	2	174	55.56	2	194	61.68		
29	腦血管疾病	3	151	47.72	3	122	38.64	3	139	44.22	3	126	40.28	3	142	45.46	3	121	38.64	3	145	46.10		
181	糖尿病	4	89	28.13	4	111	35.15	4	114	36.26	4	107	34.21	4	106	33.94	4	105	33.53	4	118	37.51		
321	肺炎	6	45	14.22	7	57	18.05	5	76	24.18	6	51	16.31	5	89	28.49	6	46	14.69	5	78	24.80		
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	5	54	17.07	5	60	19.00	7	54	17.18	5	63	20.14	6	78	24.97	5	58	18.52	6	61	19.39		
E47-E53	事故傷害	7	44	13.91	6	58	18.37	6	62	19.72	7	43	13.75	7	44	14.09	8	37	11.81	7	37	11.76		
E54	自殺	9	24	7.59	8	37	11.72	10	23	7.32	8	35	11.19	8	40	12.81	7	40	12.77	8	36	11.45		
038	敗血症	12	14	4.42	12	10	3.17	12	9	2.86	12	11	3.52	14	6	1.92	11	22	7.02	9	25	7.95		
347	慢性肝病及肝硬化	8	35	11.06	9	30	9.50	8	37	11.77	9	25	7.99	9	30	9.60	8	37	11.81	10	22	6.99		
	其他		391	123.58		382	120.98		370	117.70		386	123.41		377	120.69		411	131.24		409	130.03		

表52-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51		1,667	533.05		1,779	570.94		1,816	580.74		1,818	579.65		1,846	589.03
C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36	1	549	175.55	1	572	183.58	1	544	173.97	1	580	184.93	1	582	185.71
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	237	75.39	2	200	63.95	2	213	68.36	2	233	74.51	2	210	66.96	2	269	85.83
I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67	3	115	36.77	3	129	41.40	3	129	41.25	3	153	48.78	3	136	43.40
J12-J18	肺炎	4	92	29.26	4	98	31.34	4	108	34.66	4	100	31.98	4	96	30.61	4	89	28.40
E10-E14	糖尿病	5	74	23.54	5	75	23.98	5	78	25.03	5	79	25.26	6	70	22.32	5	87	27.76
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	63	20.04	6	56	17.91	7	48	15.40	6	72	23.02	7	68	21.68	6	72	22.97
I10-I15	高血壓性疾病	9	45	14.31	8	48	15.35	9	45	14.44	10	43	13.75	8	67	21.36	8	46	14.68
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	55	17.49	7	49	15.67	9	45	14.44	9	51	16.31	9	60	19.13	10	43	13.72
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	45	14.31	11	38	12.15	11	43	13.80	8	55	17.59	10	46	14.67	9	44	14.04
A40-A41	敗血症	8	54	17.18	10	41	13.11	6	57	18.29	7	59	18.87	5	72	22.96	7	56	17.87
	其他		418	132.96		398	127.27		441	141.53		451	144.23		396	126.26		422	134.65

表52-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			2,054		655.12
C00-C97	惡性腫瘤	1		593		189.14
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		317		101.11
I60-I69	腦血管疾病	3		148		47.20
J12-J18	肺炎	4		120		38.27
E10-E14	糖尿病	5		96		30.62
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6		85		27.11
I10-I15	高血壓性疾病	7		67		21.37
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8		58		18.50
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9		44		14.03
A40-A41	敗血症	10		42		13.40
	其他			484		154.37

表52-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		987	440.48		972	444.28		1,037	484.33		989	462.79		949	441.58		1,017	472.82
08-14	惡性腫瘤	1	289	128.97	1	281	128.44	1	323	150.86	1	302	141.32	1	293	136.34	1	325	151.10
25-27-28*	心臟疾病	2	124	55.34	3	120	54.85	3	106	49.51	3	96	44.92	2	99	46.07	3	88	40.91
29	腦血管疾病	3	106	47.31	2	129	58.96	2	111	51.84	2	105	49.13	3	91	42.34	2	99	46.03
181	糖尿病	5	47	20.98	5	46	21.03	5	64	29.89	4	56	26.20	4	59	27.45	3	88	40.91
321	肺炎	7	32	14.28	9	17	7.77	8	30	14.01	8	26	12.17	8	29	13.49	9	17	7.90
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	25	11.16	6	29	13.26	6	37	17.28	7	34	15.91	7	33	15.36	5	52	24.18
E47-E53	事故傷害	4	64	28.56	4	63	28.80	4	75	35.03	5	49	22.93	5	49	22.80	6	46	21.39
E54	自殺	10	20	8.93	9	17	7.77	10	17	7.94	11	17	7.95	9	22	10.24	8	25	11.62
347	慢性肝病及肝硬化	6	37	16.51	8	22	10.06	7	32	14.95	6	39	18.25	6	38	17.68	7	28	13.02
038	敗血症	15	4	1.79	11	13	5.94	13	13	6.07	13	8	3.74	15	5	2.33	13	10	4.65
	其他		239	106.66		235	107.41		229	106.95		257	120.26		231	107.49		239	111.12

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,074	497.71		1,045	482.00		1,114	512.69		1,123	517.67		1,178	543.14		1,106	506.77		1,230	561.56
08-14	惡性腫瘤	1	349	161.73	1	359	165.59	1	354	162.92	1	370	170.56	1	374	172.44	1	351	160.83	1	384	175.32
25-27-28*	心臟疾病	2	110	50.98	2	114	52.58	2	120	55.23	2	154	70.99	2	146	67.32	2	138	63.23	2	147	67.11
29	腦血管疾病	3	104	48.20	3	87	40.13	3	104	47.86	3	83	38.26	3	102	47.03	3	105	48.11	3	109	49.76
181	糖尿病	4	100	46.34	4	82	37.82	4	58	26.69	4	71	32.73	4	91	41.96	4	71	32.53	4	86	39.26
321	肺炎	7	25	11.59	8	26	11.99	7	35	16.11	5	35	16.13	5	49	22.59	6	48	21.99	5	67	30.59
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	5	52	24.10	6	31	14.30	5	57	26.23	7	31	14.29	7	36	16.60	7	27	12.37	6	44	20.09
E47-E53	事故傷害	6	38	17.61	5	41	18.91	6	36	16.57	9	27	12.45	8	33	15.22	8	23	10.54	7	31	14.15
E54	自殺	7	25	11.59	7	27	12.45	9	27	12.43	5	35	16.13	6	44	20.29	5	49	22.45	8	29	13.24
347	慢性肝病及肝硬化	9	23	10.66	9	23	10.61	8	30	13.81	8	30	13.83	9	27	12.45	9	22	10.08	9	23	10.50
038	敗血症	12	8	3.71	12	6	2.77	13	7	3.22	12	5	2.30	10	15	6.92	11	11	5.04	10	21	9.59
	其他		240	111.22		249	114.85		286	131.62		282	129.99		261	120.34		261	119.59		289	131.94

表52-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因（續2）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率		
A00-Y98	所有死亡原因	1,264	578.06	1,192	545.43	1,261	575.31	1,341	603.74	1,412	626.49	1,350	592.87						
C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70	1	417	190.81	1	402	183.41	1	418	188.19	1	430	190.79	1	412	180.94
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	167	76.37	2	143	65.43	2	145	66.15	2	156	70.23	2	153	67.89	2	173	75.98
I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22	3	96	43.93	3	89	40.60	3	101	45.47	3	96	42.59	3	88	38.65
J12-J18	肺炎	4	70	32.01	4	76	34.78	4	73	33.31	4	73	32.87	4	78	34.61	4	76	33.38
E10-E14	糖尿病	5	69	31.56	5	47	21.51	5	63	28.74	5	66	29.71	5	75	33.28	5	65	28.55
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	30	13.72	10	29	13.27	11	31	14.14	7	37	16.66	9	46	20.41	7	52	22.84
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	36	16.46	6	39	17.85	6	46	20.99	9	35	15.76	6	59	26.18	10	33	14.49
I10-I15	高血壓性疾病	11	25	11.43	11	28	12.81	12	30	13.69	7	37	16.66	7	54	23.96	6	57	25.03
A40-A41	敗血症	7	37	16.92	7	36	16.47	7	42	19.16	6	61	27.46	8	51	22.63	9	36	15.81
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	32	14.63	9	31	14.18	9	34	15.51	9	35	15.76	11	37	16.42	11	21	9.22
	其他		304	139.03		250	114.39		306	139.61		322	144.97		333	147.75		337	148.00

表52-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			1,431		623.19
C00-C97	惡性腫瘤	1		427		185.96
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		208		90.58
I60-I69	腦血管疾病	3		101		43.98
J12-J18	肺炎	4		74		32.23
E10-E14	糖尿病	5		68		29.61
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6		53		23.08
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7		47		20.47
I10-I15	高血壓性疾病	8		42		18.29
A40-A41	敗血症	9		37		16.11
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10		30		13.06
	其他			344		149.81

表52-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		786	454.91		821	486.17		778	468.89		802	483.88		840	506.24		917	558.44
08-14	惡性腫瘤	1	244	141.22	1	210	124.35	1	242	145.85	1	227	136.96	1	247	148.86	1	275	167.47
25-27-28*	心臟疾病	3	77	44.57	2	100	59.22	2	103	62.08	2	101	60.94	2	111	66.90	2	97	59.07
29	腦血管疾病	2	86	49.77	3	97	57.44	3	69	41.59	3	80	48.27	3	66	39.78	3	88	53.59
181	糖尿病	4	39	22.57	4	49	29.02	4	47	28.33	5	38	22.93	4	44	26.52	4	66	40.19
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	20	11.58	6	30	17.76	6	24	14.46	7	27	16.29	6	31	18.68	6	30	18.27
321	肺炎	7	27	15.63	8	27	15.99	9	18	10.85	8	25	15.08	7	28	16.87	8	24	14.62
E47-E53	事故傷害	5	32	18.52	5	45	26.65	5	40	24.11	4	46	27.75	5	37	22.30	5	38	23.14
E54	自殺	11	8	4.63	10	13	7.70	15	5	3.01	12	5	3.02	11	11	6.63	11	10	6.09
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	15.63	9	25	14.80	7	21	12.66	6	33	19.91	7	28	16.87	7	27	16.44
26	高血壓性疾病	6	30	17.36	7	28	16.58	8	19	11.45	9	14	8.45	9	19	11.45	9	20	12.18
	其他		196	113.44		197	116.66		190	114.51		206	124.29		218	131.38		242	147.37

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																				
		90年			91年			92年			93年			94年			95年					
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
01-56	所有死亡原因		864	532.14		905	559.60		870	541.37		858	539.48		892	564.88		843	533.65		874	549.53
08-14	惡性腫瘤	1	267	164.45	1	288	178.08	1	245	152.45	1	245	154.05	1	282	178.58	1	267	169.02	1	258	162.22
25-27-28*	心臟疾病	2	111	68.37	2	101	62.45	2	111	69.07	2	113	71.05	2	102	64.59	2	80	50.64	2	86	54.07
29	腦血管疾病	3	94	57.90	3	88	54.41	3	73	45.43	3	89	55.96	3	88	55.73	3	62	39.25	3	75	47.16
181	糖尿病	4	58	35.72	4	62	38.34	4	64	39.82	4	59	37.10	4	58	36.73	4	53	33.55	4	58	36.47
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	32	19.71	7	25	15.46	6	32	19.91	5	34	21.38	7	23	14.57	6	31	19.62	5	52	32.70
321	肺炎	6	26	16.01	5	34	21.02	5	56	34.85	6	24	15.09	5	30	19.00	5	51	32.28	6	38	23.89
E47-E53	事故傷害	7	22	13.55	6	29	17.93	8	16	9.96	8	21	13.20	6	24	15.20	8	25	15.83	7	25	15.72
E54	自殺	9	12	7.39	8	20	12.37	7	18	11.20	7	22	13.83	8	19	12.03	9	24	15.19	8	22	13.83
347	慢性肝病及肝硬化	8	19	11.70	10	12	7.42	9	15	9.33	8	21	13.20	9	18	11.40	7	26	16.46	9	17	10.69
26	高血壓性疾病	10	10	6.16	9	17	10.51	10	14	8.71	10	11	6.92	10	10	6.33	10	14	8.86	10	10	6.29
	其他		213	131.19		229	141.60		226	140.63		219	137.70		238	150.72		210	132.94		233	146.50

表52-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因（續2）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																		
		97年				98年				99年				100年				101年		
順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因	957	600.33	897	563.99	885	556.10	957	596.29	999	617.42	892	548.43							
C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07	1	276	173.54	1	278	174.68	1	263	163.87	1	305	188.50	1	248	152.48	
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	127	79.67	2	116	72.94	2	103	64.72	2	118	73.52	2	129	79.73	2	121	74.39	
I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54	3	58	36.47	3	56	35.19	3	54	33.65	3	73	45.12	4	57	35.05	
J12-J18	肺炎	4	70	43.91	4	49	30.81	4	51	32.05	4	52	32.40	4	71	43.88	3	76	46.73	
E10-E14	糖尿病	7	30	18.82	5	46	28.92	7	32	20.11	5	38	23.68	7	39	24.10	5	47	28.90	
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	35	21.96	6	31	19.49	10	18	11.31	6	31	19.32	8	32	19.78	6	31	19.06	
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	22	13.80	8	27	16.98	9	21	13.20	8	30	18.69	8	32	19.78	6	31	19.06	
A40-A41	敗血症	5	41	25.72	6	31	19.49	6	36	22.62	6	31	19.32	5	42	25.96	10	21	12.91	
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	13.17	9	23	14.46	13	15	9.43	8	30	18.69	10	24	14.83	8	24	14.76	
I10-I15	高血壓性疾病	10	19	11.92	10	21	13.20	5	41	25.76	10	27	16.82	5	42	25.96	9	23	14.14	
	其他		218	136.75		219	137.70		234	147.04		283	176.33		210	129.79		213	130.96	

表52-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			1,093		669.47
C00-C97	惡性腫瘤	1		291		178.24
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		179		109.64
I60-I69	腦血管疾病	3		94		57.58
J12-J18	肺炎	4		78		47.78
E10-E14	糖尿病	5		45		27.56
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6		33		20.21
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6		33		20.21
A40-A41	敗血症	8		31		18.99
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9		29		17.76
I10-I15	高血壓性疾病	10		28		17.15
	其他			252		154.35

表52-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		733	536.47		711	528.07		756	564.51		778	580.11		775	578.22		747	561.24
08-14	惡性腫瘤	1	230	168.33	1	194	144.09	1	232	173.24	1	204	152.11	1	223	166.38	1	201	151.02
25-27-28*	心臟疾病	2	73	53.43	2	88	65.36	2	111	82.88	2	96	71.58	2	91	67.89	4	68	51.09
29	腦血管疾病	3	72	52.70	3	84	62.39	3	89	66.46	3	94	70.09	3	87	64.91	2	101	75.88
181	糖尿病	4	48	35.13	5	43	31.94	5	39	29.12	4	54	40.26	4	48	35.81	3	69	51.84
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	30	21.96	6	30	22.28	7	26	19.41	6	31	23.12	8	23	17.16	6	26	19.53
321	肺炎	8	22	16.10	9	15	11.14	8	17	12.69	8	17	12.68	7	24	17.91	8	24	18.03
E47-E53	事故傷害	5	47	34.40	4	46	34.17	4	42	31.36	5	53	39.52	5	33	24.62	5	37	27.80
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.30	7	21	15.60	6	28	20.91	7	19	14.17	6	30	22.38	7	25	18.78
E54	自殺	11	10	7.32	12	7	5.20	13	7	5.23	10	11	8.20	14	6	4.48	9	13	9.77
038	敗血症	10	12	8.78	11	9	6.68	13	7	5.23	9	13	9.69	16	2	1.49	12	4	3.01
	其他		164	120.03		174	129.23		158	117.98		186	138.69		208	155.19		179	134.49

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				96年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
01-56	所有死亡原因		749	567.34		811	618.09		812	623.38		766	593.91		867	679.14		802	632.16		810	640.19								
08-14	惡性腫瘤	1	223	168.92	1	250	190.53	1	242	185.78	1	205	158.94	1	228	178.60	1	273	215.19	1	259	204.70								
25-27-28*	心臟疾病	3	73	55.30	2	93	70.88	2	97	74.47	2	89	69.01	2	95	74.42	2	96	75.67	2	94	74.29								
29	腦血管疾病	2	88	66.66	3	69	52.59	3	80	61.42	3	73	56.60	3	89	69.72	4	55	43.35	3	68	53.74								
181	糖尿病	4	51	38.63	4	62	47.25	4	56	42.99	4	60	46.52	4	63	49.35	3	56	44.14	4	50	39.52								
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	5	36	27.27	5	29	22.10	5	42	32.24	5	33	25.59	5	42	32.90	6	25	19.71	5	35	27.66								
321	肺炎	9	15	11.36	6	27	20.58	6	26	19.96	6	32	24.81	7	25	19.58	5	29	22.86	6	29	22.92								
E47-E53	事故傷害	6	29	21.97	8	19	14.48	7	24	18.42	8	20	15.51	8	24	18.80	8	20	15.76	7	24	18.97								
347	慢性肝病及肝硬化	7	24	18.18	7	21	16.00	8	22	16.89	7	21	16.28	9	22	17.23	10	10	7.88	7	24	18.97								
E54	自殺	8	17	12.88	8	19	14.48	9	15	11.52	9	19	14.73	6	30	23.50	7	22	17.34	9	18	14.23								
038	敗血症	11	11	8.33	12	6	4.57	12	5	3.84	12	6	4.65	10	18	14.10	9	11	8.67	10	13	10.27								
	其他		182	137.86		216	164.62		203	155.84		208	161.27		231	180.95		205	161.59		196	154.91								

表52-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				98年				99年				100年				101年				102年				
		順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	
A00-Y98	所有死亡原因		893	712.17		859	692.60		806	650.00		859	683.81		926	725.00		889	687.47							
C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93	1	255	205.60	1	255	205.65	1	244	194.24	1	288	225.48	1	282	218.07							
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	118	94.11	2	105	84.66	2	83	66.94	2	98	78.01	2	142	111.18	2	125	96.66							
I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84	3	84	67.73	3	58	46.77	3	61	48.56	3	65	50.89	3	59	45.63							
J12-J18	肺炎	4	61	48.65	5	41	33.06	4	49	39.52	4	56	44.58	5	40	31.32	5	47	36.35							
E10-E14	糖尿病	5	55	43.86	4	58	46.76	5	43	34.68	5	48	38.21	4	41	32.10	4	49	37.89							
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	26	20.74	7	27	21.77	8	23	18.55	8	25	19.90	7	30	23.49	6	32	24.75							
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	23	18.34	8	26	20.96	7	28	22.58	7	26	20.70	8	25	19.57	8	25	19.33							
I10-I15	高血壓性疾病	9	21	16.75	11	17	13.71	12	15	12.10	9	22	17.51	12	15	11.74	9	20	15.47							
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	16.75	8	26	20.96	10	17	13.71	10	20	15.92	10	21	16.44	10	16	12.37							
A40-A41	敗血症	6	32	25.52	6	32	25.80	6	32	25.81	6	39	31.05	6	34	26.62	7	29	22.43							
	其他		204	162.69		188	151.58		203	163.71		220	175.13		225	176.16		205	158.53							

表52-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			843		646.49
C00-C97	惡性腫瘤	1		236		180.99
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		139		106.60
I60-I69	腦血管疾病	3		55		42.18
J12-J18	肺炎	4		53		40.65
E10-E14	糖尿病	5		45		34.51
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6		41		31.44
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7		25		19.17
I10-I15	高血壓性疾病	8		23		17.64
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9		20		15.34
A40-A41	敗血症	9		20		15.34
	其他			186		142.64

表52-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,094	506.93		1,218	573.08		1,227	584.91		1,186	567.13		1,283	614.28		1,269	611.86
08-14	惡性腫瘤	1	270	125.11	1	317	149.15	1	322	153.50	1	301	143.94	1	366	175.24	1	332	160.08
25-27-28*	心臟疾病	2	136	63.02	2	151	71.05	2	167	79.61	2	128	61.21	2	145	69.42	3	123	59.31
29	腦血管疾病	3	127	58.85	3	132	62.11	3	131	62.45	3	123	58.82	3	127	60.81	2	129	62.20
181	糖尿病	5	57	26.41	5	63	29.64	4	83	39.57	4	72	34.43	4	100	47.88	4	106	51.11
321	肺炎	8	30	13.90	10	23	10.82	10	24	11.44	9	25	11.95	8	29	13.88	9	26	12.54
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	35	16.22	7	35	16.47	7	33	15.73	6	46	22.00	7	45	21.55	6	49	23.63
347	慢性肝病及肝硬化	6	43	19.93	6	54	25.41	6	47	22.40	7	45	21.52	6	49	23.46	7	34	16.39
E54	自殺	11	19	8.80	9	27	12.70	8	27	12.87	11	20	9.56	11	16	7.66	8	29	13.98
E47-E53	事故傷害	4	73	33.83	4	89	41.88	5	71	33.85	5	67	32.04	5	65	31.12	5	64	30.86
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	9	24	11.12	11	19	8.94	11	23	10.96	9	25	11.95	10	22	10.53	13	14	6.75
	其他		280	129.74		308	144.92		299	142.53		334	159.72		319	152.73		363	175.02

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																				
		90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
01-56	所有死亡原因	1,344	654.21	1,335	655.25	1,389	688.11	1,391	699.50	1,454	741.48	1,428	733.02	1,493	770.88							
08-14	惡性腫瘤	1	377	183.51	1	386	189.46	1	388	192.21	1	414	208.19	1	431	219.79	1	427	219.19	1	458	236.48
25-27-28*	心臟疾病	3	149	72.53	2	153	75.10	2	147	72.82	2	160	80.46	2	142	72.41	2	149	76.48	2	160	82.61
29	腦血管疾病	2	152	73.99	3	133	65.28	3	134	66.38	3	125	62.86	3	139	70.88	3	138	70.84	3	126	65.06
181	糖尿病	4	100	48.68	4	88	43.19	4	108	53.50	4	92	46.26	4	113	57.63	4	119	61.08	4	109	56.28
321	肺炎	8	34	16.55	5	55	27.00	5	73	36.16	8	43	21.62	5	60	30.60	6	49	25.15	5	87	44.92
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	5	55	26.77	7	46	22.58	7	54	26.75	6	54	27.16	7	45	22.95	5	58	29.77	6	63	32.53
347	慢性肝病及肝硬化	7	43	20.93	8	43	21.11	8	53	26.26	7	53	26.65	9	28	14.28	8	35	17.97	7	42	21.69
E54	自殺	9	32	15.58	9	28	13.74	9	30	14.86	9	33	16.59	6	58	29.58	6	49	25.15	8	37	19.10
E47-E53	事故傷害	6	50	24.34	6	52	25.52	6	57	28.24	5	60	30.17	8	37	18.87	9	32	16.43	9	34	17.56
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	22	10.71	12	12	5.89	10	13	6.44	13	11	5.53	11	16	8.16	13	7	3.59	10	14	7.23
	其他		330	160.63		339	166.39		332	164.47		346	174.00		385	196.33		365	187.36		363	187.43

表52-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續2）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68		1,552	819.43		1,525	807.87		1,578	830.63		1,616	842.80		1,604	830.86
C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83	1	419	221.23	1	446	236.27	1	426	224.24	1	448	233.65	1	464	240.35
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	203	106.05	2	175	92.40	2	167	88.47	2	185	97.38	2	207	107.96	2	215	111.37
J12-J18	肺炎	3	111	57.99	5	95	50.16	4	107	56.68	4	110	57.90	4	102	53.20	5	85	44.03
I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29	3	118	62.30	3	114	60.39	3	116	61.06	3	121	63.11	3	123	63.71
E10-E14	糖尿病	5	88	45.97	4	105	55.44	5	86	45.56	5	108	56.85	5	90	46.94	4	88	45.58
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	61	31.87	9	47	24.82	8	48	25.43	8	50	26.32	9	43	22.43	8	45	23.31
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	50	26.12	8	52	27.46	10	39	20.66	6	62	32.64	6	66	34.42	7	57	29.53
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	45	23.51	12	32	16.90	11	33	17.48	12	34	17.90	9	43	22.43	10	42	21.76
I10-I15	高血壓性疾病	11	39	20.37	11	43	22.70	7	49	25.96	7	57	30.00	7	61	31.81	6	60	31.08
A40-A41	敗血症	9	46	24.03	6	60	31.68	6	60	31.79	9	44	23.16	8	58	30.25	9	43	22.27
	其他		363	189.64		406	214.36		376	199.19		386	203.18		377	196.62		382	197.87

表52-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			1,651		850.60
C00-C97	惡性腫瘤	1		458		235.96
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		253		130.35
J12-J18	肺炎	3		108		55.64
I60-I69	腦血管疾病	3		108		55.64
E10-E14	糖尿病	5		100		51.52
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6		66		34.00
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7		61		31.43
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8		52		26.79
I10-I15	高血壓性疾病	9		49		25.25
A40-A41	敗血症	10		43		22.15
	其他			353		181.87

表52-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,041	461.94		1,086	474.55		1,057	454.28		1,125	469.43		1,130	458.85		1,174	467.98
08-14	惡性腫瘤	1	274	121.59	1	282	123.23	1	279	119.91	1	305	127.27	1	312	126.69	1	336	133.94
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.16	3	108	47.19	2	132	56.73	3	112	46.73	2	124	50.35	3	101	40.26
29	腦血管疾病	2	121	53.69	2	129	56.37	3	113	48.57	2	118	49.24	3	123	49.95	2	122	48.63
181	糖尿病	5	70	31.06	5	60	26.22	4	62	26.65	5	61	25.45	4	79	32.08	4	81	32.29
321	肺炎	8	30	13.31	7	28	12.24	8	31	13.32	8	29	12.10	7	35	14.21	8	34	13.55
E54	自殺	12	11	4.88	11	19	8.30	10	20	8.60	11	14	5.84	10	21	8.53	9	22	8.77
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	43	19.08	6	37	16.17	6	40	17.19	6	43	17.94	6	42	17.05	6	43	17.14
E47-E53	事故傷害	4	88	39.05	4	84	36.71	5	58	24.93	4	63	26.29	5	61	24.77	5	70	27.90
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	12.87	8	27	11.80	7	33	14.18	7	37	15.44	8	33	13.40	7	36	14.35
038	敗血症	14	9	3.99	12	15	6.55	13	13	5.59	12	13	5.42	19	2	0.81	12	11	4.38
	其他		271	120.25		297	129.78		276	118.62		330	137.70		298	121.01		318	126.76

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		1,180	465.44		1,227	480.75		1,143	445.58		1,277	496.35		1,297	501.74		1,301	500.03		1,402	536.05	
08-14	惡性腫瘤	1	365	143.97	1	373	146.15	1	307	119.68	1	406	157.81	1	384	148.55	1	411	157.96	1	411	157.15	
25-27-28*	心臟疾病	3	122	48.12	2	145	56.81	2	159	61.98	2	165	64.13	2	148	57.25	2	133	51.12	2	168	64.23	
29	腦血管疾病	2	129	50.88	3	119	46.63	3	122	47.56	3	133	51.70	3	113	43.71	3	119	45.74	3	116	44.35	
181	糖尿病	4	67	26.43	4	87	34.09	4	69	26.90	4	79	30.71	4	79	30.56	4	71	27.29	4	84	32.12	
321	肺炎	8	33	13.02	7	39	15.28	5	45	17.54	6	41	15.94	5	57	22.05	5	59	22.68	5	74	28.29	
E54	自殺	9	29	11.44	9	22	8.62	7	31	12.08	7	35	13.60	7	44	17.02	7	42	16.14	6	51	19.50	
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	36	14.20	5	43	16.85	9	22	8.58	5	42	16.32	6	51	19.73	6	49	18.83	7	47	17.97	
E47-E53	事故傷害	5	49	19.33	6	41	16.06	6	38	14.81	9	27	10.49	8	42	16.25	8	33	12.68	8	35	13.38	
347	慢性肝病及肝硬化	6	44	17.36	8	23	9.01	7	31	12.08	8	30	11.66	9	29	11.22	9	27	10.38	9	29	11.09	
038	敗血症	15	6	2.37	13	9	3.53	13	8	3.12	13	7	2.72	11	15	5.80	11	17	6.53	10	20	7.65	
	其他		300	118.33		326	127.73		311	121.24		312	121.27		335	129.59		340	130.68		367	140.32	

表52-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39		1,406	538.09		1,454	555.84		1,551	586.67		1,619	604.38		1,514	560.07
C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79	1	394	150.79	1	417	159.41	1	449	169.83	1	486	181.43	1	403	149.08
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	188	71.84	2	166	63.53	2	150	57.34	2	193	73.00	2	171	63.84	2	201	74.35
J12-J18	肺炎	4	86	32.86	5	64	24.49	4	86	32.88	4	90	34.04	4	103	38.45	4	96	35.51
I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98	3	105	40.18	3	103	39.37	3	125	47.28	3	125	46.66	3	122	45.13
E10-E14	糖尿病	5	60	22.93	4	68	26.02	5	80	30.58	5	81	30.64	5	81	30.24	5	91	33.66
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	46	17.58	8	43	16.46	8	53	20.26	9	42	15.89	8	58	21.65	8	54	19.98
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	38	14.52	6	58	22.20	6	63	24.08	6	71	26.86	6	66	24.64	9	45	16.65
A40-A41	敗血症	7	45	17.20	11	32	12.25	9	41	15.67	7	67	25.34	9	57	21.28	7	59	21.83
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	41	15.67	10	38	14.54	11	32	12.23	10	37	14.00	10	41	15.31	10	39	14.43
I10-I15	高血壓性疾病	10	35	13.37	7	51	19.52	6	63	24.08	8	59	22.32	7	61	22.77	6	61	22.57
	其他		321	122.66		387	148.11		366	139.91		337	127.47		370	138.12		343	126.88

表52-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			1,678		615.48
C00-C97	惡性腫瘤	1		462		169.46
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		236		86.56
J12-J18	肺炎	3		117		42.92
I60-I69	腦血管疾病	4		109		39.98
E10-E14	糖尿病	5		82		30.08
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6		66		24.21
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7		65		23.84
A40-A41	敗血症	8		59		21.64
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9		52		19.07
I10-I15	高血壓性疾病	10		39		14.31
	其他			391		143.42

表52-9・臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		469	415.37		521	464.88		529	475.05		489	437.23		528	467.73		568	499.97
08-14	惡性腫瘤	1	139	123.11	1	139	124.03	1	149	133.80	1	137	122.50	1	146	129.34	1	166	146.12
25-27-28*	心臟疾病	3	43	38.08	3	51	45.51	3	51	45.80	3	54	48.28	3	47	41.64	3	57	50.17
29	腦血管疾病	2	49	43.40	2	55	49.08	2	56	50.29	2	55	49.18	2	57	50.49	2	64	56.33
181	糖尿病	5	27	23.91	5	26	23.20	5	32	28.74	6	19	16.99	4	29	25.69	4	41	36.09
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	8	7.09	8	15	13.38	6	16	14.37	9	12	10.73	7	20	17.72	6	21	18.48
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	20.37	6	23	20.52	7	14	12.57	5	21	18.78	6	21	18.60	6	21	18.48
E47-E53	事故傷害	4	32	28.34	3	51	45.51	4	49	44.00	4	28	25.04	5	28	24.80	5	29	25.53
E54	自殺	8	11	9.74	11	8	7.14	7	14	12.57	12	6	5.36	9	12	10.63	9	11	9.68
321	肺炎	13	7	6.20	9	13	11.60	9	13	11.67	7	18	16.09	8	17	15.06	8	14	12.32
038	敗血症	14	5	4.43	13	5	4.46	12	7	6.29	13	4	3.58	13	4	3.54	16	2	1.76
	其他		125	110.71		135	120.46		128	114.94		135	120.71		147	130.22		142	124.99

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-9・臺北市南港區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		568	498.07		568	498.74		570	502.29		567	501.54		587	519.39		649	573.55		596	525.17				
08-14	惡性腫瘤	1	202	177.13	1	177	155.42	1	176	155.09	1	193	170.72	1	186	164.58	1	206	182.05	1	195	171.83				
25-27-28*	心臟疾病	2	47	41.21	3	56	49.17	2	82	72.26	2	78	68.99	2	66	58.40	2	68	60.09	2	64	56.39				
29	腦血管疾病	3	38	33.32	2	65	57.07	3	66	58.16	3	48	42.46	3	55	48.67	3	61	53.91	3	60	52.87				
181	糖尿病	5	31	27.18	4	40	35.12	4	32	28.20	4	34	30.07	4	44	38.93	4	41	36.23	4	27	23.79				
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	16	14.03	7	16	14.05	8	16	14.10	6	22	19.46	7	23	20.35	8	17	15.02	5	25	22.03				
347	慢性肝病及肝硬化	6	25	21.92	7	16	14.05	5	21	18.51	7	17	15.04	9	10	8.85	9	15	13.26	6	22	19.39				
E47-E53	事故傷害	4	35	30.69	5	24	21.07	7	18	15.86	5	30	26.54	5	25	22.12	5	30	26.51	7	19	16.74				
E54	自殺	9	14	12.28	6	19	16.68	9	15	13.22	8	13	11.50	6	24	21.24	5	30	26.51	8	14	12.34				
321	肺炎	7	24	21.05	9	15	13.17	6	19	16.74	9	10	8.85	8	11	9.73	7	28	24.74	8	14	12.34				
038	敗血症	13	4	3.51	10	8	7.02	10	8	7.02	11	3	2.65	12	5	4.42	11	7	6.19	10	10	8.81				
	其他		132	115.75		132	115.90		117	103.10		119	105.26		138	122.11		146	129.03		146	128.65				

表52-9・臺北市南港區歷年主要死亡原因（續2）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	
A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24		667	588.13		704	619.79		662	575.27		703	599.26		689	578.40		
C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60	1	206	181.64	1	215	189.28	1	195	169.45	1	222	189.24	1	226	189.72		
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	75	65.97	2	79	69.66	2	74	65.15	2	91	79.08	2	83	70.75	2	85	71.36		
I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74	3	48	42.32	3	54	47.54	3	48	41.71	3	52	44.33	3	62	52.05		
J12-J18	肺炎	3	58	51.01	4	42	37.03	4	44	38.74	4	43	37.37	4	48	40.92	4	43	36.10		
E10-E14	糖尿病	5	31	27.27	5	33	29.10	6	33	29.05	5	36	31.28	5	39	33.24	5	32	26.86		
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	20	17.59	7	22	19.40	5	37	32.57	6	28	24.33	7	28	23.87	7	20	16.79		
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	9	19	16.71	7	22	19.40	7	25	22.01	7	19	16.51	12	17	14.49	11	13	10.91		
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	24	21.11	9	20	17.63	8	21	18.49	9	17	14.77	11	18	15.34	10	14	11.75		
A40-A41	敗血症	9	19	16.71	12	12	10.58	10	18	15.85	7	19	16.51	6	29	24.72	6	21	17.63		
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	11	15	13.19	6	23	20.28	9	19	16.73	9	17	14.77	9	19	16.20	7	20	16.79		
	其他		130	114.34		160	141.08		164	144.38		149	129.48		148	126.16		153	128.44		

表52-9・臺北市南港區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			744		617.40
C00-C97	惡性腫瘤	1		228		189.20
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		94		78.01
I60-I69	腦血管疾病	3		70		58.09
J12-J18	肺炎	4		46		38.17
E10-E14	糖尿病	5		39		32.36
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6		25		20.75
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7		23		19.09
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8		20		16.60
A40-A41	敗血症	9		18		14.94
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	10		17		14.11
	其他			164		136.09

表52-10・臺北市內湖區歷年主要死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		782	350.67		828	361.55		867	369.47		906	375.94		845	341.95		969	385.16							
08-14	惡性腫瘤	1	198	88.79	1	229	99.99	1	235	100.14	1	256	106.23	1	232	93.88	1	269	106.92							
25-27-28*	心臟疾病	2	84	37.67	2	84	36.68	3	91	38.78	2	99	41.08	2	102	41.28	3	112	44.52							
29	腦血管疾病	3	71	31.84	3	83	36.24	2	108	46.02	3	87	36.10	3	87	35.21	2	114	45.31							
181	糖尿病	5	41	18.39	5	43	18.78	4	58	24.72	5	42	17.43	4	69	27.92	4	78	31.00							
321	肺炎	8	24	10.76	9	22	9.61	10	13	5.54	9	25	10.37	11	13	5.26	7	29	11.53							
E54	自殺	7	26	11.66	7	24	10.48	9	15	6.39	8	29	12.03	8	18	7.28	9	19	7.55							
E47-E53	事故傷害	4	56	25.11	4	58	25.33	5	46	19.60	4	68	28.22	5	47	19.02	5	56	22.26							
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	20	8.97	10	18	7.86	8	23	9.80	7	31	12.86	7	27	10.93	8	25	9.94							
347	慢性肝病及肝硬化	6	30	13.45	6	28	12.23	6	31	13.21	6	32	13.28	6	33	13.35	6	31	12.32							
26	高血壓性疾病	11	16	7.17	8	23	10.04	7	24	10.23	10	19	7.88	9	16	6.47	12	7	2.78							
	其他		216	96.86		216	94.32		223	95.03		218	90.46		201	81.34		229	91.02							

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-10 · 臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		976	384.17		976	380.41		1,010	389.66		1,097	421.12		1,048	400.74		1,044	396.61		1,107	417.62	
08-14	惡性腫瘤	1	293	115.33	1	342	133.30	1	302	116.51	1	314	120.54	1	306	117.01	1	357	135.62	1	373	140.72	
25-27-28*	心臟疾病	2	90	35.43	2	90	35.08	2	121	46.68	2	160	61.42	2	115	43.97	2	105	39.89	2	134	50.55	
29	腦血管疾病	3	88	34.64	2	90	35.08	3	91	35.11	3	90	34.55	3	107	40.91	3	104	39.51	3	96	36.22	
181	糖尿病	4	71	27.95	4	57	22.22	4	60	23.15	4	65	24.95	4	74	28.30	4	60	22.79	4	73	27.54	
321	肺炎	8	29	11.41	9	15	5.85	9	26	10.03	8	31	11.90	9	35	13.38	7	37	14.06	5	51	19.24	
E54	自殺	9	23	9.05	6	32	12.47	7	36	13.89	6	39	14.97	6	39	14.91	5	43	16.34	6	34	12.83	
E47-E53	事故傷害	5	50	19.68	5	48	18.71	5	47	18.13	5	52	19.96	8	36	13.77	8	35	13.30	6	34	12.83	
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	36	14.17	7	31	12.08	6	40	15.43	7	33	12.67	7	39	14.91	6	42	15.96	8	33	12.45	
347	慢性肝病及肝硬化	6	38	14.96	8	30	11.69	8	31	11.96	9	28	10.75	5	41	15.68	9	34	12.92	9	30	11.32	
26	高血壓性疾病	10	17	6.69	10	11	4.29	14	5	1.93	11	11	4.22	10	23	8.79	10	14	5.32	10	15	5.66	
	其他		241	94.86		230	89.65		251	96.84		274	105.18		233	89.09		213	80.92		234	88.28	

表52-10 · 臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續2）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口	死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因	1,183	444.46	1,170	437.78	1,183	439.82	1,238	453.56	1,382	497.41	1,322	469.74								
C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51	1	365	136.57	1	364	135.33	1	376	137.75	1	418	150.45	1	403	143.20		
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	153	57.48	2	133	49.77	2	133	49.45	2	129	47.26	2	152	54.71	2	161	57.21		
I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95	3	90	33.68	3	87	32.35	3	95	34.81	3	105	37.79	3	109	38.73		
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	28	10.52	11	29	10.85	9	35	13.01	6	46	16.85	6	47	16.92	6	56	19.90		
E10-E14	糖尿病	4	68	25.55	4	65	24.32	4	62	23.05	4	69	25.28	4	77	27.71	4	66	23.45		
J12-J18	肺炎	5	63	23.67	5	60	22.45	5	54	20.08	5	54	19.78	5	65	23.39	5	58	20.61		
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	33	12.40	6	41	15.34	6	42	15.61	7	40	14.65	9	43	15.48	9	34	12.08		
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	7	38	14.28	7	37	13.84	11	31	11.53	12	24	8.79	11	31	11.16	12	26	9.24		
I10-I15	高血壓性疾病	10	28	10.52	12	26	9.73	12	30	11.15	8	37	13.56	10	32	11.52	11	31	11.02		
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	33	12.40	8	36	13.47	7	40	14.87	10	30	10.99	7	45	16.20	7	38	13.50		
	其他		272	102.19		288	107.76		305	113.39		338	123.83		367	132.09		340	120.81		

表52-10・臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			1,364		479.77
C00-C97	惡性腫瘤	1		398		139.99
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		209		73.51
I60-I69	腦血管疾病	3		105		36.93
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4		61		21.46
E10-E14	糖尿病	4		61		21.46
J12-J18	肺炎	6		59		20.75
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7		43		15.12
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	8		36		12.66
I10-I15	高血壓性疾病	9		32		11.26
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10		30		10.55
	其他			330		116.07

表52-11・臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,192	399.07		1,271	428.91		1,246	423.71		1,241	420.29		1,288	435.12		1,363	462.31
08-14	惡性腫瘤	1	322	107.80	1	383	129.25	1	388	131.94	1	389	131.74	1	371	125.33	1	408	138.39
25-27-28*	心臟疾病	3	129	43.19	2	157	52.98	2	152	51.69	2	143	48.43	2	160	54.05	3	131	44.43
29	腦血管疾病	2	163	54.57	3	150	50.62	2	152	51.69	3	134	45.38	3	127	42.90	2	161	54.61
181	糖尿病	5	65	21.76	5	51	17.21	5	59	20.06	5	70	23.71	4	83	28.04	4	114	38.67
321	肺炎	7	40	13.39	10	25	8.44	10	22	7.48	6	34	11.51	8	40	13.51	7	40	13.57
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	37	12.39	9	27	9.11	6	35	11.90	6	34	11.51	7	41	13.85	5	48	16.28
E47-E53	事故傷害	4	85	28.46	4	71	23.96	4	77	26.18	4	72	24.38	5	50	16.89	5	48	16.28
E54	自殺	9	26	8.70	7	40	13.50	8	27	9.18	9	19	6.43	9	31	10.47	9	27	9.16
347	慢性肝病及肝硬化	6	41	13.73	6	44	14.85	7	31	10.54	8	30	10.16	6	45	15.20	7	40	13.57
038	敗血症	13	8	2.68	13	13	4.39	11	18	6.12	14	9	3.05	14	10	3.38	15	7	2.37
	其他		276	92.40		310	104.61		285	96.92		307	103.97		330	111.48		339	114.98

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-11 · 臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		1,406	479.42		1,371	469.85		1,519	523.17		1,462	505.78		1,588	550.74		1,527	530.24		1,569	545.49	
08-14	惡性腫瘤	1	424	144.58	1	461	157.99	1	433	149.13	1	476	164.67	1	456	158.15	1	489	169.80	1	533	185.31	
25-27-28*	心臟疾病	3	139	47.40	2	132	45.24	2	187	64.41	2	161	55.70	2	171	59.31	2	171	59.38	2	162	56.32	
29	腦血管疾病	2	162	55.24	3	130	44.55	3	168	57.86	3	150	51.89	3	135	46.82	3	107	37.16	3	137	47.63	
181	糖尿病	4	104	35.46	4	93	31.87	4	108	37.20	4	107	37.02	4	105	36.42	4	105	36.46	4	107	37.20	
321	肺炎	9	29	9.89	7	39	13.37	5	63	21.70	7	42	14.53	5	77	26.70	5	71	24.65	5	76	26.42	
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	50	17.05	6	44	15.08	7	55	18.94	6	44	15.22	6	61	21.16	6	53	18.40	6	60	20.86	
E47-E53	事故傷害	5	61	20.80	5	46	15.76	6	56	19.29	5	63	21.79	8	43	14.91	7	45	15.63	7	43	14.95	
E54	自殺	7	43	14.66	9	32	10.97	9	35	12.05	8	30	10.38	7	49	16.99	8	43	14.93	8	38	13.21	
347	慢性肝病及肝硬化	8	39	13.30	8	34	11.65	8	40	13.78	9	24	8.30	9	36	12.49	9	30	10.42	9	31	10.78	
038	敗血症	11	12	4.09	12	12	4.11	12	12	4.13	10	13	4.50	10	19	6.59	11	18	6.25	10	19	6.61	
	其他		343	116.96		348	119.26		362	124.68		352	121.77		436	151.21		395	137.16		363	126.20	

表52-11 · 臺北市士林區歷年主要死亡原因（續2）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																							
		97年				98年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50		1,620	568.50		1,595	561.23		1,710	598.31		1,708	593.09		1,809	625.26						
C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76	1	482	169.15	1	483	169.95	1	546	191.04	1	498	172.93	1	600	207.38						
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	231	80.61	2	216	75.80	2	186	65.45	2	190	66.48	2	227	78.82	2	208	71.89						
I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02	3	115	40.36	3	116	40.82	4	106	37.09	3	110	38.20	3	147	50.81						
J12-J18	肺炎	4	97	33.85	5	93	32.64	4	91	32.02	3	113	39.54	5	96	33.34	5	90	31.11						
E10-E14	糖尿病	5	75	26.17	4	97	34.04	4	91	32.02	5	83	29.04	4	102	35.42	4	106	36.64						
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	46	16.05	6	56	19.65	7	50	17.59	6	63	22.04	6	60	20.83	7	58	20.05						
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	49	17.10	9	38	13.34	13	28	9.85	10	43	15.05	9	48	16.67	9	46	15.90						
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	53	18.50	7	53	18.60	6	53	18.65	8	51	17.84	7	58	20.14	6	62	21.43						
A40-A41	敗血症	6	59	20.59	8	42	14.74	8	44	15.48	6	63	22.04	10	47	16.32	10	41	14.17						
I10-I15	高血壓性疾病	12	31	10.82	12	31	10.88	9	40	14.07	9	46	16.09	7	58	20.14	8	50	17.28						
	其他		407	142.03		397	139.32		413	145.32		406	142.05		404	140.29		401	138.60						

表52-11・臺北市士林區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			1,805		622.20
C00-C97	惡性腫瘤	1		537		185.11
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		252		86.87
I60-I69	腦血管疾病	3		124		42.74
J12-J18	肺炎	4		104		35.85
E10-E14	糖尿病	5		91		31.37
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6		76		26.20
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7		59		20.34
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8		53		18.27
A40-A41	敗血症	9		49		16.89
I10-I15	高血壓性疾病	10		44		15.17
	其他			416		143.40

表52-12・臺北市北投區歷年主要死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		1,078	443.77		1,121	462.90		1,082	447.47		1,132	464.00		1,191	483.28		1,187	479.40							
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.03	1	316	130.49	1	307	126.96	1	326	133.63	1	344	139.59	1	357	144.18							
25-27-28*	心臟疾病	3	100	41.17	2	132	54.51	3	120	49.63	3	87	35.66	2	136	55.19	2	117	47.25							
29	腦血管疾病	2	119	48.99	3	127	52.44	2	137	56.66	2	141	57.80	3	103	41.79	2	117	47.25							
181	糖尿病	5	51	20.99	5	67	27.67	4	76	31.43	5	56	22.95	4	79	32.06	4	93	37.56							
321	肺炎	7	36	14.82	7	40	16.52	10	23	9.51	8	28	11.48	6	46	18.67	8	27	10.90							
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.82	6	42	17.34	6	40	16.54	7	32	13.12	7	38	15.42	6	42	16.96							
347	慢性肝病及肝硬化	6	46	18.94	8	36	14.87	8	25	10.34	6	36	14.76	8	29	11.77	7	31	12.52							
E47-E53	事故傷害	4	84	34.58	4	73	30.14	5	64	26.47	4	73	29.92	5	75	30.43	5	56	22.62							
E54	自殺	10	18	7.41	11	14	5.78	8	25	10.34	12	17	6.97	9	24	9.74	9	25	10.10							
038	敗血症	14	12	4.94	11	14	5.78	14	9	3.72	13	13	5.33	12	14	5.68	14	8	3.23							
	其他		299	123.09		260	107.36		256	105.87		323	132.40		303	122.95		314	126.82							

資料來源：衛生福利部。

表52-12 · 臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																				
		90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
01-56	所有死亡原因	1,286	518.20	1,286	517.49	1,345	540.00	1,317	528.90	1,400	563.46	1,395	560.68	1,433	573.60							
08-14	惡性腫瘤	1	399	160.78	1	356	143.25	1	392	157.38	1	375	150.60	1	399	160.59	1	401	161.17	1	463	185.33
25-27-28*	心臟疾病	3	123	49.56	3	126	50.70	2	162	65.04	2	163	65.46	2	168	67.62	2	175	70.34	2	158	63.24
29	腦血管疾病	2	154	62.06	2	131	52.71	3	154	61.83	3	127	51.00	3	137	55.14	3	132	53.05	3	138	55.24
181	糖尿病	4	86	34.65	4	92	37.02	4	92	36.94	4	83	33.33	4	108	43.47	4	95	38.18	4	91	36.43
321	肺炎	7	32	12.89	7	45	18.11	5	55	22.08	6	48	19.28	7	47	18.92	5	68	27.33	5	72	28.82
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	49	19.74	6	54	21.73	6	50	20.07	7	46	18.47	5	63	25.36	6	54	21.70	6	48	19.21
347	慢性肝病及肝硬化	8	20	8.06	8	35	14.08	8	32	12.85	8	32	12.85	9	29	11.67	9	32	12.86	7	45	18.01
E47-E53	事故傷害	5	53	21.36	5	75	30.18	7	35	14.05	5	54	21.69	8	45	18.11	8	37	14.87	8	40	16.01
E54	自殺	8	20	8.06	9	29	11.67	8	32	12.85	8	32	12.85	6	55	22.14	7	42	16.88	9	29	11.61
038	敗血症	10	18	7.25	11	16	6.44	13	8	3.21	12	9	3.61	10	15	6.04	10	18	7.23	10	18	7.21
	其他		332	133.78		327	131.58		333	133.70		348	139.75		334	134.43		341	137.24		331	132.49

表52-12・臺北市北投區歷年主要死亡原因（續2）

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																			
		97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	每十萬人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬人 死 亡 率	順位	死 人 數
A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13		1,439	578.14		1,434	576.77		1,522	606.98		1,512	597.06		1,521	596.90		
C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70	1	432	173.56	1	424	170.54	1	444	177.07	1	482	190.33	1	463	181.70		
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	194	77.64	2	169	67.90	2	181	72.80	2	200	79.76	2	210	82.92	2	206	80.84		
I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83	3	110	44.19	3	89	35.80	3	122	48.65	3	95	37.51	3	109	42.78		
J12-J18	肺炎	4	92	36.82	4	100	40.18	4	87	34.99	4	91	36.29	5	59	23.30	5	79	31.00		
E10-E14	糖尿病	5	66	26.41	5	78	31.34	5	86	34.59	5	68	27.12	4	93	36.72	4	89	34.93		
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	51	20.41	6	58	23.30	6	44	17.70	6	62	24.73	6	56	22.11	6	62	24.33		
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	52	20.81	8	42	16.87	7	43	17.29	9	41	16.35	7	53	20.93	8	45	17.66		
I10-I15	高血壓性疾病	10	38	15.21	12	30	12.05	9	36	14.48	11	34	13.56	8	43	16.98	7	51	20.01		
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	36	14.41	10	39	15.67	10	35	14.08	7	48	19.14	8	43	16.98	11	37	14.52		
A40-A41	敗血症	8	45	18.01	8	42	16.87	13	31	12.47	8	44	17.55	10	32	12.64	10	40	15.70		
	其他		367	146.88		339	136.20		378	152.04		368	146.76		346	136.63		340	133.43		

表52-12・臺北市北投區歷年主要死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡	每 人 死	十 亡
A00-Y98	所有死亡原因			1,578		615.25
C00-C97	惡性腫瘤	1		460		179.35
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2		216		84.22
I60-I69	腦血管疾病	3		106		41.33
J12-J18	肺炎	4		104		40.55
E10-E14	糖尿病	5		96		37.43
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6		68		26.51
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7		54		21.05
I10-I15	高血壓性疾病	8		51		19.88
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9		47		18.32
A40-A41	敗血症	10		44		17.16
	其他			332		129.44

表53-1・臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		224	105.52		254	120.67		256	123.15		261	126.08		249	119.77		309	148.95						
162	肺癌	1	38	17.90	2	33	15.68	1	55	26.46	1	55	26.57	1	49	23.57	1	59	28.44						
155	肝癌	2	34	16.02	1	41	19.48	2	44	21.17	2	45	21.74	2	41	19.72	2	51	24.58						
153 154	結腸直腸癌	2	34	16.02	3	31	14.73	4	25	12.03	3	28	13.53	3	32	15.39	3	36	17.35						
174	女性乳癌(1)	4	9	8.30	4	15	13.92	5	11	10.32	4	14	13.17	5	10	9.35	6	10	9.35						
185	攝護腺癌(2)	11	3	2.89	6	7	6.81	17	1	0.99	6	9	8.94	6	9	8.92	4	16	15.91						
179 180	子宮頸癌(1)	7	6	5.53	10	5	4.64	16	2	1.88	7	6	5.64	8	7	6.54	7	8	7.48						
151	胃癌	5	16	7.54	5	27	12.83	3	36	17.32	5	22	10.63	4	26	12.51	5	29	13.98						
200202203	非何杰金淋巴癌	10	7	3.30	7	11	5.23	7	13	6.25	9	11	5.31	7	14	6.73	10	8	3.86						
157	胰臟癌	9	8	3.77	7	11	5.23	6	15	7.22	10	10	4.83	9	8	3.85	10	8	3.86						
204-208	白血病	14	5	2.36	12	9	4.28	8	7	3.37	14	5	2.42	10	7	3.37	10	8	3.86						
	其他		64	30.15		64	17.84		47	22.61		56	27.05		46	22.13		76	36.63						

資料來源：衛生福利部。

附註:(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-1 · 臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		299	145.03		280	136.48		307	149.43		304	147.73		313	151.18		345	165.26		332	157.94				
162	肺癌	1	71	34.44	1	74	36.07	1	66	32.13	1	76	36.93	1	66	31.88	1	61	29.22	1	86	40.91				
155	肝癌	2	40	19.40	2	41	19.98	3	45	21.90	4	37	17.98	2	51	24.63	2	50	23.95	2	44	20.93				
153 154	結腸直腸癌	4	33	16.01	3	32	15.60	4	38	18.50	3	40	19.44	3	42	20.29	3	43	20.60	3	40	19.03				
174	女性乳癌(1)	3	19	17.85	4	16	15.08	2	27	25.37	2	21	19.65	4	17	15.77	4	20	18.34	4	18	16.34				
185	攝護腺癌(2)	6	9	9.03	6	7	7.07	6	11	11.11	7	8	8.09	5	10	10.08	6	14	14.04	5	11	11.00				
179 180	子宮頸癌(1)	8	8	7.52	8	5	4.71	9	5	4.70	22	1	0.94	15	3	2.78	14	4	3.67	6	12	10.89				
151	胃癌	5	28	13.58	5	25	12.19	5	23	11.20	5	19	9.23	7	15	7.25	5	34	16.29	7	21	9.99				
200202203	非何杰金淋巴癌	9	12	5.82	9	9	4.39	7	11	5.35	5	19	9.23	6	15	7.25	8	17	8.14	8	20	9.51				
157	胰臟癌	7	16	7.76	7	10	4.87	7	11	5.35	9	10	4.86	8	12	5.80	8	17	8.14	9	16	7.61				
204-208	白血病	11	7	3.40	12	6	2.92	13	7	3.41	13	6	2.92	18	2	0.97	12	9	4.31	10	12	5.71				
	其他		56	10.23		55	26.81		63	30.67		67	32.56		80	38.64		76	36.41		52	24.74				

表53-1・臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		306	145.34		331	158.34		352	169.06		386	184.52		369	175.36		389	184.69
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92	1	81	38.75	1	77	36.98	1	81	38.72	1	82	38.97	1	65	30.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10	2	54	25.83	3	46	22.09	3	54	25.81	2	49	23.29	2	52	24.69
C22	肝和肝內膽管癌	2	44	20.90	3	51	24.40	4	35	16.81	2	57	27.25	3	48	22.81	4	47	22.31
C50	女性乳房癌(1)	4	16	14.47	4	15	13.66	2	25	22.85	4	22	19.99	4	25	22.57	3	26	23.44
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	14.00	6	7	7.06	10	7	7.09	5	14	14.12	5	16	16.06	6	15	15.05
C16	胃癌	6	22	10.45	5	18	8.61	5	21	10.09	6	26	12.43	6	18	8.55	5	35	16.62
C25	胰臟癌	7	20	9.50	7	12	5.74	12	11	5.28	7	17	8.13	6	18	8.55	7	19	9.02
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	13	4	3.62	8	6	5.46	6	11	10.05	14	4	3.63	17	2	1.81	8	9	8.11
C15	食道癌	15	5	2.37	16	4	1.91	13	10	4.80	10	10	4.78	8	11	5.23	11	11	5.22
C67	膀胱癌	16	4	1.90	14	5	2.39	11	12	5.76	16	5	2.39	9	10	4.75	13	10	4.75
	其他		78	37.05		78	37.31		97	46.59		96	45.89		90	42.77		100	47.48

表53-1・臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
C00-C97	所有癌症死亡原因			380		180.60
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		73		34.69
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		57		27.09
C22	肝和肝內膽管癌	3		52		24.71
C50	女性乳房癌(1)	4		27		24.34
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5		19		19.10
C16	胃癌	6		23		10.93
C25	胰臟癌	7		18		8.55
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	8		9		8.11
C15	食道癌	9		14		6.65
C67	膀胱癌	10		10		4.75
	其他			78		37.07

表53-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		303	123.50		306	126.45		327	136.22		371	153.82		343	141.61		351	145.58						
162	肺癌	1	65	26.49	1	62	25.62	1	60	24.99	1	86	35.66	1	83	34.27	1	85	35.25						
155	肝癌	2	56	22.82	2	49	20.25	2	51	21.25	2	53	21.97	2	55	22.71	3	44	18.25						
153 154	結腸直腸癌	3	30	12.23	3	38	15.70	4	38	15.83	4	38	15.75	3	39	16.10	2	54	22.40						
174	女性乳癌(1)	6	8	6.62	5	11	9.20	3	20	16.83	6	10	8.35	4	18	14.90	5	12	9.95						
185	攝護腺癌(2)	15	3	2.41	6	8	6.53	7	8	6.60	13	6	4.94	7	10	8.23	6	7	5.81						
151	胃癌	4	25	10.19	4	24	9.92	5	34	14.16	3	39	16.17	5	29	11.97	4	33	13.69						
200202203	非何杰金淋巴癌	7	10	4.08	10	10	4.13	10	10	4.17	8	13	5.39	10	10	4.13	7	13	5.39						
156	膽囊癌	9	9	3.67	13	8	3.31	15	6	2.50	11	12	4.98	10	10	4.13	10	10	4.15						
157	胰臟癌	7	10	4.08	17	5	2.07	15	6	2.50	8	13	5.39	8	14	5.78	8	12	4.98						
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	8	3.26	9	11	4.55	8	13	5.42	16	5	2.07	9	11	4.54	11	9	3.73						
	其他		79	32.20		80	33.06		81	33.74		96	39.80		64	26.42		72	29.86						

資料來源：衛生福利部。

附註:(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		410	171.61		383	161.30		367	155.52		373	159.71		430	185.63		401	173.50		427	185.51				
162	肺癌	1	78	32.65	1	86	36.22	1	78	33.05	1	71	30.40	1	81	34.97	1	84	36.34	1	103	44.75				
155	肝癌	2	71	29.72	2	58	24.43	2	52	22.04	2	66	28.26	2	63	27.20	2	55	23.80	2	54	23.46				
153 154	結腸直腸癌	3	45	18.84	3	45	18.95	4	38	16.10	3	41	17.56	5	51	22.02	3	50	21.63	3	48	20.85				
174	女性乳癌(1)	5	20	16.70	4	19	15.92	3	23	19.33	7	9	7.62	3	28	23.80	4	21	17.81	4	24	20.35				
185	攝護腺癌(2)	6	14	11.75	6	17	14.40	7	9	7.69	5	12	10.40	6	12	10.53	6	11	9.71	5	17	15.14				
151	胃癌	4	40	16.74	5	37	15.58	5	30	12.71	4	29	12.42	4	52	22.45	5	38	16.44	6	30	13.03				
200202203	非何杰金淋巴癌	13	9	3.77	13	8	3.37	9	15	6.36	6	19	8.14	7	24	10.36	10	14	6.06	7	21	9.12				
156	膽囊癌	9	13	5.44	13	8	3.37	13	9	3.81	12	10	4.28	15	7	3.02	9	15	6.49	8	18	7.82				
157	胰臟癌	10	12	5.02	9	11	4.63	6	19	8.05	9	15	6.42	8	17	7.34	7	18	7.79	9	16	6.95				
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	10	4.19	17	5	2.11	12	11	4.66	10	12	5.14	9	14	6.04	7	18	7.79	10	12	5.21				
	其他		98	41.02		89	37.48		83	35.17		89	38.11		81	34.97		77	33.31		84	36.49				

表53-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續2）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率	順位	死 人 數	每十萬人 死亡率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	397 173.88			437 192.88			424 188.25			441 195.29			455 200.32			447 195.95		
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60	1	87	38.40	1	84	37.30	1	85	37.64	1	108	47.55	1	87	38.14
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02	2	67	29.57	3	43	19.09	4	54	23.91	3	55	24.21	4	43	18.85
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15	3	54	23.83	2	61	27.08	3	61	27.01	2	58	25.54	2	60	26.30
C50	女性乳房癌(1)	4	23	19.59	4	25	21.39	4	22	18.87	2	38	32.44	5	23	19.50	3	29	24.46
C16	胃癌	5	27	11.83	5	40	17.65	7	23	10.21	7	26	11.51	6	29	12.77	6	34	14.90
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	10	4.38	9	11	4.86	10	11	4.88	10	14	6.20	9	15	6.60	10	17	7.45
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	9.92	6	16	14.59	6	12	11.04	9	9	8.28	4	24	21.98	5	17	15.52
C25	胰臟癌	7	22	9.64	7	26	11.48	5	30	13.32	5	28	12.40	8	18	7.92	10	17	7.45
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	10	8.52	17	3	2.57	8	7	6.01	8	10	8.54	15	4	3.39	9	10	8.43
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	15	6.57	14	8	3.53	9	12	5.33	11	13	5.76	10	14	6.16	8	20	8.77
	其他		90	39.42		100	44.14		119	52.84		103	45.61		107	47.11		113	49.54

表53-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
						萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因			433		189.02
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		82		35.80
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		57		24.88
C22	肝和肝內膽管癌	3		54		23.57
C50	女性乳房癌(1)	4		25		20.98
C16	胃癌	5		32		13.97
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	6		22		9.60
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7		10		9.10
C25	胰臟癌	8		20		8.73
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9		7		5.87
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10		13		5.67
	其他			111		48.46

表53-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		410	122.97		455	140.71		444	140.64		410	129.50		438	137.71		409	129.00						
162	肺癌	1	85	25.49	1	95	29.38	1	91	28.82	1	80	25.27	1	95	29.87	1	78	24.60						
153 154	結腸直腸癌	4	45	13.50	3	55	17.01	3	53	16.79	2	62	19.58	3	52	16.35	2	63	19.87						
155	肝癌	2	72	21.59	2	66	20.41	2	70	22.17	3	51	16.11	2	62	19.49	3	61	19.24						
174	女性乳癌(1)	3	24	14.17	4	25	15.20	4	26	16.15	4	23	14.19	4	24	14.67	4	21	12.83						
151	胃癌	5	34	10.20	5	47	14.53	5	42	13.30	5	40	12.63	5	45	14.15	5	29	9.15						
185	攝護腺癌(2)	7	10	6.09	8	10	6.29	7	15	9.70	7	12	7.77	7	12	7.77	7	12	7.82						
183	卵巢癌(1)	8	8	4.72	13	5	3.04	9	7	4.35	17	2	1.23	11	5	3.06	9	7	4.28						
200202203	非何杰金淋巴癌	9	13	3.90	7	25	7.73	8	22	6.97	8	17	5.37	8	22	6.92	8	19	5.99						
179 180	子宮頸癌(1)	6	11	6.50	6	18	10.95	6	20	12.42	6	14	8.63	6	14	8.56	9	7	4.28						
156	膽囊癌	20	3	0.90	10	12	3.71	13	7	2.22	10	12	3.79	17	6	1.89	12	12	3.78						
	其他		105	31.49		97	30.00		91	28.82		97	30.64		101	31.76		100	31.61						

資料來源：衛生福利部。

附註:(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				96年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因		481	152.02		514	162.78		488	155.23		527	168.49		501	160.39		495	158.06		473	150.37								
162	肺癌	1	116	36.66	1	107	33.89	1	97	30.86	1	113	36.13	1	105	33.62	1	110	35.12	1	96	30.52								
153 154	結腸直腸癌	3	51	16.12	4	54	17.10	4	55	17.50	2	77	24.62	3	64	20.49	3	58	18.52	2	66	20.98								
155	肝癌	2	65	20.54	2	90	28.50	2	71	22.59	3	69	22.06	2	73	23.37	2	84	26.82	3	64	20.35								
174	女性乳癌(1)	4	25	15.27	3	30	18.32	3	33	20.20	4	26	15.96	4	30	18.39	6	19	11.59	4	20	12.11								
151	胃癌	6	34	10.75	5	39	12.35	6	32	10.18	6	39	12.47	5	46	14.73	4	42	13.41	5	37	11.76								
185	攝護腺癌(2)	5	22	14.41	6	17	11.18	5	17	11.26	5	22	14.67	6	18	12.06	5	19	12.74	6	16	10.71								
183	卵巢癌(1)	12	6	3.67	12	6	3.66	10	8	4.90	7	11	6.75	12	7	4.29	7	12	7.32	7	14	8.48								
200202203	非何杰金淋巴癌	9	19	6.01	7	29	9.18	7	31	9.86	13	13	4.16	9	17	5.44	8	20	6.39	8	26	8.27								
179 180	子宮頸癌(1)	10	8	4.89	9	11	6.72	8	15	9.18	8	10	6.14	8	9	5.52	10	8	4.88	9	12	7.27								
156	膽囊癌	11	14	4.42	11	14	4.43	13	11	3.50	11	15	4.80	10	15	4.80	11	12	3.83	10	22	6.99								
	其他		121	38.17		117	37.05		118	37.54		132	42.20		117	37.46		111	35.44		100	31.79								

表53-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續2）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	501 159.36		549 175.55		572 183.58		544 173.97		580 184.93		582 185.71							
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40	1	116	37.09	1	119	38.19	1	107	34.22	1	116	36.99	1	124	39.57
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86	2	71	22.70	2	70	22.47	2	83	26.54	4	65	20.72	2	91	29.04
C50	女性乳房癌(1)	4	24	14.50	4	35	21.20	3	36	21.84	3	37	22.34	5	31	18.64	4	36	21.64
C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63	3	70	22.38	5	58	18.61	4	68	21.75	2	83	26.46	3	69	22.02
C25	胰臟癌	7	23	7.32	6	36	11.51	6	40	12.84	6	23	7.36	7	37	11.80	7	33	10.53
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	18	12.10	5	19	12.87	4	28	19.08	5	23	15.64	3	31	21.04	6	16	10.88
C16	胃癌	6	30	9.54	7	35	11.19	6	40	12.84	7	22	7.04	6	46	14.67	5	41	13.08
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45	9	18	5.76	8	32	10.27	9	18	5.76	8	19	6.06	10	17	5.42
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	11	6	3.62	12	7	4.24	14	6	3.64	11	7	4.23	9	9	5.41	8	11	6.61
C91-C95	白血病	13	10	3.18	10	15	4.80	9	16	5.13	8	20	6.40	13	11	3.51	11	14	4.47
	其他		128	40.71		127	40.61		127	40.76		136	43.49		132	42.09		130	41.48

表53-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
						萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因			593		189.14
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		122		38.91
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		78		24.88
C50	女性乳房癌(1)	3		41		24.61
C22	肝和肝內膽管癌	4		76		24.24
C25	胰臟癌	5		44		14.03
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6		17		11.57
C16	胃 癌	7		31		9.89
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8		26		8.29
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	9		13		7.80
C91-C95	白 血 痘	10		14		4.47
	其 他			131		41.78

表53-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		289	128.97		281	128.44		323	150.86		302	141.32		293	136.34		325	151.10						
162	肺癌	1	50	22.31	1	53	24.22	2	54	25.22	2	51	23.86	1	66	30.71	1	50	23.25						
155	肝癌	2	42	18.74	1	53	24.22	1	60	28.02	1	54	25.27	2	41	19.08	3	45	20.92						
153 154	結腸直腸癌	4	37	16.51	4	24	10.97	3	39	18.22	3	34	15.91	3	36	16.75	2	48	22.32						
151	胃癌	5	26	11.60	3	35	16.00	6	25	11.68	5	26	12.17	5	21	9.77	5	27	12.55						
174	女性乳癌(1)	6	11	9.68	5	11	9.91	4	19	17.45	4	15	13.74	4	11	9.99	4	20	18.09						
200202203	非何杰金淋巴癌	10	10	4.46	11	8	3.66	7	16	7.47	7	19	8.89	9	9	4.19	9	10	4.65						
157	胰臟癌	11	9	4.02	7	11	5.03	11	10	4.67	16	5	2.34	6	16	7.44	16	5	2.32						
150	食道癌	12	6	2.68	15	6	2.74	9	12	5.60	15	6	2.81	11	7	3.26	13	8	3.72						
156	膽囊癌	12	6	2.68	11	8	3.66	13	9	4.20	9	10	4.68	11	7	3.26	9	10	4.65						
185	攝護腺癌(2)	8	6	5.43	10	4	3.71	14	3	2.85	8	6	5.74	8	7	6.68	6	9	8.61						
	其他		86	38.38		68	31.08		76	35.50		76	35.56		72	33.50		93	43.24						

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		349	161.73		359	165.59		354	162.92		370	170.56		374	172.44		351	160.83		384	175.32				
162	肺癌	1	77	35.68	2	77	35.52	1	76	34.98	1	70	32.27	1	80	36.89	1	62	28.41	1	84	38.35				
155	肝癌	2	65	30.12	1	80	36.90	2	73	33.60	2	64	29.50	3	46	21.21	2	61	27.95	2	64	29.22				
153 154	結腸直腸癌	3	42	19.46	4	32	14.76	3	33	15.19	4	45	20.74	2	56	25.82	3	43	19.70	3	41	18.72				
151	胃癌	7	19	8.80	5	30	13.84	5	29	13.35	5	24	11.06	5	29	13.37	5	26	11.91	4	37	16.89				
174	女性乳癌(1)	4	14	12.58	3	17	15.16	4	16	14.21	3	29	25.77	4	21	18.63	4	19	16.70	5	14	12.21				
200202203	非何杰金淋巴癌	12	9	4.17	7	12	5.53	11	11	5.06	13	7	3.23	7	19	8.76	6	21	9.62	6	20	9.13				
157	胰臟癌	11	10	4.63	7	12	5.53	12	8	3.68	6	19	8.76	9	14	6.45	7	16	7.33	7	18	8.22				
150	食道癌	8	12	5.56	12	7	3.23	16	5	2.30	10	12	5.53	10	12	5.53	10	13	5.96	8	15	6.85				
156	膽囊癌	8	12	5.56	10	11	5.07	13	7	3.22	10	12	5.53	12	7	3.23	12	10	4.58	9	14	6.39				
185	攝護腺癌(2)	5	11	10.53	14	3	2.87	6	12	11.46	8	7	6.71	6	11	10.56	9	7	6.70	10	5	4.79				
	其他		78	36.15		78	35.98		84	38.66		81	37.34		79	36.42		73	33.45		72	32.87				

表53-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 人 數	每十萬 人 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		382	174.70		417	190.81		402	183.41		418	188.19		430	190.79		412	180.94
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47	1	85	38.89	1	85	38.78	1	84	37.82	1	85	37.71	1	91	39.96
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35	2	62	28.37	2	63	28.74	2	68	30.61	3	54	23.96	2	59	25.91
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78	4	42	19.22	3	54	24.64	3	52	23.41	2	58	25.73	3	54	23.71
C50	女性乳房癌(1)	5	14	12.19	3	25	21.70	4	26	22.44	4	23	19.54	4	22	18.38	4	18	14.86
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	8	7.71	7	11	10.65	5	17	16.45	5	13	12.45	5	16	15.14	5	13	12.20
C16	胃癌	4	33	15.09	6	26	11.90	6	20	9.12	7	24	10.81	7	21	9.32	6	26	11.42
C25	胰臟癌	8	14	6.40	5	30	13.73	7	14	6.39	6	25	11.26	6	22	9.76	8	19	8.34
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	10	6	5.22	8	10	8.68	9	7	6.04	12	5	4.25	12	6	5.01	10	7	5.78
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	12	5.49	9	14	6.41	12	11	5.02	8	21	9.45	8	16	7.10	7	21	9.22
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	11	5.03	11	11	5.03	10	12	5.47	10	12	5.40	9	15	6.66	9	15	6.59
	其他		99	45.28		101	46.22		93	42.43		91	40.97		115	51.02		89	39.09

表53-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
C00-C97	所有癌症死亡原因			427		185.96
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		78		33.97
C22	肝和肝內膽管癌	2		65		28.31
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3		60		26.13
C50	女性乳房癌(1)	4		23		18.81
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5		14		13.04
C16	胃癌	6		22		9.58
C25	胰臟癌	7		21		9.15
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	8		9		7.36
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9		16		6.97
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10		14		6.10
	其他			105		45.73

表53-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		244	141.22		210	124.35		242	145.85		227	136.96		247	148.86		275	167.47						
162	肺癌	1	48	27.78	1	38	22.50	1	56	33.75	1	61	36.80	1	47	28.33	1	57	34.71						
153 154	結腸直腸癌	4	30	17.36	4	30	17.76	4	24	14.46	4	23	13.88	3	32	19.29	3	32	19.49						
155	肝癌	2	41	23.73	2	32	18.95	2	42	25.31	2	39	23.53	2	38	22.90	2	46	28.01						
179 180	子宮頸癌(1)	5	7	8.17	5	10	11.93	5	11	13.32	6	6	7.24	6	6	7.20	5	9	10.89						
151	胃癌	3	34	19.68	3	31	18.36	6	17	10.25	5	17	10.26	4	27	16.27	4	24	14.62						
200202203	非何杰金淋巴癌	17	3	1.74	7	10	5.92	8	10	6.03	11	5	3.02	11	8	4.82	14	5	3.04						
150	食道癌	11	6	3.47	16	2	1.18	14	5	3.01	9	6	3.62	15	5	3.01	9	10	6.09						
157	胰臟癌	9	8	4.63	14	4	2.37	10	8	4.82	7	8	4.83	8	9	5.42	12	7	4.26						
174	女性乳癌(1)	6	6	7.00	6	8	9.54	3	15	18.16	3	13	15.68	5	8	9.60	5	9	10.89						
204-208	白血病	12	5	2.89	11	5	2.96	11	7	4.22	9	6	3.62	11	8	4.82	10	8	4.87						
	其他		56	32.41		40	23.69		47	28.33		43	25.94		59	35.56		68	41.41						

資料來源：衛生福利部。

附註:(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		267	164.45		288	178.08		245	152.45		245	154.05		282	178.58		267	169.02		258	162.22				
162	肺癌	1	60	36.95	1	47	29.06	1	59	36.71	1	53	33.32	1	53	33.56	1	57	36.08	1	64	40.24				
153 154	結腸直腸癌	3	28	17.25	3	37	22.88	3	29	18.05	2	41	25.78	4	32	20.26	3	31	19.62	2	39	24.52				
155	肝癌	2	37	22.79	2	38	23.50	2	32	19.91	3	34	21.38	3	34	21.53	2	41	25.95	3	32	20.12				
179 180	子宮頸癌(1)	9	5	6.10	6	11	13.43	11	4	4.90	9	5	6.17	18	2	2.48	8	6	7.41	4	9	11.01				
151	胃癌	3	28	17.25	4	29	17.93	5	20	12.45	4	21	13.20	5	25	15.83	5	20	12.66	5	12	7.55				
200202203	非何杰金淋巴癌	7	12	7.39	9	12	7.42	7	9	5.60	8	10	6.29	6	20	12.67	7	13	8.23	6	11	6.92				
150	食道癌	11	7	4.31	12	8	4.95	7	9	5.60	12	6	3.77	10	9	5.70	12	6	3.80	6	11	6.92				
157	胰臟癌	8	11	6.77	7	16	9.89	9	8	4.98	7	12	7.55	7	11	6.97	9	9	5.70	8	10	6.29				
174	女性乳癌(1)	5	13	15.87	8	8	9.77	4	14	17.15	6	9	11.11	2	19	23.55	4	14	17.28	9	5	6.12				
204-208	白血病	11	7	4.31	10	9	5.57	9	8	4.98	14	5	3.14	13	8	5.07	11	7	4.43	10	9	5.66				
	其他		59	36.34		73	45.14		53	32.98		49	30.81		69	43.70		63	39.88		56	35.21				

表53-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續2）

疾病碼 ICD-10	死亡原因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	303	190.07	276	173.54	278	174.68	263	163.87	305	188.50	248	152.48						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64	1	57	35.84	1	64	40.22	1	56	34.89	1	62	38.32	1	51	31.36
C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70	3	31	19.49	2	41	25.76	3	32	19.94	3	45	27.81	4	30	18.44
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48	2	33	20.75	3	37	23.25	2	38	23.68	2	51	31.52	2	42	25.82
C50	女性乳房癌(1)	4	16	19.48	4	15	18.27	4	14	17.01	4	15	18.04	5	11	13.10	3	19	22.46
C25	胰臟癌	9	9	5.65	7	13	8.17	6	16	10.05	6	16	9.97	7	13	8.03	7	14	8.61
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	11.65	9	5	6.50	7	5	6.51	5	9	11.63	4	13	16.70	6	7	8.97
C16	胃癌	5	29	18.19	5	25	15.72	5	19	11.94	7	11	6.85	6	18	11.12	5	15	9.22
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	7	6	7.30	8	6	7.31	12	3	3.65	13	3	3.61	12	3	3.57	16	2	2.36
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	8	5.02	14	5	3.14	8	9	5.66	11	6	3.74	9	10	6.18	8	10	6.15
C15	食道癌	10	8	5.02	6	16	10.06	11	7	4.40	11	6	3.74	14	5	3.09	12	5	3.07
	其他		78	48.93		70	44.01		63	39.59		71	44.24		74	45.73		53	32.59

表53-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
						萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因			291		178.24
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		45		27.56
C22	肝和肝內膽管癌	2		43		26.34
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3		42		25.73
C50	女性乳房癌(1)	4		14		16.45
C25	胰臟癌	5		24		14.70
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6		11		14.07
C16	胃 癌	7		21		12.86
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	8		8		9.40
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9		10		6.13
C15	食道癌	9		10		6.13
	其他			63		38.59

表53-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		230	168.33		194	144.09		232	173.24		204	152.11		223	166.38		201	151.02						
162	肺癌	1	45	32.93	2	28	20.80	1	46	34.35	2	31	23.12	3	29	21.64	1	39	29.30						
155	肝癌	2	39	28.54	1	47	34.91	2	41	30.61	1	42	31.32	1	49	36.56	2	27	20.29						
153 154	結腸直腸癌	4	22	16.10	3	22	16.34	3	29	21.65	3	22	16.40	2	30	22.38	3	20	15.03						
174	女性乳癌(1)	5	10	14.75	6	6	9.00	6	7	10.56	4	9	13.55	4	11	16.56	5	7	10.59						
185	攝護腺癌(2)	12	3	4.36	12	3	4.41	17	1	1.48	-	-	-	11	3	4.44	13	3	4.48						
179 180	子宮頸癌(1)	11	3	4.43	4	7	10.50	5	11	16.60	8	4	6.02	6	7	10.54	5	7	10.59						
151	胃癌	3	30	21.96	5	14	10.40	4	27	20.16	5	17	12.68	5	18	13.43	4	19	14.28						
157	胰臟癌	6	9	6.59	16	2	1.49	10	6	4.48	10	7	5.22	16	4	2.98	7	12	9.02						
200202203	非何杰金淋巴癌	6	9	6.59	10	6	4.46	9	9	6.72	10	7	5.22	12	5	3.73	11	6	4.51						
150	食道癌	9	8	5.86	8	9	6.68	8	10	7.47	7	9	6.71	7	10	7.46	10	7	5.26						
	其他		52	38.06		50	37.14		45	33.60		56	41.76		57	42.53		54	40.57						

資料來源：衛生福利部。

附註:(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		223	168.92		250	190.53		242	185.78		205	158.94		228	178.60		273	215.19		259	204.70				
162	肺癌	1	41	31.06	1	60	45.73	1	52	39.92	1	40	31.01	1	41	32.12	2	51	40.20	1	54	42.68				
155	肝癌	2	39	29.54	2	38	28.96	2	41	31.48	1	40	31.01	3	34	26.63	1	57	44.93	2	40	31.61				
153 154	結腸直腸癌	5	20	15.15	3	33	25.15	3	31	23.80	3	26	20.16	4	29	22.72	3	30	23.65	3	35	27.66				
174	女性乳癌(1)	3	13	19.80	4	12	18.39	5	9	13.87	5	7	10.87	2	18	28.19	4	13	20.44	4	14	22.02				
185	攝護腺癌(2)	14	3	4.52	9	5	7.58	6	6	9.18	13	3	4.64	10	4	6.27	7	6	9.48	5	10	15.89				
179 180	子宮頸癌(1)	6	7	10.66	6	5	7.66	7	5	7.71	9	3	4.66	11	3	4.70	10	5	7.86	6	8	12.58				
151	胃癌	4	21	15.91	5	19	14.48	4	20	15.35	4	15	11.63	5	14	10.97	8	12	9.46	7	14	11.06				
157	胰臟癌	11	6	4.54	10	8	6.10	14	5	3.84	7	8	6.20	13	5	3.92	6	13	10.25	8	12	9.48				
200202203	非何杰金淋巴癌	11	6	4.54	10	8	6.10	8	10	7.68	7	8	6.20	7	11	8.62	11	9	7.09	9	9	7.11				
150	食道癌	9	7	5.30	8	10	7.62	9	9	6.91	14	3	2.33	6	14	10.97	9	11	8.67	10	8	6.32				
	其他		60	45.45		52	39.63		54	41.46		52	40.32		55	43.08		66	52.02		55	43.47				

表53-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		267	212.93		255	205.60		255	205.65		244	194.24		288	225.49		282	218.07
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66	1	56	45.15	1	56	45.16	1	60	47.76	1	56	43.84	1	59	45.63
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91	3	29	23.38	3	35	28.23	3	26	20.70	2	48	37.58	3	33	25.52
C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47	2	36	29.03	2	47	37.90	2	36	28.66	3	39	30.53	2	53	40.99
C50	女性乳房癌(1)	4	16	25.32	4	11	17.55	4	9	14.33	4	12	18.81	4	11	16.93	4	9	13.65
C16	胃癌	5	14	11.17	5	21	16.93	6	14	11.29	5	16	12.74	5	16	12.53	5	14	10.83
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	3	4.82	6	8	13.04	7	5	8.17	9	4	6.47	8	6	9.56	12	3	4.73
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	8	6.38	7	15	12.09	9	7	5.65	6	14	11.14	6	14	10.96	7	11	8.51
C25	胰臟癌	15	5	3.99	8	12	9.68	9	7	5.65	7	10	7.96	6	14	10.96	5	14	10.83
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	7	5.58	9	9	7.26	13	5	4.03	12	5	3.98	16	4	3.13	11	7	5.41
C67	膀胱癌	10	7	5.58	9	9	7.26	16	4	3.23	12	5	3.98	16	4	3.13	13	6	4.64
	其他		64	51.04		49	39.51		66	53.23		56	44.58		76	59.50		73	56.45

表53-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死 亡	萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因			236		180.99
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		57		43.71
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		37		28.37
C22	肝和肝內膽管癌	3		36		27.61
C50	女性乳房癌(1)	4		11		16.51
C16	胃癌	5		15		11.50
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6		6		9.41
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7		11		8.44
C25	胰臟癌	8		6		4.60
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8		6		4.60
C67	膀胱癌	8		6		4.60
	其他			45		34.51

表53-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		270	125.11		317	149.15		322	153.50		301	143.94		366	175.24		332	160.08						
155	肝癌	1	50	23.17	2	53	24.94	2	57	27.17	2	62	29.65	2	61	29.21	2	48	23.14						
162	肺癌	2	48	22.24	1	67	31.52	1	68	32.42	1	67	32.04	1	73	34.95	1	71	34.23						
153 154	結腸直腸癌	4	26	12.05	4	38	17.88	3	32	15.25	5	26	12.43	3	44	21.07	3	41	19.77						
174	女性乳癌(1)	6	8	7.60	6	10	9.66	6	7	6.85	3	16	15.68	4	20	19.58	5	10	9.85						
151	胃癌	3	42	19.46	3	39	18.35	4	31	14.78	4	30	14.35	5	29	13.88	4	31	14.95						
200202203	非何杰金淋巴癌	9	9	4.17	9	10	4.71	11	11	5.24	10	10	4.78	7	19	9.10	8	13	6.27						
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.52	7	7	6.42	10	6	5.58	17	2	1.87	12	5	4.69	7	7	6.61						
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	12	5.56	16	3	1.41	7	14	6.67	7	12	5.74	13	9	4.31	10	10	4.82						
150	食道癌	16	4	1.85	11	8	3.76	8	12	5.72	8	11	5.26	8	14	6.70	10	10	4.82						
156	膽囊癌	10	6	2.78	14	4	1.88	13	9	4.29	10	10	4.78	9	12	5.75	12	9	4.34						
	其他		60	27.80		78	36.70		75	35.75		55	26.30		80	38.30		82	39.54						

資料來源：衛生福利部。

附註:(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		377	183.51		386	189.46		388	192.21		414	208.19		431	219.79		427	219.19		458	236.48	
155	肝癌	2	65	31.64	2	69	33.87	1	79	39.14	2	71	35.70	2	55	28.05	2	72	36.96	1	94	48.54	
162	肺癌	1	86	41.86	1	72	35.34	2	68	33.69	1	75	37.72	1	88	44.88	1	84	43.12	2	84	43.37	
153 154	結腸直腸癌	3	47	22.88	3	48	23.56	3	37	18.33	3	47	23.64	3	42	21.42	3	67	34.39	3	55	28.40	
174	女性乳癌(1)	5	14	13.91	5	15	15.01	4	16	16.14	5	15	15.35	4	19	19.68	5	15	15.60	4	18	18.77	
151	胃癌	4	37	18.01	4	44	21.60	6	24	11.89	4	36	18.10	5	37	18.87	4	32	16.43	5	35	18.07	
200202203	非何杰金淋巴癌	9	12	5.84	6	18	8.83	10	15	7.43	12	13	6.54	13	10	5.10	11	10	5.13	6	24	12.39	
185	攝護腺癌(2)	8	7	6.68	11	6	5.78	9	9	8.76	8	10	9.89	7	12	12.05	6	14	14.19	7	9	9.21	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	18	8.76	9	14	6.87	8	19	9.41	7	20	10.06	6	27	13.77	8	22	11.29	8	16	8.26	
150	食道癌	11	9	4.38	10	12	5.89	13	9	4.46	10	14	7.04	11	18	9.18	15	6	3.08	9	16	8.26	
156	膽囊癌	11	9	4.38	12	11	5.40	11	14	6.94	15	7	3.52	9	22	11.22	17	5	2.57	10	15	7.74	
	其他		73	35.53		77	37.79		98	48.55		106	53.30		101	51.51		100	51.33		92	47.50	

表53-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續2）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年				98年				99年				100年				101年				102年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	
C00-C97	所有癌症死亡原因		394	205.83		419	221.23		446	236.27		426	224.24		448	233.65		464	240.35							
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54	1	79	41.71	1	86	45.56	1	91	47.90	1	90	46.94	1	101	52.32							
C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70	1	79	41.71	2	77	40.79	2	61	32.11	3	60	31.29	2	82	42.48							
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08	3	57	30.10	3	50	26.49	3	52	27.37	2	64	33.38	3	59	30.56							
C50	女性乳房癌(1)	7	9	9.47	6	15	15.90	4	24	25.41	4	24	25.15	5	14	14.50	4	23	23.63							
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	10.37	5	16	16.83	13	4	4.24	6	16	16.92	8	10	10.50	7	13	13.58							
C16	胃癌	4	25	13.06	4	35	18.48	5	38	20.13	5	34	17.90	4	33	17.21	5	27	13.99							
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75	7	20	10.56	7	23	12.18	7	17	8.95	6	23	12.00	5	27	13.99							
C25	胰臟癌	5	20	10.45	8	17	8.98	8	21	11.12	7	17	8.95	7	22	11.47	8	17	8.81							
C15	食道癌	16	6	3.13	8	17	8.98	14	8	4.24	11	10	5.26	9	16	8.34	10	15	7.77							
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	9	4.70	14	7	3.70	10	11	5.83	9	14	7.37	11	13	6.78	11	10	5.18							
	其他		89	46.50		77	40.65		104	55.09		90	47.37		103	53.72		90	46.62							

表53-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
C00-C97	所有癌症死亡原因			458		235.96
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		100		51.52
C22	肝和肝內膽管癌	2		65		33.49
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3		60		30.91
C50	女性乳房癌(1)	4		25		25.49
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5		16		16.66
C16	胃癌	6		29		14.94
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7		28		14.43
C25	胰臟癌	8		20		10.30
C15	食道癌	9		15		7.73
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10		14		7.21
	其他			86		44.31

表53-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		274	121.59		282	123.23		279	119.91		305	127.27		312	126.69		336	133.94
162	肺癌	1	53	23.52	1	51	22.29	2	45	19.34	1	70	29.21	1	70	28.42	1	63	25.11
155	肝癌	2	51	22.63	2	48	20.97	1	55	23.64	2	46	19.19	2	46	18.68	2	57	22.72
153 154	結腸直腸癌	5	28	12.42	3	38	16.60	4	26	11.17	3	38	15.86	3	34	13.81	3	37	14.75
174	女性乳癌(1)	3	16	14.36	5	12	10.57	3	16	13.81	5	10	8.35	5	12	9.72	4	15	11.90
151	胃癌	4	29	12.87	4	27	11.80	5	25	10.74	4	26	10.85	6	23	9.34	5	22	8.77
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.39	7	7	6.07	7	6	5.14	7	8	6.67	4	13	10.58	6	9	7.21
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	8.08	13	3	2.64	6	11	9.49	5	10	8.35	7	11	8.91	14	5	3.97
157	胰臟癌	10	7	3.11	8	11	4.81	10	10	4.30	15	6	2.50	9	13	5.28	12	10	3.99
183	卵巢癌(1)	9	4	3.59	17	2	1.76	18	1	0.86	18	2	1.67	11	6	4.86	7	9	7.14
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	7	3.11	10	10	4.37	8	11	4.73	11	7	2.92	12	9	3.65	12	10	3.99
	其他		65	28.84		73	31.90		73	31.37		82	34.22		75	30.45		99	39.46

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		365	143.97		373	146.15		307	119.68		406	157.81		384	148.55		411	157.96		411	157.15	
162	肺癌	1	82	32.34	1	72	28.21	1	74	28.85	1	90	34.98	1	84	32.50	1	88	33.82	1	85	32.50	
155	肝癌	2	59	23.27	3	50	19.59	3	38	14.81	2	63	24.49	3	43	16.63	3	45	17.30	2	53	20.26	
153 154	結腸直腸癌	4	30	11.83	2	57	22.33	2	40	15.59	4	45	17.49	2	44	17.02	2	53	20.37	3	43	16.44	
174	女性乳癌(1)	3	16	12.53	4	20	15.53	4	12	9.25	3	25	19.18	4	19	14.47	4	21	15.83	4	19	14.20	
151	胃癌	5	28	11.04	5	34	13.32	6	17	6.63	6	24	9.33	5	36	13.93	5	34	13.07	5	33	12.62	
185	攝護腺癌(2)	6	12	9.53	7	9	7.12	5	9	7.10	5	12	9.45	6	14	11.01	6	16	12.55	6	13	10.18	
179 180	子宮頸癌(1)	7	12	9.40	6	10	7.77	7	8	6.17	9	8	6.14	10	7	5.33	12	6	4.52	7	11	8.22	
157	胰臟癌	11	10	3.94	9	14	5.49	10	11	4.29	10	14	5.44	7	16	6.19	7	24	9.22	8	16	6.12	
183	卵巢癌(1)	13	5	3.92	10	7	5.44	13	4	3.08	15	4	3.07	16	3	2.28	8	9	6.78	9	8	5.98	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	9	3.55	13	6	2.35	14	6	2.34	10	14	5.44	7	16	6.19	9	16	6.15	10	15	5.74	
	其他		102	40.23		94	36.83		168	65.49		211	82.01		202	78.14		203	78.02		215	82.20	

表53-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續2）

疾病碼 ICD-10	死亡原因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	426	162.79	394	150.79	417	159.41	449	169.83	486	181.43	403	149.08						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83	1	82	31.38	1	95	36.32	1	104	39.34	1	96	35.84	1	69	25.52
C50	女性乳房癌(1)	3	28	20.87	4	19	14.15	3	27	20.03	4	27	19.79	4	26	18.79	6	17	12.16
C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46	2	58	22.20	4	49	18.73	3	56	21.18	2	70	26.13	2	57	21.09
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34	3	47	17.99	2	58	22.17	2	68	25.72	3	57	21.28	3	53	19.61
C16	胃癌	5	21	8.02	6	29	11.10	5	43	16.44	5	30	11.35	5	46	17.17	4	35	12.95
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	7.06	5	16	12.60	6	17	13.41	6	11	8.60	6	14	10.81	5	16	12.26
C25	胰臟癌	7	18	6.88	7	16	6.12	8	15	5.73	10	17	6.43	7	23	8.59	7	24	8.88
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	11	4.20	14	9	3.44	11	9	3.44	11	11	4.16	9	14	5.23	10	12	4.44
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	12	4.59	10	12	4.59	7	17	6.50	9	19	7.19	8	17	6.35	9	15	5.55
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	17	5	1.91	15	6	2.30	17	3	1.15	19	3	1.13	12	11	4.11	14	6	2.22
	其他		111	42.42		100	38.27		84	32.11		103	38.96		112	41.81		99	36.62

表53-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
C00-C97	所有癌症死亡原因			462		169.46
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		93		34.11
C50	女性乳房癌(1)	2		41		29.03
C22	肝和肝內膽管癌	3		69		25.31
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4		63		23.11
C16	胃癌	5		33		12.10
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6		10		7.61
C25	胰臟癌	7		19		6.97
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8		17		6.24
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9		13		4.77
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	10		11		4.03
	其他			93		34.11

表53-9・臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		139	123.11		139	124.03		149	133.80		137	122.50		146	129.34		166	146.12						
162	肺癌	1	28	24.80	1	31	27.66	1	33	29.63	1	34	30.40	1	30	26.58	1	31	27.29						
155	肝癌	2	23	20.37	2	23	20.52	3	16	14.37	2	22	19.67	2	25	22.15	5	17	14.96						
153 154	結腸直腸癌	5	12	10.63	5	11	9.82	5	14	12.57	4	13	11.62	6	13	11.52	4	19	16.72						
151	胃癌	3	16	14.17	3	22	19.63	3	16	14.37	5	11	9.84	4	18	15.95	2	23	20.25						
174	女性乳癌(1)	4	6	10.80	4	6	10.88	2	13	23.70	8	3	5.44	3	10	17.94	3	10	17.81						
200202203	非何杰金淋巴癌	8	6	5.31	8	6	5.35	10	5	4.49	9	5	4.47	8	7	6.20	11	5	4.40						
185	攝護腺癌(2)	14	1	1.74	-	-	-	4	4	7.08	6	4	7.06	5	7	12.25	7	5	8.70						
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	10	8.86	10	4	3.57	9	6	5.39	7	7	6.26	9	5	4.43	11	5	4.40						
156	膽囊癌	10	4	3.54	14	2	1.78	17	1	0.90	13	3	2.68	18	1	0.89	14	3	2.64						
179 180	子宮頸癌(1)	6	5	9.00	7	3	5.44	6	6	10.94	3	8	14.50	7	5	8.97	6	7	12.47						
	其他		28	24.80		31	27.66		35	31.43		27	24.14		25	22.15		41	36.09						

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-9 · 臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		202	177.13		177	155.42		176	155.09		193	170.72		186	164.58		206	182.05		195	171.83				
162	肺癌	2	40	35.08	1	44	38.63	2	33	29.08	2	36	31.84	2	34	30.08	2	33	29.16	1	41	36.13				
155	肝癌	1	43	37.71	2	23	20.20	1	47	41.42	1	37	32.73	1	39	34.51	1	38	33.58	2	30	26.43				
153 154	結腸直腸癌	3	21	18.41	3	18	15.81	3	13	11.46	6	17	15.04	3	22	19.47	3	24	21.21	3	24	21.15				
151	胃癌	6	16	14.03	4	16	14.05	5	12	10.57	4	19	16.81	6	12	10.62	4	19	16.79	4	15	13.22				
174	女性乳癌(1)	4	9	15.93	7	4	7.06	4	6	10.60	3	10	17.73	4	9	15.96	5	8	14.14	5	7	12.30				
200202203	非何杰金淋巴癌	7	8	7.02	9	7	6.15	7	7	6.17	15	4	3.54	9	6	5.31	7	8	7.07	6	11	9.69				
185	攝護腺癌(2)	8	4	6.95	17	1	1.75	-	-	-	11	3	5.30	7	4	7.07	7	4	7.07	7	5	8.84				
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	9	6	5.26	9	7	6.15	7	7	6.17	8	8	7.08	12	5	4.42	6	10	8.84	8	8	7.05				
156	膽囊癌	10	5	4.38	9	7	6.15	13	4	3.52	8	8	7.08	9	6	5.31	11	5	4.42	8	8	7.05				
179 180	子宮頸癌(1)	5	8	14.16	5	5	8.83	6	4	7.07	5	9	15.96	5	7	12.41	17	1	1.77	10	4	7.03				
	其他		42	36.83		45	39.51		43	37.89		42	37.15		42	37.16		56	49.49		42	37.01				

表53-9 · 臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續2）

疾病碼 ICD-10	死亡原因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	186	163.60	206	181.64	215	189.28	195	169.45	222	189.24	226	189.72						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66	1	52	45.85	1	51	44.90	1	44	38.24	1	48	40.92	1	43	36.10
C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87	3	22	19.40	2	37	32.57	2	30	26.07	2	36	30.69	2	32	26.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47	2	28	24.69	4	25	22.01	3	23	19.99	4	30	25.57	4	22	18.47
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	4	7.09	7	6	10.69	8	4	7.14	9	3	5.30	5	8	13.90	7	6	10.29
C50	女性乳房癌(1)	2	14	24.46	4	8	13.97	3	15	26.05	4	10	17.09	3	18	30.12	3	13	21.38
C16	胃癌	3	26	22.87	5	13	11.46	6	13	11.45	5	12	10.43	6	11	9.38	6	13	10.91
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	10	3	5.24	12	3	5.24	-	-	-	18	1	1.71	10	4	6.69	11	3	4.93
C25	胰臟癌	7	8	7.04	5	13	11.46	9	7	6.16	6	10	8.69	8	8	6.82	9	9	7.56
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	5	4.40	9	7	6.17	5	15	13.21	6	10	8.69	8	8	6.82	5	15	12.59
C15	食道癌	7	8	7.04	14	4	3.53	7	9	7.92	13	3	2.61	7	9	7.67	10	7	5.88
	其他		35	30.78		50	44.09		39	34.34		49	42.58		42	35.80		63	52.89

表53-9・臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
C00-C97	所有癌症死亡原因			228		189.20
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		45		37.34
C22	肝和肝內膽管癌	2		36		29.87
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3		24		19.92
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	4		10		16.98
C50	女性乳房癌(1)	5		10		16.23
C16	胃癌	6		19		15.77
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	7		7		11.36
C25	胰臟癌	8		8		6.64
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9		7		5.81
C15	食道癌	9		7		5.81
	其他			55		45.64

表53-10 · 臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		198	88.79		229	99.99		235	100.14		256	106.23		232	93.88		269	106.92						
162	肺癌	2	29	13.00	3	37	16.16	1	50	21.31	1	53	21.99	1	49	19.83	1	50	19.87						
153 154	結腸直腸癌	4	19	8.52	4	25	10.92	5	18	7.67	3	32	13.28	3	24	9.71	4	26	10.33						
155	肝癌	1	42	18.83	1	44	19.21	2	42	17.90	2	50	20.75	2	36	14.57	2	44	17.49						
151	胃癌	3	25	11.21	5	16	6.99	4	23	9.80	5	27	11.20	6	17	6.88	3	27	10.73						
174	女性乳癌(1)	5	8	7.20	2	20	17.46	3	14	11.88	4	15	12.37	5	11	8.83	5	12	9.44						
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.79	-	-	-	11	3	2.57	14	2	1.67	14	2	1.63	6	8	6.43						
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.79	8	9	3.93	13	4	1.70	17	1	0.41	9	8	3.24	12	6	2.38						
183	卵巢癌(1)	8	3	2.70	16	2	1.75	17	2	1.70	12	4	3.30	7	6	4.82	17	2	1.57						
200202203	非何杰金淋巴癌	9	6	2.69	7	12	5.24	8	8	3.41	6	13	5.39	8	10	4.05	9	9	3.58						
157	胰臟癌	11	5	2.24	10	6	2.62	6	13	5.54	9	9	3.73	15	4	1.62	8	13	5.17						
	其他		55	24.66		58	25.33		58	24.72		50	20.75		65	26.30		72	28.62						

資料來源：衛生福利部。

附註:(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-10・臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		293	115.33		342	133.30		302	116.51		314	120.54		306	117.01		357	135.62		373	140.72				
162	肺癌	1	58	22.83	1	81	31.57	1	61	23.53	2	55	21.11	1	56	21.41	1	87	33.05	1	71	26.79				
153 154	結腸直腸癌	3	39	15.35	3	34	13.25	4	27	10.42	3	41	15.74	3	41	15.68	4	33	12.54	2	52	19.62				
155	肝癌	2	45	17.71	2	56	21.83	2	49	18.90	1	58	22.27	2	43	16.44	2	53	20.13	3	47	17.73				
151	胃癌	5	21	8.27	4	30	11.69	5	26	10.03	6	19	7.29	7	24	9.18	4	33	12.54	4	33	12.45				
174	女性乳癌(1)	4	18	14.00	5	12	9.23	3	19	14.43	4	13	9.80	4	15	11.22	3	19	14.08	5	16	11.74				
185	攝護腺癌(2)	7	8	6.38	9	6	4.74	17	2	1.57	5	12	9.39	6	12	9.39	9	7	5.46	6	15	11.65				
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	18	5	1.97	6	14	5.46	10	8	3.09	9	13	4.99	15	5	1.91	10	10	3.80	7	16	6.04				
183	卵巢癌(1)	16	3	2.33	15	3	2.31	12	4	3.04	15	4	3.01	10	6	4.49	11	5	3.70	8	8	5.87				
200202203	非何杰金淋巴癌	8	11	4.33	13	7	2.73	6	19	7.33	10	11	4.22	9	12	4.59	8	16	6.08	9	15	5.66				
157	胰臟癌	12	7	2.76	6	14	5.46	7	11	4.24	8	14	5.37	12	9	3.44	6	19	7.22	9	15	5.66				
	其他		78	30.70		85	33.13		76	29.32		74	28.41		83	31.74		75	28.49		85	32.07				

表53-10・臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續2）

疾病碼 ICD-10	死亡原因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	366	137.51	365	136.57	364	135.33	376	137.75	418	150.45	403	143.20						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55	1	74	27.69	1	77	28.63	1	85	31.14	1	71	25.55	1	89	31.62
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28	2	60	22.45	2	48	17.85	3	37	13.56	3	56	20.16	3	55	19.54
C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80	3	59	22.08	3	46	17.10	2	56	20.52	2	63	22.68	2	69	24.52
C50	女性乳房癌(1)	3	21	15.32	4	16	11.60	4	20	14.37	4	19	13.43	4	23	15.95	4	20	13.67
C16	胃癌	5	25	9.39	5	21	7.86	6	21	7.81	6	21	7.69	8	20	7.20	7	21	7.46
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	6.97	6	9	6.96	5	11	8.48	5	16	12.17	7	10	7.48	5	15	11.10
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	11	4.13	9	14	5.24	11	10	3.72	11	8	2.93	9	18	6.48	10	14	4.97
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	9	3.38	12	8	2.99	13	8	2.97	8	18	6.59	12	11	3.96	14	6	2.13
C91-C95	白血病	15	6	2.25	10	10	3.74	15	6	2.23	11	8	2.93	13	9	3.24	10	14	4.97
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	-	-	-	13	4	2.90	8	8	5.75	13	4	2.83	5	17	11.79	6	11	7.52
	其他	105	39.45		90	33.68		109	40.52		104	38.10		120	43.19		89	31.62	

表53-10・臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
C00-C97	所有癌症死亡原因			398		139.99
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		88		30.95
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		48		16.88
C22	肝和肝內膽管癌	3		46		16.18
C50	女性乳房癌(1)	4		19		12.84
C16	胃癌	5		28		9.85
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6		13		9.54
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7		17		5.98
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8		16		5.63
C91-C95	白血病	9		14		4.92
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	10		6		4.05
	其他			103		36.23

表53-11 · 臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				85年				86年				87年				88年				89年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		322	107.80		383	129.25		388	131.94		389	131.74		371	125.33		408	138.39						
162	肺癌	1	74	24.77	1	76	25.65	1	88	29.93	1	75	25.40	1	82	27.70	1	92	31.20						
155	肝癌	2	62	20.76	2	68	22.95	2	66	22.44	2	64	21.68	2	55	18.58	2	66	22.39						
174	女性乳癌(1)	5	10	6.67	5	15	10.09	3	24	16.27	3	25	16.85	6	11	7.38	3	26	17.48						
153 154	結腸直腸癌	4	28	9.37	3	50	16.87	4	38	12.92	4	42	14.22	3	42	14.19	4	43	14.58						
185	攝護腺癌(2)	7	7	4.70	7	9	6.09	13	4	2.73	7	7	4.77	5	11	7.49	11	6	4.11						
151	胃癌	3	29	9.71	4	40	13.50	5	34	11.56	5	41	13.89	3	42	14.19	5	32	10.85						
183	卵巢癌(1)	9	6	4.00	12	5	3.36	7	7	4.75	8	6	4.04	17	2	1.34	18	2	1.34						
200202203	非何杰金淋巴癌	11	9	3.01	8	15	5.06	9	12	4.08	11	10	3.39	10	12	4.05	7	15	5.09						
157	胰臟癌	10	11	3.68	9	12	4.05	14	8	2.72	11	10	3.39	8	15	5.07	7	15	5.09						
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	6	2.01	10	11	3.71	14	8	2.72	14	9	3.05	10	12	4.05	15	8	2.71						
	其他		80	26.78		82	27.67		99	33.67		100	33.87		87	29.39		103	34.94						

資料來源：衛生福利部。

附註:(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-11・臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		424	144.58		461	157.99		433	149.13		476	164.67		456	158.15		489	169.80		533	185.31				
162	肺癌	1	86	29.32	1	85	29.13	1	97	33.41	1	120	41.51	1	99	34.33	1	101	35.07	1	113	39.29				
155	肝癌	2	72	24.55	2	66	22.62	2	77	26.52	2	66	22.83	2	67	23.24	2	83	28.82	2	83	28.86				
174	女性乳癌(1)	4	21	14.18	3	30	20.33	4	18	12.24	4	26	17.74	6	13	8.87	3	28	19.09	3	29	19.75				
153 154	結腸直腸癌	3	51	17.39	4	58	19.88	3	50	17.22	3	56	19.37	2	67	23.24	4	54	18.75	4	55	19.12				
185	攝護腺癌(2)	7	12	8.27	8	13	9.02	6	13	9.07	6	15	10.53	4	18	12.69	6	15	10.62	5	16	11.36				
151	胃癌	5	34	11.59	5	44	15.08	5	31	10.68	5	32	11.07	5	32	11.10	5	39	13.54	6	29	10.08				
183	卵巢癌(1)	8	8	5.40	10	6	4.07	17	2	1.36	8	9	6.14	15	4	2.73	8	9	6.14	7	14	9.53				
200202203	非何杰金淋巴癌	13	10	3.41	7	27	9.25	12	11	3.79	12	14	4.84	9	16	5.55	10	16	5.56	8	22	7.65				
157	胰臟癌	14	9	3.07	11	11	3.77	8	16	5.51	11	15	5.19	7	22	7.63	12	15	5.21	9	21	7.30				
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	12	4.09	11	11	3.77	7	18	6.20	7	24	8.30	9	16	5.55	7	19	6.60	10	19	6.61				
	其他		109	37.17		110	37.70		100	34.44		99	34.25		102	35.38		110	38.20		132	45.89				

表53-11・臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續2）

疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	475	165.76	482	169.15	483	169.95	546	191.04	498	172.93	600	207.38						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15	1	114	40.01	1	99	34.83	1	125	43.74	1	107	37.15	1	114	39.40
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38	4	45	15.79	3	59	20.76	3	67	23.44	3	54	18.75	2	73	25.23
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82	2	86	30.18	2	71	24.98	2	74	25.89	2	71	24.65	3	70	24.19
C50	女性乳房癌(1)	4	27	18.43	3	24	16.44	4	20	13.71	4	27	18.36	4	22	14.84	4	30	20.12
C25	胰臟癌	8	18	6.28	7	28	9.83	7	21	7.39	6	31	10.85	7	18	6.25	6	33	11.41
C16	胃癌	5	33	11.52	6	29	10.18	5	32	11.26	5	34	11.90	6	27	9.38	6	33	11.41
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	15	10.71	5	15	10.79	6	11	7.96	12	6	4.32	5	14	10.02	5	19	13.55
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93	8	14	4.91	9	17	5.98	7	20	7.00	12	13	4.51	8	31	10.71
C15	食道癌	7	19	6.63	13	10	3.51	8	20	7.04	8	17	5.95	10	15	5.21	10	23	7.95
C67	膀胱癌	18	3	1.05	10	12	4.21	16	7	2.46	13	12	4.20	11	14	4.86	15	10	3.46
	其他		107	37.34		105	36.85		126	44.34		133	46.54		143	49.66		164	56.69

表53-11・臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
C00-C97	所有癌症死亡原因			537		185.11
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		125		43.09
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		75		25.85
C22	肝和肝內膽管癌	3		66		22.75
C50	女性乳房癌(1)	4		31		20.71
C25	胰臟癌	5		35		12.06
C16	胃癌	6		29		10.00
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7		11		7.83
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8		21		7.24
C15	食道癌	9		16		5.52
C67	膀胱癌	10		15		5.17
	其他			113		38.95

表53-12 · 臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	單位：人，人/每十萬人口																	
		84年			85年			86年			87年			88年			89年		
順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 死 亡 率		
08-14	所有癌症死亡原因	277	114.03	316	130.49	307	126.96	326	133.63	344	139.59	357	144.18						
162	肺癌	2	52	21.41	1	74	30.56	1	72	29.78	1	66	27.05	1	77	31.24	1	76	30.69
155	肝癌	1	58	23.88	2	57	23.54	2	62	25.64	2	60	24.59	2	55	22.32	2	56	22.62
153 154	結腸直腸癌	5	18	7.41	5	24	9.91	4	30	12.41	3	40	16.40	3	39	15.83	3	43	17.37
174	女性乳癌(1)	3	19	15.73	4	14	11.61	5	10	8.29	5	11	9.01	4	16	12.93	4	17	13.65
151	胃癌	4	22	9.06	3	34	14.04	3	36	14.89	4	31	12.71	6	22	8.93	5	32	12.92
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.64	7	8	6.58	8	7	5.78	7	7	5.74	7	7	5.70	14	3	2.44
200202203	非何杰金淋巴癌	11	6	2.47	10	9	3.72	12	6	2.48	8	13	5.33	8	14	5.68	7	19	7.67
179 180	子宮頸癌(1)	6	8	6.62	6	10	8.29	5	10	8.29	9	6	4.91	5	12	9.70	6	12	9.64
157	胰臟癌	7	10	4.12	8	14	5.78	9	10	4.14	6	16	6.56	8	14	5.68	9	12	4.85
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.65	11	7	2.89	9	10	4.14	17	5	2.05	10	11	4.46	8	14	5.65
	其他		78	32.11		65	26.84		54	22.33		71	29.10		77	31.24		73	29.48

資料來源：衛生福利部。

附註:(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-12・臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年				91年				92年				93年				94年				95年				
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		399	160.78		356	143.25		392	157.38		375	150.60		399	160.59		401	161.17		463	185.33				
162	肺癌	1	88	35.46	1	84	33.80	1	86	34.53	1	81	32.53	1	78	31.39	1	92	36.98	1	106	42.43				
155	肝癌	2	70	28.21	2	52	20.92	2	60	24.09	2	72	28.91	2	64	25.76	2	63	25.32	2	61	24.42				
153 154	結腸直腸癌	4	37	14.91	3	42	16.90	3	45	18.07	3	42	16.87	3	52	20.93	3	46	18.49	3	59	23.62				
174	女性乳癌(1)	5	17	13.59	8	9	7.17	5	15	11.90	5	13	10.30	5	16	12.67	6	12	9.47	4	19	14.89				
151	胃癌	3	43	17.33	4	27	10.86	4	30	12.04	4	34	13.65	4	32	12.88	4	34	13.67	5	33	13.21				
185	攝護腺癌(2)	7	8	6.50	6	10	8.13	6	10	8.13	6	9	7.33	6	13	10.64	7	8	6.56	6	15	12.28				
200202203	非何杰金淋巴癌	10	13	5.24	7	19	7.65	8	13	5.22	11	11	4.42	8	16	6.44	8	15	6.03	7	26	10.41				
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	7.19	5	12	9.56	16	4	3.17	7	8	6.34	9	8	6.34	5	13	10.25	8	9	7.05				
157	胰臟癌	13	8	3.22	11	10	4.02	7	15	6.02	9	13	5.22	11	12	4.83	10	13	5.22	9	17	6.80				
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	15	6.04	13	8	3.22	9	12	4.82	10	12	4.82	7	17	6.84	10	13	5.22	10	16	6.40				
	其他		91	36.67		83	33.40		102	40.95		80	32.13		91	36.63		92	36.98		102	40.83				

表53-12・臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續2）

疾病碼 ICD-10	死亡原因	單位：人，人/每十萬人口																	
		97年			98年			99年			100年			101年			102年		
順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因	464	185.70	432	173.56	424	170.54	444	177.07	482	190.33	463	181.70						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82	1	84	33.75	1	97	39.01	1	92	36.69	1	97	38.30	1	95	37.28
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81	2	59	23.70	5	45	18.10	4	55	21.93	3	61	24.09	3	54	21.19
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62	3	57	22.90	2	59	23.73	2	73	29.11	2	70	27.64	2	72	28.26
C50	女性乳房癌(1)	4	20	15.62	4	28	21.92	3	28	21.90	3	29	22.46	5	17	13.03	4	24	18.27
C25	胰臟癌	8	19	7.60	8	17	6.83	8	17	6.84	6	17	6.78	7	21	8.29	8	18	7.06
C16	胃癌	6	27	10.81	6	27	10.85	6	23	9.25	5	29	11.57	4	44	17.37	7	21	8.24
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	11.49	5	14	11.56	4	23	19.04	7	8	6.58	6	14	11.40	5	15	12.15
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.20	7	20	8.04	9	15	6.03	8	16	6.38	8	16	6.32	6	28	10.99
C15	食道癌	10	13	5.20	8	17	6.83	11	12	4.83	8	16	6.38	13	11	4.34	12	12	4.71
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	12	6	4.69	12	6	4.70	12	5	3.91	12	5	3.87	10	7	5.37	11	7	5.33
	其他	129	51.63		103	41.38		100	40.22		104	41.48		124	48.97		117	45.92	

表53-12・臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續3完）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年				
		順 位	死 人	亡 數	每 人 死	十 亡
C00-C97	所有癌症死亡原因			460		179.35
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		84		32.75
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		65		25.34
C22	肝和肝內膽管癌	3		58		22.61
C50	女性乳房癌(1)	4		22		16.62
C25	胰臟癌	5		32		12.48
C16	胃癌	6		30		11.70
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7		14		11.28
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8		19		7.41
C15	食道癌	9		18		7.02
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	10		8		6.04
	其他			110		42.89

伍、歷年主要癌症發生率

表54・臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人／每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	247.37	216.08	34.38	28.83	38.69	35.97	34.08	29.37	26.82	22.51	16.02	12.04	12.32	11.68	4.68	4.05
85年	267.36	226.20	40.01	32.15	41.53	37.46	39.09	32.75	26.19	20.98	18.86	13.98	15.19	13.84	4.81	3.78
86年	266.91	220.52	37.80	29.26	44.42	39.08	36.72	30.44	26.25	20.38	21.40	15.83	12.86	11.45	5.70	4.54
87年	287.79	231.95	43.41	33.25	44.57	37.95	39.66	32.28	25.24	19.54	24.55	17.05	16.87	14.86	6.98	5.35
88年	306.62	268.49	43.38	36.36	46.89	42.54	42.84	38.20	24.29	20.45	29.10	23.72	18.40	16.97	6.95	5.66
89年	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90年	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91年	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92年	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93年	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94年	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95年	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26
96年	378.22	269.92	52.91	35.29	50.72	37.87	59.72	41.30	25.13	16.59	43.60	29.51	25.05	19.30	9.16	6.40
97年	419.14	290.36	57.04	37.19	53.42	38.00	70.42	48.07	26.67	16.95	55.16	34.93	28.80	21.56	9.99	6.85
98年	433.34	291.45	62.83	39.86	52.76	36.30	72.20	47.48	26.10	15.81	57.60	36.28	30.62	22.30	10.23	6.38
99年	456.61	303.85	61.07	38.75	54.41	37.43	80.47	53.22	26.61	15.61	58.37	36.42	28.59	20.26	9.82	6.30
100年	451.05	299.70	63.31	39.63	53.90	36.30	79.13	52.15	25.62	15.72	59.08	37.28	31.10	21.88	11.20	7.18
101年	459.72	298.65	61.77	37.67	52.36	34.50	83.56	53.18	24.66	14.53	57.65	35.21	30.89	21.68	10.97	6.89

資料來源：國民健康署。

附 註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表54・臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人／每十萬男性人口

年別	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.48	6.53	5.97	6.05	9.14	8.38	9.67	7.64	2.57	2.08	5.89	5.38	2.80	2.48	4.16	3.54
85年	6.34	5.59	5.50	5.29	8.93	8.13	10.46	8.09	1.91	1.53	4.73	4.10	3.36	3.18	3.21	2.99
86年	8.55	7.30	4.47	4.32	9.24	8.22	10.09	8.20	3.31	2.49	5.24	4.64	3.46	3.16	3.39	2.88
87年	7.06	5.71	5.37	5.20	7.29	6.22	12.66	9.50	2.91	2.31	5.98	5.06	2.53	2.46	3.61	2.86
88年	9.39	8.39	5.04	4.86	8.94	8.06	13.52	11.32	2.67	2.19	3.89	3.34	3.67	3.68	4.89	4.26
89年	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90年	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91年	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92年	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93年	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94年	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95年	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69
96年	10.96	7.94	9.78	8.19	10.02	7.85	11.19	7.32	4.07	2.78	6.18	4.67	3.13	2.59	4.07	2.97
97年	12.75	9.08	9.13	7.31	8.81	7.04	13.06	8.79	3.86	2.54	7.55	5.34	3.78	3.51	4.48	3.04
98年	11.19	7.77	9.84	7.76	10.00	7.84	13.41	8.28	3.57	2.21	6.51	4.63	3.25	2.95	4.60	3.33
99年	12.59	8.33	12.83	9.34	9.82	7.59	13.15	8.02	4.75	3.15	9.43	6.48	4.59	3.50	5.54	3.49
100年	10.89	7.25	11.83	9.23	9.25	7.21	14.10	8.70	4.39	2.49	7.99	5.77	2.90	2.25	4.54	2.94
101年	12.37	8.03	11.20	8.01	9.96	7.35	12.91	7.80	4.59	2.75	10.43	7.03	3.73	3.17	3.97	2.60

表55・臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人／每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	213.99	200.47	18.64	18.77	23.72	23.42	42.81	38.25	12.81	12.62	12.58	12.11	3.33	3.20	23.26	21.95
85年	249.83	225.27	19.40	18.26	28.26	27.09	47.28	40.79	15.28	14.93	14.66	13.20	3.67	3.49	26.58	24.20
86年	258.48	227.82	19.80	17.73	27.32	25.15	53.42	44.91	16.65	16.39	14.35	12.57	3.30	3.07	26.94	23.38
87年	282.48	240.29	21.06	18.80	31.62	27.55	55.26	45.34	16.12	14.77	12.39	10.47	3.34	2.97	24.48	20.76
88年	293.65	268.19	20.05	19.10	32.44	30.93	65.92	57.65	18.77	18.27	13.66	12.77	3.53	3.31	22.15	19.72
89年	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90年	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91年	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92年	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93年	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94年	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95年	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21
96年	328.84	236.19	32.11	22.18	48.16	33.66	92.48	66.76	19.53	13.51	14.06	9.49	5.62	3.78	12.06	8.53
97年	351.41	244.08	34.99	23.40	49.63	32.68	96.16	67.67	22.56	15.27	14.20	9.24	6.51	4.29	12.94	8.79
98年	396.37	269.25	43.95	28.41	54.34	35.37	109.65	76.05	21.68	13.79	15.29	9.64	8.54	5.54	14.11	9.59
99年	394.55	262.64	43.06	26.78	55.96	35.31	110.60	75.15	21.90	14.11	13.49	8.15	7.23	4.39	13.12	8.74
100年	408.04	269.40	41.47	25.97	60.89	37.26	113.70	76.63	23.13	14.31	15.06	9.29	9.89	6.18	13.53	9.05
101年	413.08	268.08	46.83	28.44	60.31	36.11	115.93	78.19	21.04	12.94	15.20	8.71	9.08	5.43	12.54	8.44

資料來源：國民健康署。

附 註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表55・臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.20	6.62	2.88	3.04	1.89	1.99	4.24	4.19	4.32	4.50	2.88	2.27	2.05	2.09	3.11	3.03
85年	6.95	6.23	4.20	4.25	2.52	2.40	5.50	4.93	2.29	2.30	3.28	2.55	2.14	2.19	2.67	2.53
86年	7.60	6.52	2.53	2.68	2.30	2.04	6.60	5.96	2.46	2.17	3.61	3.02	1.84	1.92	4.22	3.86
87年	9.58	8.15	4.03	3.95	3.27	2.69	8.44	7.49	2.58	2.32	4.03	3.41	2.05	1.83	3.65	3.11
88年	9.54	8.62	3.00	3.06	2.10	2.08	6.76	6.17	2.18	2.16	3.23	2.73	2.25	2.13	5.41	5.18
89年	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90年	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91年	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92年	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93年	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94年	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95年	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67
96年	11.61	8.93	5.03	4.55	3.18	2.09	13.76	10.11	2.44	1.79	2.89	2.15	2.22	2.04	5.40	3.52
97年	12.35	9.00	5.25	4.19	3.85	2.48	16.79	11.52	3.55	2.64	3.40	2.60	2.96	2.61	5.18	3.21
98年	12.62	9.16	7.28	5.54	3.49	2.15	16.26	11.06	3.86	2.61	2.08	1.53	1.71	1.50	5.57	3.38
99年	13.79	9.96	6.19	4.66	4.20	2.58	19.76	13.57	3.83	2.44	3.02	2.13	2.51	2.17	4.65	2.88
100年	14.11	10.06	6.47	5.33	4.00	2.33	18.77	12.58	3.49	2.31	2.69	2.02	3.27	2.62	5.24	3.05
101年	11.89	8.56	7.49	5.79	3.75	2.21	19.81	13.16	3.82	2.48	2.52	1.80	2.52	1.94	4.76	2.73

陸、附錄

【附錄 1】103 年臺北市十大死因出爐了 癌症續居首位，慢性疾病占了 7 項

103 年臺北市十大死因出爐了，惡性腫瘤仍續居首位，慢性疾病占了 7 項，每 100 人中有 66 人死於慢性疾病，十大死因與 102 年相比僅排名順序異動，自殺則連續 7 年退出十大。十大癌症死因仍以肺癌蟬聯第一，大腸癌則超越肝癌升至第 2 名。

103 年臺北市民死亡人數為 1 萬 6,953 人，較 102 年增加 853 人(5.3%)；死亡率為每十萬人口 629.2 人，亦較 102 年增加 28.4 人(4.7%)，死亡者平均年齡為 75.0 歲，較全國 71.8 歲為高。如依 WHO 編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 332.5 人，較 102 年增加 6.2 人(1.9%)，並較全國標準化死亡率 443.6 人低，在全國 22 縣市中，僅高於金門縣，為死亡率第二低的縣市。

十大主要死因死亡人數占總死亡人數的 7 成 7，慢性疾病占了 7 項(占 65.6%)，惡性腫瘤(占 28.9%)仍居首位，其餘依序為心臟疾病(占 14.7%)；腦血管疾病(占 7.1%)；肺炎(占 6.3%)；糖尿病(占 5.0%)；慢性下呼吸道疾病(占 3.9%)；腎炎、腎病症候群及腎病變(占 3.3%)；高血壓性疾病(占 2.7%)；事故傷害(占 2.7%)；敗血症(占 2.6%)。與 102 年比較，僅排名順序異動，腎炎、腎病症候群及腎病變與事故傷害各前進 1 名為第 7、9 名、高血壓性疾病與敗血症各退後 1 名為第 8、10 名。

103 年臺北市十大主要死因標準化死亡率較 102 年增加者有 6 項，分別為肺炎(增 17.9%)、心臟疾病(增 16.1%)、腎炎、腎病症候群及腎病變(增 8.8%)、事故傷害(增 6.7%)、慢性下呼吸道疾病(增 6.2%)、腦血管疾病(增 0.4%)；減少者有 4 項，分別為高血壓性疾病(減 13.8%)、敗血症(減 7.3%)、糖尿病(減 3.6%)、惡性腫瘤(減 3.1%)。

依性別觀察，103 年兩性死因前三名皆為惡性腫瘤、心臟疾病及腦血管疾病，與 102 年比較，順位皆無變動。死亡人數、死亡率及標準化死亡率呈男高於女。男、女性標準化死亡率分別較 102 年增加 3.2% 及 0.2%，男性增幅最多為心臟疾病 16.2%，腎炎、腎病症候群及腎病變 13.4% 次之，減幅最多為高血壓性疾病 11.2%。女性增幅最多為肺炎 33.7%，骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 28.2% 次之，減幅最大為高血壓性疾病 14.3%。

依年齡層觀察，103 年臺北市 15-24 歲青年死因前三名為事故傷害(占 26.3%)、自殺(占 25.3%)及惡性腫瘤(占 14.1%)；25-44 歲壯年則以惡性腫瘤(占 30.4%)為首、自殺(占 15.0%)及心臟疾病(占 12.7%)次之；45-64 歲中年仍以惡性腫瘤(占 45.1%)居首位、心臟疾病(占 12.6%)及腦血管疾病(占 5.7%)次之；65 歲以上老年則以惡性腫瘤(占 25.2%)、心臟疾病(占 15.5%)及腦血管疾病(占 7.7%)居前三名。

103 年臺北市民因自殺死亡人數為 311 人，較 102 年增加 50 人(19.2%)，其死亡人數依年齡層分以 45-64 歲占 33.1% 最多，25-44 歲占 30.9% 次之；若依自殺死亡方式區分，則以利用懸吊、絞勒及閉息死亡者占 33.4% 最多。103 年自殺標準死亡率為每十萬人口 9.1 人，相較 102 年上升 23.0%，居 103 年臺北市主要死因第 11 順位，較 102 年上升 1 個順位，繼 97 年連續 7 年退出十大主要死因。

103 年臺北市民癌症死亡人數為 4,903 人，較 102 年減少 16 人，平均約每 1 小時 47 分鐘就有 1 位市民因癌症死亡；死亡率為每十萬人口 182.0 人，死亡者平均年齡為 70.7 歲，較全國 68.1 歲高；若經標準化之死亡率後為 103.7

人，較 102 年 107.7 人減少 3.1%，並較全國標準化死亡率 130.2 人低，在全國各縣市中僅高於金門縣。十大癌症死因仍以肺癌居首，其他依序為 2.結腸直腸癌、3.肝癌、4.女性乳癌、5.攝護腺癌、6.胃癌、7.胰臟癌、8.口腔癌、9.卵巢癌、10.非何杰金氏淋巴瘤；與 102 年比較，結腸直腸癌前進一名為第 2 名，肝癌退後一名為第 3 名。

103 年臺北市十大癌症死因標準化死亡率較 102 年增加者有 4 項，增幅較多者為胰臟癌(增 12.2%)、女性乳癌(增 6.7%)；減少者有 6 項，減幅較多者為口腔癌(減 18.4%)、攝護腺癌(減 13.6%)。

若依性別觀察，103 年臺北市男性十大癌症死因除膀胱癌前進 1 名至第 10 名、白血病後退 2 名至第 12 名外，其餘死因及順位與 102 年相同；男性標準化死亡率較 102 年減少，其中以口腔癌減少 15.4% 最多，攝護腺癌減少 13.6% 次之。女性十大癌症死因除胰臟癌與非何杰金氏淋巴瘤各前進 1 名、胃癌及子宮頸及部位未明示子宮癌各後退 1 名外，其餘死因與順位皆與 102 年相同；女性標準化死亡率較 102 年減少，其中以子宮頸及部位未明示子宮癌減少 28.1% 最多，白血病減少 18.2% 次之。

臺北市政府衛生局為提供市民方便性及可近性之篩檢服務，與 11 家特約醫院診所及十二區健康服務中心合作，從 104 年 3 月至 8 月於各行政區之學校、區(里)民活動中心等社區服務據點，辦理『成人整合性預防保健服務』，免費提供「四大癌症篩檢」(子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌)及「成人健康檢查」(身體基礎檢查、生化檢查、尿液檢查)，於社區就近服務市民，免除至醫院排隊掛號之麻煩，歡迎市民朋友踴躍參加。凡設籍臺北市的市民更可透過申辦「台北卡」，只要在 104 年 9 月 30 日前參加四癌篩檢，或篩檢陽性個案完成複檢，最高可獲得點數 985 點(1 點可兌換 1 元悠遊卡加值金)，相關活動可洽臺北市十二區健康服務中心或參閱衛生局網頁。因此，臺北市政府衛生局也呼籲民眾平日除了飲食均衡、少鹽少油多蔬果、每週運動至少 150 分鐘、不抽菸的良好習慣外，也不要忘了每年定期接受健康篩檢，以降低罹癌與慢性病風險。

表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因

民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男性				女性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比%	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比%	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比%
1	所有死亡原因	16,953	629.2	100.0	所有死亡原因	9,908	766.4	100.0	所有死亡原因	7,045	502.6	100.0
1	惡性腫瘤	4,903	182.0	28.9	惡性腫瘤	2,824	218.4	28.5	惡性腫瘤	2,079	148.3	29.5
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,489	92.4	14.7	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,480	114.5	14.9	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,009	72.0	14.3
3	腦血管疾病	1,212	45.0	7.1	腦血管疾病	722	55.8	7.3	腦血管疾病	490	35.0	7.0
4	肺炎	1,060	39.3	6.3	肺炎	638	49.4	6.4	肺炎	422	30.1	6.0
5	糖尿病	854	31.7	5.0	慢性下呼吸道疾病	476	36.8	4.8	糖尿病	421	30.0	6.0
6	慢性下呼吸道疾病	657	24.4	3.9	糖尿病	433	33.5	4.4	腎炎、腎病症候群及腎病變	272	19.4	3.9
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	556	20.6	3.3	事故傷害	318	24.6	3.2	高血壓性疾病	220	15.7	3.1
8	高血壓性疾病	461	17.1	2.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	284	22.0	2.9	慢性下呼吸道疾病	181	12.9	2.6
9	事故傷害	458	17.0	2.7	敗血症	269	20.8	2.7	敗血症	176	12.6	2.5
10	敗血症	445	16.5	2.6	高血壓性疾病	241	18.6	2.4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	161	11.5	2.3
	其他	3,858	143.2	22.8	其他	2,223	172.0	22.4	其他	1,614	115.2	22.9

資料來源：衛生福利部。

表2 ICD-10 臺北市10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	102年		103年		較上年增減率(%)
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	
	所有死亡原因	326.3	所有死亡原因	332.5	1.9
1	惡性腫瘤	107.0	惡性腫瘤	103.7	-3.1
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	39.8	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	46.2	16.1
3	腦血管疾病	22.3	腦血管疾病	22.4	0.4
4	肺炎	14.5	肺炎	17.1	17.9
5	糖尿病	16.8	糖尿病	16.2	-3.6
6	慢性下呼吸道疾病	9.7	慢性下呼吸道疾病	10.3	6.2
7	高血壓性疾病	8.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.9	8.8
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.1	高血壓性疾病	7.5	-13.8
9	敗血症	8.2	事故傷害	11.2	6.7
10	事故傷害	10.5	敗血症	7.6	-7.3

資料來源：衛生福利部。

表3 ICD-10 臺北市男性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	102年		103年		較上年增減率(%)
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	
	所有死亡原因	409.6	所有死亡原因	422.8	3.2
1	惡性腫瘤	130.9	惡性腫瘤	127.7	-2.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	53.2	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	61.8	16.2
3	腦血管疾病	28.2	腦血管疾病	29.5	4.6
4	肺炎	19.9	肺炎	22.2	11.6
5	慢性下呼吸道疾病	15.3	慢性下呼吸道疾病	15.9	3.9
6	糖尿病	18.4	糖尿病	18.3	-0.5
7	敗血症	10.0	事故傷害	17.0	13.3
8	事故傷害	15.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	11.0	13.4
9	高血壓性疾病	9.8	敗血症	10.0	0.0
10	腎炎、腎病徵候群及腎病變	9.7	高血壓性疾病	8.7	-11.2

資料來源：衛生福利部。

表4 ICD-10 臺北市女性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	102年		103年		較上年增減率(%)
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	
	所有死亡原因	253.9	所有死亡原因	254.3	0.2
1	惡性腫瘤	86.2	惡性腫瘤	83.1	-3.6
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	28.4	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	33.1	16.5
3	腦血管疾病	17.4	腦血管疾病	16.3	-6.3
4	糖尿病	15.6	肺炎	12.7	33.7
5	肺炎	9.5	糖尿病	14.4	-7.7
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.0	3.4
7	高血壓性疾病	7.7	高血壓性疾病	6.6	-14.3
8	敗血症	6.5	慢性下呼吸道疾病	5.2	13.0
9	慢性下呼吸道疾病	4.6	敗血症	5.6	-13.8
10	事故傷害	6.3	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5.0	28.2

資料來源：衛生福利部。

表5 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因

民國103年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男性				女性			
	癌症死亡原因	死 亡	每十萬 人口	死亡人數	癌症死亡原因	死 亡	每十萬 男性人口	死亡人數	癌症死亡原因	死 亡	每十萬 女性人口	死亡人數
		人 數	死 亡 率	%		人 數	死 亡 率	%		人 數	死 亡 率	%
	所有癌症死亡原因	4,903	182.0	100.0	所有癌症死亡原因	2,824	218.4	100.0	所有癌症死亡原因	2,079	148.3	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	992	36.8	20.2	氣管、支氣管和肺癌	588	45.5	20.8	氣管、支氣管和肺癌	404	28.8	19.4
2	結腸、直腸和肛門癌	666	24.7	13.6	肝和肝內膽管癌	447	34.6	15.8	結腸、直腸和肛門癌	302	21.5	14.5
3	肝和肝內膽管癌	666	24.7	13.6	結腸、直腸和肛門癌	364	28.2	12.9	女性乳房癌	289	20.6	13.9
4	女性乳房癌①	289	20.6	5.9	胃癌	199	15.4	7.0	肝和肝內膽管癌	219	15.6	10.5
5	前列腺(攝護腺)癌②	151	11.7	3.1	口腔癌	152	11.8	5.4	胰臟癌	124	8.8	6.0
6	胃癌	312	11.6	6.4	前列腺(攝護腺)癌	151	11.7	5.3	胃癌	113	8.1	5.4
7	胰臟癌	257	9.5	5.2	胰臟癌	133	10.3	4.7	卵巢癌	84	6.0	4.0
8	口腔癌	174	6.5	3.5	食道癌	124	9.6	4.4	非何杰金氏淋巴瘤	63	4.5	3.0
9	卵巢癌	84	6.0	1.7	非何杰金氏淋巴瘤	92	7.1	3.3	子宮頸及部位未明示 子宮癌	58	4.1	2.8
10	非何杰金氏淋巴瘤	155	5.8	3.2	膀胱癌	66	5.1	2.3	白血病	43	3.1	2.1
	其他	1,157	42.9	23.6	其他	508	39.3	18.0	其他	380	27.1	18.3

資料來源：衛生福利部。

附 註:①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表6 ICD-10 臺北市10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	102年		103年		較上年增減率(%)
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	
1	所有癌症死因	107.0	所有癌症死因	103.7	-3.1
1	氣管、支氣管和肺癌	20.7	氣管、支氣管和肺癌	20.3	-1.9
2	肝和肝內膽管癌	15.4	結腸、直腸和肛門癌	13.5	0.7
3	結腸、直腸和肛門癌	13.4	肝和肝內膽管癌	14.2	-7.8
4	女性乳房癌①	11.9	女性乳房癌①	12.7	6.7
5	前列腺(攝護腺)癌②	5.9	前列腺(攝護腺)癌②	5.1	-13.6
6	胃癌	6.3	胃癌	6.1	-3.2
7	胰臟癌	4.9	胰臟癌	5.5	12.2
8	口腔癌	4.9	口腔癌	4.0	-18.4
9	卵巢癌①	3.8	卵巢癌①	3.6	-5.3
10	非何杰金氏淋巴瘤	3.2	非何杰金氏淋巴瘤	3.3	3.1

資料來源：衛生福利部。

附 註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表7 ICD-10 臺北市男性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	102年		103年		較上年增減率(%)
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	130.9	所有癌症死亡原因	127.7	-2.4
1	氣管、支氣管和肺癌	26.9	氣管、支氣管和肺癌	25.8	-4.1
2	肝和肝內膽管癌	23.4	肝和肝內膽管癌	21.2	-9.4
3	結腸、直腸和肛門癌	16.2	結腸、直腸和肛門癌	16.2	0.0
4	胃癌	7.8	胃癌	8.2	5.1
5	口腔癌	9.1	口腔癌	7.7	-15.4
6	前列腺(攝護腺)癌	5.9	前列腺(攝護腺)癌	5.1	-13.6
7	胰臟癌	5.6	胰臟癌	6.3	12.5
8	食道癌	5.4	食道癌	6.0	11.1
9	非何杰金氏淋巴瘤	3.4	非何杰金氏淋巴瘤	4.1	20.6
10	白血病	3.7	膀胱癌	2.6	13.0

資料來源：衛生福利部。

表8 ICD-10 臺北市女性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	102年		103年		較上年增減率(%)
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	86.2	所有癌症死亡原因	83.1	-3.6
1	氣管、支氣管和肺癌	15.4	氣管、支氣管和肺癌	15.7	1.9
2	結腸、直腸和肛門癌	10.9	結腸、直腸和肛門癌	11.3	3.7
3	女性乳房癌	11.9	女性乳房癌	12.7	6.7
4	肝和肝內膽管癌	8.7	肝和肝內膽管癌	8.2	-5.7
5	胃癌	4.9	胰臟癌	4.8	11.6
6	胰臟癌	4.3	胃癌	4.3	-12.2
7	卵巢癌	3.8	卵巢癌	3.6	-5.3
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	3.2	非何杰金氏淋巴瘤	2.6	-16.1
9	非何杰金氏淋巴瘤	3.1	子宮頸及部位未明示子宮癌	2.3	-28.1
10	白血病	2.2	白血病	1.8	-18.2

資料來源：衛生福利部。

【附錄2】ICD-10 新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較

表1.新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較

順位	新北市 2014				臺中市 2014				臺南市 2014				高雄市 2014			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比												
	所有死亡原因	21,711	548.14	100.00	所有死亡原因	15,888	586.11	100.00	所有死亡原因	14,333	760.88	100.00	所有死亡原因	20,167	725.58	100.00
1	惡性腫瘤	6,469	163.32	29.80	惡性腫瘤	4,739	174.82	29.83	惡性腫瘤	4,335	230.13	30.24	惡性腫瘤	5,895	212.09	29.23
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,820	71.20	12.99	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,536	56.66	9.67	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,389	73.74	9.69	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,012	72.39	9.98
3	腦血管疾病	1,499	37.85	6.90	腦血管疾病	1,113	41.06	7.01	肺炎	1,114	59.14	7.77	肺炎	1,444	51.95	7.16
4	糖尿病	1,287	32.49	5.93	糖尿病	1,030	38.00	6.48	腦血管疾病	1,036	55.00	7.23	腦血管疾病	1,355	48.75	6.72
5	肺炎	1,247	31.48	5.74	肺炎	839	30.95	5.28	糖尿病	1,031	54.73	7.19	糖尿病	1,184	42.60	5.87
6	慢性下呼吸道疾病	797	20.12	3.67	事故傷害	766	28.26	4.82	事故傷害	584	31.00	4.07	事故傷害	918	33.03	4.55
7	事故傷害	764	19.29	3.52	慢性下呼吸道疾病	617	22.76	3.88	慢性下呼吸道疾病	538	28.56	3.75	慢性下呼吸道疾病	703	25.29	3.49
8	高血壓性疾病	646	16.31	2.98	高血壓性疾病	585	21.58	3.68	高血壓性疾病	444	23.57	3.10	慢性肝病及肝硬化	656	23.60	3.25
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	625	15.78	2.88	腎炎、腎病症候群及腎病變	507	18.70	3.19	腎炎、腎病症候群及腎病變	432	22.93	3.01	高血壓性疾病	654	23.53	3.24
10	慢性肝病及肝硬化	571	14.42	2.63	慢性肝病及肝硬化	486	17.93	3.06	慢性肝病及肝硬化	380	20.17	2.65	腎炎、腎病症候群及腎病變	594	21.37	2.95
	其他	4,986	125.88	22.97	其他	3,670	135.39	23.10	其他	3,050	161.91	21.28	其他	4,752	170.97	23.56
11	蓄意自我傷害（自殺）	560	14.14	2.58	蓄意自我傷害（自殺）	382	14.09	2.40	蓄意自我傷害（自殺）	285	15.13	1.99	敗血症	474	17.05	2.35
12	敗血症	460	11.61	2.12	敗血症	275	10.14	1.73	敗血症	263	13.96	1.83	蓄意自我傷害（自殺）	448	16.12	2.22
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	286	7.22	1.32	衰老/老邁	146	5.39	0.92	衰老/老邁	184	9.77	1.28	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	187	6.73	0.93
14	血管性及未明示之癱瘓症	251	6.34	1.16	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	135	4.98	0.85	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	124	6.58	0.87	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	132	4.75	0.65
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	187	4.72	0.86	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	134	4.94	0.84	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	108	5.73	0.75	衰老/老邁	130	4.68	0.64

資料來源：衛生福利部。

表2.新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較

順位	新北市 2014				臺中市 2014				臺南市 2014				高雄市 2014			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比												
	惡性腫瘤	6,469	163.32	100.00	惡性腫瘤	4,739	174.82	100.00	惡性腫瘤	4,335	230.13	100.00	惡性腫瘤	5,895	212.09	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	1,357	34.26	20.98	氣管、支氣管和肺癌	880	32.46	18.57	肝和肝內膽管癌	860	45.65	19.84	氣管、支氣管和肺癌	1,125	40.48	19.08
2	肝和肝內膽管癌	1,009	25.47	15.60	肝和肝內膽管癌	822	30.32	17.35	氣管、支氣管和肺癌	792	42.04	18.27	肝和肝內膽管癌	1,087	39.11	18.44
3	結腸、直腸和肛門癌	752	18.99	11.62	結腸、直腸和肛門癌	563	20.77	11.88	結腸、直腸和肛門癌	584	31.00	13.47	結腸、直腸和肛門癌	746	26.84	12.65
4	女性乳房癌(1)	310	15.42	4.79	女性乳房癌(1)	275	20.11	5.80	女性乳房癌(1)	200	21.29	4.61	女性乳房癌(1)	253	18.14	4.29
5	胃癌	381	9.62	5.89	口腔癌	270	9.96	5.70	前列腺(攝護腺)癌(2)	113	11.97	2.61	口腔癌	383	13.78	6.50
6	口腔癌	369	9.32	5.70	前列腺(攝護腺)癌(2)	121	9.01	2.55	口腔癌	218	11.57	5.03	前列腺(攝護腺)癌(2)	136	9.82	2.31
7	胰臟癌	297	7.50	4.59	胃癌	233	8.60	4.92	胃癌	203	10.78	4.68	胃癌	256	9.21	4.34
8	前列腺(攝護腺)癌(2)	138	7.07	2.13	食道癌	204	7.53	4.30	胰臟癌	171	9.08	3.94	胰臟癌	230	8.28	3.90
9	食道癌	268	6.77	4.14	胰臟癌	185	6.82	3.90	食道癌	132	7.01	3.04	食道癌	224	8.06	3.80
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	95	4.73	1.47	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	70	5.12	1.48	膀胱癌	107	5.68	2.47	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	93	6.67	1.58
	其他	1,493	37.69	23.08	其他	1,116	41.17	23.55	其他	955	50.70	22.03	其他	1,362	49.00	23.10
11	卵巢癌(1)	86	4.28	1.33	卵巢癌(1)	67	4.90	1.41	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	52	5.54	1.20	卵巢癌(1)	73	5.23	1.24
12	非何杰金氏淋巴瘤	168	4.24	2.60	非何杰金氏淋巴瘤	109	4.02	2.30	卵巢癌(1)	50	5.32	1.15	白血病	140	5.04	2.37
13	白血病	140	3.53	2.16	白血病	105	3.87	2.22	非何杰金氏淋巴瘤	87	4.62	2.01	非何杰金氏淋巴瘤	127	4.57	2.15
14	鼻咽癌	115	2.90	1.78	膀胱癌	96	3.54	2.03	白血病	82	4.35	1.89	膀胱癌	109	3.92	1.85
15	膀胱癌	104	2.63	1.61	子宮體癌(1)	37	2.71	0.78	膽囊和其他膽道癌	74	3.93	1.71	子宮體癌(1)	39	2.80	0.66

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

表1.臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2014				全國 2014				日本 2013(平成25年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	16,953	629.19	100.00	所有死亡原因	162,911	696.09	100.00	所有死亡原因	1,268,436	1009.07	100.00
1	惡性腫瘤	4,903	181.97	28.92	惡性腫瘤	46,094	196.95	28.29	惡性腫瘤	364,872	290.26	28.77
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,489	92.38	14.68	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	19,400	82.89	11.91	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	196,723	156.50	15.51
3	腦血管疾病	1,212	44.98	7.15	腦血管疾病	11,736	50.15	7.20	肺炎	122,969	97.82	9.69
4	肺炎	1,060	39.34	6.25	肺炎	10,352	44.23	6.35	腦血管疾病	118,347	94.15	9.33
5	糖尿病	854	31.70	5.04	糖尿病	9,845	42.07	6.04	老邁	69,720	55.46	5.50
6	慢性下呼吸道疾病	657	24.38	3.88	事故傷害	7,123	30.44	4.37	事故傷害	39,574	31.48	3.12
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	556	20.64	3.28	慢性下呼吸道疾病	6,430	27.47	3.95	自殺	26,063	20.73	2.05
8	高血壓性疾病	461	17.11	2.72	高血壓性疾病	5,459	23.33	3.35	腎衰竭	25,101	19.97	1.98
9	事故傷害	458	17.00	2.70	慢性肝病及肝硬化	4,962	21.20	3.05	慢性阻塞性肺病	16,443	13.08	1.30
10	敗血症	445	16.52	2.62	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,868	20.80	2.99	主動脈瘤及剝離	16,105	12.81	1.27
	其他	3,858	143.19	22.76	其他	36,642	156.57	22.49	其他	272,519	216.79	21.48
11	蓄意自我傷害（自殺）	311	11.54	1.83	蓄意自我傷害（自殺）	3,546	15.15	2.18	肝臟疾病	15,930	12.67	1.26
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	309	11.47	1.82	敗血症	3,434	14.67	2.11	糖尿病	13,812	10.99	1.09
13	慢性肝病及肝硬化	284	10.54	1.68	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,606	6.86	0.99	敗血症	11,158	8.88	0.88
14	血管性及未明示之癥狀	198	7.35	1.17	衰老/老邁	1,461	6.24	0.90	原位及良性腫瘤	10,995	8.75	0.87
15	帕金森病	135	5.01	0.80	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,357	5.80	0.83	血管性及未明示之癥狀	9,992	7.95	0.79

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2014				全國 2014				日本 2013(平成25年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	110	377.05	100.00	所有死亡原因	763	360.93	100.00	所有死亡原因	2,185	212.17	100.00
1	源於周產期的特定病況(1)	55	188.52	50.00	先天性畸形、變形及染色體異常	148	70.01	19.40	先天性畸形變形及染色體異常	811	78.75	37.12
2	先天性畸形變形及染色體異常	25	85.69	22.73	源於周產期的呼吸性疾患	103	48.72	13.50	源於周產期的特定病況	548	53.21	25.08
3	事故傷害	5	17.14	4.55	事故傷害	57	26.96	7.47	源於周產期的呼吸和心臟血管疾患	308	29.91	14.10
4	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	5	17.14	4.55	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	42	19.87	5.50	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	124	12.04	5.68
5	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	3	10.28	2.73	特發於周產期的感染	32	15.14	4.19	事故傷害	89	8.64	4.07
6	肺炎	2	6.86	1.82	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	30	14.19	3.93	胎兒及新生兒出血及血液疾患	76	7.38	3.48
7	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	6.86	1.82	胎兒及新生兒出血及血液疾患	23	10.88	3.01	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	63	6.12	2.88
8	腦血管疾病	1	3.43	0.91	肺炎	20	9.46	2.62	妊娠期間及胎兒生長有關的疾患	59	5.73	2.70
9					心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	17	8.04	2.23	敗血症	42	4.08	1.92
10					母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	17	8.04	2.23	肺炎	37	3.59	1.69
	其他	12	41.13	10.91	其他	274	129.61	35.91	其他	28	2.72	1.28

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

附註：(1)源於周產期的特定病況包含胎兒及新生兒受母體因素和妊娠、產程[臨產]及分娩併發症的影響、妊娠期長短和胎兒生長有關的疾患、生產創傷、特發於周產期的呼吸和心臟血管疾患、特發於周產期的感染(症)、胎兒及新生兒出血和血液疾患、特發於胎兒及新生兒的短暫性內分泌和(新陳)代謝(性)疾患、胎兒和新生兒消化系統疾患、侵及(侵犯、涉及)胎兒及新生兒體被[被膜、皮膚]和體溫調節的病況。

表3. 少年（1-14歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2014				全國 2014				日本 2013(平成25年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	50	14.04	100.00	所有死亡原因	500	16.02	100.00	所有死亡原因	1,693	11.12	100.00
1	惡性腫瘤	16	4.49	32.00	事故傷害	119	3.81	23.80	惡性腫瘤	286	1.88	16.89
2	先天性畸形變形及染色體異常	7	1.97	14.00	惡性腫瘤	109	3.49	21.80	事故傷害	282	1.85	16.66
3	事故傷害	7	1.97	14.00	先天性畸形變形及染色體異常	47	1.51	9.40	先天性畸形變形及染色體異常	182	1.20	10.75
4	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	5	1.40	10.00	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	30	0.96	6.00	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	99	0.65	5.85
5	肺炎	2	0.56	4.00	加害（他殺）	11	0.35	2.20	自殺	92	0.60	5.43
6	加害（他殺）	1	0.28	2.00	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	9	0.29	1.80	肺炎	83	0.55	4.90
7	敗血症	1	0.28	2.00	腦血管疾病	8	0.26	1.60	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	66	0.43	3.90
8	貧血	1	0.28	2.00	肺炎	8	0.26	1.60	敗血症	37	0.24	2.19
9	腦血管疾病	1	0.28	2.00	流行性感冒	6	0.19	1.20	腸道感染症	34	0.22	2.01
10	慢性下呼吸道疾病	1	0.28	2.00	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	0.16	1.00	他殺	32	0.21	1.89
	其他	8	2.25	16.00	其他	148	4.74	29.60	其他	500	3.28	29.53

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2014				全國 2014				日本 2013(平成25年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	99	32.63	100.00	所有死亡原因	1,190	37.84	100.00	所有死亡原因	3,691	30.82	100.00
1	事故傷害	26	8.57	26.26	事故傷害	585	18.60	49.16	自殺	1,708	14.26	46.27
2	蓄意自我傷害（自殺）	25	8.24	25.25	蓄意自我傷害（自殺）	162	5.15	13.61	事故傷害	747	6.24	20.24
3	惡性腫瘤	14	4.61	14.14	惡性腫瘤	117	3.72	9.83	惡性腫瘤	325	2.71	8.81
4	加害（他殺）	6	1.98	6.06	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	42	1.34	3.53	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	163	1.36	4.42
5	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	0.66	2.02	先天性畸形變形及染色體異常	20	0.64	1.68	先天性畸形變形及染色體異常	50	0.42	1.35
6	肺炎	2	0.66	2.02	加害（他殺）	19	0.60	1.60	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	48	0.40	1.30
7	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	0.66	2.02	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	0.48	1.26	腦血管疾病	46	0.38	1.25
8	腦血管疾病	2	0.66	2.02	肺炎	11	0.35	0.92	肺炎	41	0.34	1.11
9	慢性下呼吸道疾病	2	0.66	2.02	腦血管疾病	10	0.32	0.84	他殺	26	0.22	0.70
10	疝氣及腸阻塞	1	0.33	1.01	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	0.25	0.67	敗血症	15	0.13	0.41
	其他	17	5.60	17.17	其他	201	6.39	16.89	其他	522	4.36	14.14

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2014				全國 2014				日本 2013(平成25年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	638	77.46	100.00	所有死亡原因	9,152	124.16	100.00	所有死亡原因	23,363	71.83	100.00
1	惡性腫瘤	194	23.55	30.41	惡性腫瘤	2,322	31.50	25.37	自殺	7,176	22.06	30.72
2	蓄意自我傷害（自殺）	96	11.66	15.05	事故傷害	1,319	17.89	14.41	惡性腫瘤	5,304	16.31	22.70
3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	81	9.83	12.70	蓄意自我傷害（自殺）	1,162	15.76	12.70	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,327	7.15	9.96
4	事故傷害	51	6.19	7.99	慢性肝病及肝硬化	801	10.87	8.75	事故傷害	2,004	6.16	8.58
5	腦血管疾病	33	4.01	5.17	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	757	10.27	8.27	腦血管疾病	1,352	4.16	5.79
6	慢性肝病及肝硬化	19	2.31	2.98	腦血管疾病	375	5.09	4.10	肝臟疾病	638	1.96	2.73
7	糖尿病	12	1.46	1.88	糖尿病	195	2.65	2.13	肺炎	323	0.99	1.38
8	肺炎	11	1.34	1.72	肺炎	131	1.78	1.43	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	234	0.72	1.00
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	0.85	1.10	高血壓性疾病	118	1.60	1.29	主動脈瘤及剝離	197	0.61	0.84
10	人類免疫缺乏病毒（HIV）疾病	6	0.73	0.94	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	116	1.57	1.27	糖尿病	170	0.52	0.73
	其他	128	15.54	20.06	其他	1,856	25.18	20.28	其他	3,638	11.19	15.57

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2014				全國 2014				日本 2013(平成25年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人 口死亡率	死 亡 百 分 比	死亡原因	死亡人數	每十萬人 口死亡率	死 亡 百 分 比	死亡原因	死亡人數	每十萬人 口死亡率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	3,187	392.20	100.00	所有死亡原因	37,600	550.99	100.00	所有死亡原因	128,931	388.56	100.00
1	惡性腫瘤	1,438	176.97	45.12	惡性腫瘤	16,028	234.88	42.63	惡性腫瘤	58,068	175.00	45.04
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	400	49.23	12.55	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	3,745	54.88	9.96	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	15,808	47.64	12.26
3	腦血管疾病	183	22.52	5.74	慢性肝病及肝硬化	2,246	32.91	5.97	腦血管疾病	9,757	29.40	7.57
4	糖尿病	138	16.98	4.33	腦血管疾病	2,134	31.27	5.68	自殺	8,776	26.45	6.81
5	事故傷害	121	14.89	3.80	事故傷害	2,123	31.11	5.65	事故傷害	5,186	15.63	4.02
6	慢性肝病及肝硬化	119	14.64	3.73	糖尿病	1,801	26.39	4.79	肝臟疾病	4,681	14.11	3.63
7	蓄意自我傷害（自 殺）	103	12.68	3.23	蓄意自我傷害（自 殺）	1,358	19.90	3.61	肺炎	3,323	10.01	2.58
8	腎炎、腎病症候群 及腎病變	62	7.63	1.95	肺炎	844	12.37	2.24	糖尿病	1,661	5.01	1.29
9	肺炎	61	7.51	1.91	腎炎、腎病症候群 及腎病變	786	11.52	2.09	主動脈瘤及剝離	1,581	4.76	1.23
10	敗血症	48	5.91	1.51	高血壓性疾病	762	11.17	2.03	腎衰竭	1,021	3.08	0.79
	其他	514	63.25	16.13	其他	5,773	84.60	15.35	其他	19,069	57.47	14.79

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表7.老年人口(65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2014				全國 2014				日本 2013(平成25年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	12,869	3,463.45	100.00	所有死亡原因	113,706	4,132.44	100.00	所有死亡原因	1,108,045	3,487.71	100.00
1	惡性腫瘤	3,241	872.25	25.18	惡性腫瘤	27,514	999.95	24.20	惡性腫瘤	300,852	946.97	27.15
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,998	537.72	15.53	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14,809	538.21	13.02	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	178,221	560.97	16.08
3	腦血管疾病	992	266.98	7.71	肺炎	9,338	339.37	8.21	肺炎	119,146	375.03	10.75
4	肺炎	982	264.29	7.63	腦血管疾病	9,202	334.43	8.09	腦血管疾病	107,133	337.21	9.67
5	糖尿病	704	189.47	5.47	糖尿病	7,838	284.86	6.89	老邁	69,693	219.37	6.29
6	慢性下呼吸道疾病	618	166.32	4.80	慢性下呼吸道疾病	5,969	216.93	5.25	事故傷害	31,225	98.28	2.82
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	487	131.07	3.78	高血壓性疾病	4,577	166.34	4.03	腎衰竭	23,992	75.52	2.17
8	高血壓性疾病	420	113.04	3.26	腎炎、腎病症候群及腎病變	3,980	144.65	3.50	慢性阻塞性肺病	15,989	50.33	1.44
9	敗血症	393	105.77	3.05	事故傷害	2,920	106.12	2.57	主動脈瘤及剝離	14,319	45.07	1.29
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	278	74.82	2.16	敗血症	2,847	103.47	2.50	糖尿病	11,960	37.65	1.08
	其他	2,756	741.73	21.42	其他	24,712	898.11	21.73	其他	235,515	741.31	21.26

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標

表1.臺北市行政區別衛生統計指標 — 人口統計

中華民國103年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km ²	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km ²	9,942	22,661	20,491	27,610	16,847	21,478	23,053	21,996	8,693	5,551	9,049	4,657	4,532
年底人口數	總計	人	2,702,315	210,473	229,657	313,693	230,496	163,388	130,973	194,715	273,921	121,257	285,767	290,455	257,520
	男性	人	1,295,636	99,430	110,182	146,903	107,664	78,158	64,003	96,205	131,932	59,213	136,922	140,510	124,514
	女性	人	1,406,679	111,043	119,475	166,790	122,832	85,230	66,970	98,510	141,989	62,044	148,845	149,945	133,006
	性比例		92.11	89.54	92.22	88.08	87.65	91.70	95.57	97.66	92.92	95.44	91.99	93.71	93.62
人口變動	出生數	人	29,024	2,046	2,505	2,974	2,622	1,674	1,535	2,260	2,830	1,467	3,171	3,113	2,827
	死亡數	人	17,177	1,265	1,469	2,101	1,442	1,139	880	1,687	1,685	743	1,369	1,822	1,575
	粗出生率	%	10.77	9.72	10.94	9.49	11.42	10.25	11.77	11.64	10.38	12.17	11.15	10.73	11.02
	粗死亡率	%	6.38	6.01	6.41	6.70	6.28	6.98	6.75	8.69	6.18	6.17	4.82	6.28	6.14
	人口增加率	%	5.88	0.62	5.08	1.05	7.62	1.52	8.88	6.38	9.51	12.57	10.34	2.46	8.13
	自然增加率	%	4.40	3.71	4.52	2.78	5.14	3.28	5.02	2.95	4.20	6.01	6.34	4.45	4.88
	社會增加率	%	1.47	-3.09	0.55	-1.73	2.45	-1.76	3.82	3.41	5.26	6.48	3.95	-1.99	3.21
生育率	一般生育率		42	38	43	39	44	41	47	47	40	46	41	43	42
	總生育率		1,350	1,280	1,335	1,295	1,370	1,365	1,420	1,445	1,320	1,400	1,315	1,335	1,325
	15-19歲	%	2	-	3	2	1	0	2	4	1	2	2	1	2
	20-24歲	%	14	11	14	7	15	13	17	23	11	17	11	15	14
	24-29歲	%	60	55	54	53	61	61	67	74	60	69	58	59	64
	30-34歲	%	115	113	116	111	112	124	116	113	113	114	119	114	112
	35-39歲	%	67	69	66	74	72	64	71	64	67	66	63	67	62
	40-44歲	%	11	8	13	11	12	10	11	11	11	12	10	10	10
	45-49歲	%	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
人口組成	14歲以下(a)	人	382,795	32,232	29,633	47,848	29,539	27,058	17,989	22,945	40,444	16,847	42,772	38,813	36,675
(年底)	15-64歲(b)	人	1,938,993	145,842	165,070	213,434	167,469	111,717	93,945	140,366	198,462	89,468	215,427	210,702	187,091
	65歲以上(c)	人	380,527	32,399	34,954	52,411	33,488	24,613	19,039	31,404	35,015	14,942	27,568	40,940	33,754
人口組成結構比(年底)	14歲以下	%	14.17	15.31	12.90	15.25	12.82	16.56	13.73	11.78	14.76	13.89	14.97	13.36	14.24
	15-64歲	%	71.75	69.29	71.88	68.04	72.66	68.38	71.73	72.09	72.45	73.78	75.39	72.54	72.65
	65歲以上	%	14.08	15.39	15.22	16.71	14.53	15.06	14.54	16.13	12.78	12.32	9.65	14.10	13.11
	扶養比(a+c)/b	%	39.37	44.32	39.13	46.97	37.64	46.25	39.41	38.72	38.02	35.53	32.65	37.85	37.64
	老化指數c/a	%	99.41	100.52	117.96	109.54	113.37	90.96	105.84	136.87	86.58	88.69	64.45	105.48	92.04

表2.臺北市行政區別衛生統計指標 — 醫療資源

中華民國103年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家	38	5	2	5	4	4	1	4	2	1	3	1	6
	診所		3,412	294	274	753	454	269	170	201	188	82	230	308	189
	護產機構		118	17	7	17	20	9	5	5	9	3	6	11	9
	精神復建機構		48	4	1	3	9	4	2	2	3	2	3	6	9
	其他醫療及醫事機構		207	19	22	31	38	16	10	10	11	6	21	14	9
	非醫事機構		974	69	79	82	92	89	60	85	86	44	85	106	97
	藥商		11,422	1,080	1,065	1,680	1,888	1,082	835	567	488	345	1,112	763	517
病床數	總計	床	24,899	1,885	1,681	3,404	2,080	3,731	650	646	968	476	2,384	1,657	5,337
	醫院病床		20,257	1,325	1,438	2,130	1,279	3,316	444	456	844	432	2,115	1,380	5,098
	一般急性病床		14,086	745	970	1,607	793	2,289	316	171	580	281	1,551	917	3,866
	一般慢性病床		619	103	133	-	20	-	-	79	-	-	-	-	284
	特殊病床		5,552	477	335	523	466	1,027	128	206	264	151	564	463	948
	診所病床		4,642	560	243	1,274	801	415	206	190	124	44	269	277	239
醫事人力 (醫療及醫事機構)	總計	人	49,164	3,566	3,130	6,745	4,943	7,535	1,346	1,497	2,441	1,045	4,349	3,711	8,856
	醫師		12,841	895	860	2,035	1,328	1,980	366	427	707	271	1,081	1,012	1,879
	西醫師		9,040	519	544	1,290	899	1,594	209	256	471	181	790	685	1,602
	中醫師		869	76	82	150	123	80	66	51	51	26	46	65	53
	牙醫師		2,932	300	234	595	306	306	91	120	185	64	245	262	224
	藥事人員		5,495	507	425	741	727	614	268	278	292	164	509	419	551
	護產人員		24,422	1,683	1,454	2,999	2,291	3,973	539	600	1,138	477	2,165	1,811	5,292
	醫檢人員		3,368	230	149	503	279	653	95	68	126	64	323	187	691
	其他		3,038	251	242	467	318	315	78	124	178	69	271	282	443
平均 每萬人 醫療資源	醫院	家	0.14	0.24	0.09	0.16	0.17	0.24	0.08	0.21	0.07	0.08	0.10	0.03	0.23
	診所		12.63	13.97	11.93	24.00	19.70	16.46	12.98	10.32	6.86	6.76	8.05	10.60	7.34
	病床數	床	92.14	89.56	73.20	108.51	90.24	228.35	49.63	33.18	35.34	39.26	83.42	57.05	207.25
	醫事人員數		181.93	169.43	136.29	215.02	214.45	461.17	102.77	76.88	89.11	86.18	152.19	127.77	343.90
	醫師	人	47.52	42.52	37.45	64.87	57.61	121.18	27.94	21.93	25.81	22.35	37.83	34.84	72.97
	西醫師		33.45	24.66	23.69	41.12	39.00	97.56	15.96	13.15	17.19	14.93	27.64	23.58	62.21
	中醫師	人	3.22	3.61	3.57	4.78	5.34	4.90	5.04	2.62	1.86	2.14	1.61	2.24	2.06
	牙醫師		10.85	14.25	10.19	18.97	13.28	18.73	6.95	6.16	6.75	5.28	8.57	9.02	8.70
	藥事人員	人	20.33	24.09	18.51	23.62	31.54	37.58	20.46	14.28	10.66	13.52	17.81	14.43	21.40
	護產人員		90.37	79.96	63.31	95.60	99.39	243.16	41.15	30.81	41.54	39.34	75.76	62.35	205.50
	醫檢人員	人	12.46	10.93	6.49	16.03	12.10	39.97	7.25	3.49	4.60	5.28	11.30	6.44	26.83
	其他		11.24	11.93	10.54	14.89	13.80	19.28	5.96	6.37	6.50	5.69	9.48	9.71	17.20

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計

中華民國103年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	腦血管疾病		3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
	肺炎		4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	6	4	4
	糖尿病		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
	慢性下呼吸道疾病		6	8	7	6	6	6	7	7	6	4	6	6	6
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		7	7	6	8	7	6	7	6	6	7	10	8	7
	高血壓性疾病		8	6	10	7	8	10	8	9	10	12	9	10	8
	事故傷害		9	9	9	9	12	9	9	8	9	8	7	7	9
	敗血症		10	10	8	10	9	8	9	10	8	9	11	9	10
十大死因 死亡率	所有死亡原因	人/每十 萬人口	629.19	587.91	643.89	655.12	623.19	669.47	646.49	850.60	615.48	617.40	479.77	622.20	615.25
	惡性腫瘤		181.97	180.60	189.02	189.14	185.96	178.24	180.99	235.96	169.46	189.20	139.99	185.11	179.35
	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）		92.38	92.68	83.38	101.11	90.58	109.64	106.60	130.35	86.56	78.01	73.51	86.87	84.22
	腦血管疾病		44.98	43.25	44.09	47.20	43.98	57.58	42.18	55.64	39.98	58.09	36.93	42.74	41.33
	肺炎		39.34	33.27	55.44	38.27	32.23	47.78	40.65	55.64	42.92	38.17	20.75	35.85	40.55
	糖尿病		31.70	29.47	30.12	30.62	29.61	27.56	34.51	51.52	30.08	32.36	21.46	31.37	37.43
	慢性下呼吸道疾病		24.38	16.63	23.57	27.11	23.08	20.21	31.44	31.43	23.84	20.75	21.46	26.20	26.51
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		20.64	18.54	27.07	18.50	20.47	20.21	19.17	34.00	24.21	19.09	10.55	18.27	21.05
	高血壓性疾病		17.11	20.44	13.53	21.37	18.29	17.15	17.64	25.25	14.31	9.96	11.26	15.17	19.88
	事故傷害		17.00	12.36	17.02	14.03	11.76	17.76	15.34	26.79	19.07	16.60	15.12	20.34	18.32
	敗血症		16.52	11.88	20.95	13.40	16.11	18.99	15.34	22.15	21.64	14.94	10.20	16.89	17.16

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續1)

中華民國103年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	332.49	282.34	316.23	289.90	331.74	321.84	350.58	405.16	342.44	379.17	338.86	335.93	355.76
	惡性腫瘤		103.66	94.62	104.37	93.05	103.84	95.13	102.39	121.04	102.13	122.64	103.82	106.70	110.46
	心臟疾病 (高血 壓性疾病除外)		46.23	43.14	39.14	41.22	47.38	49.31	54.84	59.90	45.71	44.88	50.04	44.38	45.56
	腦血管疾病		22.40	18.27	20.21	19.41	22.72	25.41	22.03	23.79	21.44	34.78	25.50	21.62	22.59
	肺炎		17.10	14.19	20.93	13.38	14.80	17.15	19.56	21.57	19.61	20.77	12.93	15.74	18.88
	糖尿病		16.16	13.07	15.06	12.21	15.11	12.75	18.52	24.77	16.46	19.71	14.81	16.27	20.21
	慢性下呼吸道疾病		10.28	5.68	8.62	9.44	10.20	8.31	14.75	10.63	10.14	10.06	13.37	11.36	13.19
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		9.89	7.65	12.10	6.53	9.35	8.65	9.23	14.98	12.28	11.18	7.45	8.99	11.79
	高血壓性疾病		7.55	8.33	6.04	7.27	8.27	6.58	8.04	10.47	6.01	5.33	6.92	7.04	9.95
	事故傷害		11.23	7.73	12.21	9.46	7.11	10.02	8.96	16.86	12.02	11.72	11.56	13.42	13.69
	敗血症		7.62	4.78	9.08	5.09	7.33	8.84	7.72	8.32	10.54	7.80	5.90	8.30	8.93
十大死因 標準化 死亡率 區排名	所有死亡原因	區排名	12	10	11	8	9	4	1	5	2	6	7	3	
	惡性腫瘤		11	5	12	6	10	8	2	9	1	7	4	3	
	心臟疾病 (高血 壓性疾病除外)		10	12	11	5	4	2	1	6	8	3	9	7	
	腦血管疾病		12	10	11	5	3	7	4	9	1	2	8	6	
	肺炎		10	2	11	9	7	5	1	4	3	12	8	6	
	糖尿病		10	8	12	7	11	4	1	5	3	9	6	2	
	慢性下呼吸道疾病		12	10	9	6	11	1	5	7	8	2	4	3	
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		10	3	12	6	9	7	1	2	5	11	8	4	
	高血壓性疾病		3	10	6	4	9	5	1	11	12	8	7	2	
	事故傷害		11	4	9	12	8	10	1	5	6	7	3	2	
	敗血症		12	2	11	9	4	8	5	1	7	10	6	3	

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續2完)

中華民國103年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	全部	人/每十 萬人口	629.19	587.91	643.89	655.12	623.19	669.47	646.49	850.60	615.48	617.40	479.77	622.20	615.25
	0歲		406.98	372.24	258.01	285.41	369.53	759.49	574.71	240.04	451.13	361.27	432.83	383.48	535.78
	1- 4歲		15.98	11.59	10.54	23.00	53.15	14.03	17.40	-	17.55	18.25	16.64	-	9.22
	5-14歲		13.14	18.28	5.63	12.44	5.68	5.42	9.25	38.97	18.88	10.11	3.59	8.15	25.81
	15-24歲		32.63	13.23	32.08	39.21	25.22	17.06	7.10	34.19	42.56	28.38	48.81	36.10	33.79
	25-44歲		77.46	61.40	85.00	79.30	91.29	65.44	87.22	92.69	87.44	86.30	59.60	69.34	73.49
	45-64歲		392.20	305.82	376.55	340.79	432.46	372.62	421.47	589.02	354.61	477.09	323.36	397.45	425.52
	65歲以上		3,463.45	3,131.32	3,328.26	3,186.34	3,165.73	3,595.86	3,399.65	3,995.72	3,750.58	3,672.19	3,721.17	3,418.68	3,543.67
年齡別 死亡率 區排名	全部	區排名	11	5	3	6	2	4	1	9	8	12	7	10	
	0歲		7	11	10	8	1	2	12	4	9	5	6	3	
	1- 4歲		8	9	2	1	7	5	11	4	3	6	11	10	
	5-14歲		4	10	5	9	11	11	1	3	11	12	8	2	
	15-24歲		11	7	3	9	10	12	5	2	12	1	4	6	
	25-44歲		11	6	7	2	10	4	1	3	5	12	9	8	
	45-64歲		12	7	10	3	8	5	1	9	2	11	6	4	
	65歲以上		12	9	10	11	5	8	1	2	4	3	7	6	

【附錄 5】主要名詞解釋與公式

本死因統計摘要係依據世界衛生組織所公告之「國際疾病與死因分類標準第十版 (ICD-10)」加註死因碼，所統計之死因為原死因 (Underlying causes of death)。

一、原（肇始）死因

死亡證明書上所填之死因係指所有導致死亡或與死亡相關的疾病、罹病狀況、或是造成這些傷害的意外或暴力環境等。

原死因係指(a)可引起一連串病症而導致直接死亡之疾病或傷害；(b)造成致命傷害之事故或暴力之環境。

二、孕產婦死亡

孕產婦死亡係指在懷孕期間或懷孕終止後 42 天內之婦女死亡，而不論其懷孕期長短或懷孕的位置為何；或任何與懷孕有關或因懷孕而加重之原因所導致之死亡。但不包括因事故或偶發原因所致之死亡。

孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡數／活產嬰兒數 * 100,000。

三、嬰兒死亡

嬰兒死亡係指嬰兒出生後未滿一歲之死亡數。

嬰兒死亡率 = 嬰兒死亡數/活產嬰兒數 * 1,000。

四、新生兒死亡

新生兒死亡率指係指嬰兒出生後，在未滿四週（28天）內之死亡數。

新生兒死亡率 = 新生兒死亡數 / 活產嬰兒數 * 1,000。

五、年齡別死亡率

年齡別死亡率 = 年齡別死亡數 / 該年齡別年中人口數 * 100,000。

六、標準化死亡率

標準化死亡率是將兩國或兩地不同性別、年齡、城鄉、所得、職業、婚姻、種族等項組合，化成為同一的基礎，用以剔除其人口在組合上之差異，俾可受到純正而客觀的比較。本書刊所用的標準化死亡率是指去除年齡組成影響、以 WHO 2000 年世界人口結構為基準的死亡率。

標準化死亡率 = $[\Sigma (\text{年齡別死亡率} * \text{標準組年齡別人口數})] / \text{標準組總人口數}$ 。