



日本腦炎疫苗接種 Inactivated polio vaccine

一、疫苗介紹：

日本腦炎疫苗為一種不活性病毒疫苗，如果要得到最好的免疫效果，必須在一定的時間內完成三劑的基礎疫苗接種，滿五歲時再追加一劑。

二、禁忌症：

- (一)發高燒，或有明顯營養障礙者。
- (二)患有比感冒還嚴重的疾病者。
- (三)有心血管疾病，腎臟，肝臟疾病，糖尿病或腳氣病者，正在急性期或惡化期者。
- (四)接種後，曾有明顯副作用者。
- (五)在接種前一年內曾發生痙攣者。
- (六)孕婦及產婦。

三、接種後反應及注意事項：

- (一)因為不活性疫苗反應較小，一般無不良反應，但偶有局部反應，在接種部位有發紅、腫脹、疼痛等症狀。
- (二)偶有全身反應，如發燒、惡寒、頭痛及倦怠症，經 2-3 天會消失。
- (三)發生嚴重的反應機會很低，約百萬分之一，導致死亡約千萬分之一。
- (四)接種後，請多喝開水，多休息，如有特殊反應時，可至轄區健康中心或醫院診治處理。
- (五)接種後，請多喝開水多休息，在極微小的機率下，若接種後有特殊反應或下列情形，請速至醫院診治，如有疑問，可洽詢衛生局預防接種諮詢專線：27205256 或各區健康中心，若確定為疑似預防接種引起之嚴重副作用，可申請行政院衛生署「預防接種受害救濟」：
 - 1.休克現象或過敏反應。
 - 2.抽搐或意識障礙。

【續後頁】

吳劭彥(2015)・預防兒童流感最好年年接種疫苗・彰基院訊，32卷(1)，P9 - 9
台北市政府衛生局(2012)・預防接種作業與兒童預防接種紀錄檢查及補行辦法
衛生署福利部疾病管制署(2013-03-19)・日本腦炎・取至
<https://www.cdc.gov.tw/qa.aspx?treeid=578435bfd011a1c&nowtreeid=7054d8bdbc75ea3d>

國光生物科技股份有限公司(2014)・日本腦炎疫苗使用說明書

No.C0217
臺北市立聯合醫院 105 年 01 月 01 日修訂