

預防登革熱 防護措施要做好 容器減量 巡倒清刷一定要



避免病媒蚊孳生，做好登革熱預防措施

1

到東南亞旅遊、活動時，要做好防蚊措施，回國後若身體不適，要馬上看醫生。

2

戶外活動要避免被蚊子叮咬，可穿著淺色長袖、長褲、使用衛生福利部核可之防蚊藥品。

3

住家應裝紗窗、紗門，並隨手關紗窗、紗門，防止蚊蟲叮咬。

4

家戶內外花瓶和盛水容器要每週清洗一次，並記得刷洗容器內壁。

5

廢棄輪胎、積水容器要馬上清除。



典型登革熱症狀

突發性的高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象。

依背頁「臺北市政府衛生局登革熱/屈公病/茲卡病毒感染症病媒蚊孳生源自我檢查表」檢視住家及周圍環境易形成病媒蚊孳生源的積水容器。

1
巡



經常巡檢，
避免戶內外積水

2
倒



清除積水，
必要的容器倒置

3
清



容器減量，
清除不要的容器

4
刷



刷洗容器，
避免蟲卵再附著



臺北市政府衛生局
Department of Health, Taipei City Government

臺北市政府衛生局防疫專線 02-2375 3782

臺北市民當家熱線 1999

衛生福利部疾病管制署疫情通報及關懷專線 1922

廣告