防跌密碼

防止嬰幼兒跌落及因應處理指引

嬰幼兒跌落常見場域

❶嬰兒車

減害：選用結構穩度、具剎車、符合經濟部安全標準(CNS12940)之嬰兒車，勿吊掛過多物品，且勿獨留嬰幼兒於車上。

❷機車

減害：準備符合頭圍之安全帽

❸居家環境(床、沙發、餐椅、樓梯)

減害：減少環境中高度的落差，並裝設緩衝設施，詳見衛生福利部國民健康署「兒童居家安全環境檢視手冊」

醫療諮詢顧問：
國立臺灣大學醫學院附設醫院兒少保護醫療中心

嬰幼兒跌落怎麼辦?

❶頭部受傷

72小時密切觀察期，若有以下狀況，請立刻就醫：

- 睡眠時間過長
- 前囟門澎出
- 持續嘔吐頭痛
- 頭部腫脹或凹陷
- 躁動難以安撫
- 走路不穩
- 痙攣
- 視線模糊等症狀

❷跌落受傷

意外跌落後，若有以下狀況，請立刻就醫：

- 意識不清或者昏迷
- 全身有任何撕裂性傷口
- 頭顱有明顯腫脹或凹陷
- 手腳活動反常

臺北市政府社會局　臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心　關心您

廣告