



三合一疫苗接種

DTaP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis);DTP

一、疫苗介紹：

三合一疫苗是利用組織培養製造出來的活性減毒疫苗，使用皮下注射，可用來預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹。它對三種疾病的預防效果可達95%以上，並可以長期免疫。建議於出生滿12個月、滿五歲各接種一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)。

二、禁忌症：

- (一)嚴重急性呼吸道感染者或其他感染導致高燒者。
- (二)免疫能力不全者。
- (三)正在使用腎上腺皮質素或抗癌藥物治療者。
- (四)孕婦。
- (五)如曾接受一般肌肉注射免疫球蛋白或B型肝炎免疫球蛋白(HBIG)，應間隔3個月以後才能接種。
- (六)輸過血，應間隔6個月後再接種。
- (七)曾靜脈注射血漿、血小板製品或靜脈注射高劑量免疫球蛋白治療時，應間隔11個月後再接種。



三、接種後反應及注意事項：

- (一)局部反應較少。
- (二)麻疹疫苗在接種後第5-12天，偶有疹子、咳嗽、鼻炎或發燒等症狀。
- (三)德國麻疹疫苗偶有發燒、暫時性關節痛、神經炎等副作用。
- (四)腮腺炎疫苗曾有引起輕微中樞神經反應之病例報告，但機率極少。
- (五)接種後3個月內應避免懷孕。
- (六)接種後，請多喝開水多休息，若有特殊反應或下列情形，請速至醫院診治：
 - 1.全身性休克或過敏反應。
 - 2.發高燒及皮膚有全身性紅疹者。

【續後頁】

參考資料

吳劭彥(2015) `預防兒童流感最好年年接種疫苗` 彰基院訊, 32 卷(1), P9 – 9。

台北市政府衛生局(2012) `預防接種作業與兒童預防接種紀錄檢查及補行辦法

衛生署福利部疾病管制署(2011) 五合一疫苗取至

<https://www.cdc.gov.tw/qa.aspx?treeid=5784355bfd011a1c&nowtreeid=7054d8bdbe75ea3d>.

No.C0216

臺北市立聯合醫院 105 年 01 月 01 日修訂