臺北市立聯合醫院
TAIPEI CITY HOSPITAL

藥物衛教單張 編號

Acetaminophen 500mg 3

鐳 藥品商品名

Paramol(普除痛錠)

Depyretin(得百利寧錠)

鐳 藥物作用

Acetaminophen 可緩解發燒以及輕至中度的疼痛。它可治療的疼痛包括頭痛, 肌肉痛, 骨關節炎, 生理痛, 感冒症狀，背痛與施打疫苗引起的注射部位疼痛。

鐳 服用方式

大人與 >12 歲兒童: 每 4 至 6 小時可服用 1-2 顆 (一天最多 8 顆)。除非經醫師指示, 勿連續使用超過 3 天。

7 – 12 歲兒童：每 4 至 6 小時可服用 1 顆 (一天最多 4 顆)。除非經醫師指示, 勿連續使用超過 2 天。

＜7 歲兒童: 不建議使用

藥品需與水或其他液體一起服用。勿超過建議劑量且服藥時間至少間隔 4 小時。當忘記服用一個劑量時, 盡可能在您想起時立刻補服一個劑量。但若幾乎到吃下一個劑量的時間, 那就略過前次劑量, 而在下次用藥時間服藥。

鏘 注意事項

1. **若對 acetaminophen 或其他仿單所標示的賦形劑過敏, 則不可使用藥品。服用藥品前也需告知醫師或藥師是否有肝臟, 腎臟方面的疾病, 飲酒習慣或目前有嚴重的感染疾病。**
2. 服用藥品期間應盡量避免飲酒, 兩者併用會增加在肝臟的副作用。**不應與其他含有 acetaminophen 成分的藥品同時使用因會造成劑量過高甚至中毒。**
3. 請告知醫師或藥師目前是否有在使用其他藥物(包括非處方藥, 中藥以及保健食品)。
4. **如果您有以下症狀, 請立即告知您的醫師或藥師, 或直接前往附近的醫院急診就醫: 呼吸急促, 喘鳴或無法呼吸, 臉部, 唇, 舌頭, 喉嚨或其他身體部位腫脹, 起疹, 脫皮, 蕁麻疹, 皮膚癢, 口腔潰瘍, 異常出血或瘀血。**

5. 孕婦用藥等級 A, 沒有致畸形之慮, 為安全藥物。但如果您已懷孕或計畫準備懷孕, 就診時還是請務必告知醫師。

6. 哺乳期間可放心使用, 為安全藥物。