

降血壓藥


7A病房關心您

簡介

▶ 作用：
降血壓、利尿

▶ 副作用：

鉀離子過高、
血壓過低，要
注意心跳過慢、
心悸、臉部潮
紅、頭痛、腸
胃不適



Diovan 得安穩錠



Norvasc 脈優



Doxaben 可迅



Exforge 易安穩膜衣錠



Sevikar 舒脈康膜衣錠



護理指導

- ▶ 每日應定時測量血壓並記錄，於返診時提供醫師參考。
- ▶ 當身體要變化姿勢時，一定要緩慢的移動。
- ▶ 當服用藥物後的30分鐘到1小時內，避免活動，預防跌倒。
- ▶ 服用完藥物後的二小時內，儘量避免開車或操作機器，以防低血壓發作引起意外。

- ▶ 高血壓必須長期治療，才能避免心血管併發症的發生，應每天定時服用，不可因血壓下降而擅自停藥，如此可能引起血壓反彈上升，使病情惡化。
- ▶ 長期服用降血壓藥者，由於飲酒會增加藥物的血管擴張作用，引起姿勢性低血壓，所以避免飲酒。
- ▶ 忘記服藥時可立即補服，若已接近下次服藥時間則不補服，仍按原時間服藥，不可服用雙倍劑量。

用藥安心諮詢專線

- ▶ 如用藥問題，可撥打陽明院
區藥劑科諮詢專線
2535-3456轉(日)6123(夜)6175

