

全民總動員

移除

外來種

注意 沙氏變色蜥



沙氏變色蜥(*Anolis sagrei*)，又名褐樹蜥(Brown anole)。原產於古巴、巴哈馬列島，入侵美國佛羅里達州。體長約4.8-6.4公分，體重約4-8克的中小型蜥蜴，常出現於高度1公尺以下的檳榔幹、香蕉、竹子、草生地、灌木叢、水泥柱及墳墓周圍，並以頭下尾上的姿勢瞭望，雄性個體甚至會以張開橘紅色喉囊的方式宣示領域。

2000年首次發現於嘉義縣三界埔的苗圃及檳榔園。

目前發現於嘉義三界埔及花蓮七星潭附近。

生殖方式為卵生，每次產下1枚卵，春秋之間可連續產卵數次。

個體可隨著天災強風或大水輸送、植物苗木及農作物運送、垃圾廢棄物清運、交通工具進行族群擴散。

食性：主要取食昆蟲、蜘蛛等節肢動物，雄性個體亦會捕食同種幼體及其他蜥蜴。



造成的問題

- ★捕食台灣原生種動物或相互競爭資源，減少生物多樣性，降低台灣生態環境的穩定性。
- ★傳播外來寄生蟲及致病性病原，造成原生物種衰弱或死亡。



管理方式

目前無藥劑或毒餌可供控制族群數量，林務局及嘉義縣政府自2009年起定期於繁殖季時捕捉，並長期監測調查，以降低族群數量，減緩擴散速度。



行政院農業委員會林務局
FORESTRY BUREAU, C.O.A.
<http://www.forest.gov.tw>