

結核病可以治療!

結核病由結核分枝桿菌引起，為空氣傳染疾病，**密閉及通風不良的空間容易增加結核病傳染風險。**

常見發病症狀：**持續咳嗽(有痰)2週以上**、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、胸痛等，因症狀和一般感冒相似，早期容易被忽略。

結核病早已有有效藥物治療，只要遵從醫師指示，**規則服藥2週後傳染力便大幅降低，可正常工作及生活，約6-9個月可以治癒。**反之，若不接受治療，有5成病人會死亡。

都治計畫

結核病需要的治療時間較長，如因不適症狀改善便忘記規則服藥，很容易治療失敗甚至產生抗藥性。為了幫助您順利完成治療，您可以加入都治計畫，由衛生單位的都治關懷員每日親自送藥關懷您，若您治療過程中產生任何不舒服，也請主動告知關懷員，以即時提供協助。

結核病人只要規則治療，可以正常工作及生活，如您遭遇任何問題或因此遭受不公平待遇，請聯絡所在地衛生局/所或撥打免付費

電話：**1922**



成功治療結核病請您一定要注意

- 服藥前2個星期，盡量在家休息，若需出入公共場合務必配戴口罩。
- 加入都治計畫，讓關懷員協助您每日持續按規服藥，完成治療。
- 配合定期驗痰和進行胸部X光檢查。

藥物可能的副作用：腸胃不適、眼白或皮膚變黃、皮膚發疹或癢、視力模糊、關節痠痛、手腳麻刺感、暈眩或聽力障礙等，如發生上述症狀，請立即回診。



結核病可以預防！

多數人感染結核菌後不會馬上出現症狀，會處於潛伏結核感染狀態，終生有發病風險，可能因老化、懷孕、疾病等造成免疫狀態低下而發病。潛伏感染者透過完整治療，有超過90%以上的人可避免日後發病。

為了早期發現未被診斷的結核病人，及儘早發現感染者予以治療，阻斷日後發病風險，公衛人員會提供結核病人之密切接觸者進行相關檢查或治療。因此，為了週遭親友的健康，也避免您因親友發病再次被傳染，請配合公衛人員進行接觸者調查，過程中會保護您的隱私，請您放心！

預防結核病請您一定要注意

- 保持室內空氣流通。
- 咳嗽、打噴嚏時摀住口鼻，出入公共場所配戴口罩。
- 主動告知公衛人員，密切接觸之親友名單。

本份衛教單張已由 _____ 衛生所（局）的
承辦人 _____ 為您說明，若您仍有相關疑問，
請撥打連絡電話： _____
與衛生所聯繫，工作人員將儘速為您說明處理。

你不可不知的 結核常識

什麼是
結核病

