

潛伏結核感染是什麼？

結核菌透過空氣傳播，多數人感染後，若免疫力佳並不會馬上出現症狀，結核菌在身體內像睡覺呈現潛伏狀態，此時是沒有傳染力的。然而潛伏結核感染者終其一生約有5-10%機會發病，且距離受感染的時間愈近，發病機會愈大。若因老化、懷孕、疾病等因素造成免疫低下，發病機率就會大幅增加。

結核病發病可能出現**持續咳嗽(有痰)2週以上**、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、胸痛等症狀，應儘速就醫檢查，以免透過飛沫或空氣傳染他人。趁尚未發病前進行預防治療，即可避免後續發病。

潛伏結核感染檢驗

若您是高風險接觸者，衛生單位公衛人員會開立轉介單，轉介您至合作醫院接受檢查和治療評估。潛伏感染的檢驗方法有：

- 丙型干擾素釋放試驗(IGRA)：5歲(含)以上適用。以抽血進行檢驗。
- 皮膚結核菌素測驗(TST)：適用未滿5歲兒童。於左前手臂內側注射結核菌素，注射點針孔極小，無需敷藥或覆蓋紗布可正常活動。其後必須於48至72小時內查看免疫反應結果。

少數受檢者可能在注射部位會產生輕微紅腫或潰瘍的情形，這是免疫反應現象，通常毋須治療，只要保持清潔乾燥即可。

	結核病	潛伏結核感染
症狀	咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振，發燒、咳血等。	無。
傳染性	飛沫與空氣傳染，通常會傳染給與病患同住一室的家人或親近接觸的人。	不具傳染力。(終生有5-10%機會發病)
治療方式	每天服藥，持續6到9個月。	由醫師依個案情形選擇以下其中一種處方： 3HP(速克伏)：每週服用1次，共12次(約3個月)。 9H：每日服用1次，持續9個月。 4R：每日服用1次，持續4個月。
副作用	較多。	較少。



潛伏結核感染治療

目前主要提供三種治療處方，依潛伏結核感染之治療合作醫師綜合評估後建議使用。

3個月isoniazid +rifapentine處方(亦稱為速克伏，3HP)：
每周1次，共12次(約3個月)。

9個月isoniazid處方(9H)：每日1次，持續9個月。

4個月rifampicin處方(4R)：每日1次，持續4個月。

各衛生單位有提供「關懷員」親自送藥關懷服務，以幫助您順利有效地服藥，且提供必要協助。

治療過程中，仍有相當低的機會可能產生副作用。如果您有任何不舒服的情況，如發燒、噁心、食慾不振、右上腹部疼痛、手腳麻木、眼白及皮膚變黃、皮膚癢疹、急性過敏反應等，請告訴關懷員或衛生所公衛人員，並請儘速返回診治醫師處，評估是否繼續服藥。

治療過程中，請按月依醫師預約時程親自到診間進行追蹤。

潛伏結核感染者經過完整治療，有超過90%以上的人可避免日後發病。不但避免未來發病時傳染給週遭親友，也避免因發病需長期合併服用多種抗結核藥物及其造成的副作用。

若您對於潛伏結核感染治療等事項仍有疑問

請撥打：_____

_____ 衛生所（局）的承辦人 _____

我們將儘速為您說明。

你不可不知的 結核常識

什麼是潛伏
結核感染？

