

臺北市八大行業自辦員工愛滋防治衛教講座工作報告

項 目	說 明	統 一 發 票 章	
一、授課時間	年 月 日 時 分	(請務必加蓋統一發票章)	
二、授課地點			
三、上課/全體人數	/		
四、配合單位			
五、工作內容	<p>(一) 過程摘要：</p> <p><input type="checkbox"/> 愛滋病的傳染途徑---性行為、體液交換、母子垂直傳染。</p> <p><input type="checkbox"/> 親吻、擁抱、蚊蟲叮咬、共同生活作息不會傳染愛滋病。</p> <p><input type="checkbox"/> 愛滋病毒潛伏期長達5-10年，沒有自覺及臨床症狀但會傳染，根據臺大醫院調查，以不明原因的發燒、腹瀉、體重減輕、咳嗽、喘氣、口腔念珠菌等伺機性感染最常見。</p> <p><input type="checkbox"/> 一個人有沒有感染愛滋病毒，是無法由外觀來判斷，要透過抽血檢驗抗體的方法來判斷是否感染。</p> <p><input type="checkbox"/> 愛滋病的預防方法要為維持固定且單一性伴侶、全程正確使用保險套、不共用針具、產前婚前愛滋病毒抗體檢查。</p> <p><input type="checkbox"/> 全程正確使用保險套實施安全性行為。</p> <p><input type="checkbox"/> 包容關懷愛滋病毒感染者，以平常心照顧及對待。</p> <p><input type="checkbox"/> 共用針頭注射毒品或使用不潔針頭，會增加感染愛滋病、病毒性肝炎(B或C型肝炎)、心內膜炎、靜脈炎等疾病。</p> <p><input type="checkbox"/> 吸食K他命之後會頻尿，不斷跑廁所，除了泌尿系統的併發症外，吸食K他命會影響精神狀態及記憶，判斷力變差，吸食者常常合併服用鎮靜安眠藥物或飲酒，危害甚大。</p> <p><input type="checkbox"/> 若發現身旁有朋友使用成癮性藥物時勿驚慌，並應好好懇談瞭解毒品的來源與使用原因，再協助轉介就醫或與專業人士諮商。戒毒成功專線：0800-770-885。</p>		
員工姓名	身份字號	員工姓名	身份字號

填報人

承辦人

單位主管

院區負責人

