

# 關於懷孕 你可能不知道的七件小事


林太太，這非常重要  
讓我來告訴你吧



# Q1 你有咳嗽超過兩個禮拜嗎？

若有，你有可能得結核病，結核病是會被傳染給寶寶的！

咳  
咳



請帶著口罩，到衛生所  
或是各大醫院的胸腔科掛號



醫師會幫你留痰檢驗  
看是否是結核病



結核病是可以治癒的，並且  
治療用的藥物對寶寶很安全！



**2 WEEKS ↑**

早期診斷治療，可以讓小貝比不被傳染，  
而且減少對寶寶的傷害，千萬不能拖喔！



## Q2 陰道有紅疹或異常分泌物嗎？

若有，你有可能得到性病！性病可能會造成寶寶視力、腦力的缺陷，甚至是外型的畸形！



請至婦產科就醫，讓醫生協助解決可能的性病問題。



全程正確使用保險套，  
以免再次感染性病！  
並向醫生詢問正確的使用方式！



請鼓勵你的性伴侶，  
也去做性病篩檢的檢查！

性伴侶都要接受檢查並治療，才是最好的預防方法！

大部分的性病是可以治癒的，  
請與您的性伴侶配合醫師一起治療！



YES

### Q3 有完成孕婦流感疫苗接種嗎？

孕婦感染流感會增加自然流產的機率，並讓小貝比體重偏低，且會有較高的機會發生嚴重併發症！

請接種流感疫苗，  
以保護孕婦及剛出生的小貝比  
免於被感染。

若選擇不接種流感疫苗，請避免在流感  
流行期間（通常是10月到來年3月），  
到擁擠的公共場所，以降低感染風險。

當然，也可以請家人接種流感疫苗，  
一起來保護孕婦的健康。

NO

如果來不及接種疫苗就得到流感，請儘快就醫，依醫師指示使用流感抗病毒藥物治療！



## Q4 愛滋病毒篩檢是陽性嗎？

若是陽性的，有可能會讓小孩出生時就被感染！  
但這是有辦法避免的，接受檢查是最重要的第一步！



可以透過治療母親的病情，讓寶寶出生時不感染愛滋病毒！而且治療愛滋病的藥物對寶寶來說很安全！



懷孕期間，持續用抗愛滋病毒藥物治療，並選擇適當的生產方式，可以降低寶寶的感染機率！




寶寶出生6-12小時內，應接受預防性抗病毒治療，不餵母乳並使用母乳替代品，降低寶寶感染愛滋的機率！

另外，衛生單位也會依追蹤時程進行抽血檢驗，以確認嬰幼兒受到完整保護，沒有被愛滋病毒感染！




# Q5 B型肝炎e抗原陽性者要留意！

阻斷垂直傳染，避免造成肝功能異常、慢性肝炎或導致肝硬化、肝癌！



寶寶出生後儘速注射1劑 B型肝炎免疫球蛋白及B型肝炎疫苗，愈早愈好，不要晚於24小時，並按時完成第2、3劑疫苗。





寶寶仍有10%可能帶原，滿12個月記得到醫院檢測B肝，及早確認寶寶狀況。



寶寶如檢測未產生B肝抗體及未帶原，追加B肝疫苗及再檢測。

如您或寶寶為B型肝炎表面抗原(HBsAg)陽性的帶原者，愛護寶寶、寶貝自己，莫忘定期追蹤檢查！




## Q6 德國麻疹抗體檢測為陰性嗎？

陰性代表妳缺乏德國麻疹的保護力，有感染的風險！



懷孕期間若感染德國麻疹，  
可能導致出生寶寶多重先天性畸形！



生產後儘速持抗體陰性證明，  
公費接種1劑麻疹腮腺炎  
德國麻疹混合疫苗(MMR)。



懷孕婦女不能注射MMR疫苗，  
產後接種不影響哺餵母乳，  
接種疫苗後4週內應避免懷孕。

抗體陰性婦女應於懷孕前或產後接種疫苗，  
保護自己也保護小貝比的健康！



**陰性**  
疫苗




# Q7 孕婦已接種百日咳相關疫苗了嗎？

新生兒感染百日咳之來源大多為同住的家屬或照顧者！



百日咳好發於5歲以下之嬰幼兒，因免疫力較弱，容易引發併發症，甚至有死亡的風險！



懷孕第28-36週接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap)。



每次懷孕都應接種1劑疫苗，若懷孕時未接種，應於生產後立即接種。

除了孕產婦接種Tdap疫苗外，照護嬰幼兒的家屬都應接種，一同保護小貝比健康成長！



歡迎把這一份資訊  
分享給孕婦、準孕婦，或是孕婦的朋友



你的分享，可以讓孕婦有更完整的準備，  
或許，也能讓好幾個寶寶變得更健康！  
更詳細資訊，請跟附近的衛生局/衛生所查詢。