漢他病毒症候群的防治

來自鼠類的疾病你我都能預防!

1 漢他病毒從哪來？ / 症狀與風險？

吸入帶病毒
鼠糞尿飛沫

接觸受
汙染物品

被帶病毒
鼠類咬傷

漢他病毒感染初期症狀

發燒、畏寒、肌肉酸痛、頭痛、視力模糊、結膜充血、腸胃道症狀

若出現上述症狀且居住或工作環境有鼠跡，應儘速就醫並告知接觸史

2 落實『防鼠三不』原則，降低風險



不讓鼠來

封堵入侵管道
(封住所有孔洞縫隙)

不讓鼠吃

斷絕食物來源
(食品、廚餘、飼料、垃圾妥善封存)

不讓鼠住

消除棲息場所
(清潔久未使用的區域，避免築巢)

3 發現鼠跡時的正確處理與消毒 SOP

步驟一：
個人防護與通風
(開窗、戴口罩、手套、鞋套)

步驟二：
調製消毒液
(市售漂白水 1:9 稀釋)

步驟三：
潑灑與作用
(潑灑稀釋液，待作用 5 分鐘後再清理)

步驟四：
最後清潔
(工作後務必肥皂洗手)

切勿直接清掃，必須先潑灑消毒液！

臺北市政府衛生局 關心您
廣告