

發現身邊家人、朋友常攜帶與濫用藥物相關的器具時，如吸管、小瓶裝藥水、夾鏈袋、針筒等，請盡速尋求相關醫療機構諮詢或進行尿液篩檢。

衛生福利部認可 濫用藥物尿液檢驗機構名單

台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室

(02)22993279轉2515或7161 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

(02)26926222轉419 新北市汐止區康寧街169巷25號4樓

臺北榮民總醫院

(02)28757525轉805 台北市石牌路二段201號

慈濟大學濫用藥物檢驗中心

(03)8561635 花蓮市中央路三段701號

長榮大學毒物研究中心

(06)2785123轉1665 台南市歸仁區長大路1號

詮昕科技股份有限公司

(04)26338389 台中市龍井區遠東街60號1樓

台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物高雄實驗室

(07)3012121轉3300 高雄市楠梓加工出口區開發路61號

中山醫學大學附設醫院檢驗科藥物檢測中心

(04)24739595轉32255 台中市南區建國北路一段110號

交通部民用航空局航空醫務中心

(02)25456700轉266 台北市松山區敦化北路340號之9

三軍總醫院臨床病理科臨床毒藥物檢驗室
(僅受理軍方檢體)

(02)87923311轉17278 台北市內湖區成功路二段325號

高雄醫學大學附設中和紀念醫院(檢驗醫學部毒物室)

(07)3121101轉7252 高雄市三民區自由一路100號

高雄市立凱旋醫院

(07)7513171轉2218 高雄市苓雅區凱旋二路130號

正修科技大學

(07)7310606轉2620 高雄市鳥松區澄清路840號

直接拒絕

要high一下嗎?



我不要!



遠離現場

要high一下嗎?



我有事!先走!



轉移話題

來一顆吧!



最近有部電影不錯!



要high一下嗎?



我唱歌
就會high了!



自我解嘲

是朋友就來一顆!



是朋友就一起打球吧!



友誼勸服

拒毒真有型
無毒大丈夫



反毒資源館

免付費諮詢專線 0800-770-885

(請請您·幫幫我)

安非他命類毒品的危害防制

無毒大丈夫

一吸毒
成千古恨



衛生福利部
Ministry of Health and Welfare



FDA 食品藥物管理署
Food and Drug Administration

吃安心 藥安全

廣告



常見安非他命類毒品

❁ 安非他命 (Amphetamine) 甲基安非他命 (Methamphetamine)



分級：第二級管制藥品及毒品

俗名：安公子、安仔、冰糖、冰塊、鹽、Speed、糖果、冰毒

濫用方式：口服、煙吸、鼻吸及注射

濫用危害：活動力增加、衝動、心跳加快、體溫升高，長期使用會造成如妄想型精神分裂症，症狀包括猜忌、多疑、妄想、情緒不穩、易怒、視幻覺、聽幻覺、觸幻覺、強迫或重覆性行為及睡眠障礙等，亦常伴有自殘、暴力攻擊行為等。因具抑制食慾的作用，常被不法人士摻入減肥藥中非法販賣，使用藥者在不知情的情況成癮，造成精神分裂、妄想症等副作用。

❁ 3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命 (MDMA)



分級：第二級管制藥品及毒品

俗名：搖頭丸、Ecstasy、E、忘我、亞當、狂喜

濫用方式：口服

濫用危害：妄想、運動過度、肌肉緊張、牙關緊閉、噁心、嘔吐、視力模糊、眼球快速轉動、寒顫等症狀，急性中毒時，會引起體溫過高(43℃以上)、脫水、心律不整、橫紋肌溶解及急性腎衰竭等症狀，嚴重者可能導致死亡。

❁ 4-甲基甲基卡西酮 (Mephedrone)



分級：第三級管制藥品及毒品

俗名：喵喵、Meow、MCAT、M-Cat

濫用方式：口服

濫用危害：施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，但因作用時間短，故施用者會不斷追加劑量。根據研究報告指出，Mephedrone會造成嚴重的血管收縮、心臟病發作、心律不整、焦慮、幻覺、妄想、痙攣等副作用。

❁ 3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (MDPV)



分級：第二級管制藥品及毒品

俗名：浴鹽、MDPV、Bath Salts

濫用方式：吸食（鼻吸）、口服、注射

濫用危害：心跳加快、高血壓、血管收縮、心律不整、體溫上升、瞳孔擴張、痙攣、中風、腦水腫、呼吸困難、心肌梗塞甚至死亡，長期會造成情緒不穩、橫紋肌溶解、嘔吐及腎臟受損。在精神方面則會產生恐慌症、焦慮、躁動、妄想、幻想、攻擊性行為、自殘、自殺等症狀。

「安非他命中毒」之診斷標準

- A** 最近有使用安非他命類藥物之用藥史。
- B** 在使用安非他命類藥物當時或剛使用後即出現明顯之行為或心理變化。
- C** 在使用安非他命類藥物當時或剛使用後，出現下列兩項症狀(或兩項以上)：
- | | |
|-------------|--------------------------|
| 1 心率過快或心率緩慢 | 6 有體重下降的證據 |
| 2 瞳孔擴大 | 7 精神運動性激動或遲滯 |
| 3 血壓升高或降低 | 8 肌肉衰弱、呼吸抑制、胸痛或心律不整 |
| 4 冒汗或寒顫 | 9 意識混亂、癲癇、運動異常、肌張力異常或昏迷。 |
| 5 噁心或嘔吐 | |
- D** 症狀並非由一般身體狀況或其他精神疾病所引起。

資料來源：精神疾患診斷與統計手冊-第四版-文字修訂版



安非他命類藥物引起之精神病

皮膚有蟲爬感



產生幻覺



藥物濫用諮詢機構

各縣市政府毒品危害防制中心
戒毒成功專線0800-770-885

衛生福利部

(02) 8590-6666

衛生福利部食品藥物管理署 諮詢服務專線

(02) 2787-8200

臺北榮民總醫院毒藥物諮詢中心

(02) 2871-7121

戒治輔導機構

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科

(02) 2726-3141 # 1350

衛生福利部草屯療養院成癮治療中心

(049) 256-0289

高雄市立凱旋醫院成癮防治科

(07) 751-3171 # 2135

財團法人基督教晨曦會

(02) 2231-7744

財團法人台灣基督教主愛之家輔導中心

(03) 826-0360

財團法人屏東縣私立基督教沐恩之家

(07) 723-0595