

# 公費肺炎鏈球菌疫苗接種問答集

## 目錄

一、	我要如何計算年齡？ .....	3
二、	我今年 65 歲以上 .....	3
三、	我設籍臺北市，且今年 63-64 歲市民 .....	5
四、	我今年 55-64 歲原住民 .....	6
五、	不同價數肺炎鏈球菌疫苗有何差別? .....	7
六、	如何查詢肺炎鏈球菌疫苗接種紀錄? .....	8
七、	肺炎鏈球菌疫苗是否可同時與流感疫苗或 COVID-19 疫苗同時接種? .....	8
八、	本市肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所有哪些? .....	8

## 113年3月22日起長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種建議

實施對象		當日 可接種疫苗	接種資格說明
設籍地/年齡	曾接種疫苗		
全國 65歲以上	PCV13/15 $\xrightarrow{1\text{年}^*}$	PPV23	全國65歲以上未曾接種23價肺炎鏈球菌疫苗，且曾經接種13價（或15價）肺炎鏈球菌疫苗者，兩劑間隔至少1年*。
全國 65歲以上	X	PCV13	全國65歲以上未曾接種13價、15價或23價肺炎鏈球菌疫苗者。
全國 65歲以上	PPV23 $\xrightarrow{1\text{年}}$	PCV13	全國65歲以上曾經接種23價肺炎鏈球菌疫苗者，兩劑間隔至少1年。

\*依據ACIP專家建議，5類高風險對象（脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者）、「機構住民」及「洗腎患者」可縮短間隔至8週。



臺北市政府衛生局 關心您 廣告

## 113年1月9日起全國55-64歲原住民族或 63-64歲臺北市市民公費肺炎鏈球菌疫苗接種建議

實施對象		當日 可接種疫苗	接種資格說明
設籍地/年齡	曾接種疫苗		
全國55-64歲原住民族、 設籍臺北市63-64歲市民	X	PPV23	全國55-64歲原住民族或設籍臺北市63-64歲市民未曾接種13價、15價或23價肺炎鏈球菌疫苗者。
全國 55-64歲原住民族	PPV23 $\xrightarrow{5\text{年}}$	PPV23	全國55-64歲原住民族曾經接種23價肺炎鏈球菌疫苗者，兩劑間隔至少5年。 【尚屆臨65歲，建議於年滿65歲時接種1劑公費13價肺炎鏈球菌疫苗，以達接種保護效益】
全國 55-64歲原住民族	PCV13/15 $\xrightarrow{1\text{年}^*}$	PPV23	全國55-64歲原住民族未曾接種23價肺炎鏈球菌疫苗，且曾經接種13價（或15價）肺炎鏈球菌疫苗者，兩劑間隔至少1年*。

\*依據ACIP專家建議，5類高風險對象（脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者）PCV13/15與PPV23接種間隔可由1年縮短至8週。



臺北市政府衛生局 關心您 廣告

## 一、我要如何計算年齡？

序號	原則：接種年-出生年		
	年齡	接種年	出生年
1	65 歲以上	民國 113 年	民國 48 年 ( 含 ) 前出生
2	63 - 64 歲		民國 49 年至民國 50 年出生
3	55 - 64 歲 原住民		民國 49 年至民國 58 年出生

## 二、我今年 65 歲以上

序號	Q	A
1	我未曾接種 23 價肺炎鏈球菌疫苗，且曾經接種過 13 價(或 15 價)肺炎鏈球菌疫苗，且接種間隔已超過 1 年者，建議接種為何？	可至 <a href="#">本市合約醫療院所</a> 接種 1 劑公費 23 價肺炎鏈球菌疫苗。
2	我未曾接種 13 價、15 價或 23 價肺炎鏈球菌疫苗，建議接種為何？	可至 <a href="#">本市合約醫療院所</a> 先接種 1 劑公費 13 價肺炎鏈球菌疫苗，間隔 1 年之後再接種 1 劑公費 23 價肺炎鏈球菌疫苗。
3	我曾經接種 23 價肺炎鏈球菌疫苗，尚未接種 13 價(或 15 價)肺炎鏈球菌疫苗，接種間隔已超過 1 年者，建議接種為何？	可至 <a href="#">本市合約醫療院所</a> 接種 1 劑公費 13 價肺炎鏈球菌疫苗。
4	我曾經接種 13 價(或 15 價)及 23 價肺炎鏈球菌疫苗，是否可接種公費肺炎鏈球菌疫苗？	您已完成接種 2 種不同價數肺炎鏈球菌疫苗，依據國內外文獻及 ACIP 專家建議，已具備足夠保護力，建議等待更多價數之新肺炎鏈球菌疫苗上市後，再依接種建議接種。
5	高風險對象、 <b>機構住民</b> 及 <b>洗腎患者</b> 接種建議？	如為高風險對象、機構住民及洗腎患者，曾經接種過 13 價(或 15 價)肺炎鏈球菌疫苗，可縮短 23 價肺炎鏈球菌疫苗接種間隔至 8 週。
6	何謂高風險對象？	依據衛生福利部疾病管制署公告，且由醫師評估認定高風險對象共 5 類： 1. 脾臟功能缺損 2. 先天或後天免疫功能不全 3. 人工耳植入 4. 腦脊髓液滲漏

		5. 正在接種免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者
7	我不確定自己是否為高風險對象，怎麼辦？	可至原就醫或長期追蹤之醫療院所，由醫師藉由病歷資料及專業評估是否符合高風險對象。
8	我不記得以前有無接種過肺炎鏈球菌疫苗，可否公費接種肺炎鏈球菌疫苗？	可確認健保卡有無 PPV23 註記貼紙，或至「健康存摺」APP、健康服務中心或合約醫療院所 <a href="#">查詢接種紀錄</a> 。若無接種紀錄，則依接種原則提供 1 劑 PCV13 及 1 劑 PPV23。
9	我確定曾經接種過 13 價肺炎鏈球菌疫苗，但健康存摺查無紀錄，怎麼辦？	建議您可至原接種院所申請接種證明，並持該證明至就近之健康服務中心登錄，以利接種紀錄之完整及日後查詢。
10	我已經完成補登肺炎鏈球菌疫苗接種紀錄，為何健康存摺 APP 查不到？	受限於醫療院所資料傳遞或匯入系統之時間差，健康存摺上之接種資料並非即時性資料，因此近期接種的資料可能尚未完整匯入。建議您可於接種後 2-4 週後至「健康存摺」查詢確認。
11	我是外國人可以接種肺炎鏈球菌疫苗嗎？	如為外籍人士，需具健保身分或持有有效居留證。

### 三、我設籍臺北市，且今年 63-64 歲市民

序號	Q	A
1	我可以接種公費肺炎鏈球菌疫苗嗎？	可以。
2	我需要攜帶什麼證件？	臺北市市民(63-64歲) 攜帶「身分證」或「台北通數位卡證」 及「健保卡」。 如為中低(低)收入戶者，請記得攜帶「相關福利資格證明」。
3	臺北市提供何種公費肺炎鏈球菌疫苗？	23 價肺炎鏈球菌疫苗
4	公費肺炎鏈球菌疫苗接種費用為何？	1. 臺北市市民(63-64歲) 疫苗免費，餘配合各合約醫療院所收費方式。 2. 如為中低(低)收入戶者 (1) 至本市市立聯合醫院及院外門診部 接種，不須支付任何費用。 (2) 如至其他醫療院所則依衛生福利部 中央健康保險署之減免掛號費規定 付費。
5	我何時可以接種肺炎鏈球菌疫苗？	全年皆可接種。
6	我可以到哪裡接種肺炎鏈球菌疫苗？	全年可至 <a href="#">本市合約醫療院所</a> 接種公費 23 價肺炎鏈球菌疫苗。

#### 四、我今年 55-64 歲原住民

序號	Q	A
1	我未曾接種 13 價、15 價或 23 價肺炎鏈球菌疫苗，建議接種為何？	可至 <a href="#">本市合約醫療院所</a> 接種 1 劑公費 23 價肺炎鏈球菌疫苗。
2	我曾經接種 23 價肺炎鏈球菌疫苗，且接種間隔已超過 5 年者，建議接種為何？	可至 <a href="#">本市合約醫療院所</a> 接種 1 劑公費 23 價肺炎鏈球菌疫苗。 【倘屆臨 65 歲，建議於年滿 65 歲時接種 1 劑公費 13 價肺炎鏈球菌疫苗，以達接種保護效益】
3	我未曾接種 23 價肺炎鏈球菌疫苗，且曾經接種過 13 價(或 15 價)肺炎鏈球菌疫苗，且接種間隔已超過 1 年者，建議接種為何？	可至 <a href="#">本市合約醫療院所</a> 接種 1 劑公費 23 價肺炎鏈球菌疫苗。
4	我曾經接種 13 價(或 15 價)及 23 價肺炎鏈球菌疫苗，是否可接種公費肺炎鏈球菌疫苗？	您已完成接種 2 種不同價數肺炎鏈球菌疫苗，依據國內外文獻及 ACIP 專家建議，已具備足夠保護力，建議等待更多價數之新肺炎鏈球菌疫苗上市後，再依接種建議接種。
5	我需要攜帶什麼證件？	原住民族攜帶「原住民族身分證明文件」、「戶口名簿」、「戶籍謄本」或「台北通數位原民卡」(四擇一)及「健保卡」。
6	高風險對象接種建議？	如為高風險對象，曾經接種過 13 價(或 15 價)肺炎鏈球菌疫苗，可縮短 23 價肺炎鏈球菌疫苗接種間隔至 8 週。
7	何謂高風險對象？	依據衛生福利部疾病管制署公告，且由醫師評估認定高風險對象共 5 類： 1.脾臟功能缺損 2.先天或後天免疫功能不全 3.人工耳植入 4.腦脊髓液滲漏 5.正在接種免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者

## 五、不同價數肺炎鏈球菌疫苗有何差別？

疫苗名稱	13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	23 價肺炎鏈球菌多醣體疫苗
商品名	沛兒 (Prevenar 13)	紐蒙肺 (Pneumovax 23)
廠商名稱	美國輝瑞 (Pfizer)	美國默沙東 (MSD)
疫苗類型	不活化疫苗	
血清型別	涵蓋 13 種血清型 (1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、23F)	涵蓋 23 種血清型 (1、2、3、4、5、6B、7F、8、 <u>9N</u> 、9V、 <u>10A</u> 、 <u>11A</u> 、 <u>12F</u> 、14、 <u>15B</u> 、 <u>17F</u> 、18C、19F、19A、 <u>20</u> 、22F、23F、33F)
接種途徑	深部肌肉注射	
副作用	接種處紅腫或疼痛、疲倦、發燒、食慾降低、頭痛、肌肉痠痛或關節疼痛、寒顫、躁動不安。	接種處紅腫或疼痛、疲倦、發燒、肌肉痠痛 (持續約 2 天後自行消失)。
作用機轉	誘發 T 細胞及 B 細胞，產生 IgG 抗體、免疫記憶 B 細胞，故具有 <b>長期</b> 的免疫記憶。	誘發 B 細胞表面的 IgG 受體結合、誘發產生 IgM 抗體，誘導免疫反應持續時間較短且無法產生免疫記憶。
抗體持續時間	<b>較長</b>	<b>較短</b>
疫苗保護力	46%：肺炎鏈球菌引起相關肺炎 45%：非細菌性肺炎 75%：侵襲性肺炎鏈球菌感染症	60-70%：侵襲性肺炎鏈球菌感染症
備註	1. 依據流行病學研究結果顯示，再接種疫苗後約 <b>2-3 週</b> 可產生抗體，仍視接種民眾自身體質影響而不同。 2. 資料來源：疫苗仿單及國內外文獻。	

## 六、 如何查詢肺炎鏈球菌疫苗接種紀錄?

方法	說明
1	網頁瀏覽器搜尋衛生福利部中央健康保險署之「健康存摺」，登入系統後行查詢。 <路徑：個人紀錄>預防接種資料>
2	透過手機至 Google play 及 App store 搜尋「健保快易通」或「健康存摺」，登入後行查詢， <路徑：個人紀錄>預防接種資料>
3	直接電洽轄區健康服務中心。 松山區健康服務中心：02-2767-1757 信義區健康服務中心：02-2723-4598 大安區健康服務中心：02-2733-5831 中山區健康服務中心：02-2501-4616 中正區健康服務中心：02-2321-5158 大同區健康服務中心：02-2585-3227 萬華區健康服務中心：02-2303-3092 文山區健康服務中心：02-2234-3501 南港區健康服務中心：02-2782-5220 內湖區健康服務中心：02-2791-1162 士林區健康服務中心：02-2881-3039 北投區健康服務中心：02-2826-1026

## 七、 肺炎鏈球菌疫苗是否可同時與流感疫苗或 COVID-19 疫苗同時接種?

三種疫苗**可同時接種不同部位**，同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分或間隔任何時間接種。

## 八、 本市肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所有哪些?

可參閱[臺北市長者肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所名冊](#) (不定期更新)

<連結路徑：臺北市政府衛生局首頁/主題專區/傳染病預防/肺炎鏈球菌疫苗/接種地點>