

中華民國 102 年  
臺北市死因統計年報

臺北市政府衛生局編印

中華民國 103 年 9 月出版



## 凡 例

- 一、本年報編印之目的，係提供臺北市死因統計，以提供政府施政及學術研究之參考。
- 二、本年報內容計分：(一) 提要分析 (二) 人口統計指標 (三) 102 年死因統計 (四) 歷年死因統計 (五) 歷年主要癌症發生率等 5 類，凡 64 表；另附錄 7 表。
- 三、部分資料因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。
- 四、本年報各表所稱「年」係指全年；「年底」係指當年 12 月底。
- 五、本年報所用符號代表意義如下：  
「—」經統計但無數據；「- -」有數值，但該數值無意義；「…」數值不明或尚未產生資料；「0」代表有數值而不及半單位；「①」修正數。



# 目次

## 凡例

## 壹、提要分析

## 貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別.....	1
表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數.....	3
表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性.....	4
表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性.....	5
表F·臺北市各行政區年底人口數.....	6
表G·臺北市近十年各行政區年底人口數.....	7
表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	8
表I·臺北市近十年各行政區年中人口數.....	9

## 參、102年死因統計

### 一、主要死因統計

表 1·臺北市、全國主要死亡原因比較.....	11
表 2·ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3·ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

## 目 次

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因.....	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因.....	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因.....	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因.....	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因.....	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因.....	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因.....	23
表14 · ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因.....	24
表15 · ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因.....	25
表16 · ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因.....	26
表17 · ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因.....	27
表18 · ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因.....	28
表19 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因.....	29
表20 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因.....	30
表21 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式.....	31
表22 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式.....	32
表23 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式.....	33
表24 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因.....	34
表25 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況.....	35
表26 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	36
表27 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	37

# 目 次

## 二、行政區別死因統計

表28-1~28-12·ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	39
表29-1~29-12·ICD-10 臺北市十二區事故傷害死亡原因.....	51
表30-1~30-12·ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	63
表31-1~31-12·ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	75

## 肆、歷年死因統計

### 一、主要死因統計

表32·臺北市歷年主要死亡原因.....	87
表33·臺北市歷年男性主要死亡原因.....	90
表34·臺北市歷年女性主要死亡原因.....	93
表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	96
表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	97
表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因.....	98
表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因.....	101
表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因.....	104
表40·臺北市歷年自殺死亡方式.....	107
表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	110
表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	113
表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	116
表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	118
表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	120

# 目 次

表46·臺北市歷年主要癌症死亡原因 .....	122
表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因 .....	125
表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因 .....	128
表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	131
表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	133
表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	135
<b>二、行政區別死因統計</b>	
表52-1~52-12·臺北市十二區歷年主要死亡原因 .....	137
表53-1~53-12·臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因 .....	173
<b>伍、歷年主要癌症發生率</b>	
表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	209
表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	211
<b>陸、附錄</b>	
【附錄1】102年臺北市十大死因出爐了癌症續居首位，慢性疾病占了7項 .....	213
【附錄2】ICD-10 新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較.....	224
【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較.....	226
【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標.....	233
【附錄5】主要名詞解釋與公式.....	238



# 壹、提要分析




# 102 年臺北市主要死因提要說明

## 一、標準化死亡率較上年減少 5.2%，較 93 年則減少 16.8%

102 年臺北市市民死亡人數 1 萬 6,000 人，平均每 32 分 39 秒就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 600.8 人，分別較 101 年減少 15.1 人、2.5%；如依世界衛生組織(W.H.O.)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 326.3 人，較上年減少 5.2%，較 93 年則減少 16.8%。若與全國相較，102 年臺北市標準化死亡率較全國標準化死亡率每十萬人口 435.3 人低 25.0%，並在全國 22 縣市中，僅高於金門縣，為死亡率第二低的縣市。

依近 10 年資料觀察，剔除人口結構因素影響後臺北市市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則反之，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。(詳圖 1)




## 二、臺北市市民十大死因惡性腫瘤蟬連榜首

102 年臺北市市民十大死因中惡性腫瘤仍蟬居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、敗血症、事故傷害；十大死因之死亡人數占總死亡人數 76.9%，其中仍以惡性腫瘤占 30.6% 最多，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 12.9% 次之，腦血管疾病占 7.5% 居三。(詳表 1、圖 2)

表 1 ICD-10 102 年臺北市十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	16,100	100.0
1	惡性腫瘤	4,919	30.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,075	12.9
3	腦血管疾病	1,210	7.5
4	肺炎	883	5.5
5	糖尿病	860	5.3
6	慢性下呼吸道疾病	573	3.6
7	高血壓性疾病	493	3.1
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	488	3.0
9	敗血症	466	2.9
10	事故傷害	406	2.5
	其他	3,727	23.1



### 三、死亡年齡平均數較 93 年增加 4 歲

102 年臺北市民死亡年齡平均數為 74.6 歲，較全國高 3.2 歲，與 93 年比較則增加 4 歲，其中男性死亡年齡平均數為 73.7 歲，女性為 75.8 歲，男性較女性低 2.1 歲；十大死因中死亡年齡平均數以肺炎 83.7 歲最高，慢性下呼吸道疾病 82.9 歲次之，最低為事故傷害 63.7 歲。

若以死亡年齡中位數來看，102 年臺北市民死亡年齡中位數為 79 歲，較全國高 3 歲，與 93 年比較則增加 4 歲，其中男性死亡年齡中位數為 78 歲，女性為 80 歲，男性較女性低 2 歲；十大死因中死亡年齡中位數以肺炎 86 歲最高，慢性下呼吸道疾

病、高血壓性疾病、敗血症 84 歲次之，最低為事故傷害 71 歲。(詳表 2)

表 2 ICD-10 102 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

單位：歲

死因別	所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	腦血管疾病	肺炎	糖尿病	慢性下呼吸道疾病	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	敗血症	事故傷害	
												死亡年齡平均數
死亡年齡平均數	兩性	74.6	70.4	76.9	78.5	83.7	77.1	83.0	81.2	79.3	81.3	63.7
	男性	73.7	71.2	74.4	76.9	83.0	75.2	82.5	79.3	78.8	81.0	61.6
	女性	75.8	69.2	80.7	80.5	85.1	79.0	84.5	83.1	79.9	81.6	67.9
死亡年齡中位數	兩性	79	72	81	82	86	80	84	84	82	84	71
	男性	78	73	79	81	85	78	84	83	82	84	66
	女性	80	71	84	84	87	81	85	85	83	84	77

### 四、臺北市男性十大死因與上年同，且順位不變


102 年臺北市男性死亡人數為 9,436 人，死亡率為每十萬男性人口 732.8 人，較上年減少 2.5%；標準化死亡率為每十萬男性人口 409.6 人，較上年減少 4.7%，較 93 年則減少 13.6%。

102 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、慢性下呼吸道疾病、糖尿病、敗血症、事故傷害、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 77.2%，其中仍以惡性腫瘤占 30.2% 最多，其次為心臟疾病(高

血壓性疾病除外)占 13.3%。(詳表 3、圖 3)

表 3 ICD-10 102 年臺北市男性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	9,436	100.0
1	惡性腫瘤	2,854	30.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,252	13.3
3	腦血管疾病	699	7.4
4	肺炎	575	6.1
5	慢性下呼吸道疾病	431	4.6
6	糖尿病	428	4.5
7	敗血症	274	2.9
8	事故傷害	271	2.9
9	高血壓性疾病	255	2.7
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	242	2.6
	其他	2,155	22.8




### 五、臺北市女性十大死因與上年同，順序亦不變

102 年臺北市女性死亡人數為 6,664 人，死亡率為每十萬女性人口 478.7 人，較上年減少 2.3%；標準化死亡率為每十萬女性人口 253.9 人，較上年減少 5.9%，較 93 年則減少 18.8%。

102 年女性十大死因之首亦為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病、敗血症、慢性下呼吸道疾病及事故傷害；女性十大死因死亡人數占女性總死亡人數 76.4%，其中亦以惡性腫瘤占 31.0%最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 12.3%。(詳表 4、圖 4)

表 4 ICD-10 102 年臺北市女性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	6,664	100.0
1	惡性腫瘤	2,065	31.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	823	12.3
3	腦血管疾病	511	7.7
4	糖尿病	432	6.5
5	肺炎	308	4.6
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	246	3.7
7	高血壓性疾病	238	3.6
8	敗血症	192	2.9
9	慢性下呼吸道疾病	142	2.1
10	事故傷害	135	2.0
	其他	1,572	23.6



#### 六、嬰兒(未滿1歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占4成9

102年臺北市未滿1歲嬰兒死亡人數為100人，死亡率為每十萬人口382.0人，分別較上年減少5人、增加10.0%。男嬰死亡率為每十萬人口406.4人，較上年增加2.8%；女嬰死亡率為356.0人，則較上年增加20.5%。嬰兒主要死因前3項分別為(1)源於周產期的特定病況49人占49.0%，(2)先天性畸形變形及染色體異常18人占18.0%，(3)嬰兒猝死症候群(SIDS)12人占12.0%，3者合占嬰兒死亡人數的79.0%。

#### 七、少年(1-14歲)惡性腫瘤居首位死因，占2成7

102年臺北市1-14歲少年死亡人數為48人，死亡率為每十萬人口13.5人，分別較上年減少12人、20.1%。少年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤13人占27.1%，(2)事故傷害6人占12.5%，(3)加害(他殺)2人占4.2%，3者合占少年死亡人數的43.8%。

#### 八、青年(15-24歲)事故傷害仍居死因首位，占3成8

102年臺北市15-24歲青年死亡人數為93人，死亡率為每十萬人口30.1人，分別較上年增加9人、12.3%。青年主要死因前3項分別為(1)事故傷害35人占37.6%，(2)蓄意自我傷害(自殺)19人占20.4%，(3)惡性腫瘤13人占14.0%，3者合占青年死亡人數的72.0%。

#### 九、壯年(25-44歲)死因之前二位為惡性腫瘤、心臟疾病(高血壓性除)

102年臺北市25-44歲壯年死亡人數為555人，死亡率為每十萬人口67.4人，分別較上年減少148人、21.3%。壯年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤189人占34.1%，(2)心臟疾病(高血壓性除)56人占10.1%，(3)蓄意自我傷害(自殺)56人占10.1%，3者合占壯年死亡人數的54.3%。

#### 十、中年(45-64歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占4成8

102年臺北市45-64歲中年死亡人數為3,190人，死亡率為

每十萬人口 394.9 人，分別較上年增加 69 人、1.4%。中年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,524 人占 47.8%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 362 人占 11.4%，(3)腦血管疾病 183 人占 5.7%，3 者合占中年死亡人數的 64.9%。

### 十一、老年(65-79 歲)死亡率以惡性腫瘤為首，占 3 成 7

102 年臺北市 65-79 歲老年死亡人數為 4,188 人，占總死亡人數的 26.0%，死亡率為每十萬人口 1,633.0 人，較上年減少 8.0%。65-79 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,569 人占 37.5%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 510 人占 12.2%，(3)腦血管疾病 299 人占 7.1%，3 者合占 65-79 歲老年死亡人數的 56.8%。


### 十二、老年(80 歲以上)死亡率亦以惡性腫瘤為首，占 2 成

102 年臺北市 80 歲以上老年死亡人數為 7,926 人，占總死亡人數的 49.2%，死亡率為每十萬人口 7991.8 人，較上年減少 2.5%。80 歲以上老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,610 人占 20.3%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 1,139 人占 14.4%，(3)腦血管疾病 708 人占 8.9%，3 者合占 80 歲以上老年死亡人數的 43.6%。

### 十三、12 行政區仍以萬華區標準化死亡率最高，大同區次之

102 年臺北市 12 行政區死亡率以萬華區每十萬人口 830.9 人最高，大同區 687.5 人次之，內湖區 469.7 人最低；標準化後

萬華區每十萬人口 409.8 人仍為最高，大同區 383.2 人次之，中正區 264.5 人最低。(詳圖 5)



### 十四、惡性腫瘤(癌症)

#### (一)「氣管、支氣管和肺癌」、「肝和肝內膽管癌」、「結腸、直腸和肛門癌」續居癌症死因前三位


102 年臺北市惡性腫瘤死亡人數為 4,919 人，占總死亡人數之 30.6%，死亡率為每十萬人口 183.6 人，較上年減少 1.9%；標準化死亡率為每十萬人口 107.0 人，較上年則減少 4.0%，較 93 年亦減少 12.4%。

102 年臺北市十大癌症死因中氣管、支氣管和肺癌仍居榜

首，其次依序為肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳房癌、前列腺(攝護腺)癌、胃癌、胰臟癌、口腔癌、卵巢癌、非何杰金氏淋巴瘤；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數 75.7%，其中氣管、支氣管和肺癌占 20.1%最多，肝和肝內膽管癌占 14.2%次之，結腸、直腸和肛門癌占 12.8%再次之。(詳表 5、圖 6)

表 5. ICD-10 102 年臺北市十大癌症死因

單位：人、%			
順位	癌症死因	死亡人數	死亡百分比
	所有癌症死因	4,919	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	988	20.1
2	肝和肝內膽管癌	700	14.2
3	結腸、直腸和肛門癌	631	12.8
4	女性乳房癌	264	5.4
5	前列腺(攝護腺)癌	155	3.2
6	胃癌	315	6.4
7	胰臟癌	231	4.7
8	口腔癌	203	4.1
9	卵巢癌	85	1.7
10	非何杰金氏淋巴瘤	154	3.1
	其他	1,193	24.3



(二) 男性癌症標準化死亡率較上年減少 5.1%、女性則減少 2.5%，惟男性癌症標準化死亡率仍為女性的 1.5 倍

102 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性為 2,854 人，女性為 2,065 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 130.9 人、每十萬女性人口 86.0 人，男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性減少 2.8%、女性增加 1.0%，標準化死亡率男性亦減少 5.1%，女性則減少 2.5%。

102 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 70.4 歲，較全國高 2.5 歲，與 93 年比較則增加 2.2 歲，其中男性死亡年齡平均數為 71.2 歲，女性為 69.2 歲。102 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平



均數以前列腺(攝護腺)癌 80.7 歲最高，胃癌 74.8 歲次之，最低為口腔癌 60.8 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，102 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 72 歲，較全國高 3 歲，與 93 年比較則增加 1 歲，其中男性死亡年齡中位數為 73 歲，女性為 71 歲。102 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡中位數以前列腺(攝護腺)癌 83 歲最高，胃癌 78 歲次之，最低為口腔癌及女性乳房癌 59 歲。(詳表 6)

表 6. ICD-10 102 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數  
單位：歲

死因別		所有癌症死因	氣管、支氣管和肺癌	肝和肝內膽管癌	結腸、直腸和肛門癌	女性乳房癌	前列腺(攝護腺)癌	胃癌	胰臟癌	口腔癌	卵巢癌	非何杰金氏淋巴瘤
		死亡年齡平均數	兩性	70.4	73.0	70.4	71.9	61.1	80.7	74.8	73.1	60.8
	男性	71.2	74.3	69.1	72.5	--	80.7	76.2	72.5	60.2	--	74.6
	女性	69.2	70.9	73.4	71.2	61.1	--	72.7	73.7	64.7	62.6	71.2
死亡年齡中位數	兩性	72	75	72	74	59	83	78	75	59	61	77
	男性	73	77	70	75	--	83	81	73	59	--	77
	女性	71	73	74	74	59	--	75	75	63	61	77



## 貳、人口統計指標



表A·臺北市人口統計指標—行政區別

中華民國102年

項 目	單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積	平方公里	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度	人/平方公里	9,884	22,647	20,387	27,581	16,719	21,446	22,850	21,857	8,612	5,483	8,957	4,646	4,496
年底人口數	人	2,686,516	210,343	228,496	313,363	228,753	163,140	129,820	193,480	271,341	119,752	282,842	289,742	255,444
男性		1,289,945	99,484	109,662	146,933	106,998	78,206	63,576	95,823	130,887	58,603	135,718	140,361	123,694
女性		1,396,571	110,859	118,834	166,430	121,755	84,934	66,244	97,657	140,454	61,149	147,124	149,381	131,750
性比例		92.37	89.74	92.28	88.29	87.88	92.08	95.97	98.12	93.19	95.84	92.25	93.96	93.89
出生數	人	26,710	1,803	2,298	2,759	2,481	1,513	1,351	2,071	2,647	1,385	2,946	2,807	2,649
粗出生率	‰	9.97	8.56	10.07	8.80	10.90	9.30	10.45	10.73	9.79	11.63	10.47	9.70	10.40
死亡數	人	16,379	1,247	1,430	1,841	1,379	967	934	1,658	1,541	703	1,304	1,815	1,560
粗死亡率	‰	6.11	5.92	6.27	5.87	6.06	5.95	7.22	8.59	5.70	5.90	4.63	6.27	6.12
人口增加率	‰	4.97	-2.66	3.35	-0.20	9.24	6.08	7.85	4.42	7.54	10.65	10.06	2.94	4.93
自然增加率		3.86	2.64	3.81	2.93	4.84	3.36	3.22	2.14	4.09	5.73	5.83	3.43	4.27
社會增加率		1.10	-5.31	-0.46	-3.13	4.36	2.71	4.59	2.27	3.42	4.87	4.18	-0.50	0.64
14歲以下年底人口數(a)	人 比重(%)	383,601 14.28	32,557 15.48	29,511 12.92	48,159 15.37	29,359 12.83	27,230 16.69	17,904 13.79	22,781 11.77	40,653 14.98	16,663 13.91	43,033 15.21	39,026 13.47	36,725 14.38
15-64歲年底人口數(b)	人 比重(%)	1,940,310 72.22	146,889 69.83	165,675 72.51	215,115 68.65	167,747 73.33	112,134 68.73	93,657 72.14	140,387 72.56	197,287 72.71	89,002 74.32	213,953 75.64	211,742 73.08	186,722 73.10
65歲以上年底人口數(c)	人 比重(%)	362,605 13.50	30,897 14.69	33,310 14.58	50,089 15.98	31,647 13.83	23,776 14.57	18,259 14.06	30,312 15.67	33,401 12.31	14,087 11.76	25,856 9.14	38,974 13.45	31,997 12.53
扶養比 (a+c)/b	%	38.46	43.20	37.92	45.67	36.37	45.49	38.61	37.82	37.54	34.55	32.20	36.84	36.80
扶幼比 a/b		19.77	22.16	17.81	22.39	17.50	24.28	19.12	16.23	20.61	18.72	20.11	18.43	19.67
扶老比 c/b		18.69	21.03	20.11	23.28	18.87	21.20	19.50	21.59	16.93	15.83	12.08	18.41	17.14
老化指數 c/a		94.53	94.90	112.87	104.01	107.79	87.32	101.98	133.06	82.16	84.54	60.08	99.87	87.13

資料來源：本府民政局。

附註：本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
87	75.76	73.12	78.93	79.11	77.06	81.48
88	75.90	73.33	78.98	79.48	77.47	81.78
89	76.46	73.83	79.56	79.85	77.78	82.24
90	76.75	74.07	79.92	80.08	78.05	82.38
91	77.19	74.58	80.24	80.36	78.34	82.60
92	77.35	74.77	80.33	80.61	78.64	82.76
93	77.48	74.68	80.75	80.99	78.92	83.20
94	77.42	74.50	80.80	81.17	78.94	83.55
95	77.90	74.86	81.41	81.58	79.19	84.13
96	78.38	75.46	81.72	81.79	79.41	84.31
97	78.57	75.59	81.94	81.99	79.70	84.38
98	79.01	76.03	82.34	82.16	79.86	84.53
99	79.18	76.13	82.55	82.42	80.06	84.81
100	79.15	75.96	82.63	82.70	80.18	85.25
<b>101</b>	<b>79.51</b>	<b>76.43</b>	<b>82.82</b>	<b>82.66</b>	<b>80.00</b>	<b>85.33</b>

資料來源：內政部。

附註：本市配合內政部縣市數據公布係以近3年合併人口編算，例101年平均餘命採99-101年，99年則採97-99年3年合併人口計算。

表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數

年 別	總 計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
	人 數 (人)								
93年	2,624,805	22,098	115,610	333,386	365,398	849,821	656,319	282,174	
94年	2,619,424	20,858	106,020	329,182	354,222	841,903	676,350	290,888	
95年	2,624,309	20,255	97,844	322,973	344,320	839,559	698,492	300,867	
96年	2,630,756	20,497	93,288	314,682	334,216	837,173	720,426	310,474	
97年	2,626,096	20,251	90,589	304,529	325,271	827,928	738,785	318,745	
98年	2,615,176	19,295	88,872	292,745	317,673	815,122	755,775	325,696	
99年	2,613,100	18,733	89,279	280,706	313,173	808,277	772,772	330,161	
100年	2,634,870	21,842	92,078	269,451	312,649	813,915	789,884	335,053	
101年	2,662,097	27,281	96,621	259,149	313,265	821,078	801,277	343,428	
<b>102年</b>	<b>2,679,871</b>	<b>27,573</b>	<b>105,081</b>	<b>250,714</b>	<b>309,256</b>	<b>823,715</b>	<b>807,903</b>	<b>355,631</b>	
	百 分 比 (%)								
93年	100.00	0.84	4.40	12.70	13.92	32.38	25.00	10.75	
94年	100.00	0.80	4.05	12.57	13.52	32.14	25.82	11.11	
95年	100.00	0.77	3.73	12.31	13.12	31.99	26.62	11.46	
96年	100.00	0.78	3.55	11.96	12.70	31.82	27.38	11.80	
97年	100.00	0.77	3.45	11.60	12.39	31.53	28.13	12.14	
98年	100.00	0.74	3.40	11.19	12.15	31.17	28.90	12.45	
99年	100.00	0.72	3.42	10.74	11.98	30.93	29.57	12.63	
100年	100.00	0.83	3.49	10.23	11.87	30.89	29.98	12.72	
101年	100.00	1.02	3.63	9.73	11.77	30.84	30.10	12.90	
<b>102年</b>	<b>100.00</b>	<b>1.03</b>	<b>3.92</b>	<b>9.36</b>	<b>11.54</b>	<b>30.74</b>	<b>30.15</b>	<b>13.27</b>	

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性

年 別	男性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
				人 數 (人)				
93年	1,289,022	11,571	60,098	174,960	186,351	399,102	312,512	144,428
94年	1,282,908	11,007	55,113	172,464	181,326	395,113	321,267	146,618
95年	1,281,102	10,599	51,037	168,671	176,781	393,448	331,205	149,362
96年	1,280,124	10,599	48,784	163,958	171,984	391,825	340,865	152,110
97年	1,274,252	10,466	47,357	158,589	167,692	387,224	348,609	154,316
98年	1,265,699	9,980	46,379	152,510	164,019	381,047	355,766	156,000
99年	1,261,502	9,708	46,394	146,399	161,906	377,421	363,045	156,630
100年	1,269,449	11,286	47,666	140,732	161,751	380,130	370,322	157,563
101年	1,280,852	14,085	49,976	135,392	162,067	384,448	374,796	160,090
<b>102年</b>	<b>1,287,653</b>	<b>14,262</b>	<b>54,260</b>	<b>130,921</b>	<b>160,134</b>	<b>386,721</b>	<b>376,956</b>	<b>164,401</b>
				百 分 比 (%)				
93年	100.00	0.90	4.66	13.57	14.46	30.96	24.24	11.20
94年	100.00	0.86	4.30	13.44	14.13	30.80	25.04	11.43
95年	100.00	0.83	3.98	13.17	13.80	30.71	25.85	11.66
96年	100.00	0.83	3.81	12.81	13.43	30.61	26.63	11.88
97年	100.00	0.82	3.72	12.45	13.16	30.39	27.36	12.11
98年	100.00	0.79	3.66	12.05	12.96	30.11	28.11	12.33
99年	100.00	0.77	3.68	11.61	12.83	29.92	28.78	12.42
100年	100.00	0.89	3.75	11.09	12.74	29.94	29.17	12.41
101年	100.00	1.10	3.90	10.57	12.65	30.02	29.26	12.50
<b>102年</b>	<b>100.00</b>	<b>1.11</b>	<b>4.21</b>	<b>10.17</b>	<b>12.44</b>	<b>30.03</b>	<b>29.27</b>	<b>12.77</b>

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。



表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性

年 別	女性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
93年	1,335,782	10,528	55,511	158,426	179,046	450,720	343,807	137,746	
94年	1,336,516	9,850	50,907	156,718	172,896	446,790	355,084	144,270	
95年	1,343,207	9,656	46,807	154,302	167,539	446,111	367,287	151,505	
96年	1,350,632	9,898	44,504	150,725	162,232	445,348	379,562	158,364	
97年	1,351,844	9,786	43,232	145,940	157,579	440,704	390,176	164,429	
98年	1,349,477	9,316	42,493	140,235	153,654	434,075	400,009	169,696	
99年	1,351,598	9,025	42,885	134,307	151,268	430,856	409,727	173,531	
100年	1,365,422	10,556	44,412	128,720	150,898	433,785	419,562	177,490	
101年	1,381,245	13,196	46,646	123,757	151,199	436,630	426,481	183,338	
<b>102年</b>	<b>1,392,218</b>	<b>13,312</b>	<b>50,821</b>	<b>119,793</b>	<b>149,123</b>	<b>436,994</b>	<b>430,947</b>	<b>191,230</b>	
				百 分 比 (%)					
93年	100.00	0.79	4.16	11.86	13.40	33.74	25.74	10.31	
94年	100.00	0.74	3.81	11.73	12.94	33.43	26.57	10.79	
95年	100.00	0.72	3.48	11.49	12.47	33.21	27.34	11.28	
96年	100.00	0.73	3.30	11.16	12.01	32.97	28.10	11.73	
97年	100.00	0.72	3.20	10.80	11.66	32.60	28.86	12.16	
98年	100.00	0.69	3.15	10.39	11.39	32.17	29.64	12.57	
99年	100.00	0.67	3.17	9.94	11.19	31.88	30.31	12.84	
100年	100.00	0.77	3.25	9.43	11.05	31.77	30.73	13.00	
101年	100.00	0.96	3.38	8.96	10.95	31.61	30.88	13.27	
<b>102年</b>	<b>100.00</b>	<b>0.96</b>	<b>3.65</b>	<b>8.60</b>	<b>10.71</b>	<b>31.39</b>	<b>30.95</b>	<b>13.74</b>	

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F·臺北市各行政區年齡別年底人口數

中華民國102年底

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
102年底人口數	2,686,516	210,343	228,496	313,363	228,753	163,140	129,820	193,480	271,341	119,752	282,842	289,742	255,444
0歲	25,637	1,735	2,180	2,650	2,330	1,485	1,286	1,970	2,551	1,334	2,885	2,717	2,514
1-4	110,454	8,503	9,300	12,826	9,130	7,014	5,672	7,769	11,180	5,347	11,751	11,333	10,629
5-9	110,797	9,778	8,283	14,527	8,230	8,169	4,866	6,165	11,879	4,623	12,480	11,292	10,505
10-14	136,713	12,541	9,748	18,156	9,669	10,562	6,080	6,877	15,043	5,359	15,917	13,684	13,077
15-19	153,991	11,944	12,226	17,784	11,708	9,460	7,059	9,818	17,181	6,930	18,553	16,637	14,691
20-24	151,106	10,797	12,997	15,370	12,246	8,172	7,119	10,871	15,661	7,230	18,633	16,937	15,073
25-29	164,894	11,333	14,401	15,976	14,019	8,804	8,197	12,595	16,217	8,161	19,292	19,126	16,773
30-34	226,155	15,319	19,711	21,957	20,188	12,273	11,798	18,141	22,114	11,573	24,975	25,144	22,962
35-39	222,689	16,756	19,050	23,782	19,328	13,198	11,311	16,521	22,592	11,141	23,611	23,754	21,645
40-44	210,511	17,084	17,489	24,553	17,728	13,130	9,878	14,230	22,720	9,607	22,307	21,595	20,190
45-49	210,737	16,860	17,594	24,721	18,199	12,805	9,719	14,440	22,803	9,231	23,421	21,729	19,215
50-54	212,115	16,175	18,049	24,006	18,909	12,122	9,936	15,300	21,724	9,086	24,226	22,794	19,788
55-59	205,948	15,787	17,809	23,768	18,671	11,436	9,813	15,093	19,588	8,461	22,534	23,500	19,488
60-64	182,164	14,834	16,349	23,198	16,751	10,734	8,827	13,378	16,687	7,582	16,401	20,526	16,897
65-69	108,656	9,738	10,251	15,044	9,719	6,813	5,230	8,219	9,812	4,274	7,911	11,818	9,827
70-74	89,016	7,350	8,260	11,938	7,804	5,499	4,763	7,626	7,931	3,683	6,165	9,865	8,132
75-79	64,714	5,164	5,557	8,600	5,845	4,403	3,796	5,811	5,723	2,557	4,611	7,075	5,572
80-84	50,666	4,171	4,618	6,871	4,441	3,411	2,504	4,483	4,825	1,855	3,731	5,383	4,373
85-89	32,889	2,888	3,110	4,825	2,605	2,270	1,297	2,850	3,405	1,217	2,414	3,222	2,786
90-94	13,005	1,241	1,158	2,153	963	1,041	503	1,035	1,383	404	832	1,265	1,027
95-99	2,965	274	285	527	222	254	122	238	279	86	165	282	231
100歲以上	694	71	71	131	48	85	44	50	43	11	27	64	49

資料來源：本府民政局。

表G·臺北市近十年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	93年底	94年底	95年底	96年底	97年底	98年底	99年底	100年底	101年底	102年底
臺北市	2,622,472	2,616,375	2,632,242	2,629,269	2,622,923	2,607,428	2,618,772	2,650,968	2,673,226	<b>2686516</b>
松山區	205,962	208,101	209,422	210,986	210,097	207,995	208,434	209,948	210,905	<b>210,343</b>
信義區	232,506	230,780	231,476	228,868	227,770	225,364	225,092	226,541	227,734	<b>228,496</b>
大安區	312,554	312,166	314,171	314,924	313,848	311,612	311,565	313,846	313,426	<b>313,363</b>
中山區	216,868	216,906	219,582	218,483	218,841	218,245	220,126	224,102	226,659	<b>228,753</b>
中正區	158,486	157,335	158,604	159,486	159,337	158,752	159,536	161,449	162,154	<b>163,140</b>
大同區	128,512	126,810	126,923	126,128	124,653	123,399	124,600	126,640	128,809	<b>129,820</b>
萬華區	197,445	194,743	194,879	192,470	190,361	188,437	189,099	190,855	192,628	<b>193,480</b>
文山區	258,046	258,953	261,417	261,666	261,719	260,869	262,307	266,442	269,310	<b>271,341</b>
南港區	112,982	113,052	113,258	113,716	113,672	113,149	114,023	116,131	118,490	<b>119,752</b>
內湖區	261,201	261,837	264,624	265,518	266,808	267,704	270,245	275,652	280,025	<b>282,842</b>
士林區	288,921	287,753	288,212	287,048	286,065	283,855	284,539	287,072	288,894	<b>289,742</b>
北投區	248,989	247,939	249,674	249,976	249,752	248,047	249,206	252,290	254,192	<b>255,444</b>

資料來源：本府民政局。

表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數

中華民國102年中

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
102年中人口數	2,679,871	210,624	228,115	313,395	227,706	162,647	129,315	193,054	270,326	119,121	281,434	289,318	254,818
0歲	27,573	1,970	2,366	2,901	2,336	1,590	1,442	2,142	2,777	1,379	2,873	2,862	2,645
1-4	105,081	7,617	8,091	11,539	7,935	6,077	4,665	6,650	9,826	4,605	10,399	9,897	9,324
5-9	111,420	9,983	8,483	14,734	8,382	8,289	4,934	6,345	12,211	4,767	12,605	11,531	10,746
10-14	139,295	13,444	10,447	19,227	10,278	11,280	6,487	7,314	16,063	5,677	17,247	14,778	13,900
15-19	156,770	12,329	12,914	18,137	12,190	9,673	7,254	10,306	17,416	7,143	19,409	17,227	15,521
20-24	152,486	10,915	13,342	15,500	12,371	8,261	7,368	11,191	15,543	7,427	18,818	17,489	15,527
25-29	167,189	11,879	15,316	17,017	14,691	9,213	8,632	13,610	16,987	8,495	19,693	20,368	17,596
30-34	225,629	15,315	19,368	22,018	19,594	11,990	11,505	17,708	21,461	11,291	23,573	24,613	22,389
35-39	218,920	16,532	18,286	23,331	18,279	12,692	10,427	15,440	22,025	10,507	22,147	22,465	20,819
40-44	211,977	17,613	17,649	25,306	17,935	13,369	9,934	14,297	23,226	9,399	22,771	22,107	20,214
45-49	212,480	17,312	18,149	25,692	18,766	12,987	9,911	14,846	23,040	9,198	24,376	22,339	19,658
50-54	212,682	16,466	18,148	24,342	18,902	12,223	9,954	15,391	21,418	8,910	24,389	23,403	20,032
55-59	205,582	15,904	17,953	24,427	18,782	11,475	9,805	14,939	19,272	8,428	21,485	23,566	19,482
60-64	177,159	14,040	15,151	21,957	15,144	10,011	7,938	12,300	14,977	6,803	13,869	18,594	15,133
65-69	104,968	8,656	9,298	13,704	8,753	6,087	4,895	7,713	8,876	3,968	6,956	10,745	9,001
70-74	87,667	6,995	7,681	11,264	7,440	5,367	4,757	7,459	7,488	3,524	5,896	9,516	7,693
75-79	63,819	5,048	5,420	8,364	5,696	4,292	3,640	5,740	5,510	2,389	4,445	6,764	5,361
80-84	50,951	4,267	4,730	7,017	4,382	3,422	2,334	4,595	5,089	1,905	3,835	5,277	4,450
85-89	32,172	2,745	2,975	4,664	2,434	2,225	1,198	2,593	3,234	1,061	2,185	3,039	2,574
90-94	12,511	1,105	1,078	1,916	857	937	472	899	1,179	356	696	1,084	923
95-99	2,875	239	252	493	198	269	134	222	220	75	158	279	213
100歲以上	668	60	47	93	39	78	45	46	44	9	17	47	46

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I·臺北市近十年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年
臺北市	2,624,805	2,619,424	2,624,309	2,630,756	2,626,096	2,615,176	2,613,100	2,634,870	2,662,097	<b>2,679,871</b>
松山區	205,778	207,032	208,762	210,204	210,542	209,046	208,215	209,191	210,427	<b>210,624</b>
信義區	233,548	231,643	231,128	230,172	228,319	226,567	225,228	225,817	227,138	<b>228,115</b>
大安區	312,782	312,360	313,169	314,548	314,386	312,730	311,589	312,706	313,636	<b>313,395</b>
中山區	216,934	216,887	218,244	219,033	218,662	218,543	219,186	222,114	225,381	<b>227,706</b>
中正區	159,042	157,911	157,970	159,045	159,412	159,045	159,144	160,493	161,802	<b>162,647</b>
大同區	128,976	127,661	126,867	126,526	125,391	124,026	124,000	125,620	127,725	<b>129,315</b>
萬華區	198,856	196,094	194,811	193,675	191,416	189,399	188,768	189,977	191,742	<b>193,054</b>
文山區	257,276	258,500	260,185	261,542	261,693	261,294	261,588	264,375	267,876	<b>270,326</b>
南港區	113,052	113,017	113,155	113,487	113,694	113,411	113,586	115,077	117,311	<b>119,121</b>
內湖區	260,495	261,519	263,231	265,071	266,163	267,256	268,975	272,949	277,839	<b>281,434</b>
士林區	289,058	288,337	287,983	287,630	286,557	284,960	284,197	285,806	287,983	<b>289,318</b>
北投區	249,009	248,464	248,807	249,825	249,864	248,900	248,627	250,748	253,241	<b>254,818</b>

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。



# 參、102 年死因統計

## 一、主要死因統計





表1·ICD-10 臺北市、全國主要死亡原因比較

中華民國102年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾病碼 ICD 10	死亡原因	臺北市				全國			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比
A00-Y98	所有死亡原因		16,100	600.78	100.00		154,374	661.30	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,919	183.55	30.55	1	44,791	191.90	29.01
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	2,075	77.43	12.89	2	17,694	75.80	11.46
I60-I69	腦血管疾病	3	1,210	45.15	7.52	3	11,313	48.50	7.33
J12-J18	肺炎	4	883	32.95	5.48	5	9,438	40.40	6.11
E10-E14	糖尿病	5	860	32.09	5.34	4	9,042	38.70	5.86
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	573	21.38	3.56	7	5,959	25.50	3.86
I10-I15	高血壓性疾病	7	493	18.40	3.06	8	5,033	21.60	3.26
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	8	488	18.21	3.03	10	4,489	19.20	2.91
A40-A41	敗血症	9	466	17.39	2.89	12	3,446	14.80	2.23
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	406	15.15	2.52	6	6,619	28.40	4.29
	其他		3,727	139.07	23.15		35,153	150.58	22.77
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	310	11.57	1.93	9	4,843	20.70	3.14
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	261	9.74	1.62	11	3,565	15.30	2.31
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	13	191	7.13	1.19	14	1,266	5.40	0.82
G20-G21	帕金森病	14	155	5.78	0.96	17	936	4.00	0.61
F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	15	142	5.30	0.88	16	966	4.10	0.63

資料來源：衛生福利部。

表2. ICD-10 全國縣市別死亡概況

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口

縣市別	總 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
總 計	154,374	661.3	435.3	93,340	799.2	556.6	61,034	523.2	322.0
新北市	20,507	519.5	402.5	12,670	650.3	517.0	7,837	392.1	298.9
臺北市	16,100	600.8	326.3	9,436	732.8	409.6	6,664	478.7	253.9
臺中市	15,000	556.9	434.1	9,012	674.3	543.7	5,988	441.3	333.7
臺南市	13,936	740.3	461.2	8,213	869.3	590.5	5,723	610.4	341.2
高雄市	19,070	686.2	473.7	11,747	847.0	603.9	7,323	525.9	351.8
宜蘭縣	3,519	767.5	450.9	2,111	905.5	579.7	1,408	624.7	326.3
桃園縣	10,914	535.8	417.5	7,004	684.2	527.9	3,910	385.8	311.7
新竹縣	3,493	662.5	449.4	2,126	786.3	565.5	1,367	532.2	331.0
苗栗縣	4,629	819.6	472.7	2,741	939.3	600.3	1,888	691.7	342.7
彰化縣	9,189	708.0	435.1	5,389	810.7	567.7	3,800	600.1	309.0
南投縣	4,578	882.6	510.3	2,752	1033.1	655.1	1,826	723.7	366.4
雲林縣	6,788	956.9	514.7	3,994	1081.0	675.4	2,794	822.0	356.0
嘉義縣	5,113	962.0	482.3	3,001	1083.6	625.1	2,112	829.8	337.5
屏東縣	7,523	879.5	537.0	4,646	1058.5	696.6	2,877	690.9	376.8
臺東縣	2,334	1034.9	620.0	1,489	1268.9	806.2	845	781.0	426.6
花蓮縣	3,177	949.7	565.7	2,028	1182.2	727.5	1,149	704.9	403.7
澎湖縣	786	789.0	406.7	441	860.3	497.2	345	713.4	314.1
基隆市	2,782	739.8	467.0	1,663	878.5	589.8	1,119	599.2	353.4
新竹市	2,486	582.5	419.5	1,470	695.1	523.6	1,016	471.9	327.0
嘉義市	1,841	679.2	441.1	1,038	781.2	541.4	803	581.1	353.7
金門縣	551	471.3	296.8	335	569.0	400.8	216	372.2	205.6
連江縣	58	494.1	332.3	34	508.6	396.9	24	475.1	247.7

資料來源：衛生福利部。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3·ICD-10 臺北市主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男 性 人 口 死亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女 性 人 口 死亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	16,100	600.78	100.00	所有死亡原因	9,436	732.81	100.00	所有死亡原因	6,664	478.66	100.00
1	惡性腫瘤	4,919	183.55	30.55	惡性腫瘤	2,854	221.64	30.25	惡性腫瘤	2,065	148.32	30.99
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,075	77.43	12.89	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,252	97.23	13.27	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	823	59.11	12.35
3	腦血管疾病	1,210	45.15	7.52	腦血管疾病	699	54.28	7.41	腦血管疾病	511	36.70	7.67
4	肺炎	883	32.95	5.48	肺炎	575	44.65	6.09	糖尿病	432	31.03	6.48
5	糖尿病	860	32.09	5.34	慢性下呼吸道疾病	431	33.47	4.57	肺炎	308	22.12	4.62
6	慢性下呼吸道疾病	573	21.38	3.56	糖尿病	428	33.24	4.54	腎炎、腎病症候群及腎病變	246	17.67	3.69
7	高血壓性疾病	493	18.40	3.06	敗血症	274	21.28	2.90	高血壓性疾病	238	17.10	3.57
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	488	18.21	3.03	事故傷害	271	21.05	2.87	敗血症	192	13.79	2.88
9	敗血症	466	17.39	2.89	高血壓性疾病	255	19.80	2.70	慢性下呼吸道疾病	142	10.20	2.13
10	事故傷害	406	15.15	2.52	腎炎、腎病症候群及腎病變	242	18.79	2.56	事故傷害	135	9.70	2.03
	其他	3,727	139.07	23.15	其他	2,155	167.36	22.84	其他	1,572	112.91	23.59
11	慢性肝病及肝硬化	310	11.57	1.93	慢性肝病及肝硬化	198	15.38	2.10	慢性肝病及肝硬化	112	8.04	1.68
12	蓄意自我傷害（自殺）	261	9.74	1.62	蓄意自我傷害（自殺）	166	12.89	1.76	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	103	7.40	1.55
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	191	7.13	1.19	帕金森病	94	7.30	1.00	蓄意自我傷害（自殺）	95	6.82	1.43
14	帕金森病	155	5.78	0.96	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	88	6.83	0.93	血管性及未明示之癡呆症	79	5.67	1.19
15	血管性及未明示之癡呆症	142	5.30	0.88	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	80	6.21	0.85	帕金森病	61	4.38	0.92

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為 2,679,871 人，其中男性為 1,287,653 人，女性為 1,392,218 人。

表4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	16,100	600.78	100	362.67	48	13.49	93	30.07	555	67.38	3,190	394.85	4,188	1,633.04	7,926	7,991.77		
1	C00-C97	惡性腫瘤	4,919	183.55	1	3.63	13	3.65	13	4.20	189	22.94	1,524	188.64	1,569	611.81	1,610	1,623.36		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,075	77.43	3	10.88	1	0.28	4	1.29	56	6.80	362	44.81	510	198.87	1,139	1,148.45		
3	I60-I69	腦血管疾病	1,210	45.15	-	-	-	-	-	-	20	2.43	183	22.65	299	116.59	708	713.88		
4	J12-J18	肺炎	883	32.95	-	-	2	0.56	-	-	5	0.61	49	6.07	149	58.10	678	683.63		
5	E10-E14	糖尿病	860	32.09	-	-	-	-	-	-	10	1.21	125	15.47	294	114.64	431	434.58		
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	573	21.38	1	3.63	-	-	-	-	1	0.12	29	3.59	119	46.40	423	426.51		
7	I10-I15	高血壓性疾病	493	18.40	-	-	-	-	-	-	5	0.61	55	6.81	110	42.89	323	325.68		
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	488	18.21	1	3.63	1	0.28	1	0.32	5	0.61	46	5.69	141	54.98	293	295.43		
9	A40-A41	敗血症	466	17.39	-	-	1	0.28	1	0.32	7	0.85	37	4.58	104	40.55	316	318.62		
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	406	15.15	3	10.88	6	1.69	35	11.32	43	5.22	86	10.64	92	35.87	141	142.17		
		其他	3,727	139.07	91	330.03	24	6.75	39	12.61	214	25.98	694	85.90	801	312.34	1,864	1,879.47		
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	310	11.57	-	-	1	0.28	-	-	23	2.79	124	15.35	78	30.41	84	84.70		
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	261	9.74	-	-	1	0.28	19	6.14	56	6.80	112	13.86	49	19.11	24	24.20		
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	191	7.13	-	-	-	-	2	0.65	6	0.73	34	4.21	40	15.60	109	109.90		
14	G20-G21	帕金森病	155	5.78	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.87	43	16.77	105	105.87		
15	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	142	5.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	15	5.85	126	127.05		

資料來源：行政院衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為人 2,679,871。

表5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況

中華民國102年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
1	A00-Y98	所有死亡原因	9,436	732.81	55	385.65	22	11.88	61	38.09	342	88.44	2,047	543.03	2,426	2,117.96	4,483	8,991.54		
	C00-C97	惡性腫瘤	2,854	221.64	1	7.01	3	1.62	9	5.62	88	22.76	851	225.76	899	784.85	1,003	2,011.71		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,252	97.23	1	7	1	1	2	1.25	48	12.41	281	74.54	310	270.64	609	1,221.47		
3	I60-I69	腦血管疾病	699	54.28	-	-	-	-	-	-	11	2.84	127	33.69	182	158.89	379	760.16		
4	J12-J18	肺炎	575	44.65	-	-	1	1	-	-	3	0.78	35	9.28	108	94.29	428	858.44		
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	431	33.47	-	-	-	-	-	-	1	0.26	27	7.16	87	75.95	316	633.80		
6	E10-E14	糖尿病	428	33.24	-	-	-	-	-	-	6	1.55	86	22.81	144	125.72	192	385.09		
7	A40-A41	敗血症	274	21.28	-	-	-	-	1	0.62	4	1.03	21	5.57	61	53.25	187	375.07		
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	271	21.05	1	7.01	2	1.08	27	16.86	34	8.79	65	17.24	61	53.25	81	162.46		
9	I10-I15	高血壓性 疾病	255	19.80	-	-	-	-	-	-	3	0.78	39	10.35	60	52.38	153	306.87		
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	242	18.79	1	7	-	-	1	1	1	0.26	26	6.90	68	59.37	145	290.83		
		其他	2,155	167.36	51	357.61	15	8.10	21	13.11	143	36.98	489	129.72	446	389.37	990	1,985.64		
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	198	15.38	-	-	1	1	-	-	21	5.43	104	27.59	38	33.18	34	68.19		
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	166	12.89	-	-	1	1	10	6.24	39	10.08	68	18.04	32	27.94	16	32.09		
13	G20-G21	帕金森病	94	7.30	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.06	26	22.70	64	128.36		
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	88	6.83	-	-	-	-	1	1	1	0.26	10	2.65	19	16.59	57	114.32		
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	80	6.21	-	-	-	-	-	-	4	1.03	15	3.98	19	16.59	42	84.24		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,287,653人。

表6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況

中華民國102年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	A00-Y98	總計	6,664	478.66	45	338.05	26	15.24	32	21.46	213	48.74	1,143	265.23	1,762	1,241.62	3,443	6,981.08		
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,065	148.32	-	-	10	5.86	4	2.68	101	23.11	673	156.17	670	472.13	607	1,230.76		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	823	59.11	2	15.02	-	-	2	1.34	8	1.83	81	18.80	200	140.93	530	1,074.64		
3	I60-I69	腦血管疾病	511	36.70	-	-	-	-	-	-	9	2.06	56	12.99	117	82.45	329	667.09		
4	E10-E14	糖尿病	432	31.03	-	-	-	-	-	-	4	0.92	39	9.05	150	105.70	239	484.60		
5	J12-J18	肺炎	308	22.12	-	-	1	0.59	-	-	2	0.46	14	3.25	41	28.89	250	506.90		
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	246	17.67	-	-	1	0.59	-	-	4	0.92	20	4.64	73	51.44	148	300.09		
7	I10-I15	高血壓性 疾病	238	17.10	-	-	-	-	-	-	2	0.46	16	3.71	50	35.23	170	344.69		
8	A40-A41	敗血症	192	13.79	-	-	1	0.59	-	-	3	0.69	16	3.71	43	30.30	129	261.56		
9	J40-J47	慢性下 呼吸道 疾病	142	10.20	1	7.51	-	-	-	-	-	-	2	0.46	32	22.55	107	216.95		
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	135	9.70	2	15.02	4	2.34	8	5.36	9	2.06	21	4.87	31	21.84	60	121.66		
		其他	1,572	112.91	40	300.49	9	5.28	18	12.07	71	16.25	205	47.57	355	250.16	874	1,772.14		
11	X60-X84, Y87.0	慢性肝病及肝硬化	112	8.04	-	-	-	-	-	-	2	0.46	20	4.64	40	28.19	50	101.38		
12	K70, K73-K74	骨骼肌肉系統及結締 組織之 疾病	103	7.40	-	-	-	-	1	0.67	5	1.14	24	5.57	21	14.80	52	105.44		
13	M00-M99	蓄意自我傷害（自 殺）	95	6.82	-	-	-	-	9	6.04	17	3.89	44	10.21	17	11.98	8	16.22		
14	F01-F03	血管性及未明示之癱 呆症	79	5.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7.75	68	137.88		
15	G20-G21	帕金森病	61	4.38	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.70	17	11.98	41	83.13		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,392,218人。

表7·ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	100	382.04	100.00		所有死亡原因	55	406.41	100.00		所有死亡原因	45	355.96	#####
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	49	187.20	49.00	P00-P96	源於周產期的特定病況	31	229.07	56.36	P00-P96	源於周產期的特定病況	18	142.38	40.00
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	18	68.77	18.00	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	9	66.50	16.36	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	9	71.19	20.00
3	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	12	45.85	12.00	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	4	29.56	7.27	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	8	63.28	17.78
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	11.46	3.00	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	7.39	1.82	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	15.82	4.44
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	11.46	3.00	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	7.39	1.82	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	15.82	4.44
6	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	1	3.82	1.00	D50-D64	貧血	1	7.39	1.82	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	1	7.91	2.22
7	D50-D64	貧血	1	3.82	1.00	C00-C97	惡性腫瘤	1	7.39	1.82	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	7.91	2.22
8	C00-C97	惡性腫瘤	1	3.82	1.00	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	7.39	1.82					
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	3.82	1.00										
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	3.82	1.00										
		其他	10	38.20	10.00		其他	6	44.34	10.91		其他	4	31.64	8.89

資料來源：衛生福利部。

附註：出生發生數為26,175人，其中男性為13,533人，女性為12,642人。

表8·ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	100	362.67	100.00		所有死亡原因	55	385.65	100.00		所有死亡原因	45	338.05	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	49	177.71	49.00	P00-P96	源於周產期的特定病況	31	217.37	56.36	P00-P96	源於周產期的特定病況	18	135.22	40.00
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	18	65.28	18.00	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	9	63.11	16.36	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	9	67.61	20.00
3	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	12	43.52	12.00	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	4	28.05	7.27	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	8	60.10	17.78
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	10.88	3.00	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	7.01	1.82	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	15.02	4.44
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	10.88	3.00	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	7.01	1.82	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	15.02	4.44
6	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	1	3.63	1.00	D50-D64	貧血	1	7.01	1.82	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	1	7.51	2.22
7	D50-D64	貧血	1	3.63	1.00	C00-C97	惡性腫瘤	1	7.01	1.82	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	7.51	2.22
8	C00-C97	惡性腫瘤	1	3.63	1.00	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	7.01	1.82					
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	3.63	1.00										
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	3.63	1.00										
		其他	10	36.27	10.00		其他	6	42.07	10.91		其他	4	30.05	8.89

資料來源：衛生福利部。

附註：0歲年中人口數為27,573人，其中男性為14,262人，女性為13,312人。



表9·ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	48	13.49	100.00		所有死亡原因	22	11.88	100.00		所有死亡原因	26	15.24	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	13	3.65	27.08	C00-C97	惡性腫瘤	3	1.62	13.64	C00-C97	惡性腫瘤	10	5.86	38.46
2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	1.69	12.50	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	1.08	9.09	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	2.34	15.38
3	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.56	4.17	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.54	4.55	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.59	3.85
3	J12-J18	肺炎	2	0.56	4.17	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.54	4.55	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.59	3.85
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.28	2.08	J12-J18	肺炎	1	0.54	4.55	J12-J18	肺炎	1	0.59	3.85
5	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.28	2.08	D50-D64	貧血	1	0.54	4.55	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	0.59	3.85
5	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	0.28	2.08	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	0.54	4.55	A40-A41	敗血症	1	0.59	3.85
5	A40-A41	敗血症	1	0.28	2.08	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.54	4.55	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.59	3.85
5	D50-D64	貧血	1	0.28	2.08										
5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.28	2.08										
5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	0.28	2.08										
5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.28	2.08										
		其他	17	4.78	35.42		其他	11	5.94	50.00		其他	6	3.52	23.08

資料來源：衛生福利部。

附註：1-14歲年中人口數為355,795人，其中男性為185,181人，女性為170,614人。

表10·ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	93	30.07	100.00		所有死亡原因	61	38.09	100.00		所有死亡原因	32	21.46	100.00
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	35	11.32	37.63	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	16.86	44.26	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	6.04	28.13
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	19	6.14	20.43	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	6.24	16.39	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	5.36	25.00
3	C00-C97	惡性腫瘤	13	4.20	13.98	C00-C97	惡性腫瘤	9	5.62	14.75	C00-C97	惡性腫瘤	4	2.68	12.50
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	4	1.29	4.30	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1.25	3.28	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1.34	6.25
5	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.65	2.15	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.25	3.28	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.67	3.13
5	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	0.65	2.15	I71	主動脈瘤及剝離	1	0.62	1.64					
7	I71	主動脈瘤及剝離	1	0.32	1.08	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.62	1.64					
7	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.32	1.08	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.62	1.64					
7	A40-A41	敗血症	1	0.32	1.08	A40-A41	敗血症	1	0.62	1.64					
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.32	1.08	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.62	1.64					
7	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	0.32	1.08	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	0.62	1.64					
		其他	13	4.20	13.98		其他	5	3.12	8.20		其他	8	5.36	25.00

資料來源：衛生福利部。

附註：15-24歲年中人口數為309,256人，其中男性為160,134人，女性為149,123人。

表11·ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	555	67.38	100.00		所有死亡原因	342	88.44	100.00		所有死亡原因	213	48.74	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	189	22.94	34.05	C00-C97	惡性腫瘤	88	22.76	25.73	C00-C97	惡性腫瘤	101	23.11	47.42
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	56	6.80	10.09	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	48	12.41	14.04	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	17	3.89	7.98
3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	56	6.80	10.09	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	39	10.08	11.40	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	2.06	4.23
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	43	5.22	7.75	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	34	8.79	9.94	I60-I69	腦血管疾病	9	2.06	4.23
5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	23	2.79	4.14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	21	5.43	6.14	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	8	1.83	3.76
6	I60-I69	腦血管疾病	20	2.43	3.60	I60-I69	腦血管疾病	11	2.84	3.22	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	5	1.14	2.35
7	E10-E14	糖尿病	10	1.21	1.80	E10-E14	糖尿病	6	1.55	1.75	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	4	0.92	1.88
8	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	8	0.97	1.44	I71	主動脈瘤及剝離	4	1.03	1.17	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	0.92	1.88
9	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	7	0.85	1.26	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	4	1.03	1.17	E10-E14	糖尿病	4	0.92	1.88
10	A40-A41	敗血症	7	0.85	1.26	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	4	1.03	1.17	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	3	0.69	1.41
						A40-A41	敗血症	4	1.03	1.17	A40-A41	敗血症	3	0.69	1.41
		其他	136	16.51	24.50		其他	79	20.43	23.10		其他	46	10.53	21.60

資料來源：衛生福利部。

附註：25-44歲年中人口數為823,715人，其中男性為386,721人，女性為436,994人。

表12·ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	3,190	394.85	100.00		所有死亡原因	2,047	543.03	100.00		所有死亡原因	1,143	265.23	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,524	188.64	47.77	C00-C97	惡性腫瘤	851	225.76	41.57	C00-C97	惡性腫瘤	673	156.17	58.88
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	362	44.81	11.35	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	281	74.54	13.73	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	81	18.80	7.09
3	I60-I69	腦血管疾病	183	22.65	5.74	I60-I69	腦血管疾病	127	33.69	6.20	I60-I69	腦血管疾病	56	12.99	4.90
4	E10-E14	糖尿病	125	15.47	3.92	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	104	27.59	5.08	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	44	10.21	3.85
5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	124	15.35	3.89	E10-E14	糖尿病	86	22.81	4.20	E10-E14	糖尿病	39	9.05	3.41
6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	112	13.86	3.51	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	68	18.04	3.32	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	24	5.57	2.10
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	86	10.64	2.70	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	65	17.24	3.18	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	21	4.87	1.84
8	I10-I15	高血壓性疾病	55	6.81	1.72	I10-I15	高血壓性疾病	39	10.35	1.91	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	4.64	1.75
9	J12-J18	肺炎	49	6.07	1.54	J12-J18	肺炎	35	9.28	1.71	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	20	4.64	1.75
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	46	5.69	1.44	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	27	7.16	1.32	I10-I15	高血壓性疾病	16	3.71	1.40
		其他	524	64.86	16.43		其他	364	96.56	17.78	A40-A41	敗血症	16	3.71	1.40
												其他	149	34.58	13.04

資料來源：衛生福利部。

附註：45-64歲年中人口數為807,903人，其中男性為376,956人，女性為430,947人。

表13·ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因	4,188	1,633.04	100.00	C00-C97	所有死亡原因	2,426	2,117.97	100.00	C00-C97	所有死亡原因	1,762	1,241.63	100.00
		惡性腫瘤	1,569	611.81	37.46		惡性腫瘤	899	784.85	37.06		惡性腫瘤	670	472.13	38.02
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	510	198.87	12.18	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	310	270.64	12.78	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	200	140.93	11.35
3	I60-I69	腦血管疾病	299	116.59	7.14	I60-I69	腦血管疾病	182	158.89	7.50	E10-E14	糖尿病	150	105.70	8.51
4	E10-E14	糖尿病	294	114.64	7.02	E10-E14	糖尿病	144	125.72	5.94	I60-I69	腦血管疾病	117	82.45	6.64
5	J12-J18	肺炎	149	58.10	3.56	J12-J18	肺炎	108	94.29	4.45	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	73	51.44	4.14
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	141	54.98	3.37	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	87	75.95	3.59	I10-I15	高血壓性疾病	50	35.23	2.84
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	119	46.40	2.84	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	68	59.37	2.80	A40-A41	敗血症	43	30.30	2.44
8	I10-I15	高血壓性疾病	110	42.89	2.63	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	61	53.25	2.51	J12-J18	肺炎	41	28.89	2.33
9	A40-A41	敗血症	104	40.55	2.48	A40-A41	敗血症	61	53.25	2.51	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	40	28.19	2.27
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	92	35.87	2.20	I10-I15	高血壓性疾病	60	52.38	2.47	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	32	22.55	1.82
		其他	801	312.34	19.13		其他	446	389.37	18.38		其他	346	243.82	19.64
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	78	30.41	1.86	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	38	33.18	1.57	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	31	21.84	1.76
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	49	19.11	1.17	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	32	27.94	1.32	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	14.80	1.19
13	G20-G21	帕金森病	43	16.77	1.03	G20-G21	帕金森病	26	22.70	1.07	G20-G21	帕金森病	17	11.98	0.96
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	40	15.60	0.96	I71	主動脈瘤及剝離	25	21.83	1.03	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	17	11.98	0.96
15	I71	主動脈瘤及剝離	36	14.04	0.86	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	19	16.59	0.78	I71	主動脈瘤及剝離	11	7.75	0.62
											F01-F03	血管性及未明示之癡呆	11	7.75	0.62

資料來源：衛生福利部。

附註：65-79歲年中人口數為256,454人，其中男性為114,544人，女性為141,911人。

表14·ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	7,926	7,991.81	100.00	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	4,483	8,991.63	100.00	C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	3,443	6,981.08	100.00
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,139	1,148.46	14.37	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	609	1,221.48	13.58	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	530	1,074.64	15.39
3	I60-I69	腦血管疾病	708	713.88	8.93	J12-J18	肺炎	428	858.45	9.55	I60-I69	腦血管疾病	329	667.09	9.56
4	J12-J18	肺炎	678	683.63	8.55	I60-I69	腦血管疾病	379	760.17	8.45	J12-J18	肺炎	250	506.90	7.26
5	E10-E14	糖尿病	431	434.58	5.44	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	316	633.81	7.05	E10-E14	糖尿病	239	484.60	6.94
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	423	426.51	5.34	E10-E14	糖尿病	192	385.10	4.28	I10-I15	高血壓性 疾病	170	344.69	4.94
7	I10-I15	高血壓性 疾病	323	325.68	4.08	A40-A41	敗血症	187	375.07	4.17	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病變	148	300.09	4.30
8	A40-A41	敗血症	316	318.62	3.99	I10-I15	高血壓性 疾病	153	306.87	3.41	A40-A41	敗血症	129	261.56	3.75
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病變	293	295.43	3.70	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病變	145	290.83	3.23	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	107	216.95	3.11
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	141	142.17	1.78	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	81	162.46	1.81	F01-F03	血管性及未 明示之癡呆 症	68	137.88	1.98
		其他	1,864	1,879.48	23.52		其他	990	1,985.66	22.08		其他	866	1,755.92	25.15
11	F01-F03	血管性及未 明示之癡呆 症	126	127.05	1.59	G20-G21	帕金森病	64	128.37	1.43	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	60	121.66	1.74
12	M00-M99	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	109	109.91	1.38	F01-F03	血管性及未 明示之癡呆 症	58	116.33	1.29	M00-M99	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	52	105.44	1.51
13	G20-G21	帕金森病	105	105.87	1.32	M00-M99	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	57	114.33	1.27	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	50	101.38	1.45
14	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	84	84.70	1.06	J66, J68-J69	肇因於吸入 外物之肺部 病況(塵肺症 及肺炎除外)	44	88.25	0.98	G20-G21	帕金森病	41	83.13	1.19
15	D00-D48	原位與良性 腫瘤(惡性 腫瘤除外)	75	75.62	0.95	D00-D48	原位與良性 腫瘤(惡性 腫瘤除外)	42	84.24	0.94	D00-D48	原位與良性 腫瘤(惡性 腫瘤除外)	33	66.91	0.96

資料來源：衛生福利部。

附註：80歲以上年中人口數為99,177人，其中男性為49,858人，女性為49,319人。

表15·ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
總計	406	15.15	150	5.60	88	3.28	15	0.56	21	0.78	9	0.34	28	1.04	95	3.54
0歲	3	10.88	-	-	-	-	-	-	3	10.88	-	-	-	-	-	-
1-14歲	6	1.69	4	1.12	1	0.28	1	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	35	11.32	27	8.73	1	0.32	1	0.32	-	-	2	0.65	3	0.97	3	0.32
25-44歲	43	5.22	19	2.31	9	1.09	3	0.36	2	0.24	1	0.12	8	0.97	1	0.12
45-64歲	86	10.64	35	4.33	19	2.35	6	0.74	3	0.37	1	0.12	13	1.61	9	1.11
65-79歲	92	35.87	37	14.43	21	8.19	4	1.56	6	2.34	-	-	3	1.17	21	8.19
80歲以上	141	142.17	28	28.23	37	37.31	-	-	7	7.06	5	5.04	1	1.01	63	63.52

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,679,871人。

表16·ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	271	21.05	102	7.92	66	5.13	10	0.78	12	0.93	6	0.47	22	1.71	53	4.12
0歲	1	7.01	-	-	-	-	-	-	1	7.01	-	-	-	-	-	-
1-14歲	2	1.08	1	0.54	-	-	1	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	27	16.86	22	13.74	1	0.62	1	0.62	-	-	-	-	2	1.25	1	0.62
25-44歲	34	8.79	14	3.62	8	2.07	2	0.52	1	0.26	1	0.26	7	1.81	1	0.26
45-64歲	65	17.24	22	5.84	18	4.78	4	1.06	2	0.53	1	0.27	11	2.92	7	1.86
65-79歲	61	53.25	23	20.08	14	12.22	2	1.75	4	3.49	-	-	1	0.87	17	14.84
80歲以上	81	162.46	20	40.11	25	50.14	-	-	4	8.02	4	8.02	1	2.01	27	54.15

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,287,653人。



表17·ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	135	9.70	48	3.45	22	1.58	5	0.36	9	0.65	3	0.22	6	0.43	42	3.02
0歲	2	15.02	-	-	-	-	-	-	2	15.02	-	-	-	-	-	-
1-14歲	4	2.34	3	1.76	1	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	8	5.36	5	3.35	-	-	-	-	-	-	2	1.34	1	0.67	-	-
25-44歲	9	2.06	5	1.14	1	0.23	1	0.23	1	0.23	-	-	1	0.23	-	-
45-64歲	21	4.87	13	3.02	1	0.23	2	0.46	1	0.23	-	-	2	0.46	2	0.46
65-79歲	31	21.84	14	9.87	7	4.93	2	1.41	2	1.41	-	-	2	1.41	4	2.82
80歲以上	60	121.66	8	16.22	12	24.33	-	-	3	6.08	1	2.03	-	-	36	72.99

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,392,218人。

表18·ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
總計	150	5.60	38	1.42	15	0.56	46	1.72	4	0.15	1	0.04	45	1.68	1	0.04
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	4	1.12	1	0.28	-	-	-	-	1	0.28	-	-	2	0.56	-	-
15-24歲	27	8.73	1	0.32	2	0.65	17	5.50	-	-	-	-	7	2.26	-	-
25-44歲	19	2.31	2	0.24	-	-	8	0.97	1	0.12	1	0.12	7	0.85	-	-
45-64歲	35	4.33	6	0.74	3	0.37	10	1.24	-	-	-	-	15	1.86	1	0.12
65-79歲	37	14.43	12	4.68	6	2.34	9	3.51	-	-	-	-	10	3.90	-	-
80歲以上	28	28.23	16	16.13	4	4.03	2	2.02	2	2.02	-	-	4	4.03	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,679,871人。

表19·ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	102	7.92	15	1.16	11	0.85	38	2.95	3	0.23	1	0.08	33	2.56	1	0.08
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.54	-	-
15-24歲	22	13.74	1	0.62	1	0.62	13	8.12	-	-	-	-	7	4.37	-	-
25-44歲	14	3.62	-	-	-	-	7	1.81	1	0.26	1	0.26	5	1.29	-	-
45-64歲	22	5.84	1	0.27	2	0.53	8	2.12	-	-	-	-	10	2.65	1	0.27
65-79歲	23	20.08	4	3.49	5	4.37	8	6.98	-	-	-	-	6	5.24	-	-
80歲以上	20	40.11	9	18.05	3	6.02	2	4.01	2	4.01	-	-	4	8.02	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,287,653人。

表20·ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	48	3.45	23	1.65	4	0.29	8	0.57	1	0.07	-	-	12	0.86	-	-
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	3	1.76	1	0.59	-	-	-	-	1	0.59	-	-	1	0.59	-	-
15-24歲	5	3.35	-	-	1	0.67	4	2.68	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44歲	5	1.14	2	0.46	-	-	1	0.23	-	-	-	-	2	0.46	-	-
45-64歲	13	3.02	5	1.16	1	0.23	2	0.46	-	-	-	-	5	1.16	-	-
65-79歲	14	9.87	8	5.64	1	0.70	1	0.70	-	-	-	-	4	2.82	-	-
80歲以上	8	16.22	7	14.19	1	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,392,218人。

表21·ICD-10 臺北市自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	261	9.74	-	-	1	0.28	19	6.14	56	6.80	112	13.86	49	19.11	24	24.20
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	1	0.39	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.15	-	-	-	-	-	-	2	0.24	2	0.25	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	55	2.05	-	-	1	0.28	3	0.97	20	2.43	29	3.59	2	0.78	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.15	-	-	-	-	1	0.32	-	-	1	0.12	1	0.39	1	1.01
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	1	1.01
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	77	2.87	-	-	-	-	3	0.97	11	1.34	36	4.46	18	7.02	9	9.07
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	28	1.04	-	-	-	-	2	0.65	4	0.49	9	1.11	8	3.12	5	5.04
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	4	0.15	-	-	-	-	1	0.32	1	0.12	1	0.12	1	0.39	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	5	0.19	-	-	-	-	-	-	1	0.12	2	0.25	2	0.78	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	3	0.11	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	2	0.78	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	67	2.50	-	-	-	-	7	2.26	14	1.70	26	3.22	12	4.68	8	8.07
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	2	0.07	-	-	-	-	1	0.32	-	-	-	-	1	0.39	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	6	0.22	-	-	-	-	1	0.32	2	0.24	2	0.25	1	0.39	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,679,871人。

表22·ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	166	12.89	-	-	1	0.54	10	6.24	39	10.08	68	18.04	32	27.94	16	32.09
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.27	1	0.87	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.27	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	40	3.11	-	-	1	0.54	2	1.25	15	3.88	21	5.57	1	0.87	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.23	-	-	-	-	1	0.62	-	-	1	0.27	1	0.87	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.27	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	56	4.35	-	-	-	-	1	0.62	9	2.33	25	6.63	14	12.22	7	14.04
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.32	-	-	-	-	1	0.62	4	1.03	3	0.80	6	5.24	3	6.02
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	4	0.31	-	-	-	-	1	0.62	1	0.26	1	0.27	1	0.87	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	5	0.39	-	-	-	-	-	-	1	0.26	2	0.53	2	1.75	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	32	2.49	-	-	-	-	3	1.87	7	1.81	11	2.92	5	4.37	6	12.03
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	1	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	4	0.31	-	-	-	-	-	-	2	0.52	1	0.27	1	0.87	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,287,653人。

表23·ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	95	6.82	-	-	-	-	9	6.04	17	3.89	44	10.21	17	11.98	8	16.22
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.29	-	-	-	-	-	-	2	0.46	2	0.46	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	15	1.08	-	-	-	-	1	0.67	5	1.14	8	1.86	1	0.70	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.03
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.03
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	21	1.51	-	-	-	-	2	1.34	2	0.46	11	2.55	4	2.82	2	4.06
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	11	0.79	-	-	-	-	1	0.67	-	-	6	1.39	2	1.41	2	4.06
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	3	0.22	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	2	1.41	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.51	-	-	-	-	4	2.68	7	1.60	15	3.48	7	4.93	2	4.06
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.70	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.14	-	-	-	-	1	0.67	-	-	1	0.23	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,392,218人。

表24·ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人 口	死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 百分比
	所有癌症死亡原因	4,919	183.55	100.00	惡性腫瘤	2,854	221.64	100.00	惡性腫瘤	2,065	148.32	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	988	36.87	20.09	氣管、支氣管和肺癌	610	47.37	21.37	氣管、支氣管和肺癌	378	27.15	18.31
2	肝和肝內膽管癌	700	26.12	14.23	肝和肝內膽管癌	485	37.67	16.99	結腸、直腸和肛門癌	273	19.61	13.22
3	結腸、直腸和肛門癌	631	23.55	12.83	結腸、直腸和肛門癌	358	27.80	12.54	女性乳房癌	264	18.96	12.78
4	女性乳房癌(1)	264	18.96	5.37	胃癌	189	14.68	6.62	肝和肝內膽管癌	215	15.44	10.41
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	155	12.04	3.15	口腔癌	175	13.59	6.13	胃癌	126	9.05	6.10
6	胃癌	315	11.75	6.40	前列腺(攝護腺)癌	155	12.04	5.43	胰臟癌	108	7.76	5.23
7	胰臟癌	231	8.62	4.70	胰臟癌	123	9.55	4.31	卵巢癌	85	6.11	4.12
8	口腔癌	203	7.57	4.13	食道癌	110	8.54	3.85	子宮頸及部位未明示子宮癌	80	5.75	3.87
9	卵巢癌(1)	85	6.11	1.73	非何杰金氏淋巴瘤	80	6.21	2.80	非何杰金氏淋巴瘤	74	5.32	3.58
10	非何杰金氏淋巴瘤	154	5.75	3.13	白血病	70	5.44	2.45	白血病	43	3.09	2.08
	其他	1,193	44.52	24.25	其他	499	38.75	17.48	其他	419	30.10	20.29
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	80	5.75	1.63	膀胱癌	57	4.43	2.00	子宮體癌	39	2.80	1.89
12	食道癌	121	4.52	2.46	鼻咽癌	56	4.35	1.96	腦癌	29	2.08	1.40
13	白血病	113	4.22	2.30	腦癌	46	3.57	1.61	口腔癌	28	2.01	1.36
14	膀胱癌	84	3.13	1.71	腎臟癌	39	3.03	1.37	膀胱癌	27	1.94	1.31
15	子宮體癌	39	2.80	0.79	膽囊和其他膽道癌	28	2.17	0.98	膽囊和其他膽道癌	25	1.80	1.21

資料來源：衛生福利部。

附註：1.臺北市年中人口數為2,679,871人，其中男性1,287,653人，女性1,392,218人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。



表25·ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	4,919	183.55	1	3.63	13	3.65	13	4.20	189	22.94	1,524	188.64	1,569	611.81	1,610	1,623.37		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	988	36.87	-	-	-	-	-	-	22	2.67	249	30.82	346	134.92	371	374.08		
2	C22	肝和肝內膽管癌	700	26.12	-	-	-	-	2	0.65	23	2.79	208	25.75	266	103.72	201	202.67		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	631	23.55	-	-	-	-	-	-	22	2.67	177	21.91	203	79.16	229	230.90		
4	C50	女性乳房癌(1)	264	18.96	-	-	-	-	-	-	24	2.91	147	18.20	64	24.96	29	29.24		
5	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	155	12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.73	46	17.94	95	95.79		
6	C16	胃癌	315	11.75	-	-	-	-	1	0.32	11	1.34	68	8.42	84	32.75	151	152.25		
7	C25	胰臟癌	231	8.62	-	-	-	-	-	-	6	0.73	53	6.56	87	33.92	85	85.71		
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14 C56,	口腔癌	203	7.57	-	-	-	-	-	-	14	1.70	123	15.22	47	18.33	19	19.16		
9	C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	85	6.11	-	-	-	-	-	-	10	1.21	39	4.83	23	8.97	13	13.11		
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	154	5.75	-	-	1	0.28	-	-	7	0.85	35	4.33	48	18.72	63	63.52		
		其他	1,193	44.52	1	3.63	12	3.37	10	3.23	50	6.07	411	50.87	355	138.43	354	356.94		
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	80	5.75	-	-	-	-	-	-	2	0.24	29	3.59	27	10.53	22	22.18		
12	C15	食道癌	121	4.52	-	-	-	-	-	-	1	0.12	75	9.28	25	9.75	20	20.17		
13	C91-C95	白血病	113	4.22	-	-	5	1.41	5	1.62	7	0.85	27	3.34	34	13.26	35	35.29		
14	C67	膀胱癌	84	3.13	-	-	-	-	-	-	1	0.12	13	1.61	22	8.58	48	48.40		
15	C54	子宮體癌	39	2.80	-	-	-	-	-	-	4	0.49	19	2.35	11	4.29	5	5.04		

資料來源：衛生福利部。

附註：1.臺北市年中人口數為2,679,871人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表26·ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國102年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,854	221.64	1	7.01	3	1.62	9	5.62	88	22.76	851	225.76	899	784.85	1,003	2,011.73		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	610	47.37	-	-	-	-	-	-	11	2.84	133	35.28	210	183.34	256	513.46		
2	C22	肝和肝內膽管癌	485	37.67	-	-	-	-	1	0.62	20	5.17	164	43.51	176	153.65	124	248.71		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	358	27.80	-	-	-	-	-	-	10	2.59	94	24.94	119	103.89	135	270.77		
4	C16	胃癌	189	14.68	-	-	-	-	1	0.62	4	1.03	34	9.02	53	46.27	97	195		
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	175	13.59	-	-	-	-	-	-	13	3.36	108	28.65	38	33.18	16	32.09		
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	155	12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.71	46	40.16	95	190.54		
7	C25	胰臟癌	123	9.55	-	-	-	-	-	-	3	0.78	31	8.22	43	37.54	46	92.26		
8	C15	食道癌	110	8.54	-	-	-	-	-	-	1	0.26	70	18.57	22	19.21	17	34.10		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	80	6.21	-	-	-	-	-	-	1	0.26	21	5.57	24	20.95	34	68		
10	C91-C95	白血病	70	5.44	-	-	2	1.08	4	2.50	5	1.29	16	4.24	21	18.33	22	44.13		
		其他	499	38.75	1	7.01	1	0.54	3	1.87	20	5.17	166	44.04	147	128.34	161	322.92		
11	C67	膀胱癌	57	4.43	-	-	-	-	-	-	1	0.26	11	2.92	16	13.97	29	58		
12	C11	鼻咽癌	56	4.35	-	-	-	-	-	-	5	1.29	32	8.49	16	13.97	3	6.02		
13	C71	腦癌	46	3.57	-	-	-	-	-	-	7	1.81	18	4.78	13	11.35	8	16.05		
14	C64	腎臟癌	39	3.03	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.98	11	9.60	12	24.07		
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	28	2.17	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.86	6	5.24	15	30		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,287,653人。

表27·ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國102年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,065	148.32	-	-	10	5.86	4	2.68	101	23.11	673	156.17	670	472.13	607	1,230.76		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	378	27.15	-	-	-	-	-	-	11	2.52	116	26.92	136	95.84	115	233.18		
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	273	19.61	-	-	-	-	-	-	12	2.75	83	19.26	84	59.19	94	190.60		
3	C50	女性乳房癌	264	18.96	-	-	-	-	-	-	24	5.49	147	34.11	64	45.10	29	58.80		
4	C22	肝和肝內膽管癌	215	15.44	-	-	-	-	1	0.67	3	0.69	44	10.21	90	63.42	77	156.13		
5	C16	胃癌	126	9.05	-	-	-	-	-	-	7	1.60	34	7.89	31	21.84	54	109.49		
6	C25	胰臟癌	108	7.76	-	-	-	-	-	-	3	0.69	22	5.11	44	31.01	39	79.08		
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	85	6.11	-	-	-	-	-	-	10	2.29	39	9.05	23	16.21	13	26.36		
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	80	5.75	-	-	-	-	-	-	2	0.46	29	6.73	27	19.03	22	44.61		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	74	5.32	-	-	1	0.59	-	-	6	1.37	14	3.25	24	16.91	29	58.80		
10	C91-C95	白血病	43	3.09	-	-	3	1.76	1	0.67	2	0.46	11	2.55	13	9.16	13	26.36		
		其他	419	30.10	-	-	6	3.52	2	1.34	21	4.81	134	31.09	134	94.43	122	247.37		
11	C54	子宮體癌	39	2.80	-	-	-	-	-	-	4	0.92	19	4.41	11	7.75	5	10.14		
12	C71	腦癌	29	2.08	-	-	-	-	-	-	4	0.92	9	2.09	11	7.75	5	10.14		
13	C00-C06, C09-C10.	口腔癌	28	2.01	-	-	-	-	-	-	1	0.23	15	3.48	9	6.34	3	6.08		
14	C67	膀胱癌	27	1.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.46	6	4.23	19	38.52		
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	25	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.39	10	7.05	9	18.25		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,392,218人。



# 參、102 年死因統計

## 二、行政區別死因統計



表28-1·ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,239	588.25	100.00	所有死亡原因	677	679.17	100.00	所有死亡原因	562	506.57	100.00
1	惡性腫瘤	389	184.69	31.40	惡性腫瘤	211	211.68	31.17	惡性腫瘤	178	160.44	31.67
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	139	65.99	11.22	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	85	85.27	12.56	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	54	48.67	9.61
3	腦血管疾病	95	45.10	7.67	腦血管疾病	53	53.17	7.83	腦血管疾病	42	37.86	7.47
4	糖尿病	70	33.23	5.65	肺炎	40	40.13	5.91	糖尿病	41	36.96	7.30
5	肺炎	68	32.29	5.49	糖尿病	29	29.09	4.28	高血壓性疾病	28	25.24	4.98
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	50	23.74	4.04	慢性下呼吸道疾病	27	27.09	3.99	肺炎	28	25.24	4.98
7	高血壓性疾病	46	21.84	3.71	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	25.08	3.69	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	22.53	4.45
8	慢性下呼吸道疾病	39	18.52	3.15	高血壓性疾病	18	18.06	2.66	敗血症	17	15.32	3.02
9	敗血症	34	16.14	2.74	敗血症	17	17.05	2.51	慢性下呼吸道疾病	12	10.82	2.14
10	事故傷害	25	11.87	2.02	事故傷害	15	15.05	2.22	事故傷害	10	9.01	1.78
	其他	284	134.84	22.92	其他	157	157.50	23.19	其他	127	114.47	22.60
11	蓄意自我傷害（自殺）	17	8.07	1.37	蓄意自我傷害（自殺）	10	10.03	1.48	蓄意自我傷害（自殺）	7	6.31	1.25
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	7.12	1.21	帕金森病	8	8.03	1.18	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	6.31	1.25
13	血管性及未明示之癱瘓症	15	7.12	1.21	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	8.03	1.18	血管性及未明示之癱瘓症	7	6.31	1.25
14	慢性肝病及肝硬化	11	5.22	0.89	血管性及未明示之癱瘓症	8	8.03	1.18	慢性肝病及肝硬化	6	5.41	1.07
15	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	11	5.22	0.89	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	8	8.03	1.18	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	5	4.51	0.89

資料來源：衛生福利部。

表28-2 · ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,425	624.68	100.00	所有死亡原因	843	769.46	100.00	所有死亡原因	582	490.90	100.00
1	惡性腫瘤	447	195.95	31.37	惡性腫瘤	257	234.58	30.49	惡性腫瘤	190	160.26	32.65
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	172	75.40	12.07	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	109	99.49	12.93	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	63	53.14	10.82
3	腦血管疾病	103	45.15	7.23	腦血管疾病	56	51.11	6.64	腦血管疾病	47	39.64	8.08
4	肺炎	76	33.32	5.33	肺炎	56	51.11	6.64	糖尿病	35	29.52	6.01
5	糖尿病	70	30.69	4.91	慢性下呼吸道疾病	36	32.86	4.27	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	21.09	4.30
6	敗血症	49	21.48	3.44	糖尿病	35	31.95	4.15	肺炎	20	16.87	3.44
7	慢性下呼吸道疾病	49	21.48	3.44	敗血症	30	27.38	3.56	敗血症	19	16.03	3.26
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	49	21.48	3.44	事故傷害	26	23.73	3.08	高血壓性疾病	16	13.50	2.75
9	事故傷害	33	14.47	2.32	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	21.91	2.85	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	12.65	2.58
10	高血壓性疾病	29	12.71	2.04	慢性肝病及肝硬化	17	15.52	2.02	慢性下呼吸道疾病	13	10.97	2.23
	其他	348	152.55	24.42	其他	197	179.81	23.37	其他	139	117.24	23.88
11	慢性肝病及肝硬化	29	12.71	2.04	蓄意自我傷害（自殺）	17	15.52	2.02	慢性肝病及肝硬化	12	10.12	2.06
12	蓄意自我傷害（自殺）	27	11.84	1.89	高血壓性疾病	13	11.87	1.54	蓄意自我傷害（自殺）	10	8.43	1.72
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	9.21	1.47	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	10	9.13	1.19	事故傷害	7	5.90	1.20
14	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	17	7.45	1.19	主動脈瘤及剝離	8	7.30	0.95	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	7	5.90	1.20
15	主動脈瘤及剝離	10	4.38	0.70	結核病(1)	6	5.48	0.71	帕金森病(2)	5	4.22	0.86

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、5.48。

(2)女性：血管性及未明示之癡呆症死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.22。



表28-3·ICD-10 臺北市大安區主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,846	589.03	100.00	所有死亡原因	1061	721.68	100.00	所有死亡原因	785	471.82	100.00
1	惡性腫瘤	582	185.71	31.53	惡性腫瘤	305	207.46	28.75	惡性腫瘤	277	166.49	35.29
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	269	85.83	14.57	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	154	104.75	14.51	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	115	69.12	14.65
3	腦血管疾病	136	43.40	7.37	腦血管疾病	79	53.73	7.45	腦血管疾病	57	34.26	7.26
4	肺炎	89	28.40	4.82	肺炎	62	42.17	5.84	糖尿病	40	24.04	5.10
5	糖尿病	87	27.76	4.71	慢性下呼吸道疾病	52	35.37	4.90	肺炎	27	16.23	3.44
6	慢性下呼吸道疾病	72	22.97	3.90	糖尿病	47	31.97	4.43	敗血症	23	13.82	2.93
7	敗血症	56	17.87	3.03	敗血症	33	22.45	3.11	慢性下呼吸道疾病	20	12.02	2.55
8	高血壓性疾病	46	14.68	2.49	事故傷害	31	21.09	2.92	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	11.42	2.42
9	事故傷害	44	14.04	2.38	高血壓性疾病	29	19.73	2.73	高血壓性疾病	17	10.22	2.17
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	43	13.72	2.33	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	16.32	2.26	血管性及未明示之癱瘓症	14	8.41	1.78
	其他	422	134.65	22.86	其他	245	166.65	23.09	其他	176	105.78	22.42
11	血管性及未明示之癱瘓症	24	7.66	1.30	慢性肝病及肝硬化	14	9.52	1.32	事故傷害	13	7.81	1.66
12	蓄意自我傷害（自殺）	21	6.70	1.14	帕金森病	11	7.48	1.04	蓄意自我傷害（自殺）	11	6.61	1.40
13	帕金森病	20	6.38	1.08	蓄意自我傷害（自殺）	10	6.80	0.94	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	11	6.61	1.40
14	慢性肝病及肝硬化	19	6.06	1.03	主動脈瘤及剝離	10	6.80	0.94	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	5.41	1.15
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	19	6.06	1.03	血管性及未明示之癱瘓症	10	6.80	0.94	帕金森病	9	5.41	1.15

資料來源：衛生福利部。

表28-4·ICD-10 臺北市中山區主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,350	592.87	100.00	所有死亡原因	784	735.56	100.00	所有死亡原因	566	467.30	100.00
1	惡性腫瘤	412	180.94	30.52	惡性腫瘤	237	222.36	30.23	惡性腫瘤	175	144.48	30.92
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	173	75.98	12.81	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	93	87.25	11.86	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	80	66.05	14.13
3	腦血管疾病	88	38.65	6.52	腦血管疾病	56	52.54	7.14	肺炎	33	27.25	5.83
4	肺炎	76	33.38	5.63	肺炎	43	40.34	5.48	腦血管疾病	32	26.42	5.65
5	糖尿病	65	28.55	4.81	慢性下呼吸道疾病	39	36.59	4.97	糖尿病	28	23.12	4.95
6	高血壓性疾病	57	25.03	4.22	糖尿病	37	34.71	4.72	事故傷害	26	21.47	4.59
7	慢性下呼吸道疾病	52	22.84	3.85	高血壓性疾病	37	34.71	4.72	高血壓性疾病	20	16.51	3.53
8	事故傷害	52	22.84	3.85	事故傷害	26	24.39	3.32	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	13.21	2.83
9	敗血症	36	15.81	2.67	敗血症	21	19.70	2.68	敗血症	15	12.38	2.65
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	33	14.49	2.44	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	15.95	2.17	慢性下呼吸道疾病	13	10.73	2.30
	其他	306	134.38	22.67	其他	178	167.00	22.70	其他	128	105.68	22.61
11	蓄意自我傷害（自殺）	21	9.22	1.56	蓄意自我傷害（自殺）	13	12.20	1.66	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	8.26	1.77
12	慢性肝病及肝硬化	20	8.78	1.48	慢性肝病及肝硬化	12	11.26	1.53	蓄意自我傷害（自殺）	8	6.60	1.41
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	7.47	1.26	帕金森病	10	9.38	1.28	慢性肝病及肝硬化	8	6.60	1.41
14	帕金森病	14	6.15	1.04	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	7.51	1.02	血管性及未明示之癡呆症	5	4.13	0.88
15	血管性及未明示之癡呆症(1)	12	5.27	0.89	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病(2)	7	6.57	0.89	帕金森病(3)	4	3.30	0.71

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）死亡人數、每十萬人口死亡率亦為12人、5.27。

(2)男性：血管性及未明示之癡呆症死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、6.57。

(3)女性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）、膽結石及其他膽囊疾患死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、3.30。

表28-5·ICD-10 臺北市中正區主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	892	548.43	100.00	所有死亡原因	525	672.52	100.00	所有死亡原因	367	433.90	100.00
1	惡性腫瘤	248	152.48	27.80	惡性腫瘤	137	175.49	26.10	惡性腫瘤	111	131.23	30.25
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	121	74.39	13.57	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	76	97.35	14.48	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	45	53.20	12.26
3	肺炎	76	46.73	8.52	肺炎	55	70.45	10.48	腦血管疾病	27	31.92	7.36
4	腦血管疾病	57	35.05	6.39	腦血管疾病	30	38.43	5.71	糖尿病	22	26.01	5.99
5	糖尿病	47	28.90	5.27	慢性下呼吸道疾病	27	34.59	5.14	肺炎	21	24.83	5.72
6	慢性下呼吸道疾病	31	19.06	3.48	糖尿病	25	32.02	4.76	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	20.10	4.63
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	31	19.06	3.48	高血壓性疾病	16	20.50	3.05	慢性肝病及肝硬化	11	13.01	3.00
8	事故傷害	24	14.76	2.69	事故傷害	16	20.50	3.05	蓄意自我傷害（自殺）	9	10.64	2.45
9	高血壓性疾病	23	14.14	2.58	敗血症	15	19.21	2.86	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	10.64	2.45
10	敗血症	21	12.91	2.35	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	17.93	2.67	事故傷害	8	9.46	2.18
	其他	213	130.96	23.88	其他	114	146.03	21.71	其他	87	102.86	23.71
11	蓄意自我傷害（自殺）	19	11.68	2.13	蓄意自我傷害（自殺）	10	12.81	1.90	高血壓性疾病	7	8.28	1.91
12	慢性肝病及肝硬化	18	11.07	2.02	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	9	11.53	1.71	敗血症	6	7.09	1.63
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	9.84	1.79	慢性肝病及肝硬化	7	8.97	1.33	血管性及未明示之癡呆症	6	7.09	1.63
14	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	10	6.15	1.12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	8.97	1.33	帕金森病	6	7.09	1.63
15	帕金森病(1)	9	5.53	1.01	主動脈瘤及剝離	6	7.69	1.14	慢性下呼吸道疾病	4	4.73	1.09

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：血管性及未明示之癡呆症死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、5.53。

表28-6·ICD-10 臺北市大同區主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	889	687.47	100.00	所有死亡原因	516	813.84	100.00	所有死亡原因	373	565.91	100.00
1	惡性腫瘤	282	218.07	31.72	惡性腫瘤	172	271.28	33.33	惡性腫瘤	110	166.89	29.49
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	125	96.66	14.06	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	73	115.14	14.15	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	52	78.89	13.94
3	腦血管疾病	59	45.63	6.64	糖尿病	29	45.74	5.62	腦血管疾病	31	47.03	8.31
4	糖尿病	49	37.89	5.51	肺炎	29	45.74	5.62	糖尿病	20	30.34	5.36
5	肺炎	47	36.35	5.29	腦血管疾病	28	44.16	5.43	肺炎	18	27.31	4.83
6	慢性下呼吸道疾病	32	24.75	3.60	慢性下呼吸道疾病	22	34.70	4.26	敗血症	13	19.72	3.49
7	敗血症	29	22.43	3.26	敗血症	16	25.24	3.10	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	19.72	3.49
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	19.33	2.81	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	18.93	2.33	高血壓性疾病	10	15.17	2.68
9	高血壓性疾病	20	15.47	2.25	事故傷害	12	18.93	2.33	慢性下呼吸道疾病	10	15.17	2.68
10	事故傷害	16	12.37	1.80	高血壓性疾病	10	15.77	1.94	慢性肝病及肝硬化	8	12.14	2.14
	其他	205	158.53	23.06	其他	113	178.23	21.90	其他	88	133.51	23.59
11	慢性肝病及肝硬化	15	11.60	1.69	蓄意自我傷害（自殺）	8	12.62	1.55	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	9.10	1.61
12	蓄意自我傷害（自殺）	11	8.51	1.24	慢性肝病及肝硬化	7	11.04	1.36	血管性及未明示之癱瘓症	6	9.10	1.61
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	8.51	1.24	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	7.89	0.97	事故傷害	4	6.07	1.07
14	帕金森病	7	5.41	0.79	帕金森病	5	7.89	0.97	蓄意自我傷害（自殺）	3	4.55	0.80
15	血管性及未明示之癱瘓症(1)	6	4.64	0.67	結核病(2)	3	4.73	0.58	主動脈瘤及剝離(3)	3	4.55	0.80

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、4.64。

(2)男性：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）、原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）、胃及十二指腸潰瘍、病毒性肝炎之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、4.73。

(3)女性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、4.55。

表28-7·ICD-10 臺北市萬華區主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,604	830.86	100.00	所有死亡原因	1020	1,065.83	100.00	所有死亡原因	584	599.87	100.00
1	惡性腫瘤	464	240.35	28.93	惡性腫瘤	308	321.84	30.20	惡性腫瘤	156	160.24	26.71
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	215	111.37	13.40	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	138	144.20	13.53	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	77	79.09	13.18
3	腦血管疾病	123	63.71	7.67	腦血管疾病	87	90.91	8.53	糖尿病	52	53.41	8.90
4	糖尿病	88	45.58	5.49	肺炎	59	61.65	5.78	高血壓性疾病	37	38.01	6.34
5	肺炎	85	44.03	5.30	慢性下呼吸道疾病	49	51.20	4.80	腦血管疾病	36	36.98	6.16
6	高血壓性疾病	60	31.08	3.74	糖尿病	36	37.62	3.53	肺炎	26	26.71	4.45
7	慢性下呼吸道疾病	57	29.53	3.55	慢性肝病及肝硬化	34	35.53	3.33	敗血症	20	20.54	3.42
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	45	23.31	2.81	事故傷害	29	30.30	2.84	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	19.52	3.25
9	敗血症	43	22.27	2.68	腎炎、腎病症候群及腎病變	26	27.17	2.55	事故傷害	13	13.35	2.23
10	慢性肝病及肝硬化	42	21.76	2.62	敗血症	23	24.03	2.25	慢性下呼吸道疾病	8	8.22	1.37
	其他	382	197.87	23.82	其他	231	241.38	22.65	其他	140	143.81	23.97
11	事故傷害	42	21.76	2.62	高血壓性疾病	23	24.03	2.25	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	8.22	1.37
12	蓄意自我傷害（自殺）	28	14.50	1.75	蓄意自我傷害（自殺）	20	20.90	1.96	慢性肝病及肝硬化	8	8.22	1.37
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	10.88	1.31	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	13.58	1.27	蓄意自我傷害（自殺）	8	8.22	1.37
14	帕金森病	14	7.25	0.87	帕金森病	9	9.40	0.88	血管性及未明示之癱瘓症	7	7.19	1.20
15	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	12	6.22	0.75	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）(1)	7	7.31	0.69	帕金森病(2)	5	5.14	0.86

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、7.31。

(2)女性：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、5.14。

表28-8 · ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,514	560.07	100.00	所有死亡原因	885	678.31	100.00	所有死亡原因	629	449.75	100.00
1	惡性腫瘤	403	149.08	26.62	惡性腫瘤	227	173.99	25.65	惡性腫瘤	176	125.85	27.98
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	201	74.35	13.28	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	125	95.81	14.12	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	76	54.34	12.08
3	腦血管疾病	122	45.13	8.06	腦血管疾病	70	53.65	7.91	腦血管疾病	52	37.18	8.27
4	肺炎	96	35.51	6.34	肺炎	56	42.92	6.33	糖尿病	47	33.61	7.47
5	糖尿病	91	33.66	6.01	糖尿病	44	33.72	4.97	肺炎	40	28.60	6.36
6	高血壓性疾病	61	22.57	4.03	慢性下呼吸道疾病	36	27.59	4.07	高血壓性疾病	29	20.74	4.61
7	敗血症	59	21.83	3.90	敗血症	33	25.29	3.73	敗血症	26	18.59	4.13
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	54	19.98	3.57	高血壓性疾病	32	24.53	3.62	腎炎、腎病症候群及腎病變	26	18.59	4.13
9	慢性下呼吸道疾病	45	16.65	2.97	腎炎、腎病症候群及腎病變	28	21.46	3.16	事故傷害	14	10.01	2.23
10	事故傷害	39	14.43	2.58	事故傷害	25	19.16	2.82	蓄意自我傷害（自殺）	10	7.15	1.59
	其他	343	126.88	22.66	其他	209	160.19	23.62	其他	133	95.10	21.14
11	蓄意自我傷害（自殺）	30	11.10	1.98	蓄意自我傷害（自殺）	20	15.33	2.26	慢性下呼吸道疾病	9	6.44	1.43
12	慢性肝病及肝硬化	28	10.36	1.85	慢性肝病及肝硬化	19	14.56	2.15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	6.44	1.43
13	帕金森病	19	7.03	1.25	帕金森病	15	11.50	1.69	慢性肝病及肝硬化	9	6.44	1.43
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	6.29	1.12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	6.13	0.90	血管性及未明示之癡呆症	6	4.29	0.95
15	血管性及未明示之癡呆症	13	4.81	0.86	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）(1)	7	5.37	0.79	主動脈瘤及剝離	5	3.58	0.79

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）、血管性及未明示之癡呆症、主動脈瘤及剝離之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、5.37。

表28-9·ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	689	578.40	100.00	所有死亡原因	405	694.52	100.00	所有死亡原因	284	467.05	100.00
1	惡性腫瘤	226	189.72	32.80	惡性腫瘤	136	233.22	33.58	惡性腫瘤	90	148.01	31.69
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	85	71.36	12.34	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	47	80.60	11.60	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	38	62.49	13.38
3	腦血管疾病	62	52.05	9.00	腦血管疾病	38	65.16	9.38	腦血管疾病	24	39.47	8.45
4	肺炎	43	36.10	6.24	肺炎	28	48.02	6.91	糖尿病	18	29.60	6.34
5	糖尿病	32	26.86	4.64	慢性下呼吸道疾病	17	29.15	4.20	肺炎	15	24.67	5.28
6	敗血症	21	17.63	3.05	糖尿病	14	24.01	3.46	高血壓性疾病	10	16.45	3.52
7	慢性下呼吸道疾病	20	16.79	2.90	敗血症	12	20.58	2.96	敗血症	9	14.80	3.17
8	慢性肝病及肝硬化	20	16.79	2.90	事故傷害	12	20.58	2.96	慢性肝病及肝硬化	9	14.80	3.17
9	高血壓性疾病	19	15.95	2.76	慢性肝病及肝硬化	11	18.86	2.72	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	13.16	2.82
10	事故傷害	14	11.75	2.03	高血壓性疾病	9	15.43	2.22	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	8.22	1.76
	其他	147	123.40	21.34	其他	81	138.90	20.00	其他	58	95.38	20.42
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	10.91	1.89	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	8.57	1.23	慢性下呼吸道疾病	3	4.93	1.06
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	7.56	1.31	帕金森病	5	8.57	1.23	血管性及未明示之癱瘓症	3	4.93	1.06
13	血管性及未明示之癱瘓症	8	6.72	1.16	血管性及未明示之癱瘓症	5	8.57	1.23	主動脈瘤及剝離	3	4.93	1.06
14	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	5.04	0.87	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	6.86	0.99	先天性畸形變形及染色體異常	3	4.93	1.06
15	帕金森病(1)	6	5.04	0.87	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	4	6.86	0.99	源於周產期的特定病況	3	4.93	1.06

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：主動脈瘤及剝離之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、5.04。

表28-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	1,322	469.74	100.00	所有死亡原因	749	554.18	100.00	所有死亡原因	573	391.72	100.00
1	惡性腫瘤	403	143.20	30.48	惡性腫瘤	222	164.26	29.64	惡性腫瘤	181	123.74	31.59
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	161	57.21	12.18	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	98	72.51	13.08	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	63	43.07	10.99
3	腦血管疾病	109	38.73	8.25	腦血管疾病	67	49.57	8.95	腦血管疾病	42	28.71	7.33
4	糖尿病	66	23.45	4.99	慢性下呼吸道疾病	36	26.64	4.81	糖尿病	34	23.24	5.93
5	肺炎	58	20.61	4.39	肺炎	34	25.16	4.54	肺炎	24	16.41	4.19
6	慢性下呼吸道疾病	56	19.90	4.24	糖尿病	32	23.68	4.27	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	16.41	4.19
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	38	13.50	2.87	敗血症	23	17.02	3.07	慢性下呼吸道疾病	20	13.67	3.49
8	敗血症	37	13.15	2.80	事故傷害	20	14.80	2.67	敗血症	14	9.57	2.44
9	事故傷害	34	12.08	2.57	慢性肝病及肝硬化	19	14.06	2.54	高血壓性疾病	14	9.57	2.44
10	慢性肝病及肝硬化	32	11.37	2.42	蓄意自我傷害（自殺）	19	14.06	2.54	事故傷害	14	9.57	2.44
	其他	328	116.55	24.81	其他	179	132.44	23.90	其他	143	97.76	24.96
11	高血壓性疾病	31	11.02	2.34	高血壓性疾病	17	12.58	2.27	慢性肝病及肝硬化	13	8.89	2.27
12	蓄意自我傷害（自殺）	26	9.24	1.97	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	10.36	1.87	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	6.15	1.57
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	5.69	1.21	主動脈瘤及剝離	8	5.92	1.07	血管性及未明示之癡呆症	9	6.15	1.57
14	血管性及未明示之癡呆症	14	4.97	1.06	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	5.18	0.93	蓄意自我傷害（自殺）	7	4.79	1.22
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）(1)	12	4.26	0.91	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	4.44	0.80	帕金森病	7	4.79	1.22

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：主動脈瘤及剝離之疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為12人、4.26。



表28-11・ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,809	625.26	100.00	所有死亡原因	1060	755.93	100.00	所有死亡原因	749	502.37	100.00
1	惡性腫瘤	600	207.38	33.17	惡性腫瘤	366	261.01	34.53	惡性腫瘤	234	156.95	31.24
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	208	71.89	11.50	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	117	83.44	11.04	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	91	61.04	12.15
3	腦血管疾病	147	50.81	8.13	腦血管疾病	81	57.76	7.64	腦血管疾病	66	44.27	8.81
4	糖尿病	106	36.64	5.86	肺炎	60	42.79	5.66	糖尿病	52	34.88	6.94
5	肺炎	90	31.11	4.98	糖尿病	54	38.51	5.09	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	21.46	4.27
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	62	21.43	3.43	慢性下呼吸道疾病	43	30.66	4.06	肺炎	30	20.12	4.01
7	慢性下呼吸道疾病	58	20.05	3.21	事故傷害	32	22.82	3.02	高血壓性疾病	26	17.44	3.47
8	高血壓性疾病	50	17.28	2.76	腎炎、腎病症候群及腎病變	30	21.39	2.83	敗血症	16	10.73	2.14
9	事故傷害	46	15.90	2.54	敗血症	25	17.83	2.36	慢性下呼吸道疾病	15	10.06	2.00
10	敗血症	41	14.17	2.27	高血壓性疾病	24	17.12	2.26	事故傷害	14	9.39	1.87
	其他	401	138.60	22.17	其他	228	162.60	21.51	其他	173	116.04	23.10
11	慢性肝病及肝硬化	35	12.10	1.93	慢性肝病及肝硬化	24	17.12	2.26	慢性肝病及肝硬化	11	7.38	1.47
12	蓄意自我傷害（自殺）	30	10.37	1.66	蓄意自我傷害（自殺）	21	14.98	1.98	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	10	6.71	1.34
13	帕金森病	20	6.91	1.11	帕金森病	13	9.27	1.23	蓄意自我傷害（自殺）	9	6.04	1.20
14	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	18	6.22	1.00	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	5.71	0.75	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	6.04	1.20
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	5.88	0.94	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）(1)	8	5.71	0.75	帕金森病(2)	7	4.70	0.93

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、5.71。

(2)女性：血管性及未明示之癡呆症之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、4.70。

表28-12 · ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,521	596.90	100.00	所有死亡原因	911	737.79	100.00	所有死亡原因	610	464.44	100.00
1	惡性腫瘤	463	181.70	30.44	惡性腫瘤	276	223.52	30.30	惡性腫瘤	187	142.38	30.66
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	206	80.84	13.54	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	137	110.95	15.04	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	69	52.54	11.31
3	腦血管疾病	109	42.78	7.17	腦血管疾病	54	43.73	5.93	腦血管疾病	55	41.88	9.02
4	糖尿病	89	34.93	5.85	肺炎	53	42.92	5.82	糖尿病	43	32.74	7.05
5	肺炎	79	31.00	5.19	慢性下呼吸道疾病	47	38.06	5.16	肺炎	26	19.80	4.26
6	慢性下呼吸道疾病	62	24.33	4.08	糖尿病	46	37.25	5.05	高血壓性疾病	24	18.27	3.93
7	高血壓性疾病	51	20.01	3.35	慢性肝病及肝硬化	29	23.49	3.18	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	16.75	3.61
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	45	17.66	2.96	高血壓性疾病	27	21.87	2.96	慢性下呼吸道疾病	15	11.42	2.46
9	慢性肝病及肝硬化	41	16.09	2.70	事故傷害	27	21.87	2.96	敗血症	14	10.66	2.30
10	敗血症	40	15.70	2.63	敗血症	26	21.06	2.85	慢性肝病及肝硬化	12	9.14	1.97
	其他	336	131.86	22.09	其他	189	153.06	20.75	其他	143	108.88	23.44
11	事故傷害	37	14.52	2.43	腎炎、腎病症候群及腎病變	23	18.63	2.52	蓄意自我傷害（自殺）	11	8.38	1.80
12	蓄意自我傷害（自殺）	26	10.20	1.71	蓄意自我傷害（自殺）	15	12.15	1.65	事故傷害	10	7.61	1.64
13	帕金森病	16	6.28	1.05	主動脈瘤及剝離	12	9.72	1.32	帕金森病	9	6.85	1.48
14	主動脈瘤及剝離	16	6.28	1.05	結核病	8	6.48	0.88	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	5.33	1.15
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	5.49	0.92	帕金森病	7	5.67	0.77	血管性及未明示之癡呆症(1)	4	3.05	0.66

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：主動脈瘤及剝離、肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）、源於周產期的特定病況之疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、3.05。

表29-1·ICD-10 臺北市松山區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	25	11.87	100.00	15	15.05	100.00	10	9.01	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	6	2.85	24.00	4	4.01	26.67	2	1.80	20.00
W00-W19	跌倒(落)	4	1.90	16.00	4	4.01	26.67	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.47	4.00	1	1.00	6.67	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.95	8.00	1	1.00	6.67	1	0.90	10.00
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.47	4.00	1	1.00	6.67	-	-	-
	其他	11	5.22	44.00	4	4.01	26.67	7	6.31	70.00

資料來源：衛生福利部。

表29-2·ICD-10 臺北市信義區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	33	14.47	100.00	26	23.73	100.00	7	5.90	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	11	4.82	33.33	8	7.30	30.77	3	2.53	42.86
W00-W19	跌倒(落)	7	3.07	21.21	6	5.48	23.08	1	0.84	14.29
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	1.75	12.12	3	2.74	11.54	1	0.84	14.29
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.88	6.06	2	1.83	7.69	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	2.19	15.15	4	3.65	15.38	1	0.84	14.29
	其他	4	1.75	12.12	3	2.74	11.54	1	0.84	14.29

資料來源：衛生福利部。

表29-3 · ICD-10 臺北市大安區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	44	14.04	100.00	31	21.09	100.00	13	7.81	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	18	5.74	40.91	12	8.16	38.71	6	3.61	46.15
W00-W19	跌倒(落)	10	3.19	22.73	7	4.76	22.58	3	1.80	23.08
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.32	2.27	1	0.68	3.23	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	1.28	9.09	4	2.72	12.90	-	-	-
	其他	11	3.51	25.00	7	4.76	22.58	4	2.40	30.77

資料來源：衛生福利部。

表29-4·ICD-10 臺北市中山區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	52	22.84	100.00	26	24.39	100.00	26	21.47	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	18	7.90	34.62	10	9.38	38.46	8	6.60	30.77
W00-W19	跌倒(落)	15	6.59	28.85	9	8.44	34.62	6	4.95	23.08
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.44	1.92	-	-	-	1	0.83	3.85
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.32	5.77	-	-	-	3	2.48	11.54
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.32	5.77	2	1.88	7.69	1	0.83	3.85
	其他	12	5.27	23.08	5	4.69	19.23	7	5.78	26.92

資料來源：衛生福利部。

表29-5 · ICD-10 臺北市中正區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	24	14.76	100.00	16	20.50	100.00	8	9.46	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	7	4.30	29.17	5	6.40	31.25	2	2.36	25.00
W00-W19	跌倒(落)	4	2.46	16.67	3	3.84	18.75	1	1.18	12.50
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.61	4.17	-	-	-	1	1.18	12.50
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	2.46	16.67	2	2.56	12.50	2	2.36	25.00
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.84	12.50	3	3.84	18.75	-	-	-
	其他	5	3.07	20.83	3	3.84	18.75	2	2.36	25.00

資料來源：衛生福利部。

表29-6·ICD-10 臺北市大同區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	16	12.37	100.00	12	18.93	100.00	4	6.07	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	6	4.64	37.50	4	6.31	33.33	2	3.03	50.00
W00-W19	跌倒(落)	1	0.77	6.25	1	1.58	8.33	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	1.55	12.50	2	3.15	16.67	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.77	6.25	1	1.58	8.33	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	6	4.64	37.50	4	6.31	33.33	2	3.03	50.00

資料來源：衛生福利部。



表29-7·ICD-10 臺北市萬華區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	42	21.76	100.00	29	30.30	100.00	13	13.35	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	13	6.73	30.95	10	10.45	34.48	3	3.08	23.08
W00-W19	跌倒(落)	11	5.70	26.19	9	9.40	31.03	2	2.05	15.38
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.52	2.38	-	-	-	1	1.03	7.69
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	3.11	14.29	4	4.18	13.79	2	2.05	15.38
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	1.04	4.76	-	-	-	2	2.05	15.38
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.04	4.76	2	2.09	6.90	-	-	-
	其他	7	3.63	16.67	4	4.18	13.79	3	3.08	23.08

資料來源：衛生福利部。

表29-8 · ICD-10 臺北市文山區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	39	14.43	100.00	25	19.16	100.00	14	10.01	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	10	3.70	25.64	7	5.37	28.00	3	2.15	21.43
W00-W19	跌倒(落)	11	4.07	28.21	8	6.13	32.00	3	2.15	21.43
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.74	5.13	2	1.53	8.00	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.37	2.56	-	-	-	1	0.72	7.14
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.37	2.56	1	0.77	4.00	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.11	7.69	1	0.77	4.00	2	1.43	14.29
	其他	11	4.07	28.21	6	4.60	24.00	5	3.58	35.71

資料來源：衛生福利部。

表29-9 · ICD-10 臺北市南港區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	14	11.75	100.00	12	20.58	100.00	2	3.29	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	6	5.04	42.86	5	8.57	41.67	1	1.64	50.00
W00-W19	跌倒(落)	6	5.04	42.86	5	8.57	41.67	1	1.64	50.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.84	7.14	1	1.71	8.33	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.84	7.14	1	1.71	8.33	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表29-10 · ICD-10 臺北市內湖區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	34	12.08	100.00	20	14.80	100.00	14	9.57	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	12	4.26	35.29	6	4.44	30.00	6	4.10	42.86
W00-W19	跌倒(落)	4	1.42	11.76	2	1.48	10.00	2	1.37	14.29
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.36	2.94	1	0.74	5.00	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.71	5.88	2	1.48	10.00	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.71	5.88	1	0.74	5.00	1	0.68	7.14
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	13	4.62	38.24	8	5.92	40.00	5	3.42	35.71

資料來源：衛生福利部。

表29-11 · ICD-10 臺北市士林區事故傷害死亡原因  
中華民國101年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	46	15.90	100.00	32	22.82	100.00	14	9.39	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	23	7.95	50.00	16	11.41	50.00	7	4.70	50.00
W00-W19	跌倒(落)	12	4.15	26.09	9	6.42	28.13	3	2.01	21.43
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.35	2.17	-	-	-	1	0.67	7.14
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	1.38	8.70	3	2.14	9.38	1	0.67	7.14
	其他	6	2.07	13.04	4	2.85	12.50	2	1.34	14.29

資料來源：衛生福利部。

表29-12 · ICD-10 臺北市北投區事故傷害死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	37	14.52	100.00	27	21.87	100.00	10	7.61	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	20	7.85	54.05	15	12.15	55.56	5	3.81	50.00
W00-W19	跌倒(落)	3	1.18	8.11	3	2.43	11.11	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.39	2.70	1	0.81	3.70	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.39	2.70	1	0.81	3.70	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.18	8.11	2	1.62	7.41	1	0.76	10.00
	其他	9	3.53	24.32	5	4.05	18.52	4	3.05	40.00

資料來源：衛生福利部。

表30-1 · ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	17	8.07	100.00	10	10.03	100.00	7	6.31	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.47	5.88	-	-	-	1	0.90	14.29			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.90	23.53	2	2.01	20.00	2	1.80	28.57			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	2.37	29.41	3	3.01	30.00	2	1.80	28.57			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.95	11.76	2	2.01	20.00	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.47	5.88	1	1.00	10.00	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	1.90	23.53	2	2.01	20.00	2	1.80	28.57			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-2 · ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	27	11.84	100.00	17	15.52	100.00	10	8.43	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	4.38	37.04	8	7.30	47.06	2	1.69	20.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	3.70	-	-	-	1	0.84	10.00
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	2.19	18.52	5	4.56	29.41	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.88	7.41	1	0.91	5.88	1	0.84	10.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.44	3.70	-	-	-	1	0.84	10.00
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	3.07	25.93	2	1.83	11.76	5	4.22	50.00
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.44	3.70	1	0.91	5.88	-	-	-

資料來源：衛生福利部。



表30-3 · ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	21	6.70	100.00	10	6.80	100.00	11	6.61	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.96	14.29	-	-	-	3	1.80	27.27
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	3.83	57.14	7	4.76	70.00	5	3.01	45.45
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	1.91	28.57	3	2.04	30.00	3	1.80	27.27
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-4 · ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	21	9.22	100.00	13	12.20	100.00	8	6.60	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.44	4.76	1	0.94	7.69	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.76	19.05	4	3.75	30.77	-	-	-			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	2.20	23.81	4	3.75	30.77	1	0.83	12.50			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.32	14.29	1	0.94	7.69	2	1.65	25.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	3.51	38.10	3	2.81	23.08	5	4.13	62.50			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-5 · ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	19	11.68	100.00	10	12.81	100.00	9	10.64	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.61	5.26	1	1.28	10.00	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	1.23	10.53	2	2.56	20.00	-	-	-			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	3.07	26.32	2	2.56	20.00	3	3.55	33.33			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	1.23	10.53	1	1.28	10.00	1	1.18	11.11			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.61	5.26	1	1.28	10.00	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.61	5.26	-	-	-	1	1.18	11.11			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	4.30	36.84	3	3.84	30.00	4	4.73	44.44			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-6 · ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男 性				女 性			
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	11	8.51	100.00	8	12.62	100.00	3	4.55	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	3.09	36.36	3	4.73	37.50	1	1.52	33.33			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	2	1.55	18.18	2	3.15	25.00	-	-	-			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.77	9.09	1	1.58	12.50	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.77	9.09	1	1.58	12.50	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	1	0.77	9.09	1	1.58	12.50	-	-	-			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	1.55	18.18	-	-	-	2	3.03	66.67			

資料來源：衛生福利部。

表30-7 · ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	28	14.50	100.00	20	20.90	100.00	8	8.22	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	3.11	21.43	5	5.22	25.00	1	1.03	12.50			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	9	4.66	32.14	7	7.31	35.00	2	2.05	25.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	5	2.59	17.86	3	3.13	15.00	2	2.05	25.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.52	3.57	-	-	-	1	1.03	12.50			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	3.63	25.00	5	5.22	25.00	2	2.05	25.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-8 · ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	30	11.10	100.00	20	15.33	100.00	10	7.15	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.37	3.33	-	-	-	1	0.72	10.00
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	2.96	26.67	7	5.37	35.00	1	0.72	10.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.37	3.33	1	0.77	5.00	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	6	2.22	20.00	6	4.60	30.00	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.11	10.00	2	1.53	10.00	1	0.72	10.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.37	3.33	1	0.77	5.00	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.37	3.33	1	0.77	5.00	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	2.96	26.67	2	1.53	10.00	6	4.29	60.00
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.37	3.33	-	-	-	1	0.72	10.00
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-9 · ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	5	4.20	100.00	3	5.14	100.00	2	3.29	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.84	20.00	1	1.71	33.33	-	-	-			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.84	20.00	-	-	-	1	1.64	50.00			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	2	1.68	40.00	2	3.43	66.67	-	-	-			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	1	0.84	20.00	-	-	-	1	1.64	50.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-10 · ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	26	9.24	100.00	19	14.06	100.00		7	4.79	100.00		
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	1.78	19.23	2	1.48	10.53		3	2.05	42.86		
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.71	7.69	2	1.48	10.53		-	-	-	-	
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	2.49	26.92	5	3.70	26.32		2	1.37	28.57		
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.07	11.54	2	1.48	10.53		1	0.68	14.29		
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.36	3.85	1	0.74	5.26		-	-	-	-	
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	2.13	23.08	5	3.70	26.32		1	0.68	14.29		
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.36	3.85	1	0.74	5.26		-	-	-	-	
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.36	3.85	1	0.74	5.26		-	-	-	-	

資料來源：衛生福利部。



表30-11 · ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男 性				女 性			
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	30	10.37	100.00	21	14.98	100.00		9	6.04	100.00		
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.35	3.33	1	0.71	4.76		-	-	-		
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.69	6.67	-	-	-		2	1.34	22.22		
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.38	13.33	3	2.14	14.29		1	0.67	11.11		
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	11	3.80	36.67	7	4.99	33.33		4	2.68	44.44		
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.38	13.33	3	2.14	14.29		1	0.67	11.11		
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.35	3.33	1	0.71	4.76		-	-	-		
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.35	3.33	1	0.71	4.76		-	-	-		
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	1.73	16.67	4	2.85	19.05		1	0.67	11.11		
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.35	3.33	1	0.71	4.76		-	-	-		

資料來源：衛生福利部。

表30-12 · ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	26	10.20	100.00	15	12.15	100.00	11	8.38	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.39	3.85	-	-	-	1	0.76	9.09
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.57	15.38	3	2.43	20.00	1	0.76	9.09
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.39	3.85	1	0.81	6.67	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	8	3.14	30.77	6	4.86	40.00	2	1.52	18.18
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.18	11.54	1	0.81	6.67	2	1.52	18.18
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.39	3.85	1	0.81	6.67	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	2.75	26.92	2	1.62	13.33	5	3.81	45.45
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.39	3.85	1	0.81	6.67	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-1 · ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	389	184.69	100.00	所有癌症死亡原因	211	211.68	100.00	所有癌症死亡原因	178	160.44	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	65	30.86	16.71	氣管、支氣管和肺癌	33	33.11	15.64	氣管、支氣管和肺癌	32	28.84	17.98
2	結腸、直腸和肛門癌	52	24.69	13.37	肝和肝內膽管癌	32	32.10	15.17	女性乳房癌	26	23.44	14.61
3	女性乳房癌(1)	26	23.44	6.68	結腸、直腸和肛門癌	26	26.08	12.32	結腸、直腸和肛門癌	26	23.44	14.61
4	肝和肝內膽管癌	47	22.31	12.08	胃癌	22	22.07	10.43	肝和肝內膽管癌	15	13.52	8.43
5	胃癌	35	16.62	9.00	前列腺(攝護腺)癌	15	15.05	7.11	胃癌	13	11.72	7.30
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	15	15.05	3.86	食道癌	11	11.04	5.21	胰臟癌	9	8.11	5.06
7	胰臟癌	19	9.02	4.88	胰臟癌	10	10.03	4.74	卵巢癌	9	8.11	5.06
8	卵巢癌(1)	9	8.11	2.31	口腔癌	10	10.03	4.74	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	7.21	4.49
9	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	7.21	2.06	非何杰金氏淋巴瘤	8	8.03	3.79	非何杰金氏淋巴瘤	6	5.41	3.37
10	非何杰金氏淋巴瘤	14	6.65	3.60	膀胱癌	7	7.02	3.32	子宮體癌	5	4.51	2.81
	其他	99	47.00	25.45	其他	37	37.12	17.54	其他	29	26.14	16.29
11	食道癌	11	5.22	2.83	白血病	6	6.02	2.84	膀胱癌	3	2.70	1.69
12	口腔癌	11	5.22	2.83	腦癌	5	5.02	2.37	白血病	3	2.70	1.69
13	膀胱癌	10	4.75	2.57	鼻咽癌	4	4.01	1.90	腎臟癌	2	1.80	1.12
14	子宮體癌	5	4.51	1.29	腎臟癌	3	3.01	1.42	膽囊和其他膽道癌	2	1.80	1.12
15	白血病	9	4.27	2.31	間皮和軟組織癌(3)	1	1.00	0.47	甲狀腺癌(4)	2	1.80	1.12

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：小腸癌、黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.00。

(4)女性：黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.80。

表31-2 · ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	447	195.95	100.00	所有癌症死亡原因	257	234.58	100.00	所有癌症死亡原因	190	160.26	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	87	38.14	19.46	氣管、支氣管和肺癌	54	49.29	21.01	氣管、支氣管和肺癌	33	27.83	17.37
2	肝和肝內膽管癌	60	26.30	13.42	肝和肝內膽管癌	39	35.60	15.18	女性乳房癌	29	24.46	15.26
3	女性乳房癌(1)	29	24.46	6.49	結腸、直腸和肛門癌	26	23.73	10.12	肝和肝內膽管癌	21	17.71	11.05
4	結腸、直腸和肛門癌	43	18.85	9.62	胃癌	22	20.08	8.56	結腸、直腸和肛門癌	17	14.34	8.95
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	17	15.52	3.80	前列腺(攝護腺)癌	17	15.52	6.61	胃癌	12	10.12	6.32
6	胃癌	34	14.90	7.61	口腔癌	16	14.60	6.23	卵巢癌	11	9.28	5.79
7	卵巢癌(1)	11	9.28	2.46	膀胱癌	13	11.87	5.06	非何杰金氏淋巴瘤	10	8.43	5.26
8	口腔癌	20	8.77	4.47	胰臟癌	9	8.21	3.50	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	8.43	5.26
9	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	10	8.43	2.24	食道癌	9	8.21	3.50	胰臟癌	8	6.75	4.21
10	胰臟癌	17	7.45	3.80	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.39	2.72	白血病	5	4.22	2.63
	其他	119	52.17	26.62	其他	45	41.07	17.51	其他	34	28.68	17.89
11	非何杰金氏淋巴瘤	17	7.45	3.80	鼻咽癌	7	6.39	2.72	子宮體癌	4	3.37	2.11
12	膀胱癌	15	6.58	3.36	白血病	4	3.65	1.56	口腔癌	4	3.37	2.11
13	食道癌	9	3.95	2.01	腎臟癌	3	2.74	1.17	腎臟癌	3	2.53	1.58
14	白血病	9	3.95	2.01	腦癌	3	2.74	1.17	膽囊和其他膽道癌	2	1.69	1.05
15	鼻咽癌	8	3.51	1.79	膽囊和其他膽道癌(3)	2	1.83	0.78	間皮和軟組織癌(4)	2	1.69	1.05

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：黑色素瘤和其他皮膚癌、喉癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.83。

(4)女性：膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.69。

表31-3 · ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	582	185.71	100.00	所有癌症死亡原因	305	207.46	100.00	所有癌症死亡原因	277	166.49	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	124	39.57	21.31	氣管、支氣管和肺癌	69	46.93	22.62	氣管、支氣管和肺癌	55	33.06	19.86
2	結腸、直腸和肛門癌	91	29.04	15.64	肝和肝內膽管癌	47	31.97	15.41	結腸、直腸和肛門癌	47	28.25	16.97
3	肝和肝內膽管癌	69	22.02	11.86	結腸、直腸和肛門癌	44	29.93	14.43	女性乳房癌	36	21.64	13.00
4	女性乳房癌(1)	36	21.64	6.19	胃癌	22	14.96	7.21	肝和肝內膽管癌	22	13.22	7.94
5	胃癌	41	13.08	7.04	胰臟癌	21	14.28	6.89	胃癌	19	11.42	6.86
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	16	10.88	2.75	前列腺(攝護腺)癌	16	10.88	5.25	胰臟癌	12	7.21	4.33
7	胰臟癌	33	10.53	5.67	非何杰金氏淋巴瘤	12	8.16	3.93	卵巢癌	11	6.61	3.97
8	卵巢癌(1)	11	6.61	1.89	腎臟癌	9	6.12	2.95	子宮頸及部位未明示子宮癌	11	6.61	3.97
9	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	11	6.61	1.89	白血病	8	5.44	2.62	白血病	6	3.61	2.17
10	非何杰金氏淋巴瘤	17	5.42	2.92	食道癌	7	4.76	2.30	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.01	1.81
	其他	133	42.44	22.85	其他	50	34.01	16.39	其他	53	31.86	19.13
11	白血病	14	4.47	2.41	口腔癌	5	3.40	1.64	口腔癌	4	2.40	1.44
12	腎臟癌	11	3.51	1.89	鼻咽癌	5	3.40	1.64	子宮體癌	4	2.40	1.44
13	食道癌	10	3.19	1.72	腦癌	5	3.40	1.64	腦癌	3	1.80	1.08
14	口腔癌	9	2.87	1.55	膽囊和其他膽道癌	4	2.72	1.31	膽囊和其他膽道癌	3	1.80	1.08
15	腦癌	8	2.55	1.37	膀胱癌(3)	3	2.04	0.98	間皮和軟組織癌(4)	3	1.80	1.08

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.04。

(4)女性：膀胱癌、食道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、1.80。

表31-4·ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	412	180.94	100.00	所有癌症死亡原因	237	222.36	100.00	所有癌症死亡原因	175	144.48	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	91	39.96	22.09	氣管、支氣管和肺癌	58	54.42	24.47	氣管、支氣管和肺癌	33	27.25	18.86
2	肝和肝內膽管癌	59	25.91	14.32	肝和肝內膽管癌	39	36.59	16.46	結腸、直腸和肛門癌	25	20.64	14.29
3	結腸、直腸和肛門癌	54	23.71	13.11	結腸、直腸和肛門癌	29	27.21	12.24	肝和肝內膽管癌	20	16.51	11.43
4	女性乳房癌(1)	18	14.86	4.37	口腔癌	18	16.89	7.59	女性乳房癌	18	14.86	10.29
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	12.20	3.16	胃癌	18	16.89	7.59	胰臟癌	11	9.08	6.29
6	胃癌	26	11.42	6.31	前列腺(攝護腺)癌	13	12.20	5.49	胃癌	8	6.60	4.57
7	口腔癌	21	9.22	5.10	非何杰金氏淋巴瘤	9	8.44	3.80	卵巢癌	7	5.78	4.00
8	胰臟癌	19	8.34	4.61	胰臟癌	8	7.51	3.38	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.95	3.43
9	非何杰金氏淋巴瘤	15	6.59	3.64	食道癌	5	4.69	2.11	白血病	5	4.13	2.86
10	卵巢癌(1)	7	5.78	1.70	鼻咽癌	5	4.69	2.11	腎臟癌	5	4.13	2.86
	其他	89	39.09	21.60	其他	35	32.84	14.77	其他	37	30.55	21.14
11	白血病	9	3.95	2.18	白血病	4	3.75	1.69	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	3.30	2.29
12	腎臟癌	9	3.95	2.18	膀胱癌	4	3.75	1.69	腦癌	4	3.30	2.29
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	4	3.30	0.97	腎臟癌	4	3.75	1.69	子宮體癌	3	2.48	1.71
14	腦癌	7	3.07	1.70	腦癌	3	2.81	1.27	甲狀腺癌	3	2.48	1.71
15	食道癌(3)	6	2.63	1.46	喉癌(4)	3	2.81	1.27	口腔癌	3	2.48	1.71

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：鼻咽癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、2.63。

(4)男性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.81。

表31-5 · ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	248	152.48	100.00	所有癌症死亡原因	137	175.49	100.00	所有癌症死亡原因	111	131.23	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	51	31.36	20.56	氣管、支氣管和肺癌	35	44.83	25.55	結腸、直腸和肛門癌	22	26.01	19.82
2	結腸、直腸和肛門癌	42	25.82	16.94	肝和肝內膽管癌	20	25.62	14.60	女性乳房癌	19	22.46	17.12
3	女性乳房癌(1)	19	22.46	7.66	結腸、直腸和肛門癌	20	25.62	14.60	氣管、支氣管和肺癌	16	18.92	14.41
4	肝和肝內膽管癌	30	18.44	12.10	胃癌	9	11.53	6.57	肝和肝內膽管癌	10	11.82	9.01
5	胃癌	15	9.22	6.05	前列腺(攝護腺)癌	7	8.97	5.11	胰臟癌	7	8.28	6.31
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	8.97	2.82	胰臟癌	7	8.97	5.11	胃癌	6	7.09	5.41
7	胰臟癌	14	8.61	5.65	腦癌	5	6.40	3.65	非何杰金氏淋巴瘤	5	5.91	4.50
8	非何杰金氏淋巴瘤	10	6.15	4.03	食道癌	5	6.40	3.65	膀胱癌	4	4.73	3.60
9	膀胱癌	8	4.92	3.23	非何杰金氏淋巴瘤	5	6.40	3.65	膽囊和其他膽道癌	3	3.55	2.70
10	腦癌	7	4.30	2.82	口腔癌	4	5.12	2.92	腎臟癌	3	3.55	2.70
	其他	45	27.67	18.15	其他	20	25.62	14.60	其他	16	18.92	14.41
11	腎臟癌	6	3.69	2.42	膀胱癌	4	5.12	2.92	白血病	2	2.36	1.80
12	食道癌	5	3.07	2.02	腎臟癌	3	3.84	2.19	卵巢癌	2	2.36	1.80
13	黑色素瘤和其他皮膚癌	5	3.07	2.02	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	3.84	2.19	間皮和軟組織癌	2	2.36	1.80
14	口腔癌	4	2.46	1.61	鼻咽癌	2	2.56	1.46	腦癌	2	2.36	1.80
15	膽囊和其他膽道癌	4	2.46	1.61	白血病(3)	1	1.28	0.73	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	2.36	1.80

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：膽囊和其他膽道癌、主唾液腺癌、甲狀腺癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.28。

表31-6 · ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	282	218.07	100.00	所有癌症死亡原因	172	271.28	100.00	所有癌症死亡原因	110	166.89	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	59	45.63	20.92	氣管、支氣管和肺癌	39	61.51	22.67	氣管、支氣管和肺癌	20	30.34	18.18
2	肝和肝內膽管癌	53	40.99	18.79	肝和肝內膽管癌	38	59.93	22.09	肝和肝內膽管癌	15	22.76	13.64
3	結腸、直腸和肛門癌	33	25.52	11.70	結腸、直腸和肛門癌	20	31.54	11.63	結腸、直腸和肛門癌	13	19.72	11.82
4	女性乳房癌(1)	9	13.65	3.19	胃癌	11	17.35	6.40	女性乳房癌	9	13.65	8.18
5	胃癌	14	10.83	4.96	口腔癌	10	15.77	5.81	非何杰金氏淋巴瘤	7	10.62	6.36
6	胰臟癌	14	10.83	4.96	胰臟癌	9	14.19	5.23	胰臟癌	5	7.59	4.55
7	口腔癌	11	8.51	3.90	食道癌	8	12.62	4.65	間皮和軟組織癌	4	6.07	3.64
8	食道癌	9	6.96	3.19	鼻咽癌	7	11.04	4.07	子宮體癌	4	6.07	3.64
9	鼻咽癌	9	6.96	3.19	膀胱癌	5	7.89	2.91	胃癌	3	4.55	2.73
10	子宮體癌(1)	4	6.07	1.42	白血病	4	6.31	2.33	卵巢癌	3	4.55	2.73
	其他	67	51.81	23.76	其他	21	33.12	12.21	其他	27	40.96	24.55
11	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.41	2.48	前列腺(攝護腺)癌	3	4.73	1.74	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.55	2.73
12	前列腺(攝護腺)癌(2)	3	4.73	1.06	腎臟癌	2	3.15	1.16	膽囊和其他膽道癌	3	4.55	2.73
13	膀胱癌	6	4.64	2.13	小腸癌	2	3.15	1.16	胸腺癌	2	3.03	1.82
14	卵巢癌(1)	3	4.55	1.06	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	2	3.15	1.16	鼻咽癌	2	3.03	1.82
15	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	4.55	1.06	腦癌(3)	1	1.58	0.58	腎臟癌	2	3.03	1.82

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：喉癌、胸腺癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.58。



表31-7 · ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	464	240.35	100.00	所有癌症死亡原因	308	321.84	100.00	所有癌症死亡原因	156	160.24	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	101	52.32	21.77	氣管、支氣管和肺癌	76	79.41	24.68	氣管、支氣管和肺癌	25	25.68	16.03
2	肝和肝內膽管癌	82	42.48	17.67	肝和肝內膽管癌	57	59.56	18.51	肝和肝內膽管癌	25	25.68	16.03
3	結腸、直腸和肛門癌	59	30.56	12.72	結腸、直腸和肛門癌	41	42.84	13.31	女性乳房癌	23	23.63	14.74
4	女性乳房癌(1)	23	23.63	4.96	口腔癌	26	27.17	8.44	結腸、直腸和肛門癌	18	18.49	11.54
5	胃癌	27	13.99	5.82	胃癌	16	16.72	5.19	胃癌	11	11.30	7.05
6	口腔癌	27	13.99	5.82	食道癌	14	14.63	4.55	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	8.22	5.13
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	13.58	2.80	前列腺(攝護腺)癌	13	13.58	4.22	胰臟癌	7	7.19	4.49
8	胰臟癌	17	8.81	3.66	胰臟癌	10	10.45	3.25	非何杰金氏淋巴瘤	5	5.14	3.21
9	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	8.22	1.72	膀胱癌	6	6.27	1.95	卵巢癌	4	4.11	2.56
10	食道癌	15	7.77	3.23	非何杰金氏淋巴瘤	5	5.22	1.62	白血病	3	3.08	1.92
	其他	92	47.66	19.83	其他	44	45.98	14.29	其他	27	27.73	17.31
11	非何杰金氏淋巴瘤	10	5.18	2.16	鼻咽癌	4	4.18	1.30	子宮體癌	2	2.05	1.28
12	卵巢癌(1)	4	4.11	0.86	腦癌	4	4.18	1.30	小腸癌	2	2.05	1.28
13	膀胱癌	7	3.63	1.51	白血病	3	3.13	0.97	腎臟癌	1	1.03	0.64
14	白血病	6	3.11	1.29	腎臟癌	2	2.09	0.65	膀胱癌	1	1.03	0.64
15	腦癌	5	2.59	1.08	胸腺癌	2	2.09	0.65	腦癌(3)	1	1.03	0.64

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：口腔癌、間皮和軟組織癌、黑色素瘤和其他皮膚癌、膽囊和其他膽道癌、食道癌、骨和關節軟骨癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.03。

表31-8 · ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	403	149.08	100.00	所有癌症死亡原因	227	173.99	100.00	所有癌症死亡原因	176	125.85	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	69	25.52	17.12	肝和肝內膽管癌	41	31.42	18.06	氣管、支氣管和肺癌	30	21.45	17.05
2	肝和肝內膽管癌	57	21.09	14.14	氣管、支氣管和肺癌	39	29.89	17.18	結腸、直腸和肛門癌	24	17.16	13.64
3	結腸、直腸和肛門癌	53	19.61	13.15	結腸、直腸和肛門癌	29	22.23	12.78	女性乳房癌	17	12.16	9.66
4	胃癌	35	12.95	8.68	胃癌	22	16.86	9.69	肝和肝內膽管癌	16	11.44	9.09
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	16	12.26	3.97	前列腺(攝護腺)癌	16	12.26	7.05	胰臟癌	14	10.01	7.95
6	女性乳房癌(1)	17	12.16	4.22	胰臟癌	10	7.66	4.41	胃癌	13	9.30	7.39
7	胰臟癌	24	8.88	5.96	白血病	9	6.90	3.96	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.72	4.55
8	白血病	16	5.92	3.97	口腔癌	7	5.37	3.08	白血病	7	5.01	3.98
9	非何杰金氏淋巴瘤	15	5.55	3.72	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.37	3.08	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	4.29	3.41
10	口腔癌	12	4.44	2.98	膽囊和其他膽道癌	6	4.60	2.64	卵巢癌	5	3.58	2.84
	其他	89	32.92	22.08	其他	41	31.42	18.06	其他	36	25.74	20.45
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	4.29	1.49	腦癌	5	3.83	2.20	口腔癌	5	3.58	2.84
12	卵巢癌(1)	5	3.58	1.24	食道癌	4	3.07	1.76	膀胱癌	4	2.86	2.27
13	膀胱癌	7	2.59	1.74	鼻咽癌	4	3.07	1.76	甲狀腺癌	3	2.15	1.70
14	腦癌	6	2.22	1.49	膀胱癌	3	2.30	1.32	間皮和軟組織癌	2	1.43	1.14
15	膽囊和其他膽道癌	6	2.22	1.49	腎臟癌	3	2.30	1.32	腦癌(3)	1	0.72	0.57

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：子宮體癌、腎臟癌、鼻咽癌、食道癌、胸腺癌、骨和關節軟骨癌、腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、0.72。

表31-9 · ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因  
中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	226	189.72	100.00	所有癌症死亡原因	136	233.22	100.00	所有癌症死亡原因	90	148.01	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	43	36.10	19.03	氣管、支氣管和肺癌	28	48.02	20.59	氣管、支氣管和肺癌	15	24.67	16.67
2	肝和肝內膽管癌	32	26.86	14.16	肝和肝內膽管癌	25	42.87	18.38	女性乳房癌	13	21.38	14.44
3	女性乳房癌(1)	13	21.38	5.75	結腸、直腸和肛門癌	15	25.72	11.03	胃癌	8	13.16	8.89
4	結腸、直腸和肛門癌	22	18.47	9.73	口腔癌	14	24.01	10.29	結腸、直腸和肛門癌	7	11.51	7.78
5	口腔癌	15	12.59	6.64	食道癌	7	12.00	5.15	肝和肝內膽管癌	7	11.51	7.78
6	胃癌	13	10.91	5.75	前列腺(攝護腺)癌	6	10.29	4.41	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	8.22	5.56
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10.29	2.65	胃癌	5	8.57	3.68	胰臟癌	4	6.58	4.44
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	5	8.22	2.21	胰臟癌	5	8.57	3.68	腦癌	4	6.58	4.44
9	胰臟癌	9	7.56	3.98	非何杰金氏淋巴瘤	4	6.86	2.94	鼻咽癌	4	6.58	4.44
10	食道癌	7	5.88	3.10	白血病	3	5.14	2.21	卵巢癌	3	4.93	3.33
	其他	61	51.21	26.99	其他	24	41.16	17.65	其他	20	32.89	22.22
11	卵巢癌(1)	3	4.93	1.33	腎臟癌	3	5.14	2.21	膽囊和其他膽道癌	2	3.29	2.22
12	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.20	2.21	膽囊和其他膽道癌	1	1.71	0.74	腎臟癌	2	3.29	2.22
13	腎臟癌	5	4.20	2.21	膀胱癌	1	1.71	0.74	口腔癌	1	1.64	1.11
14	鼻咽癌	4	3.36	1.77	主唾液腺癌	1	1.71	0.74	子宮體癌	1	1.64	1.11
15	腦癌	4	3.36	1.77	甲狀腺癌(3)	1	1.71	0.74	間皮和軟組織癌(4)	1	1.64	1.11

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：骨和關節軟骨癌、喉癌、間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.71。

(4)女性：鼻腔、中耳和副鼻竇癌、膀胱癌、胸腺癌、小腸癌、非何杰金氏淋巴瘤之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.64。

表31-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	403	143.20	100.00	所有癌症死亡原因	222	164.26	100.00	所有癌症死亡原因	181	123.74	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	89	31.62	22.08	氣管、支氣管和肺癌	48	35.51	21.62	氣管、支氣管和肺癌	41	28.03	22.65
2	肝和肝內膽管癌	69	24.52	17.12	肝和肝內膽管癌	44	32.56	19.82	肝和肝內膽管癌	25	17.09	13.81
3	結腸、直腸和肛門癌	55	19.54	13.65	結腸、直腸和肛門癌	31	22.94	13.96	結腸、直腸和肛門癌	24	16.41	13.26
4	女性乳房癌(1)	20	13.67	4.96	前列腺(攝護腺)癌	15	11.10	6.76	女性乳房癌	20	13.67	11.05
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	15	11.10	3.72	口腔癌	12	8.88	5.41	卵巢癌	11	7.52	6.08
6	卵巢癌(1)	11	7.52	2.73	胃癌	12	8.88	5.41	胃癌	9	6.15	4.97
7	胃癌	21	7.46	5.21	胰臟癌	11	8.14	4.95	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	5.47	4.42
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	5.47	1.99	白血病	9	6.66	4.05	子宮體癌	8	5.47	4.42
9	子宮體癌(1)	8	5.47	1.99	食道癌	7	5.18	3.15	白血病	5	3.42	2.76
10	胰臟癌	14	4.97	3.47	鼻咽癌	4	2.96	1.80	腦癌	4	2.73	2.21
	其他	93	33.05	23.08	其他	29	21.46	13.06	其他	26	17.77	14.36
11	口腔癌	14	4.97	3.47	膽囊和其他膽道癌	4	2.96	1.80	胰臟癌	3	2.05	1.66
12	白血病	14	4.97	3.47	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.22	1.35	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.05	1.66
13	食道癌	9	3.20	2.23	腎臟癌	3	2.22	1.35	膽囊和其他膽道癌	2	1.37	1.10
14	非何杰金氏淋巴瘤	6	2.13	1.49	間皮和軟組織癌	3	2.22	1.35	口腔癌	2	1.37	1.10
15	膽囊和其他膽道癌(3)	6	2.13	1.49	膀胱癌(4)	2	1.48	0.90	食道癌	2	1.37	1.10

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、2.13。

(4)男性：腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.48。

表31-11 · ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	600	207.38	100.00	所有癌症死亡原因	366	261.01	100.00	所有癌症死亡原因	234	156.95	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	114	39.40	19.00	氣管、支氣管和肺癌	71	50.63	19.40	氣管、支氣管和肺癌	43	28.84	18.38
2	結腸、直腸和肛門癌	73	25.23	12.17	肝和肝內膽管癌	51	36.37	13.93	女性乳房癌	30	20.12	12.82
3	肝和肝內膽管癌	70	24.19	11.67	結腸、直腸和肛門癌	48	34.23	13.11	結腸、直腸和肛門癌	25	16.77	10.68
4	女性乳房癌(1)	30	20.12	5.00	口腔癌	29	20.68	7.92	肝和肝內膽管癌	19	12.74	8.12
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	19	13.55	3.17	食道癌	22	15.69	6.01	胰臟癌	19	12.74	8.12
6	胃癌	33	11.41	5.50	胃癌	21	14.98	5.74	胃癌	12	8.05	5.13
7	胰臟癌	33	11.41	5.50	前列腺(攝護腺)癌	19	13.55	5.19	卵巢癌	12	8.05	5.13
8	口腔癌	31	10.71	5.17	非何杰金氏淋巴瘤	14	9.98	3.83	子宮頸及部位未明示子宮癌	11	7.38	4.70
9	卵巢癌(1)	12	8.05	2.00	胰臟癌	14	9.98	3.83	非何杰金氏淋巴瘤	9	6.04	3.85
10	非何杰金氏淋巴瘤	23	7.95	3.83	鼻咽癌	10	7.13	2.73	腦癌	4	2.68	1.71
	其他	162	55.99	27.00	其他	67	47.78	18.31	其他	50	33.54	21.37
11	食道癌	23	7.95	3.83	腦癌	8	5.71	2.19	膽囊和其他膽道癌	4	2.68	1.71
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	11	7.38	1.83	白血病	7	4.99	1.91	甲狀腺癌	4	2.68	1.71
13	腦癌	12	4.15	2.00	膀胱癌	7	4.99	1.91	膀胱癌	3	2.01	1.28
14	鼻咽癌	12	4.15	2.00	間皮和軟組織癌	4	2.85	1.09	間皮和軟組織癌	2	1.34	0.85
15	膀胱癌	10	3.46	1.67	膽囊和其他膽道癌(3)	4	2.85	1.09	子宮體癌(4)	2	1.34	0.85

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：腎臟癌死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.85。

(4)女性：白血病、小腸癌、口腔癌、鼻咽癌死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.34。

表31-12 · ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因

中華民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	463	181.70	100.00	所有癌症死亡原因	276	223.52	100.00	所有癌症死亡原因	187	142.38	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	95	37.28	20.52	氣管、支氣管和肺癌	60	48.59	21.74	氣管、支氣管和肺癌	35	26.65	18.72
2	肝和肝內膽管癌	72	28.26	15.55	肝和肝內膽管癌	52	42.11	18.84	結腸、直腸和肛門癌	25	19.03	13.37
3	結腸、直腸和肛門癌	54	21.19	11.66	結腸、直腸和肛門癌	29	23.49	10.51	女性乳房癌	24	18.27	12.83
4	女性乳房癌(1)	24	18.27	5.18	口腔癌	24	19.44	8.70	肝和肝內膽管癌	20	15.23	10.70
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	15	12.15	3.24	前列腺(攝護腺)癌	15	12.15	5.43	胃癌	12	9.14	6.42
6	口腔癌	28	10.99	6.05	白血病	12	9.72	4.35	胰臟癌	9	6.85	4.81
7	胃癌	21	8.24	4.54	食道癌	11	8.91	3.99	非何杰金氏淋巴瘤	9	6.85	4.81
8	胰臟癌	18	7.06	3.89	胃癌	9	7.29	3.26	卵巢癌	7	5.33	3.74
9	白血病	16	6.28	3.46	胰臟癌	9	7.29	3.26	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	3.81	2.67
10	非何杰金氏淋巴瘤	15	5.89	3.24	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.86	2.17	子宮體癌	5	3.81	2.67
	其他	105	41.21	22.68	其他	49	39.68	17.75	其他	36	27.41	19.25
11	卵巢癌(1)	7	5.33	1.51	腦癌	5	4.05	1.81	白血病	4	3.05	2.14
12	食道癌	12	4.71	2.59	間皮和軟組織癌	4	3.24	1.45	口腔癌	4	3.05	2.14
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	5	3.81	1.08	鼻咽癌	4	3.24	1.45	腦癌	3	2.28	1.60
14	子宮體癌(1)	5	3.81	1.08	甲狀腺癌	3	2.43	1.09	膀胱癌	3	2.28	1.60
15	腦癌	8	3.14	1.73	膽囊和其他膽道癌(3)	2	1.62	0.72	膽囊和其他膽道癌(4)	2	1.52	1.07

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：膀胱癌、黑色素瘤和其他皮膚癌、小腸癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.62。

(4)女性：間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.52。

## 肆、歷年死因統計

### 一、主要死因統計





表32·臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		11,551	437.00		11,989	457.75		12,054	463.27		12,205	465.98		12,424	470.49		12,799	484.10
08-14	惡性腫瘤	1	3,180	120.31	1	3,366	128.52	1	3,504	134.67	1	3,489	133.21	1	3,564	134.97	1	3,738	141.38
25-27-28*	心臟疾病	3	1,257	47.56	2	1,384	52.84	2	1,453	55.84	2	1,331	50.82	2	1,428	54.08	3	1,252	47.35
29	腦血管疾病	2	1,306	49.41	3	1,361	51.96	3	1,326	50.96	3	1,303	49.75	3	1,209	45.78	2	1,380	52.20
181	糖尿病	5	620	23.46	5	634	24.21	4	755	29.02	5	647	24.70	4	863	32.68	4	1,004	37.97
321	肺炎	7	372	14.07	8	332	12.68	9	276	10.61	8	330	12.60	8	396	15.00	8	316	11.95
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	358	13.54	6	368	14.05	6	378	14.53	6	413	15.77	6	419	15.87	6	457	17.29
E47-E53	事故傷害	4	752	28.45	4	772	29.48	5	683	26.25	4	692	26.42	5	658	24.92	5	599	22.66
E54	自殺	10	206	7.79	10	224	8.55	10	214	8.22	10	201	7.67	10	212	8.03	9	237	8.96
347	慢性肝病及肝硬化	6	380	14.38	7	367	14.01	7	349	13.41	7	389	14.85	7	404	15.30	7	373	14.11
038	敗血症	13	96	3.63	12	132	5.04	13	129	4.96	13	116	4.43	16	70	2.65	14	85	3.21
26	高血壓性疾病	9	292	11.05	9	328	12.52	8	286	10.99	9	281	10.73	9	250	9.47	10	191	7.22
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	190	7.19	11	183	6.99	11	182	6.99	11	200	7.64	11	156	5.91	11	142	5.37
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	76	2.88	16	87	3.32	16	63	2.42	16	59	2.25	14	81	3.07	12	111	4.20
02	結核病	15	80	3.03	13	107	4.09	12	180	6.92	12	122	4.66	12	99	3.75	12	111	4.20
44	先天性畸形	12	99	3.75	14	92	3.51	14	106	4.07	15	71	2.71	13	82	3.11	15	81	3.06
	其他		2,287	86.52		2,252	85.98		2,170	83.40		2,561	97.78		2,533	95.92		2,722	102.95

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表32·臺北市歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
01-56	所有死亡原因		13,222	500.81		13,279	503.41		13,631	517.40		13,733	523.20		14,339	547.41		13,875	528.71		14,486	550.64
08-14	惡性腫瘤	1	4,089	154.88	1	4,169	158.05	1	4,001	151.87	1	4,202	160.09	1	4,290	163.78	1	4,423	168.54	1	4,566	173.56
25-27-28*	心臟疾病	3	1,383	52.38	2	1,450	54.97	2	1,642	62.33	2	1,732	65.99	2	1,665	63.56	2	1,527	58.19	2	1,642	62.42
29	腦血管疾病	2	1,397	52.91	3	1,233	46.74	3	1,325	50.29	3	1,240	47.24	3	1,367	52.19	3	1,182	45.04	3	1,289	49.00
181	糖尿病	4	903	34.20	4	889	33.70	4	946	35.91	4	893	34.02	4	988	37.72	4	946	36.05	4	958	36.42
321	肺炎	7	367	13.90	7	448	16.98	5	567	21.52	7	447	17.03	5	572	21.84	5	575	21.91	5	688	26.15
350	腎炎、腎徵候群 及腎性病變	6	490	18.56	6	456	17.29	6	503	19.09	5	503	19.16	6	544	20.77	6	485	18.48	6	549	20.87
E47-E53	事故傷害	5	506	19.17	5	514	19.49	7	455	17.27	6	463	17.64	8	415	15.84	8	379	14.44	7	372	14.14
E54	自殺	9	290	10.98	8	325	12.32	9	320	12.15	8	346	13.18	7	467	17.83	7	454	17.30	8	364	13.84
347	慢性肝病及肝硬化	8	365	13.83	9	305	11.56	8	367	13.93	9	333	12.69	9	323	12.33	9	317	12.08	9	331	12.58
038	敗血症	12	116	4.39	12	109	4.13	13	93	3.53	12	94	3.58	11	150	5.73	11	145	5.53	10	188	7.15
26	高血壓性疾病	10	167	6.33	10	179	6.79	10	142	5.39	10	167	6.36	10	162	6.18	10	176	6.71	11	141	5.36
323	支氣管炎、肺氣 腫及氣喘	11	149	5.64	11	123	4.66	11	115	4.37	11	113	4.31	12	109	4.16	12	92	3.51	12	97	3.69
341	胃及十二指腸之 潰瘍	15	75	2.84	16	61	2.31	14	64	2.43	14	70	2.67	13	77	2.94	13	79	3.01	13	80	3.04
02	結核病	13	89	3.37	13	82	3.11	12	98	3.72	13	74	2.82	14	60	2.29	14	68	2.59	14	57	2.17
44	先天性畸形	16	67	2.54	15	64	2.43	15	41	1.56	15	48	1.83	16	39	1.49	15	42	1.60	15	48	1.82
	其他		2,769	104.88		2,872	108.88		2,952	112.05		3,008	114.60		3,111	118.77		2,985	113.74		3,116	118.45

表32·臺北市歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		15,119	575.72		14,870	568.60		15,047	575.83		15,834	600.94		16,397	615.94		16,100	600.78
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10	1	4,563	174.48	1	4,632	177.26	1	4,732	179.59	1	4,981	187.11	1	4,919	183.55
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除 外）	2	2,014	76.69	2	1,768	67.61	2	1,723	65.94	2	1,905	72.30	2	2,028	76.18	2	2,075	77.43
I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66	3	1,128	43.13	3	1,047	40.07	3	1,137	43.15	3	1,186	44.55	3	1,210	45.15
J12-J18	肺炎	4	950	36.18	4	840	32.12	4	899	34.40	4	942	35.75	4	905	34.00	4	883	32.95
E10-E14	糖尿病	5	716	27.26	5	825	31.55	5	769	29.43	5	775	29.41	5	817	30.69	5	860	32.09
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98	6	496	18.97	7	465	17.79	6	582	22.09	6	591	22.20	6	573	21.38
I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24	9	385	14.72	9	422	16.15	9	446	16.93	8	536	20.13	7	493	18.40
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	491	18.70	7	451	17.25	6	474	18.14	8	448	17.00	9	531	19.95	8	488	18.21
A40-A41	敗血症	6	513	19.53	8	441	16.86	8	449	17.18	7	566	21.48	7	559	21.00	9	466	17.39
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	389	14.81	10	377	14.42	11	359	13.74	10	402	15.26	10	430	16.15	10	406	15.15
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27	11	349	13.35	13	318	12.17	11	315	11.96	12	286	10.74	11	310	11.57
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	370	14.09	12	341	13.04	12	329	12.59	12	306	11.61	11	333	12.51	12	261	9.74
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾 病	13	281	10.70	13	340	13.00	10	380	14.54	13	217	8.24	13	167	6.27	13	191	7.13
G20-G21	帕金森病	15	93	3.54	16	92	3.52	16	111	4.25	16	121	4.59	14	158	5.94	14	155	5.78
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	17	69	2.63	15	112	4.28	15	116	4.44	14	136	5.16	15	129	4.85	15	142	5.30
	其他		2,451	93.34		2,362	90.30		2,554	97.74		2,804	106.42		2,760	103.68		2,668	99.56

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		7,172	541.89		7,451	568.85		7,351	565.92		7,546	578.81		7,593	579.35		7,841	598.84
08-14	惡性腫瘤	1	1,977	149.38	1	2,118	161.70	1	2,135	164.36	1	2,154	165.22	1	2,235	170.53	1	2,356	179.93
25-27-28*	心臟疾病	3	791	59.77	2	892	68.10	2	910	70.06	2	817	62.67	2	895	68.29	2	824	62.93
29	腦血管疾病	2	800	60.45	3	822	62.76	3	798	61.43	3	783	60.06	3	699	53.33	3	805	61.48
181	糖尿病	5	328	24.78	5	309	23.59	5	390	30.02	5	323	24.78	5	415	31.66	4	506	38.64
321	肺炎	7	245	18.51	7	226	17.25	8	189	14.55	8	231	17.72	7	269	20.52	8	192	14.66
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	185	13.98	8	194	14.81	7	224	17.24	7	232	17.80	8	213	16.25	7	242	18.48
E47-E53	事故傷害	4	535	40.42	4	560	42.75	4	491	37.80	4	494	37.89	4	437	33.34	5	426	32.53
E54	自殺	11	123	9.29	10	155	11.83	11	125	9.62	11	125	9.59	9	143	10.91	9	143	10.92
347	慢性肝病及肝硬化	6	273	20.63	6	253	19.32	6	247	19.02	6	277	21.25	6	306	23.35	6	253	19.32
038	敗血症	14	50	3.78	13	78	5.95	13	74	5.70	13	64	4.91	15	38	2.90	15	41	3.13
26	高血壓性疾病	9	167	12.62	9	190	14.51	9	158	12.16	9	159	12.20	9	143	10.91	10	117	8.94
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	131	9.90	11	110	8.40	12	119	9.16	10	133	10.20	11	94	7.17	11	99	7.56
02	胃及十二指腸之潰瘍	13	58	4.38	14	63	4.81	16	39	3.00	15	37	2.84	13	54	4.12	13	76	5.80
02	結核病	12	71	5.36	12	80	6.11	10	141	10.85	12	92	7.06	12	78	5.95	12	86	6.57
44	先天性畸形	16	48	3.63	15	54	4.12	14	60	4.62	15	37	2.84	16	37	2.82	14	47	3.59
	其他		1,390	105.02		1,347	102.84		1,251	96.31		1,588	121.81		1,537	117.27		1,628	124.33

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		8,056	617.44		8,001	615.07		8,213	633.43		8,352	647.93		8,763	683.06		8,387	654.67		8,633	674.39
08-14	惡性腫瘤	1	2,565	196.59	1	2,520	193.72	1	2,430	187.41	1	2,594	201.24	1	2,630	205.00	1	2,695	210.37	1	2,757	215.37
25-27-28*	心臟疾病	2	906	69.44	2	896	68.88	2	996	76.82	2	1,107	85.88	2	1,060	82.62	2	971	75.79	2	1,026	80.15
29	腦血管疾病	3	820	62.85	3	734	56.43	3	818	63.09	3	725	56.24	3	822	64.07	3	680	53.08	3	768	59.99
181	糖尿病	4	450	34.49	4	464	35.67	4	463	35.71	4	440	34.13	4	521	40.61	4	473	36.92	4	495	38.67
321	肺炎	8	233	17.86	6	314	24.14	5	369	28.46	6	300	23.27	5	370	28.84	5	373	29.12	5	446	34.84
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	257	19.70	7	246	18.91	7	261	20.13	7	278	21.57	6	324	25.26	8	261	20.37	6	272	21.25
E47-E53	事故傷害	5	365	27.97	5	359	27.60	6	316	24.37	5	342	26.53	8	312	24.32	7	281	21.93	7	265	20.70
E54	自殺	9	192	14.72	8	214	16.45	9	203	15.66	8	225	17.46	7	313	24.40	6	309	24.12	8	228	17.81
347	慢性肝病及肝硬化	7	239	18.32	9	209	16.07	8	249	19.20	9	222	17.22	9	192	14.97	9	210	16.39	9	222	17.34
038	敗血症	13	59	4.52	13	53	4.07	13	61	4.70	13	54	4.19	11	73	5.69	11	73	5.70	10	82	6.41
26	高血壓性疾病	11	88	6.74	10	99	7.61	11	70	5.40	10	82	6.36	10	106	8.26	10	94	7.34	11	69	5.39
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	95	7.28	11	75	5.77	12	68	5.24	11	73	5.66	12	71	5.53	12	58	4.53	12	61	4.77
341	胃及十二指腸之潰瘍	14	50	3.83	15	35	2.69	14	42	3.24	14	43	3.34	13	52	4.05	14	43	3.36	13	48	3.75
02	結核病	12	76	5.82	12	67	5.15	10	75	5.78	12	59	4.58	14	50	3.90	13	53	4.14	14	40	3.12
44	先天性畸形	16	33	2.53	16	34	2.61	15	23	1.77	16	25	1.94	17	17	1.33	16	16	1.25	15	23	1.80
	其他		1,628	124.78		1,682	129.30		1,769	136.43		1,783	138.32		1,850	144.20		1,797	140.27		1,831	143.03

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬男性人口死亡率						
A00-Y98	所有死亡原因		8,992	705.67		8,782	693.85		8,882	704.08		9,359	737.25		9,628	751.69		9,436	732.81
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,698	211.73	1	2,671	211.03	1	2,771	219.66	1	2,749	216.55	1	2,937	229.30	1	2,854	221.64
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,278	100.29	2	1,101	86.99	2	1,039	82.36	2	1,155	90.98	2	1,246	97.28	2	1,252	97.23
I60-I69	腦血管疾病	3	677	53.13	3	647	51.12	3	602	47.72	3	697	54.91	3	679	53.01	3	699	54.28
J12-J18	肺炎	4	619	48.58	4	528	41.72	4	548	43.44	4	605	47.66	4	563	43.96	4	575	44.65
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	337	26.45	6	377	29.79	6	335	26.56	5	445	35.05	5	430	33.57	5	431	33.47
E10-E14	糖尿病	5	352	27.62	5	423	33.42	5	384	30.44	6	393	30.96	6	414	32.32	6	428	33.24
A40-A41	敗血症	8	263	20.64	10	233	18.41	10	230	18.23	7	337	26.55	7	308	24.05	7	274	21.28
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	269	21.11	7	260	20.54	7	258	20.45	8	267	21.03	8	285	22.25	8	271	21.05
I10-I15	高血壓性疾病	11	204	16.01	12	206	16.28	9	231	18.31	10	230	18.12	9	274	21.39	9	255	19.80
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	240	18.83	8	249	19.67	8	234	18.55	9	236	18.59	10	255	19.91	10	242	18.79
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	197	15.46	11	232	18.33	12	198	15.70	11	211	16.62	12	187	14.60	11	198	15.38
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	231	18.13	9	234	18.49	11	212	16.81	12	188	14.81	11	207	16.16	12	166	12.89
G20-G21	帕金森病	15	56	4.39	15	62	4.90	16	64	5.07	15	70	5.51	13	96	7.50	13	94	7.30
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	132	10.36	13	142	11.22	13	170	13.48	13	82	6.46	14	73	5.70	14	88	6.83
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	14	101	7.93	14	73	5.77	14	75	5.95	14	75	5.91	17	60	4.68	15	80	6.21
	其他		1,338	105.01		1,344	106.17		1,531	121.36		1,619	127.54		1,614	126.01		1,529	118.74

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		4,379	331.81		4,538	346.60		4,703	360.94		4,659	354.16		4,831	363.23		4,958	371.52
08-14	惡性腫瘤	1	1,203	91.16	1	1,248	95.32	1	1,369	105.07	1	1,335	101.48	1	1,329	99.92	1	1,382	103.56
25-27-28*	心臟疾病	3	466	35.31	3	492	37.58	2	543	41.67	3	514	39.07	2	533	40.07	4	428	32.07
29	腦血管疾病	2	506	38.34	2	539	41.17	3	528	40.52	2	520	39.53	3	510	38.35	2	575	43.09
181	糖尿病	4	292	22.13	4	325	24.82	4	365	28.01	4	324	24.63	4	448	33.68	3	498	37.32
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	173	13.11	6	174	13.29	6	154	11.82	6	181	13.76	6	206	15.49	5	215	16.11
321	肺炎	7	127	9.62	9	106	8.10	10	87	6.68	9	99	7.53	7	127	9.55	7	124	9.29
E54	自殺	10	83	6.29	11	69	5.27	9	89	6.83	10	76	5.78	10	69	5.19	9	94	7.04
347	慢性肝病及肝硬化	9	107	8.11	8	114	8.71	8	102	7.83	8	112	8.51	9	98	7.37	8	120	8.99
E47-E53	事故傷害	5	217	16.44	5	212	16.19	5	192	14.74	5	198	15.05	5	221	16.62	6	173	12.96
038	敗血症	13	46	3.49	12	54	4.12	12	55	4.22	12	52	3.95	14	32	2.41	11	44	3.30
26	高血壓性疾病	8	125	9.47	7	138	10.54	7	128	9.82	7	122	9.27	8	107	8.05	10	74	5.55
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	59	4.47	10	73	5.58	11	63	4.84	11	67	5.09	11	62	4.66	12	43	3.22
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	18	1.36	16	24	1.83	16	24	1.84	16	22	1.67	15	27	2.03	13	35	2.62
44	先天性畸形	12	51	3.86	13	38	2.90	13	46	3.53	13	34	2.58	12	45	3.38	14	34	2.55
200	貧血	17	10	0.76	19	6	0.46	18	9	0.69	18	7	0.53	17	6	0.45	17	17	1.27
	其他		896	67.89		926	70.73		949	72.83		996	75.71		1,011	76.01		1,102	82.58

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		5,166	386.85		5,278	394.76		5,418	404.96		5,381	402.84		5,576	417.20		5,488	408.57		5,853	433.35
08-14	惡性腫瘤	1	1,524	114.12	1	1,649	123.33	1	1,571	117.42	1	1,608	120.38	1	1,660	124.20	1	1,728	128.65	1	1,809	133.94
25-27-28*	心臟疾病	3	477	35.72	2	554	41.44	2	646	48.28	2	625	46.79	2	605	45.27	2	556	41.39	2	616	45.61
29	腦血管疾病	2	577	43.21	3	499	37.32	3	507	37.90	3	515	38.55	3	545	40.78	3	502	37.37	3	521	38.57
181	糖尿病	4	453	33.92	4	425	31.79	4	483	36.10	4	453	33.91	4	467	34.94	4	473	35.21	4	463	34.28
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	233	17.45	5	210	15.71	5	242	18.09	5	225	16.84	5	220	16.46	5	224	16.68	5	277	20.51
321	肺炎	7	134	10.03	7	134	10.02	6	198	14.80	6	147	11.00	6	202	15.11	6	202	15.04	6	242	17.92
E54	自殺	9	98	7.34	8	111	8.30	9	117	8.75	7	121	9.06	7	154	11.52	7	145	10.80	7	136	10.07
347	慢性肝病及肝硬化	8	126	9.44	9	96	7.18	8	118	8.82	9	111	8.31	8	131	9.80	8	107	7.97	8	109	8.07
E47-E53	事故傷害	6	141	10.56	6	155	11.59	7	139	10.39	7	121	9.06	9	103	7.71	9	98	7.30	9	107	7.92
038	敗血症	11	57	4.27	11	56	4.19	12	32	2.39	11	40	2.99	10	77	5.76	11	72	5.36	10	106	7.85
26	高血壓性疾病	10	79	5.92	10	80	5.98	10	72	5.38	10	85	6.36	11	56	4.19	10	82	6.10	11	72	5.33
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	54	4.04	12	48	3.59	11	47	3.51	11	40	2.99	12	38	2.84	13	34	2.53	12	36	2.67
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	25	1.87	15	26	1.94	15	22	1.64	13	27	2.02	13	25	1.87	12	36	2.68	13	32	2.37
44	先天性畸形	14	34	2.55	13	30	2.24	16	18	1.35	14	23	1.72	14	22	1.65	14	26	1.94	14	25	1.85
200	貧血	16	13	0.97	17	9	0.67	17	14	1.05	16	17	1.27	16	13	0.97	15	21	1.56	15	20	1.48
	其他		1,141	85.44		1,196	89.45		1,192	89.10		1,223	91.56		1,258	94.13		1,182	88.00		1,282	94.92



表34·臺北市歷年女性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		6,127	453.23		6,088	451.14		6,165	456.13		6,475	474.21		6,769	490.07		6,664	478.66
C00-C97	惡性腫瘤	1	1,769	130.86	1	1,892	140.20	1	1,861	137.69	1	1,983	145.23	1	2,044	147.98	1	2,065	148.32
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	736	54.44	2	667	49.43	2	684	50.61	2	750	54.93	2	782	56.62	2	823	59.11
I60-I69	腦血管疾病	3	522	38.61	3	481	35.64	3	445	32.92	3	440	32.22	3	507	36.71	3	511	36.70
E10-E14	糖尿病	4	364	26.93	4	402	29.79	4	385	28.48	4	382	27.98	4	403	29.18	4	432	31.03
J12-J18	肺炎	5	331	24.49	5	312	23.12	5	351	25.97	5	337	24.68	5	342	24.76	5	308	22.12
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	251	18.57	7	202	14.97	6	240	17.76	8	212	15.53	6	276	19.98	6	246	17.67
I10-I15	高血壓性疾病	8	170	12.58	9	179	13.26	9	191	14.13	7	216	15.82	7	262	18.97	7	238	17.10
A40-A41	敗血症	7	250	18.49	6	208	15.41	7	219	16.20	6	229	16.77	8	251	18.17	8	192	13.79
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	109	8.06	10	119	8.82	10	130	9.62	9	137	10.03	9	161	11.66	9	142	10.20
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	120	8.88	11	117	8.67	13	101	7.47	10	135	9.89	10	145	10.50	10	135	9.70
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	9	149	11.02	8	198	14.67	8	210	15.54	10	135	9.89	13	94	6.81	11	112	8.04
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	139	10.28	13	107	7.93	12	117	8.66	12	118	8.64	11	126	9.12	12	103	7.40
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13	99	7.32	11	117	8.67	11	120	8.88	13	104	7.62	12	99	7.17	13	95	6.82
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	15	38	2.81	14	68	5.04	14	61	4.51	14	73	5.35	14	65	4.71	14	79	5.67
G20-G21	帕金森病	17	37	2.74	17	30	2.22	15	47	3.48	16	51	3.74	15	62	4.49	15	61	4.38
	其他		1,043	77.15		989	73.30		1,003	74.21		1,173	85.89		1,150	83.26		1,122	80.59

表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數 (人)	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 84年	111	63	48	3.26	202	112	90	5.93	-	-
民國 85年	104	58	46	3.07	216	111	105	6.37	2	5.89
民國 86年	98	53	45	2.80	212	117	95	6.05	3	8.57
民國 87年	79	45	34	2.65	166	100	66	5.58	3	10.08
民國 88年	81	44	37	2.54	168	90	78	5.27	2	6.27
民國 89年	86	50	36	2.54	153	89	64	4.52	-	-
民國 90年	88	46	42	3.31	149	75	74	5.60	3	11.27
民國 91年	68	41	27	2.67	111	62	49	4.35	1	3.92
民國 92年	46	22	24	1.97	89	42	47	3.80	3	12.82
民國 93年	56	29	27	2.52	100	58	42	4.50	-	-
民國 94年	51	27	24	2.44	89	44	45	4.26	1	4.79
民國 95年	40	20	20	1.88	69	30	39	3.24	1	4.70
民國 96年	56	34	22	2.61	89	57	32	4.15	1	4.66
民國 97年	59	33	26	2.89	95	51	44	4.65	1	4.90
民國 98年	32	18	14	1.64	69	34	35	3.54	-	-
民國 99年	52	30	22	2.78	71	41	30	3.80	1	5.35
民國 100年	63	30	33	2.48	96	50	46	3.77	-	-
民國 101年	71	43	28	2.35	105	62	43	3.47	3	9.92
<b>民國 102年</b>	<b>67</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>2.56</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>3.82</b>	<b>2</b>	<b>7.64</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：1. 新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000。

2. 嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000

3. 孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數) × 100,000。

表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率

單位：人／每十萬人口

年別	總計	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
84年	437.00	682.71	32.62	18.42	27.06	60.57	77.17	65.05	90.99	113.30	160.75	261.74	386.95	681.57	1,081.85	1,676.13	2,664.91	4,267.21	7,274.45	11,039.79
85年	457.75	673.86	45.78	17.30	22.78	47.79	69.88	74.81	89.43	121.56	175.14	270.34	402.54	688.84	1,105.93	1,573.56	2,674.67	4,300.10	6,908.85	11,667.37
86年	463.27	633.97	46.94	15.83	14.87	39.99	48.43	68.09	84.34	131.22	184.72	273.57	392.13	626.42	1,050.42	1,650.66	2,469.82	4,285.18	6,565.16	11,540.95
87年	465.98	519.20	47.91	21.16	12.41	35.07	53.31	66.86	72.52	130.10	160.17	246.88	379.54	634.67	975.66	1,630.90	2,443.44	4,064.66	6,730.79	11,230.74
88年	470.49	554.05	30.48	12.65	20.64	37.55	42.38	57.00	69.13	113.03	159.35	251.56	350.49	566.77	968.13	1,472.13	2,409.57	3,959.08	6,641.81	11,953.77
89年	484.10	477.82	34.20	14.45	17.16	47.15	44.74	49.58	75.59	119.57	153.35	242.18	350.33	575.30	925.06	1,530.22	2,402.38	3,923.90	6,530.01	11,437.54
90年	500.81	508.22	31.83	15.72	15.49	35.56	44.36	46.11	67.09	118.49	168.75	242.39	391.39	564.51	938.44	1,527.54	2,418.31	3,807.86	6,329.57	11,330.28
91年	503.41	437.72	41.40	13.99	14.90	30.58	36.58	53.21	69.89	117.86	163.49	244.55	353.34	564.14	903.31	1,399.37	2,330.38	3,611.06	6,167.56	11,169.46
92年	517.40	372.82	24.52	11.92	14.46	34.85	36.65	54.73	77.59	112.50	146.43	233.45	339.14	511.37	829.43	1,415.81	2,269.54	3,555.13	6,175.39	11,670.54
93年	523.20	452.52	32.87	11.12	14.57	27.91	46.19	53.77	77.28	107.85	159.51	227.93	349.91	545.62	850.44	1,253.79	2,119.75	3,456.63	6,116.51	10,769.36
94年	547.41	426.71	21.69	15.85	13.42	41.51	38.86	53.63	86.38	104.37	164.56	240.15	350.28	464.27	850.95	1,295.29	2,034.07	3,557.58	6,002.50	11,305.33
95年	528.71	340.67	29.64	11.84	15.21	34.40	44.62	63.55	65.17	112.92	155.35	237.33	365.65	507.15	721.45	1,150.53	2,001.99	3,249.51	5,306.01	10,046.38
96年	550.64	434.21	20.37	17.43	7.01	25.78	39.69	52.14	56.09	98.39	148.71	246.28	311.48	475.52	708.13	1,171.78	2,041.12	3,320.52	5,341.79	10,629.20
97年	575.72	469.11	23.18	16.16	12.47	19.20	45.78	48.92	66.26	105.37	157.67	230.61	330.13	455.61	699.50	1,124.34	2,016.68	3,257.44	5,549.18	10,992.30
98年	568.60	357.61	21.38	13.08	5.53	26.88	36.77	40.38	63.46	85.57	148.62	225.80	314.22	467.69	638.77	1,116.63	1,912.70	3,080.41	5,353.26	10,468.26
99年	575.83	379.01	17.92	10.66	10.08	23.18	29.30	45.38	63.43	87.69	135.15	207.88	295.07	466.23	627.12	1,073.08	1,722.41	3,119.39	5,172.92	10,733.81
100年	600.94	439.53	17.38	6.91	9.11	23.22	31.96	38.62	61.99	82.84	147.77	212.79	323.21	449.50	647.50	1,009.22	1,742.48	3,149.19	5,256.75	11,145.17
101年	615.94	384.89	30.01	10.62	13.00	22.57	31.22	54.76	55.70	92.04	135.16	209.92	316.51	450.09	642.50	1,046.14	1,634.99	3,111.78	5,368.53	11,362.42
<b>102年</b>	<b>600.78</b>	<b>362.67</b>	<b>15.23</b>	<b>15.26</b>	<b>10.77</b>	<b>27.43</b>	<b>32.79</b>	<b>32.30</b>	<b>39.45</b>	<b>71.26</b>	<b>120.77</b>	<b>221.67</b>	<b>333.36</b>	<b>461.62</b>	<b>598.90</b>	<b>951.72</b>	<b>1,608.36</b>	<b>2,787.57</b>	<b>5,146.12</b>	<b>10,998.33</b>

資料來源：衛生福利部。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	萬 口 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	萬 口 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	萬 口 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	萬 口 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	萬 口 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	萬 口 率
E47-E53		752	28.45	772	29.48	683	26.25	692	26.42	658	24.92	599	22.66						
E47	運輸事故	393	14.87	391	14.93	351	13.49	335	12.79	221	8.37	225	8.51						
E48	意外中毒	39	1.48	32	1.22	33	1.27	21	0.80	24	0.91	28	1.06						
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	2	0.08	-	-	-	-	1	0.04	3	0.11	1	0.04						
E50	意外墜落	97	3.67	112	4.28	110	4.23	115	4.39	146	5.53	144	5.45						
E51	火及火焰所致之事故傷害	30	1.13	40	1.53	35	1.35	35	1.34	21	0.80	20	0.76						
E52	其他事故傷害，包括後期影響	191	7.23	197	7.52	153	5.88	185	7.06	243	9.20	181	6.85						
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-						

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
E47-E53		506	19.17	514	19.49	455	17.27	463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14
E47	運輸事故	195	7.39	249	9.44	189	7.17	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54
E48	意外中毒	24	0.91	27	1.02	26	0.99	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	109	4.13	86	3.26	103	3.91	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31
E51	火及火焰所致之事故傷 害	13	0.49	12	0.45	19	0.72	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	165	6.25	139	5.27	118	4.48	140	5.33	83	3.17	91	3.47	82	3.12
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率
V01-X59, Y85-Y86		389	14.81	377	14.42	359	13.74	402	15.26	430	16.15	406	15.15
V01-V99	運輸事故傷害	153	5.83	165	6.31	154	5.89	147	5.58	152	5.71	150	5.60
W00-W19	跌倒(落)	91	3.47	72	2.75	83	3.18	100	3.80	96	3.61	88	3.28
W65-W74	意外溺死和淹沒	26	0.99	17	0.65	16	0.61	27	1.02	14	0.53	15	0.56
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	19	0.72	24	0.92	26	0.99	26	0.99	24	0.90	21	0.78
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	6	0.23	7	0.27	6	0.23	5	0.19	16	0.60	9	0.34
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	25	0.95	26	0.99	20	0.77	16	0.61	19	0.71	28	1.04
	其他	69	2.63	66	2.52	54	2.07	81	3.07	109	4.09	95	3.54

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率
E47-E53		535	40.42	560	42.75	491	37.80	494	37.89	437	33.34	426	32.53
E47	運輸事故	278	21.00	289	22.06	261	20.09	228	17.49	152	11.60	165	12.60
E48	意外中毒	32	2.42	22	1.68	25	1.92	13	1.00	17	1.30	20	1.53
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-
E50	意外墜落	69	5.21	83	6.34	74	5.70	83	6.37	88	6.71	101	7.71
E51	火及火焰所致之事故傷 害	21	1.59	24	1.83	23	1.77	24	1.84	11	0.84	9	0.69
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	134	10.12	142	10.84	108	8.31	145	11.12	168	12.82	131	10.00
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E47-E53		365	27.97	359	27.60	316	24.37	342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70
E47	運輸事故	146	11.19	161	12.38	137	10.57	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06
E48	意外中毒	14	1.07	20	1.54	19	1.47	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25
E49	內科醫療之事故 傷害，異常反應 及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	74	5.67	70	5.38	67	5.17	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16
E51	火及火焰所致之 事故傷害	8	0.61	10	0.77	13	1.00	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31
E52	其他事故傷害， 包括後期影響	123	9.43	98	7.53	80	6.17	110	8.53	68	5.30	71	5.54	63	4.92
E53	治療用之藥品， 藥物所致之不良 影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		269	21.11	377	20.54	258	20.45	267	21.03	285	22.25	271	21.05
V01-V99	運輸事故傷害	104	8.16	110	8.69	113	8.96	97	7.64	108	8.43	102	7.92
W00-W19	跌倒(落)	66	5.18	55	4.35	64	5.07	67	5.28	72	5.62	66	5.13
W65-W74	意外溺死和淹沒	21	1.65	13	1.03	11	0.87	19	1.50	10	0.78	10	0.78
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	13	1.02	15	1.19	18	1.43	15	1.18	12	0.94	12	0.93
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	5	0.39	7	0.55	3	0.24	5	0.39	6	0.47	6	0.47
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	17	1.33	14	1.11	14	1.11	14	1.10	12	0.94	22	1.71
	其他	43	3.37	46	3.63	35	2.77	50	3.94	65	5.07	53	4.12

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年	
		死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
E47-E53		217	16.44	212	16.19	192	14.74	198	15.05	221	16.62	173	12.96
E47	運輸事故	115	8.71	102	7.79	90	6.91	107	8.13	69	5.19	60	4.50
E48	意外中毒	7	0.53	10	0.76	8	0.61	8	0.61	7	0.53	8	0.60
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.15	1	0.07
E50	意外墜落	28	2.12	29	2.21	36	2.76	32	2.43	58	4.36	43	3.22
E51	火及火焰所致之事故傷 害	9	0.68	16	1.22	12	0.92	11	0.84	10	0.75	11	0.82
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	57	4.32	55	4.20	45	3.45	40	3.04	75	5.64	50	3.75
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E47-E53		141	10.56	155	11.59	139	10.39	121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92
E47	運輸事故	49	3.67	88	6.58	52	3.89	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15
E48	意外中毒	10	0.75	7	0.52	7	0.52	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59
E49	內科醫療之事故 傷害，異常反應 及後期併發症	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	35	2.62	16	1.20	36	2.69	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55
E51	火及火焰所致之 事故傷害	5	0.37	2	0.15	6	0.45	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22
E52	其他事故傷害， 包括後期影響	42	3.15	41	3.07	38	2.84	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41
E53	治療用之藥品， 藥物所致之不良 影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		120	8.88	377	8.67	101	7.47	135	9.89	145	10.50	135	9.70
V01-V99	運輸事故傷害	49	3.62	55	4.08	41	3.03	50	3.66	44	3.19	48	3.45
W00-W19	跌倒(落)	25	1.85	17	1.26	19	1.41	33	2.42	24	1.74	22	1.58
W65-W74	意外溺死和淹沒	5	0.37	4	0.30	5	0.37	8	0.59	4	0.29	5	0.36
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	0.44	9	0.67	8	0.59	11	0.81	12	0.87	9	0.65
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.07	-	-	3	0.22	-	-	10	0.72	3	0.22
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	8	0.59	12	0.89	6	0.44	2	0.15	7	0.51	6	0.43
	其他	26	1.92	20	1.48	19	1.41	31	2.27	44	3.19	42	3.02

表40·臺北市歷年自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
E54	自殺總計	206	7.79	224	8.55	214	8.22	201	7.67	212	8.03	237	8.96
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	30	1.15	22	0.85	26	0.99	21	0.8	17	0.64
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	1	0.04	1	0.04
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	5	0.19	7	0.26
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	109	4.12	125	4.77	141	5.42	89	3.40	103	3.90	134	5.07
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	18	0.68	9	0.34	7	0.27	14	0.53	12	0.45	15	0.57
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	3	0.11	1	0.04	2	0.08	-	-	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	14	0.53	6	0.23	5	0.19	9	0.34	5	0.19
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	1.51	32	1.22	28	1.08	54	2.06	47	1.78	46	1.74
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	9	0.34	9	0.35	10	0.38	14	0.53	12	0.45
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表40·臺北市歷年自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
E54	自殺總計	290	10.98	325	12.32	320	12.15	346	13.18	467	17.83	454	17.30	364	13.84
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	27	1.02	30	1.14	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	2	0.08	2	0.08	2	0.08	-	-	1	0.04	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	25	0.95	82	3.11	56	2.13	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	122	4.62	116	4.40	113	4.29	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	26	0.98	21	0.80	22	0.84	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	2	0.08	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	7	0.27	6	0.23	4	0.15	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	60	2.27	54	2.05	78	2.96	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	21	0.80	16	0.61	15	0.57	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表40·臺北市歷年自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	370	14.09	341	13.04	329	12.59	306	11.61	333	12.51	261	9.74
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	1	0.04	-	-	1	0.04	3	0.11	2	0.07
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	6	0.23	5	0.19	9	0.34	7	0.26	4	0.15
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	-	-	-	-	2	0.08	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	124	4.72	99	3.79	100	3.83	72	2.73	82	3.08	55	2.05
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	6	0.23	9	0.34	11	0.42	6	0.23	4	0.15
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	6	0.23	2	0.08	1	0.04	1	0.04	2	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	109	4.17	113	4.32	126	4.78	103	3.87	77	2.87
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	25	0.96	24	0.92	25	0.95	34	1.28	28	1.04
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	2	0.08	4	0.15
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	5	0.19	4	0.15	1	0.04	4	0.15	5	0.19
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	4	0.15	10	0.38	6	0.23	8	0.30	3	0.11
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	68	2.60	55	2.10	52	1.97	71	2.67	67	2.50
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.11	0	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	3	0.11	4	0.15	1	0.04	2	0.08	0	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	6	0.23	1	0.04	-	-	4	0.15	6	0.22

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E54	自殺總計	123	9.29	155	11.83	125	9.62	125	9.59	143	10.91	143	10.92
E950	以固體或液體物質自殺及自 為中毒	11	0.83	20	1.53	11	0.85	14	1.07	15	1.14	9	0.69
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自 為中毒	-	-	1	0.08	-	-	-	-	5	0.38	6	0.46
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及 自傷	71	5.36	88	6.72	84	6.47	61	4.68	80	6.10	87	6.64
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	8	0.60	5	0.38	6	0.46	10	0.77	7	0.53	8	0.61
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	2	0.15	1	0.08	2	0.15	-	-	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.15	10	0.76	5	0.38	4	0.31	8	0.61	3	0.23
E957	由高處跳下自殺及自傷	24	1.81	21	1.60	12	0.92	27	2.07	19	1.45	24	1.83
E958	其他及未明示之方式自殺及 自傷	7	0.53	7	0.53	6	0.46	6	0.46	8	0.61	5	0.38
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E54	自殺總計	192	14.72	214	16.45	203	15.66	225	17.46	313	24.40	309	24.12	228	17.81
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	15	1.15	17	1.31	17	1.31	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	2	0.15	2	0.15	1	0.08	-	-	1	0.08	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	18	1.38	62	4.77	43	3.32	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	82	6.28	79	6.07	76	5.86	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	17	1.30	12	0.92	11	0.85	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	2	0.15	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	6	0.46	4	0.31	3	0.23	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16
E957	由高處跳下自殺及自傷	37	2.84	27	2.08	40	3.08	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	13	1.00	10	0.77	12	0.93	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	231	18.13	234	18.49	212	16.81	188	14.81	207	16.16	166	12.89
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	2	0.16
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	3	0.24	2	0.16	6	0.47	3	0.23	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	6.36	72	5.69	70	5.55	43	3.39	59	4.61	40	3.11
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	3	0.24	7	0.55	8	0.63	5	0.39	3	0.23
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.32	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	81	6.40	80	6.34	83	6.54	62	4.84	56	4.35
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	19	1.50	13	1.03	17	1.34	21	1.64	17	1.32
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.16	4	0.31
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	4	0.32	1	0.08	1	0.08	2	0.16	5	0.39
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	2	0.16	7	0.55	3	0.24	5	0.39	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	37	2.92	26	2.06	25	1.97	40	3.12	32	2.49
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.16	0	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	3	0.24	-	-	1	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	5	0.40	1	0.08	-	-	2.00	0.16	4	0.31

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E54	自殺總計	83	6.29	69	5.27	89	6.83	76	5.78	69	5.19	94	7.04
E950	以固體或液體物質自殺及 自為中毒	14	1.06	10	0.76	11	0.84	12	0.91	6	0.45	8	0.60
E951	以家用瓦斯自殺及自為中 毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及 自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E953	吊死、勒死及窒息之自殺 及自傷	38	2.88	37	2.83	57	4.37	28	2.13	23	1.73	47	3.52
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	10	0.76	4	0.31	1	0.08	4	0.30	5	0.38	7	0.52
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	4	0.31	1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	11	0.84	16	1.23	27	2.05	28	2.11	22	1.65
E958	其他及未明示之方式自殺 及自傷	2	0.15	2	0.15	3	0.23	4	0.30	6	0.45	7	0.52
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E54	自殺總計	98	7.34	111	8.30	117	8.75	121	9.06	154	11.52	145	10.80	136	10.07
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	10	0.75	10	0.75	13	0.97	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	7	0.52	20	1.50	13	0.97	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	40	3.00	37	2.77	37	2.77	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	9	0.67	9	0.67	11	0.82	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.07	2	0.15	1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	23	1.72	27	2.02	38	2.84	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	8	0.60	6	0.45	3	0.22	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28	107	7.93	117	8.66	118	8.64	126	9.12	95	6.82
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	3	0.22	3	0.22	3	0.22	4	0.29	4	0.29
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	43	3.18	27	2.00	30	2.22	29	2.12	23	1.67	15	1.08
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	3	0.22	2	0.15	3	0.22	1	0.07	1	0.07
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	2	0.15	1	0.07	-	-	-	-	1	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	28	2.07	33	2.44	43	3.15	41	2.97	21	1.51
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	6	0.44	11	0.81	8	0.59	13	0.94	11	0.79
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	3	0.22	-	-	2	0.14	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	2	0.15	3	0.22	3	0.22	3	0.22	3	0.22
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	31	2.30	29	2.15	27	1.98	31	2.24	35	2.51
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	0	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	3	0.22	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-	2	0.14	2	0.14

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
85年	457.75	474.91	128.52	130.61	52.84	55.12	51.96	53.52	24.21	25.00	12.68	13.77	14.05	14.78	29.48	29.19
86年	463.27	459.89	134.67	131.73	55.84	55.60	50.96	50.27	29.02	28.60	10.61	10.84	14.53	14.27	26.25	25.33
87年	465.98	445.91	133.21	125.92	50.82	48.32	49.75	47.19	24.70	23.24	12.60	12.10	15.77	15.04	26.42	25.48
88年	470.49	434.03	134.97	123.57	54.08	49.01	45.78	41.26	32.68	29.91	15.00	13.84	15.87	14.72	24.92	23.86
89年	484.10	428.95	141.38	125.80	47.35	41.22	52.20	45.46	37.97	32.88	11.95	10.32	17.29	15.08	22.66	21.42
90年	500.81	426.61	154.88	132.24	52.38	43.72	52.91	43.95	34.20	28.60	13.90	11.26	18.56	15.45	19.17	17.72
91年	503.41	410.73	158.05	129.89	54.97	43.43	46.74	37.24	33.70	26.67	16.98	12.98	17.29	13.45	19.49	17.86
92年	517.40	402.53	151.87	120.46	62.33	46.71	50.29	37.85	35.91	27.21	21.52	15.83	19.09	14.36	17.27	15.35
93年	523.20	392.14	160.09	122.12	65.99	46.85	47.24	33.77	34.02	24.96	17.03	11.49	19.16	13.77	17.64	15.78
94年	547.41	392.62	163.78	120.21	63.56	42.87	52.19	35.74	37.72	26.19	21.84	13.82	20.77	13.94	15.84	14.03
95年	528.71	364.83	168.54	118.90	58.19	38.38	45.04	29.23	36.05	23.79	21.91	13.32	18.48	12.19	14.44	12.68
96年	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		慢性下呼吸道疾病		高血壓性疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	45.66	27.26	36.18	20.14	27.26	16.89	16.98	9.27	14.24	8.21
98年	568.60	347.27	174.48	111.24	67.61	39.98	43.13	24.61	32.12	16.59	31.55	18.86	18.97	9.85	14.72	8.17
99年	575.83	338.78	177.26	110.14	65.94	36.69	40.07	21.91	34.40	16.89	29.43	16.78	17.79	8.87	16.15	8.49
100年	600.94	343.47	179.59	109.78	72.30	38.51	43.15	23.13	35.75	16.96	29.41	16.39	22.09	10.48	16.93	8.47
101年	615.94	344.34	187.11	111.52	76.18	40.21	44.55	22.94	34.00	15.54	30.69	16.63	22.20	10.31	20.13	9.74
<b>102年</b>	<b>600.78</b>	<b>326.27</b>	<b>183.55</b>	<b>106.98</b>	<b>77.43</b>	<b>39.81</b>	<b>45.15</b>	<b>22.34</b>	<b>32.95</b>	<b>14.46</b>	<b>32.09</b>	<b>16.84</b>	<b>21.38</b>	<b>9.73</b>	<b>18.40</b>	<b>8.66</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
85年	8.55	8.14	14.01	13.91	5.04	5.31	12.52	13.16	6.99	7.33	3.32	3.52	4.09	4.18	3.51	4.84
86年	8.22	7.65	13.41	12.87	4.96	4.93	10.99	10.90	6.99	6.88	2.42	2.46	6.92	6.88	4.07	5.46
87年	7.67	7.20	14.85	13.92	4.43	4.39	10.73	10.24	7.64	7.07	2.25	2.18	4.66	4.42	2.71	3.58
88年	8.03	7.12	15.30	14.31	2.65	2.45	9.47	8.60	5.91	5.32	3.07	2.73	3.75	3.34	3.11	4.40
89年	8.96	7.94	14.11	12.45	3.21	2.76	7.22	6.23	5.37	4.62	4.20	3.55	4.20	3.61	3.06	4.20
90年	10.98	9.70	13.83	11.89	4.39	3.57	6.33	5.24	5.64	4.72	2.84	2.28	3.37	2.80	2.54	3.64
91年	12.32	10.72	11.56	9.55	4.13	3.22	6.79	5.21	4.66	3.66	2.31	1.80	3.11	2.33	2.43	3.59
92年	12.15	10.29	13.93	11.22	3.53	2.56	5.39	3.98	4.37	3.21	2.43	1.79	3.72	2.74	1.56	2.41
93年	13.18	10.93	12.69	9.96	3.58	2.52	6.36	4.43	4.31	2.92	2.67	1.89	2.82	2.01	1.83	3.32
94年	17.83	14.79	12.33	9.20	5.73	3.78	6.18	4.14	4.16	2.79	2.94	2.06	2.29	1.62	1.49	2.66
95年	17.30	14.12	12.08	8.86	5.53	3.48	6.71	4.30	3.51	2.26	3.01	1.89	2.59	1.63	1.60	2.92
96年	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年別	腎炎、腎病徵候群及腎病變		敗血症		事故傷害		慢性肝病及肝硬化		蓄意自我傷害(自殺)		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		帕金森病		血管性及未明示之癱瘓症	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	18.70	11.20	19.53	11.27	14.81	11.94	11.27	7.69	14.09	11.40	10.70	5.87	3.54	1.88	2.63	1.29
98年	17.25	9.72	16.86	9.44	14.42	11.20	13.35	8.79	13.04	10.39	13.00	6.39	3.52	1.89	4.28	2.06
99年	18.14	10.07	17.18	9.25	13.74	10.71	12.17	7.90	12.59	9.67	14.54	6.79	4.25	2.10	4.44	2.00
100年	17.00	8.89	21.48	10.81	15.26	10.92	11.96	7.65	11.61	8.98	8.24	4.45	4.59	2.33	5.16	2.18
101年	19.95	10.62	21.00	10.47	16.15	11.31	10.74	6.77	12.51	9.82	6.27	3.41	5.94	2.92	4.85	1.94
102年	18.21	9.13	17.39	8.18	15.15	10.47	11.57	6.99	9.74	7.40	7.13	3.62	5.78	2.71	5.30	2.11

表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
85年	568.85	558.35	161.70	155.99	68.10	66.65	62.76	60.47	23.59	23.04	17.25	17.64	14.81	14.80	42.75	41.78
86年	565.92	534.47	164.36	153.91	70.06	65.79	61.43	57.33	30.02	27.73	14.55	13.94	17.24	15.80	37.80	35.96
87年	578.81	528.10	165.22	148.86	62.67	56.32	60.06	53.70	24.78	22.12	17.72	16.10	17.80	16.00	37.89	36.44
88年	579.35	510.34	170.53	149.76	68.29	58.54	53.33	45.15	31.66	27.51	20.52	17.75	16.25	14.54	33.34	31.57
89年	598.84	508.07	179.93	153.80	62.93	52.48	61.48	51.02	38.64	31.91	14.66	11.83	18.48	15.35	32.53	30.28
90年	617.44	506.38	196.59	160.95	69.44	56.05	62.85	49.69	34.49	27.60	17.86	13.72	19.70	15.75	27.97	25.64
91年	615.07	486.19	193.72	154.72	68.88	53.03	56.43	43.79	35.67	27.07	24.14	17.44	18.91	14.60	27.60	25.21
92年	633.43	478.70	187.41	144.63	76.82	55.94	63.09	46.02	35.71	26.53	28.46	19.91	20.13	14.57	24.37	21.59
93年	647.93	474.26	201.24	149.63	85.88	59.64	56.24	39.19	34.13	24.46	23.27	14.96	21.57	14.97	26.53	23.74
94年	683.06	480.28	205.00	148.15	82.62	54.25	64.07	43.39	40.61	27.75	28.84	17.20	25.26	16.55	24.32	21.46
95年	654.67	445.74	210.37	146.09	75.79	49.62	53.08	34.17	36.92	24.11	29.12	17.22	20.37	13.06	21.93	19.32
96年	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		慢性下呼吸道疾病		糖尿病		敗血症	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	53.13	32.56	48.58	26.32	26.45	13.76	27.62	17.36	20.64	11.78
98年	693.85	425.20	211.03	134.11	86.99	52.89	51.12	29.05	41.72	21.04	29.79	15.11	33.42	20.41	18.41	10.28
99年	704.08	421.30	219.66	137.29	82.36	47.58	47.72	26.99	43.44	21.00	26.56	12.91	30.44	17.70	18.23	9.72
100年	737.25	426.54	216.55	132.95	90.98	50.79	54.91	29.93	47.66	22.21	35.05	16.00	30.96	18.33	26.55	13.53
101年	751.69	429.77	229.30	138.02	97.28	54.52	53.01	28.56	43.96	20.08	33.57	15.24	32.32	18.20	24.05	11.78
<b>102年</b>	<b>732.81</b>	<b>409.56</b>	<b>221.64</b>	<b>130.87</b>	<b>97.23</b>	<b>53.17</b>	<b>54.28</b>	<b>28.22</b>	<b>44.65</b>	<b>19.94</b>	<b>33.47</b>	<b>15.30</b>	<b>33.24</b>	<b>18.44</b>	<b>21.28</b>	<b>10.03</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
85年	11.83	11.21	19.32	18.61	5.95	5.88	14.51	13.75	8.40	8.04	4.81	4.78	6.11	5.87	4.12	5.30
86年	9.62	8.91	19.02	17.91	5.70	5.31	12.16	11.49	9.16	8.45	3.00	2.81	10.85	10.11	4.62	6.03
87年	9.59	9.06	21.25	19.75	4.91	4.58	12.20	11.07	10.20	8.76	2.84	2.69	7.06	6.37	2.84	3.57
88年	10.91	9.73	23.35	21.96	2.90	4.77	10.91	9.57	7.17	5.78	4.12	3.40	5.95	4.84	2.82	3.87
89年	10.92	9.42	19.32	16.79	3.13	2.44	8.94	7.24	7.56	6.10	5.80	4.57	6.57	5.39	3.59	4.74
90年	14.72	13.27	18.32	15.79	4.52	3.58	6.74	5.51	7.28	5.95	3.83	2.94	5.82	4.56	2.53	3.42
91年	16.45	13.99	16.07	13.27	4.07	2.97	7.61	5.58	5.77	4.35	2.69	2.07	5.15	3.60	2.61	3.72
92年	15.66	13.42	19.20	15.43	4.70	3.22	5.40	4.00	5.24	3.69	3.24	2.24	5.78	4.09	1.77	2.62
93年	17.46	14.81	17.22	13.87	4.19	2.83	6.36	4.29	5.66	3.64	3.34	2.25	4.58	3.14	1.94	3.25
94年	24.40	20.52	14.97	11.51	5.69	3.62	8.26	5.49	5.53	3.57	4.05	2.78	3.90	2.70	1.33	2.20
95年	24.12	20.00	16.39	12.38	5.70	3.34	7.34	4.78	4.53	2.83	3.36	2.06	4.14	2.46	1.25	2.40
96年	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年別	事故傷害		高血壓性疾病		腎炎、腎病徵候群及腎病變		慢性肝病及肝硬化		蓄意自我傷害(自殺)		帕金森病		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	21.11	17.19	16.01	9.43	18.83	11.24	15.46	10.94	18.13	15.00	4.39	2.24	10.36	5.63	7.93	4.79
98年	20.54	16.29	16.28	9.25	19.67	10.79	18.33	12.76	18.49	14.83	4.90	2.56	11.22	5.05	5.77	3.39
99年	20.45	16.18	18.31	9.74	18.55	10.57	15.70	10.91	16.81	13.01	5.07	2.28	13.48	6.09	5.95	3.48
100年	21.03	15.84	18.12	9.32	18.59	9.68	16.62	11.40	14.81	11.63	5.51	2.83	6.46	3.30	5.91	3.26
101年	22.25	16.23	21.39	10.76	19.91	11.13	14.60	9.70	16.16	12.59	7.50	3.72	5.70	2.96	4.68	2.45
<b>102年</b>	<b>21.05</b>	<b>15.04</b>	<b>19.80</b>	<b>9.82</b>	<b>18.79</b>	<b>9.69</b>	<b>15.38</b>	<b>10.12</b>	<b>12.89</b>	<b>9.96</b>	<b>7.30</b>	<b>3.49</b>	<b>6.83</b>	<b>3.32</b>	<b>6.21</b>	<b>3.31</b>

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎徵候群及腎性病變		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
85年	346.60	384.85	95.32	102.11	37.58	42.33	41.17	46.07	24.82	27.76	13.29	14.93	8.10	9.40	5.27	5.03
86年	360.94	381.88	105.07	108.40	41.67	44.63	40.52	43.01	28.01	29.90	11.82	12.55	6.68	7.30	6.83	6.47
87年	354.16	359.17	101.48	100.73	39.07	39.75	39.53	40.17	24.63	25.10	13.76	13.97	7.53	7.74	5.78	5.41
88年	363.23	354.77	99.92	95.83	40.07	38.68	38.35	37.28	33.68	32.98	15.49	15.09	9.55	9.41	5.19	4.62
89年	371.52	347.71	103.56	96.02	32.07	29.71	43.09	39.97	37.32	34.73	16.11	14.98	9.29	8.60	7.04	6.37
90年	386.85	346.12	114.12	101.60	35.72	31.32	43.21	38.11	33.92	30.31	17.45	15.28	10.03	8.53	7.34	6.33
91年	394.76	336.33	123.33	105.00	41.44	34.13	37.32	30.92	31.79	26.66	15.71	13.06	10.02	8.19	8.30	7.14
92年	404.96	328.28	117.42	96.19	48.28	37.79	37.90	29.85	36.10	28.60	18.09	14.30	14.80	11.55	8.75	7.39
93年	402.84	312.67	120.38	94.63	46.79	34.35	38.55	28.72	33.91	26.02	16.84	12.63	11.00	7.84	9.06	8.26
94年	417.20	309.11	124.20	93.11	45.27	31.66	40.78	28.68	34.94	25.11	16.46	11.53	15.11	10.25	11.52	9.63
95年	408.57	288.49	128.65	92.46	41.39	27.76	37.37	24.78	35.21	23.87	16.68	11.39	15.04	9.47	10.80	8.87
96年	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎病徵候群 及腎病變		高血壓性 疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	38.61	22.90	26.93	16.79	24.49	14.14	18.57	11.35	12.58	7.27
98年	451.14	276.88	140.20	90.07	49.43	28.58	35.64	20.63	29.79	17.72	23.12	12.35	14.97	8.70	13.26	7.33
99年	456.13	265.58	137.69	85.62	50.61	27.23	32.92	17.61	28.48	16.12	25.97	12.95	17.76	9.80	14.13	7.43
100年	474.21	270.05	145.23	89.19	54.93	27.89	32.22	17.12	27.98	14.97	24.68	12.06	15.53	8.19	15.82	7.81
101年	490.07	269.77	147.98	88.40	56.62	28.04	36.71	18.18	29.18	15.39	24.76	11.42	19.98	10.28	18.97	8.90
<b>102年</b>	<b>478.66</b>	<b>253.90</b>	<b>148.32</b>	<b>86.24</b>	<b>59.11</b>	<b>28.39</b>	<b>36.70</b>	<b>17.36</b>	<b>31.03</b>	<b>15.60</b>	<b>22.12</b>	<b>9.54</b>	<b>17.67</b>	<b>8.67</b>	<b>17.10</b>	<b>7.74</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
85年	8.71	9.53	16.19	16.85	4.12	4.65	10.54	12.06	5.58	6.32	1.83	2.11	2.90	4.36	0.46	0.50
86年	7.83	8.20	14.74	14.94	4.22	4.57	9.82	10.47	4.84	5.11	1.84	2.02	3.53	4.85	0.69	0.79
87年	8.51	8.65	15.05	14.87	3.95	4.06	9.27	9.49	5.09	5.10	1.67	1.71	2.58	3.61	0.53	0.56
88年	7.37	7.15	16.62	16.43	2.41	2.42	8.05	7.76	4.66	4.58	2.03	1.95	3.38	4.95	0.45	0.45
89年	8.99	8.51	12.96	12.93	3.30	3.02	5.55	5.14	3.22	2.95	2.62	2.40	2.55	3.64	1.27	1.13
90年	9.44	8.56	10.56	10.05	4.27	3.70	5.92	5.13	4.04	3.49	1.87	1.60	2.55	3.86	0.97	0.86
91年	7.18	6.18	11.59	11.02	4.19	3.46	5.98	4.82	3.59	2.95	1.94	1.56	2.24	3.45	0.67	0.58
92年	8.82	7.44	10.39	9.44	2.39	1.84	5.38	4.13	3.51	2.70	1.64	1.31	1.35	2.20	1.05	0.84
93年	8.31	6.60	9.06	7.40	2.99	2.15	6.36	4.65	2.99	2.20	2.02	1.51	1.72	3.40	1.27	0.99
94年	9.80	7.32	7.71	7.05	5.76	4.00	4.19	2.87	2.84	1.97	1.87	1.36	1.65	3.15	0.97	0.76
95年	7.97	5.79	7.30	6.30	5.36	3.59	6.10	3.95	2.53	1.69	2.68	1.74	1.94	3.45	1.56	1.06
96年	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年別	敗血症		慢性下呼吸道疾病		事故傷害		慢性肝病及肝硬化		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		蓄意自我傷害(自殺)		血管性及未明示之癡呆症		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	18.49	10.99	8.06	4.57	8.88	6.98	7.32	4.87	11.02	6.25	10.28	8.19	2.81	1.48	2.74	1.52
98年	15.41	8.77	8.82	4.61	8.67	6.49	8.67	5.38	14.67	7.76	7.93	6.48	5.04	2.57	2.22	1.23
99年	16.20	8.98	9.62	4.94	7.47	5.74	8.88	5.36	15.54	7.61	8.66	6.70	4.51	2.11	3.48	1.90
100年	16.77	8.39	10.03	5.06	9.89	6.49	7.62	4.44	9.89	5.54	8.64	6.65	5.35	2.32	3.74	1.90
101年	18.17	9.22	11.66	5.67	10.50	6.82	7.17	4.18	6.81	3.86	9.12	7.31	4.71	1.91	4.49	2.23
<b>102年</b>	<b>13.79</b>	<b>6.53</b>	<b>10.20</b>	<b>4.64</b>	<b>9.70</b>	<b>6.34</b>	<b>8.04</b>	<b>4.28</b>	<b>7.40</b>	<b>3.88</b>	<b>6.82</b>	<b>5.17</b>	<b>5.67</b>	<b>2.33</b>	<b>4.38</b>	<b>2.03</b>

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		3,180	120.31		3,366	128.52		3,504	134.67		3,489	133.21		3,564	134.97		3,738	141.38
162	肺癌	1	615	23.27	1	645	24.63	1	718	27.59	1	729	27.83	1	750	28.40	1	751	28.41
155	肝癌	2	570	21.56	2	581	22.18	2	606	23.29	2	588	22.45	2	564	21.36	2	562	21.26
153 154	結腸直腸癌	3	329	12.45	3	386	14.74	3	366	14.07	3	398	15.20	3	417	15.79	3	462	17.47
174	女性乳癌(1)	5	135	10.23	5	153	11.69	4	182	13.97	5	164	12.47	4	162	12.18	4	169	12.66
151	胃癌	4	328	12.41	4	356	13.59	5	346	13.30	4	327	12.48	5	317	12.00	5	328	12.41
185	攝護腺癌(2)	7	51	3.85	7	68	5.19	8	65	5.00	8	66	5.06	7	91	6.94	7	93	7.10
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	92	3.48	8	133	5.08	7	133	5.11	7	136	5.19	8	143	5.42	9	136	5.14
157	胰臟癌	9	97	3.67	9	111	4.24	10	109	4.19	9	112	4.28	9	122	4.62	8	138	5.22
179 180	子宮頸癌(1)	6	108	8.18	6	102	7.79	6	128	9.82	6	102	7.75	6	113	8.50	6	97	7.27
156	膽囊癌	15	64	2.42	14	81	3.09	16	71	2.73	11	93	3.55	12	94	3.56	12	104	3.93
183	卵巢癌(1)	11	44	3.33	12	44	3.36	15	36	2.76	14	42	3.19	13	41	3.08	14	42	3.15
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	78	2.95	13	88	3.36	9	113	4.34	15	79	3.02	10	98	3.71	10	113	4.27
150	食道癌	14	75	2.84	14	81	3.09	11	102	3.92	12	88	3.36	11	97	3.67	11	108	4.08
204-208	白血病	8	100	3.78	11	89	3.40	12	94	3.61	10	99	3.78	14	76	2.88	13	99	3.74
188	膀胱癌	17	57	2.16	17	55	2.10	17	56	2.15	16	66	2.52	16	66	2.50	15	83	3.14
	其他		437	16.53		393	15.01		379	14.57		400	15.27		413	15.64		453	17.13

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
08-14	所有癌症死亡原因		4,089	154.88		4,169	158.05		4,001	151.87		4,202	160.09		4,290	163.78		4,423	168.54		4,566	173.56
162	肺癌	1	883	33.45	1	889	33.70	1	847	32.15	1	880	33.53	1	870	33.21	1	910	34.68	1	987	37.52
155	肝癌	2	671	25.42	2	661	25.06	2	664	25.20	2	677	25.79	2	607	23.17	2	702	26.75	2	666	25.32
153 154	結腸直腸癌	3	444	16.82	3	490	18.58	3	436	16.55	3	518	19.73	3	542	20.69	3	532	20.27	3	557	21.17
174	女性乳癌(1)	4	199	14.90	4	192	14.36	4	208	15.55	4	203	15.20	4	224	16.76	4	209	15.56	4	203	15.03
151	胃癌	5	349	13.22	5	374	14.18	5	294	11.16	5	311	11.85	5	354	13.51	5	363	13.83	5	329	12.51
185	攝護腺癌(2)	6	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	6	122	9.46	6	133	10.37	6	129	10.07	6	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	130	4.92	8	172	6.52	8	166	6.30	9	148	5.64	7	181	6.91	8	175	6.67	7	217	8.25
157	胰臟癌	9	124	4.70	9	157	5.95	9	146	5.54	8	164	6.25	9	168	6.41	7	178	6.78	8	178	6.77
179 180	子宮頸癌(1)	7	110	8.24	7	105	7.85	7	85	6.35	7	87	6.51	8	86	6.43	10	81	6.03	9	89	6.59
156	膽囊癌	12	106	4.01	11	119	4.51	13	101	3.83	11	125	4.76	12	120	4.58	12	116	4.42	10	149	5.66
183	卵巢癌(1)	11	56	4.19	12	53	3.96	14	49	3.66	12	58	4.34	14	50	3.74	11	73	5.43	11	74	5.48
140-149*	口腔癌(含口咽及 下咽)	10	113	4.28	14	92	3.49	10	125	4.74	10	138	5.26	10	146	5.57	9	166	6.33	12	134	5.09
150	食道癌	13	103	3.90	10	123	4.66	12	104	3.95	14	106	4.04	11	126	4.81	14	97	3.70	13	126	4.79
204-208	白血病	14	97	3.67	13	94	3.56	11	109	4.14	13	108	4.11	13	100	3.82	13	98	3.73	14	107	4.07
188	膀胱癌	16	76	2.88	17	60	2.27	16	56	2.13	15	92	3.51	16	66	2.52	16	82	3.12	15	91	3.46
	其他		508	19.24		482	18.27		504	19.13		465	17.72		517	19.74		512	19.51		523	19.88

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		4,467	170.10		4,563	174.48		4,632	177.26		4,732	179.59		4,981	187.11		4,919	183.55
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34	1	967	36.98	1	990	37.89	1	1,014	38.48	1	1,018	38.24	1	988	36.87
C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69	2	665	25.43	2	644	24.65	2	672	25.50	2	697	26.18	2	700	26.12
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59	3	592	22.64	3	570	21.81	3	609	23.11	3	648	24.34	3	631	23.55
C50	女性乳房癌(1)	4	228	16.87	4	236	17.49	4	266	19.68	4	283	20.73	4	243	17.59	4	264	18.96
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	124	9.73	6	142	11.22	6	144	11.41	6	132	10.40	5	176	13.74	5	155	12.04
C16	胃癌	5	312	11.88	5	319	12.20	5	307	11.75	5	285	10.82	6	329	12.36	6	315	11.75
C25	胰臟癌	7	192	7.31	7	237	9.06	7	211	8.07	7	231	8.77	7	232	8.71	7	231	8.62
C00-C06, C09- C10, C12-C14 C56, C57.0- C57.4	口腔癌	9	131	4.99	8	148	5.66	9	151	5.78	8	153	5.81	9	169	6.35	8	203	7.57
	卵巢癌(1)	13	58	4.29	11	65	4.82	12	66	4.88	11	65	4.76	8	88	6.37	9	85	6.11
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	131	4.99	12	119	4.55	8	152	5.82	9	149	5.65	10	147	5.52	10	154	5.75
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	75	5.55	9	69	5.11	10	71	5.25	10	74	5.42	12	63	4.56	11	80	5.75
C15	食道癌	12	120	4.57	10	129	4.93	11	137	5.24	12	115	4.36	11	133	5.00	12	121	4.52
C91-C95	白血病	11	121	4.61	13	106	4.05	13	107	4.09	13	112	4.25	13	110	4.13	13	113	4.22
C67	膀胱癌	15	80	3.05	14	80	3.06	14	95	3.64	14	78	2.96	14	85	3.19	14	84	3.13
C54	子宮體癌(1)	17	28	2.07	19	23	1.70	18	29	2.15	18	34	2.49	18	35	2.53	15	39	2.80
	其他		671	25.55		666	25.47		692	26.48		726	27.55		808	30.35		756	28.21

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		1,977	149.38		2,118	161.70		2,135	164.36		2,154	165.22		2,235	170.53		2,356	179.93
162	肺癌	2	414	31.28	1	448	34.20	1	471	36.26	1	482	36.97	1	542	41.35	1	514	39.26
155	肝癌	1	436	32.94	2	445	33.97	2	458	35.26	2	460	35.28	2	430	32.81	2	432	32.99
153 154	結腸直腸癌	4	191	14.43	4	236	18.02	4	226	17.40	4	220	16.87	3	240	18.31	3	264	20.16
151	胃癌	3	212	16.02	3	255	19.47	3	228	17.55	3	228	17.49	4	203	15.49	4	218	16.65
185	攝護腺癌	11	51	3.85	8	68	5.19	8	65	5.00	9	66	5.06	5	91	6.94	7	93	7.10
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	66	4.99	5	80	6.11	7	79	6.08	6	74	5.68	6	86	6.56	8	91	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	73	5.52	6	77	5.88	5	101	7.78	6	74	5.68	7	82	6.26	6	94	7.18
150	食道癌	8	64	4.84	7	69	5.27	6	90	6.93	5	79	6.06	7	82	6.26	5	100	7.64
157	胰臟癌	9	63	4.76	10	63	4.81	10	58	4.47	8	72	5.52	9	73	5.57	9	84	6.42
156	膽囊癌	16	27	2.04	12	40	3.05	14	34	2.62	12	56	4.30	11	52	3.97	11	55	4.20
204-208	白血病	7	65	4.91	11	55	4.20	11	53	4.08	10	64	4.91	12	49	3.74	10	68	5.19
188	膀胱癌	12	42	3.17	12	40	3.05	12	41	3.16	13	51	3.91	13	48	3.66	12	54	4.12
147	鼻咽癌	9	63	4.76	9	67	5.12	9	64	4.93	11	57	4.37	10	54	4.12	13	51	3.89
191	腦癌	14	29	2.19	14	37	2.82	12	41	3.16	15	33	2.53	15	27	2.06	15	26	1.99
161	喉癌	15	28	2.12	16	17	1.30	17	12	0.92	16	21	1.61	16	25	1.91	16	24	1.83
	其他		153	11.56		121	9.24		114	8.78		117	8.97		151	11.52		188	14.36

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率						
08-14	所有癌症死亡原因		2,565	196.59		2,520	193.72		2,430	187.41		2,594	201.24		2,630	205.00		2,695	210.37		2,757	215.37
162	肺癌	1	619	47.44	1	588	45.20	1	572	44.12	1	599	46.47	1	562	43.81	1	608	47.46	1	635	49.60
155	肝癌	2	491	37.63	2	492	37.82	2	477	36.79	2	495	38.40	2	445	34.69	2	518	40.43	2	488	38.12
153 154	結腸直腸癌	3	261	20.00	3	285	21.91	3	246	18.97	3	306	23.74	3	306	23.85	3	316	24.67	3	308	24.06
151	胃癌	4	244	18.70	4	231	17.76	4	185	14.27	4	198	15.36	4	236	18.40	4	240	18.73	4	214	16.72
185	攝護腺癌	5	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	5	122	9.46	5	133	10.37	6	129	10.07	5	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	90	6.90	7	97	7.46	8	92	7.10	7	91	7.06	8	115	8.96	7	112	8.74	6	129	10.08
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	6	96	7.36	9	82	6.30	5	111	8.56	5	122	9.46	6	133	10.37	5	147	11.47	7	117	9.14
150	食道癌	7	92	7.05	5	116	8.92	7	96	7.40	7	91	7.06	7	116	9.04	9	87	6.79	8	107	8.36
157	胰臟癌	9	71	5.44	8	96	7.38	9	86	6.63	9	89	6.90	9	103	8.03	8	96	7.49	9	91	7.11
156	膽囊癌	13	52	3.99	10	61	4.69	12	52	4.01	11	65	5.04	10	70	5.46	11	60	4.68	10	89	6.95
204-208	白血病	10	62	4.75	12	48	3.69	10	66	5.09	10	68	5.28	11	59	4.60	12	54	4.22	11	68	5.31
188	膀胱癌	11	61	4.68	13	46	3.54	13	41	3.16	12	62	4.81	13	45	3.51	13	50	3.90	12	65	5.08
147	鼻咽癌	11	61	4.68	11	52	4.00	11	54	4.16	13	55	4.27	12	59	4.60	10	65	5.07	13	63	4.92
191	腦癌	16	28	2.15	15	28	2.15	16	21	1.62	15	26	2.02	14	32	2.49	14	33	2.58	14	26	2.03
161	喉癌	15	36	2.76	16	17	1.31	14	33	2.55	16	18	1.40	15	20	1.56	16	20	1.56	15	19	1.48
	其他		181	13.87		175	13.45		191	14.73		187	14.51		196	15.28		160	12.49		202	15.78



表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73		2,671	211.03		2,771	219.66		2,749	216.55		2,937	229.30		2,854	221.64
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54	1	596	47.09	1	617	48.91	1	639	50.34	1	633	49.42	1	610	47.37
C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30	2	449	35.47	2	443	35.12	2	474	37.34	2	475	37.08	2	485	37.67
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13	3	311	24.57	3	331	26.24	3	325	25.60	3	371	28.97	3	358	27.80
C16	胃癌	4	218	17.11	4	203	16.04	4	197	15.62	4	191	15.05	4	203	15.85	4	189	14.68
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02	7	136	10.75	6	139	11.02	5	132	10.40	6	146	11.40	5	175	13.59
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73	5	142	11.22	5	144	11.41	5	132	10.40	5	176	13.74	6	155	12.04
C25	胰臟癌	7	114	8.95	6	137	10.82	7	126	9.99	7	111	8.74	8	123	9.60	7	123	9.55
C15	食道癌	8	107	8.40	8	109	8.61	8	115	9.12	8	104	8.19	7	127	9.92	8	110	8.54
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96	9	77	6.08	9	102	8.09	9	94	7.40	9	86	6.71	9	80	6.21
C91-C95	白血病	9	76	5.96	10	64	5.06	10	65	5.15	10	63	4.96	10	71	5.54	10	70	5.44
C67	膀胱癌	12	57	4.47	11	56	4.42	11	63	4.99	11	53	4.18	12	55	4.29	11	57	4.43
C11	鼻咽癌	11	61	4.79	12	49	3.87	12	56	4.44	13	42	3.31	11	56	4.37	12	56	4.35
C71	腦癌	14	26	2.04	15	35	2.77	13	41	3.25	13	42	3.31	13	44	3.44	13	46	3.57
C64	腎臟癌	14	26	2.04	13	38	3.00	14	39	3.09	12	48	3.78	15	37	2.89	14	39	3.03
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43	13	38	3.00	15	30	2.38	15	32	2.52	14	40	3.12	15	28	2.17
	其他		253	19.85		231	18.25		263	20.85		267	21.03		294	22.95		273	21.20

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		1,203	91.16		1,248	95.32		1,369	105.07		1,335	101.48		1,329	99.92		1,382	103.56
162	肺癌	1	201	15.23	1	197	15.05	1	247	18.96	1	247	18.78	1	208	15.64	1	237	17.76
153 154	結腸直腸癌	2	138	10.46	3	150	11.46	4	140	10.74	2	178	13.53	2	177	13.31	2	198	14.84
174	女性乳癌	3	135	10.23	2	153	11.69	2	182	13.97	3	164	12.47	3	162	12.18	3	169	12.66
155	肝癌	4	134	10.15	4	136	10.39	3	148	11.36	4	128	9.73	4	134	10.08	4	130	9.74
151	胃癌	5	116	8.79	6	101	7.71	6	118	9.06	6	99	7.53	5	114	8.57	5	110	8.24
179 180	子宮頸癌	6	108	8.18	5	102	7.79	5	128	9.82	5	102	7.75	6	113	8.50	6	97	7.27
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	11	26	1.97	7	53	4.05	7	54	4.14	7	62	4.71	7	57	4.29	9	45	3.37
157	胰臟癌	10	34	2.58	8	48	3.67	8	51	3.91	9	40	3.04	8	49	3.68	7	54	4.05
183	卵巢癌	7	44	3.33	9	44	3.36	11	36	2.76	8	42	3.19	10	41	3.08	10	42	3.15
156	膽囊癌	8	37	2.80	10	41	3.13	10	37	2.84	10	37	2.81	9	42	3.16	8	49	3.67
204-208	白血病	9	35	2.65	11	34	2.60	9	41	3.15	11	35	2.66	11	27	2.03	11	31	2.32
182	子宮體癌	19	8	0.61	18	7	0.53	-	-	-	25	1	0.08	12	20	1.50	15	17	1.27
188	膀胱癌	15	15	1.14	15	15	1.15	15	15	1.15	15	15	1.14	13	18	1.35	12	29	2.17
191	腦癌	12	23	1.74	12	23	1.76	12	31	2.38	12	27	2.05	17	12	0.90	16	15	1.12
150	食道癌	16	11	0.83	16	12	0.92	16	12	0.92	18	9	0.68	16	15	1.13	18	8	0.60
	其他		138	10.46		132	10.08		129	9.90		149	11.33		140	10.53		151	11.31

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率						
08-14	所有癌症死亡原因		1,524	114.12		1,649	123.33		1,571	117.42		1,608	120.38		1,660	124.20		1,728	128.65		1,809	133.94
162	肺癌	1	264	19.77	1	301	22.51	1	275	20.55	1	281	21.04	1	308	23.05	1	302	22.48	1	352	26.06
153 154	結腸直腸癌	3	183	13.70	2	205	15.33	3	190	14.20	2	212	15.87	2	236	17.66	2	216	16.08	2	249	18.44
174	女性乳癌	2	199	14.90	3	192	14.36	2	208	15.55	3	203	15.20	3	224	16.76	3	209	15.56	3	203	15.03
155	肝癌	4	180	13.48	4	169	12.64	4	187	13.98	4	182	13.62	4	162	12.12	4	184	13.70	4	178	13.18
151	胃癌	6	105	7.86	5	143	10.70	5	109	8.15	5	113	8.46	5	118	8.83	5	123	9.16	5	115	8.51
179 180	子宮頸癌	5	110	8.24	6	105	7.85	6	85	6.35	6	87	6.51	6	86	6.43	7	81	6.03	6	89	6.59
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	40	3.00	7	75	5.61	7	74	5.53	10	57	4.27	7	66	4.94	9	63	4.69	7	88	6.52
157	胰臟癌	9	53	3.97	8	61	4.56	8	60	4.48	7	75	5.61	8	65	4.86	6	82	6.10	8	87	6.44
183	卵巢癌	7	56	4.19	10	53	3.96	9	49	3.66	9	58	4.34	10	50	3.74	8	73	5.43	9	74	5.48
156	膽囊癌	8	54	4.04	9	58	4.34	9	49	3.66	8	60	4.49	9	50	3.74	10	56	4.17	10	60	4.44
204-208	白血病	11	35	2.62	11	46	3.44	11	43	3.21	11	40	2.99	11	41	3.07	11	44	3.28	11	39	2.89
182	子宮體癌	16	16	1.20	13	23	1.72	15	16	1.20	14	22	1.65	13	22	1.65	13	25	1.86	12	26	1.93
188	膀胱癌	17	15	1.12	16	14	1.05	16	15	1.12	12	30	2.25	14	21	1.57	15	32	2.38	13	26	1.93
191	腦癌	14	22	1.65	15	18	1.35	12	23	1.72	13	24	1.80	12	25	1.87	16	22	1.64	14	20	1.48
150	食道癌	18	11	0.82	21	7	0.52	21	8	0.60	18	15	1.12	18	10	0.75	19	10	0.74	15	19	1.41
	其他		181	13.55		179	13.39		180	13.45		149	11.15		176	13.17		206	15.34		184	13.62

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		1,769	130.86		1,892	140.20		1,861	137.69		1,983	145.23		2,044	147.98		2,065	148.32
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78	1	371	27.49	1	373	27.60	1	375	27.46	1	385	27.87	1	378	27.15
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31	2	281	20.82	3	239	17.68	2	284	20.80	2	277	20.05	2	273	19.61
C50	女性乳房癌	3	228	16.87	3	236	17.49	2	266	19.68	3	283	20.73	3	243	17.59	3	264	18.96
C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76	4	216	16.01	4	201	14.87	4	198	14.50	4	222	16.07	4	215	15.44
C16	胃癌	5	94	6.95	5	116	8.60	5	110	8.14	6	94	6.88	5	126	9.12	5	126	9.05
C25	胰臟癌	6	78	5.77	6	100	7.41	6	85	6.29	5	120	8.79	6	109	7.89	6	108	7.76
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	8	58	4.29	8	65	4.82	8	66	4.88	8	65	4.76	7	88	6.37	7	85	6.11
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	75	5.55	7	69	5.11	7	71	5.25	7	74	5.42	8	63	4.56	8	80	5.75
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07	9	42	3.11	9	50	3.70	9	55	4.03	9	61	4.42	9	74	5.32
C91-C95	白血病	10	45	3.33	9	42	3.11	10	42	3.11	10	49	3.59	10	39	2.82	10	43	3.09
C54	子宮體癌	14	23	1.70	15	21	1.56	13	28	2.07	13	28	2.05	15	28	2.03	11	39	2.80
C71	腦癌	11	35	2.59	11	35	2.59	15	22	1.63	11	34	2.49	11	37	2.68	12	29	2.08
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	26	1.92	18	16	1.19	20	9	0.67	18	20	1.46	14	29	2.10	13	28	2.01
C67	膀胱癌	17	23	1.70	13	24	1.78	11	32	2.37	15	25	1.83	13	30	2.17	14	27	1.94
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	12	28	2.07	14	23	1.70	12	29	2.15	11	34	2.49	12	35	2.53	15	25	1.80
	其他		247	18.27		258	19.12		267	19.75		279	20.43		307	22.23		271	19.47

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
85年	128.52	130.61	24.63	25.11	22.18	22.54	14.74	15.13	11.69	11.54	13.59	13.65	5.19	4.70	5.08	5.21
86年	134.67	131.73	27.59	26.66	23.29	22.95	14.07	13.85	13.97	13.25	13.30	12.96	5.00	4.66	5.11	5.10
87年	133.21	125.92	27.83	25.93	22.45	21.54	15.20	14.56	12.47	11.87	12.48	11.57	5.06	4.30	5.19	5.01
88年	134.97	123.57	28.40	25.63	21.36	19.93	15.79	14.44	12.18	11.19	12.00	10.83	6.94	5.68	5.42	4.86
89年	141.38	125.80	28.41	24.95	21.26	19.43	17.47	15.37	12.66	11.48	12.41	10.71	7.10	5.68	5.14	4.61
90年	154.88	132.24	33.45	28.02	25.42	22.35	16.82	14.23	14.90	12.94	13.22	11.07	9.20	6.83	4.92	4.15
91年	158.05	129.89	33.70	27.17	25.06	21.27	18.58	15.06	14.36	12.05	14.18	11.21	8.15	5.70	6.52	5.31
92年	151.87	120.46	32.15	25.14	25.20	20.37	16.55	12.76	15.55	12.66	11.16	8.52	8.25	5.53	6.30	5.13
93年	160.09	122.12	33.53	25.03	25.79	20.05	19.73	14.86	15.20	11.80	11.85	8.66	9.46	5.88	5.64	4.32
94年	163.78	120.21	33.21	23.58	23.17	17.60	20.69	14.85	16.76	12.67	13.51	9.41	10.37	6.14	6.91	5.12
95年	168.54	118.90	34.68	23.70	26.75	19.75	20.27	14.03	15.56	11.37	13.83	9.15	10.07	5.68	6.67	4.78
96年	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		女性乳房癌		前列腺(攝護腺)癌		胃癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	170.10	112.87	35.34	22.90	26.69	18.47	21.59	13.90	16.87	11.66	9.73	5.35	11.88	7.51	7.31	4.85
98年	174.48	111.24	36.98	22.87	25.43	16.63	22.64	14.01	17.49	11.55	11.22	5.88	12.20	7.31	9.06	5.74
99年	177.26	110.14	37.89	22.60	24.65	15.83	21.81	13.10	19.68	12.87	11.41	5.86	11.75	6.67	8.07	5.06
100年	179.59	109.78	38.48	22.83	25.50	15.95	23.11	13.85	20.73	13.50	10.40	5.12	10.82	6.21	8.77	5.30
101年	187.11	111.52	38.24	22.23	26.18	16.07	24.34	13.77	17.59	10.88	13.74	6.72	12.36	6.83	8.71	5.19
<b>102年</b>	<b>183.55</b>	<b>106.98</b>	<b>36.87</b>	<b>20.72</b>	<b>26.12</b>	<b>15.44</b>	<b>23.55</b>	<b>13.36</b>	<b>18.96</b>	<b>11.90</b>	<b>12.04</b>	<b>5.87</b>	<b>11.75</b>	<b>6.27</b>	<b>8.62</b>	<b>4.89</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
85年	4.24	4.31	7.79	8.16	3.09	3.24	3.36	3.51	3.36	3.49	3.09	3.20	3.40	3.51	2.10	2.13
86年	4.19	4.01	9.82	10.16	2.73	2.76	2.76	2.82	4.34	4.20	3.92	3.80	3.61	3.61	2.15	2.12
87年	4.28	4.00	7.75	7.32	3.55	3.45	3.19	3.00	3.02	2.76	3.36	3.16	3.78	3.66	2.52	2.37
88年	4.62	4.19	8.50	7.95	3.56	3.28	3.08	2.90	3.71	3.51	3.67	3.49	2.88	2.79	2.50	2.25
89年	5.22	4.57	7.27	6.51	3.93	3.55	3.15	2.85	4.27	3.84	4.08	3.62	3.74	3.48	3.14	2.78
90年	4.70	3.91	8.24	7.39	4.01	3.40	4.19	3.62	4.28	3.71	3.90	3.42	3.67	3.19	2.88	2.28
91年	5.95	4.89	7.85	6.60	4.51	3.72	3.96	3.31	3.49	3.00	4.66	3.88	3.56	3.15	2.27	1.80
92年	5.54	4.31	6.35	5.09	3.83	2.96	3.66	3.05	4.74	3.93	3.95	3.16	4.14	3.70	2.13	1.58
93年	6.25	4.84	6.51	4.90	4.76	3.56	4.34	3.38	5.26	4.26	4.04	3.19	4.11	3.43	3.51	2.44
94年	6.41	4.61	6.43	4.89	4.58	3.44	3.74	2.76	5.57	4.30	4.81	3.76	3.82	3.07	2.52	1.74
95年	6.78	4.75	6.03	4.26	4.42	3.04	5.43	3.91	6.33	4.81	3.70	2.66	3.73	2.77	3.12	1.97
96年	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年別	口腔癌		卵巢癌		非何杰金氏淋巴瘤		子宮頸及部位未 明示子宮癌		食道癌		白血病		膀胱癌		子宮體癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	4.99	3.43	4.29	2.96	4.99	3.18	5.55	3.62	4.57	3.16	4.61	3.42	3.05	1.83	2.07	1.42
98年	5.66	3.78	4.82	3.36	4.55	2.85	5.11	3.31	4.93	3.23	4.05	2.92	3.06	1.72	1.70	1.15
99年	5.78	3.90	4.88	3.21	5.82	3.39	5.25	3.39	5.24	3.43	4.09	2.78	3.64	1.97	2.15	1.46
100年	5.81	3.86	4.76	3.25	5.65	3.30	5.42	3.23	4.36	2.71	4.25	2.95	2.96	1.57	2.49	1.67
101年	6.35	3.97	6.37	4.09	5.52	3.30	4.56	2.87	5.00	3.13	4.13	2.87	3.19	1.57	2.53	1.53
<b>102年</b>	<b>7.57</b>	<b>4.88</b>	<b>6.11</b>	<b>3.79</b>	<b>5.75</b>	<b>3.24</b>	<b>5.75</b>	<b>3.25</b>	<b>4.52</b>	<b>2.76</b>	<b>4.22</b>	<b>2.89</b>	<b>3.13</b>	<b>1.59</b>	<b>2.80</b>	<b>1.73</b>

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤		口腔癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
85年	161.70	155.99	34.20	32.85	33.97	33.64	18.02	17.08	19.47	18.18	5.19	4.70	6.11	5.84	5.88	6.16
86年	164.36	153.91	36.26	32.50	35.26	33.96	17.40	16.38	17.55	16.28	5.00	4.66	6.08	5.66	7.78	7.49
87年	165.22	148.86	36.97	31.79	35.28	32.90	16.87	15.20	17.49	15.13	5.06	4.30	5.68	5.32	5.68	5.23
88年	170.53	149.76	41.35	35.19	32.81	29.90	18.31	15.99	15.49	13.17	6.94	5.68	6.56	5.54	6.26	6.04
89年	179.93	153.80	39.26	32.31	32.99	29.86	20.16	16.82	16.65	13.60	7.10	5.68	6.95	5.93	7.18	6.62
90年	196.59	160.95	47.44	37.48	37.63	32.68	20.00	16.23	18.70	14.79	9.20	6.83	6.90	5.62	7.36	6.51
91年	193.72	154.72	45.20	34.72	37.82	32.06	21.91	17.15	17.76	13.19	8.15	5.70	7.46	5.76	6.30	5.62
92年	187.41	144.63	44.12	33.18	36.79	29.57	18.97	14.09	14.27	10.49	8.25	5.53	7.10	5.52	8.56	7.37
93年	201.24	149.63	46.47	33.20	38.40	30.08	23.74	17.23	15.36	10.60	9.46	5.88	7.06	5.28	9.46	7.95
94年	205.00	148.15	43.81	30.08	34.69	26.89	23.85	16.86	18.40	12.46	10.37	6.14	8.96	6.51	10.37	8.18
95年	210.37	146.09	47.46	31.25	40.43	30.73	24.67	17.02	18.73	11.98	10.07	5.68	8.74	6.09	11.47	9.00
96年	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		胃癌		口腔癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	17.11	10.69	9.02	6.44	9.73	5.35	8.95	6.11
98年	211.03	134.11	47.09	28.32	35.47	24.25	24.57	15.19	16.04	9.38	10.75	7.48	11.22	5.88	10.82	6.77
99年	219.66	137.29	48.91	29.60	35.12	23.28	26.24	15.97	15.62	8.91	11.02	7.70	11.41	5.86	9.99	6.41
100年	216.55	132.95	50.34	30.02	37.34	24.12	25.60	15.83	15.05	8.67	10.40	7.26	10.40	5.12	8.74	5.44
101年	229.30	138.02	49.42	28.92	37.08	24.29	28.97	16.89	15.85	8.46	11.40	7.44	13.74	6.72	9.60	5.89
<b>102年</b>	<b>221.64</b>	<b>130.87</b>	<b>47.37</b>	<b>26.87</b>	<b>37.67</b>	<b>23.37</b>	<b>27.80</b>	<b>16.17</b>	<b>14.68</b>	<b>7.83</b>	<b>13.59</b>	<b>9.10</b>	<b>12.04</b>	<b>5.87</b>	<b>9.55</b>	<b>5.59</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
85年	5.27	5.11	4.81	4.51	3.05	3.09	4.20	4.09	3.05	2.94	5.12	4.97	2.82	2.58	1.30	1.19
86年	6.93	6.52	4.47	3.94	2.62	2.49	4.08	3.97	3.16	2.95	4.93	4.81	3.16	3.31	0.92	0.86
87年	6.06	5.53	5.52	4.87	4.30	4.04	4.91	4.67	3.91	3.40	4.37	4.25	2.53	2.44	1.61	1.43
88年	6.26	5.88	5.57	4.66	3.97	3.50	3.74	3.61	3.66	3.12	4.12	3.78	2.06	1.89	1.91	1.78
89年	7.64	6.64	6.42	5.28	4.20	3.54	5.19	4.62	4.12	3.52	3.89	3.66	1.99	1.82	1.83	1.60
90年	7.05	6.06	5.44	4.27	3.99	3.21	4.75	4.16	4.68	4.03	4.68	3.42	2.15	1.80	2.76	2.35
91年	8.92	7.40	7.38	6.10	4.69	3.73	3.69	3.21	3.54	2.61	4.00	3.50	2.15	1.84	1.31	1.05
92年	7.40	5.96	6.63	5.08	4.01	2.99	5.09	4.35	3.16	2.26	4.16	3.52	1.62	1.34	2.55	2.01
93年	7.06	5.68	6.90	5.20	5.04	3.74	5.28	4.16	4.81	3.12	4.27	3.39	2.02	1.75	1.40	1.00
94年	9.04	7.40	8.03	5.72	5.46	4.02	4.60	3.50	3.51	2.20	4.60	3.67	2.49	2.11	1.56	1.04
95年	6.79	4.87	7.49	5.21	4.68	3.22	4.22	2.91	3.90	2.30	5.07	4.16	2.58	2.02	1.56	0.99
96年	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99
年別	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		腎臟癌		膽囊和其他膽道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	8.40	5.90	5.96	3.65	5.96	4.28	4.47	2.62	4.79	3.61	2.04	1.86	2.04	1.37	2.43	1.62
98年	8.61	5.89	6.08	3.83	5.06	3.61	4.42	2.44	3.87	2.83	2.77	2.07	3.00	2.05	3.00	1.81
99年	9.12	6.19	8.09	4.61	5.15	3.38	4.99	2.63	4.44	2.99	3.25	2.40	3.09	1.93	2.38	1.64
100年	8.19	5.30	7.40	4.35	4.96	3.26	4.18	2.13	3.31	2.41	3.31	2.45	3.78	2.13	2.52	1.41
101年	9.92	6.46	6.71	4.13	5.54	3.72	4.29	1.98	4.37	2.97	3.44	2.54	2.89	1.69	3.12	1.97
<b>102年</b>	<b>8.54</b>	<b>5.40</b>	<b>6.21</b>	<b>3.43</b>	<b>5.44</b>	<b>3.73</b>	<b>4.43</b>	<b>2.33</b>	<b>4.35</b>	<b>3.02</b>	<b>3.57</b>	<b>2.43</b>	<b>3.03</b>	<b>1.89</b>	<b>2.17</b>	<b>1.15</b>



表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
85年	95.32	102.11	15.05	16.32	11.46	12.60	11.69	11.54	10.39	11.19	7.71	8.31	7.79	8.16	4.05	4.52
86年	105.07	108.40	18.96	19.84	10.74	11.24	13.97	13.25	11.36	11.98	9.06	9.12	9.82	10.16	4.14	4.58
87年	101.48	100.73	18.78	18.93	13.53	13.74	12.47	11.87	9.73	9.98	7.53	7.45	7.75	7.32	4.71	4.70
88年	99.92	95.83	15.64	15.01	13.31	12.87	12.18	11.19	10.08	9.99	8.57	8.16	8.50	7.95	4.29	4.14
89年	103.56	96.02	17.76	16.76	14.84	13.81	12.66	11.48	9.74	9.23	8.24	7.39	7.27	6.51	3.37	3.15
90年	114.12	101.60	19.77	17.50	13.70	12.12	14.90	12.94	13.48	12.35	7.86	6.94	8.24	7.39	3.00	2.70
91年	123.33	105.00	22.51	19.16	15.33	12.92	14.36	12.05	12.64	11.00	10.70	8.90	7.85	6.60	5.61	4.83
92年	117.42	96.19	20.55	16.75	14.20	11.38	15.55	12.66	13.98	11.62	8.15	6.45	6.35	5.09	5.53	4.79
93年	120.38	94.63	21.04	16.41	15.87	12.42	15.20	11.80	13.62	10.67	8.46	6.55	6.51	4.90	4.27	3.40
94年	124.20	93.11	23.05	16.99	17.66	12.94	16.76	12.67	12.12	9.11	8.83	6.35	6.43	4.89	4.94	3.79
95年	128.65	92.46	22.48	15.97	16.08	11.23	15.56	11.37	13.70	9.88	9.16	6.31	6.03	4.26	4.69	3.44
96年	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		結腸、直腸和肛門癌		女性乳房癌		肝和肝內膽管癌		胃癌		胰臟癌		卵巢癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	130.86	87.54	24.78	16.27	17.31	11.20	16.87	11.66	15.76	10.79	6.95	4.47	5.77	3.76	4.29	2.96
98年	140.20	90.07	27.49	17.54	20.82	12.92	17.49	11.55	16.01	9.98	8.60	5.30	7.41	4.75	4.82	3.36
99年	137.69	85.62	27.60	16.36	17.68	10.57	19.68	12.87	14.87	9.27	8.14	4.62	6.29	3.86	4.88	3.21
100年	145.23	89.19	27.46	16.41	20.80	12.16	20.73	13.50	14.50	8.92	6.88	3.97	8.79	5.20	4.76	3.25
101年	147.98	88.40	27.87	16.31	20.05	11.11	17.59	10.88	16.07	9.11	9.12	5.32	7.89	4.57	6.37	4.09
<b>102年</b>	<b>148.32</b>	<b>86.24</b>	<b>27.15</b>	<b>15.36</b>	<b>19.61</b>	<b>10.93</b>	<b>18.96</b>	<b>11.90</b>	<b>15.44</b>	<b>8.66</b>	<b>9.05</b>	<b>4.87</b>	<b>7.76</b>	<b>4.29</b>	<b>6.11</b>	<b>3.79</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
85年	3.67	4.07	3.36	3.51	3.13	3.47	2.60	2.82	0.53	0.59	1.15	1.26	1.76	1.84	0.92	1.04
86年	3.91	4.15	2.76	2.82	2.84	3.08	3.15	3.26	0.00	0.00	1.15	1.22	2.38	2.48	0.92	0.91
87年	3.04	3.07	3.19	3.00	2.81	2.90	2.66	2.63	0.08	0.07	1.14	1.20	2.05	2.08	0.68	0.70
88年	3.68	3.64	3.08	2.90	3.16	3.12	2.03	1.96	1.50	1.46	1.35	1.25	0.90	0.86	1.13	1.09
89年	4.05	3.77	3.15	2.85	3.67	3.51	2.32	2.26	1.27	1.21	2.17	2.03	1.12	1.06	0.60	0.55
90年	3.97	3.50	4.19	3.62	4.04	3.59	2.62	2.46	1.20	1.12	1.12	0.98	1.65	1.63	0.82	0.73
91年	4.56	3.82	3.96	3.31	4.34	3.80	3.44	3.11	1.72	1.46	1.05	0.91	1.35	1.21	0.52	0.44
92年	4.48	3.58	3.66	3.05	3.66	2.97	3.21	3.00	1.20	0.99	1.12	0.88	1.72	1.44	0.60	0.48
93年	5.61	4.50	4.34	3.38	4.49	3.43	2.99	2.65	1.65	1.34	2.25	1.66	1.80	1.70	1.12	0.86
94年	4.86	3.55	3.74	2.76	3.74	2.88	3.07	2.58	1.65	1.33	1.57	1.20	1.87	1.63	0.75	0.52
95年	6.10	4.35	5.43	3.91	4.17	2.93	3.28	2.52	1.86	1.41	2.38	1.62	1.64	1.30	0.74	0.56
96年	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94
年別	子宮頸及部位未明示子宮癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		子宮體癌		腦癌		口腔癌		膀胱癌		膽囊和其他膽道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	5.55	3.62	4.07	2.73	3.33	2.61	2.07	1.42	1.70	1.32	1.18	0.74	1.70	1.05	2.59	1.68
98年	5.11	3.31	3.11	1.96	3.11	2.22	1.70	1.15	1.56	1.21	0.89	0.53	1.78	1.03	2.59	1.67
99年	5.25	3.39	3.70	2.25	3.11	2.19	2.15	1.46	2.07	1.75	0.89	0.57	2.37	1.32	1.63	1.02
100年	5.42	3.23	4.03	2.32	3.59	2.67	2.49	1.67	2.05	1.50	1.54	0.92	1.83	1.03	2.49	1.52
101年	4.56	2.87	4.42	2.61	2.82	2.11	2.53	1.53	2.03	1.84	1.67	0.93	2.17	1.16	2.68	1.48
<b>102年</b>	<b>5.75</b>	<b>3.25</b>	<b>5.32</b>	<b>3.09</b>	<b>3.09</b>	<b>2.15</b>	<b>2.80</b>	<b>1.73</b>	<b>2.08</b>	<b>1.26</b>	<b>2.01</b>	<b>1.22</b>	<b>1.94</b>	<b>0.96</b>	<b>1.80</b>	<b>0.98</b>

肆、歷年死因統計

二、行政區別死因統計



表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		797	375.45		837	397.63		832	400.24		838	404.81		894	430.00		901	434.30
08-14	惡性腫瘤	1	224	105.52	1	254	120.67	1	256	123.15	1	261	126.08	1	249	119.77	1	309	148.95
25-27-28*	心臟疾病	3	91	42.87	2	104	49.41	2	85	40.89	2	93	44.93	2	91	43.77	3	75	36.15
29	腦血管疾病	2	103	48.52	3	99	47.03	3	83	39.93	3	92	44.44	4	82	39.44	2	104	50.13
181	糖尿病	4	42	19.79	5	41	19.48	4	57	27.42	4	47	22.70	4	82	39.44	4	64	30.85
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.25	8	19	9.03	7	22	10.58	7	23	11.11	7	25	12.02	6	31	14.94
321	肺炎	6	27	12.72	6	32	15.20	8	20	9.62	7	23	11.11	6	29	13.95	9	16	7.71
E54	自殺	10	17	8.01	11	15	7.13	10	13	6.25	6	24	11.59	10	12	5.77	10	14	6.75
E47-E53	事故傷害	5	30	14.13	4	50	23.75	5	47	22.61	4	47	22.70	3	89	42.81	5	39	18.80
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	9.89	8	19	9.03	9	19	9.14	10	17	8.21	8	23	11.06	7	23	11.09
038	敗血症	12	7	3.30	13	7	3.33	13	9	4.33	14	5	2.42	14	4	1.92	13	5	2.41
	其他		209	98.45		197	93.59		221	106.31		206	99.51		208	100.05		221	106.53

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
01-56	所有死亡原因		913	442.84		938	457.20		936	455.61		960	466.52		1,024	494.61		963	461.29		1,011	480.96
08-14	惡性腫瘤	1	299	145.03	1	280	136.48	1	307	149.43	1	304	147.73	1	313	151.18	1	345	165.26	1	332	157.94
25-27-28*	心臟疾病	3	89	43.17	2	121	58.98	2	92	44.78	2	101	49.08	2	134	64.72	2	104	49.82	2	108	51.38
29	腦血管疾病	2	96	46.56	3	88	42.89	4	66	32.13	3	81	39.36	3	91	43.95	3	73	34.97	3	86	40.91
181	糖尿病	4	56	27.16	4	63	30.71	3	79	38.45	4	62	30.13	4	67	32.36	4	65	31.14	4	79	37.58
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.61	5	37	18.03	7	29	14.12	7	27	13.12	7	33	15.94	8	26	12.45	5	41	19.50
321	肺炎	5	39	18.92	6	34	16.57	6	31	15.09	5	42	20.41	5	41	19.80	7	28	13.41	6	37	17.60
E54	自殺	9	20	9.70	7	24	11.70	9	19	9.25	9	18	8.75	9	20	9.66	6	30	14.37	7	29	13.80
E47-E53	事故傷害	6	34	16.49	8	23	11.21	5	41	19.96	6	38	18.47	6	35	16.91	5	34	16.29	8	26	12.37
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	10.19	10	13	6.34	8	23	11.20	8	20	9.72	8	22	10.63	8	26	12.45	9	17	8.09
038	敗血症	12	7	3.40	11	9	4.39	11	10	4.87	12	9	4.37	11	10	4.83	15	3	1.44	10	14	6.66
	其他		226	109.62		246	119.91		239	116.34		258	125.38		258	124.62		229	109.69		242	115.13

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,057	502.04		1,044	499.41		1,085	521.10		1,218	582.24		1,189	565.04		1,239	588.25
C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34	1	331	158.34	1	352	169.06	1	386	184.52	1	369	175.36	1	389	184.69
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	140	66.50	2	124	59.32	2	145	69.64	2	165	78.88	2	160	76.04	2	139	65.99
I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32	3	78	37.31	3	70	33.62	3	87	41.59	3	92	43.72	3	95	45.10
E10-E14	糖尿病	5	63	29.92	4	48	22.96	4	56	26.90	5	73	34.90	4	47	22.34	4	70	33.23
J12-J18	肺炎	4	49	23.27	5	72	34.44	5	59	28.34	4	50	23.90	5	53	25.19	5	68	32.29
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	31	14.72	10	21	10.05	7	30	14.41	7	36	17.21	10	29	13.78	6	50	23.74
I10-I15	高血壓性疾病	7	37	17.57	6	34	16.26	8	28	13.45	8	32	15.30	7	37	17.58	7	46	21.84
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	27	12.82	8	33	15.79	6	32	15.37	9	29	13.86	8	33	15.68	8	39	18.52
A40-A41	敗血症	6	46	21.85	6	34	16.26	8	28	13.45	6	42	20.08	6	38	18.06	9	34	16.14
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	22	10.45	11	20	9.57	11	24	11.53	10	21	10.04	9	32	15.21	10	25	11.87
	其他		249	118.27		249	119.11		261	125.35		297	141.98		299	142.09		284	134.84

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,176	479.31		1,172	484.31		1,208	503.23		1,305	541.06		1,230	507.83		1,239	513.88
08-14	惡性腫瘤	1	303	123.50	1	306	126.45	1	327	136.22	1	371	153.82	1	343	141.61	1	351	145.58
25-27-28*	心臟疾病	2	121	49.32	2	135	55.79	2	159	66.24	2	141	58.46	2	145	59.87	2	132	54.75
29	腦血管疾病	3	120	48.91	3	128	52.89	3	134	55.82	3	134	55.56	3	108	44.59	3	124	51.43
181	糖尿病	5	59	24.05	4	71	29.34	4	93	38.74	4	67	27.78	4	89	36.75	4	92	38.16
321	肺炎	6	48	19.56	6	47	19.42	8	30	12.50	8	38	15.75	5	63	26.01	8	30	12.44
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	33	13.45	7	45	18.60	6	33	13.75	7	46	19.07	7	45	18.58	7	36	14.93
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.67	9	31	12.81	7	31	12.91	6	51	21.14	8	36	14.86	6	39	16.18
E54	自殺	11	16	6.52	10	30	12.40	12	16	6.67	9	26	10.78	10	26	10.73	9	21	8.71
E47-E53	事故傷害	4	81	33.01	5	63	26.03	5	57	23.75	5	56	23.22	6	58	23.95	5	54	22.40
26	高血壓性疾病	8	34	13.86	8	34	14.05	9	29	12.08	10	25	10.37	9	29	11.97	10	17	7.05
	其他		325	132.46		282	116.53		299	124.56		350	145.11		288	118.91		343	142.26

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,355	567.15		1,308	550.86		1,353	573.36		1,331	569.90		1,366	589.70		1,271	549.91		1,363	592.17
08-14	惡性腫瘤	1	410	171.61	1	383	161.30	1	367	155.52	1	373	159.71	1	430	185.63	1	401	173.50	1	427	185.51
25-27-28*	心臟疾病	2	151	63.20	2	161	67.80	2	166	70.35	2	178	76.22	3	159	68.64	2	134	57.98	2	167	72.55
29	腦血管疾病	3	141	59.02	3	111	46.75	3	128	54.24	3	115	49.24	2	163	70.37	3	105	45.43	3	133	57.78
181	糖尿病	4	90	37.67	5	52	21.90	4	106	44.92	4	74	31.69	4	80	34.54	3	105	45.43	4	76	33.02
321	肺炎	6	41	17.16	4	73	30.74	5	52	22.04	6	52	22.27	5	51	22.02	5	61	26.39	5	65	28.24
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	35	14.65	7	43	18.11	6	50	21.19	5	59	25.26	6	50	21.58	6	45	19.47	6	40	17.38
347	慢性肝病及肝硬化	8	34	14.23	9	25	10.53	9	32	13.56	9	32	13.70	8	31	13.38	9	23	9.95	7	29	12.60
E54	自殺	9	31	12.98	8	36	15.16	7	39	16.53	8	35	14.99	7	45	19.43	7	40	17.31	8	27	11.73
E47-E53	事故傷害	5	49	20.51	6	44	18.53	8	37	15.68	7	39	16.70	9	27	11.66	8	28	12.11	9	24	10.43
26	高血壓性疾病	12	12	5.02	10	20	8.42	10	15	6.36	10	21	8.99	10	18	7.77	10	17	7.36	10	15	6.52
	其他		361	151.10		360	151.61		361	152.98		353	151.15		312	134.69		312	134.99		360	156.40

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77		1,357	598.94		1,336	593.18		1,382	612.00		1,513	666.12		1,425	624.68
C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88	1	437	192.88	1	424	188.25	1	441	195.29	1	455	200.32	1	447	195.95
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	2	181	79.28	2	142	62.67	2	143	63.49	2	147	65.10	2	184	81.01	2	172	75.40
I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37	3	111	48.99	4	82	36.41	3	93	41.18	3	99	43.59	3	103	45.15
J12-J18	肺炎	4	87	38.10	5	74	32.66	3	93	41.29	4	87	38.53	4	94	41.38	4	76	33.32
E10-E14	糖尿病	5	51	22.34	4	81	35.75	5	56	24.86	7	49	21.70	5	63	27.74	5	70	30.69
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	45	19.71	6	49	21.63	7	42	18.65	6	57	25.24	6	59	25.98	6	49	21.48
A40-A41	敗血症	6	47	20.59	7	48	21.19	9	36	15.98	5	66	29.23	7	54	23.77	6	49	21.48
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	6	47	20.59	9	42	18.54	6	45	19.98	9	36	15.94	8	52	22.89	6	49	21.48
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	34	14.89	10	34	15.01	10	35	15.54	11	26	11.51	10	33	14.53	9	33	14.47
I10-I15	高血壓性疾病	9	41	17.96	8	44	19.42	12	32	14.21	8	40	17.71	9	47	20.69	10	29	12.71
	其他		297	130.08		295	130.20		348	154.51		340	150.56		373	164.22		348	152.55

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,416	424.70		1,431	442.54		1,435	454.53		1,414	446.61		1,471	462.50		1,448	456.72
08-14	惡性腫瘤	1	410	122.97	1	455	140.71	1	444	140.64	1	410	129.50	1	438	137.71	1	409	129.00
25-27-28*	心臟疾病	2	184	55.19	2	154	47.63	2	176	55.75	2	181	57.17	2	177	55.65	3	151	47.63
29	腦血管疾病	3	169	50.69	3	148	45.77	3	143	45.29	3	140	44.22	3	151	47.48	2	157	49.52
181	糖尿病	5	74	22.19	5	74	22.88	4	85	26.92	5	65	20.53	4	102	32.07	4	112	35.33
321	肺炎	6	49	14.70	6	43	13.30	9	35	11.09	8	42	13.27	7	43	13.52	8	35	11.04
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	45	13.50	8	41	12.68	7	49	15.52	6	54	17.06	6	49	15.41	6	54	17.03
E47-E53	事故傷害	4	80	23.99	4	79	24.43	5	57	18.05	4	70	22.11	5	66	20.75	5	62	19.56
E54	自殺	9	24	7.20	13	10	3.09	10	28	8.87	13	13	4.11	11	13	4.09	10	21	6.62
038	敗血症	12	10	3.00	11	16	4.95	12	15	4.75	11	15	4.74	16	5	1.57	14	9	2.84
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.60	9	37	11.44	8	37	11.72	9	29	9.16	8	39	12.26	7	38	11.99
	其他		349	104.68		374	115.66		366	115.93		395	124.76		388	121.99		400	126.17

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率						
01-56	所有死亡原因		1,507	476.30		1,509	477.89		1,570	499.42		1,584	506.42		1,638	524.39		1,546	493.66		1,598	508.03
08-14	惡性腫瘤	1	481	152.02	1	514	162.78	1	488	155.23	1	527	168.49	1	501	160.39	1	495	158.06	1	473	150.37
25-27-28*	心臟疾病	2	179	56.57	2	158	50.04	2	198	62.98	2	210	67.14	2	225	72.03	2	174	55.56	2	194	61.68
29	腦血管疾病	3	151	47.72	3	122	38.64	3	139	44.22	3	126	40.28	3	142	45.46	3	121	38.64	3	145	46.10
181	糖尿病	4	89	28.13	4	111	35.15	4	114	36.26	4	107	34.21	4	106	33.94	4	105	33.53	4	118	37.51
321	肺炎	6	45	14.22	7	57	18.05	5	76	24.18	6	51	16.31	5	89	28.49	6	46	14.69	5	78	24.80
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	5	54	17.07	5	60	19.00	7	54	17.18	5	63	20.14	6	78	24.97	5	58	18.52	6	61	19.39
E47-E53	事故傷害	7	44	13.91	6	58	18.37	6	62	19.72	7	43	13.75	7	44	14.09	8	37	11.81	7	37	11.76
E54	自殺	9	24	7.59	8	37	11.72	10	23	7.32	8	35	11.19	8	40	12.81	7	40	12.77	8	36	11.45
038	敗血症	12	14	4.42	12	10	3.17	12	9	2.86	12	11	3.52	14	6	1.92	11	22	7.02	9	25	7.95
347	慢性肝病及肝硬化	8	35	11.06	9	30	9.50	8	37	11.77	9	25	7.99	9	30	9.60	8	37	11.81	10	22	6.99
	其他		391	123.58		382	120.98		370	117.70		386	123.41		377	120.69		411	131.24		409	130.03

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51		1,667	533.05		1,779	570.95		1,816	580.74		1,818	579.65		1,846	589.03
C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36	1	549	175.55	1	572	183.58	1	544	173.97	1	580	184.93	1	582	185.71
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	237	75.39	2	200	63.95	2	213	68.36	2	233	74.51	2	210	76.04	2	269	85.83
I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67	3	115	36.77	3	129	41.40	3	129	41.25	3	153	43.72	3	136	43.40
J12-J18	肺炎	4	92	29.26	4	98	31.34	4	108	34.66	4	100	31.98	4	96	25.19	4	89	28.40
E10-E14	糖尿病	5	74	23.54	5	75	23.98	5	78	25.03	5	79	25.26	6	70	22.34	5	87	27.76
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	63	20.04	6	56	17.91	7	48	15.40	6	72	23.02	7	68	18.06	6	72	22.97
A40-A41	敗血症	8	54	17.18	10	41	13.11	6	57	18.29	7	59	18.87	5	72	17.58	7	56	17.87
I10-I15	高血壓性疾病	9	45	14.31	8	48	15.35	9	45	14.44	10	43	13.75	8	67	15.68	8	46	14.68
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	45	14.31	11	38	12.15	11	43	13.80	8	55	17.59	10	46	15.21	9	44	14.04
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	55	17.49	7	49	15.67	9	45	14.44	9	51	16.31	9	60	13.78	10	43	13.72
	其他		418	132.96		398	127.27		441	141.53		451	144.23		396	126.26		422	134.65

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		987	440.48		972	444.28		1,037	484.33		989	462.79		949	441.58		1,017	472.82
08-14	惡性腫瘤	1	289	128.97	1	281	128.44	1	323	150.86	1	302	141.32	1	293	136.34	1	325	151.10
25-27-28*	心臟疾病	2	124	55.34	3	120	54.85	3	106	49.51	3	96	44.92	2	99	46.07	3	88	40.91
29	腦血管疾病	3	106	47.31	2	129	58.96	2	111	51.84	2	105	49.13	3	91	42.34	2	99	46.03
181	糖尿病	5	47	20.98	5	46	21.03	5	64	29.89	4	56	26.20	4	59	27.45	3	88	40.91
321	肺炎	7	32	14.28	9	17	7.77	8	30	14.01	8	26	12.17	8	29	13.49	9	17	7.90
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	25	11.16	6	29	13.26	6	37	17.28	7	34	15.91	7	33	15.36	5	52	24.18
E47-E53	事故傷害	4	64	28.56	4	63	28.80	4	75	35.03	5	49	22.93	5	49	22.80	6	46	21.39
E54	自殺	10	20	8.93	9	17	7.77	10	17	7.94	11	17	7.95	9	22	10.24	8	25	11.62
347	慢性肝病及肝硬化	6	37	16.51	8	22	10.06	7	32	14.95	6	39	18.25	6	38	17.68	7	28	13.02
038	敗血症	15	4	1.79	11	13	5.94	13	13	6.07	13	8	3.74	15	5	2.33	13	10	4.65
	其他		239	106.66		235	107.41		229	106.95		257	120.26		231	107.49		239	111.12

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
01-56	所有死亡原因		1,074	497.71		1,045	482.00		1,114	512.69		1,123	517.67		1,178	543.14		1,106	506.77		1,230	561.56
08-14	惡性腫瘤	1	349	161.73	1	359	165.59	1	354	162.92	1	370	170.56	1	374	172.44	1	351	160.83	1	384	175.32
25-27-28*	心臟疾病	2	110	50.98	2	114	52.58	2	120	55.23	2	154	70.99	2	146	67.32	2	138	63.23	2	147	67.11
29	腦血管疾病	3	104	48.20	3	87	40.13	3	104	47.86	3	83	38.26	3	102	47.03	3	105	48.11	3	109	49.76
181	糖尿病	4	100	46.34	4	82	37.82	4	58	26.69	4	71	32.73	4	91	41.96	4	71	32.53	4	86	39.26
321	肺炎	7	25	11.59	8	26	11.99	7	35	16.11	5	35	16.13	5	49	22.59	6	48	21.99	5	67	30.59
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	5	52	24.10	6	31	14.30	5	57	26.23	7	31	14.29	7	36	16.60	7	27	12.37	6	44	20.09
E47-E53	事故傷害	6	38	17.61	5	41	18.91	6	36	16.57	9	27	12.45	8	33	15.22	8	23	10.54	7	31	14.15
E54	自殺	7	25	11.59	7	27	12.45	9	27	12.43	5	35	16.13	6	44	20.29	5	49	22.45	8	29	13.24
347	慢性肝病及肝硬化	9	23	10.66	9	23	10.61	8	30	13.81	8	30	13.83	9	27	12.45	9	22	10.08	9	23	10.50
038	敗血症	12	8	3.71	12	6	2.77	13	7	3.22	12	5	2.30	10	15	6.92	11	11	5.04	10	21	9.59
	其他		240	111.22		249	114.85		286	131.62		282	129.99		261	120.34		261	119.59		289	131.94

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,264	578.06		1,192	545.43		1,261	575.31		1,341	603.74		1,412	626.50		1,350	592.87
C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70	1	417	190.81	1	402	183.41	1	418	188.19	1	430	190.79	1	412	180.94
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	167	76.37	2	143	65.43	2	145	66.15	2	156	70.23	2	153	67.89	2	173	75.98
I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22	3	96	43.93	3	89	40.60	3	101	45.47	3	96	42.59	3	88	38.65
J12-J18	肺炎	4	70	32.01	4	76	34.78	4	73	33.31	4	73	32.87	4	78	34.61	4	76	33.38
E10-E14	糖尿病	5	69	31.56	5	47	21.51	5	63	28.74	5	66	29.71	5	75	33.28	5	65	28.55
I10-I15	高血壓性疾病	11	25	11.43	11	28	12.81	12	30	13.69	7	37	16.66	7	54	23.96	6	57	25.03
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	30	13.72	10	29	13.27	11	31	14.14	7	37	16.66	9	46	20.41	7	52	22.84
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	18	8.23	11	28	12.81	9	34	15.51	11	31	13.96	10	38	16.86	7	52	22.84
A40-A41	敗血症	7	37	16.92	7	36	16.47	7	42	19.16	6	61	27.46	8	51	22.63	9	36	15.81
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	36	16.46	6	39	17.85	6	46	20.99	9	35	15.76	6	59	26.18	10	33	14.49
	其他		318	145.43		253	115.77		306	139.61		326	146.77		332	147.31		306	134.38



表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		786	454.91		821	486.17		778	468.89		802	483.88		840	506.24		917	558.44
08-14	惡性腫瘤	1	244	141.22	1	210	124.35	1	242	145.85	1	227	136.96	1	247	148.86	1	275	167.47
25-27-28*	心臟疾病	3	77	44.57	2	100	59.22	2	103	62.08	2	101	60.94	2	111	66.90	2	97	59.07
29	腦血管疾病	2	86	49.77	3	97	57.44	3	69	41.59	3	80	48.27	3	66	39.78	3	88	53.59
181	糖尿病	4	39	22.57	4	49	29.02	4	47	28.33	5	38	22.93	4	44	26.52	4	66	40.19
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	20	11.58	6	30	17.76	6	24	14.46	7	27	16.29	6	31	18.68	6	30	18.27
321	肺炎	7	27	15.63	8	27	15.99	9	18	10.85	8	25	15.08	7	28	16.87	8	24	14.62
E47-E53	事故傷害	5	32	18.52	5	45	26.65	5	40	24.11	4	46	27.75	5	37	22.30	5	38	23.14
E54	自殺	11	8	4.63	10	13	7.70	15	5	3.01	12	5	3.02	11	11	6.63	11	10	6.09
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	15.63	9	25	14.80	7	21	12.66	6	33	19.91	7	28	16.87	7	27	16.44
26	高血壓性疾病	6	30	17.36	7	28	16.58	8	19	11.45	9	14	8.45	9	19	11.45	9	20	12.18
	其他		196	113.44		197	116.66		190	114.51		206	124.29		218	131.38		242	147.37

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率						
01-56	所有死亡原因		864	532.14		905	559.60		870	541.37		858	539.48		892	564.88		843	533.65		874	549.53
08-14	惡性腫瘤	1	267	164.45	1	288	178.08	1	245	152.45	1	245	154.05	1	282	178.58	1	267	169.02	1	258	162.22
25-27-28*	心臟疾病	2	111	68.37	2	101	62.45	2	111	69.07	2	113	71.05	2	102	64.59	2	80	50.64	2	86	54.07
29	腦血管疾病	3	94	57.90	3	88	54.41	3	73	45.43	3	89	55.96	3	88	55.73	3	62	39.25	3	75	47.16
181	糖尿病	4	58	35.72	4	62	38.34	4	64	39.82	4	59	37.10	4	58	36.73	4	53	33.55	4	58	36.47
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	5	32	19.71	7	25	15.46	6	32	19.91	5	34	21.38	7	23	14.57	6	31	19.62	5	52	32.70
321	肺炎	6	26	16.01	5	34	21.02	5	56	34.85	6	24	15.09	5	30	19.00	5	51	32.28	6	38	23.89
E47-E53	事故傷害	7	22	13.55	6	29	17.93	8	16	9.96	8	21	13.20	6	24	15.20	8	25	15.83	7	25	15.72
E54	自殺	9	12	7.39	8	20	12.37	7	18	11.20	7	22	13.83	8	19	12.03	9	24	15.19	8	22	13.83
347	慢性肝病及肝硬化	8	19	11.70	10	12	7.42	9	15	9.33	8	21	13.20	9	18	11.40	7	26	16.46	9	17	10.69
26	高血壓性疾病	10	10	6.16	9	17	10.51	10	14	8.71	10	11	6.92	10	10	6.33	10	14	8.86	10	10	6.29
	其他		213	131.19		229	141.60		226	140.63		219	137.70		238	150.72		210	132.94		233	146.50

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		957	600.33		897	563.99		885	556.10		957	596.29		999	617.42		892	548.43
C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07	1	276	173.54	1	278	174.68	1	263	163.87	1	305	188.50	1	248	152.48
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	127	79.67	2	116	72.94	2	103	64.72	2	118	73.52	2	129	79.73	2	121	74.39
J12-J18	肺炎	4	70	43.91	4	49	30.81	4	51	32.05	4	52	32.40	4	71	43.88	3	76	46.73
I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54	3	58	36.47	3	56	35.19	3	54	33.65	3	73	45.12	4	57	35.05
E10-E14	糖尿病	7	30	18.82	5	46	28.92	7	32	20.11	5	38	23.68	7	39	24.10	5	47	28.90
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	35	21.96	6	31	19.49	10	18	11.31	6	31	19.32	8	32	19.78	6	31	19.06
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	22	13.80	8	27	16.98	9	21	13.20	8	30	18.69	8	32	19.78	6	31	19.06
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	13.17	9	23	14.46	13	15	9.43	8	30	18.69	10	24	14.83	8	24	14.76
I10-I15	高血壓性疾病	10	19	11.92	10	21	13.20	5	41	25.76	10	27	16.82	5	42	25.96	9	23	14.14
A40-A41	敗血症	5	41	25.72	6	31	19.49	6	36	22.62	6	31	19.32	5	42	25.96	10	21	12.91
	其他		218	136.75		219	137.70		234	147.04		283	176.33		210	129.79		213	130.96

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		733	536.47		711	528.07		756	564.51		778	580.11		775	578.22		747	561.24
08-14	惡性腫瘤	1	230	168.33	1	194	144.09	1	232	173.24	1	204	152.11	1	223	166.38	1	201	151.02
25-27-28*	心臟疾病	2	73	53.43	2	88	65.36	2	111	82.88	2	96	71.58	2	91	67.89	4	68	51.09
29	腦血管疾病	3	72	52.70	3	84	62.39	3	89	66.46	3	94	70.09	3	87	64.91	2	101	75.88
181	糖尿病	4	48	35.13	5	43	31.94	5	39	29.12	4	54	40.26	4	48	35.81	3	69	51.84
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	30	21.96	6	30	22.28	7	26	19.41	6	31	23.12	8	23	17.16	6	26	19.53
321	肺炎	8	22	16.10	9	15	11.14	8	17	12.69	8	17	12.68	7	24	17.91	8	24	18.03
E47-E53	事故傷害	5	47	34.40	4	46	34.17	4	42	31.36	5	53	39.52	5	33	24.62	5	37	27.80
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.30	7	21	15.60	6	28	20.91	7	19	14.17	6	30	22.38	7	25	18.78
E54	自殺	11	10	7.32	12	7	5.20	13	7	5.23	10	11	8.20	14	6	4.48	9	13	9.77
038	敗血症	10	12	8.78	11	9	6.68	13	7	5.23	9	13	9.69	16	2	1.49	12	4	3.01
	其他		164	120.03		174	129.23		158	117.98		186	138.69		208	155.19		179	134.49

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		749	567.34		811	618.09		812	623.38		766	593.91		867	679.14		802	632.16		810	640.19
08-14	惡性腫瘤	1	223	168.92	1	250	190.53	1	242	185.78	1	205	158.94	1	228	178.60	1	273	215.19	1	259	204.70
25-27-28*	心臟疾病	3	73	55.30	2	93	70.88	2	97	74.47	2	89	69.01	2	95	74.42	2	96	75.67	2	94	74.29
29	腦血管疾病	2	88	66.66	3	69	52.59	3	80	61.42	3	73	56.60	3	89	69.72	4	55	43.35	3	68	53.74
181	糖尿病	4	51	38.63	4	62	47.25	4	56	42.99	4	60	46.52	4	63	49.35	3	56	44.14	4	50	39.52
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	5	36	27.27	5	29	22.10	5	42	32.24	5	33	25.59	5	42	32.90	6	25	19.71	5	35	27.66
321	肺炎	9	15	11.36	6	27	20.58	6	26	19.96	6	32	24.81	7	25	19.58	5	29	22.86	6	29	22.92
E47-E53	事故傷害	6	29	21.97	8	19	14.48	7	24	18.42	8	20	15.51	8	24	18.80	8	20	15.76	7	24	18.97
347	慢性肝病及肝硬化	7	24	18.18	7	21	16.00	8	22	16.89	7	21	16.28	9	22	17.23	10	10	7.88	7	24	18.97
E54	自殺	8	17	12.88	8	19	14.48	9	15	11.52	9	19	14.73	6	30	23.50	7	22	17.34	9	18	14.23
038	敗血症	11	11	8.33	12	6	4.57	12	5	3.84	12	6	4.65	10	18	14.10	9	11	8.67	10	13	10.27
	其他		182	137.86		216	164.62		203	155.84		208	161.27		231	180.95		205	161.59		196	154.91

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		893	712.18		859	692.60		806	650.00		859	683.81		926	725.00		889	687.47
C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93	1	255	205.60	1	255	205.65	1	244	194.24	1	288	225.49	1	282	218.07
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	118	94.11	2	105	84.66	2	83	66.94	2	98	78.01	2	142	111.18	2	125	96.66
I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84	3	84	67.73	3	58	46.77	3	61	48.56	3	65	50.89	3	59	45.63
E10-E14	糖尿病	5	55	43.86	4	58	46.76	5	43	34.68	5	48	38.21	4	41	32.10	4	49	37.89
J12-J18	肺炎	4	61	48.65	5	41	33.06	4	49	39.52	4	56	44.58	5	40	31.32	5	47	36.35
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	26	20.74	7	27	21.77	8	23	18.55	8	25	19.90	7	30	23.49	6	32	24.75
A40-A41	敗血症	6	32	25.52	6	32	25.80	6	32	25.81	6	39	31.05	6	34	26.62	7	29	22.43
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	23	18.34	8	26	20.96	7	28	22.58	7	26	20.70	8	25	19.57	8	25	19.33
I10-I15	高血壓性疾病	9	21	16.75	11	17	13.71	12	15	12.10	9	22	17.51	12	15	11.74	9	20	15.47
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	16.75	8	26	20.96	10	17	13.71	10	20	15.92	10	21	16.44	10	16	12.37
	其他		204	162.69		188	151.58		203	163.71		220	175.13		225	176.16		205	158.53

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,094	506.93		1,218	573.08		1,227	584.91		1,186	567.13		1,283	614.28		1,269	611.86
08-14	惡性腫瘤	1	270	125.11	1	317	149.15	1	322	153.50	1	301	143.94	1	366	175.24	1	332	160.08
25-27-28*	心臟疾病	2	136	63.02	2	151	71.05	2	167	79.61	2	128	61.21	2	145	69.42	3	123	59.31
29	腦血管疾病	3	127	58.85	3	132	62.11	3	131	62.45	3	123	58.82	3	127	60.81	2	129	62.20
181	糖尿病	5	57	26.41	5	63	29.64	4	83	39.57	4	72	34.43	4	100	47.88	4	106	51.11
321	肺炎	8	30	13.90	10	23	10.82	10	24	11.44	9	25	11.95	8	29	13.88	9	26	12.54
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	35	16.22	7	35	16.47	7	33	15.73	6	46	22.00	7	45	21.55	6	49	23.63
347	慢性肝病及肝硬化	6	43	19.93	6	54	25.41	6	47	22.40	7	45	21.52	6	49	23.46	7	34	16.39
E54	自殺	11	19	8.80	9	27	12.70	8	27	12.87	11	20	9.56	11	16	7.66	8	29	13.98
E47-E53	事故傷害	4	73	33.83	4	89	41.88	5	71	33.85	5	67	32.04	5	65	31.12	5	64	30.86
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	9	24	11.12	11	19	8.94	11	23	10.96	9	25	11.95	10	22	10.53	13	14	6.75
	其他		280	129.74		308	144.92		299	142.53		334	159.72		319	152.73		363	175.02

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率						
01-56	所有死亡原因		1,344	654.21		1,335	655.25		1,389	688.11		1,391	699.50		1,454	741.48		1,428	733.02		1,493	770.88
08-14	惡性腫瘤	1	377	183.51	1	386	189.46	1	388	192.21	1	414	208.19	1	431	219.79	1	427	219.19	1	458	236.48
25-27-28*	心臟疾病	3	149	72.53	2	153	75.10	2	147	72.82	2	160	80.46	2	142	72.41	2	149	76.48	2	160	82.61
29	腦血管疾病	2	152	73.99	3	133	65.28	3	134	66.38	3	125	62.86	3	139	70.88	3	138	70.84	3	126	65.06
181	糖尿病	4	100	48.68	4	88	43.19	4	108	53.50	4	92	46.26	4	113	57.63	4	119	61.08	4	109	56.28
321	肺炎	8	34	16.55	5	55	27.00	5	73	36.16	8	43	21.62	5	60	30.60	6	49	25.15	5	87	44.92
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	5	55	26.77	7	46	22.58	7	54	26.75	6	54	27.16	7	45	22.95	5	58	29.77	6	63	32.53
347	慢性肝病及肝硬化	7	43	20.93	8	43	21.11	8	53	26.26	7	53	26.65	9	28	14.28	8	35	17.97	7	42	21.69
E54	自殺	9	32	15.58	9	28	13.74	9	30	14.86	9	33	16.59	6	58	29.58	6	49	25.15	8	37	19.10
E47-E53	事故傷害	6	50	24.34	6	52	25.52	6	57	28.24	5	60	30.17	8	37	18.87	9	32	16.43	9	34	17.56
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	22	10.71	12	12	5.89	10	13	6.44	13	11	5.53	11	16	8.16	13	7	3.59	10	14	7.23
	其他		330	160.63		339	166.39		332	164.47		346	174.00		385	196.33		365	187.36		363	187.43



表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68		1,552	819.43		1,525	807.87		1,578	830.63		1,616	842.80		1,616	842.80
C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83	1	419	221.23	1	446	236.27	1	426	224.24	1	448	233.65	1	448	233.65
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	203	106.05	2	175	92.40	2	167	88.47	2	185	97.38	2	207	107.96	2	207	107.96
I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29	3	118	62.30	3	114	60.39	3	116	61.06	3	121	63.11	3	121	63.11
E10-E14	糖尿病	5	88	45.97	4	105	55.44	5	86	45.56	5	108	56.85	5	90	46.94	4	102	53.20
J12-J18	肺炎	3	111	57.99	5	95	50.16	4	107	56.68	4	110	57.90	4	102	53.20	5	90	46.94
I10-I15	高血壓性疾病	11	39	20.37	11	43	22.70	7	49	25.96	7	57	30.00	7	61	31.81	6	66	34.42
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	50	26.12	8	52	27.46	10	39	20.66	6	62	32.64	6	66	34.42	7	61	31.81
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	61	31.87	9	47	24.82	8	48	25.43	8	50	26.32	9	43	22.43	8	58	30.25
A40-A41	敗血症	9	46	24.03	6	60	31.68	6	60	31.79	9	44	23.16	8	58	30.25	9	43	22.43
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	45	23.51	12	32	16.90	11	33	17.48	12	34	17.90	9	43	22.43	9	43	22.43
	其他		363	189.64		406	214.36		376	199.19		386	203.18		377	196.62		377	195.28

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,041	461.94		1,086	474.55		1,057	454.28		1,125	469.43		1,130	458.85		1,174	467.98
08-14	惡性腫瘤	1	274	121.59	1	282	123.23	1	279	119.91	1	305	127.27	1	312	126.69	1	336	133.94
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.16	3	108	47.19	2	132	56.73	3	112	46.73	2	124	50.35	3	101	40.26
29	腦血管疾病	2	121	53.69	2	129	56.37	3	113	48.57	2	118	49.24	3	123	49.95	2	122	48.63
181	糖尿病	5	70	31.06	5	60	26.22	4	62	26.65	5	61	25.45	4	79	32.08	4	81	32.29
321	肺炎	8	30	13.31	7	28	12.24	8	31	13.32	8	29	12.10	7	35	14.21	8	34	13.55
E54	自殺	12	11	4.88	11	19	8.30	10	20	8.60	11	14	5.84	10	21	8.53	9	22	8.77
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	43	19.08	6	37	16.17	6	40	17.19	6	43	17.94	6	42	17.05	6	43	17.14
E47-E53	事故傷害	4	88	39.05	4	84	36.71	5	58	24.93	4	63	26.29	5	61	24.77	5	70	27.90
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	12.87	8	27	11.80	7	33	14.18	7	37	15.44	8	33	13.40	7	36	14.35
038	敗血症	14	9	3.99	12	15	6.55	13	13	5.59	12	13	5.42	19	2	0.81	12	11	4.38
	其他		271	120.25		297	129.78		276	118.62		330	137.70		298	121.01		318	126.76

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,180	465.44		1,227	480.75		1,143	445.58		1,277	496.35		1,297	501.74		1,301	500.03		1,402	536.05
08-14	惡性腫瘤	1	365	143.97	1	373	146.15	1	307	119.68	1	406	157.81	1	384	148.55	1	411	157.96	1	411	157.15
25-27-28*	心臟疾病	3	122	48.12	2	145	56.81	2	159	61.98	2	165	64.13	2	148	57.25	2	133	51.12	2	168	64.23
29	腦血管疾病	2	129	50.88	3	119	46.63	3	122	47.56	3	133	51.70	3	113	43.71	3	119	45.74	3	116	44.35
181	糖尿病	4	67	26.43	4	87	34.09	4	69	26.90	4	79	30.71	4	79	30.56	4	71	27.29	4	84	32.12
321	肺炎	8	33	13.02	7	39	15.28	5	45	17.54	6	41	15.94	5	57	22.05	5	59	22.68	5	74	28.29
E54	自殺	9	29	11.44	9	22	8.62	7	31	12.08	7	35	13.60	7	44	17.02	7	42	16.14	6	51	19.50
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	36	14.20	5	43	16.85	9	22	8.58	5	42	16.32	6	51	19.73	6	49	18.83	7	47	17.97
E47-E53	事故傷害	5	49	19.33	6	41	16.06	6	38	14.81	9	27	10.49	8	42	16.25	8	33	12.68	8	35	13.38
347	慢性肝病及肝硬化	6	44	17.36	8	23	9.01	7	31	12.08	8	30	11.66	9	29	11.22	9	27	10.38	9	29	11.09
038	敗血症	15	6	2.37	13	9	3.53	13	8	3.12	13	7	2.72	11	15	5.80	11	17	6.53	10	20	7.65
	其他		300	118.33		326	127.73		311	121.24		312	121.27		335	129.59		340	130.68		367	140.32

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39		1,406	538.09		1,454	555.84		1,551	586.67		1,619	604.38		1,514	560.07
C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79	1	394	150.79	1	417	159.41	1	449	169.83	1	486	181.43	1	403	149.08
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	188	71.84	2	166	63.53	2	150	57.34	2	193	73.00	2	171	63.84	2	201	74.35
I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98	3	105	40.18	3	103	39.37	3	125	47.28	3	125	46.66	3	122	45.13
J12-J18	肺炎	4	86	32.86	5	64	24.49	4	86	32.88	4	90	34.04	4	103	38.45	4	96	35.51
E10-E14	糖尿病	5	60	22.93	4	68	26.02	5	80	30.58	5	81	30.64	5	81	30.24	5	91	33.66
I10-I15	高血壓性疾病	10	35	13.37	7	51	19.52	6	63	24.08	8	59	22.32	7	61	22.77	6	61	22.57
A40-A41	敗血症	7	45	17.20	11	32	12.25	9	41	15.67	7	67	25.34	9	57	21.28	7	59	21.83
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	46	17.58	8	43	16.46	8	53	20.26	9	42	15.89	8	58	21.65	8	54	19.98
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	38	14.52	6	58	22.20	6	63	24.08	6	71	26.86	6	66	24.64	9	45	16.65
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	41	15.67	10	38	14.54	11	32	12.23	10	37	14.00	10	41	15.31	10	39	14.43
	其他		321	122.66		387	148.11		366	139.91		337	127.47		370	138.12		343	126.88

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		469	415.37		521	464.88		529	475.05		489	437.23		528	467.73		568	499.97
08-14	惡性腫瘤	1	139	123.11	1	139	124.03	1	149	133.80	1	137	122.50	1	146	129.34	1	166	146.12
25-27-28*	心臟疾病	3	43	38.08	3	51	45.51	3	51	45.80	3	54	48.28	3	47	41.64	3	57	50.17
29	腦血管疾病	2	49	43.40	2	55	49.08	2	56	50.29	2	55	49.18	2	57	50.49	2	64	56.33
181	糖尿病	5	27	23.91	5	26	23.20	5	32	28.74	6	19	16.99	4	29	25.69	4	41	36.09
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	8	7.09	8	15	13.38	6	16	14.37	9	12	10.73	7	20	17.72	6	21	18.48
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	20.37	6	23	20.52	7	14	12.57	5	21	18.78	6	21	18.60	6	21	18.48
E47-E53	事故傷害	4	32	28.34	3	51	45.51	4	49	44.00	4	28	25.04	5	28	24.80	5	29	25.53
E54	自殺	8	11	9.74	11	8	7.14	7	14	12.57	12	6	5.36	9	12	10.63	9	11	9.68
321	肺炎	13	7	6.20	9	13	11.60	9	13	11.67	7	18	16.09	8	17	15.06	8	14	12.32
038	敗血症	14	5	4.43	13	5	4.46	12	7	6.29	13	4	3.58	13	4	3.54	16	2	1.76
	其他		125	110.71		135	120.46		128	114.94		135	120.71		147	130.22		142	124.99

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		568	498.07		568	498.74		570	502.29		567	501.54		587	519.39		649	573.55		596	525.17
08-14	惡性腫瘤	1	202	177.13	1	177	155.42	1	176	155.09	1	193	170.72	1	186	164.58	1	206	182.05	1	195	171.83
25-27-28*	心臟疾病	2	47	41.21	3	56	49.17	2	82	72.26	2	78	68.99	2	66	58.40	2	68	60.09	2	64	56.39
29	腦血管疾病	3	38	33.32	2	65	57.07	3	66	58.16	3	48	42.46	3	55	48.67	3	61	53.91	3	60	52.87
181	糖尿病	5	31	27.18	4	40	35.12	4	32	28.20	4	34	30.07	4	44	38.93	4	41	36.23	4	27	23.79
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	16	14.03	7	16	14.05	8	16	14.10	6	22	19.46	7	23	20.35	8	17	15.02	5	25	22.03
347	慢性肝病及肝硬化	6	25	21.92	7	16	14.05	5	21	18.51	7	17	15.04	9	10	8.85	9	15	13.26	6	22	19.39
E47-E53	事故傷害	4	35	30.69	5	24	21.07	7	18	15.86	5	30	26.54	5	25	22.12	5	30	26.51	7	19	16.74
E54	自殺	9	14	12.28	6	19	16.68	9	15	13.22	8	13	11.50	6	24	21.24	5	30	26.51	8	14	12.34
321	肺炎	7	24	21.05	9	15	13.17	6	19	16.74	9	10	8.85	8	11	9.73	7	28	24.74	8	14	12.34
038	敗血症	13	4	3.51	10	8	7.02	10	8	7.02	11	3	2.65	12	5	4.42	11	7	6.19	10	10	8.81
	其他		132	115.75		132	115.90		117	103.10		119	105.26		138	122.11		146	129.03		146	128.65

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24		667	588.13		704	619.79		662	575.27		703	599.26		689	578.40
C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60	1	206	181.64	1	215	189.28	1	195	169.45	1	222	189.24	1	226	189.72
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	75	65.97	2	79	69.66	2	74	65.15	2	91	79.08	2	83	70.75	2	85	71.36
I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74	3	48	42.32	3	54	47.54	3	48	41.71	3	52	44.33	3	62	52.05
J12-J18	肺炎	3	58	51.01	4	42	37.03	4	44	38.74	4	43	37.37	4	48	40.92	4	43	36.10
E10-E14	糖尿病	5	31	27.27	5	33	29.10	6	33	29.05	5	36	31.28	5	39	33.25	5	32	26.86
A40-A41	敗血症	9	19	16.71	12	12	10.58	10	18	15.85	7	19	16.51	6	29	24.72	6	21	17.63
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	20	17.59	7	22	19.40	5	37	32.57	6	28	24.33	7	28	23.87	7	20	16.79
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	11	15	13.19	6	23	20.28	9	19	16.73	9	17	14.77	9	19	16.20	7	20	16.79
I10-I15	高血壓性疾病	11	15	13.19	12	12	10.58	12	13	11.45	12	12	10.43	9	19	16.20	9	19	15.95
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	24	21.11	9	20	17.64	8	21	18.49	9	17	14.77	11	18	15.34	10	14	11.75
	其他		134	117.86		170	149.90		176	154.95		156	135.56		146	124.46		147	123.40

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		782	350.67		828	361.55		867	369.47		906	375.94		845	341.95		969	385.16
08-14	惡性腫瘤	1	198	88.79	1	229	99.99	1	235	100.14	1	256	106.23	1	232	93.88	1	269	106.92
25-27-28*	心臟疾病	2	84	37.67	2	84	36.68	3	91	38.78	2	99	41.08	2	102	41.28	3	112	44.52
29	腦血管疾病	3	71	31.84	3	83	36.24	2	108	46.02	3	87	36.10	3	87	35.21	2	114	45.31
181	糖尿病	5	41	18.39	5	43	18.78	4	58	24.72	5	42	17.43	4	69	27.92	4	78	31.00
321	肺炎	8	24	10.76	9	22	9.61	10	13	5.54	9	25	10.37	11	13	5.26	7	29	11.53
E54	自殺	7	26	11.66	7	24	10.48	9	15	6.39	8	29	12.03	8	18	7.28	9	19	7.55
E47-E53	事故傷害	4	56	25.11	4	58	25.33	5	46	19.60	4	68	28.22	5	47	19.02	5	56	22.26
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	20	8.97	10	18	7.86	8	23	9.80	7	31	12.86	7	27	10.93	8	25	9.94
347	慢性肝病及肝硬化	6	30	13.45	6	28	12.23	6	31	13.21	6	32	13.28	6	33	13.35	6	31	12.32
26	高血壓性疾病	11	16	7.17	8	23	10.04	7	24	10.23	10	19	7.88	9	16	6.47	12	7	2.78
	其他		216	96.86		216	94.32		223	95.03		218	90.46		201	81.34		229	91.02

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		976	384.17		976	380.41		1,010	389.66		1,097	421.12		1,048	400.74		1,044	396.61		1,107	417.62
08-14	惡性腫瘤	1	293	115.33	1	342	133.30	1	302	116.51	1	314	120.54	1	306	117.01	1	357	135.62	1	373	140.72
25-27-28*	心臟疾病	2	90	35.43	2	90	35.08	2	121	46.68	2	160	61.42	2	115	43.97	2	105	39.89	2	134	50.55
29	腦血管疾病	3	88	34.64	2	90	35.08	3	91	35.11	3	90	34.55	3	107	40.91	3	104	39.51	3	96	36.22
181	糖尿病	4	71	27.95	4	57	22.22	4	60	23.15	4	65	24.95	4	74	28.30	4	60	22.79	4	73	27.54
321	肺炎	8	29	11.41	9	15	5.85	9	26	10.03	8	31	11.90	9	35	13.38	7	37	14.06	5	51	19.24
E54	自殺	9	23	9.05	6	32	12.47	7	36	13.89	6	39	14.97	6	39	14.91	5	43	16.34	6	34	12.83
E47-E53	事故傷害	5	50	19.68	5	48	18.71	5	47	18.13	5	52	19.96	8	36	13.77	8	35	13.30	6	34	12.83
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.17	7	31	12.08	6	40	15.43	7	33	12.67	7	39	14.91	6	42	15.96	8	33	12.45
347	慢性肝病及肝硬化	6	38	14.96	8	30	11.69	8	31	11.96	9	28	10.75	5	41	15.68	9	34	12.92	9	30	11.32
26	高血壓性疾病	10	17	6.69	10	11	4.29	14	5	1.93	11	11	4.22	10	23	8.79	10	14	5.32	10	15	5.66
	其他		241	94.86		230	89.65		251	96.84		274	105.18		233	89.09		213	80.92		234	88.28

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,183	444.46		1,170	437.78		1,183	439.82		1,238	453.57		1,382	497.41		1,322	469.74
C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51	1	365	136.57	1	364	135.33	1	376	137.75	1	418	150.45	1	403	143.20
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	153	57.48	2	133	49.77	2	133	49.45	2	129	47.26	2	152	54.71	2	161	57.21
I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95	3	90	33.68	3	87	32.35	3	95	34.81	3	105	37.79	3	109	38.73
E10-E14	糖尿病	4	68	25.55	4	65	24.32	4	62	23.05	4	69	25.28	4	77	27.71	4	66	23.45
J12-J18	肺炎	5	63	23.67	5	60	22.45	5	54	20.08	5	54	19.78	5	65	23.39	5	58	20.61
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	28	10.52	11	29	10.85	9	35	13.01	6	46	16.85	6	47	16.92	6	56	19.90
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	33	12.40	8	36	13.47	7	40	14.87	10	30	10.99	7	45	16.20	7	38	13.50
A40-A41	敗血症	6	42	15.78	10	31	11.60	13	24	8.92	9	31	11.36	7	45	16.20	8	37	13.15
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	33	12.40	6	41	15.34	6	42	15.61	7	40	14.65	9	43	15.48	9	34	12.08
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	25	9.39	13	25	9.35	9	35	13.01	10	30	10.99	12	28	10.08	10	32	11.37
	其他		271	101.82		295	110.38		307	114.14		338	123.83		357	128.49		328	116.55

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,192	399.07		1,271	428.91		1,246	423.71		1,241	420.29		1,288	435.12		1,363	462.31
08-14	惡性腫瘤	1	322	107.80	1	383	129.25	1	388	131.94	1	389	131.74	1	371	125.33	1	408	138.39
25-27-28*	心臟疾病	3	129	43.19	2	157	52.98	2	152	51.69	2	143	48.43	2	160	54.05	3	131	44.43
29	腦血管疾病	2	163	54.57	3	150	50.62	2	152	51.69	3	134	45.38	3	127	42.90	2	161	54.61
181	糖尿病	5	65	21.76	5	51	17.21	5	59	20.06	5	70	23.71	4	83	28.04	4	114	38.67
321	肺炎	7	40	13.39	10	25	8.44	10	22	7.48	6	34	11.51	8	40	13.51	7	40	13.57
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	37	12.39	9	27	9.11	6	35	11.90	6	34	11.51	7	41	13.85	5	48	16.28
E47-E53	事故傷害	4	85	28.46	4	71	23.96	4	77	26.18	4	72	24.38	5	50	16.89	5	48	16.28
E54	自殺	9	26	8.70	7	40	13.50	8	27	9.18	9	19	6.43	9	31	10.47	9	27	9.16
347	慢性肝病及肝硬化	6	41	13.73	6	44	14.85	7	31	10.54	8	30	10.16	6	45	15.20	7	40	13.57
038	敗血症	13	8	2.68	13	13	4.39	11	18	6.12	14	9	3.05	14	10	3.38	15	7	2.37
	其他		276	92.40		310	104.61		285	96.92		307	103.97		330	111.48		339	114.98

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
01-56	所有死亡原因		1,406	479.42		1,371	469.85		1,519	523.17		1,462	505.78		1,588	550.74		1,527	530.24		1,569	545.49
08-14	惡性腫瘤	1	424	144.58	1	461	157.99	1	433	149.13	1	476	164.67	1	456	158.15	1	489	169.80	1	533	185.31
25-27-28*	心臟疾病	3	139	47.40	2	132	45.24	2	187	64.41	2	161	55.70	2	171	59.31	2	171	59.38	2	162	56.32
29	腦血管疾病	2	162	55.24	3	130	44.55	3	168	57.86	3	150	51.89	3	135	46.82	3	107	37.16	3	137	47.63
181	糖尿病	4	104	35.46	4	93	31.87	4	108	37.20	4	107	37.02	4	105	36.42	4	105	36.46	4	107	37.20
321	肺炎	9	29	9.89	7	39	13.37	5	63	21.70	7	42	14.53	5	77	26.70	5	71	24.65	5	76	26.42
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	50	17.05	6	44	15.08	7	55	18.94	6	44	15.22	6	61	21.16	6	53	18.40	6	60	20.86
E47-E53	事故傷害	5	61	20.80	5	46	15.76	6	56	19.29	5	63	21.79	8	43	14.91	7	45	15.63	7	43	14.95
E54	自殺	7	43	14.66	9	32	10.97	9	35	12.05	8	30	10.38	7	49	16.99	8	43	14.93	8	38	13.21
347	慢性肝病及肝硬化	8	39	13.30	8	34	11.65	8	40	13.78	9	24	8.30	9	36	12.49	9	30	10.42	9	31	10.78
038	敗血症	11	12	4.09	12	12	4.11	12	12	4.13	10	13	4.50	10	19	6.59	11	18	6.25	10	19	6.61
	其他		343	116.96		348	119.26		362	124.68		352	121.77		436	151.21		395	137.16		363	126.20

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50		1,620	568.50		1,595	561.23		1,710	598.31		1,708	593.09		1,809	625.26
C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76	1	482	169.15	1	483	169.95	1	546	191.04	1	498	172.93	1	600	207.38
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	231	80.61	2	216	75.80	2	186	65.45	2	190	66.48	2	227	78.82	2	208	71.89
I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02	3	115	40.36	3	116	40.82	4	106	37.09	3	110	38.20	3	147	50.81
E10-E14	糖尿病	5	75	26.17	4	97	34.04	4	91	32.02	5	83	29.04	4	102	35.42	4	106	36.64
J12-J18	肺炎	4	97	33.85	5	93	32.64	4	91	32.02	3	113	39.54	5	96	33.34	5	90	31.11
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	53	18.50	7	53	18.60	6	53	18.65	8	51	17.84	7	58	20.14	6	62	21.43
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	46	16.05	6	56	19.65	7	50	17.59	6	63	22.04	6	60	20.83	7	58	20.05
I10-I15	高血壓性疾病	12	31	10.82	12	31	10.88	9	40	14.07	9	46	16.09	7	58	20.14	8	50	17.28
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	49	17.10	9	38	13.34	13	28	9.85	10	43	15.05	9	48	16.67	9	46	15.90
A40-A41	敗血症	6	59	20.59	8	42	14.74	8	44	15.48	6	63	22.04	10	47	16.32	10	41	14.17
	其他		407	142.03		397	139.32		413	145.32		406	142.05		404	140.29		401	138.60

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,078	443.77		1,121	462.90		1,082	447.47		1,132	464.00		1,191	483.28		1,187	479.40
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.03	1	316	130.49	1	307	126.96	1	326	133.63	1	344	139.59	1	357	144.18
25-27-28*	心臟疾病	3	100	41.17	2	132	54.51	3	120	49.63	3	87	35.66	2	136	55.19	2	117	47.25
29	腦血管疾病	2	119	48.99	3	127	52.44	2	137	56.66	2	141	57.80	3	103	41.79	2	117	47.25
181	糖尿病	5	51	20.99	5	67	27.67	4	76	31.43	5	56	22.95	4	79	32.06	4	93	37.56
321	肺炎	7	36	14.82	7	40	16.52	10	23	9.51	8	28	11.48	6	46	18.67	8	27	10.90
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.82	6	42	17.34	6	40	16.54	7	32	13.12	7	38	15.42	6	42	16.96
347	慢性肝病及肝硬化	6	46	18.94	8	36	14.87	8	25	10.34	6	36	14.76	8	29	11.77	7	31	12.52
E47-E53	事故傷害	4	84	34.58	4	73	30.14	5	64	26.47	4	73	29.92	5	75	30.43	5	56	22.62
E54	自殺	10	18	7.41	11	14	5.78	8	25	10.34	12	17	6.97	9	24	9.74	9	25	10.10
038	敗血症	14	12	4.94	11	14	5.78	14	9	3.72	13	13	5.33	12	14	5.68	14	8	3.23
	其他		299	123.09		260	107.36		256	105.87		323	132.40		303	122.95		314	126.82

資料來源：衛生福利部。

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,286	518.20		1,286	517.49		1,345	540.00		1,317	528.90		1,400	563.46		1,395	560.68		1,433	573.60
08-14	惡性腫瘤	1	399	160.78	1	356	143.25	1	392	157.38	1	375	150.60	1	399	160.59	1	401	161.17	1	463	185.33
25-27-28*	心臟疾病	3	123	49.56	3	126	50.70	2	162	65.04	2	163	65.46	2	168	67.62	2	175	70.34	2	158	63.24
29	腦血管疾病	2	154	62.06	2	131	52.71	3	154	61.83	3	127	51.00	3	137	55.14	3	132	53.05	3	138	55.24
181	糖尿病	4	86	34.65	4	92	37.02	4	92	36.94	4	83	33.33	4	108	43.47	4	95	38.18	4	91	36.43
321	肺炎	7	32	12.89	7	45	18.11	5	55	22.08	6	48	19.28	7	47	18.92	5	68	27.33	5	72	28.82
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	49	19.74	6	54	21.73	6	50	20.07	7	46	18.47	5	63	25.36	6	54	21.70	6	48	19.21
347	慢性肝病及肝硬化	8	20	8.06	8	35	14.08	8	32	12.85	8	32	12.85	9	29	11.67	9	32	12.86	7	45	18.01
E47-E53	事故傷害	5	53	21.36	5	75	30.18	7	35	14.05	5	54	21.69	8	45	18.11	8	37	14.87	8	40	16.01
E54	自殺	8	20	8.06	9	29	11.67	8	32	12.85	8	32	12.85	6	55	22.14	7	42	16.88	9	29	11.61
038	敗血症	10	18	7.25	11	16	6.44	13	8	3.21	12	9	3.61	10	15	6.04	10	18	7.23	10	18	7.21
	其他		332	133.78		327	131.58		333	133.70		348	139.75		334	134.43		341	137.24		331	132.49

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13		1,439	578.14		1,434	576.77		1,522	606.98		1,512	597.06		1,521	596.90
C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70	1	432	173.56	1	424	170.54	1	444	177.07	1	482	190.33	1	463	181.70
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	194	77.64	2	169	67.90	2	181	72.80	2	200	79.76	2	210	82.92	2	206	80.84
I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83	3	110	44.19	3	89	35.80	3	122	48.65	3	95	37.51	3	109	42.78
E10-E14	糖尿病	5	66	26.41	5	78	31.34	5	86	34.59	5	68	27.12	4	93	36.72	4	89	34.93
J12-J18	肺炎	4	92	36.82	4	100	40.18	4	87	34.99	4	91	36.29	5	59	23.30	5	79	31.00
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	51	20.41	6	58	23.30	6	44	17.70	6	62	24.73	6	56	22.11	6	62	24.33
I10-I15	高血壓性疾病	10	38	15.21	12	30	12.05	9	36	14.48	11	34	13.56	8	43	16.98	7	51	20.01
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	52	20.81	8	42	16.87	7	43	17.30	9	41	16.35	7	53	20.93	8	45	17.66
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	13	28	11.21	13	27	10.85	10	35	14.08	12	29	11.57	12	26	10.27	9	41	16.09
A40-A41	敗血症	8	45	18.01	8	42	16.87	13	31	12.47	8	44	17.55	10	32	12.64	10	40	15.70
	其他		375	150.08		351	141.02		378	152.04		387	154.34		363	143.34		336	131.86



表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		224	105.52		254	120.67		256	123.15		261	126.08		249	119.77		309	148.95
162	肺癌	1	38	17.90	2	33	15.68	1	55	26.46	1	55	26.57	1	49	23.57	1	59	28.44
155	肝癌	2	34	16.02	1	41	19.48	2	44	21.17	2	45	21.74	2	41	19.72	2	51	24.58
153 154	結腸直腸癌	2	34	16.02	3	31	14.73	4	25	12.03	3	28	13.53	3	32	15.39	3	36	17.35
174	女性乳癌(1)	4	9	8.30	4	15	13.92	5	11	10.32	4	14	13.17	5	10	9.35	6	10	9.35
185	攝護腺癌(2)	11	3	2.89	6	7	6.81	17	1	0.99	6	9	8.94	6	9	8.92	4	16	15.91
179 180	子宮頸癌(1)	7	6	5.53	10	5	4.64	16	2	1.88	7	6	5.64	8	7	6.54	7	8	7.48
151	胃癌	5	16	7.54	5	27	12.83	3	36	17.32	5	22	10.63	4	26	12.51	5	29	13.98
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	7	3.30	7	11	5.23	7	13	6.25	9	11	5.31	7	14	6.73	10	8	3.86
157	胰臟癌	9	8	3.77	7	11	5.23	6	15	7.22	10	10	4.83	9	8	3.85	10	8	3.86
204-208	白血病	14	5	2.36	12	9	4.28	8	7	3.37	14	5	2.42	10	7	3.37	10	8	3.86
	其他		64	30.15		64	17.84		47	22.61		56	27.05		46	22.13		76	36.63

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		299	145.03		280	136.48		307	149.43		304	147.73		313	151.18		345	165.26		332	157.94
162	肺癌	1	71	34.44	1	74	36.07	1	66	32.13	1	76	36.93	1	66	31.88	1	61	29.22	1	86	40.91
155	肝癌	2	40	19.40	2	41	19.98	3	45	21.90	4	37	17.98	2	51	24.63	2	50	23.95	2	44	20.93
153 154	結腸直腸癌	4	33	16.01	3	32	15.60	4	38	18.50	3	40	19.44	3	42	20.29	3	43	20.60	3	40	19.03
174	女性乳癌(1)	3	19	17.85	4	16	15.08	2	27	25.37	2	21	19.65	4	17	15.77	4	20	18.34	4	18	16.34
185	攝護腺癌(2)	6	9	9.03	6	7	7.07	6	11	11.11	7	8	8.09	5	10	10.08	6	14	14.04	5	11	11.00
179 180	子宮頸癌(1)	8	8	7.52	8	5	4.71	9	5	4.70	22	1	0.94	15	3	2.78	14	4	3.67	6	12	10.89
151	胃癌	5	28	13.58	5	25	12.19	5	23	11.20	5	19	9.23	7	15	7.25	5	34	16.29	7	21	9.99
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	12	5.82	9	9	4.39	7	11	5.35	5	19	9.23	6	15	7.25	8	17	8.14	8	20	9.51
157	胰臟癌	7	16	7.76	7	10	4.87	7	11	5.35	9	10	4.86	8	12	5.80	8	17	8.14	9	16	7.61
204-208	白血病	11	7	3.40	12	6	2.92	13	7	3.41	13	6	2.92	18	2	0.97	12	9	4.31	10	12	5.71
	其他		56	10.23		55	26.81		63	30.67		67	32.56		80	38.64		76	36.41		52	24.74

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		306	145.34		331	158.34		352	169.06		386	184.52		369	175.36		389	184.69
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92	1	81	38.75	1	77	36.98	1	81	38.72	1	82	38.97	1	65	30.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10	2	54	25.83	3	46	22.09	3	54	25.81	2	49	23.29	2	52	24.69
C50	女性乳房癌(1)	4	16	14.47	4	15	13.66	2	25	22.85	4	22	19.99	4	25	22.57	3	26	23.44
C22	肝和肝內膽管癌	2	22	10.45	3	18	8.61	4	21	10.09	2	26	12.43	3	48	22.81	4	47	22.31
C16	胃癌	6	44	20.90	5	51	24.40	5	35	16.81	6	57	27.25	6	18	8.55	5	35	16.62
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	14.00	6	7	7.06	10	7	7.09	5	14	14.12	5	16	16.06	6	15	15.05
C25	胰臟癌	7	20	9.50	7	12	5.74	12	11	5.28	7	17	8.13	6	18	8.55	7	19	9.02
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	13	4	3.62	8	6	5.46	6	11	10.05	14	4	3.63	17	2	1.81	8	9	8.11
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	6	5.43	8	6	5.46	7	8	7.31	15	3	2.73	11	5	4.51	9	8	7.21
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	12	5.70	13	7	3.35	8	15	7.20	8	13	6.21	9	10	4.75	10	14	6.65
	其他		69	32.77		74	35.40		96	46.11		95	45.41		96	45.62		99	47.00

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		303	123.50		306	126.45		327	136.22		371	153.82		343	141.61		351	145.58
162	肺癌	1	65	26.49	1	62	25.62	1	60	24.99	1	86	35.66	1	83	34.27	1	85	35.25
155	肝癌	2	56	22.82	2	49	20.25	2	51	21.25	2	53	21.97	2	55	22.71	3	44	18.25
153 154	結腸直腸癌	3	30	12.23	3	38	15.70	4	38	15.83	4	38	15.75	3	39	16.10	2	54	22.40
174	女性乳癌(1)	6	8	6.62	5	11	9.20	3	20	16.83	6	10	8.35	4	18	14.90	5	12	9.95
185	攝護腺癌(2)	15	3	2.41	6	8	6.53	7	8	6.60	13	6	4.94	7	10	8.23	6	7	5.81
151	胃癌	4	25	10.19	4	24	9.92	5	34	14.16	3	39	16.17	5	29	11.97	4	33	13.69
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	10	4.08	10	10	4.13	10	10	4.17	8	13	5.39	10	10	4.13	7	13	5.39
156	膽囊癌	9	9	3.67	13	8	3.31	15	6	2.50	11	12	4.98	10	10	4.13	10	10	4.15
157	胰臟癌	7	10	4.08	17	5	2.07	15	6	2.50	8	13	5.39	8	14	5.78	8	12	4.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	8	3.26	9	11	4.55	8	13	5.42	16	5	2.07	9	11	4.54	11	9	3.73
	其他		79	32.20		80	33.06		81	33.74		96	39.80		64	26.42		72	29.86

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年		96年								
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
08-14	所有癌症死亡原因		410	171.61		383	161.30		367	155.52		373	159.71		430	185.63		401	173.50		427	185.51
162	肺癌	1	78	32.65	1	86	36.22	1	78	33.05	1	71	30.40	1	81	34.97	1	84	36.34	1	103	44.75
155	肝癌	2	71	29.72	2	58	24.43	2	52	22.04	2	66	28.26	2	63	27.20	2	55	23.80	2	54	23.46
153 154	結腸直腸癌	3	45	18.84	3	45	18.95	4	38	16.10	3	41	17.56	5	51	22.02	3	50	21.63	3	48	20.85
174	女性乳癌(1)	5	20	16.70	4	19	15.92	3	23	19.33	7	9	7.62	3	28	23.80	4	21	17.81	4	24	20.35
185	攝護腺癌(2)	6	14	11.75	6	17	14.40	7	9	7.69	5	12	10.40	6	12	10.53	6	11	9.71	5	17	15.14
151	胃癌	4	40	16.74	5	37	15.58	5	30	12.71	4	29	12.42	4	52	22.45	5	38	16.44	6	30	13.03
200202203	非何杰金淋巴瘤	13	9	3.77	13	8	3.37	9	15	6.36	6	19	8.14	7	24	10.36	10	14	6.06	7	21	9.12
156	膽囊癌	9	13	5.44	13	8	3.37	13	9	3.81	12	10	4.28	15	7	3.02	9	15	6.49	8	18	7.82
157	胰臟癌	10	12	5.02	9	11	4.63	6	19	8.05	9	15	6.42	8	17	7.34	7	18	7.79	9	16	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	10	4.19	17	5	2.11	12	11	4.66	10	12	5.14	9	14	6.04	7	18	7.79	10	12	5.21
	其他		98	41.02		89	37.48		83	35.17		89	38.11		81	34.97		77	33.31		84	36.49

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		397	173.88		437	192.88		424	188.25		441	195.29		455	200.32		447	195.95
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60	1	87	38.40	1	84	37.30	1	85	37.64	1	108	47.55	1	87	38.14
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15	3	54	23.83	2	61	27.08	3	61	27.01	2	58	25.54	2	60	26.30
	女性乳房癌(1)	4	23	19.59	4	25	21.39	4	22	18.87	2	38	32.44	5	23	19.50	3	29	24.46
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02	2	67	29.57	3	43	19.09	4	54	23.91	3	55	24.21	4	43	18.85
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	9.92	6	16	14.59	6	12	11.04	9	9	8.28	4	24	21.98	5	17	15.52
C16	胃癌	5	27	11.83	5	40	17.65	7	23	10.21	7	26	11.51	6	29	12.77	6	34	14.90
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	15	4	3.41	10	5	4.28	16	4	3.43	6	14	11.95	7	14	11.87	7	11	9.28
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	15	6.57	14	8	3.53	9	12	5.33	11	13	5.76	10	14	6.16	8	20	8.77
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	10	8.52	17	3	2.57	8	7	6.01	8	10	8.54	15	4	3.39	9	10	8.43
C25	胰臟癌	7	22	9.64	7	26	11.48	5	30	13.32	5	28	12.40	8	18	7.92	10	17	7.45
	其他		96	42.05		106	46.79		126	55.94		103	45.61		108	47.55		119	52.17

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		410	122.97		455	140.71		444	140.64		410	129.50		438	137.71		409	129.00
162	肺癌	1	85	25.49	1	95	29.38	1	91	28.82	1	80	25.27	1	95	29.87	1	78	24.60
153 154	結腸直腸癌	4	45	13.50	3	55	17.01	3	53	16.79	2	62	19.58	3	52	16.35	2	63	19.87
155	肝癌	2	72	21.59	2	66	20.41	2	70	22.17	3	51	16.11	2	62	19.49	3	61	19.24
174	女性乳癌(1)	3	24	14.17	4	25	15.20	4	26	16.15	4	23	14.19	4	24	14.67	4	21	12.83
151	胃癌	5	34	10.20	5	47	14.53	5	42	13.30	5	40	12.63	5	45	14.15	5	29	9.15
185	攝護腺癌(2)	7	10	6.09	8	10	6.29	7	15	9.70	7	12	7.77	7	12	7.77	7	12	7.82
183	卵巢癌(1)	8	8	4.72	13	5	3.04	9	7	4.35	17	2	1.23	11	5	3.06	9	7	4.28
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	13	3.90	7	25	7.73	8	22	6.97	8	17	5.37	8	22	6.92	8	19	5.99
179 180	子宮頸癌(1)	6	11	6.50	6	18	10.95	6	20	12.42	6	14	8.63	6	14	8.56	9	7	4.28
156	膽囊癌	20	3	0.90	10	12	3.71	13	7	2.22	10	12	3.79	17	6	1.89	12	12	3.78
	其他		105	31.49		97	30.00		91	28.82		97	30.64		101	31.76		100	31.61

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		481	152.02		514	162.78		488	155.23		527	168.49		501	160.39		495	158.06		473	150.37
162	肺癌	1	116	36.66	1	107	33.89	1	97	30.86	1	113	36.13	1	105	33.62	1	110	35.12	1	96	30.52
153 154	結腸直腸癌	3	51	16.12	4	54	17.10	4	55	17.50	2	77	24.62	3	64	20.49	3	58	18.52	2	66	20.98
155	肝癌	2	65	20.54	2	90	28.50	2	71	22.59	3	69	22.06	2	73	23.37	2	84	26.82	3	64	20.35
174	女性乳癌(1)	4	25	15.27	3	30	18.32	3	33	20.20	4	26	15.96	4	30	18.39	6	19	11.59	4	20	12.11
151	胃癌	6	34	10.75	5	39	12.35	6	32	10.18	6	39	12.47	5	46	14.73	4	42	13.41	5	37	11.76
185	攝護腺癌(2)	5	22	14.41	6	17	11.18	5	17	11.26	5	22	14.67	6	18	12.06	5	19	12.74	6	16	10.71
183	卵巢癌(1)	12	6	3.67	12	6	3.66	10	8	4.90	7	11	6.75	12	7	4.29	7	12	7.32	7	14	8.48
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	19	6.01	7	29	9.18	7	31	9.86	13	13	4.16	9	17	5.44	8	20	6.39	8	26	8.27
179 180	子宮頸癌(1)	10	8	4.89	9	11	6.72	8	15	9.18	8	10	6.14	8	9	5.52	10	8	4.88	9	12	7.27
156	膽囊癌	11	14	4.42	11	14	4.43	13	11	3.50	11	15	4.80	10	15	4.80	11	12	3.83	10	22	6.99
	其他		121	38.17		117	37.05		118	37.54		132	42.20		117	37.46		111	35.44		100	31.79



表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		501	159.36		549	175.55		572	183.58		544	173.97		580	184.93		582	185.71
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40	1	116	37.09	1	119	38.19	1	107	34.22	1	116	36.99	1	124	39.57
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86	2	71	22.70	2	70	22.47	2	83	26.54	4	65	20.72	2	91	29.04
C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63	3	70	22.38	5	58	18.61	4	68	21.75	2	83	26.46	3	69	22.02
C50	女性乳房癌(1)	4	24	14.50	4	35	21.20	3	36	21.84	3	37	22.34	5	31	18.64	4	36	21.64
C16	胃癌	6	30	9.54	7	35	11.19	6	40	12.84	7	22	7.04	6	46	14.67	5	41	13.08
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	18	12.10	5	19	12.87	4	28	19.08	5	23	15.64	3	31	21.04	6	16	10.88
C25	胰臟癌	7	23	7.32	6	36	11.51	6	40	12.84	6	23	7.36	7	37	11.80	7	33	10.53
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	11	6	3.62	12	7	4.24	14	6	3.64	11	7	4.23	9	9	5.41	8	11	6.61
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	11	6	3.62	8	10	6.06	14	6	3.64	10	8	4.83	10	8	4.81	8	11	6.61
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45	9	18	5.76	8	32	10.27	9	18	5.76	8	19	6.06	10	17	5.42
	其他		132	41.99		132	42.21		137	43.97		148	47.33		135	43.04		133	42.44

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		289	128.97		281	128.44		323	150.86		302	141.32		293	136.34		325	151.10
162	肺癌	1	50	22.31	1	53	24.22	2	54	25.22	2	51	23.86	1	66	30.71	1	50	23.25
155	肝癌	2	42	18.74	1	53	24.22	1	60	28.02	1	54	25.27	2	41	19.08	3	45	20.92
153 154	結腸直腸癌	4	37	16.51	4	24	10.97	3	39	18.22	3	34	15.91	3	36	16.75	2	48	22.32
151	胃癌	5	26	11.60	3	35	16.00	6	25	11.68	5	26	12.17	5	21	9.77	5	27	12.55
174	女性乳癌(1)	6	11	9.68	5	11	9.91	4	19	17.45	4	15	13.74	4	11	9.99	4	20	18.09
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	10	4.46	11	8	3.66	7	16	7.47	7	19	8.89	9	9	4.19	9	10	4.65
157	胰臟癌	11	9	4.02	7	11	5.03	11	10	4.67	16	5	2.34	6	16	7.44	16	5	2.32
150	食道癌	12	6	2.68	15	6	2.74	9	12	5.60	15	6	2.81	11	7	3.26	13	8	3.72
156	膽囊癌	12	6	2.68	11	8	3.66	13	9	4.20	9	10	4.68	11	7	3.26	9	10	4.65
185	攝護腺癌(2)	8	6	5.43	10	4	3.71	14	3	2.85	8	6	5.74	8	7	6.68	6	9	8.61
	其他		86	38.38		68	31.08		76	35.50		76	35.56		72	33.50		93	43.24

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		349	161.73		359	165.59		354	162.92		370	170.56		374	172.44		351	160.83		384	175.32
162	肺癌	1	77	35.68	2	77	35.52	1	76	34.98	1	70	32.27	1	80	36.89	1	62	28.41	1	84	38.35
155	肝癌	2	65	30.12	1	80	36.90	2	73	33.60	2	64	29.50	3	46	21.21	2	61	27.95	2	64	29.22
153 154	結腸直腸癌	3	42	19.46	4	32	14.76	3	33	15.19	4	45	20.74	2	56	25.82	3	43	19.70	3	41	18.72
151	胃癌	7	19	8.80	5	30	13.84	5	29	13.35	5	24	11.06	5	29	13.37	5	26	11.91	4	37	16.89
174	女性乳癌(1)	4	14	12.58	3	17	15.16	4	16	14.21	3	29	25.77	4	21	18.63	4	19	16.70	5	14	12.21
200202203	非何杰金淋巴瘤	12	9	4.17	7	12	5.53	11	11	5.06	13	7	3.23	7	19	8.76	6	21	9.62	6	20	9.13
157	胰臟癌	11	10	4.63	7	12	5.53	12	8	3.68	6	19	8.76	9	14	6.45	7	16	7.33	7	18	8.22
150	食道癌	8	12	5.56	12	7	3.23	16	5	2.30	10	12	5.53	10	12	5.53	10	13	5.96	8	15	6.85
156	膽囊癌	8	12	5.56	10	11	5.07	13	7	3.22	10	12	5.53	12	7	3.23	12	10	4.58	9	14	6.39
185	攝護腺癌(2)	5	11	10.53	14	3	2.87	6	12	11.46	8	7	6.71	6	11	10.56	9	7	6.70	10	5	4.79
	其他		78	36.15		78	35.98		84	38.66		81	37.34		79	36.42		73	33.45		72	32.87

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		382	174.70		417	190.81		402	183.41		418	188.19		430	190.79		412	180.94
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47	1	85	38.89	1	85	38.78	1	84	37.82	1	85	37.71	1	91	39.96
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35	2	62	28.37	2	63	28.74	2	68	30.61	3	54	23.96	2	59	25.91
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78	4	42	19.22	3	54	24.64	3	52	23.41	2	58	25.73	3	54	23.71
C50	女性乳房癌(1)	5	14	12.19	3	25	21.70	4	26	22.44	4	23	19.54	4	22	18.38	4	18	14.86
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	8	7.71	7	11	10.65	5	17	16.45	5	13	12.45	5	16	15.14	5	13	12.20
C16	胃癌	4	33	15.09	6	26	11.90	6	20	9.12	7	24	10.81	7	21	9.32	6	26	11.42
C00-C06, C09-C10,	口腔癌	9	12	5.49	9	14	6.41	12	11	5.02	8	21	9.45	8	16	7.10	7	21	9.22
C25	胰臟癌	8	14	6.40	5	30	13.73	7	14	6.39	6	25	11.26	6	22	9.76	8	19	8.34
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	11	5.03	11	11	5.03	10	12	5.47	10	12	5.40	9	15	6.66	9	15	6.59
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	10	6	5.22	8	10	8.68	9	7	6.04	12	5	4.25	12	6	5.01	10	7	5.78
	其他		99	45.28		101	46.22		93	42.43		91	40.97		115	51.02		89	39.09

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		244	141.22		210	124.35		242	145.85		227	136.96		247	148.86		275	167.47
162	肺癌	1	48	27.78	1	38	22.50	1	56	33.75	1	61	36.80	1	47	28.33	1	57	34.71
153 154	結腸直腸癌	4	30	17.36	4	30	17.76	4	24	14.46	4	23	13.88	3	32	19.29	3	32	19.49
155	肝癌	2	41	23.73	2	32	18.95	2	42	25.31	2	39	23.53	2	38	22.90	2	46	28.01
179 180	子宮頸癌(1)	5	7	8.17	5	10	11.93	5	11	13.32	6	6	7.24	6	6	7.20	5	9	10.89
151	胃癌	3	34	19.68	3	31	18.36	6	17	10.25	5	17	10.26	4	27	16.27	4	24	14.62
200202203	非何杰金淋巴瘤	17	3	1.74	7	10	5.92	8	10	6.03	11	5	3.02	11	8	4.82	14	5	3.04
150	食道癌	11	6	3.47	16	2	1.18	14	5	3.01	9	6	3.62	15	5	3.01	9	10	6.09
157	胰臟癌	9	8	4.63	14	4	2.37	10	8	4.82	7	8	4.83	8	9	5.42	12	7	4.26
174	女性乳癌(1)	6	6	7.00	6	8	9.54	3	15	18.16	3	13	15.68	5	8	9.60	5	9	10.89
204-208	白血病	12	5	2.89	11	5	2.96	11	7	4.22	9	6	3.62	11	8	4.82	10	8	4.87
	其他		56	32.41		40	23.69		47	28.33		43	25.94		59	35.56		68	41.41

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		267	164.45		288	178.08		245	152.45		245	154.05		282	178.58		267	169.02		258	162.22
162	肺癌	1	60	36.95	1	47	29.06	1	59	36.71	1	53	33.32	1	53	33.56	1	57	36.08	1	64	40.24
153 154	結腸直腸癌	3	28	17.25	3	37	22.88	3	29	18.05	2	41	25.78	4	32	20.26	3	31	19.62	2	39	24.52
155	肝癌	2	37	22.79	2	38	23.50	2	32	19.91	3	34	21.38	3	34	21.53	2	41	25.95	3	32	20.12
179 180	子宮頸癌(1)	9	5	6.10	6	11	13.43	11	4	4.90	9	5	6.17	18	2	2.48	8	6	7.41	4	9	11.01
151	胃癌	3	28	17.25	4	29	17.93	5	20	12.45	4	21	13.20	5	25	15.83	5	20	12.66	5	12	7.55
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	12	7.39	9	12	7.42	7	9	5.60	8	10	6.29	6	20	12.67	7	13	8.23	6	11	6.92
150	食道癌	11	7	4.31	12	8	4.95	7	9	5.60	12	6	3.77	10	9	5.70	12	6	3.80	6	11	6.92
157	胰臟癌	8	11	6.77	7	16	9.89	9	8	4.98	7	12	7.55	7	11	6.97	9	9	5.70	8	10	6.29
174	女性乳癌(1)	5	13	15.87	8	8	9.77	4	14	17.15	6	9	11.11	2	19	23.55	4	14	17.28	9	5	6.12
204-208	白血病	11	7	4.31	10	9	5.57	9	8	4.98	14	5	3.14	13	8	5.07	11	7	4.43	10	9	5.66
	其他		59	36.34		73	45.14		53	32.98		49	30.81		69	43.70		63	39.88		56	35.21

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		303	190.07		276	173.54		278	174.68		263	163.87		305	188.50		248	152.48
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64	1	57	35.84	1	64	40.22	1	56	34.89	1	62	38.32	1	51	31.36
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48	2	33	20.75	3	37	23.25	2	38	23.68	2	51	31.52	2	42	25.82
C50	女性乳房癌(1)	4	16	19.48	4	15	18.27	4	14	17.01	4	15	18.04	5	11	13.10	3	19	22.46
C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70	3	31	19.49	2	41	25.76	3	32	19.94	3	45	27.81	4	30	18.44
C16	胃癌	5	29	18.19	5	25	15.72	5	19	11.94	7	11	6.85	6	18	11.12	5	15	9.22
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	11.65	9	5	6.50	7	5	6.51	5	9	11.63	4	13	16.70	6	7	8.97
C25	胰臟癌	9	9	5.65	7	13	8.17	6	16	10.05	6	16	9.97	7	13	8.03	7	14	8.61
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	8	5.02	14	5	3.14	8	9	5.66	11	6	3.74	9	10	6.18	8	10	6.15
C67	膀胱癌	17	5	3.14	12	6	3.77	13	5	3.14	9	10	6.23	20	2	1.24	9	8	4.92
C71	腦癌	20	3	1.88	14	5	3.14	14	4	2.51	17	4	2.49	10	7	4.33	10	7	4.30
	其他		84	52.69		81	50.93		64	40.22		66	41.12		73	45.12		45	27.67

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		230	168.33		194	144.09		232	173.24		204	152.11		223	166.38		201	151.02
162	肺癌	1	45	32.93	2	28	20.80	1	46	34.35	2	31	23.12	3	29	21.64	1	39	29.30
155	肝癌	2	39	28.54	1	47	34.91	2	41	30.61	1	42	31.32	1	49	36.56	2	27	20.29
153 154	結腸直腸癌	4	22	16.10	3	22	16.34	3	29	21.65	3	22	16.40	2	30	22.38	3	20	15.03
174	女性乳癌(1)	5	10	14.75	6	6	9.00	6	7	10.56	4	9	13.55	4	11	16.56	5	7	10.59
185	攝護腺癌(2)	12	3	4.36	12	3	4.41	17	1	1.48	-	-	-	11	3	4.44	13	3	4.48
179 180	子宮頸癌(1)	11	3	4.43	4	7	10.50	5	11	16.60	8	4	6.02	6	7	10.54	5	7	10.59
151	胃癌	3	30	21.96	5	14	10.40	4	27	20.16	5	17	12.68	5	18	13.43	4	19	14.28
157	胰臟癌	6	9	6.59	16	2	1.49	10	6	4.48	10	7	5.22	16	4	2.98	7	12	9.02
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	9	6.59	10	6	4.46	9	9	6.72	10	7	5.22	12	5	3.73	11	6	4.51
150	食道癌	9	8	5.86	8	9	6.68	8	10	7.47	7	9	6.71	7	10	7.46	10	7	5.26
	其他		52	38.06		50	37.14		45	33.60		56	41.76		57	42.53		54	40.57

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		223	168.92		250	190.53		242	185.78		205	158.94		228	178.60		273	215.19		259	204.70
162	肺癌	1	41	31.06	1	60	45.73	1	52	39.92	1	40	31.01	1	41	32.12	2	51	40.20	1	54	42.68
155	肝癌	2	39	29.54	2	38	28.96	2	41	31.48	1	40	31.01	3	34	26.63	1	57	44.93	2	40	31.61
153 154	結腸直腸癌	5	20	15.15	3	33	25.15	3	31	23.80	3	26	20.16	4	29	22.72	3	30	23.65	3	35	27.66
174	女性乳癌(1)	3	13	19.80	4	12	18.39	5	9	13.87	5	7	10.87	2	18	28.19	4	13	20.44	4	14	22.02
185	攝護腺癌(2)	14	3	4.52	9	5	7.58	6	6	9.18	13	3	4.64	10	4	6.27	7	6	9.48	5	10	15.89
179 180	子宮頸癌(1)	6	7	10.66	6	5	7.66	7	5	7.71	9	3	4.66	11	3	4.70	10	5	7.86	6	8	12.58
151	胃癌	4	21	15.91	5	19	14.48	4	20	15.35	4	15	11.63	5	14	10.97	8	12	9.46	7	14	11.06
157	胰臟癌	11	6	4.54	10	8	6.10	14	5	3.84	7	8	6.20	13	5	3.92	6	13	10.25	8	12	9.48
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	4.54	10	8	6.10	8	10	7.68	7	8	6.20	7	11	8.62	11	9	7.09	9	9	7.11
150	食道癌	9	7	5.30	8	10	7.62	9	9	6.91	14	3	2.33	6	14	10.97	9	11	8.67	10	8	6.32
	其他		60	45.45		52	39.63		54	41.46		52	40.32		55	43.08		66	52.02		55	43.47

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		267	212.93		255	205.60		255	205.65		244	194.24		288	225.49		282	218.07
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66	1	56	45.15	1	56	45.16	1	60	47.76	1	56	43.84	1	59	45.63
C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47	2	36	29.03	2	47	37.90	2	36	28.66	3	39	30.53	2	53	40.99
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91	3	29	23.38	3	35	28.23	3	26	20.70	2	48	37.58	3	33	25.52
C50	女性乳房癌(1)	4	16	25.32	4	11	17.55	4	9	14.33	4	12	18.81	4	11	16.93	4	9	13.65
C16	胃癌	5	14	11.17	5	21	16.93	6	14	11.29	5	16	12.74	5	16	12.53	5	14	10.83
C25	胰臟癌	15	5	3.99	8	12	9.68	9	7	5.65	7	10	7.96	6	14	10.96	5	14	10.83
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	8	6.38	7	15	12.09	9	7	5.65	6	14	11.14	6	14	10.96	7	11	8.51
C15	食道癌	6	9	7.18	11	7	5.64	5	15	12.10	12	5	3.98	9	10	7.83	8	9	6.96
C11	鼻咽癌	10	7	5.58	13	5	4.03	13	5	4.03	16	3	2.39	11	7	5.48	8	9	6.96
C54	子宮體癌(1)	20	1	1.58	14	2	3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	6.07
	其他		64	51.04		61	49.18		60	48.39		62	49.36		73	57.15		67	51.81

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		270	125.11		317	149.15		322	153.50		301	143.94		366	175.24		332	160.08
155	肝癌	1	50	23.17	2	53	24.94	2	57	27.17	2	62	29.65	2	61	29.21	2	48	23.14
162	肺癌	2	48	22.24	1	67	31.52	1	68	32.42	1	67	32.04	1	73	34.95	1	71	34.23
153 154	結腸直腸癌	4	26	12.05	4	38	17.88	3	32	15.25	5	26	12.43	3	44	21.07	3	41	19.77
174	女性乳癌(1)	6	8	7.60	6	10	9.66	6	7	6.85	3	16	15.68	4	20	19.58	5	10	9.85
151	胃癌	3	42	19.46	3	39	18.35	4	31	14.78	4	30	14.35	5	29	13.88	4	31	14.95
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	9	4.17	9	10	4.71	11	11	5.24	10	10	4.78	7	19	9.10	8	13	6.27
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.52	7	7	6.42	10	6	5.58	17	2	1.87	12	5	4.69	7	7	6.61
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	12	5.56	16	3	1.41	7	14	6.67	7	12	5.74	13	9	4.31	10	10	4.82
150	食道癌	16	4	1.85	11	8	3.76	8	12	5.72	8	11	5.26	8	14	6.70	10	10	4.82
156	膽囊癌	10	6	2.78	14	4	1.88	13	9	4.29	10	10	4.78	9	12	5.75	12	9	4.34
	其他		60	27.80		78	36.70		75	35.75		55	26.30		80	38.30		82	39.54

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		377	183.51		386	189.46		388	192.21		414	208.19		431	219.79		427	219.19		458	236.48
155	肝癌	2	65	31.64	2	69	33.87	1	79	39.14	2	71	35.70	2	55	28.05	2	72	36.96	1	94	48.54
162	肺癌	1	86	41.86	1	72	35.34	2	68	33.69	1	75	37.72	1	88	44.88	1	84	43.12	2	84	43.37
153 154	結腸直腸癌	3	47	22.88	3	48	23.56	3	37	18.33	3	47	23.64	3	42	21.42	3	67	34.39	3	55	28.40
174	女性乳癌(1)	5	14	13.91	5	15	15.01	4	16	16.14	5	15	15.35	4	19	19.68	5	15	15.60	4	18	18.77
151	胃癌	4	37	18.01	4	44	21.60	6	24	11.89	4	36	18.10	5	37	18.87	4	32	16.43	5	35	18.07
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	12	5.84	6	18	8.83	10	15	7.43	12	13	6.54	13	10	5.10	11	10	5.13	6	24	12.39
185	攝護腺癌(2)	8	7	6.68	11	6	5.78	9	9	8.76	8	10	9.89	7	12	12.05	6	14	14.19	7	9	9.21
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	18	8.76	9	14	6.87	8	19	9.41	7	20	10.06	6	27	13.77	8	22	11.29	8	16	8.26
150	食道癌	11	9	4.38	10	12	5.89	13	9	4.46	10	14	7.04	11	18	9.18	15	6	3.08	9	16	8.26
156	膽囊癌	11	9	4.38	12	11	5.40	11	14	6.94	15	7	3.52	9	22	11.22	17	5	2.57	10	15	7.74
	其他		73	35.53		77	37.79		98	48.55		106	53.30		101	51.51		100	51.33		92	47.50

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		394	205.83		419	221.23		446	236.27		426	224.24		448	233.65		464	240.35
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54	1	79	41.71	1	86	45.56	1	91	47.90	1	90	46.94	1	101	52.32
C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70	1	79	41.71	2	77	40.79	2	61	32.11	3	60	31.29	2	82	42.48
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08	3	57	30.10	3	50	26.49	3	52	27.37	2	64	33.38	3	59	30.56
C50	女性乳房癌(1)	7	9	9.47	6	15	15.90	4	24	25.41	4	24	25.15	5	14	14.50	4	23	23.63
C16	胃癌	4	25	13.06	4	35	18.48	5	38	20.13	5	34	17.90	4	33	17.21	5	27	13.99
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75	7	20	10.56	7	23	12.18	7	17	8.95	6	23	12.00	5	27	13.99
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	10.37	5	16	16.83	13	4	4.24	6	16	16.92	8	10	10.50	7	13	13.58
C25	胰臟癌	5	20	10.45	8	17	8.98	8	21	11.12	7	17	8.95	7	22	11.47	8	17	8.81
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	9	9.47	10	7	7.42	6	12	12.70	12	5	5.24	15	4	4.14	9	8	8.22
C15	食道癌	16	6	3.13	8	17	8.98	14	8	4.24	11	10	5.26	9	16	8.34	10	15	7.77
	其他		89	46.50		77	40.65		103	54.56		99	52.11		112	58.41		92	47.66

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		274	121.59		282	123.23		279	119.91		305	127.27		312	126.69		336	133.94
162	肺癌	1	53	23.52	1	51	22.29	2	45	19.34	1	70	29.21	1	70	28.42	1	63	25.11
155	肝癌	2	51	22.63	2	48	20.97	1	55	23.64	2	46	19.19	2	46	18.68	2	57	22.72
153 154	結腸直腸癌	5	28	12.42	3	38	16.60	4	26	11.17	3	38	15.86	3	34	13.81	3	37	14.75
174	女性乳癌(1)	3	16	14.36	5	12	10.57	3	16	13.81	5	10	8.35	5	12	9.72	4	15	11.90
151	胃癌	4	29	12.87	4	27	11.80	5	25	10.74	4	26	10.85	6	23	9.34	5	22	8.77
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.39	7	7	6.07	7	6	5.14	7	8	6.67	4	13	10.58	6	9	7.21
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	8.08	13	3	2.64	6	11	9.49	5	10	8.35	7	11	8.91	14	5	3.97
157	胰臟癌	10	7	3.11	8	11	4.81	10	10	4.30	15	6	2.50	9	13	5.28	12	10	3.99
183	卵巢癌(1)	9	4	3.59	17	2	1.76	18	1	0.86	18	2	1.67	11	6	4.86	7	9	7.14
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	7	3.11	10	10	4.37	8	11	4.73	11	7	2.92	12	9	3.65	12	10	3.99
	其他		65	28.84		73	31.90		73	31.37		82	34.22		75	30.45		99	39.46

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		365	143.97		373	146.15		307	119.68		406	157.81		384	148.55		411	157.96		411	157.15
162	肺癌	1	82	32.34	1	72	28.21	1	74	28.85	1	90	34.98	1	84	32.50	1	88	33.82	1	85	32.50
155	肝癌	2	59	23.27	3	50	19.59	3	38	14.81	2	63	24.49	3	43	16.63	3	45	17.30	2	53	20.26
153 154	結腸直腸癌	4	30	11.83	2	57	22.33	2	40	15.59	4	45	17.49	2	44	17.02	2	53	20.37	3	43	16.44
174	女性乳癌(1)	3	16	12.53	4	20	15.53	4	12	9.25	3	25	19.18	4	19	14.47	4	21	15.83	4	19	14.20
151	胃癌	5	28	11.04	5	34	13.32	6	17	6.63	6	24	9.33	5	36	13.93	5	34	13.07	5	33	12.62
185	攝護腺癌(2)	6	12	9.53	7	9	7.12	5	9	7.10	5	12	9.45	6	14	11.01	6	16	12.55	6	13	10.18
179 180	子宮頸癌(1)	7	12	9.40	6	10	7.77	7	8	6.17	9	8	6.14	10	7	5.33	12	6	4.52	7	11	8.22
157	胰臟癌	11	10	3.94	9	14	5.49	10	11	4.29	10	14	5.44	7	16	6.19	7	24	9.22	8	16	6.12
183	卵巢癌(1)	13	5	3.92	10	7	5.44	13	4	3.08	15	4	3.07	16	3	2.28	8	9	6.78	9	8	5.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	9	3.55	13	6	2.35	14	6	2.34	10	14	5.44	7	16	6.19	9	16	6.15	10	15	5.74
	其他		102	40.23		94	36.83		168	65.49		211	82.01		202	78.14		203	78.02		215	82.20

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		426	162.79		394	150.79		417	159.41		449	169.83		486	181.43		403	149.08
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83	1	82	31.38	1	95	36.32	1	104	39.34	1	96	35.84	1	69	25.52
C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46	2	58	22.20	4	49	18.73	3	56	21.18	2	70	26.13	2	57	21.09
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34	3	47	17.99	2	58	22.17	2	68	25.72	3	57	21.28	3	53	19.61
C16	胃癌	5	21	8.02	6	29	11.10	5	43	16.44	5	30	11.35	5	46	17.17	4	35	12.95
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	7.06	5	16	12.60	6	17	13.41	6	11	8.60	6	14	10.81	5	16	12.26
C50	女性乳房癌(1)	3	28	20.87	4	19	14.15	3	27	20.03	4	27	19.79	4	26	18.79	6	17	12.16
C25	胰臟癌	7	18	6.88	7	16	6.12	8	15	5.73	10	17	6.43	7	23	8.59	7	24	8.88
C91-C95	白血病	13	11	4.20	9	13	4.98	14	7	2.68	12	10	3.78	12	11	4.11	8	16	5.92
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	12	4.59	10	12	4.59	7	17	6.50	9	19	7.19	8	17	6.35	9	15	5.55
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	11	4.20	14	9	3.44	11	9	3.44	11	11	4.16	9	14	5.23	10	12	4.44
	其他		105	40.12		93	35.59		80	30.58		96	36.31		112	41.81		89	32.92



表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		139	123.11		139	124.03		149	133.80		137	122.50		146	129.34		166	146.12
162	肺癌	1	28	24.80	1	31	27.66	1	33	29.63	1	34	30.40	1	30	26.58	1	31	27.29
155	肝癌	2	23	20.37	2	23	20.52	3	16	14.37	2	22	19.67	2	25	22.15	5	17	14.96
153 154	結腸直腸癌	5	12	10.63	5	11	9.82	5	14	12.57	4	13	11.62	6	13	11.52	4	19	16.72
151	胃癌	3	16	14.17	3	22	19.63	3	16	14.37	5	11	9.84	4	18	15.95	2	23	20.25
174	女性乳癌(1)	4	6	10.80	4	6	10.88	2	13	23.70	8	3	5.44	3	10	17.94	3	10	17.81
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	6	5.31	8	6	5.35	10	5	4.49	9	5	4.47	8	7	6.20	11	5	4.40
185	攝護腺癌(2)	14	1	1.74	-	-	-	7	4	7.08	6	4	7.06	5	7	12.25	7	5	8.70
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	10	8.86	10	4	3.57	9	6	5.39	7	7	6.26	9	5	4.43	11	5	4.40
156	膽囊癌	10	4	3.54	14	2	1.78	17	1	0.90	13	3	2.68	18	1	0.89	14	3	2.64
179 180	子宮頸癌(1)	6	5	9.00	7	3	5.44	6	6	10.94	3	8	14.50	7	5	8.97	6	7	12.47
	其他		28	24.80		31	27.66		35	31.43		27	24.14		25	22.15		41	36.09

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		202	177.13	177	155.42	176	155.09	193	170.72	186	164.58	206	182.05	195	171.83							
162	肺癌	2	40	35.08	1	44	38.63	2	33	29.08	2	36	31.84	2	34	30.08	2	33	29.16	1	41	36.13	
155	肝癌	1	43	37.71	2	23	20.20	1	47	41.42	1	37	32.73	1	39	34.51	1	38	33.58	2	30	26.43	
153 154	結腸直腸癌	3	21	18.41	3	18	15.81	3	13	11.46	6	17	15.04	3	22	19.47	3	24	21.21	3	24	21.15	
151	胃癌	6	16	14.03	4	16	14.05	5	12	10.57	4	19	16.81	6	12	10.62	4	19	16.79	4	15	13.22	
174	女性乳癌(1)	4	9	15.93	7	4	7.06	4	6	10.60	3	10	17.73	4	9	15.96	5	8	14.14	5	7	12.30	
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	8	7.02	9	7	6.15	7	7	6.17	15	4	3.54	9	6	5.31	7	8	7.07	6	11	9.69	
185	攝護腺癌(2)	8	4	6.95	17	1	1.75	-	-	-	11	3	5.30	7	4	7.07	7	4	7.07	7	5	8.84	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	9	6	5.26	9	7	6.15	7	7	6.17	8	8	7.08	12	5	4.42	6	10	8.84	8	8	7.05	
156	膽囊癌	10	5	4.38	9	7	6.15	13	4	3.52	8	8	7.08	9	6	5.31	11	5	4.42	8	8	7.05	
179 180	子宮頸癌(1)	5	8	14.16	5	5	8.83	6	4	7.07	5	9	15.96	5	7	12.41	17	1	1.77	10	4	7.03	
	其他		42	36.83	45	39.51	43	37.89	42	37.15	42	37.15	42	37.16	56	49.49	42	37.01					

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		186	163.60		206	181.64		215	189.28		195	169.45		222	189.24		226	189.72
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66	1	52	45.85	1	51	44.90	1	44	38.24	1	48	40.92	1	43	36.10
C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87	3	22	19.40	2	37	32.57	2	30	26.07	2	36	30.69	2	32	26.86
C50	女性乳房癌(1)	2	14	24.46	4	8	13.97	3	15	26.05	4	10	17.09	3	18	30.12	3	13	21.38
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47	2	28	24.69	4	25	22.01	3	23	19.99	4	30	25.57	4	22	18.47
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	5	4.40	9	7	6.17	5	15	13.21	6	10	8.69	8	8	6.82	5	15	12.59
C16	胃癌	3	26	22.87	5	13	11.46	6	13	11.45	5	12	10.43	6	11	9.38	6	13	10.91
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	4	7.09	7	6	10.69	8	4	7.14	9	3	5.30	5	8	13.90	7	6	10.29
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	19	1	1.75	8	4.00	6.99	14	2	3.47	11	3	5.13	11	3	5.02	8	5	8.22
C25	胰臟癌	7	8	7.04	5	13	11.46	9	7	6.16	6	10	8.69	8	8	6.82	9	9	7.56
C15	食道癌	7	8	7.04	14	4	3.53	7	9	7.92	13	3	2.61	7	9	7.67	10	7	5.88
	其他		37	32.54		49	43.21		37	32.57		47	40.84		43	36.65		61	51.21

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		198	88.79		229	99.99		235	100.14		256	106.23		232	93.88		269	106.92
162	肺癌	2	29	13.00	3	37	16.16	1	50	21.31	1	53	21.99	1	49	19.83	1	50	19.87
153 154	結腸直腸癌	4	19	8.52	4	25	10.92	5	18	7.67	3	32	13.28	3	24	9.71	4	26	10.33
155	肝癌	1	42	18.83	1	44	19.21	2	42	17.90	2	50	20.75	2	36	14.57	2	44	17.49
151	胃癌	3	25	11.21	5	16	6.99	4	23	9.80	5	27	11.20	6	17	6.88	3	27	10.73
174	女性乳癌(1)	5	8	7.20	2	20	17.46	3	14	11.88	4	15	12.37	5	11	8.83	5	12	9.44
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.79	-	-	-	11	3	2.57	14	2	1.67	14	2	1.63	6	8	6.43
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.79	8	9	3.93	13	4	1.70	17	1	0.41	9	8	3.24	12	6	2.38
183	卵巢癌(1)	8	3	2.70	16	2	1.75	17	2	1.70	12	4	3.30	7	6	4.82	17	2	1.57
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	6	2.69	7	12	5.24	8	8	3.41	6	13	5.39	8	10	4.05	9	9	3.58
157	胰臟癌	11	5	2.24	10	6	2.62	6	13	5.54	9	9	3.73	15	4	1.62	8	13	5.17
	其他		55	24.66		58	25.33		58	24.72		50	20.75		65	26.30		72	28.62

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		293	115.33		342	133.30		302	116.51		314	120.54		306	117.01		357	135.62		373	140.72
162	肺癌	1	58	22.83	1	81	31.57	1	61	23.53	2	55	21.11	1	56	21.41	1	87	33.05	1	71	26.79
153 154	結腸直腸癌	3	39	15.35	3	34	13.25	4	27	10.42	3	41	15.74	3	41	15.68	4	33	12.54	2	52	19.62
155	肝癌	2	45	17.71	2	56	21.83	2	49	18.90	1	58	22.27	2	43	16.44	2	53	20.13	3	47	17.73
151	胃癌	5	21	8.27	4	30	11.69	5	26	10.03	6	19	7.29	7	24	9.18	4	33	12.54	4	33	12.45
174	女性乳癌(1)	4	18	14.00	5	12	9.23	3	19	14.43	4	13	9.80	4	15	11.22	3	19	14.08	5	16	11.74
185	攝護腺癌(2)	7	8	6.38	9	6	4.74	17	2	1.57	5	12	9.39	6	12	9.39	9	7	5.46	6	15	11.65
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	18	5	1.97	6	14	5.46	10	8	3.09	9	13	4.99	15	5	1.91	10	10	3.80	7	16	6.04
183	卵巢癌(1)	16	3	2.33	15	3	2.31	12	4	3.04	15	4	3.01	10	6	4.49	11	5	3.70	8	8	5.87
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	11	4.33	13	7	2.73	6	19	7.33	10	11	4.22	9	12	4.59	8	16	6.08	9	15	5.66
157	胰臟癌	12	7	2.76	6	14	5.46	7	11	4.24	8	14	5.37	12	9	3.44	6	19	7.22	9	15	5.66
	其他		78	30.70		85	33.13		76	29.32		74	28.41		83	31.74		75	28.49		85	32.07

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		366	137.51		365	136.57		364	135.33		376	137.75		418	150.45		403	143.20
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55	1	74	27.69	1	77	28.63	1	85	31.14	1	71	25.55	1	89	31.62
C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80	3	59	22.08	3	46	17.10	2	56	20.52	2	63	22.68	2	69	24.52
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28	2	60	22.45	2	48	17.85	3	37	13.56	3	56	20.16	3	55	19.54
C50	女性乳房癌(1)	3	21	15.32	4	16	11.60	4	20	14.37	4	19	13.43	4	23	15.95	4	20	13.67
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	6.97	6	9	6.96	5	11	8.48	5	16	12.17	7	10	7.48	5	15	11.10
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	-	-	-	13	4	2.90	8	8	5.75	13	4	2.83	5	17	11.79	6	11	7.52
C16	胃癌	5	25	9.39	5	21	7.86	6	21	7.81	6	21	7.69	8	20	7.20	7	21	7.46
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	8	5.83	8	8	5.80	10	6	4.31	9	6	4.24	6	11	7.63	8	8	5.47
C54	子宮體癌(1)	21	1	0.73	20	1	0.72	19	2	1.44	13	4	2.83	15	4	2.77	8	8	5.47
C25	胰臟癌	7	16	6.01	7	17	6.36	9	12	4.46	7	20	7.33	9	18	6.48	10	14	4.97
	其他		106	39.83		96	35.92		113	42.01		108	39.57		125	44.99		93	33.05

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		322	107.80		383	129.25		388	131.94		389	131.74		371	125.33		408	138.39
162	肺癌	1	74	24.77	1	76	25.65	1	88	29.93	1	75	25.40	1	82	27.70	1	92	31.20
155	肝癌	2	62	20.76	2	68	22.95	2	66	22.44	2	64	21.68	2	55	18.58	2	66	22.39
174	女性乳癌(1)	5	10	6.67	5	15	10.09	3	24	16.27	3	25	16.85	6	11	7.38	3	26	17.48
153 154	結腸直腸癌	4	28	9.37	3	50	16.87	4	38	12.92	4	42	14.22	3	42	14.19	4	43	14.58
185	攝護腺癌(2)	7	7	4.70	7	9	6.09	13	4	2.73	7	7	4.77	5	11	7.49	11	6	4.11
151	胃癌	3	29	9.71	4	40	13.50	5	34	11.56	5	41	13.89	3	42	14.19	5	32	10.85
183	卵巢癌(1)	9	6	4.00	12	5	3.36	7	7	4.75	8	6	4.04	17	2	1.34	18	2	1.34
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	9	3.01	8	15	5.06	9	12	4.08	11	10	3.39	10	12	4.05	7	15	5.09
157	胰臟癌	10	11	3.68	9	12	4.05	14	8	2.72	11	10	3.39	8	15	5.07	7	15	5.09
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	6	2.01	10	11	3.71	14	8	2.72	14	9	3.05	10	12	4.05	15	8	2.71
	其他		80	26.78		82	27.67		99	33.67		100	33.87		87	29.39		103	34.94

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		424	144.58		461	157.99		433	149.13		476	164.67		456	158.15		489	169.80		533	185.31
162	肺癌	1	86	29.32	1	85	29.13	1	97	33.41	1	120	41.51	1	99	34.33	1	101	35.07	1	113	39.29
155	肝癌	2	72	24.55	2	66	22.62	2	77	26.52	2	66	22.83	2	67	23.24	2	83	28.82	2	83	28.86
174	女性乳癌(1)	4	21	14.18	3	30	20.33	4	18	12.24	4	26	17.74	6	13	8.87	3	28	19.09	3	29	19.75
153 154	結腸直腸癌	3	51	17.39	4	58	19.88	3	50	17.22	3	56	19.37	2	67	23.24	4	54	18.75	4	55	19.12
185	攝護腺癌(2)	7	12	8.27	8	13	9.02	6	13	9.07	6	15	10.53	4	18	12.69	6	15	10.62	5	16	11.36
151	胃癌	5	34	11.59	5	44	15.08	5	31	10.68	5	32	11.07	5	32	11.10	5	39	13.54	6	29	10.08
183	卵巢癌(1)	8	8	5.40	10	6	4.07	17	2	1.36	8	9	6.14	15	4	2.73	8	9	6.14	7	14	9.53
200202203	非何杰金淋巴瘤	13	10	3.41	7	27	9.25	12	11	3.79	12	14	4.84	9	16	5.55	10	16	5.56	8	22	7.65
157	胰臟癌	14	9	3.07	11	11	3.77	8	16	5.51	11	15	5.19	7	22	7.63	12	15	5.21	9	21	7.30
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	12	4.09	11	11	3.77	7	18	6.20	7	24	8.30	9	16	5.55	7	19	6.60	10	19	6.61
	其他		109	37.17		110	37.70		100	34.44		99	34.25		102	35.38		110	38.20		132	45.89



表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		475	165.76		482	169.15		483	169.95		546	191.04		498	172.93		600	207.38
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15	1	114	40.01	1	99	34.83	1	125	43.74	1	107	37.15	1	114	39.40
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38	4	45	15.79	3	59	20.76	3	67	23.44	3	54	18.75	2	73	25.23
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82	2	86	30.18	2	71	24.98	2	74	25.89	2	71	24.65	3	70	24.19
C50	女性乳房癌(1)	4	27	18.43	3	24	16.44	4	20	13.71	4	27	18.36	4	22	14.84	4	30	20.12
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	15	10.71	5	15	10.79	6	11	7.96	12	6	4.32	5	14	10.02	5	19	13.55
C16	胃癌	5	33	11.52	6	29	10.18	5	32	11.26	5	34	11.90	6	27	9.38	6	33	11.41
C25	胰臟癌	8	18	6.28	7	28	9.83	7	21	7.39	6	31	10.85	7	18	6.25	6	33	11.41
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93	8	14	4.91	9	17	5.98	7	20	7.00	12	13	4.51	8	31	10.71
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	11	8	5.46	12	6	4.11	10	7	4.80	18	4	2.72	8	9	6.07	9	12	8.05
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	15	5.23	10	12	4.21	12	13	4.57	9	16	5.60	9	17	5.90	10	23	7.95
	其他		106	36.99		109	38.25		133	46.80		142	49.68		146	50.70		162	55.99

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		277	114.03		316	130.49		307	126.96		326	133.63		344	139.59		357	144.18
162	肺癌	2	52	21.41	1	74	30.56	1	72	29.78	1	66	27.05	1	77	31.24	1	76	30.69
155	肝癌	1	58	23.88	2	57	23.54	2	62	25.64	2	60	24.59	2	55	22.32	2	56	22.62
153 154	結腸直腸癌	5	18	7.41	5	24	9.91	4	30	12.41	3	40	16.40	3	39	15.83	3	43	17.37
174	女性乳癌(1)	3	19	15.73	4	14	11.61	5	10	8.29	5	11	9.01	4	16	12.93	4	17	13.65
151	胃癌	4	22	9.06	3	34	14.04	3	36	14.89	4	31	12.71	6	22	8.93	5	32	12.92
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.64	7	8	6.58	8	7	5.78	7	7	5.74	7	7	5.70	14	3	2.44
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	2.47	10	9	3.72	12	6	2.48	8	13	5.33	8	14	5.68	7	19	7.67
179 180	子宮頸癌(1)	6	8	6.62	6	10	8.29	5	10	8.29	9	6	4.91	5	12	9.70	6	12	9.64
157	胰臟癌	7	10	4.12	8	14	5.78	9	10	4.14	6	16	6.56	8	14	5.68	9	12	4.85
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.65	11	7	2.89	9	10	4.14	17	5	2.05	10	11	4.46	8	14	5.65
	其他		78	32.11		65	26.84		54	22.33		71	29.10		77	31.24		73	29.48

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		399	160.78		356	143.25		392	157.38		375	150.60		399	160.59		401	161.17		463	185.33
162	肺癌	1	88	35.46	1	84	33.80	1	86	34.53	1	81	32.53	1	78	31.39	1	92	36.98	1	106	42.43
155	肝癌	2	70	28.21	2	52	20.92	2	60	24.09	2	72	28.91	2	64	25.76	2	63	25.32	2	61	24.42
153 154	結腸直腸癌	4	37	14.91	3	42	16.90	3	45	18.07	3	42	16.87	3	52	20.93	3	46	18.49	3	59	23.62
174	女性乳癌(1)	5	17	13.59	8	9	7.17	5	15	11.90	5	13	10.30	5	16	12.67	6	12	9.47	4	19	14.89
151	胃癌	3	43	17.33	4	27	10.86	4	30	12.04	4	34	13.65	4	32	12.88	4	34	13.67	5	33	13.21
185	攝護腺癌(2)	7	8	6.50	6	10	8.13	6	10	8.13	6	9	7.33	6	13	10.64	7	8	6.56	6	15	12.28
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	13	5.24	7	19	7.65	8	13	5.22	11	11	4.42	8	16	6.44	8	15	6.03	7	26	10.41
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	7.19	5	12	9.56	16	4	3.17	7	8	6.34	9	8	6.34	5	13	10.25	8	9	7.05
157	胰臟癌	13	8	3.22	11	10	4.02	7	15	6.02	9	13	5.22	11	12	4.83	10	13	5.22	9	17	6.80
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	15	6.04	13	8	3.22	9	12	4.82	10	12	4.82	7	17	6.84	10	13	5.22	10	16	6.40
	其他		91	36.67		83	33.40		102	40.95		80	32.13		91	36.63		92	36.98		102	40.83

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		464	185.70		432	173.56		424	170.54		444	177.07		482	190.33		463	181.70
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82	1	84	33.75	1	97	39.01	1	92	36.69	1	97	38.30	1	95	37.28
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62	3	57	22.90	2	59	23.73	2	73	29.11	2	70	27.64	2	72	28.26
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81	2	59	23.70	5	45	18.10	4	55	21.93	3	61	24.09	3	54	21.19
C50	女性乳房癌	4	20	15.62	4	28	21.92	3	28	21.90	3	29	22.46	5	17	13.03	4	24	18.27
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	14	11.49	5	14	11.56	4	23	19.04	7	8	6.58	6	14	11.40	5	15	12.15
C00-C06, C09-C10,	口腔癌	10	13	5.20	7	20	8.04	9	15	6.03	8	16	6.38	8	16	6.32	6	28	10.99
C16	胃癌	6	27	10.81	6	27	10.85	6	23	9.25	5	29	11.57	4	44	17.37	7	21	8.24
C25	胰臟癌	8	19	7.60	8	17	6.83	8	17	6.84	6	17	6.78	7	21	8.29	8	18	7.06
C91-C95	白血病	14	9	3.60	13	10	4.02	15	6	2.41	15	7	2.79	11	12	4.74	9	16	6.28
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	19	7.60	11	13	5.22	10	14	5.63	11	10	3.99	11	12	4.74	10	15	5.89
	其他		120	48.03		103	41.38		97	39.01		108	43.07		118	46.60		105	41.21

## 伍、歷年主要癌症發生率



表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	247.37	216.08	34.38	28.83	38.69	35.97	34.08	29.37	26.82	22.51	16.02	12.04	12.32	11.68	4.68	4.05
85年	267.36	226.20	40.01	32.15	41.53	37.46	39.09	32.75	26.19	20.98	18.86	13.98	15.19	13.84	4.81	3.78
86年	266.91	220.52	37.80	29.26	44.42	39.08	36.72	30.44	26.25	20.38	21.40	15.83	12.86	11.45	5.70	4.54
87年	287.79	231.95	43.41	33.25	44.57	37.95	39.66	32.28	25.24	19.54	24.55	17.05	16.87	14.86	6.98	5.35
88年	306.62	268.49	43.38	36.36	46.89	42.54	42.84	38.20	24.29	20.45	29.10	23.72	18.40	16.97	6.95	5.66
89年	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90年	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91年	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92年	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93年	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94年	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95年	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26
96年	378.22	269.92	52.91	35.29	50.72	37.87	59.72	41.30	25.13	16.59	43.60	29.51	25.05	19.30	9.16	6.40
97年	419.14	290.36	57.04	37.19	53.42	38.00	70.42	48.07	26.67	16.95	55.16	34.93	28.80	21.56	9.99	6.85
98年	433.34	291.45	62.83	39.86	52.76	36.30	72.20	47.48	26.10	15.81	57.60	36.28	30.62	22.30	10.23	6.38
99年	456.61	303.85	61.07	38.75	54.41	37.43	80.47	53.22	26.61	15.61	58.37	36.42	28.59	20.26	9.82	6.30
<b>100年</b>	<b>451.05</b>	<b>299.70</b>	<b>63.31</b>	<b>39.63</b>	<b>53.90</b>	<b>36.30</b>	<b>79.13</b>	<b>52.15</b>	<b>25.62</b>	<b>15.72</b>	<b>59.08</b>	<b>37.28</b>	<b>31.10</b>	<b>21.88</b>	<b>11.20</b>	<b>7.18</b>

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.48	6.53	5.97	6.05	9.14	8.38	9.67	7.64	2.57	2.08	5.89	5.38	2.80	2.48	4.16	3.54
85年	6.34	5.59	5.50	5.29	8.93	8.13	10.46	8.09	1.91	1.53	4.73	4.10	3.36	3.18	3.21	2.99
86年	8.55	7.30	4.47	4.32	9.24	8.22	10.09	8.20	3.31	2.49	5.24	4.64	3.46	3.16	3.39	2.88
87年	7.06	5.71	5.37	5.20	7.29	6.22	12.66	9.50	2.91	2.31	5.98	5.06	2.53	2.46	3.61	2.86
88年	9.39	8.39	5.04	4.86	8.94	8.06	13.52	11.32	2.67	2.19	3.89	3.34	3.67	3.68	4.89	4.26
89年	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90年	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91年	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92年	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93年	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94年	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95年	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69
96年	10.96	7.94	9.78	8.19	10.02	7.85	11.19	7.32	4.07	2.78	6.18	4.67	3.13	2.59	4.07	2.97
97年	12.75	9.08	9.13	7.31	8.81	7.04	13.06	8.79	3.86	2.54	7.55	5.34	3.78	3.51	4.48	3.04
98年	11.19	7.77	9.84	7.76	10.00	7.84	13.41	8.28	3.57	2.21	6.51	4.63	3.25	2.95	4.60	3.33
99年	12.59	8.33	12.83	9.34	9.82	7.59	13.15	8.02	4.75	3.15	9.43	6.48	4.59	3.50	5.54	3.49
<b>100年</b>	<b>10.89</b>	<b>7.25</b>	<b>11.83</b>	<b>9.23</b>	<b>9.25</b>	<b>7.21</b>	<b>14.10</b>	<b>8.70</b>	<b>4.39</b>	<b>2.49</b>	<b>7.99</b>	<b>5.77</b>	<b>2.90</b>	<b>2.25</b>	<b>4.54</b>	<b>2.94</b>



表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	213.99	200.47	18.64	18.77	23.72	23.42	42.81	38.25	12.81	12.62	12.58	12.11	3.33	3.20	23.26	21.95
85年	249.83	225.27	19.40	18.26	28.26	27.09	47.28	40.79	15.28	14.93	14.66	13.20	3.67	3.49	26.58	24.20
86年	258.48	227.82	19.80	17.73	27.32	25.15	53.42	44.91	16.65	16.39	14.35	12.57	3.30	3.07	26.94	23.38
87年	282.48	240.29	21.06	18.80	31.62	27.55	55.26	45.34	16.12	14.77	12.39	10.47	3.34	2.97	24.48	20.76
88年	293.65	268.19	20.05	19.10	32.44	30.93	65.92	57.65	18.77	18.27	13.66	12.77	3.53	3.31	22.15	19.72
89年	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90年	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91年	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92年	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93年	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94年	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95年	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21
96年	328.84	236.19	32.11	22.18	48.16	33.66	92.48	66.76	19.53	13.51	14.06	9.49	5.62	3.78	12.06	8.53
97年	351.41	244.08	34.99	23.40	49.63	32.68	96.16	67.67	22.56	15.27	14.20	9.24	6.51	4.29	12.94	8.79
98年	396.37	269.25	43.95	28.41	54.34	35.37	109.65	76.05	21.68	13.79	15.29	9.64	8.54	5.54	14.11	9.59
99年	394.55	262.64	43.06	26.78	55.96	35.31	110.60	75.15	21.90	14.11	13.49	8.15	7.23	4.39	13.12	8.74
<b>100年</b>	<b>408.04</b>	<b>269.40</b>	<b>41.47</b>	<b>25.97</b>	<b>60.89</b>	<b>37.26</b>	<b>113.70</b>	<b>76.63</b>	<b>23.13</b>	<b>14.31</b>	<b>15.06</b>	<b>9.29</b>	<b>9.89</b>	<b>6.18</b>	<b>13.53</b>	<b>9.05</b>

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.20	6.62	2.88	3.04	1.89	1.99	4.24	4.19	4.32	4.50	2.88	2.27	2.05	2.09	3.11	3.03
85年	6.95	6.23	4.20	4.25	2.52	2.40	5.50	4.93	2.29	2.30	3.28	2.55	2.14	2.19	2.67	2.53
86年	7.60	6.52	2.53	2.68	2.30	2.04	6.60	5.96	2.46	2.17	3.61	3.02	1.84	1.92	4.22	3.86
87年	9.58	8.15	4.03	3.95	3.27	2.69	8.44	7.49	2.58	2.32	4.03	3.41	2.05	1.83	3.65	3.11
88年	9.54	8.62	3.00	3.06	2.10	2.08	6.76	6.17	2.18	2.16	3.23	2.73	2.25	2.13	5.41	5.18
89年	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90年	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91年	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92年	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93年	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94年	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95年	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67
96年	11.61	8.93	5.03	4.55	3.18	2.09	13.76	10.11	2.44	1.79	2.89	2.15	2.22	2.04	5.40	3.52
97年	12.35	9.00	5.25	4.19	3.85	2.48	16.79	11.52	3.55	2.64	3.40	2.60	2.96	2.61	5.18	3.21
98年	12.62	9.16	7.28	5.54	3.49	2.15	16.26	11.06	3.86	2.61	2.08	1.53	1.71	1.50	5.57	3.38
99年	13.79	9.96	6.19	4.66	4.20	2.58	19.76	13.57	3.83	2.44	3.02	2.13	2.51	2.17	4.65	2.88
<b>100年</b>	<b>14.11</b>	<b>10.06</b>	<b>6.47</b>	<b>5.33</b>	<b>4.00</b>	<b>2.33</b>	<b>18.77</b>	<b>12.58</b>	<b>3.49</b>	<b>2.31</b>	<b>2.69</b>	<b>2.02</b>	<b>3.27</b>	<b>2.62</b>	<b>5.24</b>	<b>3.05</b>

## 陸、附錄



## 【附錄 1】102 年臺北市十大死因出爐了 癌症續居首位，慢性疾病占了 7 項

102 年臺北市十大死因出爐了，惡性腫瘤仍續居首位，慢性疾病占了 7 項，每 100 人中有 66 人死於慢性疾病，十大死因除糖尿病標準化死亡率上升外，其餘均為下降，自殺則連續 6 年退出十大。十大癌症死因仍以肺癌蟬聯第一，口腔癌順位略升至第 8 名。

102 年臺北市民死亡人數為 1 萬 6,100 人，較 101 年減少 297 人(1.8%)；死亡率為每十萬人口 600.8 人，亦較 101 年減少 15.1 人(2.5%)，死亡者平均年齡為 74.6 歲，較全國 71.4 歲為高。如依 WHO 編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 326.3 人，較 101 年減少 18 人(5.2%)，並較全國標準化死亡率 435.3 人低，在全國 22 縣市中，僅高於金門縣，為死亡率第二低的縣市。

十大主要死因死亡人數占總死亡人數的 7 成 7，慢性疾病占了 7 項(占 66.0%)，惡性腫瘤(占 30.6%)仍居首位，其餘依序為 2.心臟疾病(占 12.9%)；3.腦血管疾病(占 7.5%)；4.肺炎(占 5.5%)；5.糖尿病(占 5.3%)；6.慢性下呼吸道疾病(占 3.6%)；7.高血壓性疾病(占 3.1%)；8.腎炎、腎病症候群及腎病變(占 3.0)；9.敗血症(占 2.9%)；10.事故傷害(占 2.5%)。與 101 年比較，僅排名順序異動，高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變各前進 1 名為第 7、8 名、敗血症退至第 9 名。

102 年臺北市十大主要死因標準化死亡率較 101 年增加者僅糖尿病(增 1.2%)1 項；其餘 9 項均為減少，分別為敗血症(減 21.9%)、腎炎、腎病症候群及腎病變(減 14.2%)、高血壓性疾病(減 10.3%)、事故傷害(減 7.1%)、肺炎(減 6.5%)、慢性下呼吸道疾病(減 5.8%)、惡性腫瘤(減 4.0%)、腦血管疾病(減 2.6%)、心臟疾病(減 1.0%)。

依性別觀察，102 年兩性死因前三名皆為惡性腫瘤、心臟疾病及腦血管疾病，與 101 年比較，順位皆無變動。死亡人數、死亡率及標準化死亡率，均呈男高於女，男性約為女性的 1.4~1.6 倍左右。男、女性標準化死亡率分別較 101 年下降 4.7%及 5.9%，男性除糖尿病、慢性下呼吸道疾病上升外，餘均呈下降；女性除心臟疾病、糖尿病上升外，其餘均呈下降，男性減幅最多為敗血症(減 15.3%)，腎炎、腎病徵候群及腎病變(減 12.6%)次之；女性減幅最多為敗血症(減 29.3%)，慢性下呼吸道疾病(減 19.3%)次之。

依年齡層觀察，102 年臺北市 15-24 歲青年死因前三名為事故傷害(占 37.63%)、自殺(占 20.43%)及惡性腫瘤(占 13.98%)；25-44 歲壯年則以惡性腫瘤(占 34.05%)為首、自殺(占 10.09%)及心臟疾病(占 10.09%)次之；45-64 歲中年仍以惡性腫瘤(占 47.77%)居首位、心臟疾病(占 11.35%)及腦血管疾病(占 5.74%)次之；65 歲以上老年則以惡性腫瘤(占 26.24%)、心臟疾病(占 13.61%)及腦血管疾病(占 8.31%)居前三名。

102 年臺北市民因自殺死亡人數為 261 人，較 101 年減少 72 人(21.6%)，其死亡人數依年齡層分以 45-64 歲占 42.91%最多，65 歲以上占 27.97%次之；若依自殺死亡方式區分，則以利用懸吊、絞勒及閉息死亡者占 29.5%最多。102 年自殺標準死亡率為每十萬人口 7.4 人，相較 101 年下降 24.6%，居 102 年臺北市主要死因第 12 順位，繼 97 年連續 6 年退出十大主要死因。

102 年臺北市民癌症死亡人數為 4,919 人，較 101 年減少 62 人，平均約每 1 小時 47 分鐘就有 1 位市民因癌症死亡；死亡率為每十萬人口 183.6 人，死亡者平均年齡為 70.4 歲，較全國 67.9 歲高；若經標準化之死亡率後為 107.0 人，較 101 年 111.5 人減少 4.0%，並較全國標準化死亡率 130.4 人低，且為全國各縣市中最低。十大癌症死因仍以肺癌居首，其他依序為 2.肝癌、3.結腸直腸癌、4.女性乳癌、5.攝護腺癌、6.胃癌、7.胰臟癌、8.口腔癌、9.卵巢癌、10.非何杰金氏淋巴瘤；與 101 年比較，口腔癌前進一名為第 8 名，卵巢癌退居第 9 名。

102 年臺北市十大癌症死因標準化死亡率較 101 年增加者有 2 項，分別為口腔癌(增 22.5%)及女性乳房癌(增 9.2%)；減少者有 8 項，減幅較多者為攝護腺癌(減 11.9%)。

若依性別觀察，102 年臺北市男性十大癌症死因除口腔癌及胰臟癌各前進一名、攝護腺癌及食道癌各後退一名外，其餘死因及順位與 101 年相同；男性標準化死亡率與 101 年比較，除口腔癌(增 23.0%)上升、白血病持平外，其餘均下降。女性十大癌症死因及順位亦與 101 年同；女性標準化死亡率較 101 年減少，除女性乳癌(增 9.2%)、子宮頸及部分未明示子宮癌(增 10.3%)、非何杰金氏淋巴瘤(增 19.2%)、白血病(增 4.8%)上升外，其餘均下降。

臺北市政府衛生局為降低癌症的威脅，提供婦女子宮頸抹片、乳房攝影檢查、大腸癌與口腔癌等 4 癌免費篩檢服務，及提供 40 歲以上市民血脂、血糖、血壓等免費三高篩檢，並在十二區健康服務中心皆成立糖尿病友支持團體，歡迎參加。凡設籍臺北市的市民更可透過申辦「台北卡」，只要在 103 年 7 月 31 日前完成癌症篩檢，或是篩檢陽性個案完成複診，可集點 20-300 點、或是設籍臺北市的糖尿病民眾參加「糖尿病人保健康」台北卡集點活動，即可集點 150 點兌換悠遊卡加值金(1 點即可兌換 1 元悠遊卡加值金)，活動詳情可洽臺北市十二區健康服務中心。除此，臺北市政府衛生局也呼籲民眾養成飲食均衡、少鹽少油多蔬果、每週運動至少 150 分鐘、不抽菸、定期篩檢的良好生活習慣，以降低罹癌與慢性病風險。

表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因

民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男性				女性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
	所有死亡原因	16,100	600.8	100.0	所有死亡原因	9,436	732.8	100.0	所有死亡原因	6,664	478.7	100.0
1	惡性腫瘤	4,919	183.6	30.6	惡性腫瘤	2,854	221.6	30.2	惡性腫瘤	2,065	148.3	31.0
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,075	77.4	12.9	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,252	97.2	13.3	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	823	59.1	12.3
3	腦血管疾病	1,210	45.2	7.5	腦血管疾病	699	54.3	7.4	腦血管疾病	511	36.7	7.7
4	肺炎	883	32.9	5.5	肺炎	575	44.7	6.1	糖尿病	432	31.0	6.5
5	糖尿病	860	32.1	5.3	慢性下呼吸道疾病	431	33.5	4.6	肺炎	308	22.1	4.6
6	慢性下呼吸道疾病	573	21.4	3.6	糖尿病	428	33.2	4.5	腎炎、腎病症候群及腎病變	246	17.7	3.7
7	高血壓性疾病	493	18.4	3.1	敗血症	274	21.3	2.9	高血壓性疾病	238	17.1	3.6
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	488	18.2	3.0	事故傷害	271	21.0	2.9	敗血症	192	13.8	2.9
9	敗血症	466	17.4	2.9	高血壓性疾病	255	19.8	2.7	慢性下呼吸道疾病	142	10.2	2.1
10	事故傷害	406	15.1	2.5	腎炎、腎病症候群及腎病變	242	18.8	2.6	事故傷害	135	9.7	2.0
	其他	3,727	139.1	23.1	其他	2,155	167.4	22.8	其他	1,572	112.9	23.6

資料來源：衛生福利部。



表2 ICD-10 臺北市10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	101年		102年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	344.3	所有死亡原因	326.3	-5.2
1	惡性腫瘤	111.5	惡性腫瘤	107.0	-4.0
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	40.2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	39.8	-1.0
3	腦血管疾病	22.9	腦血管疾病	22.3	-2.6
4	肺炎	15.5	肺炎	14.5	-6.5
5	糖尿病	16.6	糖尿病	16.8	1.2
6	慢性下呼吸道疾病	10.3	慢性下呼吸道疾病	9.7	-5.8
7	敗血症	10.5	高血壓性疾病	8.7	-10.3
8	高血壓性疾病	9.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.1	-14.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.6	敗血症	8.2	-21.9
10	事故傷害	11.3	事故傷害	10.5	-7.1

資料來源：衛生福利部。

### 表3 ICD-10 臺北市男性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	101年		102年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	429.8	所有死亡原因	409.6	-4.7
1	惡性腫瘤	138.0	惡性腫瘤	130.9	-5.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	54.5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	53.2	-2.4
3	腦血管疾病	28.6	腦血管疾病	28.2	-1.4
4	肺炎	20.1	肺炎	19.9	-1.0
5	慢性下呼吸道疾病	15.2	慢性下呼吸道疾病	15.3	0.7
6	糖尿病	18.2	糖尿病	18.4	1.1
7	敗血症	11.8	敗血症	10.0	-15.3
8	事故傷害	16.2	事故傷害	15.0	-7.4
9	高血壓性疾病	10.8	高血壓性疾病	9.8	-9.3
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	11.1	腎炎、腎病徵候群及腎病變	9.7	-12.6

資料來源：衛生福利部。

表4 ICD-10 臺北市女性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	101年		102年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	269.8	所有死亡原因	253.9	-5.9
1	惡性腫瘤	88.4	惡性腫瘤	86.2	-2.5
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	28.0	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	28.4	1.4
3	腦血管疾病	18.2	腦血管疾病	17.4	-4.4
4	糖尿病	15.4	糖尿病	15.6	1.3
5	肺炎	11.4	肺炎	9.5	-16.7
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.3	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.7	-15.5
7	高血壓性疾病	8.9	高血壓性疾病	7.7	-13.5
8	敗血症	9.2	敗血症	6.5	-29.3
9	慢性下呼吸道疾病	5.7	慢性下呼吸道疾病	4.6	-19.3
10	事故傷害	6.8	事故傷害	6.3	-7.4

資料來源：衛生福利部。

表5 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因

民國102年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男				女			
	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
	所有癌症死亡原因	4,919	183.6	100.0	所有癌症死亡原因	2,854	221.6	100.0	所有癌症死亡原因	2,065	148.3	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	988	36.9	20.1	氣管、支氣管和肺癌	610	47.4	21.4	氣管、支氣管和肺癌	378	27.2	18.3
2	肝和肝內膽管癌	700	26.1	14.2	肝和肝內膽管癌	485	37.7	17.0	結腸、直腸和肛門癌	273	19.6	13.2
3	結腸、直腸和肛門癌	631	23.5	12.8	結腸、直腸和肛門癌	358	27.8	12.5	女性乳房癌	264	19.0	12.8
4	女性乳房癌①	264	19.0	5.4	胃癌	189	14.7	6.6	肝和肝內膽管癌	215	15.4	10.4
5	前列腺(攝護腺)癌②	155	12.0	3.2	口腔癌	175	13.6	6.1	胃癌	126	9.1	6.1
6	胃癌	315	11.8	6.4	前列腺(攝護腺)癌	155	12.0	5.4	胰臟癌	108	7.8	5.2
7	胰臟癌	231	8.6	4.7	胰臟癌	123	9.6	4.3	卵巢癌	85	6.1	4.1
8	口腔癌	203	7.6	4.1	食道癌	110	8.5	3.9	子宮頸及部位未明示子宮癌	80	5.7	3.9
9	卵巢癌①	85	6.1	1.7	非何杰金氏淋巴瘤	80	6.2	2.8	非何杰金氏淋巴瘤	74	5.3	3.6
10	非何杰金氏淋巴瘤	154	5.7	3.1	白血病	70	5.4	2.5	白血病	43	3.1	2.1
	其他	1,193	44.5	24.3	其他	499	38.8	17.5	其他	419	30.1	20.3

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表6 ICD-10 臺北市10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	101年		102年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死因	111.5	所有癌症死因	107.0	-4.0
1	氣管、支氣管和肺癌	22.2	氣管、支氣管和肺癌	20.7	-6.8
2	肝和肝內膽管癌	16.1	肝和肝內膽管癌	15.4	-4.3
3	結腸、直腸和肛門癌	13.8	結腸、直腸和肛門癌	13.4	-2.9
4	女性乳房癌①	10.9	女性乳房癌①	11.9	9.2
5	前列腺(攝護腺)癌②	6.7	前列腺(攝護腺)癌②	5.9	-11.9
6	胃癌	6.8	胃癌	6.3	-7.4
7	胰臟癌	5.2	胰臟癌	4.9	-5.8
8	卵巢癌①	4.1	口腔癌	4.9	22.5
9	口腔癌	4.0	卵巢癌①	3.8	-7.3
10	非何杰金氏淋巴瘤	3.3	非何杰金氏淋巴瘤	3.2	-3.0

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

### 表7 ICD-10 臺北市男性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	101年		102年		
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	138.0	所有癌症死亡原因	130.9	-5.1
1	氣管、支氣管和肺癌	28.9	氣管、支氣管和肺癌	26.9	-6.9
2	肝和肝內膽管癌	24.3	肝和肝內膽管癌	23.4	-3.7
3	結腸、直腸和肛門癌	16.9	結腸、直腸和肛門癌	16.2	-4.1
4	胃癌	8.5	胃癌	7.8	-8.2
5	前列腺(攝護腺)癌	6.7	口腔癌	9.1	23.0
6	口腔癌	7.4	前列腺(攝護腺)癌	5.9	-11.9
7	食道癌	6.5	胰臟癌	5.6	-5.1
8	胰臟癌	5.9	食道癌	5.4	-16.9
9	非何杰金氏淋巴瘤	4.1	非何杰金氏淋巴瘤	3.4	-17.1
10	白血病	3.7	白血病	3.7	0.0

資料來源：衛生福利部。

表8 ICD-10 臺北市女性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	101年		102年		
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	88.4	所有癌症死亡原因	86.2	-2.5
1	氣管、支氣管和肺癌	16.3	氣管、支氣管和肺癌	15.4	-5.5
2	結腸、直腸和肛門癌	11.1	結腸、直腸和肛門癌	10.9	-1.8
3	女性乳房癌	10.9	女性乳房癌	11.9	9.2
4	肝和肝內膽管癌	9.1	肝和肝內膽管癌	8.7	-4.4
5	胃癌	5.3	胃癌	4.9	-7.5
6	胰臟癌	4.6	胰臟癌	4.3	-6.5
7	卵巢癌	4.1	卵巢癌	3.8	-7.3
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	2.9	子宮頸及部位未明示子宮癌	3.2	10.3
9	非何杰金氏淋巴瘤	2.6	非何杰金氏淋巴瘤	3.1	19.2
10	白血病	2.1	白血病	2.2	4.8

資料來源：衛生福利部。

## 【附錄2】ICD-10 新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較

表1.新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較

順位	新北市 2013				臺中市 2013				臺南市 2013				高雄市 2013			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	20,507	519.54	100.00	所有死亡原因	15,000	556.94	100.00	所有死亡原因	13,936	740.32	100.00	所有死亡原因	19,070	686.15	100.00
1	惡性腫瘤	6,333	160.45	30.88	惡性腫瘤	4,613	171.28	30.75	惡性腫瘤	4,226	224.50	30.32	惡性腫瘤	5,663	203.76	29.70
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,473	62.65	12.06	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,553	57.66	10.35	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,369	72.73	9.82	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,922	69.15	10.08
3	腦血管疾病	1,441	36.51	7.03	腦血管疾病	1,079	40.06	7.19	腦血管疾病	1,004	53.34	7.20	肺炎	1,278	45.98	6.70
4	糖尿病	1,278	32.38	6.23	糖尿病	953	35.38	6.35	肺炎	1,000	53.12	7.18	腦血管疾病	1,256	45.19	6.59
5	肺炎	1,036	26.25	5.05	事故傷害	731	27.14	4.87	糖尿病	945	50.20	6.78	糖尿病	1,168	42.03	6.12
6	慢性下呼吸道疾病	728	18.44	3.55	肺炎	700	25.99	4.67	事故傷害	609	32.35	4.37	事故傷害	813	29.25	4.26
7	事故傷害	679	17.20	3.31	慢性下呼吸道疾病	614	22.80	4.09	慢性下呼吸道疾病	558	29.64	4.00	慢性下呼吸道疾病	708	25.47	3.71
8	高血壓性疾病	608	15.40	2.96	高血壓性疾病	593	22.02	3.95	腎炎、腎病症候群及 腎病變	450	23.91	3.23	慢性肝病及肝硬化	573	20.62	3.00
9	腎炎、腎病症候群及 腎病變	599	15.18	2.92	腎炎、腎病症候群及 腎病變	463	17.19	3.09	高血壓性疾病	448	23.80	3.21	高血壓性疾病	523	18.82	2.74
10	慢性肝病及肝硬化	576	14.59	2.81	慢性肝病及肝硬化	458	17.01	3.05	慢性肝病及肝硬化	394	20.93	2.83	腎炎、腎病症候群及 腎病變	521	18.75	2.73
	其他	4,756	120.49	23.19	其他	3,243	120.41	21.62	其他	2,933	155.81	21.05	其他	4,645	167.13	24.36
11	蓄意自我傷害（自 殺）	554	14.04	2.70	蓄意自我傷害（自 殺）	340	12.62	2.27	蓄意自我傷害（自 殺）	316	16.79	2.27	敗血症	462	16.62	2.42
12	敗血症	442	11.20	2.16	敗血症	229	8.50	1.53	敗血症	249	13.23	1.79	蓄意自我傷害（自 殺）	451	16.23	2.36
13	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	217	5.50	1.06	衰老/老邁	131	4.86	0.87	衰老/老邁	183	9.72	1.31	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	152	5.47	0.80
14	血管性及未明示之癱 瘓症	174	4.41	0.85	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	124	4.60	0.83	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	96	5.10	0.69	衰老/老邁	146	5.25	0.77
15	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	162	4.10	0.79	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	115	4.27	0.77	帕金森病	95	5.05	0.68	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	116	4.17	0.61

資料來源：衛生福利部。



表2.新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較

順位	新北市 2013				臺中市 2013				臺南市 2013				高雄市 2013			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
1	惡性腫瘤	6,333	160.45	100.00	惡性腫瘤	4,613	171.28	100.00	惡性腫瘤	4,226	224.50	100.00	惡性腫瘤	5,663	203.76	100.00
2	氣管、支氣管和肺癌	1,327	33.62	20.95	氣管、支氣管和肺癌	870	32.30	18.86	肝和肝內膽管癌	815	43.30	19.29	肝和肝內膽管癌	1,178	42.39	20.80
3	肝和肝內膽管癌	1,024	25.94	16.17	肝和肝內膽管癌	821	30.48	17.80	氣管、支氣管和肺癌	776	41.22	18.36	氣管、支氣管和肺癌	1,061	38.18	18.74
4	結腸、直腸和肛門癌	713	18.06	11.26	結腸、直腸和肛門癌	521	19.34	11.29	結腸、直腸和肛門癌	588	31.24	13.91	結腸、直腸和肛門癌	678	24.39	11.97
5	女性乳房癌(1)	320	16.01	5.05	女性乳房癌(1)	242	17.84	5.25	女性乳房癌(1)	188	20.05	4.45	女性乳房癌(1)	255	18.31	4.50
6	胃癌	389	9.86	6.14	口腔癌	298	11.06	6.46	前列腺(攝護腺)癌(2)	114	12.07	2.70	口腔癌	387	13.92	6.83
7	口腔癌	360	9.12	5.68	前列腺(攝護腺)癌(2)	144	10.77	3.12	口腔癌	198	10.52	4.69	前列腺(攝護腺)癌(2)	130	9.37	2.30
8	胰臟癌	290	7.35	4.58	胃癌	201	7.46	4.36	胃癌	163	8.66	3.86	胃癌	234	8.42	4.13
9	前列腺(攝護腺)癌(2)	137	7.03	2.16	胰臟癌	192	7.13	4.16	胰臟癌	160	8.50	3.79	胰臟癌	202	7.27	3.57
10	食道癌	241	6.11	3.81	食道癌	183	6.79	3.97	膀胱癌	132	7.01	3.12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	100	7.18	1.77
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	92	4.60	1.45	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	70	5.16	1.52	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	63	6.72	1.49	食道癌	190	6.84	3.36
12	其他	1,440	22.75	22.74	其他	1,071	22.93	23.22	其他	1,029	35.22	24.35	其他	1,248	27.48	22.04
13	卵巢癌(1)	88	4.40	1.39	卵巢癌(1)	66	4.86	1.43	食道癌	126	6.69	2.98	卵巢癌(1)	77	5.53	1.36
14	非何杰金氏淋巴瘤	165	4.18	2.61	非何杰金氏淋巴瘤	118	4.38	2.56	非何杰金氏淋巴瘤	106	5.63	2.51	白血病	127	4.57	2.24
15	白血病	147	3.72	2.32	白血病	108	4.01	2.34	白血病	88	4.67	2.08	非何杰金氏淋巴瘤	113	4.07	2.00
16	鼻咽癌	100	2.53	1.58	膀胱癌	82	3.04	1.78	卵巢癌(1)	43	4.59	1.02	膀胱癌	99	3.56	1.75
17	子宮體癌(1)	47	2.35	0.74	腦癌	69	2.56	1.50	鼻咽癌	72	3.82	1.70	鼻咽癌	81	2.91	1.43

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

### 【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

表1.臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2013				全國 2013				日本 2012(平成24年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
1	所有死亡原因	16,100	600.78	100.00	所有死亡原因	154,374	661.28	100.00	所有死亡原因	1,256,359	997.45	100.00
2	惡性腫瘤	4,919	183.55	30.55	惡性腫瘤	44,791	191.87	29.01	惡性腫瘤	360,963	286.58	28.73
3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,075	77.43	12.89	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	17,694	75.79	11.46	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	198,836	157.86	15.83
4	腦血管疾病	1,210	45.15	7.52	腦血管疾病	11,313	48.46	7.33	肺炎	123,925	98.39	9.86
5	肺炎	883	32.95	5.48	糖尿病	9,438	40.43	6.11	腦血管疾病	121,602	96.54	9.68
6	糖尿病	860	32.09	5.34	肺炎	9,042	38.73	5.86	老邁	60,719	48.21	4.83
7	慢性下呼吸道疾病	573	21.38	3.56	事故傷害	6,619	28.35	4.29	事故傷害	41,031	32.58	3.27
8	高血壓性疾病	493	18.40	3.06	慢性下呼吸道疾病	5,959	25.53	3.86	自殺	26,433	20.99	2.10
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	488	18.21	3.03	高血壓性疾病	5,033	21.56	3.26	腎衰竭	25,107	19.93	2.00
10	敗血症	466	17.39	2.89	慢性肝病及肝硬化	4,843	20.75	3.14	慢性阻塞性肺病	16,402	13.02	1.31
11	事故傷害	406	15.15	2.52	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,489	19.23	2.91	肝臟疾病	15,980	12.69	1.27
12	其他	3,727	139.07	23.15	其他	35,153	150.58	22.77	其他	265,361	210.68	21.12
13	慢性肝病及肝硬化	310	11.57	1.93	蓄意自我傷害（自殺）	3,565	15.27	2.31	主動脈瘤及剝離	15,831	12.57	1.26
14	蓄意自我傷害（自殺）	261	9.74	1.62	敗血症	3,446	14.76	2.23	糖尿病	14,486	11.50	1.15
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	191	7.13	1.19	衰老/老邁	1,308	5.60	0.85	敗血症	11,486	9.12	0.91
16	帕金森病	155	5.78	0.96	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,266	5.42	0.82	原位及良性腫瘤	10,946	8.69	0.87
17	血管性及未明示之癡呆症	142	5.30	0.88	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,191	5.10	0.77	血管性及未明示之癡呆症	8,888	7.06	0.71

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2013				全國 2013				日本 2012(平成24年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	100	382.04	100.00	所有死亡原因	767	393.46	100.00	所有死亡原因	2,299	221.65	100.00
1	源於周產期的特定病況(1)	49	187.20	49.00	先天性畸形、變形及染色體異常	165	84.64	21.51	先天性畸形變形及染色體異常	815	78.57	35.45
2	先天性畸形變形及染色體異常	18	68.77	18.00	源於周產期的呼吸性疾患	115	58.99	14.99	源於周產期的特定病況	583	56.21	25.36
3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	12	45.85	12.00	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	50	25.65	6.52	源於周產期的呼吸和心臟血管疾患	314	30.27	13.66
4	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	3	11.46	3.00	嬰兒猝死症候群(SIDS)	48	24.62	6.26	嬰兒猝死症候群(SIDS)	144	13.88	6.26
5	事故傷害	3	11.46	3.00	事故傷害	45	23.08	5.87	事故傷害	93	8.97	4.05
6	加害(他殺)	1	3.82	1.00	特發於周產期的感染	31	15.90	4.04	源於周產期的特定病況	84	8.10	3.65
7	貧血	1	3.82	1.00	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	22	11.29	2.87	胎兒及新生兒出血及血液疾患	81	7.81	3.52
8	惡性腫瘤	1	3.82	1.00	母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	13	6.67	1.69	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	60	5.78	2.61
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	3.82	1.00	腦之其他疾患	10	5.13	1.30	妊娠期間及胎兒生長有關的疾患	59	5.69	2.57
10	慢性下呼吸道疾病	1	3.82	1.00	胎兒及新生兒出血及血液疾患	10	5.13	1.30	敗血症	53	5.11	2.31
	其他	10	38.20	10.00	其他	258	132.35	33.64	其他	13	1.25	0.57

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

附註：(1)源於周產期的特定病況包含胎兒及新生兒受母體因素和妊娠、產程[臨產]及分娩併發症的影響、妊娠期長短和胎兒生長有關的疾患、生產創傷、特發於周產期的呼吸和心臟血管疾患、特發於周產期的感染(症)、胎兒及新生兒出血和血液疾患、特發於胎兒及新生兒的短暫性內分泌和(新陳)代謝(性)疾患、胎兒和新生兒消化系統疾患、侵及(侵犯、涉及)胎兒及新生兒體被[被膜、皮膚]和體溫調節的病況。

表3. 少年（1-14歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2013				全國 2013				日本 2012(平成24年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	48	13.49	100.00	所有死亡原因	512	16.11	100.00	所有死亡原因	1,883	12.24	100.00
1	惡性腫瘤	13	3.65	27.08	惡性腫瘤	109	3.43	21.29	事故傷害	321	2.09	17.05
2	事故傷害	6	1.69	12.50	事故傷害	108	3.40	21.09	惡性腫瘤	296	1.92	15.72
3	加害（他殺）	2	0.56	4.17	先天性畸形變形及染色體異常	45	1.42	8.79	先天性畸形變形及染色體異常	227	1.48	12.06
4	肺炎	2	0.56	4.17	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	30	0.94	5.86	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	108	0.70	5.74
5	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1	0.28	2.08	腦血管疾病	12	0.38	2.34	肺炎	95	0.62	5.05
6	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.28	2.08	敗血症	11	0.35	2.15	自殺	75	0.49	3.98
7	胃及十二指腸潰瘍	1	0.28	2.08	加害（他殺）	10	0.31	1.95	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	58	0.38	3.08
8	敗血症	1	0.28	2.08	肺炎	6	0.19	1.17	敗血症	51	0.33	2.71
9	貧血	1	0.28	2.08	骨骼肌肉系統及結締組織之 疾病	6	0.19	1.17	腸道感染症	43	0.28	2.28
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.28	2.08	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	4	0.13	0.78	他殺	37	0.24	1.96
	其他	19	5	39.58	其他	171	5.38	33.40	其他	572	3.72	30.38

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2013				全國 2013				日本 2012(平成24年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	93	30.07	100.00	所有死亡原因	1,226	38.37	100.00	所有死亡原因	3,845	31.89	100.00
1	事故傷害	35	11.32	37.63	事故傷害	578	18.09	47.15	自殺	1,789	14.84	46.53
2	蓄意自我傷害（自殺）	19	6.14	20.43	蓄意自我傷害（自殺）	166	5.20	13.54	事故傷害	770	6.39	20.03
3	惡性腫瘤	13	4.20	13.98	惡性腫瘤	132	4.13	10.77	惡性腫瘤	337	2.79	8.76
4	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	4	1.29	4.30	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	52	1.63	4.24	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	171	1.42	4.45
5	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.65	2.15	加害（他殺）	16	0.50	1.31	腦血管疾病	54	0.45	1.40
6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	0.65	2.15	先天性畸形變形及染色體異常	15	0.47	1.22	先天性畸形變形及染色體異常	52	0.43	1.35
7	主動脈瘤及剝離	1	0.32	1.08	肺炎	14	0.44	1.14	肺炎	50	0.41	1.30
8	加害（他殺）	1	0.32	1.08	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	0.41	1.06	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	46	0.38	1.20
9	敗血症	1	0.32	1.08	腦血管疾病	9	0.28	0.73	他殺	18	0.15	0.47
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.32	1.08	敗血症	7	0.22	0.57	敗血症	13	0.11	0.34
	其他	14	5	15.05	其他	224	7.01	18.27	其他	545	4.52	14.17

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2013				全國 2013				日本 2012(平成24年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	555	67.38	100.00	所有死亡原因	8,967	120.82	100.00	所有死亡原因	24,419	73.82	100.00
1	惡性腫瘤	189	22.94	34.05	惡性腫瘤	2,376	32.01	26.50	自殺	7,336	22.18	30.04
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	56	6.80	10.09	事故傷害	1,220	16.44	13.61	惡性腫瘤	5,549	16.77	22.72
3	蓄意自我傷害（自殺）	56	6.80	10.09	蓄意自我傷害（自殺）	1,190	16.03	13.27	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,450	7.41	10.03
4	事故傷害	43	5.22	7.75	慢性肝病及肝硬化	787	10.60	8.78	事故傷害	2,224	6.72	9.11
5	慢性肝病及肝硬化	23	2.79	4.14	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	693	9.34	7.73	腦血管疾病	1,446	4.37	5.92
6	腦血管疾病	20	2.43	3.60	腦血管疾病	342	4.61	3.81	肝臟疾病	668	2.02	2.74
7	糖尿病	10	1.21	1.80	糖尿病	169	2.28	1.88	肺炎	315	0.95	1.29
8	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	8	0.97	1.44	肺炎	125	1.68	1.39	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	240	0.73	0.98
9	加害（他殺）	7	0.85	1.26	敗血症	91	1.23	1.01	糖尿病	208	0.63	0.85
10	敗血症	7	0.85	1.26	高血壓性 疾病	90	1.21	1.00	主動脈瘤及剝離	190	0.57	0.78
	其他	136	16.51	24.50	其他	1,884	25.38	21.01	其他	3,793	11.47	15.53

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2013				全國 2013				日本 2012(平成24年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	3,190	394.85	100.00	所有死亡原因	36,229	540.59	100.00	所有死亡原因	135,317	401.07	100.00
1	惡性腫瘤	1,524	188.64	47.77	惡性腫瘤	15,627	233.18	43.13	惡性腫瘤	60,788	180.17	44.92
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	362	44.81	11.35	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	3,450	51.48	9.52	心臟疾病(高血 壓性 疾病除外)	16,795	49.78	12.41
3	腦血管疾病	183	22.65	5.74	慢性肝病及肝硬化	2,212	33.01	6.11	腦血管疾病	10,502	31.13	7.76
4	糖尿病	125	15.47	3.92	事故傷害	1,996	29.78	5.51	自殺	9,250	27.42	6.84
5	慢性肝病及肝硬化	124	15.35	3.89	腦血管疾病	1,986	29.63	5.48	事故傷害	5,496	16.29	4.06
6	蓄意自我傷害(自殺)	112	13.86	3.51	糖尿病	1,831	27.32	5.05	肝臟疾病	4,821	14.29	3.56
7	事故傷害	86	10.64	2.70	蓄意自我傷害(自殺)	1,355	20.22	3.74	肺炎	3,475	10.30	2.57
8	高血壓性 疾病	55	6.81	1.72	肺炎	789	11.77	2.18	糖尿病	1,835	5.44	1.36
9	肺炎	49	6.07	1.54	腎炎、腎病症候群 及腎病變	666	9.94	1.84	主動脈瘤及剝離	1,636	4.85	1.21
10	腎炎、腎病症候群 及腎病變	46	5.69	1.44	高血壓性 疾病	643	9.59	1.77	腎衰竭	1,175	3.48	0.87
	其他	524	64.86	16.43	其他	5,674	84.66	15.66	其他	19,544	57.93	14.44

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表7.老年人口(65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2013				全國 2013				日本 2012(平成24年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	12,114	3406.34	100.00	所有死亡原因	106,673	4029.53	100.00	所有死亡原因	1,088,049	3,547.48	100.00
1	惡性腫瘤	3,179	893.90	26.24	惡性腫瘤	26,542	1002.61	24.88	惡性腫瘤	293,954	958.41	27.02
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,649	463.68	13.61	心臟疾病(高血壓 性 疾病除外)	13,447	507.96	12.61	心臟疾病(高血 壓 性 疾病除外)	179,209	584.29	16.47
3	腦血管疾病	1,007	283.16	8.31	腦血管疾病	8,960	338.46	8.40	肺炎	119,936	391.04	11.02
4	肺炎	827	232.54	6.83	肺炎	8,099	305.94	7.59	腦血管疾病	109,551	357.18	10.07
5	糖尿病	725	203.86	5.98	糖尿病	7,433	280.78	6.97	老邁	60,699	197.90	5.58
6	慢性下呼吸道疾病	542	152.41	4.47	慢性下呼吸道疾病	5,529	208.86	5.18	事故傷害	32,065	104.55	2.95
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	434	122.04	3.58	高血壓性 疾病	4,298	162.36	4.03	腎衰竭	23,843	77.74	2.19
8	高血壓性 疾病	433	121.76	3.57	腎炎、腎病症候群 及腎病變	3,736	141.13	3.50	慢性阻塞性 肺病	15,967	52.06	1.47
9	敗血症	420	118.10	3.47	敗血症	2,842	107.36	2.66	主動脈瘤及 剝離	13,997	45.64	1.29
10	事故傷害	233	65.52	1.92	事故傷害	2,672	100.93	2.50	糖尿病	12,429	40.52	1.14
	其他	2,665	749.37	22.00	其他	23,115	873.16	21.67	其他	226,399	738.15	20.81

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>



## 【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標

### 表1.臺北市行政區別衛生統計指標 — 人口統計

中華民國102年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km <sup>2</sup>	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km <sup>2</sup>	9,884	22,647	20,387	27,581	16,719	21,446	22,850	21,857	8,612	5,483	8,957	4,646	4,496
年底人口數	總計		2,686,516	210,343	228,496	313,363	228,753	163,140	129,820	193,480	271,341	119,752	282,842	289,742	255,444
	男性	人	1,289,945	99,484	109,662	146,933	106,998	78,206	63,576	95,823	130,887	58,603	135,718	140,361	123,694
	女性		1,396,571	110,859	118,834	166,430	121,755	84,934	66,244	97,657	140,454	61,149	147,124	149,381	131,750
	性比例		92.37	89.74	92.28	88.29	87.88	92.08	95.97	98.12	93.19	95.84	92.25	93.96	93.89
人口變動	出生數	人	26,710	1,803	2,298	2,759	2,481	1,513	1,351	2,071	2,647	1,385	2,946	2,807	2,649
	死亡數	人	16,379	1,247	1,430	1,841	1,379	967	934	1,658	1,541	703	1,304	1,815	1,560
	粗出生率	%	9.97	8.56	10.07	8.80	10.90	9.30	10.45	10.73	9.79	11.63	10.47	9.70	10.40
	粗死亡率	%	6.11	5.92	6.27	5.87	6.06	5.95	7.22	8.59	5.70	5.90	4.63	6.27	6.12
	人口增加率	%	4.97	-2.66	3.35	-0.20	9.24	6.08	7.85	4.42	7.54	10.65	10.06	2.94	4.93
	自然增加率	%	3.86	2.64	3.81	2.93	4.84	3.36	3.22	2.14	4.09	5.73	5.83	3.43	4.27
社會增加率	%	1.10	-5.31	-0.46	-3.13	4.36	2.71	4.59	2.27	3.42	4.87	4.18	-0.50	0.64	
生育率	一般生育率		37	32	38	34	41	36	40	42	36	42	37	37	39
	總生育率		1,205	1,085	1,180	1,140	1,265	1,200	1,230	1,275	1,210	1,290	1,220	1,185	1,240
	15-19歲		1	0	1	1	1	1	1	4	1	2	2	1	2
	20-24歲		13	11	11	8	13	8	16	18	12	14	12	16	18
	24-29歲	%	55	43	51	43	55	62	65	65	55	58	54	54	60
	30-34歲		102	95	99	102	110	101	97	103	105	111	104	99	100
	35-39歲		60	59	63	62	62	58	58	55	58	63	63	58	59
	40-44歲		10	9	11	11	12	10	8	10	10	9	9	9	9
45-49歲		0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	
人口組成 (年底)	14歲以下 (a)		383,601	32,557	29,511	48,159	29,359	27,230	17,904	22,781	40,653	16,663	43,033	39,026	36,725
	15-64歲 (b)	人	1,940,310	146,889	165,675	215,115	167,747	112,134	93,657	140,387	197,287	89,002	213,953	211,742	186,722
	65歲以上 (c)		362,605	30,897	33,310	50,089	31,647	23,776	18,259	30,312	33,401	14,087	25,856	38,974	31,997
人口組成結 構比(年底)	14歲以下		14.28	15.48	12.92	15.37	12.83	16.69	13.79	11.77	14.98	13.91	15.21	13.47	14.38
	15-64歲	%	72.22	69.83	72.51	68.65	73.33	68.73	72.14	72.56	72.71	74.32	75.64	73.08	73.10
	65歲以上		13.50	14.69	14.58	15.98	13.83	14.57	14.06	15.67	12.31	11.76	9.14	13.45	12.53
	扶養比(a+c)/b	%	38.46	43.20	37.92	45.67	36.37	45.49	38.61	37.82	37.54	34.55	32.20	36.84	36.80
老化指數c/a		94.53	94.90	112.87	104.01	107.79	87.32	101.98	133.06	82.16	84.54	60.08	99.87	87.13	

附註：生育率資料係因戶政資訊系統程式異常，致戶政統計資料無法正確執行，資料將延後發布。

表2.臺北市行政區別衛生統計指標—醫療資源

中華民國102年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家	39	6	2	5	4	3	2	5	2	1	3	1	5
	診所		3,342	293	259	733	448	261	173	198	184	77	229	304	183
	護產機構		115	16	7	15	20	11	7	4	6	2	7	11	9
	精神復建機構		48	2	1	5	9	4	2	3	3	2	3	5	9
	其他醫療及醫事機構		151	14	13	26	30	14	9	9	7	2	14	9	4
	非醫事機構		906	63	66	74	84	80	61	83	91	40	69	98	97
	藥商		11,021	1,044	1,006	1,639	1,790	1,053	824	540	489	333	1,054	742	507
病床數	總計	床	24,241	1,851	1,608	3,042	2,018	3,691	720	686	952	470	2,342	1,625	5,236
	醫院病床		20,660	1,410	1,427	2,217	1,371	3,370	525	523	844	429	2,121	1,385	5,038
	一般急性病床		14,372	789	970	1,674	858	2,357	383	238	580	280	1,566	919	3,758
	一般慢性病床		679	139	133	-	20	-	-	79	-	-	-	-	308
	特殊病床		5,609	482	324	543	493	1,013	142	206	264	149	555	466	972
	診所病床		3,581	441	181	825	647	321	195	163	108	41	221	240	198
醫事人力 (醫療及醫事機構)	總計	人	48,143	3,535	2,980	6,604	4,755	7,482	1,351	1,507	2,426	1,034	4,156	3,617	8,696
	醫師		12,555	905	824	1,974	1,272	1,929	366	439	681	239	1,054	1,043	1,829
	西醫師		8,869	532	532	1,248	870	1,557	206	256	457	149	770	712	1,580
	中醫師		843	79	68	143	99	83	70	61	48	22	50	69	51
	牙醫師		2,843	294	224	583	303	289	90	122	176	68	234	262	198
	藥事人員		5,411	489	423	739	715	620	273	284	285	154	487	390	552
	護產人員		24,143	1,678	1,371	2,942	2,212	4,005	559	602	1,164	527	2,083	1,736	5,264
	醫檢人員		3,228	225	143	506	277	637	98	62	118	63	296	180	623
其他	2,806	238	219	443	279	291	55	120	178	51	236	268	428		
平均 每萬人 醫療資源	醫院	家	0.15	0.29	0.09	0.16	0.17	0.18	0.15	0.26	0.07	0.08	0.11	0.03	0.20
	診所	家	12.44	13.93	11.33	23.39	19.58	16.00	13.33	10.23	6.78	6.43	8.10	10.49	7.16
	病床數	床	90.23	88.00	70.37	97.08	88.22	226.25	55.46	35.46	35.09	39.25	82.80	56.08	204.98
	醫事人員數	人	179.20	168.06	130.42	210.75	207.87	458.62	104.07	77.89	89.41	86.35	146.94	124.84	340.43
	醫師	人	46.73	43.02	36.06	62.99	55.61	118.24	28.19	22.69	25.10	19.96	37.26	36.00	71.60
	西醫師	人	33.01	25.29	23.28	39.83	38.03	95.44	15.87	13.23	16.84	12.44	27.22	24.57	61.85
	中醫師	人	3.14	3.76	2.98	4.56	4.33	5.09	5.39	3.15	1.77	1.84	1.77	2.38	2.00
	牙醫師	人	10.58	13.98	9.80	18.60	13.25	17.71	6.93	6.31	6.49	5.68	8.27	9.04	7.75
	藥事人員	人	20.14	23.25	18.51	23.58	31.26	38.00	21.03	14.68	10.50	12.86	17.22	13.46	21.61
	護產人員	人	89.87	79.77	60.00	93.88	96.70	245.49	43.06	31.11	42.90	44.01	73.65	59.92	206.07
	醫檢人員	人	12.02	10.70	6.26	16.15	12.11	39.05	7.55	3.20	4.35	5.26	10.47	6.21	24.39
其他	人	10.44	11.31	9.58	14.14	12.20	17.84	4.24	6.20	6.56	4.26	8.34	9.25	16.76	

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計

中華民國102年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	腦血管疾病		3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
	肺炎		4	5	4	4	4	3	5	5	4	4	5	5	5
	糖尿病		5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4
	慢性下呼吸道疾病		6	8	7	6	7	6	6	7	9	7	6	7	6
	高血壓性 疾病		7	7	10	8	6	9	9	6	6	9	11	8	7
	腎炎、腎病 症候群及腎病變		8	6	8	10	10	7	8	8	8	11	7	6	8
	敗血症		9	9	6	7	9	10	7	9	7	6	8	10	10
	事故傷害		10	10	9	9	8	8	10	11	10	10	9	9	11
十大死因 死亡率	所有死亡原因	人/每十 萬人口	600.78	588.25	624.68	589.03	592.87	548.43	687.47	830.86	560.07	578.40	469.74	625.26	596.90
	惡性腫瘤		183.55	184.69	195.95	185.71	180.94	152.48	218.07	240.35	149.08	189.72	143.20	207.38	181.70
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		77.43	65.99	75.40	85.83	75.98	74.39	96.66	111.37	74.35	71.36	57.21	71.89	80.84
	腦血管疾病		45.15	45.10	45.15	43.40	38.65	35.05	45.63	63.71	45.13	52.05	38.73	50.81	42.78
	肺炎		32.95	32.29	33.32	28.40	33.38	46.73	36.35	44.03	35.51	36.10	20.61	31.11	31.00
	糖尿病		32.09	33.23	30.69	27.76	28.55	28.90	37.89	45.58	33.66	26.86	23.45	36.64	34.93
	慢性下呼吸道疾病		21.38	18.52	21.48	22.97	22.84	19.06	24.75	29.53	16.65	16.79	19.90	20.05	24.33
	高血壓性 疾病		18.40	21.84	12.71	14.68	25.03	14.14	15.47	31.08	22.57	15.95	11.02	17.28	20.01
	腎炎、腎病 症候群及腎病變		18.21	23.74	21.48	13.72	14.49	19.06	19.33	23.31	19.98	10.91	13.50	21.43	17.66
	敗血症		17.39	16.14	21.48	17.87	15.81	12.91	22.43	22.27	21.83	17.63	13.15	14.17	15.70
事故傷害	15.15	11.87	14.47	14.04	22.84	14.76	12.37	21.76	14.43	11.75	12.08	15.90	14.52		

表3.臺北市行政區別衛生統計指標—ICD-10死因統計(續1)

中華民國102年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世 界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	326.27	288.15	320.26	265.06	320.24	264.45	383.25	409.75	319.09	365.11	340.25	351.82	352.92
	惡性腫瘤		106.98	101.25	107.17	94.86	103.00	79.50	124.15	128.59	93.22	128.04	105.15	122.24	113.59
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)		39.81	32.19	34.24	35.58	40.31	35.70	53.92	49.65	38.66	42.12	41.46	38.91	45.47
	腦血管疾病		22.34	20.54	19.20	16.86	19.42	16.61	23.66	28.28	24.50	29.15	26.89	26.94	22.80
	肺炎		14.46	15.94	13.20	8.98	15.08	15.18	20.13	21.54	17.02	19.21	17.63	20.04	19.01
	糖尿病		16.84	13.00	14.99	11.66	15.01	13.51	18.59	17.24	18.89	17.24	11.98	14.00	16.15
	慢性下呼吸道疾病		9.73	11.25	8.64	8.55	12.51	8.02	11.79	13.48	10.82	10.68	13.19	10.53	12.49
	高血壓性疾病		8.66	8.35	9.39	6.08	10.29	8.15	12.18	11.93	10.51	8.93	10.23	9.68	10.36
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		9.13	7.34	10.04	5.13	14.73	9.22	9.79	10.51	10.97	10.96	8.59	7.93	9.93
	敗血症		8.18	6.31	9.82	9.85	8.36	6.39	8.31	9.47	8.41	9.26	8.83	12.37	10.56
	事故傷害		10.47	6.10	5.83	5.16	7.41	4.99	10.28	13.41	9.53	10.07	8.73	7.08	7.95
十大死因 標準化 死亡率 區排名	所有死亡原因	區排名		10	7	11	8	12	2	1	9	3	6	5	4
	惡性腫瘤			9	6	10	8	12	3	1	11	2	7	4	5
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)			12	11	10	6	9	1	2	8	4	5	7	3
	腦血管疾病			8	10	11	9	12	6	2	5	1	4	3	7
	肺炎			8	11	12	10	9	2	1	7	4	6	3	5
	糖尿病			10	7	12	6	9	2	3	1	4	11	8	5
	慢性下呼吸道疾病			6	10	11	3	12	5	1	7	8	2	9	4
	高血壓性疾病			10	8	12	5	11	1	2	3	9	6	7	4
	腎炎、腎病症候 群及腎病變			11	5	12	1	8	7	4	2	3	9	10	6
	敗血症			12	4	3	9	11	10	5	8	6	7	1	2
	事故傷害			9	10	11	7	12	2	1	4	3	5	8	6

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續2完)

中華民國102年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	全部	人/每十 萬人口	600.78	588.25	624.68	589.03	592.87	548.43	687.47	830.86	560.07	578.40	469.74	625.26	596.90
	0歲		362.67	204.97	591.72	346.86	83.46	378.91	205.97	465.66	360.43	496.45	267.96	441.20	486.53
	1-4歲		15.23	12.25	-	32.55	11.52	-	18.96	-	9.41	-	26.69	18.58	29.60
	5-14歲		12.76	-	32.89	6.05	11.05	-	27.02	7.59	14.65	9.88	20.82	19.72	8.38
	15-24歲		30.07	13.04	42.81	26.90	32.96	22.47	27.75	52.25	27.27	20.88	29.15	35.18	26.36
	25-44歲		67.38	62.47	63.66	41.53	91.55	33.77	56.06	76.55	76.42	81.86	64.74	82.56	68.76
	45-64歲		394.85	324.75	377.61	328.44	379.17	343.31	509.49	582.64	338.27	420.08	386.81	447.08	395.89
	65歲以上		3,406.34	3,254.23	3,327.00	2,992.18	3,218.94	3,017.08	3,679.58	4,000.80	3,525.86	3,637.68	3,582.18	3,427.04	3,642.86
年齡別 死亡率 區排名	全部	區排名		8	4	7	6	11	2	1	10	9	12	3	5
	0歲			11	1	8	12	6	10	4	7	2	9	5	3
	1-4歲			6	9	1	7	9	4	9	8	9	3	5	2
	5-14歲			11	1	10	6	11	11	9	5	11	3	4	8
	15-24歲			12	2	8	4	10	6	1	7	12	5	3	9
	25-44歲			9	8	11	1	12	10	4	5	3	7	2	6
	45-64歲			12	8	11	7	9	2	1	10	4	6	3	5
	65歲以上			9	8	12	10	11	2	1	6	4	5	7	3

## 【附錄 5】主要名詞解釋與公式

本死因統計摘要係依據世界衛生組織所公告之「國際疾病與死因分類標準第十版 (ICD-10)」加註死因碼，所統計之死因為原死因 (Underlying causes of death)。

### 一、原 (肇始) 死因

死亡證明書上所填之死因係指所有導致死亡或與死亡相關的疾病、罹病狀況、或是造成這些傷害的意外或暴力環境等。

原死因係指(a)可引起一連串病症而導致直接死亡之疾病或傷害；(b)造成致命傷害之事故或暴力之環境。

### 二、孕產婦死亡

孕產婦死亡係指在懷孕期間或懷孕終止後 42 天內之婦女死亡，而不論其懷孕期長短或懷孕的位置為何；或任何與懷孕有關或因懷孕而加重之原因所導致之死亡。但不包括因事故或偶發原因所致之死亡。

孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數 \* 100,000。

### 三、嬰兒死亡

嬰兒死亡係指嬰兒出生後未滿一歲之死亡數。

嬰兒死亡率 = 嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數 \* 1,000。

#### 四、新生兒死亡

新生兒死亡係指係指嬰兒出生後，在未滿四週（28天）內之死亡數。

新生兒死亡率 = 新生兒死亡數 / 活產嬰兒數 \* 1,000。

#### 五、年齡別死亡率

年齡別死亡率 = 年齡別死亡數 / 該年齡別年中人口數 \* 100,000。

#### 六、標準化死亡率

標準化死亡率是將兩國或兩地不同性別、年齡、城鄉、所得、職業、婚姻、種族等項組合，化成為同一的基礎，用以剔除其人口在組合上之差異，俾可受到純正而客觀的比較。本書刊所用的標準化死亡率是指去除年齡組成影響、以 WHO 2000 年世界人口結構為基準的死亡率。

標準化死亡率 =  $\left[ \sum (\text{年齡別死亡率} * \text{標準組年齡別人口數}) \right] / \text{標準組總人口數}$ 。