

中華民國 104 年
臺北市死因統計年報

臺北市政府衛生局編印

中華民國 105 年 10 月出版

凡 例

- 一、本年報編印之目的，係提供臺北市死因統計，以提供政府施政及學術研究之參考。
- 二、本年報內容計分：(一) 提要分析 (二) 人口統計指標 (三) 104 年死因統計 (四) 歷年死因統計 (五) 歷年主要癌症發生率等 5 類，凡 64 表；另附錄 7 表。
- 三、部分資料因尾數四捨五入，計算時仍以原始數據計算，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。
- 四、本年報各表所稱「年」係指全年；「年底」係指當年 12 月底。
- 五、本年報所用符號代表意義如下：
「—」經統計但無數據；「- -」有數值，但該數值無意義；「…」數值不明或尚未產生資料；「0」代表有數值而不及半單位；「①」修正數。

目次

凡例

壹、提要分析

貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別.....	1
表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數.....	3
表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性.....	4
表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性.....	5
表F·臺北市各行政區年底人口數.....	6
表G·臺北市近十年各行政區年底人口數.....	7
表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	8
表I·臺北市近十年各行政區年中人口數.....	9

參、104年死因統計

一、主要死因統計

表 1·臺北市、全國主要死亡原因比較.....	11
表 2·ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3·ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

目 次

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因.....	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因.....	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因.....	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因.....	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因.....	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因.....	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因.....	23
表14 · ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因.....	24
表15 · ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因.....	25
表16 · ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因.....	26
表17 · ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因.....	27
表18 · ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因.....	28
表19 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因.....	29
表20 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因.....	30
表21 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式.....	31
表22 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式.....	32
表23 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式.....	33
表24 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因.....	34
表25 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況.....	35
表26 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	36
表27 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	37

目 次

二、行政區別死因統計

表28-1~28-12·ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	39
表29-1~29-12·ICD-10 臺北市十二區事故傷害死亡原因.....	51
表30-1~30-12·ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	63
表31-1~31-12·ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	75

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表32·臺北市歷年主要死亡原因.....	87
表33·臺北市歷年男性主要死亡原因.....	90
表34·臺北市歷年女性主要死亡原因.....	93
表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	96
表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	97
表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因.....	98
表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因.....	101
表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因.....	104
表40·臺北市歷年自殺死亡方式.....	107
表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	110
表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	113
表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	116
表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	118
表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	120

目 次

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因	122
表47· 臺北市歷年男性主要癌症死亡原因	125
表48· 臺北市歷年女性主要癌症死亡原因	128
表49· 臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	131
表50· 臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	133
表51· 臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	135
二、行政區別死因統計	
表52-1~52-12· 臺北市十二區歷年主要死亡原因	137
表53-1~53-12· 臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因	173
伍、歷年主要癌症發生率	
表54· 臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	209
表55· 臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	211
陸、附錄	
【附錄1】104年臺北市十大死因出爐了癌症續居首位，慢性疾病占了7項	213
【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較.....	225
【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較.....	229
【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標.....	236
【附錄5】主要名詞解釋與公式.....	241


壹、提要分析

104 年臺北市主要死因提要說明

一、標準化死亡率較上年減少 2.1%，較 95 年則減少 10.8%

104 年臺北市市民死亡人數 1 萬 7,160 人，平均每 31 分鐘就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 634.7 人，分別較 103 年增加 5.5 人、0.9%；如依世界衛生組織(W.H.O.)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 325.6 人，較上年減少 2.1%，較 95 年則減少 10.8%。若與全國相較，104 年臺北市標準化死亡率較全國標準化死亡率每十萬人口 431.5 人低 24.5%，並在全國 22 縣市中，僅高於連江縣，為死亡率第二低的縣市。

依近 10 年資料觀察，剔除人口結構因素影響後臺北市市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則反之，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。(詳圖 1)




二、臺北市市民十大死因惡性腫瘤蟬連榜首

104 年臺北市市民十大死因中惡性腫瘤仍蟬居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病、敗血症、事故傷害；十大死因之死亡人數占總死亡人數 75.9%，其中仍以惡性腫瘤占 29.3% 最多，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 13.9% 次之，腦血管疾病占 6.7% 居三。(詳表 1、圖 2)

表 1 ICD-10 104 年臺北市十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	17,160	100.0
1	惡性腫瘤	5,025	29.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,381	13.9
3	腦血管疾病	1,153	6.7
4	肺炎	1,125	6.6
5	糖尿病	773	4.5
6	慢性下呼吸道疾病	636	3.7
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	565	3.3
8	高血壓性疾病	463	2.7
9	敗血症	462	2.7
10	事故傷害	435	2.5
	其他	4,142	24.1



三、死亡年齡平均數較 95 年增加 5.1 歲

104 年臺北市民死亡年齡平均數為 75.3 歲，較全國高 3.3 歲，與 95 年比較則增加 5.1 歲，其中男性死亡年齡平均數為 74.2 歲，女性為 76.8 歲，男性較女性低 2.6 歲；十大死因中死亡年齡平均數以慢性下呼吸道疾病 84.6 歲最高，肺炎 83.6 歲次之，最低為事故傷害 62.5 歲。

若以死亡年齡中位數來看，104 年臺北市民死亡年齡中位數為 80 歲，較全國高 4 歲，與 95 年比較則增加 4 歲，其中男性死亡年齡中位數為 78 歲，女性為 81 歲，男性較女性低 3 歲；十大死因中死亡年齡中位數以慢性下呼吸道疾病 87 歲最高，肺

炎 86 歲次之，最低為事故傷害 67 歲。(詳表 2)

表 2 ICD-10 104 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

單位：歲

死因別	所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	腦血管疾病	肺炎	糖尿病	慢性下呼吸道疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	敗血症	事故傷害	
												死亡年齡平均數
死亡年齡平均數	兩性	75.3	70.9	77.8	78.8	83.6	77.8	84.6	79.6	81.1	81.8	62.5
	男性	74.2	71.2	75.6	77.0	82.8	75.1	84.4	78.6	77.2	81.1	60.1
	女性	76.8	70.5	81.1	81.2	84.7	80.9	85.1	80.6	85.2	82.8	68.0
死亡年齡中位數	兩性	80	72	81	82	86	80	87	83	84	85	67
	男性	78	72	79	80	86	78	86	82	80	84	65
	女性	81	72	84	84	87	83	88	83	87	85	73


四、臺北市男性十大死因與上年同，僅順位改變

104 年臺北市男性死亡人數為 9,932 人，死亡率為每十萬男性人口 766.6 人，較上年增加 0.03%；標準化死亡率為每十萬男性人口 414.3 人，較上年減少 2.0%，較 95 年則減少 7.0%。

104 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、慢性下呼吸道疾病、糖尿病、事故傷害、敗血症、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 76.6%，其中仍以惡性腫瘤占 28.7% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 14.2%。(詳表 3、圖 3)

表 3 ICD-10 104 年臺北市男性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	9,932	100.0
1	惡性腫瘤	2,855	28.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,415	14.2
3	肺炎	685	6.9
4	腦血管疾病	667	6.7
5	慢性下呼吸道疾病	470	4.7
6	糖尿病	413	4.2
7	事故傷害	303	3.1
8	敗血症	285	2.9
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	282	2.8
10	高血壓性疾病	237	2.4
	其他	2,320	23.4




五、臺北市女性十大死因與上年比較，血管性及未明示之癡呆症躍居 10 大

104 年臺北市女性死亡人數為 7,228 人，死亡率為每十萬女性人口 513.3 人，較上年增加 2.1%；標準化死亡率為每十萬女性人口 250.2 人，較上年減少 1.6%，較 95 年則減少 13.3%。

104 年女性十大死因之首亦為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病、敗血症及血管性及未明示之癡呆症；女性十大死因死亡人數占女性總死亡人數 75.6%，其中亦以惡性腫瘤占 30.0% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 13.4%。(詳表 4、圖 4)

表 4 ICD-10 104 年臺北市女性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	7,228	100.0
1	惡性腫瘤	2,170	30.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	966	13.4
3	腦血管疾病	486	6.7
4	肺炎	440	6.1
5	糖尿病	360	5.0
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	283	3.9
7	高血壓性疾病	226	3.1
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	185	2.6
9	敗血症	177	2.4
10	血管性及未明示之癡呆症	171	2.4
	其他	1,764	24.4



六、嬰兒(未滿1歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占5成3

104年臺北市未滿1歲嬰兒死亡人數為137人，死亡率為每十萬人口474.6人，分別較上年增加27人、增加25.9%。男嬰死亡率為每十萬人口519.6人，較上年增加11.0%；女嬰死亡率為425.9人，較上年增加51.4%。嬰兒主要死因前3項分別為(1)源於周產期的特定病況73人占53.3%，(2)先天性畸形變形及染色體異常24人占17.5%，(3)事故傷害6人占4.4%，3者合占嬰兒死亡人數的75.2%。

七、少年(1-14歲)惡性腫瘤居首位死因，占1成4

104年臺北市1-14歲少年死亡人數為29人，死亡率為每十萬人口8.2人，分別較上年減少21人、41.4%。少年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤4人占13.8%，(2)事故傷害3人占10.3%，(3)加害(他殺)、先天性畸形變形及染色體異常、肺炎各2人，分占6.9%，5者合占少年死亡人數的44.8%。

八、青年(15-24歲)事故傷害仍居死因首位，占3成2

104年臺北市15-24歲青年死亡人數為84人，死亡率為每十萬人口28.0人，分別較上年減少15人、14.1%。青年主要死因前3項分別為(1)事故傷害27人占32.1%，(2)惡性腫瘤14人占16.7%，(3)蓄意自我傷害(自殺)13人占15.5%，3者合占青年死亡人數的64.3%。

九、壯年(25-44歲)死因之前二位為惡性腫瘤、蓄意自我傷害(自殺)

104年臺北市25-44歲壯年死亡人數為589人，死亡率為每十萬人口71.9人，分別較上年減少49人、7.2%。壯年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤176人占29.9%，(2)蓄意自我傷害(自殺)85人占14.4%，(3)事故傷害71人占12.1%，3者合占壯年死亡人數的56.4%。

十、中年(45-64歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占4成7

104年臺北市45-64歲中年死亡人數為3,203人，死亡率為每十萬人口393.4人，分別較上年增加16人、0.3%。中年主要

死因前3項分別為(1)惡性腫瘤 1,489 人占 46.5%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 385 人占 12.0%，(3)腦血管疾病 165 人占 5.2%，3 者合占中年死亡人數的 63.7%。

十一、老年(65-79 歲)死亡率以惡性腫瘤為首，占 3 成 9

104 年臺北市 65-79 歲老年死亡人數為 4,447 人，占總死亡人數的 25.9%，死亡率為每十萬人口 1,551.3 人，較上年減少 3.6%。65-79 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,720 人占 38.7%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 609 人占 13.7%，(3)腦血管疾病 287 人占 6.5%，3 者合占 65-79 歲老年死亡人數的 58.9%。


十二、老年(80 歲以上)死亡率亦以惡性腫瘤為首，占 1 成 9

104 年臺北市 80 歲以上老年死亡人數為 8,671 人，占總死亡人數的 50.5%，死亡率為每十萬人口 8,402.9 人，較上年減少 0.2%。80 歲以上老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,622 人占 18.7%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)1,325 人占 15.3%，(3)肺炎 849 人占 9.8%，3 者合占 80 歲以上老年死亡人數的 43.8%。

十三、12 行政區以萬華區標準化死亡率最高，大同區次之

104 年臺北市 12 行政區死亡率以萬華區每十萬人口 882.1 人最高，大同區 753.0 人次之，內湖區 496.4 人最低；標準化後萬華區每十萬人口 412.1 人仍為最高，大同區 401.0 人次之，大

安區 259.4 人最低。(詳圖 5)



十四、惡性腫瘤(癌症)

(一)「氣管、支氣管和肺癌」、「結腸、直腸和肛門癌」、「肝和肝內膽管癌」續居癌症死因前三位

104 年臺北市惡性腫瘤死亡人數為 5,025 人，占總死亡人數之 29.3%，死亡率為每十萬人口 185.9 人，較上年增加 2.1%；標準化死亡率為每十萬人口 102.8 人，較上年則減少 0.9%，較 95 年亦減少 13.5%。


104 年臺北市十大癌症死因中氣管、支氣管和肺癌仍居榜首，其次依序為結腸、直腸和肛門癌、肝和肝內膽管癌、女性

乳房癌、前列腺(攝護腺)癌、胃癌、胰臟癌、口腔癌、非何杰金氏淋巴瘤、卵巢癌；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數 75.0%，其中氣管、支氣管和肺癌占 19.6%最多，結腸、直腸和肛門癌占 13.7 次之，肝和肝內膽管癌占 13.3%再次之。(詳表 5、圖 6)

表 5. ICD-10 104 年臺北市十大癌症死因

單位：人、%

順位	癌症死因	死亡人數	死亡百分比
	所有癌症死因	5,025	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	984	19.6
2	結腸、直腸和肛門癌	686	13.7
2	肝和肝內膽管癌	667	13.3
4	女性乳房癌	288	5.7
5	前列腺(攝護腺)癌	163	3.2
6	胃癌	295	5.9
7	胰臟癌	273	5.4
8	口腔癌	183	3.6
9	非何杰金氏淋巴瘤	153	3.0
10	卵巢癌	77	1.5
	其他	1,256	25.0



(二) 男性癌症標準化死亡率較上年減少 0.5%、女性則減少 0.6%，惟男性癌症標準化死亡率仍為女性的 1.5 倍

104 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性為 2,855 人，女性為 2,170 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 127.1 人、每十萬女性人口 82.6 人，男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性增加 1.1%、女性增加 4.4%，標準化死亡率男性則減少 0.5%，女性亦減少 0.6%。

104 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 70.9 歲，較全國高 2.5 歲，與 95 年比較則增加 2.0 歲，其中男性死亡年齡平均數為 71.2 歲，女性為 70.5 歲。104 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平

均數以前列腺(攝護腺)癌 81.3 歲最高，胃癌 73.8 歲次之，最低為卵巢癌 61.1 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，104 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 72 歲，較全國高 3 歲，與 95 年相同，其中男性死亡年齡中位數為 72 歲，女性為 72 歲。104 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡中位數以前列腺(攝護腺)癌 83 歲最高，非何杰金氏淋巴瘤 76 歲次之，最低為卵巢癌 59 歲。(詳表 6)

表 6. ICD-10 104 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數
單位：歲

死因別		所有癌症死因	氣管、支氣管和肺癌	結腸、直腸和肛門癌	肝和肝內膽管癌	女性乳房癌	前列腺(攝護腺)癌	胃癌	胰臟癌	口腔癌	非何杰金氏淋巴瘤	卵巢癌
死亡年齡平均數	兩性	70.9	72.3	73.2	71.2	62.9	81.3	73.8	70.9	61.9	72.3	61.1
	男性	71.2	72.5	72.8	69.3	--	81.3	74.4	68.8	60.7	72.1	--
	女性	70.5	71.8	73.7	74.6	62.9	--	72.8	73.2	71.1	72.6	61.1
死亡年齡中位數	兩性	72	74	75	72	62	83	75	71	61	76	59
	男性	72	74	75	69	--	83	75	69.5	61	75	--
	女性	72	74	75	76	62	--	74.5	75	71	76	59

貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別

中華民國104年

項 目	單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積	平方公里	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度	人/平方公里	9,951	22,580	20,451	27,555	16,909	21,358	23,045	21,954	8,739	5,597	9,106	4,661	4,538
年底人口數	人	2,704,810	209,714	229,211	313,058	231,350	162,475	130,929	194,339	275,367	122,245	287,566	290,694	257,862
男性		1,295,462	98,853	109,806	146,483	107,979	77,598	63,996	95,916	132,457	59,710	137,719	140,453	124,492
女性		1,409,348	110,861	119,405	166,575	123,371	84,877	66,933	98,423	142,910	62,535	149,847	150,241	133,370
性比例		91.92	89.17	91.96	87.94	87.52	91.42	95.61	97.45	92.69	95.48	91.91	93.49	93.34
出生數	人	28,987	1,962	2,475	2,951	2,461	1,679	1,455	2,200	3,006	1,490	3,321	3,100	2,887
粗出生率	‰	10.72	9.34	10.79	9.42	10.66	10.30	11.11	11.31	10.95	12.24	11.58	10.67	11.20
死亡數	人	17,106	1,299	1,470	1,942	1,399	1,112	1,010	1,732	1,594	725	1,415	1,782	1,626
粗死亡率	‰	6.33	6.18	6.41	6.20	6.06	6.82	7.71	8.90	5.80	5.95	4.94	6.13	6.31
人口增加率	‰	0.92	-3.61	-1.94	-2.03	3.70	-5.60	-0.34	-1.93	5.26	8.11	6.28	0.82	1.33
自然增加率		4.39	3.16	4.38	3.22	4.60	3.48	3.40	2.41	5.14	6.28	6.65	4.54	4.89
社會增加率		-3.47	-6.77	-6.32	-5.25	-0.90	-9.08	-3.73	-4.34	0.12	1.83	-0.37	-3.71	-3.57
14歲以下年底人口數(a)	人 比重(%)	377,428 13.95	31,616 15.08	28,995 12.65	47,240 15.09	29,228 12.63	26,432 16.27	17,771 13.57	22,641 11.65	39,841 14.47	16,844 13.78	42,363 14.73	38,251 13.16	36,206 14.04
15-64歲年底人口數(b)	人 比重(%)	1,928,200 71.29	144,191 68.76	163,607 71.38	211,030 67.41	166,760 72.08	110,438 67.97	93,331 71.28	139,223 71.64	198,799 72.19	89,647 73.33	215,842 75.06	209,286 72.00	186,046 72.15
65歲以上年底人口數(c)	人 比重(%)	399,182 14.76	33,907 16.17	36,609 15.97	54,788 17.50	35,362 15.29	25,605 15.76	19,827 15.14	32,475 16.71	36,727 13.34	15,754 12.89	29,361 10.21	43,157 14.85	35,610 13.81
扶養比 (a+c)/b	%	40.28	45.44	40.10	48.35	38.73	47.12	40.28	39.59	38.52	36.36	33.23	38.90	38.60
扶幼比 a/b		19.57	21.93	17.72	22.39	17.53	23.93	19.04	16.26	20.04	18.79	19.63	18.28	19.46
扶老比 c/b		20.70	23.52	22.38	25.96	21.21	23.18	21.24	23.33	18.47	17.57	13.60	20.62	19.14
老化指數 c/a		105.76	107.25	126.26	115.98	120.99	96.87	111.57	143.43	92.18	93.53	69.31	112.83	98.35

資料來源：本府民政局。

附註：本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
87	75.76	73.12	78.93	79.11	77.06	81.48
88	75.90	73.33	78.98	79.48	77.47	81.78
89	76.46	73.83	79.56	79.85	77.78	82.24
90	76.75	74.07	79.92	80.08	78.05	82.38
91	77.19	74.58	80.24	80.36	78.34	82.60
92	77.35	74.77	80.33	80.61	78.64	82.76
93	77.48	74.68	80.75	80.99	78.92	83.20
94	77.42	74.50	80.80	81.17	78.94	83.55
95	77.90	74.86	81.41	81.58	79.19	84.13
96	78.38	75.46	81.72	81.79	79.41	84.31
97	78.57	75.59	81.94	81.99	79.70	84.38
98	79.01	76.03	82.34	82.16	79.86	84.53
99	79.18	76.13	82.55	82.42	80.06	84.81
100	79.15	75.96	82.63	82.70	80.18	85.25
101	79.51	76.43	82.82	82.66	80.00	85.33
102	80.02	76.91	83.36	82.90	80.18	85.63
103	79.84	76.72	83.19	83.10	80.33	85.89

資料來源：內政部。

附註：本市配合內政部縣市數據公布係以近3年合併人口編算，例103年平均餘命採101-103年，102年則採100-102年3年合併人口計算。

表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數

年 別	總 計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
				人 數 (人)				
95年	2,624,309	20,255	97,844	322,973	344,320	839,559	698,492	300,867
96年	2,630,756	20,497	93,288	314,682	334,216	837,173	720,426	310,474
97年	2,626,096	20,251	90,589	304,529	325,271	827,928	738,785	318,745
98年	2,615,176	19,295	88,872	292,745	317,673	815,122	755,775	325,696
99年	2,613,100	18,733	89,279	280,706	313,173	808,277	772,772	330,161
100年	2,634,870	21,842	92,078	269,451	312,649	813,915	789,884	335,053
101年	2,662,097	27,281	96,621	259,149	313,265	821,078	801,277	343,428
102年	2,679,871	27,573	105,081	250,714	309,256	823,715	807,903	355,631
103年	2,694,416	27,029	112,644	243,526	303,418	823,648	812,586	371,566
104年	2,703,563	28,102	118,347	233,663	299,539	819,784	814,274	389,855
				百 分 比 (%)				
95年	100.00	0.77	3.73	12.31	13.12	31.99	26.62	11.46
96年	100.00	0.78	3.55	11.96	12.70	31.82	27.38	11.80
97年	100.00	0.77	3.45	11.60	12.39	31.53	28.13	12.14
98年	100.00	0.74	3.40	11.19	12.15	31.17	28.90	12.45
99年	100.00	0.72	3.42	10.74	11.98	30.93	29.57	12.63
100年	100.00	0.83	3.49	10.23	11.87	30.89	29.98	12.72
101年	100.00	1.02	3.63	9.73	11.77	30.84	30.10	12.90
102年	100.00	1.03	3.92	9.36	11.54	30.74	30.15	13.27
103年	100.00	1.00	4.18	9.04	11.26	30.57	30.16	13.79
104年	100.00	1.04	4.38	8.64	11.08	30.32	30.12	14.42

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性

年 別	男性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
				人 數 (人)				
95年	1,281,102	10,599	51,037	168,671	176,781	393,448	331,205	149,362
96年	1,280,124	10,599	48,784	163,958	171,984	391,825	340,865	152,110
97年	1,274,252	10,466	47,357	158,589	167,692	387,224	348,609	154,316
98年	1,265,699	9,980	46,379	152,510	164,019	381,047	355,766	156,000
99年	1,261,502	9,708	46,394	146,399	161,906	377,421	363,045	156,630
100年	1,269,449	11,286	47,666	140,732	161,751	380,130	370,322	157,563
101年	1,280,852	14,085	49,976	135,392	162,067	384,448	374,796	160,090
102年	1,287,653	14,262	54,260	130,921	160,134	386,721	376,956	164,401
103年	1,292,791	13,863	58,061	127,147	157,322	387,679	378,315	170,405
104年	1,295,549	14,457	60,873	121,979	155,310	387,029	378,491	177,413
				百 分 比 (%)				
95年	100.00	0.83	3.98	13.17	13.80	30.71	25.85	11.66
96年	100.00	0.83	3.81	12.81	13.43	30.61	26.63	11.88
97年	100.00	0.82	3.72	12.45	13.16	30.39	27.36	12.11
98年	100.00	0.79	3.66	12.05	12.96	30.11	28.11	12.33
99年	100.00	0.77	3.68	11.61	12.83	29.92	28.78	12.42
100年	100.00	0.89	3.75	11.09	12.74	29.94	29.17	12.41
101年	100.00	1.10	3.90	10.57	12.65	30.02	29.26	12.50
102年	100.00	1.11	4.21	10.17	12.44	30.03	29.27	12.77
103年	100.00	1.07	4.49	9.84	12.17	29.99	29.26	13.18
104年	100.00	1.12	4.70	9.42	11.99	29.87	29.21	13.69

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性

年 別	女性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
95年	1,343,207	9,656	46,807	154,302	167,539	446,111	367,287	151,505	
96年	1,350,632	9,898	44,504	150,725	162,232	445,348	379,562	158,364	
97年	1,351,844	9,786	43,232	145,940	157,579	440,704	390,176	164,429	
98年	1,349,477	9,316	42,493	140,235	153,654	434,075	400,009	169,696	
99年	1,351,598	9,025	42,885	134,307	151,268	430,856	409,727	173,531	
100年	1,365,422	10,556	44,412	128,720	150,898	433,785	419,562	177,490	
101年	1,381,245	13,196	46,646	123,757	151,199	436,630	426,481	183,338	
102年	1,392,218	13,312	50,821	119,793	149,123	436,994	430,947	191,230	
103年	1,401,625	13,166	54,583	116,379	146,097	435,969	434,271	201,161	
104年	1,408,014	13,645	57,474	111,685	144,230	432,755	435,784	212,442	
				百 分 比 (%)					
95年	100.00	0.72	3.48	11.49	12.47	33.21	27.34	11.28	
96年	100.00	0.73	3.30	11.16	12.01	32.97	28.10	11.73	
97年	100.00	0.72	3.20	10.80	11.66	32.60	28.86	12.16	
98年	100.00	0.69	3.15	10.39	11.39	32.17	29.64	12.57	
99年	100.00	0.67	3.17	9.94	11.19	31.88	30.31	12.84	
100年	100.00	0.77	3.25	9.43	11.05	31.77	30.73	13.00	
101年	100.00	0.96	3.38	8.96	10.95	31.61	30.88	13.27	
102年	100.00	0.96	3.65	8.60	10.71	31.39	30.95	13.74	
103年	100.00	0.94	3.89	8.30	10.42	31.10	30.98	14.35	
104年	100.00	0.97	4.08	7.93	10.24	30.74	30.95	15.09	

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F·臺北市各行政區年齡別年底人口數

中華民國104年底

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
104年底人口數	2,704,810	209,714	229,211	313,058	231,350	162,475	130,929	194,339	275,367	122,245	287,566	290,694	257,862
0歲	27,783	1,922	2,378	2,893	2,357	1,672	1,380	2,084	2,856	1,414	3,198	2,909	2,720
1-4	121,860	9,208	10,128	13,919	10,392	7,630	6,233	8,637	12,258	5,990	13,322	12,478	11,665
5-9	108,917	9,645	8,088	14,585	8,136	8,028	4,869	5,834	11,547	4,609	12,341	10,883	10,352
10-14	118,868	10,841	8,401	15,843	8,343	9,102	5,289	6,086	13,180	4,831	13,502	11,981	11,469
15-19	146,766	11,589	11,469	17,126	11,137	9,022	6,763	9,121	16,577	6,623	17,615	15,647	14,077
20-24	150,573	10,840	12,710	15,771	12,083	8,208	6,945	10,718	16,299	7,156	18,338	16,705	14,800
25-29	157,350	10,813	13,806	15,095	13,342	8,276	7,745	11,785	15,825	7,780	19,129	17,969	15,785
30-34	215,939	14,451	18,820	20,778	19,015	11,782	11,189	16,886	21,407	10,996	24,379	24,312	21,924
35-39	238,221	17,242	20,366	24,971	20,753	13,985	12,410	18,014	23,773	12,110	25,999	25,233	23,365
40-44	205,010	16,562	16,837	23,324	17,473	12,749	9,746	14,082	21,775	9,750	21,760	21,012	19,940
45-49	207,390	16,343	17,289	23,978	17,995	12,268	9,743	14,273	23,014	9,390	22,484	21,514	19,099
50-54	208,151	15,760	17,652	23,683	18,583	11,720	9,704	14,946	21,929	9,018	23,910	21,855	19,391
55-59	204,969	15,380	17,583	22,980	18,415	11,487	9,684	15,079	20,136	8,790	23,121	22,980	19,334
60-64	193,831	15,211	17,075	23,324	17,964	10,941	9,402	14,319	18,064	8,034	19,107	22,059	18,331
65-69	136,418	11,869	12,653	18,680	12,497	8,469	6,472	10,123	12,315	5,466	10,689	14,906	12,279
70-74	88,017	7,483	8,286	11,850	7,667	5,324	4,462	7,165	8,028	3,691	6,231	9,645	8,185
75-79	70,435	5,669	6,187	9,343	6,182	4,614	4,043	6,205	6,266	2,854	4,954	7,815	6,303
80-84	50,039	4,082	4,359	6,789	4,659	3,390	2,699	4,459	4,460	1,823	3,613	5,385	4,321
85-89	34,697	3,017	3,255	4,991	2,887	2,297	1,380	2,988	3,580	1,288	2,587	3,473	2,954
90-94	15,251	1,358	1,456	2,394	1,153	1,153	576	1,226	1,616	502	1,068	1,522	1,227
95-99	3,579	352	337	605	264	293	150	250	398	116	190	334	290
100歲以上	746	77	76	136	53	65	45	59	64	14	29	77	51

資料來源：本府民政局。

表G·臺北市近十年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	95年底	96年底	97年底	98年底	99年底	100年底	101年底	102年底	103年底	104年底
臺北市	2,632,242	2,629,269	2,622,923	2,607,428	2,618,772	2,650,968	2,673,226	2,686,516	2,702,315	2,704,810
松山區	209,422	210,986	210,097	207,995	208,434	209,948	210,905	210,343	210,473	209,714
信義區	231,476	228,868	227,770	225,364	225,092	226,541	227,734	228,496	229,657	229,211
大安區	314,171	314,924	313,848	311,612	311,565	313,846	313,426	313,363	313,693	313,058
中山區	219,582	218,483	218,841	218,245	220,126	224,102	226,659	228,753	230,496	231,350
中正區	158,604	159,486	159,337	158,752	159,536	161,449	162,154	163,140	163,388	162,475
大同區	126,923	126,128	124,653	123,399	124,600	126,640	128,809	129,820	130,973	130,929
萬華區	194,879	192,470	190,361	188,437	189,099	190,855	192,628	193,480	194,715	194,339
文山區	261,417	261,666	261,719	260,869	262,307	266,442	269,310	271,341	273,921	275,367
南港區	113,258	113,716	113,672	113,149	114,023	116,131	118,490	119,752	121,257	122,245
內湖區	264,624	265,518	266,808	267,704	270,245	275,652	280,025	282,842	285,767	287,566
士林區	288,212	287,048	286,065	283,855	284,539	287,072	288,894	289,742	290,455	290,694
北投區	249,674	249,976	249,752	248,047	249,206	252,290	254,192	255,444	257,520	257,862

資料來源：本府民政局。

表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數

中華民國104年中

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
104年中人口數	2,703,563	210,094	229,434	313,376	230,923	162,932	130,951	194,527	274,644	121,751	286,667	290,575	257,691
0歲	28,102	1,974	2,425	2,925	2,449	1,674	1,439	2,140	2,813	1,424	3,160	2,965	2,716
1-4	118,347	8,984	9,899	13,588	10,039	7,437	6,028	8,384	11,938	5,800	12,808	12,085	11,360
5-9	109,811	9,672	8,200	14,559	8,201	8,099	4,898	5,940	11,688	4,646	12,397	11,040	10,473
10-14	123,852	11,295	8,791	16,473	8,695	9,536	5,516	6,330	13,704	4,976	14,203	12,443	11,892
15-19	148,425	11,659	11,629	17,289	11,234	9,150	6,855	9,258	16,732	6,695	17,843	15,838	14,246
20-24	151,114	10,858	12,789	15,736	12,195	8,236	7,000	10,794	16,180	7,211	18,417	16,797	14,904
25-29	158,340	10,900	13,911	15,183	13,462	8,372	7,821	11,916	15,795	7,778	19,139	18,126	15,940
30-34	219,952	14,780	19,178	21,154	19,329	11,981	11,434	17,342	21,740	11,254	24,664	24,737	22,362
35-39	235,012	17,140	20,098	24,764	20,492	13,857	12,204	17,740	23,512	11,913	25,463	24,825	23,006
40-44	206,481	16,726	16,991	23,606	17,582	12,858	9,770	14,141	22,004	9,688	21,882	21,178	20,057
45-49	207,987	16,422	17,385	24,177	17,994	12,377	9,708	14,264	22,961	9,328	22,719	21,573	19,082
50-54	209,442	15,884	17,753	23,806	18,653	11,869	9,808	15,083	21,943	9,066	24,004	22,042	19,534
55-59	205,848	15,525	17,698	23,139	18,540	11,496	9,760	15,143	20,061	8,743	23,127	23,165	19,454
60-64	190,997	15,124	16,909	23,381	17,636	10,883	9,281	14,116	17,705	7,885	18,378	21,716	17,986
65-69	128,617	11,272	11,989	17,678	11,718	8,030	6,090	9,560	11,643	5,151	9,932	14,002	11,555
70-74	89,061	7,542	8,379	11,959	7,772	5,374	4,575	7,367	8,053	3,739	6,259	9,790	8,255
75-79	68,986	5,505	6,037	9,163	6,107	4,562	4,001	6,091	6,111	2,772	4,895	7,633	6,111
80-84	50,057	4,100	4,377	6,778	4,600	3,392	2,655	4,485	4,547	1,827	3,611	5,366	4,322
85-89	34,353	2,988	3,227	4,981	2,832	2,289	1,372	2,957	3,536	1,262	2,550	3,418	2,945
90-94	14,650	1,331	1,371	2,323	1,094	1,116	559	1,184	1,562	477	1,012	1,451	1,173
95-99	3,386	335	322	581	252	274	136	241	367	109	181	316	274
100歲以上	746	82	80	139	53	74	47	56	54	13	27	75	49

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I·臺北市近十年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年
臺北市	2,624,309	2,630,756	2,626,096	2,615,176	2,613,100	2,634,870	2,662,097	2,679,871	2,694,416	2,703,563
松山區	208,762	210,204	210,542	209,046	208,215	209,191	210,427	210,624	210,408	210,094
信義區	231,128	230,172	228,319	226,567	225,228	225,817	227,138	228,115	229,077	229,434
大安區	313,169	314,548	314,386	312,730	311,589	312,706	313,636	313,395	313,528	313,376
中山區	218,244	219,033	218,662	218,543	219,186	222,114	225,381	227,706	229,625	230,923
中正區	157,970	159,045	159,412	159,045	159,144	160,493	161,802	162,647	163,264	162,932
大同區	126,867	126,526	125,391	124,026	124,000	125,620	127,725	129,315	130,397	130,951
萬華區	194,811	193,675	191,416	189,399	188,768	189,977	191,742	193,054	194,098	194,527
文山區	260,185	261,542	261,693	261,294	261,588	264,375	267,876	270,326	272,631	274,644
南港區	113,155	113,487	113,694	113,411	113,586	115,077	117,311	119,121	120,505	121,751
內湖區	263,231	265,071	266,163	267,256	268,975	272,949	277,839	281,434	284,305	286,667
士林區	287,983	287,630	286,557	284,960	284,197	285,806	287,983	289,318	290,099	290,575
北投區	248,807	249,825	249,864	248,900	248,627	250,748	253,241	254,818	256,482	257,691

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

參、104 年死因統計

一、主要死因統計

表1·ICD-10 臺北市、全國主要死亡原因比較
中華民國104年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾病碼 ICD 10	死亡原因	臺北市					全國				
		順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
A00-Y98	所有死亡原因		17,160	634.72	325.57	100.00		163,574	697.16	431.45	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	5,025	185.87	102.84	29.28	1	46,829	199.59	128.00	28.63
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	2,381	88.07	42.60	13.88	2	19,202	81.84	48.07	11.74
I60-I69	腦血管疾病	3	1,153	42.65	20.08	6.72	3	11,169	47.60	27.91	6.83
J12-J18	肺炎	4	1,125	41.61	17.37	6.56	4	10,761	45.86	24.63	6.58
E10-E14	糖尿病	5	773	28.59	13.87	4.50	5	9,530	40.62	24.31	5.83
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	636	23.52	9.54	3.71	7	6,383	27.20	14.57	3.90
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	565	20.90	9.68	3.29	9	4,762	20.30	11.80	2.91
I10-I15	高血壓性疾病	8	463	17.13	7.65	2.70	8	5,536	23.59	13.17	3.38
A40-A41	敗血症	9	462	17.09	7.49	2.69	12	3,428	14.61	8.32	2.10
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	435	16.09	11.05	2.53	6	7,033	29.97	22.80	4.30
	其他		4,142	153.21	83.40	24.14		38,941	165.97	107.86	23.81
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	318	11.76	8.72	1.85	11	3,675	15.66	12.10	2.25
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	12	299	11.06	3.97	1.74	16	1,368	5.83	2.84	0.84
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	297	10.99	4.67	1.73	13	1,624	6.92	4.17	0.99
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	278	10.28	5.96	1.62	10	4,688	19.98	13.63	2.87
G20-G21	帕金森病	15	180	6.66	2.95	1.05	17	1,060	4.52	2.49	0.65

資料來源：衛生福利部。

表2. ICD-10 全國縣市別死亡概況

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口

縣市別	總 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
總 計	163,574	697.16	431.45	98,230	839.21	557.18	65,344	555.75	316.12
新北市	22,086	556.50	398.87	13,373	685.25	511.36	8,713	431.94	299.34
臺北市	17,160	634.72	325.57	9,932	766.62	414.33	7,228	513.35	250.23
桃園市	11,577	556.04	410.60	7,360	705.78	524.63	4,217	405.78	303.44
臺中市	16,072	588.26	431.06	9,733	719.89	553.48	6,339	459.31	320.80
臺南市	14,312	759.29	445.87	8,388	888.62	574.31	5,924	629.56	328.10
高雄市	20,522	738.48	475.68	12,376	895.52	604.13	8,146	583.12	357.73
宜蘭縣	3,721	811.65	447.71	2,233	960.37	584.88	1,488	658.61	316.06
新竹縣	3,509	650.01	420.58	2,159	781.31	542.91	1,350	512.32	297.76
苗栗縣	4,710	832.86	456.21	2,773	951.35	582.83	1,937	706.83	327.47
彰化縣	10,019	776.50	442.67	5,921	897.60	587.44	4,098	649.83	308.55
南投縣	4,746	927.13	495.93	2,860	1,088.95	651.20	1,886	756.63	341.11
雲林縣	6,857	976.09	502.29	4,053	1,109.31	662.24	2,804	831.72	342.20
嘉義縣	5,418	1,037.31	486.15	3,237	1,190.06	644.55	2,181	871.32	329.40
屏東縣	8,126	962.13	548.98	4,903	1,132.97	703.74	3,223	782.61	394.09
臺東縣	2,392	1,070.43	604.13	1,508	1,302.41	797.57	884	820.98	408.68
花蓮縣	3,234	972.14	556.81	2,054	1,209.45	732.24	1,180	724.64	386.33
澎湖縣	918	899.73	446.29	545	1,036.51	584.48	373	754.29	309.98
基隆市	2,841	762.50	448.11	1,650	881.06	562.72	1,191	642.68	344.14
新竹市	2,545	587.73	406.95	1,532	714.83	525.73	1,013	463.17	303.07
嘉義市	2,014	744.20	455.81	1,156	874.70	584.54	858	619.65	344.91
金門縣	741	568.86	351.20	452	692.06	479.50	289	444.97	235.63
連江縣	54	431.09	303.00	32	446.80	374.63	22	410.10	224.99

資料來源：衛生福利部。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3· ICD-10 臺北市主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	17,160	634.72	325.57	100.00	所有死亡原因	9,932	766.62	414.33	100.00	所有死亡原因	7,228	513.35	250.23	100.00
1	惡性腫瘤	5,025	185.87	102.84	29.28	惡性腫瘤	2,855	220.37	127.13	28.75	惡性腫瘤	2,170	154.12	82.57	30.02
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,381	88.07	42.60	13.88	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,415	109.22	56.98	14.25	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	966	68.61	30.53	13.36
3	腦血管疾病	1,153	42.65	20.08	6.72	肺炎	685	52.87	22.79	6.90	腦血管疾病	486	34.52	15.13	6.72
4	肺炎	1,125	41.61	17.37	6.56	腦血管疾病	667	51.48	26.11	6.72	肺炎	440	31.25	12.64	6.09
5	糖尿病	773	28.59	13.87	4.50	慢性下呼吸道疾病	470	36.28	15.00	4.73	糖尿病	360	25.57	11.32	4.98
6	慢性下呼吸道疾病	636	23.52	9.54	3.71	糖尿病	413	31.88	16.92	4.16	腎炎、腎病症候群及腎病變	283	20.10	8.92	3.92
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	565	20.90	9.68	3.29	事故傷害	303	23.39	16.86	3.05	高血壓性疾病	226	16.05	6.33	3.13
8	高血壓性疾病	463	17.13	7.65	2.70	敗血症	285	22.00	10.05	2.87	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	185	13.14	5.53	2.56
9	敗血症	462	17.09	7.49	2.69	腎炎、腎病症候群及腎病變	282	21.77	10.57	2.84	敗血症	177	12.57	5.31	2.45
10	事故傷害	435	16.09	11.05	2.53	高血壓性疾病	237	18.29	9.34	2.39	血管性及未明示之癱瘓症	171	12.14	4.37	2.37
	其他	4,142	153.21	83.40	24.14	其他	2,320	179.07	102.58	23.36	其他	1,764	125.28	67.59	24.41
11	蓄意自我傷害（自殺）	318	11.76	8.72	1.85	蓄意自我傷害（自殺）	205	15.82	11.73	2.06	慢性下呼吸道疾病	166	11.79	4.75	2.30
12	血管性及未明示之癱瘓症	299	11.06	3.97	1.74	慢性肝病及肝硬化	173	13.35	8.46	1.74	事故傷害	132	9.37	5.72	1.83
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	297	10.99	4.67	1.73	血管性及未明示之癱瘓症	128	9.88	3.60	1.29	蓄意自我傷害（自殺）	113	8.03	6.07	1.56
14	慢性肝病及肝硬化	278	10.28	5.96	1.62	帕金森病	116	8.95	4.19	1.17	慢性肝病及肝硬化	105	7.46	3.83	1.45
15	帕金森病	180	6.66	2.95	1.05	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	112	8.64	3.68	1.13	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	86	6.11	3.10	1.19

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為 2,703,563 人，其中男性為 1,295,549 人，女性為 1,408,014 人。

表4· ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
1	A00-Y98	所有死亡原因	17,160	634.72	137	487.52	29	8.24	84	28.04	589	71.85	3,203	393.36	4,447	1,551.30	8,671	8,402.86		
	C00-C97	惡性腫瘤	5,025	185.87	-	-	4	1.14	14	4.67	176	21.47	1,489	182.86	1,720	600.01	1,622	1,571.84		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,381	88.07	4	14.23	1	0.28	2	0.67	55	6.71	385	47.28	609	212.44	1,325	1,284.03		
3	I60-I69	腦血管疾病	1,153	42.65	1	3.56	-	-	-	-	22	2.68	165	20.26	287	100.12	678	657.03		
4	J12-J18	肺炎	1,125	41.61	-	-	2	0.57	-	-	11	1.34	67	8.23	196	68.37	849	822.75		
5	E10-E14	糖尿病	773	28.59	-	-	-	-	1	0.33	9	1.10	118	14.49	224	78.14	421	407.98		
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	636	23.52	-	-	-	-	2	0.67	1	0.12	28	3.44	102	35.58	503	487.45		
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	565	20.90	-	-	1	0.28	-	-	5	0.61	74	9.09	144	50.23	341	330.46		
8	I10-I15	高血壓性疾病	463	17.13	-	-	-	-	1	0.33	8	0.98	54	6.63	93	32.44	307	297.51		
9	A40-A41	敗血症	462	17.09	1	3.56	1	0.28	-	-	2	0.24	42	5.16	92	32.09	324	313.98		
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	435	16.09	6	21.35	3	0.85	27	9.01	71	8.66	87	10.68	109	38.02	132	127.92		
		其他	4,142	153.21	125	444.82	17	4.83	37	12.35	229	27.93	694	85.23	871	303.84	2,169	2,101.93		
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	318	11.76	-	-	-	-	13	4.34	85	10.37	136	16.70	53	18.49	31	30.04		
12	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	299	11.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	29	10.12	269	260.68		
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	297	10.99	1	3.56	-	-	-	-	7	0.85	30	3.68	42	14.65	217	210.29		
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	278	10.28	-	-	-	-	1	0.33	23	2.81	100	12.28	79	27.56	75	72.68		
15	G20-G21	帕金森病	180	6.66	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.98	47	16.40	125	121.13		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為人 2,703,563。

表5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況

中華民國104年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
1	A00-Y98	所有死亡原因	9,932	766.62	78	539.55	16	8.75	60	38.63	371	95.86	2,044	540.04	2,644	2,063.09	4,719	9,580.75		
	C00-C97	惡性腫瘤	2,855	220.37	-	-	3	1.64	8	5.15	90	23.25	808	213.48	1,018	794.34	928	1,884.07		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,415	109.22	1	6.92	-	-	1	0.64	43	11.11	300	79.26	372	290.27	698	1,417.12		
3	J12-J18	肺炎	685	52.87	-	-	1	0.55	-	-	7	1.81	50	13.21	114	88.95	513	1,041.52		
4	I60-I69	腦血管疾病	667	51.48	-	-	-	-	-	-	15	3.88	122	32.23	177	138.11	353	716.68		
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	470	36.28	-	-	-	-	1	0.64	-	-	20	5.28	76	59.30	373	757.28		
6	E10-E14	糖尿病	413	31.88	-	-	-	-	1	0.64	5	1.29	91	24.04	126	98.32	190	385.75		
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	303	23.39	5	34.59	3	1.64	22	14.17	54	13.95	66	17.44	65	50.72	88	178.66		
8	A40-A41	敗血症	285	22.00	1	6.92	-	-	-	-	2	0.52	30	7.93	62	48.38	190	385.75		
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	282	21.77	-	-	1	0.55	-	-	4	1.03	44	11.63	74	57.74	159	322.81		
10	I10-I15	高血壓性 疾病	237	18.29	-	-	-	-	1	0.64	7	1.81	41	10.83	60	46.82	128	259.87		
		其他	2,320	179.07	71	491.13	8	4.38	26	16.74	144	37.21	472	124.71	500	390.14	1,099	2,231.25		
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	205	15.82	-	-	-	-	10	6.44	48	12.40	90	23.78	33	25.75	24	48.73		
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	173	13.35	-	-	-	-	-	-	21	5.43	76	20.08	42	32.77	34	69.03		
13	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	128	9.88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	13	10.14	114	231.45		
14	G20-G21	帕金森病	116	8.95	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.53	31	24.19	83	168.51		
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	112	8.64	1	6.92	-	-	-	-	2	0.52	13	3.43	12	9.36	84	170.54		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,295,549人。

表6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況

中華民國104年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
1	A00-Y98	總計	7,228	513.35	59	432.39	13	7.69	24	16.64	218	50.37	1,159	265.96	1,803	1,137.50	3,952	7,327.20		
	C00-C97	惡性腫瘤	2,170	154.12	-	-	1	0.59	6	4.16	86	19.87	681	156.27	702	442.89	694	1,286.71		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	966	68.61	3	21.99	1	0.59	1	0.69	12	2.77	85	19.51	237	149.52	627	1,162.49		
3	I60-I69	腦血管疾病	486	34.52	1	7.33	-	-	-	-	7	1.62	43	9.87	110	69.40	325	602.57		
4	J12-J18	肺炎	440	31.25	-	-	1	0.59	-	-	4	0.92	17	3.90	82	51.73	336	622.96		
5	E10-E14	糖尿病	360	25.57	-	-	-	-	-	-	4	0.92	27	6.20	98	61.83	231	428.29		
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	283	20.10	-	-	-	-	-	-	1	0.23	30	6.88	70	44.16	182	337.44		
7	I10-I15	高血壓性疾病	226	16.05	-	-	-	-	-	-	1	0.23	13	2.98	33	20.82	179	331.87		
8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	185	13.14	-	-	-	-	-	-	5	1.16	17	3.90	30	18.93	133	246.59		
9	A40-A41	敗血症	177	12.57	-	-	1	0.59	-	-	-	-	12	2.75	30	18.93	134	248.44		
10	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	171	12.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10.09	155	287.38		
		其他	1,764	125.28	55	403.08	9	5.32	17	11.79	98	22.65	234	53.70	395	249.20	956	1,772.47		
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	166	11.79	-	-	-	-	1	0.69	1	0.23	8	1.84	26	16.40	130	241.03		
12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	132	9.37	1	7.33	-	-	5	3.47	17	3.93	21	4.82	44	27.76	44	81.58		
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	113	8.03	-	-	-	-	3	2.08	37	8.55	46	10.56	20	12.62	7	12.98		
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	105	7.46	-	-	-	-	1	0.69	2	0.46	24	5.51	37	23.34	41	76.02		
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	86	6.11	-	-	1	0.59	-	-	7	1.62	10	2.29	19	11.99	49	90.85		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,408,014人。

表7·ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	137	474.62	100.00		所有死亡原因	78	519.62	100.00		所有死亡原因	59	425.87	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	73	252.90	53.28	P00-P96	源於周產期的特定病況	43	286.46	55.13	P00-P96	源於周產期的特定病況	30	216.54	50.85
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	24	83.15	17.52	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	14	93.26	17.95	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	10	72.18	16.95
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	20.79	4.38	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	33.31	6.41	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	21.65	5.08
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	4	13.86	2.92	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	2	13.32	2.56	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	2	14.44	3.39
5	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	4	13.86	2.92	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	6.66	1.28	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	7.22	1.69
6	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	3.46	0.73	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.66	1.28	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	7.22	1.69
7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	3.46	0.73	A40-A41	敗血症	1	6.66	1.28	I60-I69	腦血管疾病	1	7.22	1.69
8	A40-A41	敗血症	1	3.46	0.73	D50-D64	貧血	1	6.66	1.28	G00, G03	腦膜炎	1	7.22	1.69
9	D50-D64	貧血	1	3.46	0.73										
10	I60-I69	腦血管疾病	1	3.46	0.73										
10	G00, G03	腦膜炎	1	3.46	0.73										
		其他	20	69.29	14.60		其他	10	66.62	12.82		其他	10	72.18	16.95

資料來源：衛生福利部。

附註：出生發生數為28,865人，其中男性為15,011人，女性為13,854人。

表8·ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	137	487.52	100.00		所有死亡原因	78	539.55	100.00		所有死亡原因	59	432.39	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	73	259.77	53.28	P00-P96	源於周產期的特定病況	43	297.44	55.13	P00-P96	源於周產期的特定病況	30	219.86	50.85
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	24	85.40	17.52	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	14	96.84	17.95	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	10	73.29	16.95
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	21.35	4.38	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	34.59	6.41	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	21.99	5.08
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	4	14.23	2.92	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	2	13.83	2.56	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	2	14.66	3.39
5	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	4	14.23	2.92	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	6.92	1.28	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	7.33	1.69
6	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	3.56	0.73	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.92	1.28	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	7.33	1.69
7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	3.56	0.73	A40-A41	敗血症	1	6.92	1.28	I60-I69	腦血管疾病	1	7.33	1.69
8	A40-A41	敗血症	1	3.56	0.73	D50-D64	貧血	1	6.92	1.28	G00, G03	腦膜炎	1	7.33	1.69
9	D50-D64	貧血	1	3.56	0.73										
10	I60-I69	腦血管疾病	1	3.56	0.73										
10	G00, G03	腦膜炎	1	3.56	0.73										
		其他	20	71.17	14.60		其他	10	69.17	12.82		其他	10	73.29	16.95

資料來源：衛生福利部。

附註：0歲年中人口數為28,102人，其中男性為14,457人，女性為13,645人。

表9·ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	29	8.24	100.00		所有死亡原因	16	8.75	100.00		所有死亡原因	13	7.69	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	4	1.14	13.79	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	1.64	18.75	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	1.18	15.38
2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	0.85	10.34	C00-C97	惡性腫瘤	3	1.64	18.75	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.59	7.69
3	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.57	6.90	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.55	6.25	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.59	7.69
4	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.57	6.90	J12-J18	肺炎	1	0.55	6.25	J12-J18	肺炎	1	0.59	7.69
5	J12-J18	肺炎	2	0.57	6.90	J10-J11	流行性感冒	1	0.55	6.25	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.59	7.69
6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.28	3.45	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.55	6.25	A40-A41	敗血症	1	0.59	7.69
7	J10-J11	流行性感冒	1	0.28	3.45						C00-C97	惡性腫瘤	1	0.59	7.69
8	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.28	3.45										
9	A40-A41	敗血症	1	0.28	3.45										
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.28	3.45										
		其他	11	3.12	37.93		其他	6	3.28	37.50		其他	5	2.96	38.46

資料來源：衛生福利部。

附註：1-14歲年中人口數為352,010人，其中男性為182,852人，女性為169,159人。

表10·ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	84	28.04	100.00		所有死亡原因	60	38.63	100.00		所有死亡原因	24	16.64	100.00
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	9.01	32.14	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	22	14.17	36.67	C00-C97	惡性腫瘤	6	4.16	25.00
2	C00-C97	惡性腫瘤	14	4.67	16.67	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	6.44	16.67	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	3.47	20.83
3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	13	4.34	15.48	C00-C97	惡性腫瘤	8	5.15	13.33	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	2.08	12.50
4	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	4	1.34	4.76	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	4	2.58	6.67	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.39	8.33
5	B20-B24	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	2	0.67	2.38	B20-B24	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	2	1.29	3.33	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.69	4.17
6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	0.67	2.38	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.64	1.67	D50-D64	貧血	1	0.69	4.17
7	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.67	2.38	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.64	1.67	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.69	4.17
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	0.67	2.38	I10-I15	高血壓性疾病	1	0.64	1.67	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	0.69	4.17
9	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.33	1.19	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.64	1.67					
10	I10-I15	高血壓性疾病	1	0.33	1.19	E10-E14	糖尿病	1	0.64	1.67					
10	D50-D64	貧血	1	0.33	1.19										
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	0.33	1.19										
10	E10-E14	糖尿病	1	0.33	1.19										
		其他	13	4.34	15.48		其他	9	5.79	15.00		其他	4	2.77	16.67

資料來源：衛生福利部。

附註：15-24歲年中人口數為299,539人，其中男性為155,310人，女性為144,230人。

表11·ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	589	71.85	100.00		所有死亡原因	371	95.86	100.00		所有死亡原因	218	50.37	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	176	21.47	29.88	C00-C97	惡性腫瘤	90	23.25	24.26	C00-C97	惡性腫瘤	86	19.87	39.45
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	85	10.37	14.43	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	54	13.95	14.56	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	37	8.55	16.97
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	71	8.66	12.05	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	48	12.40	12.94	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	17	3.93	7.80
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	55	6.71	9.34	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	11.11	11.59	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	2.77	5.50
5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	23	2.81	3.90	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	21	5.43	5.66	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	1.62	3.21
6	I60-I69	腦血管疾病	22	2.68	3.74	I60-I69	腦血管疾病	15	3.88	4.04	I60-I69	腦血管疾病	7	1.62	3.21
7	J12-J18	肺炎	11	1.34	1.87	J12-J18	肺炎	7	1.81	1.89	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	1.16	2.29
8	E10-E14	糖尿病	9	1.10	1.53	I10-I15	高血壓性疾病	7	1.81	1.89	J12-J18	肺炎	4	0.92	1.83
9	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	0.98	1.36	E10-E14	糖尿病	5	1.29	1.35	E10-E14	糖尿病	4	0.92	1.83
10	I10-I15	高血壓性疾病	8	0.98	1.36	B20-B24	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	4	1.03	1.08	O00-O99	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	3	0.69	1.38
		其他	121	14.76	20.54	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	1.03	1.08		其他	36	8.32	16.51
		其他	121	14.76	20.54		其他	73	18.86	19.68		其他	36	8.32	16.51

資料來源：衛生福利部。

附註：25-44歲年中人口數為819,784人，其中男性為387,029人，女性為432,755人。

表12·ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	3,203	393.36	100.00		所有死亡原因	2,044	540.04	100.00		所有死亡原因	1,159	265.96	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,489	182.86	46.49	C00-C97	惡性腫瘤	808	213.48	39.53	C00-C97	惡性腫瘤	681	156.27	58.76
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	385	47.28	12.02	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	300	79.26	14.68	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	85	19.51	7.33
3	I60-I69	腦血管疾病	165	20.26	5.15	I60-I69	腦血管疾病	122	32.23	5.97	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	46	10.56	3.97
4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	136	16.70	4.25	E10-E14	糖尿病	91	24.04	4.45	I60-I69	腦血管疾病	43	9.87	3.71
5	E10-E14	糖尿病	118	14.49	3.68	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	90	23.78	4.40	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	30	6.88	2.59
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	100	12.28	3.12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	76	20.08	3.72	E10-E14	糖尿病	27	6.20	2.33
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	87	10.68	2.72	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	66	17.44	3.23	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	24	5.51	2.07
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	74	9.09	2.31	J12-J18	肺炎	50	13.21	2.45	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	21	4.82	1.81
9	J12-J18	肺炎	67	8.23	2.09	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	44	11.63	2.15	J12-J18	肺炎	17	3.90	1.47
10	I10-I15	高血壓性疾病	54	6.63	1.69	I10-I15	高血壓性疾病	41	10.83	2.01	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	3.90	1.47
		其他	528	64.84	16.48		其他	356	94.06	17.42		其他	168	38.55	14.50

資料來源：衛生福利部。

附註：45-64歲年中人口數為814,274人，其中男性為378,491人，女性為435,784人。

表13·ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因	4,447	1,551.30	100.00	C00-C97	所有死亡原因	2,644	2,063.09	100.00	C00-C97	所有死亡原因	1,803	1,137.50	100.00
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	609	212.44	13.69	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	372	290.27	14.07	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	237	149.52	13.14
3	I60-I69	腦血管疾病	287	100.12	6.45	I60-I69	腦血管疾病	177	138.11	6.69	I60-I69	腦血管疾病	110	69.40	6.10
4	E10-E14	糖尿病	224	78.14	5.04	E10-E14	糖尿病	126	98.32	4.77	E10-E14	糖尿病	98	61.83	5.44
5	J12-J18	肺炎	196	68.37	4.41	J12-J18	肺炎	114	88.95	4.31	J12-J18	肺炎	82	51.73	4.55
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	144	50.23	3.24	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	76	59.30	2.87	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	70	44.16	3.88
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	109	38.02	2.45	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	74	57.74	2.80	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	44	27.76	2.44
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	102	35.58	2.29	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	65	50.72	2.46	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	37	23.34	2.05
9	I10-I15	高血壓性疾病	93	32.44	2.09	A40-A41	敗血症	62	48.38	2.34	I10-I15	高血壓性疾病	33	20.82	1.83
10	A40-A41	敗血症	92	32.09	2.07	I10-I15	高血壓性疾病	60	46.82	2.27	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織	30	18.93	1.66
		其他	871	303.84	19.59		其他	500	390.14	18.91		其他	360	227.12	19.97
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	79	27.56	1.78	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	42	32.77	1.59	A40-A41	敗血症	30	18.93	1.66
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	53	18.49	1.19	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	33	25.75	1.25	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	26	16.40	1.44
13	G20-G21	帕金森病	47	16.40	1.06	G20-G21	帕金森病	31	24.19	1.17	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	20	12.62	1.11
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	42	14.65	0.94	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	21	16.39	0.79	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	19	11.99	1.05
15	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	40	13.95	0.90	I71	主動脈瘤及剝離	18	14.05	0.68	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	16	10.09	0.89
											G20-G21	帕金森病	16	10.09	0.89

資料來源：衛生福利部。

附註：65-79歲年中人口數為286,664人，其中男性為128,158人，女性為158,506人。

表14·ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因	8,671	8,402.86	100.00	C00-C97	所有死亡原因	4,719	9,580.75	100.00	C00-C97	所有死亡原因	3,952	7,327.20	100.00
		惡性腫瘤	1,622	1,571.84	18.71		惡性腫瘤	928	1,884.07	19.67		惡性腫瘤	694	1,286.71	17.56
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,325	1,284.03	15.28	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	698	1,417.12	14.79	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	627	1,162.49	15.87
3	J12-J18	肺炎	849	822.75	9.79	J12-J18	肺炎	513	1,041.52	10.87	J12-J18	肺炎	336	622.96	8.50
4	I60-I69	腦血管疾病	678	657.03	7.82	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	373	757.28	7.90	I60-I69	腦血管疾病	325	602.57	8.22
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	503	487.45	5.80	I60-I69	腦血管疾病	353	716.68	7.48	E10-E14	糖尿病	231	428.29	5.85
6	E10-E14	糖尿病	421	407.98	4.86	A40-A41	敗血症	190	385.75	4.03	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	182	337.44	4.61
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	341	330.46	3.93	E10-E14	糖尿病	190	385.75	4.03	I10-I15	高血壓性疾病	179	331.87	4.53
8	A40-A41	敗血症	324	313.98	3.74	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	159	322.81	3.37	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	155	287.38	3.92
9	I10-I15	高血壓性疾病	307	297.51	3.54	I10-I15	高血壓性疾病	128	259.87	2.71	A40-A41	敗血症	134	248.44	3.39
10	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	269	260.68	3.10	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	114	231.45	2.42	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	133	246.59	3.37
		其他	2,032	1,969.16	23.43		其他	1,073	2,178.46	22.74		其他	956	1,772.47	24.19
11	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	217	210.29	2.50	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	88	178.66	1.86	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	130	241.03	3.29
12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	132	127.92	1.52	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	84	170.54	1.78	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	49	90.85	1.24
13	G20-G21	帕金森病	125	121.13	1.44	G20-G21	帕金森病	83	168.51	1.76	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	44	81.58	1.11
14	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	95	92.06	1.10	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	49	99.48	1.04	G20-G21	帕金森病	42	77.87	1.06
15	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	89	86.25	1.03	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	46	93.39	0.97	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	41	76.02	1.04

資料來源：衛生福利部。

附註：80歲以上年中人口數為103,191人，其中男性為49,255人，女性為53,936人。

表15·ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
總計	435	16.09	131	4.85	99	3.66	22	0.81	34	1.26	8	0.30	35	1.29	106	3.92
0歲	6	21.35	-	-	-	-	-	-	5	17.79	-	-	-	-	1	3.56
1-14歲	3	0.85	1	0.28	-	-	-	-	2	0.57	-	-	-	-	-	-
15-24歲	27	9.01	19	6.34	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	1	0.33	4	1.34
25-44歲	71	8.66	29	3.54	5	0.61	8	0.98	-	-	2	0.24	20	2.44	7	0.85
45-64歲	87	10.68	25	3.07	21	2.58	4	0.49	12	1.47	3	0.37	9	1.11	13	1.60
65-79歲	109	38.02	39	13.60	28	9.77	6	2.09	6	2.09	2	0.70	3	1.05	25	8.72
80歲以上	132	127.92	18	17.44	45	43.61	3	2.91	7	6.78	1	0.97	2	1.94	56	54.27

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,703,563人。

表16·ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	303	23.39	83	6.41	71	5.48	20	1.54	26	2.01	4	0.31	28	2.16	71	5.48
0歲	5	34.59	-	-	-	-	-	-	4	27.67	-	-	-	-	1	6.92
1-14歲	3	1.64	1	0.55	-	-	-	-	2	1.09	-	-	-	-	-	-
15-24歲	22	14.17	14	9.01	-	-	1	0.64	2	1.29	-	-	1	0.64	4	2.58
25-44歲	54	13.95	22	5.68	3	0.78	8	2.07	-	-	-	-	17	4.39	4	1.03
45-64歲	66	17.44	16	4.23	16	4.23	4	1.06	9	2.38	3	0.79	7	1.85	11	2.91
65-79歲	65	50.72	20	15.61	18	14.05	6	4.68	3	2.34	1	0.78	1	0.78	16	12.48
80歲以上	88	178.66	10	20.30	34	69.03	1	2.03	6	12.18	-	-	2	4.06	35	71.06

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,295,549人。

表17· ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	132	9.37	48	3.41	28	1.99	2	0.14	8	0.57	4	0.28	7	0.50	35	2.49
0歲	1	7.33	-	-	-	-	-	-	1	7.33	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	5	3.47	5	3.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44歲	17	3.93	7	1.62	2	0.46	-	-	-	-	2	0.46	3	0.69	3	0.69
45-64歲	21	4.82	9	2.07	5	1.15	-	-	3	0.69	-	-	2	0.46	2	0.46
65-79歲	44	27.76	19	11.99	10	6.31	-	-	3	1.89	1	0.63	2	1.26	9	5.68
80歲以上	44	81.58	8	14.83	11	20.39	2	3.71	1	1.85	1	1.85	-	-	21	38.94

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,408,014人。

表18·ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
總計	131	4.85	39	1.44	7	0.26	27	1.00	6	0.22	2	0.07	49	1.81	1	0.04
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.28	-	-
15-24歲	19	6.34	-	-	-	-	4	1.34	-	-	-	-	15	5.01	-	-
25-44歲	29	3.54	1	0.12	-	-	11	1.34	2	0.24	1	0.12	14	1.71	-	-
45-64歲	25	3.07	6	0.74	2	0.25	7	0.86	4	0.49	1	0.12	4	0.49	1	0.12
65-79歲	39	13.60	19	6.63	3	1.05	5	1.74	-	-	-	-	12	4.19	-	-
80歲以上	18	17.44	13	12.60	2	1.94	-	-	-	-	-	-	3	2.91	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,703,563人。

表19·ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外 事故中受傷		腳踏車騎乘者在 運輸事故傷害中 受傷		摩托車騎乘者在 運輸事故傷害中 受傷		汽車乘員[乘客或 員工(駕駛員)]在 運輸事故傷害中 受傷		小貨(卡)車或箱型車 乘員[乘客或員工(駕 駛員)]在運輸意外事 故中受傷		其他陸路運輸 事故傷害		其他和未特定的運 輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
總計	83	6.41	14	1.08	5	0.39	21	1.62	2	0.15	2	0.15	38	2.93	1	0.08
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.55	-	-
15-24歲	14	9.01	-	-	-	-	2	1.29	-	-	-	-	12	7.73	-	-
25-44歲	22	5.68	-	-	-	-	10	2.58	-	-	1	0.26	11	2.84	-	-
45-64歲	16	4.23	2	0.53	1	0.26	6	1.59	2	0.53	1	0.26	3	0.79	1	0.26
65-79歲	20	15.61	5	3.90	2	1.56	3	2.34	-	-	-	-	10	7.80	-	-
80歲以上	10	20.30	7	14.21	2	4.06	-	-	-	-	-	-	1	2.03	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,295,549人。

表20·ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	48	3.41	25	1.78	2	0.14	6	0.43	4	0.28	-	-	11	0.78	-	-
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	5	3.47	-	-	-	-	2	1.39	-	-	-	-	3	2.08	-	-
25-44歲	7	1.62	1	0.23	-	-	1	0.23	2	0.46	-	-	3	0.69	-	-
45-64歲	9	2.07	4	0.92	1	0.23	1	0.23	2	0.46	-	-	1	0.23	-	-
65-79歲	19	11.99	14	8.83	1	0.63	2	1.26	-	-	-	-	2	1.26	-	-
80歲以上	8	14.83	6	11.12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.71	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,408,014人。

表21·ICD-10 臺北市自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	318	11.76	-	-	-	-	13	4.34	85	10.37	136	16.70	53	18.49	31	30.04
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.18	-	-	-	-	-	-	1	0.12	4	0.49	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	-	-	-	-	-	-	1	0.12	1	0.12	1	0.35	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	3.00	-	-	-	-	5	1.67	32	3.90	39	4.79	4	1.40	1	0.97
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.30	-	-	-	-	-	-	1	0.12	3	0.37	2	0.70	2	1.94
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	1	0.97
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	105	3.88	-	-	-	-	5	1.67	17	2.07	44	5.40	23	8.02	16	15.51
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	20	0.74	-	-	-	-	-	-	3	0.37	10	1.23	6	2.09	1	0.97
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	5	0.18	-	-	-	-	-	-	1	0.12	4	0.49	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	3	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	1	0.35	1	0.97
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	9	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.12	5	0.61	2	0.70	1	0.97
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	69	2.55	-	-	-	-	3	1.00	26	3.17	19	2.33	14	4.88	7	6.78
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	5	0.18	-	-	-	-	-	-	1	0.12	3	0.37	-	-	1	0.97

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,703,563人。

表22·ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	205	15.82	-	-	-	-	10	6.44	48	12.40	90	23.78	33	25.75	24	48.73
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	-	-	1	0.26	1	0.26	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	1	0.78	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	56	4.32	-	-	-	-	3	1.93	19	4.91	31	8.19	3	2.34	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.31	-	-	-	-	-	-	1	0.26	1	0.26	-	-	2	4.06
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.03
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	72	5.56	-	-	-	-	5	3.22	9	2.33	29	7.66	16	12.48	13	26.39
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	12	0.93	-	-	-	-	-	-	2	0.52	6	1.59	3	2.34	1	2.03
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	5	0.39	-	-	-	-	-	-	1	0.26	4	1.06	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.78	1	2.03
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	7	0.54	-	-	-	-	-	-	1	0.26	3	0.79	2	1.56	1	2.03
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	38	2.93	-	-	-	-	2	1.29	13	3.36	11	2.91	7	5.46	5	10.15
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.53	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,295,549人。

表23·ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	113	8.03	-	-	-	-	3	2.08	37	8.55	46	10.56	20	12.62	7	12.98
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.69	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	25	1.78	-	-	-	-	2	1.39	13	3.00	8	1.84	1	0.63	1	1.85
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.46	2	1.26	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	33	2.34	-	-	-	-	-	-	8	1.85	15	3.44	7	4.42	3	5.56
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	8	0.57	-	-	-	-	-	-	1	0.23	4	0.92	3	1.89	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.46	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	31	2.20	-	-	-	-	1	0.69	13	3.00	8	1.84	7	4.42	2	3.71
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.21	-	-	-	-	-	-	1	0.23	1	0.23	-	-	1	1.85

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,408,014人。

表24·ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	5,025	185.87	102.84	100.00	惡性腫瘤	2,855	220.37	127.13	100.00	惡性腫瘤	2,170	154.12	82.57	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	984	36.40	19.68	19.58	氣管、支氣管和肺癌	589	45.46	25.93	20.63	氣管、支氣管和肺癌	395	28.05	14.50	18.20
2	結腸、直腸和肛門癌	686	25.37	13.41	13.65	肝和肝內膽管癌	429	33.11	19.76	15.03	結腸、直腸和肛門癌	325	23.08	11.66	14.98
3	肝和肝內膽管癌	667	24.67	13.72	13.27	結腸、直腸和肛門癌	361	27.86	15.56	12.64	女性乳房癌	288	20.45	12.15	13.27
4	女性乳房癌(1)	288	20.45	12.15	5.73	胃癌	185	14.28	7.92	6.48	肝和肝內膽管癌	238	16.90	8.63	10.97
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	163	12.58	5.97	3.24	前列腺(攝護腺)癌	163	12.58	5.97	5.71	胰臟癌	133	9.45	4.82	6.13
6	胃癌	295	10.91	5.80	5.87	口腔癌	161	12.43	8.20	5.64	胃癌	110	7.81	4.04	5.07
7	胰臟癌	273	10.10	5.60	5.43	胰臟癌	140	10.81	6.52	4.90	卵巢癌	77	5.47	3.40	3.55
8	口腔癌	183	6.77	4.24	3.64	食道癌	124	9.57	5.93	4.34	子宮頸及部位未明示子宮癌	70	4.97	2.73	3.23
9	非何杰金氏淋巴瘤	153	5.66	3.09	3.04	非何杰金氏淋巴瘤	88	6.79	3.90	3.08	非何杰金氏淋巴瘤	65	4.62	2.40	3.00
10	卵巢癌(1)	77	5.47	3.40	1.53	膀胱癌	86	6.64	3.08	3.01	子宮體癌	42	2.98	1.76	1.94
	其他	1,256	46.46	26.19	25.00	其他	529	40.83	24.35	18.53	其他	427	30.33	16.48	19.68
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	70	4.97	2.73	1.39	白血病	68	5.25	3.07	2.38	白血病	40	2.84	1.50	1.84
12	食道癌	133	4.92	2.88	2.65	鼻咽癌	61	4.71	3.19	2.14	膽囊和其他膽道癌	36	2.56	1.24	1.66
13	膀胱癌	117	4.33	1.95	2.33	腎臟癌	43	3.32	1.95	1.51	膀胱癌	31	2.20	0.98	1.43
14	白血病	108	3.99	2.24	2.15	膽囊和其他膽道癌	37	2.86	1.64	1.30	腎臟癌	30	2.13	1.08	1.38
15	子宮體癌(1)	42	2.98	1.76	0.84	腦癌	31	2.39	1.56	1.09	腦癌	28	1.99	1.34	1.29

資料來源：衛生福利部。

附註：1.臺北市年中人口數為2,703,563人，其中男性1,295,549人，女性1,408,014人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表25·ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	5,025	185.87	-	-	4	1.14	14	4.67	176	21.47	1,489	182.86	1,720	600.01	1,622	1,571.84
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	984	36.40	-	-	-	-	1	0.33	24	2.93	263	32.30	357	124.54	339	328.52
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	686	25.37	-	-	-	-	-	-	13	1.59	187	22.97	222	77.44	264	255.84
3	C22	肝和肝內膽管癌	667	24.67	-	-	-	-	-	-	15	1.83	183	22.47	276	96.28	193	187.03
4	C50	女性乳房癌(1)	288	20.45	-	-	-	-	-	-	24	5.55	146	33.50	71	44.79	47	87.14
5	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	163	12.58	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.91	46	35.89	106	215.21
6	C16	胃癌	295	10.91	-	-	-	-	-	-	6	0.73	64	7.86	113	39.42	112	108.54
7	C25	胰臟癌	273	10.10	-	-	-	-	-	-	7	0.85	83	10.19	103	35.93	80	77.53
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	183	6.77	-	-	-	-	-	-	20	2.44	91	11.18	46	16.05	26	25.20
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	153	5.66	-	-	-	-	3	1.00	4	0.49	38	4.67	54	18.84	54	52.33
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	77	5.47	-	-	-	-	1	0.69	7	1.62	39	8.95	21	13.25	9	16.69
		其他	1,256	46.46	-	-	4	1.14	9	3.00	56	6.83	384	47.16	411	143.37	392	379.88
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	70	4.97	-	-	-	-	-	-	5	1.16	28	6.43	20	12.62	17	31.52
12	C15	食道癌	133	4.92	-	-	-	-	-	-	1	0.12	65	7.98	45	15.70	22	21.32
13	C67	膀胱癌	117	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1.96	31	10.81	70	67.84
14	C91-C95	白血病	108	3.99	-	-	1	0.28	2	0.67	6	0.73	29	3.56	31	10.81	39	37.79
15	C54	子宮體癌(1)	42	2.98	-	-	-	-	-	-	2	0.46	27	6.20	10	6.31	3	5.56

資料來源：衛生福利部。

附註：1.臺北市年中人口數為2,703,563人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表26·ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國104年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,855	220.37	-	-	3	1.64	8	5.15	90	23.25	808	213.48	1,018	794.34	928	1,884.07		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	589	45.46	-	-	-	-	1	0.64	13	3.36	140	36.99	230	179.47	205	416.20		
2	C22	肝和肝內膽管癌	429	33.11	-	-	-	-	-	-	10	2.58	143	37.78	169	131.87	107	217.24		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	361	27.86	-	-	-	-	-	-	9	2.33	99	26.16	118	92.07	135	274.08		
4	C16	胃癌	185	14.28	-	-	-	-	-	-	2	0.52	38	10.04	76	59.30	69	140.09		
5	C61	前列腺(攝護腺)癌	163	12.58	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.91	46	35.89	106	215.21		
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	161	12.43	-	-	-	-	-	-	20	5.17	83	21.93	40	31.21	18	36.54		
7	C25	胰臟癌	140	10.81	-	-	-	-	-	-	5	1.29	47	12.42	57	44.48	31	62.94		
8	C15	食道癌	124	9.57	-	-	-	-	-	-	1	0.26	62	16.38	42	32.77	19	38.57		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	88	6.79	-	-	-	-	2	1.29	3	0.78	21	5.55	31	24.19	31	62.94		
10	C67	膀胱癌	86	6.64	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.17	23	17.95	51	103.54		
		其他	529	40.83	-	-	3	1.64	5	3.22	27	6.98	152	40.16	186	145.13	156	316.72		
11	C91-C95	白血病	68	5.25	-	-	1	0.55	2	1.29	3	0.78	17	4.49	19	14.83	26	52.79		
12	C11	鼻咽癌	61	4.71	-	-	-	-	-	-	6	1.55	33	8.72	18	14.05	4	8.12		
13	C64	腎臟癌	43	3.32	-	-	-	-	-	-	1	0.26	11	2.91	19	14.83	12	24.36		
14	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	37	2.86	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.17	17	13.26	8	16.24		
15	C71	腦癌	31	2.39	-	-	1	0.55	-	-	3	0.78	7	1.85	14	10.92	6	12.18		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,295,549人。

表27·ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國104年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,170	154.12	-	-	1	0.59	6	4.16	86	19.87	681	156.27	702	442.89	694	1,286.71		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	395	28.05	-	-	-	-	-	-	11	2.54	123	28.23	127	80.12	134	248.44		
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	325	23.08	-	-	-	-	-	-	4	0.92	88	20.19	104	65.61	129	239.17		
3	C50	女性乳房癌	288	20.45	-	-	-	-	-	-	24	5.55	146	33.50	71	44.79	47	87.14		
4	C22	肝和肝內膽管癌	238	16.90	-	-	-	-	-	-	5	1.16	40	9.18	107	67.51	86	159.45		
5	C25	胰臟癌	133	9.45	-	-	-	-	-	-	2	0.46	36	8.26	46	29.02	49	90.85		
6	C16	胃癌	110	7.81	-	-	-	-	-	-	4	0.92	26	5.97	37	23.34	43	79.72		
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	77	5.47	-	-	-	-	1	0.69	7	1.62	39	8.95	21	13.25	9	16.69		
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	70	4.97	-	-	-	-	-	-	5	1.16	28	6.43	20	12.62	17	31.52		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	65	4.62	-	-	-	-	1	0.69	1	0.23	17	3.90	23	14.51	23	42.64		
10	C54	子宮體癌	42	2.98	-	-	-	-	-	-	2	0.46	27	6.20	10	6.31	3	5.56		
		其他	427	30.33	-	-	1	0.59	4	2.77	21	4.85	111	25.47	136	85.80	154	285.52		
11	C91-C95	白血病	40	2.84	-	-	-	-	-	-	3	0.69	12	2.75	12	7.57	13	24.10		
12	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	36	2.56	-	-	-	-	-	-	1	0.23	6	1.38	14	8.83	15	27.81		
13	C67	膀胱癌	31	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.92	8	5.05	19	35.23		
14	C64	腎臟癌	30	2.13	-	-	-	-	-	-	1	0.23	6	1.38	11	6.94	12	22.25		
15	C71	腦癌	28	1.99	-	-	1	0.59	1	0.69	3	0.69	13	2.98	3	1.89	7	12.98		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,408,014人。

參、104 年死因統計

二、行政區別死因統計

表28-1·ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,314	625.44	292.93	100.00	所有死亡原因	716	722.20	357.25	100.00	所有死亡原因	598	538.97	238.48	100.00
1	惡性腫瘤	386	183.73	94.55	29.38	惡性腫瘤	210	211.82	109.47	29.33	惡性腫瘤	176	158.63	82.43	29.43
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	199	94.72	41.30	15.14	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	113	113.98	55.46	15.78	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	86	77.51	29.56	14.38
3	肺炎	101	48.07	17.06	7.69	肺炎	54	54.47	19.46	7.54	肺炎	47	42.36	14.86	7.86
4	腦血管疾病	92	43.79	17.52	7.00	腦血管疾病	48	48.42	20.37	6.70	腦血管疾病	44	39.66	15.27	7.36
5	慢性下呼吸道疾病	52	24.75	8.89	3.96	慢性下呼吸道疾病	34	34.29	12.80	4.75	糖尿病	28	25.24	10.21	4.68
6	糖尿病	48	22.85	10.35	3.65	敗血症	23	23.20	8.82	3.21	高血壓性疾病	23	20.73	7.01	3.85
7	高血壓性疾病	40	19.04	6.75	3.04	糖尿病	20	20.17	10.69	2.79	慢性下呼吸道疾病	18	16.22	5.59	3.01
8	敗血症	39	18.56	6.54	2.97	蓄意自我傷害（自 殺）	18	18.16	14.03	2.51	敗血症	16	14.42	4.69	2.68
9	血管性及未明示之 癱瘓症	28	13.33	4.26	2.13	高血壓性疾病	17	17.15	6.69	2.37	腎炎、腎病症候群 及腎病變	15	13.52	5.30	2.51
10	腎炎、腎病症候群 及腎病變	26	12.38	5.14	1.98	事故傷害	15	15.13	10.94	2.09	血管性及未明示之 癱瘓症	14	12.62	4.15	2.34
	其他	303	144.22	80.57	23.06	其他	164	165.42	88.52	22.91	其他	131	118.07	59.41	21.91
11	蓄意自我傷害（自 殺）	23	10.95	8.40	1.75	血管性及未明示之 癱瘓症	14	14.12	4.42	1.96	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	13	11.72	3.95	2.17
12	事故傷害	22	10.47	7.57	1.67	腎炎、腎病症候群 及腎病變	11	11.10	5.12	1.54	帕金森病	8	7.21	2.72	1.34
13	帕金森病	18	8.57	3.23	1.37	帕金森病	10	10.09	3.80	1.40	慢性肝病及肝硬化	8	7.21	3.70	1.34
14	慢性肝病及肝硬化	17	8.09	4.48	1.29	慢性肝病及肝硬化	9	9.08	5.37	1.26	事故傷害	7	6.31	4.37	1.17
15	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	16	7.62	2.62	1.22	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	9	9.08	3.26	1.26	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	6	5.41	2.59	1.00

資料來源：衛生福利部。

表28-2 · ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,476	643.32	319.90	100.00	所有死亡原因	884	803.68	408.94	100.00	所有死亡原因	592	495.65	244.01	100.00
1	惡性腫瘤	436	190.03	102.25	29.54	惡性腫瘤	248	225.47	125.09	28.05	惡性腫瘤	188	157.40	83.59	31.76
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	176	76.71	34.50	11.92	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	110	100.01	47.34	12.44	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	66	55.26	23.74	11.15
3	肺炎	111	48.38	19.46	7.52	肺炎	68	61.82	24.18	7.69	肺炎	43	36.00	15.09	7.26
4	腦血管疾病	93	40.53	19.12	6.30	腦血管疾病	51	46.37	22.03	5.77	腦血管疾病	42	35.16	16.74	7.09
5	糖尿病	68	29.64	13.39	4.61	糖尿病	39	35.46	17.22	4.41	糖尿病	29	24.28	10.34	4.90
6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	50	21.79	9.19	3.39	腎炎、腎病症候群 及腎病變	30	27.27	10.95	3.39	腎炎、腎病症候群 及腎病變	20	16.74	7.52	3.38
7	高血壓性疾病	42	18.31	7.92	2.85	慢性下呼吸道疾病	27	24.55	9.95	3.05	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	18	15.07	7.31	3.04
8	事故傷害	39	17.00	10.13	2.64	高血壓性疾病	26	23.64	11.68	2.94	高血壓性疾病	16	13.40	5.07	2.70
9	慢性下呼吸道疾病	39	17.00	7.36	2.64	事故傷害	25	22.73	13.55	2.83	事故傷害	14	11.72	6.88	2.36
10	敗血症	36	15.69	6.30	2.44	敗血症	23	20.91	7.60	2.60	敗血症	13	10.88	4.83	2.20
	其他	386	168.24	90.27	26.15	其他	237	215.47	119.35	26.81	其他	143	119.73	62.91	24.16
11	蓄意自我傷害（自 殺）	33	14.38	9.08	2.24	蓄意自我傷害（自 殺）	22	20.00	12.86	2.49	慢性下呼吸道疾病	12	10.05	5.20	2.03
12	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	32	13.95	6.85	2.17	慢性肝病及肝硬化	19	17.27	12.15	2.15	蓄意自我傷害（自 殺）	11	9.21	5.67	1.86
13	慢性肝病及肝硬化	27	11.77	7.43	1.83	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	14	12.73	5.89	1.58	慢性肝病及肝硬化	8	6.70	3.44	1.35
14	帕金森病	16	6.97	3.09	1.08	帕金森病	13	11.82	5.30	1.47	血管性及未明示之 癡呆症	5	4.19	1.34	0.84
15	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	16	6.97	2.83	1.08	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	13	11.82	5.05	1.47	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	4	3.35	1.07	0.68

資料來源：衛生福利部。

表28-3·ICD-10 臺北市大安區主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,962	626.09	259.39	100.00	所有死亡原因	1,050	715.78	300.22	100.00	所有死亡原因	912	547.15	226.52	100.00
1	惡性腫瘤	565	180.29	83.82	28.80	惡性腫瘤	287	195.65	91.64	27.33	惡性腫瘤	278	166.78	77.47	30.48
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	275	87.75	32.15	14.02	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	155	105.66	41.64	14.76	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	120	71.99	24.26	13.16
3	腦血管疾病	139	44.36	16.37	7.08	肺炎	83	56.58	18.13	7.90	腦血管疾病	58	34.80	11.02	6.36
4	肺炎	128	40.85	13.41	6.52	腦血管疾病	81	55.22	23.05	7.71	肺炎	45	27.00	9.33	4.93
5	糖尿病	80	25.53	9.71	4.08	慢性下呼吸道疾病	53	36.13	12.17	5.05	糖尿病	42	25.20	9.03	4.61
6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	72	22.98	8.81	3.67	糖尿病	38	25.90	10.72	3.62	腎炎、腎病症候群 及腎病變	36	21.60	8.40	3.95
7	慢性下呼吸道疾病	71	22.66	7.81	3.62	腎炎、腎病症候群 及腎病變	36	24.54	9.22	3.43	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	24	14.40	4.43	2.63
8	高血壓性疾病	56	17.87	6.33	2.85	高血壓性疾病	33	22.50	9.51	3.14	事故傷害	23	13.80	7.70	2.52
9	敗血症	51	16.27	5.38	2.60	敗血症	28	19.09	5.98	2.67	高血壓性疾病	23	13.80	3.79	2.52
10	事故傷害	45	14.36	8.07	2.29	事故傷害	22	15.00	8.37	2.10	敗血症	23	13.80	4.78	2.52
	其他	480	153.17	67.53	24.46	其他	234	159.52	69.79	22.29	其他	240	143.99	66.31	26.32
11	血管性及未明示之 癡呆症	35	11.17	3.09	1.78	血管性及未明示之 癡呆症	17	11.59	3.59	1.62	血管性及未明示之 癡呆症	18	10.80	2.75	1.97
12	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	31	9.89	3.07	1.58	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	17	11.59	5.22	1.62	慢性下呼吸道疾病	18	10.80	3.86	1.97
13	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	25	7.98	3.30	1.27	帕金森病	14	9.54	3.68	1.33	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	11	6.60	2.06	1.21
14	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	22	7.02	2.00	1.12	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	11	7.50	1.87	1.05	蓄意自我傷害（自 殺）	11	6.60	6.53	1.21
15	蓄意自我傷害（自 殺）	21	6.70	6.13	1.07	慢性肝病及肝硬化 (1)	10	6.82	3.04	0.95	慢性肝病及肝硬化	10	6.00	2.28	1.10

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：蓄意自我傷害(自殺)之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為10人、6.82人，每十萬人口標準化死亡率為5.83人。

表28-4 · ICD-10 臺北市中山區主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,416	613.19	316.50	100.00	所有死亡原因	798	740.11	406.07	100.00	所有死亡原因	618	502.02	244.35	100.00
1	惡性腫瘤	424	183.61	101.41	29.94	惡性腫瘤	253	234.65	136.03	31.70	惡性腫瘤	171	138.91	73.88	27.67
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	179	77.52	39.13	12.64	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	109	101.09	55.03	13.66	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	70	56.86	26.78	11.33
3	腦血管疾病	94	40.71	19.04	6.64	腦血管疾病	56	51.94	25.57	7.02	肺炎	43	34.93	13.60	6.96
4	肺炎	83	35.94	15.37	5.86	肺炎	40	37.10	17.87	5.01	腦血管疾病	38	30.87	13.79	6.15
5	糖尿病	58	25.12	11.55	4.10	慢性下呼吸道疾病	32	29.68	12.16	4.01	腎炎、腎病症候群 及腎病變	32	25.99	11.38	5.18
6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	50	21.65	9.96	3.53	事故傷害	30	27.82	21.54	3.76	糖尿病	31	25.18	10.14	5.02
7	慢性下呼吸道疾病	49	21.22	8.48	3.46	糖尿病	27	25.04	13.31	3.38	血管性及未明示之 癡呆症	20	16.25	6.22	3.24
8	事故傷害	42	18.19	13.30	2.97	高血壓性疾病	20	18.55	9.52	2.51	高血壓性疾病	19	15.43	5.83	3.07
9	高血壓性疾病	39	16.89	7.40	2.75	敗血症	20	18.55	8.38	2.51	慢性下呼吸道疾病	17	13.81	5.32	2.75
10	敗血症	36	15.59	6.57	2.54	腎炎、腎病症候群 及腎病變	18	16.69	8.18	2.26	敗血症	16	13.00	5.04	2.59
	其他	362	156.76	84.29	25.56	其他	193	179.00	98.48	24.19	其他	161	130.79	72.38	26.05
11	血管性及未明示之 癡呆症	34	14.72	5.57	2.40	蓄意自我傷害（自 殺）	16	14.84	10.34	2.01	蓄意自我傷害（自 殺）	13	10.56	8.74	2.10
12	蓄意自我傷害（自 殺）	29	12.56	9.44	2.05	血管性及未明示之 癡呆症	14	12.98	4.84	1.75	事故傷害	12	9.75	5.74	1.94
13	慢性肝病及肝硬化	24	10.39	5.34	1.69	慢性肝病及肝硬化	14	12.98	7.34	1.75	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	10	8.12	3.32	1.62
14	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	20	8.66	3.60	1.41	帕金森病	10	9.27	4.96	1.25	慢性肝病及肝硬化	10	8.12	3.73	1.62
15	帕金森病	17	7.36	3.54	1.20	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	10	9.27	3.91	1.25	帕金森病(1)	7	5.69	2.43	1.13

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、5.69人，每十萬人口標準化死亡率為2.48人。

表28-5·ICD-10 臺北市中正區主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,097	673.29	314.63	100.00	所有死亡原因	626	803.82	394.24	100.00	所有死亡原因	471	553.77	245.19	100.00
1	惡性腫瘤	317	194.56	100.26	28.90	惡性腫瘤	164	210.59	110.69	26.20	惡性腫瘤	153	179.89	91.21	32.48
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	148	90.84	39.66	13.49	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	78	100.16	49.51	12.46	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	70	82.30	31.70	14.86
3	肺炎	77	47.26	17.86	7.02	肺炎	57	73.19	29.02	9.11	腦血管疾病	25	29.39	12.44	5.31
4	腦血管疾病	67	41.12	18.43	6.11	腦血管疾病	42	53.93	25.38	6.71	肺炎	20	23.51	7.83	4.25
5	糖尿病	51	31.30	14.19	4.65	慢性下呼吸道疾病	35	44.94	16.16	5.59	糖尿病	20	23.51	8.62	4.25
6	慢性下呼吸道疾病	48	29.46	10.52	4.38	糖尿病	31	39.81	20.68	4.95	高血壓性疾病	18	21.16	7.55	3.82
7	敗血症	35	21.48	8.74	3.19	敗血症	22	28.25	11.91	3.51	血管性及未明示之 癱瘓症	14	16.46	5.13	2.97
8	高血壓性疾病	31	19.03	6.93	2.83	事故傷害	21	26.97	20.35	3.35	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	14	16.46	6.26	2.97
9	腎炎、腎病症候群 及腎病變	29	17.80	7.34	2.64	腎炎、腎病症候群 及腎病變	16	20.54	8.55	2.56	敗血症	13	15.28	5.97	2.76
10	事故傷害	28	17.19	12.65	2.55	帕金森病	15	19.26	6.49	2.40	腎炎、腎病症候群 及腎病變	13	15.28	6.20	2.76
	其他	266	163.26	78.03	24.25	其他	145	186.19	95.50	23.16	其他	111	130.51	62.26	23.57
11	血管性及未明示之 癱瘓症	25	15.34	4.48	2.28	高血壓性疾病	13	16.69	6.39	2.08	慢性下呼吸道疾病	13	15.28	5.33	2.76
12	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	23	14.12	5.25	2.10	血管性及未明示之 癱瘓症	11	14.12	3.74	1.76	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	9	10.58	5.10	1.91
13	帕金森病	21	12.89	4.22	1.91	蓄意自我傷害（自 殺）	11	14.12	11.27	1.76	蓄意自我傷害（自 殺）	8	9.41	7.93	1.70
14	蓄意自我傷害（自 殺）	19	11.66	9.43	1.73	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	9	11.56	4.07	1.44	事故傷害	7	8.23	5.48	1.49
15	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	14	8.59	4.15	1.28	慢性肝病及肝硬化	6	7.70	3.63	0.96	帕金森病(1)	6	7.05	2.21	1.27

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、7.05人，每十萬人口標準化死亡率為2.64人。

表28-6 · ICD-10 臺北市大同區主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	986	752.95	400.99	100.00	所有死亡原因	569	889.07	518.76	100.00	所有死亡原因	417	622.84	296.89	100.00
1	惡性腫瘤	300	229.09	127.23	30.43	惡性腫瘤	180	281.25	167.05	31.63	惡性腫瘤	120	179.23	92.95	28.78
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	151	115.31	60.97	15.31	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	88	137.50	78.60	15.47	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	63	94.10	45.50	15.11
3	腦血管疾病	75	57.27	27.91	7.61	腦血管疾病	43	67.19	36.49	7.56	腦血管疾病	32	47.80	20.38	7.67
4	肺炎	57	43.53	21.09	5.78	肺炎	35	54.69	29.37	6.15	腎炎、腎病症候群 及腎病變	24	35.85	15.90	5.76
5	腎炎、腎病症候群 及腎病變	43	32.84	16.42	4.36	慢性下呼吸道疾病	21	32.81	15.96	3.69	糖尿病	23	34.35	14.56	5.52
6	糖尿病	43	32.84	16.08	4.36	事故傷害	20	31.25	20.92	3.51	肺炎	22	32.86	14.24	5.28
7	敗血症	29	22.15	10.00	2.94	糖尿病	20	31.25	17.45	3.51	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	17	25.39	10.15	4.08
8	慢性下呼吸道疾病	29	22.15	9.40	2.94	腎炎、腎病症候群 及腎病變	19	29.69	16.47	3.34	敗血症	14	20.91	8.44	3.36
9	事故傷害	25	19.09	11.90	2.54	敗血症	15	23.44	12.03	2.64	血管性及未明示之 癱瘓症	10	14.94	5.41	2.40
10	慢性肝病及肝硬化 其他	21 213	16.04 162.66	8.80 91.19	2.13 21.60	慢性肝病及肝硬化 其他	14 114	21.88 178.13	13.84 110.58	2.46 20.04	高血壓性疾病 其他	10 82	14.94 122.48	5.34 64.01	2.40 19.66
11	高血壓性疾病	18	13.75	6.03	1.83	蓄意自我傷害（自殺）	11	17.19	10.90	1.93	慢性下呼吸道疾病	8	11.95	4.40	1.92
12	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	17	12.98	5.70	1.72	高血壓性疾病	8	12.50	6.59	1.41	慢性肝病及肝硬化	7	10.46	3.99	1.68
13	血管性及未明示之 癱瘓症	16	12.22	4.94	1.62	血管性及未明示之 癱瘓症	6	9.38	4.34	1.05	事故傷害	5	7.47	3.45	1.20
14	蓄意自我傷害（自 殺）	15	11.45	7.29	1.52	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	5	7.81	4.39	0.88	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	4	5.97	2.45	0.96
15	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）(1)	7	5.35	2.67	0.71	膽結石及其他膽囊 疾患	5	7.81	4.12	0.88	蓄意自我傷害（自 殺）	4	5.97	4.11	0.96

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：源於周產期的特定病況、肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、5.35人，每十萬人口標準化死亡率分別為8.76人、2.27人。

表28-7·ICD-10 臺北市萬華區主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,716	882.14	412.09	100.00	所有死亡原因	1,056	1,099.31	533.92	100.00	所有死亡原因	660	670.28	302.46	100.00
1	惡性腫瘤	459	235.96	120.66	26.75	惡性腫瘤	279	290.44	152.24	26.42	惡性腫瘤	180	182.80	92.84	27.27
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	268	137.77	60.94	15.62	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	163	169.68	80.03	15.44	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	105	106.64	43.48	15.91
3	肺炎	126	64.77	23.98	7.34	肺炎	80	83.28	32.77	7.58	腦血管疾病	47	47.73	19.08	7.12
4	腦血管疾病	119	61.17	25.82	6.93	腦血管疾病	72	74.95	33.64	6.82	肺炎	46	46.72	16.25	6.97
5	糖尿病	92	47.29	21.97	5.36	慢性下呼吸道疾病	49	51.01	16.61	4.64	糖尿病	45	45.70	18.51	6.82
6	慢性下呼吸道疾病	67	34.44	11.34	3.90	糖尿病	47	48.93	25.92	4.45	高血壓性疾病	23	23.36	8.50	3.48
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	54	27.76	11.30	3.15	事故傷害	36	37.48	25.54	3.41	腎炎、腎病症候群 及腎病變	19	19.30	7.71	2.88
8	事故傷害	52	26.73	17.56	3.03	敗血症	36	37.48	15.26	3.41	慢性下呼吸道疾病	18	18.28	6.11	2.73
9	敗血症	52	26.73	9.96	3.03	腎炎、腎病症候群 及腎病變	35	36.44	15.18	3.31	事故傷害	16	16.25	10.06	2.42
10	高血壓性疾病	49	25.19	10.62	2.86	高血壓性疾病	26	27.07	13.11	2.46	敗血症	16	16.25	5.43	2.42
	其他	378	194.32	97.95	22.03	其他	233	242.56	123.63	22.06	其他	145	147.26	74.49	21.97
11	慢性肝病及肝硬化	33	16.96	10.29	1.92	慢性肝病及肝硬化	24	24.98	16.06	2.27	血管性及未明示之 癱瘓症	11	11.17	3.87	1.67
12	蓄意自我傷害（自 殺）	31	15.94	12.64	1.81	蓄意自我傷害（自 殺）	20	20.82	16.55	1.89	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	11	11.17	3.97	1.67
13	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	25	12.85	4.58	1.46	帕金森病	16	16.66	5.84	1.52	蓄意自我傷害（自 殺）	11	11.17	8.89	1.67
14	帕金森病	20	10.28	3.66	1.17	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	14	14.57	5.26	1.33	慢性肝病及肝硬化	9	9.14	5.18	1.36
15	血管性及未明示之 癱瘓症	19	9.77	3.27	1.11	血管性及未明示之 癱瘓症	8	8.33	2.67	0.76	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	6	6.09	2.62	0.91

資料來源：衛生福利部。

表28-8 · ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,617	588.76	307.80	100.00	所有死亡原因	964	729.23	392.88	100.00	所有死亡原因	653	458.41	233.17	100.00
1	惡性腫瘤	453	164.94	95.06	28.01	惡性腫瘤	257	194.41	112.65	26.66	惡性腫瘤	196	137.59	79.17	30.02
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	229	83.38	40.74	14.16	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	140	105.90	51.64	14.52	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	89	62.48	30.75	13.63
3	肺炎	119	43.33	18.06	7.36	肺炎	78	59.00	23.36	8.09	肺炎	41	28.78	12.82	6.28
4	腦血管疾病	95	34.59	17.82	5.88	腦血管疾病	61	46.14	26.36	6.33	腦血管疾病	34	23.87	11.03	5.21
5	糖尿病	70	25.49	12.39	4.33	慢性下呼吸道疾病	48	36.31	16.54	4.98	腎炎、腎病症候群 及腎病變	31	21.76	10.16	4.75
6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	63	22.94	11.38	3.90	糖尿病	40	30.26	15.29	4.15	糖尿病	30	21.06	9.75	4.59
7	慢性下呼吸道疾病	62	22.57	9.79	3.83	敗血症	33	24.96	10.23	3.42	高血壓性疾病	23	16.15	7.62	3.52
8	敗血症	52	18.93	8.66	3.22	腎炎、腎病症候群 及腎病變	32	24.21	13.32	3.32	敗血症	19	13.34	7.15	2.91
9	高血壓性疾病	45	16.38	8.71	2.78	事故傷害	26	19.67	13.00	2.70	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	18	12.64	5.83	2.76
10	事故傷害	38	13.84	8.47	2.35	高血壓性疾病	22	16.64	10.30	2.28	血管性及未明示之 癡呆症	16	11.23	4.11	2.45
	其他	391	142.37	76.72	24.18	其他	227	171.72	100.20	23.55	其他	156	109.51	54.78	23.89
11	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	30	10.92	4.63	1.86	慢性肝病及肝硬化	16	12.10	7.83	1.66	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	14	9.83	5.90	2.14
12	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	27	9.83	5.73	1.67	蓄意自我傷害（自 殺）	14	10.59	8.06	1.45	慢性下呼吸道疾病	14	9.83	4.02	2.14
13	血管性及未明示之 癡呆症	26	9.47	3.31	1.61	帕金森病	13	9.83	4.95	1.35	事故傷害	12	8.42	4.25	1.84
14	慢性肝病及肝硬化	25	9.10	5.39	1.55	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	13	9.83	5.58	1.35	帕金森病	9	6.32	2.26	1.38
15	帕金森病(1)	22	8.01	3.36	1.36	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	12	9.08	3.25	1.24	慢性肝病及肝硬化	9	6.32	3.30	1.38

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：蓄意自我傷害(自殺)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為22人、8.01人，每十萬人口標準化死亡率為5.95人。

表28-9 · ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有死亡原因	722	593.01	361.83	100.00	所有死亡原因	433	728.20	471.26	100.00	所有死亡原因	289	463.96	266.18	100.00
1	惡性腫瘤	231	189.73	120.52	31.99	惡性腫瘤	140	235.45	157.74	32.33	惡性腫瘤	91	146.09	88.23	31.49
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	108	88.71	53.42	14.96	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	66	111.00	72.26	15.24	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	42	67.43	37.38	14.53
3	腦血管疾病	51	41.89	23.28	7.06	腦血管疾病	29	48.77	29.09	6.70	腦血管疾病	22	35.32	18.41	7.61
4	肺炎	43	35.32	17.58	5.96	肺炎	27	45.41	23.44	6.24	腎炎、腎病症候群 及腎病變	18	28.90	15.00	6.23
5	腎炎、腎病症候群 及腎病變	35	28.75	15.47	4.85	腎炎、腎病症候群 及腎病變	17	28.59	16.55	3.93	肺炎	16	25.69	12.46	5.54
6	糖尿病	28	23.00	14.16	3.88	蓄意自我傷害（自 殺）	15	25.23	18.49	3.46	糖尿病	13	20.87	12.32	4.50
7	高血壓性疾病	23	18.89	10.24	3.19	糖尿病	15	25.23	15.48	3.46	高血壓性疾病	12	19.26	10.04	4.15
8	蓄意自我傷害（自 殺）	18	14.78	10.50	2.49	事故傷害	14	23.54	21.97	3.23	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	10	16.05	7.94	3.46
9	慢性肝病及肝硬化	17	13.96	8.82	2.35	高血壓性疾病	11	18.50	10.67	2.54	慢性肝病及肝硬化	8	12.84	7.95	2.77
10	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	15	12.32	6.64	2.08	敗血症	10	16.82	12.51	2.31	慢性下呼吸道疾病	5	8.03	3.98	1.73
	其他	153	125.67	81.21	21.19	其他	89	149.68	93.06	20.55	其他	52	83.48	52.46	17.99
11	事故傷害	14	11.50	10.77	1.94	慢性下呼吸道疾病	9	15.14	6.60	2.08	皮膚及皮下組織疾 病	3	4.82	2.28	1.04
12	慢性下呼吸道疾病	14	11.50	5.37	1.94	慢性肝病及肝硬化	9	15.14	10.11	2.08	血管性及未明示之 癱瘓症	3	4.82	2.01	1.04
13	敗血症	11	9.03	6.29	1.52	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	5	8.41	5.28	1.15	疝氣及腸阻塞	3	4.82	2.59	1.04
14	疝氣及腸阻塞	6	4.93	2.52	0.83	疝氣及腸阻塞	3	5.05	2.53	0.69	胃及十二指腸潰瘍	3	4.82	2.40	1.04
15	血管性及未明示之 癱瘓症	5	4.11	1.61	0.69	血管性及未明示之 癱瘓症(1)	2	3.36	1.24	0.46	蓄意自我傷害（自 殺）	3	4.82	3.58	1.04

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)、源於周產期的特定病況、肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)、膽結石及其他膽囊疾患之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.36人，每十萬人口標準化死亡率分別為2.45人、4.97人、1.24人、1.74人。

表28-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	1,423	496.40	340.19	100.00	所有死亡原因	858	624.82	448.67	100.00	所有死亡原因	565	378.32	249.61	100.00
2	惡性腫瘤	458	159.77	112.15	32.19	惡性腫瘤	273	198.80	148.10	31.82	惡性腫瘤	185	123.87	83.13	32.74
3	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	176	61.40	40.23	12.37	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	108	78.65	54.12	12.59	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	68	45.53	28.55	12.04
4	腦血管疾病	105	36.63	23.64	7.38	腦血管疾病	55	40.05	26.77	6.41	腦血管疾病	50	33.48	21.11	8.85
5	肺炎	68	23.72	13.65	4.78	慢性下呼吸道疾病	50	36.41	23.59	5.83	肺炎	26	17.41	9.99	4.60
6	慢性下呼吸道疾病	58	20.23	12.38	4.08	肺炎	42	30.59	17.87	4.90	腎炎、腎病症候群 及腎病變	20	13.39	7.86	3.54
7	事故傷害	48	16.74	13.73	3.37	事故傷害	34	24.76	20.68	3.96	血管性及未明示之 癱瘓症	18	12.05	6.68	3.19
8	敗血症	44	15.35	10.00	3.09	敗血症	28	20.39	14.14	3.26	敗血症	16	10.71	6.82	2.83
9	糖尿病	42	14.65	9.89	2.95	糖尿病	26	18.93	13.51	3.03	糖尿病	16	10.71	6.88	2.83
10	蓄意自我傷害（自 殺）	36	12.56	10.04	2.53	蓄意自我傷害（自 殺）	23	16.75	13.77	2.68	事故傷害	14	9.37	6.95	2.48
11	血管性及未明示之 癱瘓症	33	11.51	6.23	2.32	高血壓性疾病	18	13.11	7.99	2.10	高血壓性疾病	13	8.70	5.36	2.30
12	其他	355	123.84	88.26	24.95	其他	201	146.37	108.13	23.43	其他	139	93.07	66.28	24.60
13	腎炎、腎病症候群 及腎病變	33	11.51	7.14	2.32	慢性肝病及肝硬化	16	11.65	9.05	1.86	蓄意自我傷害（自 殺）	13	8.70	6.77	2.30
14	高血壓性疾病	31	10.81	6.68	2.18	血管性及未明示之 癱瘓症	15	10.92	5.79	1.75	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	12	8.04	5.75	2.12
15	慢性肝病及肝硬化	26	9.07	6.81	1.83	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	13	9.47	5.13	1.52	慢性肝病及肝硬化	10	6.70	4.86	1.77
16	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	22	7.67	4.39	1.55	腎炎、腎病症候群 及腎病變	13	9.47	6.42	1.52	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	9	6.03	3.62	1.59
17	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	16	5.58	3.96	1.12	帕金森病	7	5.10	3.88	0.82	帕金森病(1)	8	5.36	3.50	1.42

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：慢性下呼吸道疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、5.36人，每十萬人口標準化死亡率為3.15人。

表28-11 · ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,800	619.46	320.83	100.00	所有死亡原因	1,027	731.06	413.37	100.00	所有死亡原因	773	515.01	240.89	100.00
1	惡性腫瘤	509	175.17	98.15	28.28	惡性腫瘤	293	208.57	124.48	28.53	惡性腫瘤	216	143.91	75.58	27.94
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	250	86.04	43.50	13.89	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	147	104.64	59.40	14.31	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	103	68.62	29.74	13.32
3	腦血管疾病	114	39.23	17.91	6.33	腦血管疾病	66	46.98	24.23	6.43	糖尿病	50	33.31	14.64	6.47
4	肺炎	109	37.51	16.20	6.06	慢性下呼吸道疾病	66	46.98	21.99	6.43	腦血管疾病	48	31.98	12.67	6.21
5	糖尿病	106	36.48	17.28	5.89	肺炎	65	46.27	21.90	6.33	肺炎	44	29.32	11.40	5.69
6	慢性下呼吸道疾病	85	29.25	12.53	4.72	糖尿病	56	39.86	20.26	5.45	腎炎、腎病症候群 及腎病變	34	22.65	9.84	4.40
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	73	25.12	12.06	4.06	腎炎、腎病症候群 及腎病變	39	27.76	14.70	3.80	血管性及未明示之 癱瘓症	28	18.66	6.50	3.62
8	高血壓性疾病	46	15.83	7.28	2.56	事故傷害	28	19.93	14.04	2.73	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	22	14.66	5.67	2.85
9	事故傷害	42	14.45	10.14	2.33	高血壓性疾病	25	17.80	9.46	2.43	高血壓性疾病	21	13.99	5.35	2.72
10	血管性及未明示之 癱瘓症	39	13.42	4.97	2.17	敗血症	22	15.66	7.73	2.14	慢性下呼吸道疾病	19	12.66	4.82	2.46
	其他	427	146.95	80.81	23.72	其他	220	156.60	95.19	21.42	其他	188	125.26	64.70	24.32
11	敗血症	39	13.42	5.99	2.17	慢性肝病及肝硬化	22	15.66	10.21	2.14	蓄意自我傷害（自 殺）	18	11.99	7.88	2.33
12	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	35	12.05	4.97	1.94	蓄意自我傷害（自 殺）	14	9.97	7.39	1.36	敗血症	17	11.33	4.58	2.20
13	慢性肝病及肝硬化	35	12.05	7.25	1.94	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	13	9.25	4.18	1.27	事故傷害	14	9.33	6.58	1.81
14	蓄意自我傷害（自 殺）	32	11.01	7.69	1.78	血管性及未明示之 癱瘓症	11	7.83	3.15	1.07	慢性肝病及肝硬化	13	8.66	4.67	1.68
15	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	18	6.19	2.85	1.00	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	10	7.12	3.27	0.97	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	8	5.33	2.43	1.03

資料來源：衛生福利部。

表28-12 · ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,631	632.93	354.18	100.00	所有死亡原因	951	763.84	451.93	100.00	所有死亡原因	680	510.56	272.51	100.00
1	惡性腫瘤	487	188.99	111.14	29.86	惡性腫瘤	271	217.67	136.09	28.50	惡性腫瘤	216	162.18	90.38	31.76
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	222	86.15	44.42	13.61	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	138	110.84	61.72	14.51	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	84	63.07	30.14	12.35
3	腦血管疾病	109	42.30	22.12	6.68	腦血管疾病	63	50.60	28.13	6.62	肺炎	47	35.29	15.66	6.91
4	肺炎	103	39.97	18.40	6.32	肺炎	56	44.98	21.45	5.89	腦血管疾病	46	34.54	17.27	6.76
5	糖尿病	87	33.76	18.67	5.33	糖尿病	54	43.37	25.91	5.68	糖尿病	33	24.78	12.56	4.85
6	慢性下呼吸道疾病	62	24.06	10.15	3.80	慢性下呼吸道疾病	46	36.95	15.63	4.84	高血壓性疾病	25	18.77	7.93	3.68
7	高血壓性疾病	43	16.69	8.20	2.64	事故傷害	32	25.70	19.55	3.36	腎炎、腎病症候群 及腎病變	21	15.77	7.53	3.09
8	事故傷害	40	15.52	11.37	2.45	蓄意自我傷害（自 殺）	31	24.90	17.80	3.26	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	19	14.27	6.93	2.79
9	蓄意自我傷害（自 殺）	39	15.13	10.61	2.39	敗血症	25	20.08	11.33	2.63	慢性下呼吸道疾病	16	12.01	5.31	2.35
10	敗血症	38	14.75	7.29	2.33	高血壓性疾病	18	14.46	8.62	1.89	血管性及未明示之 癱瘓症	14	10.51	4.28	2.06
	其他	401	155.61	91.80	24.59	其他	217	174.29	105.69	22.82	其他	159	119.38	74.52	23.38
11	腎炎、腎病症候群 及腎病變	37	14.36	7.29	2.27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	16	12.85	6.94	1.68	敗血症	13	9.76	4.05	1.91
12	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	31	12.03	5.73	1.90	慢性肝病及肝硬化	14	11.24	6.96	1.47	慢性肝病及肝硬化	10	7.51	4.13	1.47
13	血管性及未明示之 癱瘓症	24	9.31	3.92	1.47	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	12	9.64	4.32	1.26	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	9	6.76	3.81	1.32
14	慢性肝病及肝硬化	24	9.31	5.47	1.47	血管性及未明示之 癱瘓症	10	8.03	3.58	1.05	事故傷害	8	6.01	4.35	1.18
15	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	14	5.43	2.94	0.86	帕金森病	7	5.62	3.22	0.74	蓄意自我傷害（自 殺）	8	6.01	4.12	1.18

資料來源：衛生福利部。

表29-1 · ICD-10 臺北市松山區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	22	10.47	100.00	15	15.13	100.00	7	6.31	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	8	3.81	36.36	5	5.04	33.33	3	2.70	42.86
W00-W19	跌倒(落)	3	1.43	13.64	2	2.02	13.33	1	0.90	14.29
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.48	4.55	1	1.01	6.67	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.95	9.09	1	1.01	6.67	1	0.90	14.29
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.95	9.09	2	2.02	13.33	-	-	-
	其他	6	2.86	27.27	4	4.03	26.67	2	1.80	28.57

資料來源：衛生福利部。

表29-2 · ICD-10 臺北市信義區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	39	17.00	100.00	25	22.73	100.00	14	11.72	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	11	4.79	28.21	5	4.55	20.00	6	5.02	42.86
W00-W19	跌倒(落)	13	5.67	33.33	9	8.18	36.00	4	3.35	28.57
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.44	2.56	1	0.91	4.00	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.44	2.56	1	0.91	4.00	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.44	2.56	1	0.91	4.00	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	1.74	10.26	3	2.73	12.00	1	0.84	7.14
	其他	8	3.49	20.51	5	4.55	20.00	3	2.51	21.43

資料來源：衛生福利部。

表29-3 · ICD-10 臺北市大安區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	45	14.36	100.00	22	15.00	100.00	23	13.80	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	9	2.87	20.00	4	2.73	18.18	5	3.00	21.74
W00-W19	跌倒(落)	8	2.55	17.78	2	1.36	9.09	6	3.60	26.09
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.28	8.89	3	2.05	13.64	1	0.60	4.35
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.32	2.22	-	-	-	1	0.60	4.35
	其他	23	7.34	51.11	13	8.86	59.09	10	6.00	43.48

資料來源：衛生福利部。

表29-4·ICD-10 臺北市中山區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	42	18.19	100.00	30	27.82	100.00	12	9.75	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	12	5.20	28.57	6	5.56	20.00	6	4.87	50.00
W00-W19	跌倒(落)	11	4.76	26.19	10	9.27	33.33	1	0.81	8.33
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.87	4.76	2	1.85	6.67	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	5	2.17	11.90	5	4.64	16.67	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	2.17	11.90	2	1.85	6.67	3	2.44	25.00
	其他	7	3.03	16.67	5	4.64	16.67	2	1.62	16.67

資料來源：衛生福利部。

表29-5 · ICD-10 臺北市中正區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	28	17.19	100.00	21	26.97	100.00	7	8.23	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	10	6.14	35.71	5	6.42	23.81	5	5.88	71.43
W00-W19	跌倒(落)	5	3.07	17.86	4	5.14	19.05	1	1.18	14.29
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.61	3.57	1	1.28	4.76	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	1.23	7.14	2	2.57	9.52	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.23	7.14	2	2.57	9.52	-	-	-
	其他	8	4.91	28.57	7	8.99	33.33	1	1.18	14.29

資料來源：衛生福利部。

表29-6·ICD-10 臺北市大同區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	25	19.09	100.00	20	31.25	100.00	5	7.47	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	4	3.05	16.00	4	6.25	20.00	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	6	4.58	24.00	3	4.69	15.00	3	4.48	60.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	3.05	16.00	4	6.25	20.00	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	2.29	12.00	1	1.56	5.00	2	2.99	40.00
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	2.29	12.00	3	4.69	15.00	-	-	-
	其他	5	3.82	20.00	5	7.81	25.00	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表29-7·ICD-10 臺北市萬華區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	52	26.73	100.00	36	37.48	100.00	16	16.25	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	21	10.80	40.38	14	14.57	38.89	7	7.11	43.75
W00-W19	跌倒(落)	9	4.63	17.31	6	6.25	16.67	3	3.05	18.75
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.54	5.77	3	3.12	8.33	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.54	5.77	3	3.12	8.33	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	1.03	3.85	1	1.04	2.78	1	1.02	6.25
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	2.57	9.62	3	3.12	8.33	2	2.03	12.50
	其他	9	4.63	17.31	6	6.25	16.67	3	3.05	18.75

資料來源：衛生福利部。

表29-8 · ICD-10 臺北市文山區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	38	13.84	100.00	26	19.67	100.00	12	8.42	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	7	2.55	18.42	6	4.54	23.08	1	0.70	8.33
W00-W19	跌倒(落)	12	4.37	31.58	8	6.05	30.77	4	2.81	33.33
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.73	5.26	2	1.51	7.69	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.73	5.26	1	0.76	3.85	1	0.70	8.33
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	3	1.09	7.89	2	1.51	7.69	1	0.70	8.33
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.09	7.89	3	2.27	11.54	-	-	-
	其他	9	3.28	23.68	4	3.03	15.38	5	3.51	41.67

資料來源：衛生福利部。

表29-9 · ICD-10 臺北市南港區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	14	11.50	100.00	14	23.54	100.00	-	-	-
V01-V99	運輸事故傷害	6	4.93	42.86	6	10.09	42.86	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	4	3.29	28.57	4	6.73	28.57	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	2.46	21.43	3	5.05	21.43	-	-	-
	其他	1	0.82	7.14	1	1.68	7.14	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表29-10 · ICD-10 臺北市內湖區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	48	16.74	100.00	34	24.76	100.00	14	9.37	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	17	5.93	35.42	12	8.74	35.29	5	3.35	35.71
W00-W19	跌倒(落)	12	4.19	25.00	10	7.28	29.41	2	1.34	14.29
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.35	2.08	1	0.73	2.94	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	5	1.74	10.42	3	2.18	8.82	2	1.34	14.29
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.35	2.08	-	-	-	1	0.67	7.14
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.05	6.25	3	2.18	8.82	-	-	-
	其他	9	3.14	18.75	5	3.64	14.71	4	2.68	28.57

資料來源：衛生福利部。

表29-11 · ICD-10 臺北市士林區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	42	14.45	100.00	28	19.93	100.00	14	9.33	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	15	5.16	35.71	8	5.69	28.57	7	4.66	50.00
W00-W19	跌倒(落)	10	3.44	23.81	8	5.69	28.57	2	1.33	14.29
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.03	7.14	2	1.42	7.14	1	0.67	7.14
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.38	9.52	3	2.14	10.71	1	0.67	7.14
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.34	2.38	1	0.71	3.57	-	-	-
	其他	9	3.10	21.43	6	4.27	21.43	3	2.00	21.43

資料來源：衛生福利部。

表29-12 · ICD-10 臺北市北投區事故傷害死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	40	15.52	100.00	32	25.70	100.00	8	6.01	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	11	4.27	27.50	8	6.43	25.00	3	2.25	37.50
W00-W19	跌倒(落)	6	2.33	15.00	5	4.02	15.63	1	0.75	12.50
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	1.55	10.00	3	2.41	9.38	1	0.75	12.50
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.16	7.50	3	2.41	9.38	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.39	2.50	-	-	-	1	0.75	12.50
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.16	7.50	3	2.41	9.38	-	-	-
	其他	12	4.66	30.00	10	8.03	31.25	2	1.50	25.00

資料來源：衛生福利部。

表30-1 · ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	23	10.95	100.00	18	18.16	100.00	5	4.51	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	2.38	21.74	4	4.03	22.22	1	0.90	20.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	6	2.86	26.09	6	6.05	33.33	-	-	-			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.95	8.70	-	-	-	2	1.80	40.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	10	4.76	43.48	8	8.07	44.44	2	1.80	40.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-2 · ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	33	14.38	100.00	22	20.00	100.00	11	9.21	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	3.03	-	-	-	1	0.84	9.09
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	9	3.92	27.27	9	8.18	40.91	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	3.03	1	0.91	4.55	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	5.23	36.36	8	7.27	36.36	4	3.35	36.36
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.87	6.06	1	0.91	4.55	1	0.84	9.09
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.44	3.03	-	-	-	1	0.84	9.09
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	2.18	15.15	3	2.73	13.64	2	1.67	18.18
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.44	3.03	-	-	-	1	0.84	9.09
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.44	3.03	-	-	-	1	0.84	9.09

資料來源：衛生福利部。

表30-3 · ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	21	6.70	100.00	10	6.82	100.00	11	6.60	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	1.91	28.57	2	1.36	20.00	4	2.40	36.36			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	2.23	33.33	5	3.41	50.00	2	1.20	18.18			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.32	4.76	1	0.68	10.00	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	1.91	28.57	2	1.36	20.00	4	2.40	36.36			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.32	4.76	-	-	-	1	0.60	9.09			

資料來源：衛生福利部。

表30-4 · ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	29	12.56	100.00	16	14.84	100.00	13	10.56	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.43	3.45	-	-	-	1	0.81	7.69			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	2.60	20.69	4	3.71	25.00	2	1.62	15.38			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	8	3.46	27.59	5	4.64	31.25	3	2.44	23.08			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.30	10.34	2	1.85	12.50	1	0.81	7.69			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2	0.87	6.90	2	1.85	12.50	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.43	3.45	1	0.93	6.25	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	3.46	27.59	2	1.85	12.50	6	4.87	46.15			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-5 · ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	19	11.66	100.00	11	14.12	100.00	8	9.41	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.61	5.26	-	-	-	1	1.18	12.50			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	3.07	26.32	3	3.85	27.27	2	2.35	25.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.61	5.26	1	1.28	9.09	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.61	5.26	-	-	-	1	1.18	12.50			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	3	1.84	15.79	3	3.85	27.27	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	3.68	31.58	2	2.57	18.18	4	4.70	50.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	1.23	10.53	2	2.57	18.18	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-6 · ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	15	11.45	100.00	11	17.19	100.00	4	5.97	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.76	6.67	-	-	-	1	1.49	25.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	6	4.58	40.00	4	6.25	36.36	2	2.99	50.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.76	6.67	1	1.56	9.09	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	5.35	46.67	6	9.38	54.55	1	1.49	25.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-7 · ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	31	15.94	100.00	20	20.82	100.00	11	11.17	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.51	3.23	1	1.04	5.00	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.51	3.23	1	1.04	5.00	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	1.54	9.68	3	3.12	15.00	-	-	-			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	16	8.23	51.61	9	9.37	45.00	7	7.11	63.64			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.51	3.23	1	1.04	5.00	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.51	3.23	1	1.04	5.00	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.51	3.23	-	-	-	1	1.02	9.09			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	3.08	19.35	4	4.16	20.00	2	2.03	18.18			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.51	3.23	-	-	-	1	1.02	9.09			

資料來源：衛生福利部。

表30-8 · ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	22	8.01	100.00	14	10.59	100.00	8	5.62	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	2.91	36.36	5	3.78	35.71	3	2.11	37.50			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	2.55	31.82	4	3.03	28.57	3	2.11	37.50			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.36	4.55	1	0.76	7.14	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	2.18	27.27	4	3.03	28.57	2	1.40	25.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-9 · ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	18	14.78	100.00	15	25.23	100.00	3	4.82	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.82	5.56	-	-	-	1	1.61	33.33			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	4.93	33.33	5	8.41	33.33	1	1.61	33.33			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	4.11	27.78	5	8.41	33.33	-	-	-			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	2.46	16.67	3	5.05	20.00	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	2.46	16.67	2	3.36	13.33	1	1.61	33.33			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-10 · ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	36	12.56	100.00	23	16.75	100.00	13	8.70	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.35	2.78	1	0.73	4.35	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	15	5.23	41.67	9	6.55	39.13	6	4.02	46.15
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.35	2.78	-	-	-	1	0.67	7.69
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	9	3.14	25.00	6	4.37	26.09	3	2.01	23.08
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.05	8.33	2	1.46	8.70	1	0.67	7.69
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.35	2.78	1	0.73	4.35	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	1.74	13.89	3	2.18	13.04	2	1.34	15.38
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.35	2.78	1	0.73	4.35	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-11 · ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	32	11.01	100.00	14	9.97	100.00	18	11.99	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.34	3.13	1	0.71	7.14	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	2.06	18.75	5	3.56	35.71	1	0.67	5.56			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.38	12.50	-	-	-	4	2.67	22.22			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.34	3.13	1	0.71	7.14	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	4.13	37.50	4	2.85	28.57	8	5.33	44.44			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.69	6.25	-	-	-	2	1.33	11.11			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.34	3.13	1	0.71	7.14	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	1.72	15.63	2	1.42	14.29	3	2.00	16.67			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-12 · ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	39	15.13	100.00	31	24.90	100.00	8	6.01	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.39	2.56	1	0.80	3.23	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	11	4.27	28.21	7	5.62	22.58	4	3.00	50.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.78	5.13	2	1.61	6.45	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	17	6.60	43.59	16	12.85	51.61	1	0.75	12.50			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.55	10.26	3	2.41	9.68	1	0.75	12.50			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.39	2.56	1	0.80	3.23	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.39	2.56	1	0.80	3.23	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	2	0.78	5.13	-	-	-	2	1.50	25.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-1 · ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	386	183.73	94.55	100.00	所有癌症死亡原因	210	211.82	109.47	100.00	所有癌症死亡原因	176	158.63	82.43	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	82	39.03	19.24	21.24	氣管、支氣管和肺癌	47	47.41	22.57	22.38	氣管、支氣管和肺癌	35	31.55	16.48	19.89
2	結腸、直腸和肛門癌	52	24.75	12.02	13.47	結腸、直腸和肛門癌	27	27.23	14.77	12.86	女性乳房癌	26	23.43	13.17	14.77
3	女性乳房癌(1)	26	23.43	13.17	6.74	肝和肝內膽管癌	25	25.22	13.90	11.90	結腸、直腸和肛門癌	25	22.53	9.79	14.20
4	肝和肝內膽管癌	46	21.90	11.14	11.92	前列腺(攝護腺)癌	21	21.18	7.91	10.00	肝和肝內膽管癌	21	18.93	8.94	11.93
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	21	21.18	7.91	5.44	胰臟癌	14	14.12	8.52	6.67	胰臟癌	10	9.01	4.70	5.68
6	胰臟癌	24	11.42	6.39	6.22	口腔癌	13	13.11	7.31	6.19	胃癌	8	7.21	3.42	4.55
7	胃癌	21	10.00	5.14	5.44	胃癌	13	13.11	7.27	6.19	卵巢癌	6	5.41	4.58	3.41
8	口腔癌	17	8.09	4.11	4.40	非何杰金氏淋巴瘤	9	9.08	5.37	4.29	子宮體癌	5	4.51	2.96	2.84
9	卵巢癌(1)	6	5.41	4.58	1.55	食道癌	5	5.04	3.12	2.38	口腔癌	4	3.61	1.44	2.27
10	非何杰金氏淋巴瘤	11	5.24	2.88	2.85	膀胱癌	5	5.04	2.61	2.38	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	2.70	1.49	1.70
	其他	80	38.08	20.38	20.73	其他	31	31.27	16.11	14.76	其他	33	29.74	15.47	18.75
11	子宮體癌(1)	5	4.51	2.96	1.30	小腸癌	4	4.03	2.86	1.90	腎臟癌	3	2.70	1.41	1.70
12	膀胱癌	8	3.81	1.70	2.07	白血病	4	4.03	1.75	1.90	膀胱癌	3	2.70	1.03	1.70
13	腎臟癌	7	3.33	1.91	1.81	腎臟癌	4	4.03	2.58	1.90	非何杰金氏淋巴瘤	2	1.80	0.65	1.14
14	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	2.70	1.49	0.78	鼻咽癌	3	3.03	1.48	1.43	腦癌	2	1.80	0.95	1.14
15	白血病(3)	5	2.38	1.11	1.30	胸腺癌	2	2.02	1.19	0.95	主唾液腺癌(4)	1	0.90	0.54	0.57

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：食道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、2.38人，每十萬人口標準化死亡率為1.38人。

(4)女性：甲狀腺癌、白血病、間皮和軟組織癌、鼻咽癌、膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、0.90人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.45人、0.54人、0.41人、0.25人、0.49人。

表31-2 · ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡 率	標準化 死亡率				死亡 率	標準化 死亡率				死亡 率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	436	190.03	102.25	100.00	所有癌症死亡原因	248	225.47	125.09	100.00	所有癌症死亡原因	188	157.40	83.59	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	82	35.74	17.98	18.81	氣管、支氣管和肺癌	55	50.00	27.52	22.18	女性乳房癌	32	26.79	15.88	17.02
2	女性乳房癌(1)	32	26.79	15.88	7.34	肝和肝內膽管癌	31	28.18	16.48	12.50	氣管、支氣管和肺癌	27	22.61	10.18	14.36
3	肝和肝內膽管癌	56	24.41	13.02	12.84	結腸、直腸和肛門癌	27	24.55	12.54	10.89	肝和肝內膽管癌	25	20.93	10.07	13.30
4	結腸、直腸和肛門癌	50	21.79	11.10	11.47	胃癌	19	17.27	8.90	7.66	結腸、直腸和肛門癌	23	19.26	9.83	12.23
5	胃癌	26	11.33	5.43	5.96	胰臟癌	17	15.46	8.77	6.85	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	7.54	4.68	4.79
6	胰臟癌	22	9.59	4.96	5.05	膀胱癌	14	12.73	5.91	5.65	卵巢癌	8	6.70	4.36	4.26
7	膀胱癌	18	7.85	3.41	4.13	食道癌	13	11.82	7.26	5.24	白血病	7	5.86	3.10	3.72
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	7.54	4.68	2.06	口腔癌	11	10.00	5.63	4.44	胃癌	7	5.86	2.60	3.72
9	前列腺(攝護腺)癌(2)	8	7.27	3.56	1.83	前列腺(攝護腺)癌	8	7.27	3.56	3.23	胰臟癌	5	4.19	1.93	2.66
10	卵巢癌(1)	8	6.70	4.36	1.83	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.36	3.74	2.82	膽囊和其他膽道癌	5	4.19	2.00	2.66
	其他	125	54.48	31.28	28.67	其他	46	41.82	24.78	18.55	其他	40	33.49	18.96	21.28
11	口腔癌	13	5.67	2.98	2.98	鼻咽癌	7	6.36	4.60	2.82	子宮體癌	4	3.35	2.13	2.13
12	食道癌	13	5.67	3.29	2.98	白血病	4	3.64	1.70	1.61	間皮和軟組織癌	4	3.35	1.79	2.13
13	白血病	11	4.79	2.50	2.52	腎臟癌	4	3.64	1.88	1.61	膀胱癌	4	3.35	1.38	2.13
14	非何杰金氏淋巴瘤	10	4.36	2.31	2.29	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	2.73	1.59	1.21	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.51	1.18	1.60
15	子宮體癌(1)	4	3.35	2.13	0.92	間皮和軟組織癌	2	1.82	0.77	0.81	口腔癌(3)	2	1.67	0.76	1.06

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：甲狀腺癌、腎臟癌、黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.67人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.01人、1.05人、1.52人。

表31-3 · ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	565	180.29	83.82	100.00	所有癌症死亡原因	287	195.65	91.64	100.00	所有癌症死亡原因	278	166.78	77.47	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	126	40.21	18.85	22.30	氣管、支氣管和肺癌	66	44.99	21.61	23.00	氣管、支氣管和肺癌	60	36.00	16.60	21.58
2	女性乳房癌(1)	40	24.00	13.17	7.08	肝和肝內膽管癌	40	27.27	13.64	13.94	女性乳房癌	40	24.00	13.17	14.39
3	肝和肝內膽管癌	74	23.61	10.94	13.10	結腸、直腸和肛門癌	33	22.50	9.21	11.50	結腸、直腸和肛門癌	35	21.00	8.47	12.59
4	結腸、直腸和肛門癌	68	21.70	8.82	12.04	非何杰金氏淋巴瘤	20	13.63	5.85	6.97	肝和肝內膽管癌	34	20.40	8.72	12.23
5	非何杰金氏淋巴瘤	31	9.89	4.49	5.49	胃癌	15	10.23	4.01	5.23	胰臟癌	23	13.80	6.15	8.27
6	胰臟癌	31	9.89	4.66	5.49	前列腺(攝護腺)癌	14	9.54	4.06	4.88	非何杰金氏淋巴瘤	11	6.60	3.36	3.96
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	14	9.54	4.06	2.48	白血病	11	7.50	3.28	3.83	胃癌	10	6.00	2.40	3.60
8	胃癌	25	7.98	3.12	4.42	腦癌	9	6.14	3.09	3.14	子宮體癌	9	5.40	2.72	3.24
9	白血病	17	5.42	2.53	3.01	膀胱癌	9	6.14	1.73	3.14	卵巢癌	8	4.80	2.69	2.88
10	子宮體癌(1)	9	5.40	2.72	1.59	食道癌	8	5.45	2.94	2.79	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	4.20	1.91	2.52
	其他	130	41.48	19.90	23.01	其他	62	42.27	22.23	21.60	其他	41	24.60	11.29	14.75
11	卵巢癌(1)	8	4.80	2.69	1.42	胰臟癌	8	5.45	2.87	2.79	白血病	6	3.60	1.89	2.16
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	4.20	1.91	1.24	口腔癌	7	4.77	3.21	2.44	腎臟癌	4	2.40	1.19	1.44
13	腦癌	11	3.51	1.80	1.95	鼻咽癌	6	4.09	2.78	2.09	小腸癌	3	1.80	0.80	1.08
14	膀胱癌	11	3.51	1.06	1.95	腎臟癌	5	3.41	1.69	1.74	間皮和軟組織癌	3	1.80	0.80	1.08
15	口腔癌(3)	9	2.87	1.81	1.59	間皮和軟組織癌(4)	4	2.73	1.04	1.39	膽囊和其他膽道癌	3	1.80	0.72	1.08

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：食道癌、腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、2.87人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.48人、1.43人。

(4)男性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.73人，每十萬人口標準化死亡率為1.53人。

表31-4 · ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡 率	標準化 死亡率				死亡 率	標準化 死亡率				死亡 率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	424	183.61	101.41	100.00	所有癌症死亡原因	253	234.65	136.03	100.00	所有癌症死亡原因	171	138.91	73.88	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	84	36.38	19.93	19.81	氣管、支氣管和肺癌	49	45.45	27.18	19.37	氣管、支氣管和肺癌	35	28.43	14.09	20.47
2	結腸、直腸和肛門癌	69	29.88	15.99	16.27	結腸、直腸和肛門癌	44	40.81	24.15	17.39	結腸、直腸和肛門癌	25	20.31	9.47	14.62
3	肝和肝內膽管癌	56	24.25	13.38	13.21	肝和肝內膽管癌	36	33.39	19.24	14.23	肝和肝內膽管癌	20	16.25	8.67	11.70
4	前列腺(攝護腺)癌(2)	18	16.69	7.82	4.25	前列腺(攝護腺)癌	18	16.69	7.82	7.11	女性乳房癌	17	13.81	7.56	9.94
5	女性乳房癌(1)	17	13.81	7.56	4.01	口腔癌	16	14.84	9.33	6.32	非何杰金氏淋巴瘤	8	6.50	4.20	4.68
6	口腔癌	19	8.23	5.02	4.48	白血病	12	11.13	7.41	4.74	卵巢癌	7	5.69	3.53	4.09
7	胃癌	19	8.23	4.23	4.48	胃癌	12	11.13	5.97	4.74	胃癌	7	5.69	2.81	4.09
8	胰臟癌	17	7.36	3.99	4.01	胰臟癌	11	10.20	5.99	4.35	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	4.87	2.15	3.51
9	非何杰金氏淋巴瘤	16	6.93	4.16	3.77	膀胱癌	9	8.35	3.81	3.56	胰臟癌	6	4.87	2.38	3.51
10	白血病	14	6.06	3.73	3.30	非何杰金氏淋巴瘤	8	7.42	4.27	3.16	腦癌	5	4.06	4.06	2.92
	其他	95	41.14	23.28	22.41	其他	38	35.24	20.85	15.02	其他	35	28.43	14.96	20.47
11	卵巢癌(1)	7	5.69	3.53	1.65	食道癌	8	7.42	4.17	3.16	膀胱癌	4	3.25	1.14	2.34
12	膀胱癌	13	5.63	2.32	3.07	腎臟癌	4	3.71	2.49	1.58	口腔癌	3	2.44	1.49	1.75
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	4.87	2.15	1.42	膽囊和其他膽道癌	4	3.71	2.09	1.58	子宮體癌	2	1.62	0.95	1.17
14	食道癌	9	3.90	2.14	2.12	腦癌	3	2.78	1.53	1.19	甲狀腺癌	2	1.62	0.94	1.17
15	腦癌	8	3.46	2.74	1.89	鼻咽癌	3	2.78	1.77	1.19	白血病(3)	2	1.62	0.64	1.17

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：骨和關節軟骨癌、腎臟癌、膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.62人，每十萬人口標準化死亡率分別為2.00人、0.80人、0.86人。

表31-5 · ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	317	194.56	100.26	100.00	所有癌症死亡原因	164	210.59	110.69	100.00	所有癌症死亡原因	153	179.89	91.21	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	59	36.21	19.51	18.61	氣管、支氣管和肺癌	33	42.37	23.80	20.12	氣管、支氣管和肺癌	26	30.57	15.73	16.99
2	女性乳房癌(1)	22	25.87	16.17	6.94	肝和肝內膽管癌	24	30.82	15.97	14.63	女性乳房癌	22	25.87	16.17	14.38
3	結腸、直腸和肛門癌	42	25.78	11.89	13.25	結腸、直腸和肛門癌	24	30.82	14.05	14.63	結腸、直腸和肛門癌	18	21.16	9.85	11.76
4	肝和肝內膽管癌	40	24.55	11.96	12.62	胃癌	12	15.41	8.05	7.32	肝和肝內膽管癌	16	18.81	8.46	10.46
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	11	14.12	6.11	3.47	前列腺(攝護腺)癌	11	14.12	6.11	6.71	胰臟癌	16	18.81	8.34	10.46
6	胰臟癌	21	12.89	6.37	6.62	口腔癌	7	8.99	6.05	4.27	卵巢癌	8	9.41	4.70	5.23
7	胃癌	19	11.66	5.83	5.99	非何杰金氏淋巴瘤	6	7.70	3.60	3.66	胃癌	7	8.23	3.93	4.58
8	卵巢癌(1)	8	9.41	4.70	2.52	食道癌	6	7.70	4.04	3.66	腎臟癌	6	7.05	2.85	3.92
9	非何杰金氏淋巴瘤	8	4.91	2.24	2.52	胰臟癌	5	6.42	4.24	3.05	膽囊和其他膽道癌	5	5.88	2.90	3.27
10	食道癌	8	4.91	2.42	2.52	鼻咽癌	5	6.42	4.09	3.05	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	3.53	2.57	1.96
	其他	79	48.49	26.03	24.92	其他	31	39.81	20.68	18.90	其他	26	30.57	15.71	16.99
11	腎臟癌	8	4.91	1.92	2.52	白血病	3	3.85	0.95	1.83	子宮體癌	3	3.53	2.08	1.96
12	口腔癌	7	4.30	2.83	2.21	間皮和軟組織癌	3	3.85	1.86	1.83	白血病	3	3.53	1.14	1.96
13	膽囊和其他膽道癌	7	4.30	2.22	2.21	膀胱癌	3	3.85	1.89	1.83	非何杰金氏淋巴瘤	2	2.35	1.08	1.31
14	白血病	6	3.68	1.06	1.89	喉癌	2	2.57	0.63	1.22	食道癌	2	2.35	1.03	1.31
15	鼻咽癌	6	3.68	2.26	1.89	腎臟癌(3)	2	2.57	0.90	1.22	腦癌(4)	2	2.35	1.49	1.31

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：黑色素瘤和其他皮膚癌、膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、2.57人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.21人、1.48人。

(4)女性：膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、2.35人，每十萬人口標準化死亡率為0.65人。

表31-6 · ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	300	229.09	127.23	100.00	所有癌症死亡原因	180	281.25	167.05	100.00	所有癌症死亡原因	120	179.23	92.95	100.00
1	結腸、直腸和肛門癌	51	38.95	20.57	17.00	肝和肝內膽管癌	32	50.00	29.61	17.78	結腸、直腸和肛門癌	26	38.83	19.67	21.67
2	氣管、支氣管和肺癌	48	36.65	19.78	16.00	氣管、支氣管和肺癌	28	43.75	25.95	15.56	氣管、支氣管和肺癌	20	29.87	14.15	16.67
3	肝和肝內膽管癌	45	34.36	19.06	15.00	結腸、直腸和肛門癌	25	39.06	22.10	13.89	肝和肝內膽管癌	13	19.42	9.55	10.83
4	女性乳房癌(1)	12	17.92	11.31	4.00	胃癌	18	28.13	15.46	10.00	女性乳房癌	12	17.92	11.31	10.00
5	胃癌	22	16.80	8.66	7.33	食道癌	11	17.19	10.88	6.11	卵巢癌	8	11.95	7.30	6.67
6	胰臟癌	19	14.51	7.81	6.33	胰臟癌	11	17.19	10.12	6.11	胰臟癌	8	11.95	5.60	6.67
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	8	12.50	6.37	2.67	前列腺(攝護腺)癌	8	12.50	6.37	4.44	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	5.97	2.78	3.33
8	卵巢癌(1)	8	11.95	7.30	2.67	口腔癌	7	10.94	8.00	3.89	非何杰金氏淋巴瘤	4	5.97	3.35	3.33
9	食道癌	11	8.40	5.14	3.67	白血病	7	10.94	7.41	3.89	胃癌	4	5.97	2.95	3.33
10	白血病	10	7.64	4.51	3.33	膀胱癌	4	6.25	3.08	2.22	白血病	3	4.48	1.86	2.50
	其他	66	50.40	29.27	22.00	其他	29	45.31	28.07	16.11	其他	18	26.89	14.45	15.00
11	口腔癌	8	6.11	4.08	2.67	膽囊和其他膽道癌	4	6.25	3.83	2.22	腦癌	3	4.48	3.92	2.50
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	4	5.97	2.78	1.33	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.69	3.87	1.67	膽囊和其他膽道癌	3	4.48	1.97	2.50
13	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.35	3.64	2.33	腎臟癌	3	4.69	2.47	1.67	膀胱癌	2	2.99	1.35	1.67
14	膽囊和其他膽道癌	7	5.35	2.92	2.33	鼻咽癌	3	4.69	3.36	1.67	鼻咽癌	2	2.99	1.59	1.67
15	膀胱癌	6	4.58	2.07	2.00	喉癌(3)	1	1.56	0.97	0.56	口腔癌(4)	1	1.49	0.48	0.83

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：黑色素瘤和其他皮膚癌、腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.56人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.78人、0.84人。

(4)女性：主唾液腺癌、腎臟癌、黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.49人

，每十萬人口標準化死亡率分別為0.60人、0.48人、0.48人。

表31-7 · ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	459	235.96	120.66	100.00	所有癌症死亡原因	279	290.44	152.24	100.00	所有癌症死亡原因	180	182.80	92.84	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	91	46.78	22.85	19.83	氣管、支氣管和肺癌	57	59.34	29.86	20.43	氣管、支氣管和肺癌	34	34.53	16.99	18.89
2	肝和肝內膽管癌	65	33.41	16.80	14.16	肝和肝內膽管癌	51	53.09	28.02	18.28	結腸、直腸和肛門癌	30	30.47	14.82	16.67
3	結腸、直腸和肛門癌	65	33.41	16.15	14.16	結腸、直腸和肛門癌	35	36.44	18.13	12.54	女性乳房癌	29	29.45	16.65	16.11
4	女性乳房癌(1)	29	29.45	16.65	6.32	口腔癌	19	19.78	12.71	6.81	肝和肝內膽管癌	14	14.22	6.47	7.78
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	15	15.62	6.78	3.27	食道癌	18	18.74	11.07	6.45	胃癌	10	10.16	5.15	5.56
6	胃癌	26	13.37	6.39	5.66	胃癌	16	16.66	7.91	5.73	非何杰金氏淋巴瘤	8	8.12	4.29	4.44
7	口腔癌	21	10.80	6.76	4.58	前列腺(攝護腺)癌	15	15.62	6.78	5.38	胰臟癌	6	6.09	2.97	3.33
8	食道癌	19	9.77	5.65	4.14	胰臟癌	11	11.45	6.59	3.94	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	5.08	2.69	2.78
9	胰臟癌	17	8.74	4.74	3.70	膀胱癌	7	7.29	3.35	2.51	卵巢癌	5	5.08	3.71	2.78
10	非何杰金氏淋巴瘤	14	7.20	4.05	3.05	鼻咽癌	7	7.29	5.39	2.51	白血病	3	3.05	1.27	1.67
	其他	97	49.86	25.40	21.13	其他	43	44.76	22.42	15.41	其他	36	36.56	17.82	20.00
11	鼻咽癌	10	5.14	3.40	2.18	非何杰金氏淋巴瘤	6	6.25	3.70	2.15	鼻咽癌	3	3.05	1.51	1.67
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	5	5.08	2.69	1.09	喉癌	6	6.25	2.59	2.15	膽囊和其他膽道癌	3	3.05	1.36	1.67
13	卵巢癌(1)	5	5.08	3.71	1.09	白血病	5	5.21	2.55	1.79	口腔癌	2	2.03	1.38	1.11
14	白血病	8	4.11	1.83	1.74	腎臟癌	5	5.21	2.72	1.79	子宮體癌	2	2.03	1.17	1.11
15	膀胱癌	8	4.11	1.72	1.74	膽囊和其他膽道癌	2	2.08	1.24	0.72	甲狀腺癌(3)	2	2.03	1.20	1.11

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：腎臟癌、間皮和軟組織癌、腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、2.03人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.88人、1.17人、0.88人。

表31-8 · ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	453	164.94	95.06	100.00	所有癌症死亡原因	257	194.41	112.65	100.00	所有癌症死亡原因	196	137.59	79.17	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	85	30.95	16.78	18.76	氣管、支氣管和肺癌	50	37.82	20.60	19.46	氣管、支氣管和肺癌	35	24.57	13.32	17.86
2	結腸、直腸和肛門癌	60	21.85	12.01	13.25	肝和肝內膽管癌	36	27.23	17.85	14.01	結腸、直腸和肛門癌	34	23.87	12.70	17.35
3	肝和肝內膽管癌	56	20.39	12.88	12.36	結腸、直腸和肛門癌	26	19.67	11.15	10.12	女性乳房癌	28	19.66	12.08	14.29
4	女性乳房癌(1)	28	19.66	12.08	6.18	前列腺(攝護腺)癌	23	17.40	9.02	8.95	肝和肝內膽管癌	20	14.04	8.33	10.20
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	23	17.40	9.02	5.08	胃癌	19	14.37	9.50	7.39	子宮頸及部位未明示子宮癌	14	9.83	6.13	7.14
6	胃癌	32	11.65	7.29	7.06	口腔癌	16	12.10	7.31	6.23	胃癌	13	9.13	5.68	6.63
7	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	14	9.83	6.13	3.09	胰臟癌	14	10.59	6.28	5.45	卵巢癌	12	8.42	5.59	6.12
8	卵巢癌(1)	12	8.42	5.59	2.65	食道癌	10	7.56	5.17	3.89	非何杰金氏淋巴瘤	4	2.81	1.27	2.04
9	口腔癌	18	6.55	3.80	3.97	膀胱癌	9	6.81	2.75	3.50	間皮和軟組織癌	4	2.81	1.41	2.04
10	胰臟癌	16	5.83	3.40	3.53	腎臟癌	8	6.05	3.63	3.11	膽囊和其他膽道癌	3	2.11	1.28	1.53
	其他	109	39.69	21.89	24.06	其他	46	34.80	19.39	17.90	其他	29	20.36	11.36	14.80
11	膀胱癌	11	4.01	1.67	2.43	白血病	6	4.54	2.36	2.33	口腔癌	2	1.40	0.70	1.02
12	非何杰金氏淋巴瘤	10	3.64	1.88	2.21	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.54	2.68	2.33	白血病	2	1.40	0.78	1.02
13	食道癌	10	3.64	2.37	2.21	鼻咽癌	5	3.78	2.72	1.95	胰臟癌	2	1.40	0.93	1.02
14	腎臟癌	10	3.64	2.12	2.21	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	2.27	1.05	1.17	腎臟癌	2	1.40	0.84	1.02
15	白血病	8	2.91	1.57	1.77	喉癌(3)	2	1.51	0.65	0.78	黑色素瘤和其他皮膚癌(4)	2	1.40	0.78	1.02

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.51人，每十萬人口標準化死亡率為1.08人。

(4)女性：膀胱癌、鼻咽癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.40人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.60人、1.03人。

表31-9 · ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡 率	標準化 死亡率				死亡 率	標準化 死亡率				死亡 率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	231	189.73	120.52	100.00	所有癌症死亡原因	140	235.45	157.74	100.00	所有癌症死亡原因	91	146.09	88.23	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	45	36.96	22.87	19.48	氣管、支氣管和肺癌	26	43.73	29.76	18.57	氣管、支氣管和肺癌	19	30.50	17.27	20.88
2	肝和肝內膽管癌	33	27.10	16.67	14.29	結腸、直腸和肛門癌	23	38.68	24.98	16.43	肝和肝內膽管癌	11	17.66	9.92	12.09
3	結腸、直腸和肛門癌	30	24.64	15.01	12.99	肝和肝內膽管癌	22	37.00	24.13	15.71	女性乳房癌	10	16.05	10.28	10.99
4	女性乳房癌(1)	10	16.05	10.28	4.33	胃癌	11	18.50	11.90	7.86	胃癌	8	12.84	8.06	8.79
5	胃癌	19	15.61	9.65	8.23	口腔癌	8	13.45	10.14	5.71	胰臟癌	8	12.84	6.95	8.79
6	胰臟癌	14	11.50	7.43	6.06	食道癌	6	10.09	7.40	4.29	結腸、直腸和肛門癌	7	11.24	6.40	7.69
7	口腔癌	8	6.57	4.69	3.46	胰臟癌	6	10.09	7.92	4.29	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.82	3.00	3.30
8	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.75	3.79	3.03	鼻咽癌	5	8.41	5.97	3.57	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.82	2.82	3.30
9	食道癌	7	5.75	3.71	3.03	非何杰金氏淋巴瘤	4	6.73	4.56	2.86	膽囊和其他膽道癌	3	4.82	2.55	3.30
10	前列腺(攝護腺)癌(2)	3	5.05	3.18	1.30	白血病	3	5.05	3.00	2.14	子宮體癌	2	3.21	2.40	2.20
	其他	55	45.17	29.71	23.81	其他	26	43.73	27.96	18.57	其他	17	27.29	18.57	18.68
11	鼻咽癌	6	4.93	3.36	2.60	前列腺(攝護腺)癌	3	5.05	3.18	2.14	白血病	2	3.21	2.31	2.20
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	4.82	3.00	1.30	喉癌	2	3.36	2.09	1.43	腎臟癌	2	3.21	1.94	2.20
13	白血病	5	4.11	2.62	2.16	腎臟癌	2	3.36	2.62	1.43	卵巢癌	1	1.61	1.16	1.10
14	腎臟癌	4	3.29	2.25	1.73	間皮和軟組織癌	2	3.36	1.90	1.43	食道癌	1	1.61	0.67	1.10
15	膽囊和其他膽道癌	4	3.29	2.00	1.73	腦癌	2	3.36	2.55	1.43	黑色素瘤和其他皮膚癌(3)	1	1.61	1.16	1.10

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：腦癌、膀胱癌、鼻咽癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.61人，每十萬人口標準化死亡率分別為2.01人、1.25人、0.94人。

表31-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	458	159.77	112.15	100.00	所有癌症死亡原因	273	198.80	148.10	100.00	所有癌症死亡原因	185	123.87	83.13	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	84	29.30	21.10	18.34	氣管、支氣管和肺癌	55	40.05	31.55	20.15	結腸、直腸和肛門癌	34	22.77	15.45	18.38
2	肝和肝內膽管癌	63	21.98	15.81	13.76	肝和肝內膽管癌	46	33.50	26.49	16.85	氣管、支氣管和肺癌	29	19.42	13.14	15.68
3	結腸、直腸和肛門癌	54	18.84	13.88	11.79	結腸、直腸和肛門癌	20	14.56	12.15	7.33	女性乳房癌	26	17.41	11.58	14.05
4	女性乳房癌(1)	26	17.41	11.58	5.68	口腔癌	18	13.11	9.89	6.59	肝和肝內膽管癌	17	11.38	7.59	9.19
5	胃癌	30	10.47	7.89	6.55	食道癌	17	12.38	9.59	6.23	胃癌	16	10.71	7.75	8.65
6	胰臟癌	26	9.07	6.30	5.68	胰臟癌	15	10.92	7.46	5.49	胰臟癌	11	7.37	5.11	5.95
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	10	7.28	3.95	2.18	胃癌	14	10.20	8.07	5.13	子宮體癌	9	6.03	3.29	4.86
8	口腔癌	18	6.28	4.55	3.93	膀胱癌	11	8.01	4.84	4.03	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	4.02	2.74	3.24
9	食道癌	18	6.28	4.70	3.93	非何杰金氏淋巴瘤	10	7.28	4.92	3.66	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.02	2.71	3.24
10	子宮體癌(1)	9	6.03	3.29	1.97	前列腺(攝護腺)癌	10	7.28	3.95	3.66	白血病	3	2.01	1.22	1.62
	其他	120	41.86	28.08	26.20	其他	57	41.51	29.19	20.88	其他	28	18.75	12.56	15.14
11	非何杰金氏淋巴瘤	16	5.58	3.78	3.49	鼻咽癌	10	7.28	5.30	3.66	膽囊和其他膽道癌	3	2.01	0.98	1.62
12	膀胱癌	13	4.53	2.81	2.84	膽囊和其他膽道癌	8	5.83	3.79	2.93	卵巢癌	2	1.34	0.90	1.08
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	4.02	2.74	1.31	腦癌	6	4.37	3.06	2.20	腎臟癌	2	1.34	0.83	1.08
14	鼻咽癌	11	3.84	2.62	2.40	白血病	5	3.64	2.11	1.83	腦癌	2	1.34	0.72	1.08
15	膽囊和其他膽道癌	11	3.84	2.21	2.40	腎臟癌	4	2.91	2.13	1.47	膀胱癌	2	1.34	0.89	1.08

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-11 · ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因
中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	509	175.17	98.15	100.00	所有癌症死亡原因	293	208.57	124.48	100.00	所有癌症死亡原因	216	143.91	75.58	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	105	36.14	20.00	20.63	氣管、支氣管和肺癌	68	48.40	28.22	23.21	氣管、支氣管和肺癌	37	24.65	13.07	17.13
2	結腸、直腸和肛門癌	81	27.88	15.08	15.91	結腸、直腸和肛門癌	44	31.32	18.41	15.02	結腸、直腸和肛門癌	37	24.65	12.28	17.13
3	肝和肝內膽管癌	65	22.37	12.36	12.77	肝和肝內膽管癌	40	28.47	17.42	13.65	肝和肝內膽管癌	25	16.66	8.12	11.57
4	女性乳房癌(1)	22	14.66	8.38	4.32	胃癌	20	14.24	8.64	6.83	女性乳房癌	22	14.66	8.38	10.19
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	17	12.10	6.09	3.34	口腔癌	19	13.52	9.13	6.48	胰臟癌	21	13.99	7.74	9.72
6	胰臟癌	34	11.70	6.66	6.68	前列腺(攝護腺)癌	17	12.10	6.09	5.80	胃癌	10	6.66	3.23	4.63
7	胃癌	30	10.32	5.72	5.89	食道癌	13	9.25	5.70	4.44	卵巢癌	7	4.66	2.46	3.24
8	口腔癌	20	6.88	4.51	3.93	胰臟癌	13	9.25	5.32	4.44	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	4.00	1.97	2.78
9	卵巢癌(1)	7	4.66	2.46	1.38	白血病	6	4.27	3.59	2.05	膀胱癌	6	4.00	1.78	2.78
10	食道癌	13	4.47	2.64	2.55	膽囊和其他膽道癌	6	4.27	2.24	2.05	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.33	1.72	2.31
	其他	115	39.58	22.68	22.59	其他	47	33.46	19.74	16.04	其他	40	26.65	14.83	18.52
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	4.00	1.97	1.18	膀胱癌	5	3.56	1.70	1.71	腦癌	5	3.33	1.79	2.31
12	膀胱癌	11	3.79	1.77	2.16	非何杰金氏淋巴瘤	4	2.85	1.20	1.37	白血病	4	2.67	1.52	1.85
13	白血病	10	3.44	2.59	1.96	間皮和軟組織癌	3	2.14	1.22	1.02	子宮體癌	3	2.00	1.27	1.39
14	非何杰金氏淋巴瘤	9	3.10	1.48	1.77	骨和關節軟骨癌	2	1.42	1.78	0.68	鼻咽癌	3	2.00	1.25	1.39
15	膽囊和其他膽道癌	9	3.10	1.52	1.77	鼻咽癌	2	1.42	0.71	0.68	膽囊和其他膽道癌	3	2.00	0.88	1.39

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-12 · ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因

中華民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	487	188.99	111.14	100.00	所有癌症死亡原因	271	217.67	136.09	100.00	所有癌症死亡原因	216	162.18	90.38	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	93	36.09	20.50	19.10	氣管、支氣管和肺癌	55	44.18	26.85	20.30	氣管、支氣管和肺癌	38	28.53	15.35	17.59
2	肝和肝內膽管癌	68	26.39	15.93	13.96	肝和肝內膽管癌	46	36.95	23.59	16.97	結腸、直腸和肛門癌	31	23.28	13.01	14.35
3	結腸、直腸和肛門癌	64	24.84	14.03	13.14	結腸、直腸和肛門癌	33	26.51	15.18	12.18	女性乳房癌	24	18.02	11.08	11.11
4	女性乳房癌(1)	24	18.02	11.08	4.93	口腔癌	20	16.06	11.03	7.38	肝和肝內膽管癌	22	16.52	9.46	10.19
5	胰臟癌	32	12.42	6.89	6.57	胃癌	16	12.85	7.48	5.90	胰臟癌	17	12.76	6.78	7.87
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	15	12.05	6.62	3.08	前列腺(攝護腺)癌	15	12.05	6.62	5.54	胃癌	10	7.51	3.58	4.63
7	胃癌	26	10.09	5.39	5.34	胰臟癌	15	12.05	7.05	5.54	非何杰金氏淋巴瘤	9	6.76	2.95	4.17
8	口腔癌	25	9.70	6.35	5.13	食道癌	9	7.23	5.06	3.32	口腔癌	5	3.75	2.31	2.31
9	非何杰金氏淋巴瘤	14	5.43	2.70	2.87	膀胱癌	9	7.23	3.92	3.32	卵巢癌	5	3.75	1.90	2.31
10	食道癌	11	4.27	2.67	2.26	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.02	2.52	1.85	間皮和軟組織癌	5	3.75	2.21	2.31
	其他	115	44.63	27.75	23.61	其他	48	38.55	26.79	17.71	其他	50	37.54	21.74	23.15
11	膀胱癌	11	4.27	2.28	2.26	鼻咽癌	5	4.02	2.89	1.85	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	3.00	1.51	1.85
12	卵巢癌(1)	5	3.75	1.90	1.03	間皮和軟組織癌	4	3.21	2.02	1.48	白血病	4	3.00	2.00	1.85
13	間皮和軟組織癌	9	3.49	2.12	1.85	腦癌	4	3.21	3.00	1.48	腎臟癌	4	3.00	1.73	1.85
14	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	4	3.00	1.51	0.82	膽囊和其他膽道癌	3	2.41	1.31	1.11	小腸癌	3	2.25	1.21	1.39
15	腦癌	7	2.72	2.07	1.44	小腸癌(3)	2	1.61	1.17	0.74	甲狀腺癌(4)	3	2.25	1.16	1.39

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：白血病、骨和關節軟骨癌、喉癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.61人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.10人、1.66人、0.85人。

(4)女性：骨和關節軟骨癌、腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.25人，每十萬人口標準化死亡率分別為2.31人、1.21人。

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表32·臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		11,551	437.00	473.41		13,733	523.20	392.14		14,339	547.41	392.62		13,875	528.71	364.83		14,486	550.64	363.48
08-14	惡性腫瘤	1	3,180	120.31	126.30	1	4,202	160.09	122.12	1	4,290	163.78	120.21	1	4,423	168.54	118.90	1	4,566	173.56	118.18
25-27-28*	心臟疾病	3	1,257	47.56	52.39	2	1,732	65.99	46.85	2	1,665	63.56	42.87	2	1,527	58.19	38.38	2	1,642	62.42	39.41
29	腦血管疾病	2	1,306	49.41	53.45	3	1,240	47.24	33.77	3	1,367	52.19	35.74	3	1,182	45.04	29.23	3	1,289	49.00	30.31
181	糖尿病	5	620	23.46	25.12	4	893	34.02	24.96	4	988	37.72	26.19	4	946	36.05	23.79	4	958	36.42	23.27
321	肺炎	7	372	14.07	16.31	7	447	17.03	11.49	5	572	21.84	13.82	5	575	21.91	13.32	5	688	26.15	14.96
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	358	13.54	14.96	5	503	19.16	13.77	6	544	20.77	13.94	6	485	18.48	12.19	6	549	20.87	12.78
E47-E53	事故傷害	4	752	28.45	28.41	6	463	17.64	15.78	8	415	15.84	14.03	8	379	14.44	12.68	7	372	14.14	11.97
E54	自殺	10	206	7.79	7.56	8	346	13.18	10.93	7	467	17.83	14.79	7	454	17.30	14.12	8	364	13.84	11.27
347	慢性肝病及肝硬化	6	380	14.38	14.81	9	333	12.69	9.96	9	323	12.33	9.20	9	317	12.08	8.86	9	331	12.58	8.92
038	敗血症	13	96	3.63	4.04	12	94	3.58	2.52	11	150	5.73	3.78	11	145	5.53	3.48	10	188	7.15	4.07
26	高血壓性疾病	9	292	11.05	12.14	10	167	6.36	4.43	10	162	6.18	4.14	10	176	6.71	4.30	11	141	5.36	3.17
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	190	7.19	7.76	11	113	4.31	2.92	12	109	4.16	2.79	12	92	3.51	2.26	12	97	3.69	2.23
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	76	2.88	3.05	14	70	2.67	1.89	13	77	2.94	2.06	13	79	3.01	1.89	13	80	3.04	1.87
02	結核病	15	80	3.03	3.20	13	74	2.82	2.01	14	60	2.29	1.62	14	68	2.59	1.63	14	57	2.17	1.32
44	先天性畸形	12	99	3.75	5.51	15	48	1.83	3.32	16	39	1.49	2.66	15	42	1.60	2.92	15	48	1.82	3.51
	其他		2,287	86.52	98.40		3,008	114.60	85.42		3,111	118.77	84.77		2,985	113.74	76.88		3,116	118.45	76.24

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表32·臺北市歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		15,119	575.72	366.18		14,870	568.60	347.27		15,047	575.83	338.78		15,834	600.94	343.47		16,397	615.94	344.34
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10	112.87	1	4,563	174.48	111.24	1	4,632	177.26	110.14	1	4,732	179.59	109.78	1	4,981	187.11	111.52
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2,014	76.69	46.14	2	1,768	67.61	39.98	2	1,723	65.94	36.69	2	1,905	72.30	38.51	2	2,028	76.18	40.21
I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66	27.26	3	1,128	43.13	24.61	3	1,047	40.07	21.91	3	1,137	43.15	23.13	3	1,186	44.55	22.94
J12-J18	肺炎	4	950	36.18	20.14	4	840	32.12	16.59	4	899	34.40	16.89	4	942	35.75	16.96	4	905	34.00	15.54
E10-E14	糖尿病	5	716	27.26	16.89	5	825	31.55	18.86	5	769	29.43	16.78	5	775	29.41	16.39	5	817	30.69	16.63
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98	9.27	6	496	18.97	9.85	7	465	17.79	8.87	6	582	22.09	10.48	6	591	22.20	10.31
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	491	18.70	11.20	7	451	17.25	9.72	6	474	18.14	10.07	8	448	17.00	8.89	9	531	19.95	10.62
I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24	8.21	9	385	14.72	8.17	9	422	16.15	8.49	9	446	16.93	8.47	8	536	20.13	9.74
A40-A41	敗血症	6	513	19.53	11.27	8	441	16.86	9.44	8	449	17.18	9.25	7	566	21.48	10.81	7	559	21.00	10.47
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	389	14.81	11.94	10	377	14.42	11.20	11	359	13.74	10.71	10	402	15.26	10.92	10	430	16.15	11.31
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	370	14.09	11.40	12	341	13.04	10.39	12	329	12.59	9.67	12	306	11.61	8.98	11	333	12.51	9.82
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	17	69	2.63	1.29	15	112	4.28	2.06	15	116	4.44	2.00	14	136	5.16	2.18	15	129	4.85	1.94
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	281	10.70	5.87	13	340	13.00	6.39	10	380	14.54	6.79	13	217	8.24	4.45	13	167	6.27	3.41
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27	7.69	11	349	13.35	8.79	13	318	12.17	7.90	11	315	11.96	7.65	12	286	10.74	6.77
G20-G21	帕金森病	15	93	3.54	1.88	16	92	3.52	1.89	16	111	4.25	2.10	16	121	4.59	2.33	14	158	5.94	2.92
	其他		2,451	93.33	62.86		2,362	90.32	58.09		2,554	97.74	60.52		2,804	106.42	63.54		2,760	103.68	60.21

表32·臺北市歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年			
		順位	死人 數	死亡 率	標準 化率	順位	死人 數	死亡 率	標準 化率	順位	死人 數	死亡 率	標準 化率
A00-Y98	所有死亡原因		16,100	600.78	326.27		16,953	629.19	332.49		17,160	634.72	325.57
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,919	183.55	106.98	1	4,903	181.97	103.66	1	5,025	185.87	102.84
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,075	77.43	39.81	2	2,489	92.38	46.23	2	2,381	88.07	42.60
I60-I69	腦血管疾病	3	1,210	45.15	22.34	3	1,212	44.98	22.40	3	1,153	42.65	20.08
J12-J18	肺炎	4	883	32.95	14.46	4	1,060	39.34	17.10	4	1,125	41.61	17.37
E10-E14	糖尿病	5	860	32.09	16.84	5	854	31.70	16.16	5	773	28.59	13.87
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	573	21.38	9.73	6	657	24.38	10.28	6	636	23.52	9.54
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	488	18.21	9.13	7	556	20.64	9.89	7	565	20.90	9.68
I10-I15	高血壓性疾病	7	493	18.40	8.66	8	461	17.11	7.55	8	463	17.13	7.65
A40-A41	敗血症	9	466	17.39	8.18	10	445	16.52	7.62	9	462	17.09	7.49
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	406	15.15	10.47	9	458	17.00	11.23	10	435	16.09	11.05
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	261	9.74	7.40	11	311	11.54	9.06	11	318	11.76	8.72
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	15	142	5.30	2.11	14	198	7.35	2.78	12	299	11.06	3.97
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	191	7.13	3.62	12	309	11.47	5.02	13	297	10.99	4.67
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	310	11.57	6.99	13	284	10.54	6.29	14	278	10.28	5.96
G20-G21	帕金森病	14	155	5.78	2.71	15	135	5.01	2.23	15	180	6.66	2.95
	其他		2,668	99.56	56.83		2,621	97.28	55.00		2,770	102.46	57.14

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
01-56	所有死亡原因		7,172	541.89	552.47		8,352	647.93	474.26		8,763	683.06	480.28		8,387	654.67	445.74		8,633	674.39	445.81
08-14	惡性腫瘤	1	1,977	149.38	148.48	1	2,594	201.24	149.63	1	2,630	205.00	148.15	1	2,695	210.37	146.09	1	2,757	215.37	146.53
25-27-28*	心臟疾病	3	791	59.77	61.02	2	1,107	85.88	59.64	2	1,060	82.62	54.25	2	971	75.79	49.62	2	1,026	80.15	51.54
29	腦血管疾病	2	800	60.45	60.80	3	725	56.24	39.19	3	822	64.07	43.39	3	680	53.08	34.17	3	768	59.99	37.36
181	糖尿病	5	328	24.78	25.13	4	440	34.13	24.46	4	521	40.61	27.75	4	473	36.92	24.11	4	495	38.67	25.11
321	肺炎	7	245	18.51	20.24	6	300	23.27	14.96	5	370	28.84	17.20	5	373	29.12	17.22	5	446	34.84	19.16
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	185	13.98	14.57	7	278	21.57	14.97	6	324	25.26	16.55	8	261	20.37	13.06	6	272	21.25	12.61
E47-E53	事故傷害	4	535	40.42	39.71	5	342	26.53	23.74	8	312	24.32	21.46	7	281	21.93	19.32	7	265	20.70	17.90
E54	自殺	11	123	9.29	8.97	8	225	17.46	14.81	7	313	24.40	20.52	6	309	24.12	20.00	8	228	17.81	14.72
347	慢性肝病及肝硬化	6	273	20.63	20.35	9	222	17.22	13.87	9	192	14.97	11.51	9	210	16.39	12.38	9	222	17.34	12.80
038	敗血症	14	50	3.78	3.89	13	54	4.19	2.83	11	73	5.69	3.62	11	73	5.70	3.34	10	82	6.41	3.70
26	高血壓性疾病	9	167	12.62	12.56	10	82	6.36	4.29	10	106	8.26	5.49	10	94	7.34	4.78	11	69	5.39	3.04
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	131	9.90	10.03	11	73	5.66	3.64	12	71	5.53	3.57	12	58	4.53	2.83	12	61	4.77	2.83
02	胃及十二指腸之潰瘍	13	58	4.38	4.31	14	43	3.34	2.25	13	52	4.05	2.78	14	43	3.36	2.06	13	48	3.75	2.30
02	結核病	12	71	5.36	5.31	12	59	4.58	3.14	14	50	3.90	2.70	13	53	4.14	2.46	14	40	3.12	1.84
44	先天性畸形	16	48	3.63	5.11	16	25	1.94	3.25	17	17	1.33	2.20	16	16	1.25	2.40	15	23	1.80	3.55
	其他		1,390	105.02	111.99		1,783	138.32	99.59		1,850	144.20	99.15		1,797	140.27	91.90		1,831	143.03	90.82

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		8,992	705.67	449.24		8,782	693.85	425.20		8,882	704.08	421.30		9,359	737.25	426.54		9,628	751.69	429.77
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,698	211.73	140.18	1	2,671	211.03	134.11	1	2,771	219.66	137.29	1	2,749	216.55	132.95	1	2,937	229.30	138.02
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1,278	100.29	60.74	2	1,101	86.99	52.89	2	1,039	82.36	47.58	2	1,155	90.98	50.79	2	1,246	97.28	54.52
J12-J18	肺炎	4	619	48.58	26.32	4	528	41.72	21.04	4	548	43.44	21.00	4	605	47.66	22.21	4	563	43.96	20.08
I60-I69	腦血管疾病	3	677	53.13	32.56	3	647	51.12	29.05	3	602	47.72	26.99	3	697	54.91	29.93	3	679	53.01	28.56
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	337	26.45	13.76	6	377	29.79	15.11	6	335	26.56	12.91	5	445	35.05	16.00	5	430	33.57	15.24
E10-E14	糖尿病	5	352	27.62	17.36	5	423	33.42	20.41	5	384	30.44	17.70	6	393	30.96	18.33	6	414	32.32	18.20
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	269	21.11	17.19	7	260	20.54	16.29	7	258	20.45	16.18	8	267	21.03	15.84	8	285	22.25	16.23
A40-A41	敗血症	8	263	20.64	11.78	10	233	18.41	10.28	10	230	18.23	9.72	7	337	26.55	13.53	7	308	24.05	11.78
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	240	18.83	11.24	8	249	19.67	10.79	8	234	18.55	10.57	9	236	18.59	9.68	10	255	19.91	11.13
I10-I15	高血壓性疾病	11	204	16.01	9.43	12	206	16.28	9.25	9	231	18.31	9.74	10	230	18.12	9.32	9	274	21.39	10.76
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	231	18.13	15.00	9	234	18.49	14.83	11	212	16.81	13.01	12	188	14.81	11.63	11	207	16.16	12.59
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	197	15.46	10.94	11	232	18.33	12.76	12	198	15.70	10.91	11	211	16.62	11.40	12	187	14.60	9.70
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	19	31	2.43	1.15	18	44	3.48	1.58	17	55	4.36	1.97	16	63	4.96	2.10	16	64	5.00	2.00
G20-G21	帕金森病	15	56	4.39	2.24	15	62	4.90	2.56	16	64	5.07	2.28	15	70	5.51	2.83	13	96	7.50	3.72
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	132	10.36	5.63	13	142	11.22	5.05	13	170	13.48	6.09	13	82	6.46	3.30	14	73	5.70	2.96
	其他		1,408	110.50	73.72		1,373	108.48	69.20		1,551	122.95	77.35		1,631	128.48	76.71		1,610	125.70	74.28

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率
A00-Y98	所有死亡原因		9,436	732.81	409.56		9,908	766.40	422.76		9,932	766.62	414.33			
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,854	221.64	130.87	1	2,824	218.44	127.74	1	2,855	220.37	127.13			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,252	97.23	53.17	2	1,480	114.48	61.76	2	1,415	109.22	56.98			
J12-J18	肺炎	4	575	44.65	19.94	4	638	49.35	22.19	3	685	52.87	22.79			
I60-I69	腦血管疾病	3	699	54.28	28.22	3	722	55.85	29.48	4	667	51.48	26.11			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	431	33.47	15.30	5	476	36.82	15.91	5	470	36.28	15.00			
E10-E14	糖尿病	6	428	33.24	18.44	6	433	33.49	18.27	6	413	31.88	16.92			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	271	21.05	15.04	7	318	24.60	16.98	7	303	23.39	16.86			
A40-A41	敗血症	7	274	21.28	10.03	9	269	20.81	10.00	8	285	22.00	10.05			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	242	18.79	9.69	8	284	21.97	10.97	9	282	21.77	10.57			
I10-I15	高血壓性疾病	9	255	19.80	9.82	10	241	18.64	8.72	10	237	18.29	9.34			
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	166	12.89	9.96	12	181	14.00	10.85	11	205	15.82	11.73			
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	198	15.38	10.12	11	188	14.54	9.34	12	173	13.35	8.46			
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	17	63	4.89	1.88	15	84	6.50	2.52	13	128	9.88	3.60			
G20-G21	帕金森病	13	94	7.30	3.49	14	91	7.04	3.16	14	116	8.95	4.19			
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	88	6.83	3.32	13	148	11.45	5.05	15	112	8.64	3.68			
	其他		1,546	120.06	70.26		1,531	118.43	69.82		1,586	122.42	70.93			

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		4,379	331.81	385.49		5,381	402.84	312.67		5,576	417.20	309.11		5,488	408.57	288.49		5,853	433.35	288.22
08-14	惡性腫瘤	1	1,203	91.16	101.11	1	1,608	120.38	94.63	1	1,660	124.20	93.11	1	1,728	128.65	92.46	1	1,809	133.94	91.74
25-27-28	心臟疾病	3	466	35.31	42.12	2	625	46.79	34.35	2	605	45.27	31.66	2	556	41.39	27.76	2	616	45.61	28.56
29	腦血管疾病	2	506	38.34	45.36	3	515	38.55	28.72	3	545	40.78	28.68	3	502	37.37	24.78	3	521	38.57	24.01
181	糖尿病	4	292	22.13	25.80	4	453	33.91	26.02	4	467	34.94	25.11	4	473	35.21	23.87	4	463	34.28	22.06
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	173	13.11	15.50	5	225	16.84	12.63	5	220	16.46	11.53	5	224	16.68	11.39	5	277	20.51	13.06
321	肺炎	7	127	9.62	11.80	6	147	11.00	7.84	6	202	15.11	10.25	6	202	15.04	9.47	6	242	17.92	10.74
E54	自殺	10	83	6.29	6.04	7	121	9.06	7.40	7	154	11.52	9.63	7	145	10.80	8.87	7	136	10.07	8.15
347	慢性肝病及肝硬化	9	107	8.11	9.33	9	111	8.31	6.60	8	131	9.80	7.32	8	107	7.97	5.79	8	109	8.07	5.54
E47-E53	事故傷害	5	217	16.44	17.14	7	121	9.06	8.26	9	103	7.71	7.05	9	98	7.30	6.30	9	107	7.92	6.42
038	敗血症	13	46	3.49	4.19	11	40	2.99	2.15	10	77	5.76	4.00	11	72	5.36	3.59	10	106	7.85	4.59
26	高血壓性疾病	8	125	9.47	11.43	10	85	6.36	4.65	11	56	4.19	2.87	10	82	6.10	3.95	11	72	5.33	3.29
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	59	4.47	5.14	11	40	2.99	2.20	12	38	2.84	1.97	13	34	2.53	1.69	12	36	2.67	1.66
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	18	1.36	1.60	13	27	2.02	1.51	13	25	1.87	1.36	12	36	2.68	1.74	13	32	2.37	1.45
44	先天性畸形	12	51	3.86	5.94	14	23	1.72	3.40	14	22	1.65	3.15	14	26	1.94	3.45	14	25	1.85	3.44
200	貧血	17	10	0.76	0.82	16	17	1.27	0.99	16	13	0.97	0.76	15	21	1.56	1.06	15	20	1.48	0.96
	其他		896	67.89	82.17		1,223	91.56	71.32		1,258	94.13	70.66		1,182	88.00	62.32		1,282	94.92	62.55

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		6,127	453.23	291.00		6,088	451.14	276.88		6,165	456.13	265.58		6,475	474.21	270.05		6,769	490.07	269.77
C00-C97	惡性腫瘤	1	1,769	130.86	87.54	1	1,892	140.20	90.07	1	1,861	137.69	85.62	1	1,983	145.23	89.19	1	2,044	147.98	88.40
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	736	54.44	32.75	2	667	49.43	28.58	2	684	50.61	27.23	2	750	54.93	27.89	2	782	56.62	28.04
I60-I69	腦血管疾病	3	522	38.61	22.90	3	481	35.64	20.63	3	445	32.92	17.61	3	440	32.22	17.12	3	507	36.71	18.18
J12-J18	肺炎	5	331	24.49	14.14	5	312	23.12	12.35	5	351	25.97	12.95	5	337	24.68	12.06	5	342	24.76	11.42
E10-E14	糖尿病	4	364	26.93	16.79	4	402	29.79	17.72	4	385	28.48	16.12	4	382	27.98	14.97	4	403	29.18	15.39
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	251	18.57	11.35	7	202	14.97	8.70	6	240	17.76	9.80	8	212	15.53	8.19	6	276	19.98	10.28
I10-I15	高血壓性疾病	8	170	12.58	7.27	9	179	13.26	7.33	9	191	14.13	7.43	7	216	15.82	7.81	7	262	18.97	8.90
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	149	11.02	6.25	8	198	14.67	7.76	8	210	15.54	7.61	10	135	9.89	5.54	13	94	6.81	3.86
A40-A41	敗血症	7	250	18.49	10.99	6	208	15.41	8.77	7	219	16.20	8.98	6	229	16.77	8.39	8	251	18.17	9.22
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	15	38	2.81	1.48	14	68	5.04	2.57	14	61	4.51	2.11	14	73	5.35	2.32	14	65	4.71	1.91
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	109	8.06	4.57	10	119	8.82	4.61	10	130	9.62	4.94	9	137	10.03	5.06	9	161	11.66	5.67
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	120	8.88	6.98	11	117	8.67	6.49	13	101	7.47	5.74	10	135	9.89	6.49	10	145	10.50	6.82
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	139	10.28	8.19	13	107	7.93	6.48	12	117	8.66	6.70	12	118	8.64	6.65	11	126	9.12	7.31
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	99	7.32	4.87	11	117	8.67	5.38	11	120	8.88	5.36	13	104	7.62	4.44	12	99	7.17	4.18
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	14	70	5.18	3.35	15	54	4.00	2.43	16	45	3.33	1.80	15	53	3.88	2.16	16	61	4.42	2.40
	其他		1,010	74.71	51.59		965	71.51	47.01		1,005	74.36	45.57		1,171	85.76	51.76		1,151	83.33	47.79

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率
A00-Y98	所有死亡原因		6,664	478.66	253.90		7,045	502.63	254.34		7,228	513.35	250.23			
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,065	148.32	86.24	1	2,079	148.33	83.12	1	2,170	154.12	82.57			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	823	59.11	28.39	2	1,009	71.99	33.14	2	966	68.61	30.53			
I60-I69	腦血管疾病	3	511	36.70	17.36	3	490	34.96	16.33	3	486	34.52	15.13			
J12-J18	肺炎	5	308	22.12	9.54	4	422	30.11	12.67	4	440	31.25	12.64			
E10-E14	糖尿病	4	432	31.03	15.60	5	421	30.04	14.40	5	360	25.57	11.32			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	246	17.67	8.67	6	272	19.41	9.01	6	283	20.10	8.92			
I10-I15	高血壓性疾病	7	238	17.10	7.74	7	220	15.70	6.59	7	226	16.05	6.33			
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	103	7.40	3.88	10	161	11.49	5.03	8	185	13.14	5.53			
A40-A41	敗血症	8	192	13.79	6.53	9	176	12.56	5.61	9	177	12.57	5.31			
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	14	79	5.67	2.33	13	114	8.13	3.08	10	171	12.14	4.37			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	142	10.20	4.64	8	181	12.91	5.21	11	166	11.79	4.75			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	135	9.70	6.34	11	140	9.99	6.00	12	132	9.37	5.72			
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13	95	6.82	5.17	12	130	9.27	7.58	13	113	8.03	6.07			
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	112	8.04	4.28	14	96	6.85	3.62	14	105	7.46	3.83			
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	16	57	4.09	2.04	15	50	3.57	1.80	15	86	6.11	3.10			
	其他		1,126	80.88	45.14		1,084	77.34	41.15		1,162	82.53	44.12			

表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數 (人)	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 84年	111	63	48	3.26	202	112	90	5.93	-	-
民國 93年	56	29	27	2.52	100	58	42	4.50	-	-
民國 94年	51	27	24	2.44	89	44	45	4.26	1	4.79
民國 95年	40	20	20	1.88	69	30	39	3.24	1	4.70
民國 96年	56	34	22	2.61	89	57	32	4.15	1	4.66
民國 97年	59	33	26	2.89	95	51	44	4.65	1	4.90
民國 98年	32	18	14	1.64	69	34	35	3.54	-	-
民國 99年	52	30	22	2.78	71	41	30	3.80	1	5.35
民國 100年	63	30	33	2.48	96	50	46	3.77	-	-
民國 101年	71	43	28	2.35	105	62	43	3.47	3	9.92
民國 102年	67	41	26	2.56	100	55	45	3.82	2	7.64
民國 103年	71	40	31	2.43	110	70	40	3.77	-	-
民國 104年	94	55	39	3.26	137	78	59	4.75	3	10.39

資料來源：衛生福利部。

附註：1. 新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000。

2. 嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000

3. 孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數) × 100,000。

表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率

單位：人/每十萬人口

年別	總計	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
84年	437.00	682.71	32.62	18.42	27.06	60.57	77.17	65.05	90.99	113.30	160.75	261.74	386.95	681.57	1,081.85	1,676.13	2,664.91	4,267.21	7,274.45	11,039.79
93年	523.20	452.52	32.87	11.12	14.57	27.91	46.19	53.77	77.28	107.85	159.51	227.93	349.91	545.62	850.44	1,253.79	2,119.75	3,456.63	6,116.51	10,769.36
94年	547.41	426.71	21.69	15.85	13.42	41.51	38.86	53.63	86.38	104.37	164.56	240.15	350.28	464.27	850.95	1,295.29	2,034.07	3,557.58	6,002.50	11,305.33
95年	528.71	340.67	29.64	11.84	15.21	34.40	44.62	63.55	65.17	112.92	155.35	237.33	365.65	507.15	721.45	1,150.53	2,001.99	3,249.51	5,306.01	10,046.38
96年	550.64	434.21	20.37	17.43	7.01	25.78	39.69	52.14	56.09	98.39	148.71	246.28	311.48	475.52	708.13	1,171.78	2,041.12	3,320.52	5,341.79	10,629.20
97年	575.72	469.11	23.18	16.16	12.47	19.20	45.78	48.92	66.26	105.37	157.67	230.61	330.13	455.61	699.50	1,124.34	2,016.68	3,257.44	5,549.18	10,992.30
98年	568.60	357.61	21.38	13.08	5.53	26.88	36.77	40.38	63.46	85.57	148.62	225.80	314.22	467.69	638.77	1,116.63	1,912.70	3,080.41	5,353.26	10,468.26
99年	575.83	379.01	17.92	10.66	10.08	23.18	29.30	45.38	63.43	87.69	135.15	207.88	295.07	466.23	627.12	1,073.08	1,722.41	3,119.39	5,172.92	10,733.81
100年	600.94	439.53	17.38	6.91	9.11	23.22	31.96	38.62	61.99	82.84	147.77	212.79	323.21	449.50	647.50	1,009.22	1,742.48	3,149.19	5,256.75	11,145.17
101年	615.94	384.89	30.01	10.62	13.00	22.57	31.22	54.76	55.70	92.04	135.16	209.92	316.51	450.09	642.50	1,046.14	1,634.99	3,111.78	5,368.53	11,362.42
102年	600.78	362.67	15.23	15.26	10.77	27.43	32.79	32.30	39.45	71.26	120.77	221.67	333.36	461.62	598.90	951.72	1,608.36	2,787.57	5,146.12	10,998.33
103年	629.19	406.98	15.98	14.45	12.05	20.39	44.92	33.31	45.32	90.65	131.91	210.82	299.87	453.63	634.57	930.83	1,612.32	2,781.10	5,270.99	11,547.13
104年	634.72	487.52	14.36	4.55	5.65	22.23	33.75	45.47	49.56	68.93	119.14	188.47	315.60	438.19	653.41	919.01	1,564.10	2,713.61	5,014.33	11,595.10

資料來源：衛生福利部。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率
E47-E53		752	28.45	463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14
E47	運輸事故	393	14.87	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54
E48	意外中毒	39	1.48	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	97	3.67	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31
E51	火及火焰所致之事故傷害	30	1.13	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27
E52	其他事故傷害，包括後期影響	191	7.23	140	5.33	83	3.17	90	3.43	82	3.12
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	1	0.04	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率
V01-X59, Y85-Y86		389	14.81	377	14.42	359	13.74	402	15.26	430	16.15	406	15.15
V01-V99	運輸事故傷害	153	5.83	165	6.31	154	5.89	147	5.58	152	5.71	150	5.60
W00-W19	跌倒(落)	91	3.47	72	2.75	83	3.18	100	3.80	96	3.61	88	3.28
W65-W74	意外溺死和淹沒	26	0.99	17	0.65	16	0.61	27	1.02	14	0.53	15	0.56
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	19	0.72	24	0.92	26	0.99	26	0.99	24	0.90	21	0.78
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	6	0.23	7	0.27	6	0.23	5	0.19	16	0.60	9	0.34
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	25	0.95	26	0.99	20	0.77	16	0.61	19	0.71	28	1.04
	其他	69	2.63	66	2.52	54	2.07	81	3.07	109	4.09	95	3.54

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	萬 口 率	死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	萬 口 率
V01-X59, Y85-Y86		458	17.00		435	16.09	
V01-V99	運輸事故傷害	142	5.27		131	4.85	
W00-W19	跌倒(落)	118	4.38		99	3.66	
W65-W74	意外溺死和淹沒	16	0.59		22	0.81	
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	23	0.85		34	1.26	
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	6	0.22		8	0.30	
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	31	1.15		35	1.29	
	其他	122	4.53		106	3.92	

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
E47-E53		535	40.42	342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70
E47	運輸事故	278	21.00	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06
E48	意外中毒	32	2.42	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	69	5.21	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16
E51	火及火焰所致之事故傷害	21	1.59	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31
E52	其他事故傷害，包括後期影響	134	10.12	110	8.53	68	5.30	70	5.46	63	4.92
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	1	0.08	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		269	21.11	377	20.54	258	20.45	267	21.03	285	22.25	271	21.05
V01-V99	運輸事故傷害	104	8.16	110	8.69	113	8.96	97	7.64	108	8.43	102	7.92
W00-W19	跌倒(落)	66	5.18	55	4.35	64	5.07	67	5.28	72	5.62	66	5.13
W65-W74	意外溺死和淹沒	21	1.65	13	1.03	11	0.87	19	1.50	10	0.78	10	0.78
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	13	1.02	15	1.19	18	1.43	15	1.18	12	0.94	12	0.93
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	5	0.39	7	0.55	3	0.24	5	0.39	6	0.47	6	0.47
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	17	1.33	14	1.11	14	1.11	14	1.10	12	0.94	22	1.71
	其他	43	3.37	46	3.63	35	2.77	50	3.94	65	5.07	53	4.12

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	每 十 萬 口 率	死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	每 十 萬 口 率
V01-X59, Y85-Y86		318	24.60		303	23.39	
V01-V99	運輸事故傷害	99	7.66		83	6.41	
W00-W19	跌倒(落)	86	6.65		71	5.48	
W65-W74	意外溺死和淹沒	14	1.08		20	1.54	
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	14	1.08		26	2.01	
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	5	0.39		4	0.31	
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	27	2.09		28	2.16	
	其他	73	5.65		71	5.48	

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十 萬女 性人 口死 亡率	死亡 人數	每十 萬女 性人 口死 亡率	死亡 人數	每十 萬女 性人 口死 亡率	死亡 人數	每十 萬女 性人 口死 亡率	死亡 人數	每十 萬女 性人 口死 亡率
E47-E53		217	16.44	121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92
E47	運輸事故	115	8.71	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15
E48	意外中毒	7	0.53	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	28	2.12	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55
E51	火及火焰所致之事故傷害	9	0.68	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22
E52	其他事故傷害，包括後期影響	57	4.32	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		120	8.88	377	8.67	101	7.47	135	9.89	145	10.50	135	9.70
V01-V99	運輸事故傷害	49	3.62	55	4.08	41	3.03	50	3.66	44	3.19	48	3.45
W00-W19	跌倒(落)	25	1.85	17	1.26	19	1.41	33	2.42	24	1.74	22	1.58
W65-W74	意外溺死和淹沒	5	0.37	4	0.30	5	0.37	8	0.59	4	0.29	5	0.36
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	0.44	9	0.67	8	0.59	11	0.81	12	0.87	9	0.65
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.07	-	-	3	0.22	-	-	10	0.72	3	0.22
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	8	0.59	12	0.89	6	0.44	2	0.15	7	0.51	6	0.43
	其他	26	1.92	20	1.48	19	1.41	31	2.27	44	3.19	42	3.02

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	每 十 萬 口 率	死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	每 十 萬 口 率
V01-X59, Y85-Y86		140	9.99		132	9.37	
V01-V99	運輸事故傷害	43	3.07		48	3.41	
W00-W19	跌倒(落)	32	2.28		28	1.99	
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.14		2	0.14	
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	9	0.64		8	0.57	
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.07		4	0.28	
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	0.29		7	0.50	
	其他	49	3.50		35	2.49	

表40·臺北市歷年自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率
E54	自殺總計	206	7.79	346	13.18	467	17.83	454	17.30	364	13.84
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	109	4.12	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	18	0.68	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	1.51	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表40·臺北市歷年自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	370	14.09	341	13.04	329	12.59	306	11.61	333	12.51	261	9.74
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	1	0.04	-	-	1	0.04	3	0.11	2	0.07
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	6	0.23	5	0.19	9	0.34	7	0.26	4	0.15
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	-	-	-	-	2	0.08	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	124	4.72	99	3.79	100	3.83	72	2.73	82	3.08	55	2.05
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	6	0.23	9	0.34	11	0.42	6	0.23	4	0.15
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	6	0.23	2	0.08	1	0.04	1	0.04	2	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	109	4.17	113	4.32	126	4.78	103	3.87	77	2.87
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	25	0.96	24	0.92	25	0.95	34	1.28	28	1.04
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	2	0.08	4	0.15
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	5	0.19	4	0.15	1	0.04	4	0.15	5	0.19
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	4	0.15	10	0.38	6	0.23	8	0.30	3	0.11
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	68	2.60	55	2.10	52	1.97	71	2.67	67	2.50
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.11	-	-
X82	利用機車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	3	0.11	4	0.15	1	0.04	2	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	6	0.23	1	0.04	-	-	4	0.15	6	0.22

表40·臺北市歷年自殺死亡方式（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103			104		
		死 人	亡 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人	亡 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
X60-X84,Y87.0	自殺總計		311	11.54	318	11.76	
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		7	0.26	5	0.18	
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		-	-	1	0.04	
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		2	0.07	3	0.11	
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-	-	-	-	
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-	-	-	-	
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		76	2.82	81	3.00	
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露		7	0.26	8	0.30	
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露		1	0.04	2	0.07	
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害		104	3.86	105	3.88	
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害		32	1.19	20	0.74	
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害		2	0.07	5	0.18	
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害		-	-	-	-	
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害		-	-	3	0.11	
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害		6	0.22	9	0.33	
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害		70	2.60	69	2.55	
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害		-	-	-	-	
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害		2	0.07	1	0.04	
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害		-	-	1	0.04	
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害		2	0.07	5	0.18	

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率
E54	自殺總計	123	9.29	225	17.46	313	24.40	309	24.12	228	17.81
E950	以固體或液體物質自殺及自 為中毒	11	0.83	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自 為中毒	-	-	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及 自傷	71	5.36	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	8	0.60	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.15	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16
E957	由高處跳下自殺及自傷	24	1.81	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89
E958	其他及未明示之方式自殺及 自傷	7	0.53	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	231	18.13	234	18.49	212	16.81	188	14.81	207	16.16	166	12.89
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	2	0.16
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	3	0.24	2	0.16	6	0.47	3	0.23	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	6.36	72	5.69	70	5.55	43	3.39	59	4.61	40	3.11
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	3	0.24	7	0.55	8	0.63	5	0.39	3	0.23
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.32	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	81	6.40	80	6.34	83	6.54	62	4.84	56	4.35
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	19	1.50	13	1.03	17	1.34	21	1.64	17	1.32
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.16	4	0.31
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	4	0.32	1	0.08	1	0.08	2	0.16	5	0.39
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	2	0.16	7	0.55	3	0.24	5	0.39	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	37	2.92	26	2.06	25	1.97	40	3.12	32	2.49
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.16	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	3	0.24	-	-	1	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	5	0.40	1	0.08	-	-	2.00	0.16	4	0.31

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103			104		
		死 人	亡 數	每 十 萬 口 率	死 人	亡 數	每 十 萬 口 率
X60-X84,Y87.0	自殺總計		181	14.00		205	15.82
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		1	0.08		2	0.15
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		-	-		1	0.08
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		1	0.08		2	0.15
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-	-		-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-	-		-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		52	4.02		56	4.32
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露		7	0.54		4	0.31
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-	-		1	0.08
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害		67	5.18		72	5.56
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害		14	1.08		12	0.93
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害		2	0.15		5	0.39
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害		-	-		-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害		-	-		2	0.15
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害		4	0.31		7	0.54
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害		32	2.48		38	2.93
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害		-	-		-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害		1	0.08		1	0.08
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害		-	-		-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害		-	-		2	0.15

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率
E54	自殺總計	83	6.29	121	9.06	154	11.52	145	10.80	136	10.07
E950	以固體或液體物質自殺及自 為中毒	14	1.06	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自 為中毒	1	0.08	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及 自傷	38	2.88	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	10	0.76	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44
E958	其他及未明示之方式自殺及 自傷	2	0.15	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28	107	7.93	117	8.66	118	8.64	126	9.12	95	6.82
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	3	0.22	3	0.22	3	0.22	4	0.29	4	0.29
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	43	3.18	27	2.00	30	2.22	29	2.12	23	1.67	15	1.08
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	3	0.22	2	0.15	3	0.22	1	0.07	1	0.07
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	2	0.15	1	0.07	-	-	-	-	1	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	28	2.07	33	2.44	43	3.15	41	2.97	21	1.51
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	6	0.44	11	0.81	8	0.59	13	0.94	11	0.79
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	3	0.22	-	-	2	0.14	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	2	0.15	3	0.22	3	0.22	3	0.22	3	0.22
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	31	2.30	29	2.15	27	1.98	31	2.24	35	2.51
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	3	0.22	1	0.07	1	0.07	1	0.07	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-	2	0.14	2	0.14

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103			104		
		死 人	亡 數	每 十 萬 口 率	死 人	亡 數	每 十 萬 口 率
X60-X84,Y87.0	自殺總計		130	9.27	113		8.03
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		6	0.43	3		0.21
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者		-	-	-		-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		1	0.07	1		0.07
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-	-	-		-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-	-	-		-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露		24	1.71	25		1.78
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露		-	-	4		0.28
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露		1	0.07	1		0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害		37	2.64	33		2.34
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害		18	1.28	8		0.57
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害		-	-	-		-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害		-	-	-		-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害		-	-	1		0.07
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害		2	0.14	2		0.14
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害		38	2.71	31		2.20
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害		-	-	-		-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害		1	0.07	-		-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害		-	-	1		0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害		2	0.14	3		0.21

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
93年	523.20	392.14	160.09	122.12	65.99	46.85	47.24	33.77	34.02	24.96	17.03	11.49	19.16	13.77	17.64	15.78
94年	547.41	392.62	163.78	120.21	63.56	42.87	52.19	35.74	37.72	26.19	21.84	13.82	20.77	13.94	15.84	14.03
95年	528.71	364.83	168.54	118.90	58.19	38.38	45.04	29.23	36.05	23.79	21.91	13.32	18.48	12.19	14.44	12.68
96年	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		慢性下呼吸道疾病		腎炎、腎病微候群 及腎病變	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	45.66	27.26	36.18	20.14	27.26	16.89	16.98	9.27	18.70	11.20
98年	568.60	347.27	174.48	111.24	67.61	39.98	43.13	24.61	32.12	16.59	31.55	18.86	18.97	9.85	17.25	9.72
99年	575.83	338.78	177.26	110.14	65.94	36.69	40.07	21.91	34.40	16.89	29.43	16.78	17.79	8.87	18.14	10.07
100年	600.94	343.47	179.59	109.78	72.30	38.51	43.15	23.13	35.75	16.96	29.41	16.39	22.09	10.48	17.00	8.89
101年	615.94	344.34	187.11	111.52	76.18	40.21	44.55	22.94	34.00	15.54	30.69	16.63	22.20	10.31	19.95	10.62
102年	600.78	326.27	183.55	106.98	77.43	39.81	45.15	22.34	32.95	14.46	32.09	16.84	21.38	9.73	18.21	9.13
103年	629.19	332.49	181.97	103.66	92.38	46.23	44.98	22.40	39.34	17.10	31.70	16.16	24.38	10.28	20.64	9.89
104年	634.72	325.57	185.87	102.84	88.07	42.60	42.65	20.08	41.61	17.37	28.59	13.87	23.52	9.54	20.90	9.68

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
93年	13.18	10.93	12.69	9.96	3.58	2.52	6.36	4.43	4.31	2.92	2.67	1.89	2.82	2.01	1.83	3.32
94年	17.83	14.79	12.33	9.20	5.73	3.78	6.18	4.14	4.16	2.79	2.94	2.06	2.29	1.62	1.49	2.66
95年	17.30	14.12	12.08	8.86	5.53	3.48	6.71	4.30	3.51	2.26	3.01	1.89	2.59	1.63	1.60	2.92
96年	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年別	高血壓性疾病		敗血症		事故傷害		蓄意自我傷害(自殺)		血管性及未明示之癱瘓症		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		慢性肝病及肝硬化		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	14.24	8.21	19.53	11.27	14.81	11.94	14.09	11.40	2.63	1.29	10.70	5.87	11.27	7.69	3.54	1.88
98年	14.72	8.17	16.86	9.44	14.42	11.20	13.04	10.39	4.28	2.06	13.00	6.39	13.35	8.79	3.52	1.89
99年	16.15	8.49	17.18	9.25	13.74	10.71	12.59	9.67	4.44	2.00	14.54	6.79	12.17	7.90	4.25	2.10
100年	16.93	8.47	21.48	10.81	15.26	10.92	11.61	8.98	5.16	2.18	8.24	4.45	11.96	7.65	4.59	2.33
101年	20.13	9.74	21.00	10.47	16.15	11.31	12.51	9.82	4.85	1.94	6.27	3.41	10.74	6.77	5.94	2.92
102年	18.40	8.66	17.39	8.18	15.15	10.47	9.74	7.40	5.30	2.11	7.13	3.62	11.57	6.99	5.78	2.71
103年	17.11	7.55	16.52	7.62	17.00	11.23	11.54	9.06	7.35	2.78	11.47	5.02	10.54	6.29	5.01	2.23
104年	17.13	7.65	17.09	7.49	16.09	11.05	11.76	8.72	11.06	3.97	10.99	4.67	10.28	5.96	6.66	2.95

表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
93年	647.93	474.26	201.24	149.63	85.88	59.64	56.24	39.19	34.13	24.46	23.27	14.96	21.57	14.97	26.53	23.74
94年	683.06	480.28	205.00	148.15	82.62	54.25	64.07	43.39	40.61	27.75	28.84	17.20	25.26	16.55	24.32	21.46
95年	654.67	445.74	210.37	146.09	75.79	49.62	53.08	34.17	36.92	24.11	29.12	17.22	20.37	13.06	21.93	19.32
96年	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		慢性下呼吸道疾病		糖尿病		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	48.58	26.32	53.13	32.56	26.45	13.76	27.62	17.36	21.11	17.19
98年	693.85	425.20	211.03	134.11	86.99	52.89	41.72	21.04	51.12	29.05	29.79	15.11	33.42	20.41	20.54	16.29
99年	704.08	421.30	219.66	137.29	82.36	47.58	43.44	21.00	47.72	26.99	26.56	12.91	30.44	17.70	20.45	16.18
100年	737.25	426.54	216.55	132.95	90.98	50.79	47.66	22.21	54.91	29.93	35.05	16.00	30.96	18.33	21.03	15.84
101年	751.69	429.77	229.30	138.02	97.28	54.52	43.96	20.08	53.01	28.56	33.57	15.24	32.32	18.20	22.25	16.23
102年	732.81	409.56	221.64	130.87	97.23	53.17	44.65	19.94	54.28	28.22	33.47	15.30	33.24	18.44	21.05	15.04
103年	766.40	422.76	218.44	127.74	114.48	61.76	49.35	22.19	55.85	29.48	36.82	15.91	33.49	18.27	24.60	16.98
104年	766.62	414.33	220.37	127.13	109.22	56.98	52.87	22.79	51.48	26.11	36.28	15.00	31.88	16.92	23.39	16.86

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
93年	17.46	14.81	17.22	13.87	4.19	2.83	6.36	4.29	5.66	3.64	3.34	2.25	4.58	3.14	1.94	3.25
94年	24.40	20.52	14.97	11.51	5.69	3.62	8.26	5.49	5.53	3.57	4.05	2.78	3.90	2.70	1.33	2.20
95年	24.12	20.00	16.39	12.38	5.70	3.34	7.34	4.78	4.53	2.83	3.36	2.06	4.14	2.46	1.25	2.40
96年	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年別	敗血症		腎炎、腎病徵候群及腎病變		高血壓性疾病		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		血管性及未明示之癡呆症		帕金森病		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	20.64	11.78	18.83	11.24	16.01	9.43	18.13	15.00	15.46	10.94	2.43	1.15	4.39	2.24	10.36	5.63
98年	18.41	10.28	19.67	10.79	16.28	9.25	18.49	14.83	18.33	12.76	3.48	1.58	4.90	2.56	11.22	5.05
99年	18.23	9.72	18.55	10.57	18.31	9.74	16.81	13.01	15.70	10.91	4.36	1.97	5.07	2.28	13.48	6.09
100年	26.55	13.53	18.59	9.68	18.12	9.32	14.81	11.63	16.62	11.40	4.96	2.10	5.51	2.83	6.46	3.30
101年	24.05	11.78	19.91	11.13	21.39	10.76	16.16	12.59	14.60	9.70	5.00	2.00	7.50	3.72	5.70	2.96
102年	21.28	10.03	18.79	9.69	19.80	9.82	12.89	9.96	15.38	10.12	4.89	1.88	7.30	3.49	6.83	3.32
103年	20.81	10.00	21.97	10.97	18.64	8.72	14.00	10.85	14.54	9.34	6.50	2.52	7.04	3.16	11.45	5.05
104年	22.00	10.05	21.77	10.57	18.29	9.34	15.82	11.73	13.35	8.46	9.88	3.60	8.95	4.19	8.64	3.68

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎徵候群及腎性病變		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
93年	402.84	312.67	120.38	94.63	46.79	34.35	38.55	28.72	33.91	26.02	16.84	12.63	11.00	7.84	9.06	8.26
94年	417.20	309.11	124.20	93.11	45.27	31.66	40.78	28.68	34.94	25.11	16.46	11.53	15.11	10.25	11.52	9.63
95年	408.57	288.49	128.65	92.46	41.39	27.76	37.37	24.78	35.21	23.87	16.68	11.39	15.04	9.47	10.80	8.87
96年	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		腎炎、腎病徵候群及腎病變		高血壓性疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	38.61	22.90	24.49	14.14	26.93	16.79	18.57	11.35	12.58	7.27
98年	451.14	276.88	140.20	90.07	49.43	28.58	35.64	20.63	23.12	12.35	29.79	17.72	14.97	8.70	13.26	7.33
99年	456.13	265.58	137.69	85.62	50.61	27.23	32.92	17.61	25.97	12.95	28.48	16.12	17.76	9.80	14.13	7.43
100年	474.21	270.05	145.23	89.19	54.93	27.89	32.22	17.12	24.68	12.06	27.98	14.97	15.53	8.19	15.82	7.81
101年	490.07	269.77	147.98	88.40	56.62	28.04	36.71	18.18	24.76	11.42	29.18	15.39	19.98	10.28	18.97	8.90
102年	478.66	253.90	148.32	86.24	59.11	28.39	36.70	17.36	22.12	9.54	31.03	15.60	17.67	8.67	17.10	7.74
103年	502.63	254.34	148.33	83.12	71.99	33.14	34.96	16.33	30.11	12.67	30.04	14.40	19.41	9.01	15.70	6.59
104年	513.35	250.23	154.12	82.57	68.61	30.53	34.52	15.13	31.25	12.64	25.57	11.32	20.10	8.92	16.05	6.33

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
93年	8.31	6.60	9.06	7.40	2.99	2.15	6.36	4.65	2.99	2.20	2.02	1.51	1.72	3.40	1.27	0.99
94年	9.80	7.32	7.71	7.05	5.76	4.00	4.19	2.87	2.84	1.97	1.87	1.36	1.65	3.15	0.97	0.76
95年	7.97	5.79	7.30	6.30	5.36	3.59	6.10	3.95	2.53	1.69	2.68	1.74	1.94	3.45	1.56	1.06
96年	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年別	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		敗血症		血管性及未明示之癱瘓症		慢性下呼吸道疾病		事故傷害		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	11.02	6.25	18.49	10.99	2.81	1.48	8.06	4.57	8.88	6.98	10.28	8.19	7.32	4.87	5.18	3.35
98年	14.67	7.76	15.41	8.77	5.04	2.57	8.82	4.61	8.67	6.49	7.93	6.48	8.67	5.38	4.00	2.43
99年	15.54	7.61	16.20	8.98	4.51	2.11	9.62	4.94	7.47	5.74	8.66	6.70	8.88	5.36	3.33	1.80
100年	9.89	5.54	16.77	8.39	5.35	2.32	10.03	5.06	9.89	6.49	8.64	6.65	7.62	4.44	3.88	2.16
101年	6.81	3.86	18.17	9.22	4.71	1.91	11.66	5.67	10.50	6.82	9.12	7.31	7.17	4.18	4.42	2.40
102年	7.40	3.88	13.79	6.53	5.67	2.33	10.20	4.64	9.70	6.34	6.82	5.17	8.04	4.28	4.09	2.04
103年	11.49	5.03	12.56	5.61	8.13	3.08	12.91	5.21	9.99	6.00	9.27	7.58	6.85	3.62	3.57	1.80
104年	13.14	5.53	12.57	5.31	12.14	4.37	11.79	4.75	9.37	5.72	8.03	6.07	7.46	3.83	6.11	3.10

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		3,180	120.31		4,202	160.09		4,290	163.78		4,423	168.54		4,566	173.56
162	肺癌	1	615	23.27	1	880	33.53	1	870	33.21	1	910	34.68	1	987	37.52
155	肝癌	2	570	21.56	2	677	25.79	2	607	23.17	2	702	26.75	2	666	25.32
153 154	結腸直腸癌	3	329	12.45	3	518	19.73	3	542	20.69	3	532	20.27	3	557	21.17
174	女性乳癌(1)	5	135	10.23	4	203	15.20	4	224	16.76	4	209	15.56	4	203	15.03
151	胃癌	4	328	12.41	5	311	11.85	5	354	13.51	5	363	13.83	5	329	12.51
185	攝護腺癌(2)	7	51	3.85	6	122	9.46	6	133	10.37	6	129	10.07	6	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	92	3.48	9	148	5.64	7	181	6.91	8	175	6.67	7	217	8.25
157	胰臟癌	9	97	3.67	8	164	6.25	9	168	6.41	7	178	6.78	8	178	6.77
179 180	子宮頸癌(1)	6	108	8.18	7	87	6.51	8	86	6.43	10	81	6.03	9	89	6.59
156	膽囊癌	15	64	2.42	11	125	4.76	12	120	4.58	12	116	4.42	10	149	5.66
183	卵巢癌(1)	11	44	3.33	12	58	4.34	14	50	3.74	11	73	5.43	11	74	5.48
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	78	2.95	10	138	5.26	10	146	5.57	9	166	6.33	12	134	5.09
150	食道癌	14	75	2.84	14	106	4.04	11	126	4.81	14	97	3.70	13	126	4.79
204-208	白血病	8	100	3.78	13	108	4.11	13	100	3.82	13	98	3.73	14	107	4.07
188	膀胱癌	17	57	2.16	15	92	3.51	16	66	2.52	16	82	3.12	15	91	3.46
	其他		437	16.53		465	17.72		517	19.74		512	19.51		523	19.88

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		4,467	170.10		4,563	174.48		4,632	177.26		4,732	179.59		4,981	187.11		4,919	183.55
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34	1	967	36.98	1	990	37.89	1	1,014	38.48	1	1,018	38.24	1	988	36.87
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59	3	592	22.64	3	570	21.81	3	609	23.11	3	648	24.34	3	631	23.55
C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69	2	665	25.43	2	644	24.65	2	672	25.50	2	697	26.18	2	700	26.12
C50	女性乳房癌(1)	4	228	16.87	4	236	17.49	4	266	19.68	4	283	20.73	4	243	17.59	4	264	18.96
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	124	9.73	6	142	11.22	6	144	11.41	6	132	10.40	5	176	13.74	5	155	12.04
C16	胃癌	5	312	11.88	5	319	12.20	5	307	11.75	5	285	10.82	6	329	12.36	6	315	11.75
C25	胰臟癌	7	192	7.31	7	237	9.06	7	211	8.07	7	231	8.77	7	232	8.71	7	231	8.62
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	9	131	4.99	8	148	5.66	9	151	5.78	8	153	5.81	9	169	6.35	8	203	7.57
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	131	4.99	12	119	4.55	8	152	5.82	9	149	5.65	10	147	5.52	10	154	5.75
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	13	58	4.29	11	65	4.82	12	66	4.88	11	65	4.76	8	88	6.37	9	85	6.11
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	75	5.55	9	69	5.11	10	71	5.25	10	74	5.42	12	63	4.56	11	80	5.75
C15	食道癌	12	120	4.57	10	129	4.93	11	137	5.24	12	115	4.36	11	133	5.00	12	121	4.52
C67	膀胱癌	15	80	3.05	14	80	3.06	14	95	3.64	14	78	2.96	14	85	3.19	14	84	3.13
C91-C95	白血病	11	121	4.61	13	106	4.05	13	107	4.09	13	112	4.25	13	110	4.13	13	113	4.22
C54	子宮體癌(1)	17	28	2.07	19	23	1.70	18	29	2.15	18	34	2.49	18	35	2.53	15	39	2.80
	其他		671	25.55		666	25.47		692	26.48		726	27.55		808	30.35		756	28.21

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		順位	死亡 人數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		4,903	181.97		5,025	185.87
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	992	36.82	1	984	36.40
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	666	24.72	2	686	25.37
C22	肝和肝內膽管癌	2	666	24.72	3	667	24.67
C50	女性乳房癌(1)	4	289	20.62	4	288	20.45
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	151	11.68	5	163	12.58
C16	胃癌	6	312	11.58	6	295	10.91
C25	胰臟癌	7	257	9.54	7	273	10.10
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	174	6.46	8	183	6.77
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	155	5.75	9	153	5.66
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	9	84	5.99	10	77	5.47
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	12	58	4.14	11	70	4.97
C15	食道癌	11	135	5.01	12	133	4.92
C67	膀胱癌	14	93	3.45	13	117	4.33
C91-C95	白血病	13	98	3.64	14	108	3.99
C54	子宮體癌(1)	17	35	2.50	15	42	2.98
	其他		738	27.39		786	29.07

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		1,977	149.38		2,594	201.24		2,630	205.00		2,695	210.37		2,757	215.37
162	肺癌	2	414	31.28	1	599	46.47	1	562	43.81	1	608	47.46	1	635	49.60
155	肝癌	1	436	32.94	2	495	38.40	2	445	34.69	2	518	40.43	2	488	38.12
153 154	結腸直腸癌	4	191	14.43	3	306	23.74	3	306	23.85	3	316	24.67	3	308	24.06
151	胃癌	3	212	16.02	4	198	15.36	4	236	18.40	4	240	18.73	4	214	16.72
185	攝護腺癌	11	51	3.85	5	122	9.46	5	133	10.37	6	129	10.07	5	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	66	4.99	7	91	7.06	8	115	8.96	7	112	8.74	6	129	10.08
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	73	5.52	5	122	9.46	6	133	10.37	5	147	11.47	7	117	9.14
150	食道癌	8	64	4.84	7	91	7.06	7	116	9.04	9	87	6.79	8	107	8.36
157	胰臟癌	9	63	4.76	9	89	6.90	9	103	8.03	8	96	7.49	9	91	7.11
156	膽囊癌	16	27	2.04	11	65	5.04	10	70	5.46	11	60	4.68	10	89	6.95
204-208	白血病	7	65	4.91	10	68	5.28	11	59	4.60	12	54	4.22	11	68	5.31
188	膀胱癌	12	42	3.17	12	62	4.81	13	45	3.51	13	50	3.90	12	65	5.08
147	鼻咽癌	9	63	4.76	13	55	4.27	12	59	4.60	10	65	5.07	13	63	4.92
191	腦癌	14	29	2.19	15	26	2.02	14	32	2.49	14	33	2.58	14	26	2.03
161	喉癌	15	28	2.12	16	18	1.40	15	20	1.56	16	20	1.56	15	19	1.48
	其他		153	11.56		187	14.51		196	15.28		160	12.49		202	15.78

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73		2,671	211.03		2,771	219.66		2,749	216.55		2,937	229.30		2,854	221.64
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54	1	596	47.09	1	617	48.91	1	639	50.34	1	633	49.42	1	610	47.37
C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30	2	449	35.47	2	443	35.12	2	474	37.34	2	475	37.08	2	485	37.67
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13	3	311	24.57	3	331	26.24	3	325	25.60	3	371	28.97	3	358	27.80
C16	胃癌	4	218	17.11	4	203	16.04	4	197	15.62	4	191	15.05	4	203	15.85	4	189	14.68
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73	5	142	11.22	5	144	11.41	5	132	10.40	5	176	13.74	6	155	12.04
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02	7	136	10.75	6	139	11.02	5	132	10.40	6	146	11.40	5	175	13.59
C25	胰臟癌	7	114	8.95	6	137	10.82	7	126	9.99	7	111	8.74	8	123	9.60	7	123	9.55
C15	食道癌	8	107	8.40	8	109	8.61	8	115	9.12	8	104	8.19	7	127	9.92	8	110	8.54
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96	9	77	6.08	9	102	8.09	9	94	7.40	9	86	6.71	9	80	6.21
C67	膀胱癌	12	57	4.47	11	56	4.42	11	63	4.99	11	53	4.18	12	55	4.29	11	57	4.43
C91-C95	白血病	9	76	5.96	10	64	5.06	10	65	5.15	10	63	4.96	10	71	5.54	10	70	5.44
C11	鼻咽癌	11	61	4.79	12	49	3.87	12	56	4.44	13	42	3.31	11	56	4.37	12	56	4.35
C64	腎臟癌	14	26	2.04	13	38	3.00	14	39	3.09	12	48	3.78	15	37	2.89	14	39	3.03
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43	13	38	3.00	15	30	2.38	15	32	2.52	14	40	3.12	15	28	2.17
C71	腦癌	14	26	2.04	15	35	2.77	13	41	3.25	13	42	3.31	13	44	3.44	13	46	3.57
	其他		253	19.85		231	18.25		263	20.85		267	21.03		294	22.95		273	21.20

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,824	218.44		2,855	220.37
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	588	45.48	1	589	45.46
C22	肝和肝內膽管癌	2	447	34.58	2	429	33.11
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	364	28.16	3	361	27.86
C16	胃癌	4	199	15.39	4	185	14.28
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	151	11.68	5	163	12.58
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	152	11.76	6	161	12.43
C25	胰臟癌	7	133	10.29	7	140	10.81
C15	食道癌	8	124	9.59	8	124	9.57
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	92	7.12	9	88	6.79
C67	膀胱癌	10	66	5.11	10	86	6.64
C91-C95	白血病	12	55	4.25	11	68	5.25
C11	鼻咽癌	11	62	4.80	12	61	4.71
C64	腎臟癌	14	32	2.48	13	43	3.32
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	45	3.48	14	37	2.86
C71	腦癌	15	30	2.32	15	31	2.39
	其他		284	21.97		289	22.31

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		1,203	91.16		1,608	120.38		1,660	124.20		1,728	128.65		1,809	133.94
162	肺癌	1	201	15.23	1	281	21.04	1	308	23.05	1	302	22.48	1	352	26.06
153 154	結腸直腸癌	2	138	10.46	2	212	15.87	2	236	17.66	2	216	16.08	2	249	18.44
174	女性乳癌	3	135	10.23	3	203	15.20	3	224	16.76	3	209	15.56	3	203	15.03
155	肝癌	4	134	10.15	4	182	13.62	4	162	12.12	4	184	13.70	4	178	13.18
151	胃癌	5	116	8.79	5	113	8.46	5	118	8.83	5	123	9.16	5	115	8.51
179 180	子宮頸癌	6	108	8.18	6	87	6.51	6	86	6.43	7	81	6.03	6	89	6.59
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	11	26	1.97	10	57	4.27	7	66	4.94	9	63	4.69	7	88	6.52
157	胰臟癌	10	34	2.58	7	75	5.61	8	65	4.86	6	82	6.10	8	87	6.44
183	卵巢癌	7	44	3.33	9	58	4.34	10	50	3.74	8	73	5.43	9	74	5.48
156	膽囊癌	8	37	2.80	8	60	4.49	9	50	3.74	10	56	4.17	10	60	4.44
204-208	白血病	9	35	2.65	11	40	2.99	11	41	3.07	11	44	3.28	11	39	2.89
182	子宮體癌	19	8	0.61	14	22	1.65	13	22	1.65	13	25	1.86	12	26	1.93
188	膀胱癌	15	15	1.14	12	30	2.25	14	21	1.57	15	32	2.38	13	26	1.93
191	腦癌	12	23	1.74	13	24	1.80	12	25	1.87	16	22	1.64	14	20	1.48
150	食道癌	16	11	0.83	18	15	1.12	18	10	0.75	19	10	0.74	15	19	1.41
	其他		138	10.46		149	11.15		176	13.17		206	15.34		184	13.62

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		1,769	130.86		1,892	140.20		1,861	137.69		1,983	145.23		2,044	147.98		2,065	148.32
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78	1	371	27.49	1	373	27.60	1	375	27.46	1	385	27.87	1	378	27.15
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31	2	281	20.82	3	239	17.68	2	284	20.80	2	277	20.05	2	273	19.61
C50	女性乳房癌	3	228	16.87	3	236	17.49	2	266	19.68	3	283	20.73	3	243	17.59	3	264	18.96
C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76	4	216	16.01	4	201	14.87	4	198	14.50	4	222	16.07	4	215	15.44
C25	胰臟癌	6	78	5.77	6	100	7.41	6	85	6.29	5	120	8.79	6	109	7.89	6	108	7.76
C16	胃癌	5	94	6.95	5	116	8.60	5	110	8.14	6	94	6.88	5	126	9.12	5	126	9.05
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	8	58	4.29	8	65	4.82	8	66	4.88	8	65	4.76	7	88	6.37	7	85	6.11
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	75	5.55	7	69	5.11	7	71	5.25	7	74	5.42	8	63	4.56	8	80	5.75
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07	9	42	3.11	9	50	3.70	9	55	4.03	9	61	4.42	9	74	5.32
C54	子宮體癌	12	28	2.07	14	23	1.70	12	29	2.15	11	34	2.49	12	35	2.53	11	39	2.80
C91-C95	白血病	10	45	3.33	9	42	3.11	10	42	3.11	10	49	3.59	10	39	2.82	10	43	3.09
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	11	35	2.59	11	35	2.59	15	22	1.63	11	34	2.49	11	37	2.68	15	25	1.80
C67	膀胱癌	14	23	1.70	13	24	1.78	11	32	2.37	15	25	1.83	13	30	2.17	14	27	1.94
C64	腎臟癌	17	22	1.63	12	25	1.85	14	25	1.85	14	27	1.98	17	22	1.59	16	23	1.65
C71	腦癌	14	23	1.70	15	21	1.56	13	28	2.07	13	28	2.05	15	28	2.03	12	29	2.08
	其他		223	16.50		226	16.75		222	16.43		238	17.43		279	20.20		276	19.82

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		順位	死亡 人數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,079	148.33		2,170	154.12
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	404	28.82	1	395	28.05
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	302	21.55	2	325	23.08
C50	女性乳房癌	3	289	20.62	3	288	20.45
C22	肝和肝內膽管癌	4	219	15.62	4	238	16.90
C25	胰臟癌	5	124	8.85	5	133	9.45
C16	胃癌	6	113	8.06	6	110	7.81
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	7	84	5.99	7	77	5.47
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	58	4.14	8	70	4.97
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	63	4.49	9	65	4.62
C54	子宮體癌	11	35	2.50	10	42	2.98
C91-C95	白血病	10	43	3.07	11	40	2.84
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.21	12	36	2.56
C67	膀胱癌	14	27	1.93	13	31	2.20
C64	腎臟癌	15	25	1.78	14	30	2.13
C71	腦癌	15	25	1.78	15	28	1.99
	其他		237	16.91		262	18.61

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
93年	160.09	122.12	33.53	25.03	25.79	20.05	19.73	14.86	15.20	11.80	11.85	8.66	9.46	5.88	5.64	4.32
94年	163.78	120.21	33.21	23.58	23.17	17.60	20.69	14.85	16.76	12.67	13.51	9.41	10.37	6.14	6.91	5.12
95年	168.54	118.90	34.68	23.70	26.75	19.75	20.27	14.03	15.56	11.37	13.83	9.15	10.07	5.68	6.67	4.78
96年	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		結腸、直腸和肛門癌		肝和肝內膽管癌		女性乳房癌		前列腺(攝護腺)癌		胃癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	170.10	112.87	35.34	22.90	21.59	13.90	26.69	18.47	16.87	11.66	9.73	5.35	11.88	7.51	7.31	4.85
98年	174.48	111.24	36.98	22.87	22.64	14.01	25.43	16.63	17.49	11.55	11.22	5.88	12.20	7.31	9.06	5.74
99年	177.26	110.14	37.89	22.60	21.81	13.10	24.65	15.83	19.68	12.87	11.41	5.86	11.75	6.67	8.07	5.06
100年	179.59	109.78	38.48	22.83	23.11	13.85	25.50	15.95	20.73	13.50	10.40	5.12	10.82	6.21	8.77	5.30
101年	187.11	111.52	38.24	22.23	24.34	13.77	26.18	16.07	17.59	10.88	13.74	6.72	12.36	6.83	8.71	5.19
102年	183.55	106.98	36.87	20.72	23.55	13.36	26.12	15.44	18.96	11.90	12.04	5.87	11.75	6.27	8.62	4.89
103年	181.97	103.66	36.82	20.34	24.72	13.54	24.72	14.18	20.62	12.73	11.68	5.14	11.58	6.07	9.54	5.48
104年	185.87	102.84	36.40	19.68	25.37	13.41	24.67	13.72	20.45	12.15	12.58	5.97	10.91	5.80	10.10	5.60

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
93年	6.25	4.84	6.51	4.90	4.76	3.56	4.34	3.38	5.26	4.26	4.04	3.19	4.11	3.43	3.51	2.44
94年	6.41	4.61	6.43	4.89	4.58	3.44	3.74	2.76	5.57	4.30	4.81	3.76	3.82	3.07	2.52	1.74
95年	6.78	4.75	6.03	4.26	4.42	3.04	5.43	3.91	6.33	4.81	3.70	2.66	3.73	2.77	3.12	1.97
96年	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年別	口腔癌		非何杰金氏淋巴瘤		卵巢癌		子宮頸及部位未 明示子宮癌		食道癌		膀胱癌		白血病		子宮體癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	4.99	3.43	4.99	3.18	4.29	2.96	5.55	3.62	4.57	3.16	3.05	1.83	4.61	3.42	2.07	1.42
98年	5.66	3.78	4.55	2.85	4.82	3.36	5.11	3.31	4.93	3.23	3.06	1.72	4.05	2.92	1.70	1.15
99年	5.78	3.90	5.82	3.39	4.88	3.21	5.25	3.39	5.24	3.43	3.64	1.97	4.09	2.78	2.15	1.46
100年	5.81	3.86	5.65	3.30	4.76	3.25	5.42	3.23	4.36	2.71	2.96	1.57	4.25	2.95	2.49	1.67
101年	6.35	3.97	5.52	3.30	6.37	4.09	4.56	2.87	5.00	3.13	3.19	1.57	4.13	2.87	2.53	1.53
102年	7.57	4.88	5.75	3.24	6.11	3.79	5.75	3.25	4.52	2.76	3.13	1.59	4.22	2.89	2.80	1.73
103年	6.46	3.97	5.75	3.29	5.99	3.60	4.14	2.27	5.01	3.04	3.45	1.72	3.64	2.35	2.50	1.48
104年	6.77	4.24	5.66	3.09	5.47	3.40	4.97	2.73	4.92	2.88	4.33	1.95	3.99	2.24	2.98	1.76

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤		口腔癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
93年	201.24	149.63	46.47	33.20	38.40	30.08	23.74	17.23	15.36	10.60	9.46	5.88	7.06	5.28	9.46	7.95
94年	205.00	148.15	43.81	30.08	34.69	26.89	23.85	16.86	18.40	12.46	10.37	6.14	8.96	6.51	10.37	8.18
95年	210.37	146.09	47.46	31.25	40.43	30.73	24.67	17.02	18.73	11.98	10.07	5.68	8.74	6.09	11.47	9.00
96年	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		胃癌		前列腺(攝護腺)癌		口腔癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	17.11	10.69	9.73	5.35	9.02	6.44	8.95	6.11
98年	211.03	134.11	47.09	28.32	35.47	24.25	24.57	15.19	16.04	9.38	11.22	5.88	10.75	7.48	10.82	6.77
99年	219.66	137.29	48.91	29.60	35.12	23.28	26.24	15.97	15.62	8.91	11.41	5.86	11.02	7.70	9.99	6.41
100年	216.55	132.95	50.34	30.02	37.34	24.12	25.60	15.83	15.05	8.67	10.40	5.12	10.40	7.26	8.74	5.44
101年	229.30	138.02	49.42	28.92	37.08	24.29	28.97	16.89	15.85	8.46	13.74	6.72	11.40	7.44	9.60	5.89
102年	221.64	130.87	47.37	26.87	37.67	23.37	27.80	16.17	14.68	7.83	12.04	5.87	13.59	9.10	9.55	5.59
103年	218.44	127.74	45.48	25.78	34.58	21.20	28.16	16.21	15.39	8.16	11.68	5.14	11.76	7.72	10.29	6.30
104年	220.37	127.13	45.46	25.93	33.11	19.76	27.86	15.56	14.28	7.92	12.58	5.97	12.43	8.20	10.81	6.52

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
93年	7.06	5.68	6.90	5.20	5.04	3.74	5.28	4.16	4.81	3.12	4.27	3.39	2.02	1.75	1.40	1.00
94年	9.04	7.40	8.03	5.72	5.46	4.02	4.60	3.50	3.51	2.20	4.60	3.67	2.49	2.11	1.56	1.04
95年	6.79	4.87	7.49	5.21	4.68	3.22	4.22	2.91	3.90	2.30	5.07	4.16	2.58	2.02	1.56	0.99
96年	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99
年別	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		膀胱癌		白血病		鼻咽癌		腎臟癌		膽囊和其他膽道癌		腦癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	8.40	5.90	5.96	3.65	4.47	2.62	5.96	4.28	4.79	3.61	2.04	1.37	2.43	1.62	2.04	1.86
98年	8.61	5.89	6.08	3.83	4.42	2.44	5.06	3.61	3.87	2.83	3.00	2.05	3.00	1.81	2.77	2.07
99年	9.12	6.19	8.09	4.61	4.99	2.63	5.15	3.38	4.44	2.99	3.09	1.93	2.38	1.64	3.25	2.40
100年	8.19	5.30	7.40	4.35	4.18	2.13	4.96	3.26	3.31	2.41	3.78	2.13	2.52	1.41	3.31	2.45
101年	9.92	6.46	6.71	4.13	4.29	1.98	5.54	3.72	4.37	2.97	2.89	1.69	3.12	1.97	3.44	2.54
102年	8.54	5.40	6.21	3.43	4.43	2.33	5.44	3.73	4.35	3.02	3.03	1.89	2.17	1.15	3.57	2.43
103年	9.59	6.04	7.12	4.12	5.11	2.60	4.25	2.91	4.80	3.28	2.48	1.44	3.48	2.09	2.32	1.78
104年	9.57	5.93	6.79	3.90	6.64	3.08	5.25	3.07	4.71	3.19	3.32	1.95	2.86	1.64	2.39	1.56

表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
93年	120.38	94.63	21.04	16.41	15.87	12.42	15.20	11.80	13.62	10.67	8.46	6.55	6.51	4.90	4.27	3.40
94年	124.20	93.11	23.05	16.99	17.66	12.94	16.76	12.67	12.12	9.11	8.83	6.35	6.43	4.89	4.94	3.79
95年	128.65	92.46	22.48	15.97	16.08	11.23	15.56	11.37	13.70	9.88	9.16	6.31	6.03	4.26	4.69	3.44
96年	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		結腸、直腸和肛門癌		女性乳房癌		肝和肝內膽管癌		胰臟癌		胃癌		卵巢癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	130.86	87.54	24.78	16.27	17.31	11.20	16.87	11.66	15.76	10.79	5.77	3.76	6.95	4.47	4.29	2.96
98年	140.20	90.07	27.49	17.54	20.82	12.92	17.49	11.55	16.01	9.98	7.41	4.75	8.60	5.30	4.82	3.36
99年	137.69	85.62	27.60	16.36	17.68	10.57	19.68	12.87	14.87	9.27	6.29	3.86	8.14	4.62	4.88	3.21
100年	145.23	89.19	27.46	16.41	20.80	12.16	20.73	13.50	14.50	8.92	8.79	5.20	6.88	3.97	4.76	3.25
101年	147.98	88.40	27.87	16.31	20.05	11.11	17.59	10.88	16.07	9.11	7.89	4.57	9.12	5.32	6.37	4.09
102年	148.32	86.24	27.15	15.36	19.61	10.93	18.96	11.90	15.44	8.66	7.76	4.29	9.05	4.87	6.11	3.79
103年	148.33	83.12	28.82	15.72	21.55	11.34	20.62	12.73	15.62	8.23	8.85	4.80	8.06	4.26	5.99	3.60
104年	154.12	82.57	28.05	14.50	23.08	11.66	20.45	12.15	16.90	8.63	9.45	4.82	7.81	4.04	5.47	3.40

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
93年	5.61	4.50	4.34	3.38	4.49	3.43	2.99	2.65	1.65	1.34	2.25	1.66	1.80	1.70	1.12	0.86
94年	4.86	3.55	3.74	2.76	3.74	2.88	3.07	2.58	1.65	1.33	1.57	1.20	1.87	1.63	0.75	0.52
95年	6.10	4.35	5.43	3.91	4.17	2.93	3.28	2.52	1.86	1.41	2.38	1.62	1.64	1.30	0.74	0.56
96年	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94
年別	子宮頸及部位未明示子宮癌		非何杰金氏淋巴瘤		子宮體癌		白血病		膽囊和其他膽道癌		膀胱癌		腎臟癌		腦癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	5.55	3.62	4.07	2.73	2.07	1.42	3.33	2.61	2.59	1.68	1.70	1.05	1.63	1.05	1.70	1.32
98年	5.11	3.31	3.11	1.96	1.70	1.15	3.11	2.22	2.59	1.67	1.78	1.03	1.85	1.14	1.56	1.21
99年	5.25	3.39	3.70	2.25	2.15	1.46	3.11	2.19	1.63	1.02	2.37	1.32	1.85	1.12	2.07	1.75
100年	5.42	3.23	4.03	2.32	2.49	1.67	3.59	2.67	2.49	1.52	1.83	1.03	1.98	1.11	2.05	1.50
101年	4.56	2.87	4.42	2.61	2.53	1.53	2.82	2.11	2.68	1.48	2.17	1.16	1.59	0.90	2.03	1.84
102年	5.75	3.25	5.32	3.09	2.80	1.73	3.09	2.15	1.80	0.98	1.94	0.96	1.65	0.92	2.08	1.26
103年	4.14	2.27	4.49	2.57	2.50	1.48	3.07	1.81	2.21	1.15	1.93	0.95	1.78	1.00	1.78	1.51
104年	4.97	2.73	4.62	2.40	2.98	1.76	2.84	1.50	2.56	1.24	2.20	0.98	2.13	1.08	1.99	1.34

肆、歷年死因統計

二、行政區別死因統計

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		797	375.45	416.72		960	466.52	338.51		1,024	494.61	338.43		963	461.29	311.91		1,011	480.96	304.56
08-14	惡性腫瘤	1	224	105.52	113.20	1	304	147.73	109.05	1	313	151.18	108.08	1	345	165.26	112.76	1	332	157.94	103.23
25-27-28*	心臟疾病	3	91	42.87	49.51	2	101	49.08	33.77	2	134	64.72	42.17	2	104	49.82	31.91	2	108	51.38	31.42
29	腦血管疾病	2	103	48.52	52.72	3	81	39.36	27.79	3	91	43.95	28.56	3	73	34.97	21.58	3	86	40.91	24.13
181	糖尿病	4	42	19.79	21.41	4	62	30.13	20.77	4	67	32.36	21.59	4	65	31.14	18.86	4	79	37.58	22.53
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.25	14.34	7	27	13.12	13.86	7	33	15.94	10.849	8	26	12.45	7.48	5	41	19.50	10.66
321	肺炎	6	27	12.72	14.99	5	42	20.41	12.21	5	41	19.80	12.18	7	28	13.41	7.73	6	37	17.60	8.94
E54	自殺	10	17	8.01	7.75	9	18	8.75	7.03	9	20	9.66	8.07	6	30	14.37	12.01	7	29	13.80	11.28
E47-E53	事故傷害	5	30	14.13	14.38	6	38	18.47	12.94	6	35	16.91	14.15	5	34	16.29	14.98	8	26	12.37	12.27
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	9.89	10.64	8	20	9.72	7.26	8	22	10.63	7.03	8	26	12.45	8.54	9	17	8.09	5.56
038	敗血症	12	7	3.30	3.52	12	9	4.37	3.10	11	10	4.83	3.01	15	3	1.44	0.92	10	14	6.66	3.41
	其他		209	98.45	114.26		258	125.38	90.73		258	124.62	82.74		229	109.69	75.15		242	115.13	71.13

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,057	502.04	305.11		1,044	499.41	286.26		1,085	521.10	285.11		1,218	582.24	307.51		1,189	565.04	287.52
C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34	90.74	1	331	158.34	96.34	1	352	169.06	99.86	1	386	184.52	109.51	1	369	175.36	96.84
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	140	66.50	37.91	2	124	59.32	32.78	2	145	69.64	34.19	2	165	78.88	36.65	2	160	76.04	34.94
J12-J18	肺炎	4	63	29.92	17.22	5	48	22.96	10.76	5	56	26.90	12.04	4	73	34.90	14.29	4	53	25.19	10.11
I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32	24.08	3	78	37.31	20.09	3	70	33.62	16.86	3	87	41.59	20.06	3	92	43.72	20.30
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	27	12.82	6.32	8	33	15.79	7.50	6	32	15.37	6.79	9	29	13.86	6.22	8	33	15.68	5.89
E10-E14	糖尿病	5	49	23.27	13.53	4	72	34.44	18.81	4	59	28.34	14.64	5	50	23.90	12.69	5	47	22.34	11.00
I10-I15	高血壓性疾病	7	37	17.57	9.93	6	34	16.26	8.68	8	28	13.45	6.52	8	32	15.30	7.00	7	37	17.58	6.60
A40-A41	敗血症	6	46	21.85	12.07	6	34	16.26	8.68	8	28	13.45	7.27	6	42	20.08	9.57	6	38	18.06	8.06
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	27	1	0.47	0.20	14	10	4.78	2.06	15	8	3.84	1.51	11	20	9.56	3.29	15	10	4.75	1.67
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	31	14.72	8.71	10	21	10.05	4.82	7	30	14.41	7.66	7	36	17.21	8.52	10	29	13.78	6.51
	其他		270	128.24	84.40		259	123.90	75.74		277	133.04	77.77		298	142.45	79.71		321	152.55	75.75

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,239	588.25	288.15		1,237	587.91	282.34		1,314	625.44	292.93			
C00-C97	惡性腫瘤	1	389	184.69	101.25	1	380	180.60	94.62	1	386	183.73	94.55			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	139	65.99	32.19	2	195	92.68	43.14	2	199	94.72	41.30			
J12-J18	肺炎	5	68	32.29	13.00	4	70	33.27	14.19	3	101	48.07	17.06			
I60-I69	腦血管疾病	3	95	45.10	20.54	3	91	43.25	18.27	4	92	43.79	17.52			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	39	18.52	7.34	8	35	16.63	5.68	5	52	24.75	8.89			
E10-E14	糖尿病	4	70	33.23	15.94	5	62	29.47	13.07	6	48	22.85	10.35			
I10-I15	高血壓性疾病	7	46	21.84	8.35	6	43	20.44	8.33	7	40	19.04	6.75			
A40-A41	敗血症	9	34	16.14	6.31	10	25	11.88	4.78	8	39	18.56	6.54			
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	12	15	7.12	2.37	13	17	8.08	2.64	9	28	13.33	4.26			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	50	23.74	11.25	7	39	18.54	7.65	10	26	12.38	5.14			
	其他		294	139.59	69.61		280	133.07	69.97		303	144.22	80.57			

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,176	479.31	492.27		1,331	569.90	390.54		1,366	589.70	386.92		1,271	549.91	341.85		1,363	592.17	355.26
08-14	惡性腫瘤	1	303	123.50	121.50	1	373	159.71	112.37	1	430	185.63	126.68	1	401	173.50	113.16	1	427	185.51	116.31
25-27-28*	心臟疾病	2	121	49.32	50.71	2	178	76.22	47.58	3	159	68.64	40.03	2	134	57.98	33.71	2	167	72.55	41.68
29	腦血管疾病	3	120	48.91	48.82	3	115	49.24	32.06	2	163	70.37	43.54	3	105	45.43	27.28	3	133	57.78	30.89
181	糖尿病	5	59	24.05	23.40	4	74	31.69	21.30	4	80	34.54	21.74	3	105	45.43	28.66	4	76	33.02	19.69
321	肺炎	6	48	19.56	20.44	6	52	22.27	13.10	5	51	22.02	12.46	5	61	26.39	13.52	5	65	28.24	14.85
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	9	33	13.45	13.33	5	59	25.26	16.94	6	50	21.58	13.21	6	45	19.47	11.14	6	40	17.38	10.28
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.67	14.26	9	32	13.70	10.13	8	31	13.38	19.42	9	23	9.95	7.05	7	29	12.60	8.38
E54	自殺	11	16	6.52	5.99	8	35	14.99	11.81	7	45	19.43	15.35	7	40	17.31	13.73	8	27	11.73	8.86
E47-E53	事故傷害	4	81	33.01	31.34	7	39	16.70	12.87	9	27	11.66	9.75	8	28	12.11	8.83	9	24	10.43	7.17
26	高血壓性疾病	8	34	13.86	14.56	10	21	8.99	5.56	10	18	7.77	5.02	10	17	7.36	3.49	10	15	6.52	3.79
	其他		325	132.46	147.92		353	151.15	106.82		312	134.69	79.72		312	134.99	81.28		360	156.40	93.36

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77	350.41		1,357	598.94	343.00		1,336	593.18	328.10		1,382	612.00	322.46		1,513	666.11	345.11
C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88	110.89	1	437	192.88	114.86	1	424	188.25	110.88	1	441	195.29	114.01	1	455	200.32	109.20
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	181	79.28	43.10	2	142	62.67	34.96	2	143	63.49	31.30	2	147	65.10	31.01	2	184	81.01	39.29
J12-J18	肺炎	4	87	38.10	19.25	5	74	32.66	15.76	3	93	41.29	17.91	4	87	38.53	17.35	4	94	41.38	17.44
I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37	27.10	3	111	48.99	26.33	4	82	36.41	17.83	3	93	41.18	20.10	3	99	43.59	21.34
E10-E14	糖尿病	5	51	22.34	12.74	4	81	35.75	18.51	5	56	24.86	13.88	7	49	21.70	11.33	5	63	27.74	15.04
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	47	20.59	11.95	9	42	18.54	9.61	6	45	19.98	10.29	9	36	15.94	7.57	8	52	22.89	11.17
I10-I15	高血壓性 疾病	9	41	17.96	9.81	8	44	19.42	10.20	12	32	14.21	8.07	8	40	17.71	8.54	9	47	20.69	9.14
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	34	14.89	11.03	10	34	15.01	10.39	10	35	15.54	11.93	11	26	11.51	7.08	10	33	14.53	10.92
J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	8	45	19.71	9.97	6	49	21.63	9.94	7	42	18.65	9.14	6	57	25.24	10.95	6	59	25.98	11.23
A40-A41	敗血症	6	47	20.59	10.86	7	48	21.19	11.55	9	36	15.98	7.32	5	66	29.23	13.37	7	54	23.77	10.42
	其他		297	130.08	83.71		295	130.20	80.89		348	154.51	89.55		340	150.56	81.15		373	164.22	75.75

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,425	624.68	320.26		1,475	643.89	316.23		1,476	643.32	319.90			
C00-C97	惡性腫瘤	1	447	195.95	107.17	1	433	189.02	104.37	1	436	190.03	102.25			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	172	75.40	34.24	2	191	83.38	39.14	2	176	76.71	34.50			
J12-J18	肺炎	4	76	33.32	13.20	3	127	55.44	20.93	3	111	48.38	19.46			
I60-I69	腦血管疾病	3	103	45.15	19.20	4	101	44.09	20.21	4	93	40.53	19.12			
E10-E14	糖尿病	5	70	30.69	14.99	5	69	30.12	15.06	5	68	29.64	13.39			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	49	21.48	10.04	6	62	27.07	12.10	6	50	21.79	9.19			
I10-I15	高血壓性疾病	10	29	12.71	5.83	10	31	13.53	6.04	7	42	18.31	7.92			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	33	14.47	9.82	9	39	17.02	12.21	8	39	17.00	10.13			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	49	21.48	8.64	7	54	23.57	8.62	8	39	17.00	7.36			
A40-A41	敗血症	6	49	21.48	9.39	8	48	20.95	9.08	10	36	15.69	6.30			
	其他		348	152.55	87.74		320	139.69	68.47		386	168.24	90.27			

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,416	424.70	386.23		1,584	506.42	319.61		1,638	524.39	311.95		1,546	493.66	282.16		1,598	508.03	276.93
08-14	惡性腫瘤	1	410	122.97	110.66	1	527	168.49	111.30	1	501	160.39	99.34	1	495	158.06	94.53	1	473	150.37	90.00
25-27-28*	心臟疾病	2	184	55.19	49.75	2	210	67.14	37.16	2	225	72.03	38.67	2	174	55.56	29.16	2	194	61.68	29.86
29	腦血管疾病	3	169	50.69	44.05	3	126	40.28	24.35	3	142	45.46	25.58	3	121	38.64	19.87	3	145	46.10	21.44
181	糖尿病	5	74	22.19	19.74	4	107	34.21	20.70	4	106	33.94	18.87	4	105	33.53	17.42	4	118	37.51	20.00
321	肺炎	6	49	14.70	13.12	6	51	16.31	8.49	5	89	28.49	13.64	6	46	14.69	6.57	5	78	24.80	10.89
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	45	13.50	12.67	5	63	20.14	11.99	6	78	24.97	13.24	5	58	18.52	10.25	6	61	19.39	9.48
E47-E53	事故傷害	4	80	23.99	22.73	7	43	13.75	12.35	7	44	14.09	11.96	8	37	11.81	10.00	7	37	11.76	8.98
E54	自殺	9	24	7.20	6.30	8	35	11.19	8.30	8	40	12.81	9.30	7	40	12.77	10.22	8	36	11.45	8.61
038	敗血症	12	10	3.00	2.79	12	11	3.52	2.03	14	6	1.92	0.86	11	22	7.02	3.41	9	25	7.95	3.58
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.60	5.76	9	25	7.99	5.42	9	30	9.60	6.77	8	37	11.81	7.33	10	22	6.99	3.78
	其他		349	104.68	98.66		386	123.41	77.52		377	120.69	73.73		411	131.24	73.39		409	130.03	70.31

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51	288.84		1,667	533.05	272.15		1,779	570.94	277.62		1,816	580.74	275.56		1,818	579.65	270.29
C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36	90.51	1	549	175.55	98.92	1	572	183.58	96.42	1	544	173.97	93.07	1	580	184.93	94.20
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	237	75.39	36.28	2	200	63.95	30.96	2	213	68.36	30.67	2	233	74.51	31.26	2	210	66.96	29.84
I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67	20.32	3	115	36.77	17.01	3	129	41.40	17.92	3	129	41.25	17.14	3	153	48.78	20.61
J12-J18	肺炎	4	92	29.26	11.80	4	98	31.34	12.51	4	108	34.66	13.68	4	100	31.98	11.50	4	96	30.61	10.66
E10-E14	糖尿病	5	74	23.54	12.29	5	75	23.98	12.25	5	78	25.03	11.66	5	79	25.26	10.76	6	70	22.32	9.47
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	55	17.49	8.53	7	49	15.67	6.88	9	45	14.44	6.70	9	51	16.31	6.38	9	60	19.13	7.70
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	63	20.04	8.79	6	56	17.91	7.37	7	48	15.40	5.64	6	72	23.02	8.60	7	68	21.68	7.68
I10-I15	高血壓性疾病	9	45	14.31	6.48	8	48	15.35	6.96	9	45	14.44	5.65	10	43	13.75	6.14	8	67	21.36	7.81
A40-A41	敗血症	8	54	17.18	7.80	10	41	13.11	5.46	6	57	18.29	7.89	7	59	18.87	7.66	5	72	22.96	9.02
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	45	14.31	10.65	11	38	12.15	7.15	11	43	13.80	7.98	8	55	17.59	10.72	10	46	14.67	8.01
	其他		418	132.96	75.39		398	127.27	66.68		441	141.53	73.41		451	144.23	72.33		396	126.26	75.75

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,846	589.03	265.06		2,054	655.12	289.90		1,962	626.09	259.39			
C00-C97	惡性腫瘤	1	582	185.71	94.86	1	593	189.14	93.05	1	565	180.29	83.82			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	269	85.83	35.58	2	317	101.11	41.22	2	275	87.75	32.15			
I60-I69	腦血管疾病	3	136	43.40	16.86	3	148	47.20	19.41	3	139	44.36	16.37			
J12-J18	肺炎	4	89	28.40	8.98	4	120	38.27	13.38	4	128	40.85	13.41			
E10-E14	糖尿病	5	87	27.76	11.66	5	96	30.62	12.21	5	80	25.53	9.71			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	43	13.72	5.16	8	58	18.50	6.53	6	72	22.98	8.81			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	72	22.97	8.55	6	85	27.11	9.44	7	71	22.66	7.81			
I10-I15	高血壓性疾病	8	46	14.68	5.13	7	67	21.37	7.27	8	56	17.87	6.33			
A40-A41	敗血症	7	56	17.87	6.08	10	42	13.40	5.09	9	51	16.27	5.38			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	44	14.04	9.85	9	44	14.03	9.46	10	45	14.36	8.07			
	其他		422	134.65	62.35		484	154.37	72.84		480	153.17	67.53			

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		987	440.48	464.15		1,123	517.67	383.52		1,178	543.14	389.31		1,106	506.77	348.65		1,230	561.56	369.71
08-14	惡性腫瘤	1	289	128.97	131.63	1	370	170.56	126.90	1	374	172.44	123.37	1	351	160.83	110.34	1	384	175.32	114.11
25-27-28*	心臟疾病	2	124	55.34	58.98	2	154	70.99	50.46	2	146	67.32	45.60	2	138	63.23	42.24	2	147	67.11	42.14
29	腦血管疾病	3	106	47.31	50.82	3	83	38.26	27.41	3	102	47.03	31.46	3	105	48.11	30.71	3	109	49.76	32.01
181	糖尿病	5	47	20.98	21.96	4	71	32.73	23.36	4	91	41.96	28.41	4	71	32.53	21.35	4	86	39.26	24.71
321	肺炎	7	32	14.28	16.79	5	35	16.13	11.39	5	49	22.59	15.23	6	48	21.99	13.75	5	67	30.59	19.15
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	25	11.16	12.71	7	31	14.29	10.64	7	36	16.60	11.06	7	27	12.37	8.36	6	44	20.09	12.40
E47-E53	事故傷害	4	64	28.56	27.70	9	27	12.45	10.51	8	33	15.22	13.40	8	23	10.54	10.43	7	31	14.15	12.47
E54	自殺	10	20	8.93	7.81	5	35	16.13	12.80	6	44	20.29	17.34	5	49	22.45	18.01	8	29	13.24	10.66
347	慢性肝病及肝硬化	6	37	16.51	16.04	8	30	13.83	10.25	9	27	12.45	9.08	9	22	10.08	7.12	9	23	10.50	7.34
038	敗血症	15	4	1.79	2.11	12	5	2.30	1.58	10	15	6.92	4.44	11	11	5.04	3.61	10	21	9.59	6.23
	其他		239	106.66	117.60		282	129.99	98.22		261	120.34	89.92		261	119.59	82.73		289	131.94	88.49

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,264	578.06	365.58		1,192	545.43	326.95		1,261	575.31	338.60		1,341	603.74	344.73		1,412	626.49	346.62
C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70	114.39	1	417	190.81	117.29	1	402	183.41	110.80	1	418	188.19	111.16	1	430	190.79	112.43
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	167	76.37	45.89	2	143	65.43	37.90	2	145	66.15	35.98	2	156	70.23	36.66	2	153	67.89	36.01
I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22	31.21	3	96	43.93	24.46	3	89	40.60	22.88	3	101	45.47	23.70	3	96	42.59	21.64
J12-J18	肺炎	4	70	32.01	18.02	4	76	34.78	18.90	4	73	33.31	17.01	4	73	32.87	15.31	4	78	34.61	15.94
E10-E14	糖尿病	5	69	31.56	19.49	5	47	21.51	13.09	5	63	28.74	15.36	5	66	29.71	16.69	5	75	33.28	18.00
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	36	16.46	9.55	6	39	17.85	9.90	6	46	20.99	11.43	9	35	15.76	8.84	6	59	26.18	14.46
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	30	13.72	7.78	10	29	13.27	6.90	11	31	14.14	6.90	7	37	16.66	8.08	9	46	20.41	9.97
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	18	8.23	6.75	11	28	12.81	10.11	9	34	15.51	12.55	11	31	13.96	9.25	10	38	16.86	11.08
I10-I15	高血壓性疾病	11	25	11.43	6.27	11	28	12.81	7.34	12	30	13.69	6.59	7	37	16.66	8.58	7	54	23.96	11.71
A40-A41	敗血症	7	37	16.92	9.68	7	36	16.47	9.18	7	42	19.16	10.53	6	61	27.46	14.48	8	51	22.63	11.03
	其他		318	145.43	96.55		253	115.77	71.88		306	139.61	88.57		326	146.77	91.98		332	147.31	75.75

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,350	592.87	320.24		1,431	623.19	331.74		1,416	613.19	316.50			
C00-C97	惡性腫瘤	1	412	180.94	103.00	1	427	185.96	103.84	1	424	183.61	101.41			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	173	75.98	40.31	2	208	90.58	47.38	2	179	77.52	39.13			
I60-I69	腦血管疾病	3	88	38.65	19.42	3	101	43.98	22.72	3	94	40.71	19.04			
J12-J18	肺炎	4	76	33.38	15.08	4	74	32.23	14.80	4	83	35.94	15.37			
E10-E14	糖尿病	5	65	28.55	15.01	5	68	29.61	15.11	5	58	25.12	11.55			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	33	14.49	7.41	7	47	20.47	9.35	6	50	21.65	9.96			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	52	22.84	10.29	6	53	23.08	10.20	7	49	21.22	8.48			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	52	22.84	14.73	12	27	11.76	7.11	8	42	18.19	13.30			
I10-I15	高血壓性疾病	6	57	25.03	12.51	8	42	18.29	8.27	9	39	16.89	7.40			
A40-A41	敗血症	9	36	15.81	8.36	9	37	16.11	7.33	10	36	15.59	6.57			
	其他		306	134.38	74.12		347	151.12	85.63		362	156.76	84.29			

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		786	454.91	404.71		858	539.48	342.76		892	564.88	349.02		843	533.65	316.60		874	549.53	305.47
08-14	惡性腫瘤	1	244	141.22	125.31	1	245	154.05	101.80	1	282	178.58	117.47	1	267	169.02	105.69	1	258	162.22	96.45
25-27-28*	心臟疾病	3	77	44.57	38.37	2	113	71.05	41.02	2	102	64.59	37.30	2	80	50.64	26.31	2	86	54.07	27.11
29	腦血管疾病	2	86	49.77	43.48	3	89	55.96	32.15	3	88	55.73	34.22	3	62	39.25	21.31	3	75	47.16	23.89
181	糖尿病	4	39	22.57	19.47	4	59	37.10	23.32	4	58	36.73	21.53	4	53	33.55	18.87	4	58	36.47	19.78
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	20	11.58	10.08	5	34	21.38	12.02	7	23	14.57	7.59	6	31	19.62	11.00	5	52	32.70	16.17
321	肺炎	7	27	15.63	14.22	6	24	15.09	7.71	5	30	19.00	10.17	5	51	32.28	15.33	6	38	23.89	11.51
E47-E53	事故傷害	5	32	18.52	17.29	8	21	13.20	9.44	6	24	15.20	13.39	8	25	15.83	13.12	7	25	15.72	12.26
E54	自殺	11	8	4.63	4.35	7	22	13.83	11.94	8	19	12.03	9.39	9	24	15.19	14.32	8	22	13.83	11.16
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	15.63	14.81	8	21	13.20	9.72	9	18	11.40	7.39	7	26	16.46	8.94	9	17	10.69	7.29
26	高血壓性疾病	6	30	17.36	15.38	10	11	6.92	3.65	10	10	6.33	3.06	10	14	8.86	4.73	10	10	6.29	2.79
	其他		196	113.44	101.95		219	137.70	89.99		238	150.72	87.49		210	132.94	76.99		233	146.50	77.06

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		957	600.33	331.54		897	563.99	308.67		885	556.10	290.83		957	596.29	307.13		999	617.42	308.90
C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07	111.73	1	276	173.54	103.34	1	278	174.68	99.77	1	263	163.87	93.15	1	305	188.50	106.54
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	127	79.67	42.36	2	116	72.94	37.95	2	103	64.72	34.02	2	118	73.52	35.53	2	129	79.73	35.84
J12-J18	肺炎	4	70	43.91	19.59	4	49	30.81	12.60	4	51	32.05	12.28	4	52	32.40	13.63	4	71	43.88	17.63
I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54	21.19	3	58	36.47	18.09	3	56	35.19	17.22	3	54	33.65	16.20	3	73	45.12	19.35
E10-E14	糖尿病	7	30	18.82	10.26	5	46	28.92	15.90	7	32	20.11	9.59	5	38	23.68	12.14	7	39	24.10	10.72
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	22	13.80	6.08	8	27	16.98	8.26	9	21	13.20	4.97	8	30	18.69	7.82	8	32	19.78	7.95
A40-A41	敗血症	5	41	25.72	12.83	6	31	19.49	9.13	6	36	22.62	9.46	6	31	19.32	8.79	5	42	25.96	12.71
I10-I15	高血壓性疾病	10	19	11.92	5.90	10	21	13.20	6.16	5	41	25.76	11.40	10	27	16.82	7.85	5	42	25.96	11.46
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	35	21.96	10.66	6	31	19.49	9.09	10	18	11.31	5.39	6	31	19.32	8.56	8	32	19.78	9.49
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	13.17	11.18	9	23	14.46	11.63	13	15	9.43	5.56	8	30	18.69	11.84	10	24	14.83	10.38
	其他		218	136.75	79.76		219	137.70	76.52		234	147.04	81.17		283	176.33	91.62		210	129.79	75.75

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		892	548.43	264.45		1,093	669.47	321.84		1,097	673.29	314.63			
C00-C97	惡性腫瘤	1	248	152.48	79.50	1	291	178.24	95.13	1	317	194.56	100.26			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	121	74.39	35.70	2	179	109.64	49.31	2	148	90.84	39.66			
J12-J18	肺炎	3	76	46.73	16.61	4	78	47.78	17.15	3	77	47.26	17.86			
I60-I69	腦血管疾病	4	57	35.05	15.18	3	94	57.58	25.41	4	67	41.12	18.43			
E10-E14	糖尿病	5	47	28.90	13.51	5	45	27.56	12.75	5	51	31.30	14.19			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	31	19.06	8.15	6	33	20.21	8.31	6	48	29.46	10.52			
A40-A41	敗血症	10	21	12.91	4.99	8	31	18.99	8.84	7	35	21.48	8.74			
I10-I15	高血壓性疾病	9	23	14.14	6.39	10	28	17.15	6.58	8	31	19.03	6.93			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	31	19.06	8.02	6	33	20.21	8.65	9	29	17.80	7.34			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	24	14.76	9.22	9	29	17.76	10.02	10	28	17.19	12.65			
	其他		213	130.96	67.18		252	154.35	79.69		266	163.26	78.03			

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		733	536.47	552.72		766	593.91	430.17		867	679.14	490.25		802	632.16	431.17		810	640.19	415.86
08-14	惡性腫瘤	1	230	168.33	172.79	1	205	158.94	119.59	1	228	178.60	130.70	1	273	215.19	148.40	1	259	204.70	136.29
25-27-28*	心臟疾病	2	73	53.43	55.15	2	89	69.01	47.71	2	95	74.42	46.89	2	96	75.67	49.95	2	94	74.29	48.80
29	腦血管疾病	3	72	52.70	53.79	3	73	56.60	39.88	3	89	69.72	50.44	4	55	43.35	27.79	3	68	53.74	34.48
181	糖尿病	4	48	35.13	36.22	4	60	46.52	33.65	4	63	49.35	34.45	3	56	44.14	29.38	4	50	39.52	24.78
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	30	21.96	22.93	5	33	25.59	18.87	5	42	32.90	23.19	6	25	19.71	13.26	5	35	27.66	17.33
321	肺炎	8	22	16.10	16.94	6	32	24.81	16.63	7	25	19.58	12.88	5	29	22.86	14.12	6	29	22.92	13.40
E47-E53	事故傷害	5	47	34.40	33.69	8	20	15.51	11.96	8	24	18.80	17.98	8	20	15.76	13.61	7	24	18.97	14.65
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.30	18.40	7	21	16.28	12.64	9	22	17.23	12.65	10	10	7.88	5.50	7	24	18.97	12.70
E54	自殺	11	10	7.32	7.33	9	19	14.73	12.08	6	30	23.50	19.84	7	22	17.34	14.17	9	18	14.23	11.77
038	敗血症	10	12	8.78	9.53	12	6	4.65	3.16	10	18	14.10	8.75	9	11	8.67	5.50	10	13	10.27	5.58
	其他		164	120.03	125.95		208	161.27	114.00		231	180.95	132.47		205	161.59	109.48		196	154.91	96.08

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		893	712.17	452.82		859	692.60	420.80		806	650.00	378.19		859	683.81	392.95		926	725.00	414.81
C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93	139.52	1	255	205.60	128.29	1	255	205.65	125.45	1	244	194.24	117.42	1	288	225.48	133.64
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	118	94.11	58.79	2	105	84.66	48.81	2	83	66.94	37.30	2	98	78.01	43.23	2	142	111.18	60.86
I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84	30.62	3	84	67.73	38.53	3	58	46.77	24.92	3	61	48.56	25.54	3	65	50.89	27.40
J12-J18	肺炎	4	61	48.65	27.90	5	41	33.06	17.33	4	49	39.52	19.33	4	56	44.58	23.36	5	40	31.32	14.99
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	23	18.34	11.73	8	26	20.96	11.57	7	28	22.58	12.11	7	26	20.70	11.24	8	25	19.57	10.32
E10-E14	糖尿病	5	55	43.86	28.02	4	58	46.76	27.53	5	43	34.68	19.34	5	48	38.21	21.30	4	41	32.10	17.49
A40-A41	敗血症	6	32	25.52	14.71	6	32	25.80	15.01	6	32	25.81	14.64	6	39	31.05	15.90	6	34	26.62	13.91
J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	7	26	20.74	11.40	7	27	21.77	11.66	8	23	18.55	9.43	8	25	19.90	10.53	7	30	23.49	11.44
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	16.75	11.45	8	26	20.96	14.30	10	17	13.71	10.58	10	20	15.92	10.46	10	21	16.44	12.21
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	12	16	12.76	8.80	10	19	15.32	10.41	11	16	12.90	7.66	11	17	13.53	7.95	10	21	16.44	10.72
	其他		209	166.68	109.88		186	149.97	97.36		202	162.90	97.43		225	179.11	106.02		219	171.46	75.75

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率
A00-Y98	所有死亡原因		889	687.47	383.25		843	646.49	350.58		986	752.95	400.99			
C00-C97	惡性腫瘤	1	282	218.07	124.15	1	236	180.99	102.39	1	300	229.09	127.23			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	125	96.66	53.92	2	139	106.60	54.84	2	151	115.31	60.97			
I60-I69	腦血管疾病	3	59	45.63	23.66	3	55	42.18	22.03	3	75	57.27	27.91			
J12-J18	肺炎	5	47	36.35	18.59	4	53	40.65	19.56	4	57	43.53	21.09			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	25	19.33	9.79	7	25	19.17	9.23	5	43	32.84	16.42			
E10-E14	糖尿病	4	49	37.89	20.13	5	45	34.51	18.52	5	43	32.84	16.08			
A40-A41	敗血症	7	29	22.43	12.18	9	20	15.34	7.72	7	29	22.15	10.00			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	32	24.75	11.79	6	41	31.44	14.75	7	29	22.15	9.40			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	16	12.37	10.28	9	20	15.34	8.96	9	25	19.09	11.90			
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	15	11.60	6.81	13	13	9.97	6.20	10	21	16.04	8.80			
	其他		210	162.39	91.95		196	150.31	86.38		213	162.66	91.19			

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,094	506.93	512.04		1,391	699.50	473.22		1,454	741.48	472.87		1,428	733.02	451.74		1,493	770.88	449.83
08-14	惡性腫瘤	1	270	125.11	121.67	1	414	208.19	142.34	1	431	219.79	142.95	1	427	219.19	140.31	1	458	236.48	142.80
25-27-28*	心臟疾病	2	136	63.02	66.08	2	160	80.46	52.18	2	142	72.41	43.14	2	149	76.48	44.31	2	160	82.61	48.02
29	腦血管疾病	3	127	58.85	59.62	3	125	62.86	39.07	3	139	70.88	43.19	3	138	70.84	41.15	3	126	65.06	37.54
181	糖尿病	5	57	26.41	26.00	4	92	46.26	30.19	4	113	57.63	36.08	4	119	61.08	36.71	4	109	56.28	31.57
321	肺炎	8	30	13.90	15.91	8	43	21.62	12.59	5	60	30.60	16.82	6	49	25.15	12.86	5	87	44.92	21.89
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	35	16.22	16.24	6	54	27.16	17.23	7	45	22.95	13.06	5	58	29.77	17.75	6	63	32.53	16.74
347	慢性肝病及肝硬化	6	43	19.93	19.40	7	53	26.65	20.28	9	28	14.28	9.28	8	35	17.97	12.60	7	42	21.69	13.72
E54	自殺	11	19	8.80	8.27	9	33	16.59	13.23	6	58	29.58	23.44	6	49	25.15	19.60	8	37	19.10	14.47
E47-E53	事故傷害	4	73	33.83	32.04	5	60	30.17	25.38	8	37	18.87	15.47	9	32	16.43	13.17	9	34	17.56	13.70
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	9	24	11.12	10.43	13	11	5.53	3.69	11	16	8.16	4.86	13	7	3.59	1.92	10	14	7.23	3.76
	其他		280	129.74	136.38		346	174.00	117.04		385	196.33	124.58		365	187.36	111.37		363	187.43	105.62

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68	450.30		1,552	819.43	447.32		1,525	807.87	433.84		1,578	830.63	426.38		1,616	842.80	427.68
C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83	122.62	1	419	221.23	125.53	1	446	236.27	132.66	1	426	224.24	121.90	1	448	233.65	127.77
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	203	106.05	56.99	2	175	92.40	47.78	2	167	88.47	45.11	2	185	97.38	45.99	2	207	107.96	50.58
J12-J18	肺炎	3	111	57.99	28.01	5	95	50.16	21.34	4	107	56.68	25.11	4	110	57.90	24.84	4	102	53.20	21.15
I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29	28.82	3	118	62.30	32.66	3	114	60.39	30.20	3	116	61.06	31.08	3	121	63.11	30.02
E10-E14	糖尿病	5	88	45.97	24.11	4	105	55.44	29.81	5	86	45.56	23.81	5	108	56.85	27.65	5	90	46.94	22.73
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	50	26.12	12.13	8	52	27.46	11.92	10	39	20.66	9.26	6	62	32.64	13.30	6	66	34.42	14.17
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	61	31.87	16.89	9	47	24.82	12.32	8	48	25.43	12.97	8	50	26.32	12.08	9	43	22.43	11.20
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	45	23.51	17.52	12	32	16.90	11.97	11	33	17.48	14.37	12	34	17.90	11.84	9	43	22.43	15.38
A40-A41	敗血症	9	46	24.03	11.95	6	60	31.68	16.88	6	60	31.79	14.88	9	44	23.16	10.08	8	58	30.25	12.72
I10-I15	高血壓性疾病	11	39	20.37	9.94	11	43	22.70	10.84	7	49	25.96	12.67	7	57	30.00	13.98	7	61	31.81	15.24
	其他		363	189.64	121.32		406	214.36	126.27		376	199.19	112.80		386	203.18	113.64		377	196.62	75.75

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,604	830.86	409.75		1,651	850.60	405.16		1,716	882.14	412.09			
C00-C97	惡性腫瘤	1	464	240.35	128.59	1	458	235.96	121.04	1	459	235.96	120.66			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	215	111.37	49.65	2	253	130.35	59.90	2	268	137.77	60.94			
J12-J18	肺炎	5	85	44.03	17.24	3	108	55.64	21.57	3	126	64.77	23.98			
I60-I69	腦血管疾病	3	123	63.71	28.28	3	108	55.64	23.79	4	119	61.17	25.82			
E10-E14	糖尿病	4	88	45.58	21.54	5	100	51.52	24.77	5	92	47.29	21.97			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	57	29.53	11.93	7	61	31.43	10.63	6	67	34.44	11.34			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	45	23.31	10.51	6	66	34.00	14.98	7	54	27.76	11.30			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	42	21.76	13.41	8	52	26.79	16.86	8	52	26.73	17.56			
A40-A41	敗血症	9	43	22.27	9.47	10	43	22.15	8.32	8	52	26.73	9.96			
I10-I15	高血壓性疾病	6	60	31.08	13.48	9	49	25.25	10.47	10	49	25.19	10.62			
	其他		382	197.87	105.65		353	181.87	92.83		378	194.32	97.95			

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,041	461.94	512.44		1,277	496.35	392.35		1,297	501.74	377.83		1,301	500.03	360.44		1,402	536.05	368.85
08-14	惡性腫瘤	1	274	121.59	129.12	1	406	157.81	128.43	1	384	148.55	113.36	1	411	157.96	117.84	1	411	157.15	113.05
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.16	47.41	2	165	64.13	48.62	2	148	57.25	40.41	2	133	51.12	33.87	2	168	64.23	42.38
29	腦血管疾病	2	121	53.69	58.88	3	133	51.70	39.73	3	113	43.71	31.45	3	119	45.74	31.14	3	116	44.35	29.52
181	糖尿病	5	70	31.06	33.39	4	79	30.71	22.83	4	79	30.56	23.60	4	71	27.29	19.76	4	84	32.12	20.84
321	肺炎	8	30	13.31	16.05	6	41	15.94	10.85	5	57	22.05	14.27	5	59	22.68	14.74	5	74	28.29	16.39
E54	自殺	12	11	4.88	4.77	7	35	13.60	12.05	7	44	17.02	14.99	7	42	16.14	13.27	6	51	19.50	15.91
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	43	19.08	20.79	5	42	16.32	12.41	6	51	19.73	13.80	6	49	18.83	13.21	7	47	17.97	12.11
E47-E53	事故傷害	4	88	39.05	40.11	9	27	10.49	9.97	8	42	16.25	14.70	8	33	12.68	10.79	8	35	13.38	11.25
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	12.87	13.43	8	30	11.66	9.72	9	29	11.22	8.88	9	27	10.38	8.25	9	29	11.09	8.64
038	敗血症	14	9	3.99	4.61	13	7	2.72	1.96	11	15	5.80	4.05	11	17	6.53	4.51	10	20	7.65	4.55
	其他		271	120.25	143.88		312	121.27	95.78		335	129.59	98.32		340	130.68	93.04		367	140.32	94.21

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39	355.06		1,406	538.09	344.02		1,454	555.84	338.70		1,551	586.67	340.24		1,619	604.38	349.18
C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79	118.80	1	394	150.79	101.78	1	417	159.41	103.33	1	449	169.83	106.17	1	486	181.43	114.23
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	188	71.84	44.69	2	166	63.53	39.82	2	150	57.34	32.62	2	193	73.00	41.56	2	171	63.84	34.40
J12-J18	肺炎	4	86	32.86	19.04	5	64	24.49	13.41	4	86	32.88	17.27	4	90	34.04	15.64	4	103	38.45	18.42
I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98	24.05	3	105	40.18	22.36	3	103	39.37	22.01	3	125	47.28	27.89	3	125	46.66	25.55
E10-E14	糖尿病	5	60	22.93	14.47	4	68	26.02	16.29	5	80	30.58	17.62	5	81	30.64	17.71	5	81	30.24	17.29
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	46	17.58	11.13	8	43	16.46	10.46	8	53	20.26	11.99	9	42	15.89	8.55	8	58	21.65	11.96
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	38	14.52	8.46	6	58	22.20	12.08	6	63	24.08	12.15	6	71	26.86	12.89	6	66	24.64	11.30
A40-A41	敗血症	7	45	17.20	11.44	11	32	12.25	6.97	9	41	15.67	9.43	7	67	25.34	12.56	9	57	21.28	11.23
I10-I15	高血壓性疾病	10	35	13.37	8.59	7	51	19.52	11.14	6	63	24.08	13.61	8	59	22.32	11.22	7	61	22.77	11.71
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	41	15.67	13.19	10	38	14.54	11.88	11	32	12.23	10.01	10	37	14.00	10.78	10	41	15.31	9.21
	其他		321	122.66	81.20		387	148.11	97.83		366	139.91	88.66		337	127.47	75.27		370	138.12	75.75

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,514	560.07	319.09		1,678	615.48	342.44		1,617	588.76	307.80			
C00-C97	惡性腫瘤	1	403	149.08	93.22	1	462	169.46	102.13	1	453	164.94	95.06			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	201	74.35	38.66	2	236	86.56	45.71	2	229	83.38	40.74			
J12-J18	肺炎	4	96	35.51	17.02	3	117	42.92	19.61	3	119	43.33	18.06			
I60-I69	腦血管疾病	3	122	45.13	24.50	4	109	39.98	21.44	4	95	34.59	17.82			
E10-E14	糖尿病	5	91	33.66	18.89	5	82	30.08	16.46	5	70	25.49	12.39			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	54	19.98	10.97	6	66	24.21	12.28	6	63	22.94	11.38			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	45	16.65	8.41	7	65	23.84	10.14	7	62	22.57	9.79			
A40-A41	敗血症	7	59	21.83	10.51	8	59	21.64	10.54	8	52	18.93	8.66			
I10-I15	高血壓性疾病	6	61	22.57	10.82	10	39	14.31	6.01	9	45	16.38	8.71			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	39	14.43	9.53	9	52	19.07	12.02	10	38	13.84	8.47			
	其他		343	126.88	76.56		391	143.42	86.10		391	142.37	76.72			

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
01-56	所有死亡原因		469	415.37	546.64		567	501.54	440.30		587	519.39	432.63		649	573.55	463.19		596	525.17	407.61
08-14	惡性腫瘤	1	139	123.11	156.95	1	193	170.72	146.42	1	186	164.58	138.32	1	206	182.05	149.20	1	195	171.83	132.30
25-27-28*	心臟疾病	3	43	38.08	53.74	2	78	68.99	60.74	2	66	58.40	48.04	2	68	60.09	47.94	2	64	56.39	41.90
29	腦血管疾病	2	49	43.40	59.01	3	48	42.46	36.54	3	55	48.67	38.94	3	61	53.91	41.50	3	60	52.87	39.39
181	糖尿病	5	27	23.91	30.41	4	34	30.07	26.64	4	44	38.93	32.92	4	41	36.23	28.65	4	27	23.79	17.44
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	10	8	7.09	9.02	6	22	19.46	16.67	7	23	20.35	16.87	8	17	15.02	11.78	5	25	22.03	15.92
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	20.37	24.52	7	17	15.04	13.32	9	10	8.85	7.83	9	15	13.26	10.66	6	22	19.39	14.95
E47-E53	事故傷害	4	32	28.34	30.47	5	30	26.54	24.59	5	25	22.12	20.42	5	30	26.51	23.81	7	19	16.74	17.59
E54	自殺	8	11	9.74	10.82	8	13	11.50	10.27	6	24	21.24	17.91	5	30	26.51	21.67	8	14	12.34	10.40
321	肺炎	13	7	6.20	9.81	9	10	8.85	7.46	8	11	9.73	7.74	7	28	24.74	18.57	8	14	12.34	8.60
038	敗血症	14	5	4.43	6.19	11	3	2.65	2.41	12	5	4.42	3.87	11	7	6.19	5.30	10	10	8.81	6.31
	其他		125	110.71	155.70		119	105.26	95.24		138	122.11	99.76		146	129.03	104.10		146	128.65	102.81

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24	404.97		667	588.13	413.85		704	619.79	424.60		662	575.27	384.04		703	599.26	389.06
C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60	121.11	1	206	181.64	130.59	1	215	189.28	134.00	1	195	169.45	116.63	1	222	189.24	127.96
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	75	65.97	44.97	2	79	69.66	50.43	2	74	65.15	43.64	2	91	79.08	50.10	2	83	70.75	45.08
I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74	32.00	3	48	42.32	28.34	3	54	47.54	32.10	3	48	41.71	26.24	3	52	44.33	27.32
J12-J18	肺炎	3	58	51.01	35.70	4	42	37.03	23.28	4	44	38.74	23.58	4	43	37.37	22.15	4	48	40.92	22.37
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	9	19	16.71	12.35	7	22	19.40	13.09	7	25	22.01	14.46	7	19	16.51	10.35	12	17	14.49	9.71
E10-E14	糖尿病	5	31	27.27	20.03	5	33	29.10	21.39	6	33	29.05	19.03	5	36	31.28	20.87	5	39	33.24	20.86
I10-I15	高血壓性疾病	11	15	13.19	8.76	12	12	10.58	7.15	12	13	11.45	7.41	12	12	10.43	6.77	9	19	16.20	9.38
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	7	21	18.47	15.08	11	16	14.11	10.83	12	13	11.45	9.38	11	13	11.30	9.28	8	21	17.90	13.47
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	11	15	13.19	9.75	6	23	20.28	15.13	9	19	16.73	12.41	9	17	14.77	11.31	9	19	16.20	11.20
M00-M99	骨骼肌肉系統及 結締組織之疾病	13	9	7.92	5.28	10	17	14.99	9.26	11	16	14.09	7.81	15	5	4.34	2.69	13	9	7.67	5.42
	其他		148	130.17	99.94		169	149.02	104.36		198	174.32	120.78		183	159.02	107.65		174	148.32	75.75

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率
A00-Y98	所有死亡原因		689	578.40	365.11		744	617.40	379.17		722	593.01	361.83			
C00-C97	惡性腫瘤	1	226	189.72	128.04	1	228	189.20	122.64	1	231	189.73	120.52			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	85	71.36	42.12	2	94	78.01	44.88	2	108	88.71	53.42			
I60-I69	腦血管疾病	3	62	52.05	29.15	3	70	58.09	34.78	3	51	41.89	23.28			
J12-J18	肺炎	4	43	36.10	19.21	4	46	38.17	20.77	4	43	35.32	17.58			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	13	10.91	6.96	7	23	19.09	11.18	5	35	28.75	15.47			
E10-E14	糖尿病	5	32	26.86	17.24	5	39	32.36	19.71	6	28	23.00	14.16			
I10-I15	高血壓性疾病	9	19	15.95	9.26	12	12	9.96	5.33	7	23	18.89	10.24			
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	17	5	4.20	2.93	11	16	13.28	9.77	8	18	14.78	10.50			
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	7	20	16.79	10.96	10	17	14.11	9.48	9	17	13.96	8.82			
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	9	7.56	4.48	13	8	6.64	3.51	10	15	12.32	6.64			
	其他		175	146.91	94.76		191	158.50	97.12		153	125.67	81.21			

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		782	350.67	533.92		1,097	421.12	440.93		1,048	400.74	403.33		1,044	396.61	378.76		1,107	417.62	378.58
08-14	惡性腫瘤	1	198	88.79	126.68	1	314	120.54	128.00	1	306	117.01	117.36	1	357	135.62	126.93	1	373	140.72	127.74
25-27-28*	心臟疾病	2	84	37.67	61.13	2	160	61.42	62.42	2	115	43.97	44.19	2	105	39.89	39.44	2	134	50.55	45.09
29	腦血管疾病	3	71	31.84	53.36	3	90	34.55	35.90	3	107	40.91	41.26	3	104	39.51	38.27	3	96	36.22	33.17
181	糖尿病	5	41	18.39	31.21	4	65	24.95	27.88	4	74	28.30	27.85	4	60	22.79	21.50	4	73	27.54	25.69
321	肺炎	8	24	10.76	20.36	8	31	11.90	12.28	9	35	13.38	12.80	7	37	14.06	13.51	5	51	19.24	17.07
E54	自殺	7	26	11.66	13.75	6	39	14.97	12.99	6	39	14.91	13.18	5	43	16.34	16.08	6	34	12.83	11.20
E47-E53	事故傷害	4	56	25.11	27.25	5	52	19.96	19.36	8	36	13.77	13.82	8	35	13.30	12.36	6	34	12.83	12.42
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	20	8.97	14.06	7	33	12.67	13.66	7	39	14.91	14.97	6	42	15.96	15.46	8	33	12.45	10.91
347	慢性肝病及肝硬化	6	30	13.45	17.26	9	28	10.75	11.17	5	41	15.68	15.55	9	34	12.92	12.24	9	30	11.32	9.99
26	高血壓性疾病	11	16	7.17	12.08	11	11	4.22	4.96	10	23	8.79	8.94	10	14	5.32	4.77	10	15	5.66	5.15
	其他		216	96.86	156.78		274	105.18	112.31		233	89.09	93.41		213	80.92	78.20		234	88.28	80.15

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,183	444.46	378.30		1,170	437.78	357.42		1,183	439.82	352.11		1,238	453.56	352.86		1,382	497.41	376.04
C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51	118.35	1	365	136.57	114.55	1	364	135.33	110.36	1	376	137.75	113.21	1	418	150.45	118.25
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	153	57.48	49.08	2	133	49.77	38.51	2	133	49.45	39.58	2	129	47.26	37.64	2	152	54.71	39.03
I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95	31.77	3	90	33.68	26.75	3	87	32.35	25.63	3	95	34.81	25.67	3	105	37.79	27.47
J12-J18	肺炎	5	63	23.67	19.12	5	60	22.45	16.75	5	54	20.08	14.41	5	54	19.78	13.31	5	65	23.39	15.99
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	28	10.52	8.83	11	29	10.85	8.32	9	35	13.01	9.01	6	46	16.85	11.02	6	47	16.92	12.06
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	33	12.40	11.36	6	41	15.34	14.16	6	42	15.61	13.93	7	40	14.65	11.00	9	43	15.48	12.77
A40-A41	敗血症	6	42	15.78	12.45	10	31	11.60	9.48	13	24	8.92	6.67	9	31	11.36	7.90	7	45	16.20	12.19
E10-E14	糖尿病	4	68	25.55	22.23	4	65	24.32	19.61	4	62	23.05	19.20	4	69	25.28	19.67	4	77	27.71	21.25
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	7	38	14.28	12.89	7	37	13.84	12.32	11	31	11.53	10.12	12	24	8.79	7.11	11	31	11.16	9.17
F01-F03	血管性及未明示 之癱瘓症	17	6	2.25	1.76	14	18	6.74	5.01	14	16	5.95	4.43	15	12	4.40	2.97	13	14	5.04	2.94
	其他		285	107.08	90.46		301	112.63	91.96		335	124.55	98.77		362	132.63	103.36		385	138.57	104.92

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,322	469.74	340.25		1,364	479.77	338.86		1,423	496.40	340.19			
C00-C97	惡性腫瘤	1	403	143.20	105.15	1	398	139.99	103.82	1	458	159.77	112.15			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	161	57.21	41.46	2	209	73.51	50.04	2	176	61.40	40.23			
I60-I69	腦血管疾病	3	109	38.73	26.89	3	105	36.93	25.50	3	105	36.63	23.64			
J12-J18	肺炎	5	58	20.61	11.98	6	59	20.75	12.93	4	68	23.72	13.65			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	56	19.90	13.19	4	61	21.46	13.37	5	58	20.23	12.38			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	34	12.08	8.83	7	43	15.12	11.56	6	48	16.74	13.73			
A40-A41	敗血症	8	37	13.15	8.59	11	29	10.20	5.90	7	44	15.35	10.00			
E10-E14	糖尿病	4	66	23.45	17.63	4	61	21.46	14.81	8	42	14.65	9.89			
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	26	9.24	7.39	8	36	12.66	10.99	9	36	12.56	10.04			
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	14	14	4.97	2.95	14	19	6.68	3.52	10	33	11.51	6.23			
	其他		358	127.21	96.19		344	121.00	86.42		355	123.84	88.26			

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,192	399.07	480.62		1,462	505.78	409.93		1,588	550.74	424.34		1,527	530.24	389.46		1,569	545.49	385.22
08-14	惡性腫瘤	1	322	107.80	123.59	1	476	164.67	131.52	1	456	158.15	122.44	1	489	169.80	126.48	1	533	185.31	133.51
25-27-28*	心臟疾病	3	129	43.19	53.54	2	161	55.70	43.66	2	171	59.31	44.17	2	171	59.38	41.99	2	162	56.32	37.83
29	腦血管疾病	2	163	54.57	66.78	3	150	51.89	40.14	3	135	46.82	34.83	3	107	37.16	25.87	3	137	47.63	31.29
181	糖尿病	5	65	21.76	27.61	4	107	37.02	28.91	4	105	36.42	26.71	4	105	36.46	25.84	4	107	37.20	25.08
321	肺炎	7	40	13.39	18.36	7	42	14.53	11.00	5	77	26.70	19.19	5	71	24.65	17.35	5	76	26.42	16.12
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	37	12.39	15.15	6	44	15.22	11.71	6	61	21.16	15.58	6	53	18.40	12.71	6	60	20.86	13.84
E47-E53	事故傷害	4	85	28.46	29.23	5	63	21.79	19.64	8	43	14.91	13.56	7	45	15.63	14.32	7	43	14.95	12.86
E54	自殺	9	26	8.70	9.29	8	30	10.38	9.03	7	49	16.99	14.16	8	43	14.93	11.86	8	38	13.21	11.18
347	慢性肝病及肝硬化	6	41	13.73	15.18	9	24	8.30	6.69	9	36	12.49	9.64	9	30	10.42	8.23	9	31	10.78	8.03
038	敗血症	13	8	2.68	3.16	10	13	4.50	3.51	10	19	6.59	4.92	11	18	6.25	4.20	10	19	6.61	4.00
	其他		276	92.40	118.73		352	121.77	104.12		436	151.21	119.15		395	137.16	100.60		363	126.20	91.48

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50	389.90		1,620	568.50	365.70		1,595	561.23	346.64		1,710	598.31	362.26		1,708	593.09	347.26
C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76	113.15	1	482	169.15	110.67	1	483	169.95	109.04	1	546	191.04	118.60	1	498	172.93	105.87
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	231	80.61	51.65	2	216	75.80	48.77	2	186	65.45	39.89	2	190	66.48	37.56	2	227	78.82	43.55
I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02	28.91	3	115	40.36	24.69	3	116	40.82	23.32	4	106	37.09	21.44	3	110	38.20	20.21
J12-J18	肺炎	4	97	33.85	20.06	5	93	32.64	18.37	4	91	32.02	16.78	3	113	39.54	21.12	5	96	33.34	16.86
E10-E14	糖尿病	5	75	26.17	17.02	4	97	34.04	21.28	4	91	32.02	19.02	5	83	29.04	16.93	4	102	35.42	19.33
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	46	16.05	9.28	6	56	19.65	11.29	7	50	17.59	10.05	6	63	22.04	10.82	6	60	20.83	10.04
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	53	18.50	11.53	7	53	18.60	11.07	6	53	18.65	10.79	8	51	17.84	10.25	7	58	20.14	10.77
I10-I15	高血壓性疾病	12	31	10.82	6.70	12	31	10.88	6.20	9	40	14.07	8.07	9	46	16.09	8.45	7	58	20.14	10.27
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	49	17.10	15.45	9	38	13.34	10.51	13	28	9.85	8.09	10	43	15.05	12.14	9	48	16.67	12.83
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	18	9	3.14	1.73	14	11	3.86	2.06	14	12	4.22	2.13	14	15	5.25	2.52	15	13	4.51	1.90
	其他		457	159.48	114.42		428	150.20	100.79		445	156.58	99.46		454	158.85	102.43		438	152.09	95.63

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,809	625.26	351.82		1,805	622.20	335.93		1,800	619.46	320.83			
C00-C97	惡性腫瘤	1	600	207.38	122.24	1	537	185.11	106.70	1	509	175.17	98.15			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	208	71.89	38.91	2	252	86.87	44.38	2	250	86.04	43.50			
I60-I69	腦血管疾病	3	147	50.81	26.94	3	124	42.74	21.62	3	114	39.23	17.91			
J12-J18	肺炎	5	90	31.11	14.00	4	104	35.85	15.74	4	109	37.51	16.20			
E10-E14	糖尿病	4	106	36.64	20.04	5	91	31.37	16.27	5	106	36.48	17.28			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	58	20.05	9.68	6	76	26.20	11.36	6	85	29.25	12.53			
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	62	21.43	10.53	8	53	18.27	8.99	7	73	25.12	12.06			
I10-I15	高血壓性疾病	8	50	17.28	7.93	10	44	15.17	7.04	8	46	15.83	7.28			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	46	15.90	12.37	7	59	20.34	13.42	9	42	14.45	10.14			
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	16	14	4.84	2.12	15	20	6.89	2.86	10	39	13.42	4.97			
	其他		428	147.93	87.06		445	153.40	87.55		427	146.95	80.81			

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,078	443.77	525.00		1,317	528.90	428.42		1,400	563.46	441.02		1,395	560.68	423.62		1,433	573.60	424.32
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.03	129.94	1	375	150.60	123.14	1	399	160.59	127.39	1	401	161.17	121.33	1	463	185.33	138.24
25-27-28*	心臟疾病	3	100	41.17	50.55	2	163	65.46	50.99	2	168	67.62	51.55	2	175	70.34	52.55	2	158	63.24	45.28
29	腦血管疾病	2	119	48.99	58.76	3	127	51.00	39.93	3	137	55.14	40.95	3	132	53.05	38.66	3	138	55.24	37.42
181	糖尿病	5	51	20.99	24.62	4	83	33.33	27.29	4	108	43.47	32.61	4	95	38.18	26.50	4	91	36.43	26.67
321	肺炎	7	36	14.82	18.81	6	48	19.28	15.08	7	47	18.92	13.31	5	68	27.33	18.90	5	72	28.82	18.74
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.82	17.49	7	46	18.47	14.65	5	63	25.36	18.55	6	54	21.70	16.30	6	48	19.21	13.04
347	慢性肝病及肝硬化	6	46	18.94	20.87	8	32	12.85	9.94	9	29	11.67	9.24	9	32	12.86	10.28	7	45	18.01	13.82
E47-E53	事故傷害	4	84	34.58	35.77	5	54	21.69	20.71	8	45	18.11	15.40	8	37	14.87	13.44	8	40	16.01	12.86
E54	自殺	10	18	7.41	7.68	8	32	12.85	10.80	6	55	22.14	18.94	7	42	16.88	13.32	9	29	11.61	10.02
038	敗血症	14	12	4.94	6.09	12	9	3.61	2.97	10	15	6.04	4.56	10	18	7.23	4.51	10	18	7.21	4.62
	其他		299	123.09	154.42		348	139.75	112.92		334	134.43	108.52		341	137.05	107.83		331	132.49	103.61

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13	426.24		1,439	578.14	390.92		1,434	576.77	368.89		1,522	606.98	384.65		1,512	597.06	367.35
C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70	131.99	1	432	173.56	118.85	1	424	170.54	114.79	1	444	177.07	116.33	1	482	190.33	120.29
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	194	77.64	51.94	2	169	67.90	42.82	2	181	72.80	43.99	2	200	79.76	47.65	2	210	82.92	50.01
I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83	34.85	3	110	44.19	28.96	3	89	35.80	21.68	3	122	48.65	28.81	3	95	37.51	20.93
J12-J18	肺炎	4	92	36.82	22.98	4	100	40.18	24.19	4	87	34.99	19.28	4	91	36.29	18.91	5	59	23.30	11.23
E10-E14	糖尿病	5	66	26.41	17.15	5	78	31.34	21.46	5	86	34.59	21.84	5	68	27.12	16.38	4	93	36.72	22.15
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	51	20.41	12.66	6	58	23.30	13.44	6	44	17.70	10.03	6	62	24.73	13.48	6	56	22.11	11.29
I10-I15	高血壓性疾病	10	38	15.21	10.01	12	30	12.05	7.83	9	36	14.48	8.33	11	34	13.56	7.05	8	43	16.98	9.10
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	36	14.41	11.60	10	39	15.67	13.96	10	35	14.08	10.87	7	48	19.14	14.99	8	43	16.98	12.80
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	43	17.21	14.33	7	44	17.68	14.04	8	38	15.28	12.13	10	40	15.95	12.79	11	28	11.06	9.28
A40-A41	敗血症	8	45	18.01	11.54	8	42	16.87	10.45	13	31	12.47	7.70	8	44	17.55	9.74	10	32	12.64	6.74
	其他		376	150.48	107.19		337	135.40	94.92		383	154.05	98.25		369	147.16	98.52		371	146.50	93.53

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年						
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化率
A00-Y98	所有死亡原因		1,521	596.90	352.92		1,578	615.25	355.76		1,631	632.93	354.18			
C00-C97	惡性腫瘤	1	463	181.70	113.59	1	460	179.35	110.46	1	487	188.99	111.14			
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	206	80.84	45.47	2	216	84.22	45.56	2	222	86.15	44.42			
I60-I69	腦血管疾病	3	109	42.78	22.80	3	106	41.33	22.59	3	109	42.30	22.12			
J12-J18	肺炎	5	79	31.00	16.15	4	104	40.55	18.88	4	103	39.97	18.40			
E10-E14	糖尿病	4	89	34.93	19.01	5	96	37.43	20.21	5	87	33.76	18.67			
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	62	24.33	12.49	6	68	26.51	13.19	6	62	24.06	10.15			
I10-I15	高血壓性疾病	7	51	20.01	10.36	8	51	19.88	9.95	7	43	16.69	8.20			
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	37	14.52	10.81	9	47	18.32	13.69	8	40	15.52	11.37			
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	26	10.20	7.72	11	37	14.43	11.22	9	39	15.13	10.61			
A40-A41	敗血症	10	40	15.70	7.95	10	44	17.16	8.93	10	38	14.75	7.29			
	其他		359	140.88	86.57		349	136.07	81.08		401	155.61	91.80			

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		224	105.52		304	147.73		313	151.18		345	165.26		332	157.94
162	肺癌	1	38	17.90	1	76	36.93	1	66	31.88	1	61	29.22	1	86	40.91
155	肝癌	2	34	16.02	4	37	17.98	2	51	24.63	2	50	23.95	2	44	20.93
153 154	結腸直腸癌	2	34	16.02	3	40	19.44	3	42	20.29	3	43	20.60	3	40	19.03
174	女性乳癌(1)	4	9	8.30	2	21	19.65	4	17	15.77	4	20	18.34	4	18	16.34
185	攝護腺癌(2)	11	3	2.89	7	8	8.09	5	10	10.08	6	14	14.04	5	11	11.00
179 180	子宮頸癌(1)	7	6	5.53	22	1	0.94	15	3	2.78	14	4	3.67	6	12	10.89
151	胃癌	5	16	7.54	5	19	9.23	7	15	7.25	5	34	16.29	7	21	9.99
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	7	3.30	5	19	9.23	6	15	7.25	8	17	8.14	8	20	9.51
157	胰臟癌	9	8	3.77	9	10	4.86	8	12	5.80	8	17	8.14	9	16	7.61
204-208	白血病	14	5	2.36	13	6	2.92	18	2	0.97	12	9	4.31	10	12	5.71
	其他		64	30.15		67	32.56		80	38.64		76	36.41		52	24.74

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		306	145.34		331	158.34		352	169.06		386	184.52		369	175.36		389	184.69
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92	1	81	38.75	1	77	36.98	1	81	38.72	1	82	38.97	1	65	30.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10	2	54	25.83	3	46	22.09	3	54	25.81	2	49	23.29	2	52	24.69
C50	女性乳房癌(1)	4	16	14.47	4	15	13.66	2	25	22.85	4	22	19.99	4	25	22.57	3	26	23.44
C22	肝和肝內膽管癌	2	44	20.90	3	51	24.40	4	35	16.81	2	57	27.25	3	48	22.81	4	47	22.31
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	14.00	6	7	7.06	10	7	7.09	5	14	14.12	5	16	16.06	6	15	15.05
C25	胰臟癌	7	20	9.50	7	12	5.74	12	11	5.28	7	17	8.13	6	18	8.55	7	19	9.02
C16	胃癌	6	22	10.45	5	18	8.61	5	21	10.09	6	26	12.43	6	18	8.55	5	35	16.62
C00-C06, C09-C10, C56, C57.0- C57.4	口腔癌	12	8	3.80	14	5	2.39	13	10	4.80	11	9	4.30	13	8	3.80	11	11	5.22
	卵巢癌(1)	13	4	3.62	8	6	5.46	6	11	10.05	14	4	3.63	17	2	1.81	8	9	8.11
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	12	5.70	13	7	3.35	8	15	7.20	8	13	6.21	9	10	4.75	10	14	6.65
	其他		67	31.82		75	35.88		94	45.15		89	42.54		93	44.20		96	45.58

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年					104年				
		順位	死亡 人數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 人 死 亡	十 萬 口 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因		380		180.60		386		183.73		
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	73		34.69	1	82		39.03		
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	57		27.09	2	52		24.75		
C50	女性乳房癌(1)	4	27		24.34	3	26		23.43		
C22	肝和肝內膽管癌	3	52		24.71	4	46		21.90		
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	19		19.10	5	21		21.18		
C25	胰臟癌	7	18		8.55	6	24		11.42		
C16	胃癌	6	23		10.93	7	21		10.00		
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	12	8		3.80	8	17		8.09		
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	8	9		8.11	9	6		5.41		
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	14	7		3.33	10	11		5.24		
	其他		87		41.35		80		38.08		

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		303	123.50		373	159.71		430	185.63		401	173.50		427	185.51
162	肺癌	1	65	26.49	1	71	30.40	1	81	34.97	1	84	36.34	1	103	44.75
155	肝癌	2	56	22.82	2	66	28.26	2	63	27.20	2	55	23.80	2	54	23.46
153 154	結腸直腸癌	3	30	12.23	3	41	17.56	5	51	22.02	3	50	21.63	3	48	20.85
174	女性乳癌(1)	6	8	6.62	7	9	7.62	3	28	23.80	4	21	17.81	4	24	20.35
185	攝護腺癌(2)	15	3	2.41	5	12	10.40	6	12	10.53	6	11	9.71	5	17	15.14
151	胃癌	4	25	10.19	4	29	12.42	4	52	22.45	5	38	16.44	6	30	13.03
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	10	4.08	6	19	8.14	7	24	10.36	10	14	6.06	7	21	9.12
156	膽囊癌	9	9	3.67	12	10	4.28	15	7	3.02	9	15	6.49	8	18	7.82
157	胰臟癌	7	10	4.08	9	15	6.42	8	17	7.34	7	18	7.79	9	16	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	8	3.26	10	12	5.14	9	14	6.04	7	18	7.79	10	12	5.21
	其他		79	32.20		89	38.11		81	34.97		77	33.31		84	36.49

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		397	173.88		437	192.88		424	188.25		441	195.29		455	200.32		447	195.95
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60	1	87	38.40	1	84	37.30	1	85	37.64	1	108	47.55	1	87	38.14
C50	女性乳房癌(1)	4	23	19.59	4	25	21.39	4	22	18.87	2	38	32.44	5	23	19.50	3	29	24.46
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15	3	54	23.83	2	61	27.08	3	61	27.01	2	58	25.54	2	60	26.30
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02	2	67	29.57	3	43	19.09	4	54	23.91	3	55	24.21	4	43	18.85
C16	胃癌	5	27	11.83	5	40	17.65	7	23	10.21	7	26	11.51	6	29	12.77	6	34	14.90
C25	胰臟癌	7	22	9.64	7	26	11.48	5	30	13.32	5	28	12.40	8	18	7.92	10	17	7.45
C67	膀胱癌	19	4	1.75	18	4	1.77	13	10	4.44	17	6	2.66	16	6	2.64	12	15	6.58
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	10	8.52	17	3	2.57	8	7	6.01	8	10	8.54	15	4	3.39	9	10	8.43
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	9.92	6	16	14.59	6	12	11.04	9	9	8.28	4	24	21.98	5	17	15.52
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	15	4	3.41	10	5	4.28	16	4	3.43	6	14	11.95	7	14	11.87	7	11	9.28
	其他		107	46.86		110	48.55		128	56.83		110	48.71		116	51.07		124	54.36

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年					104年				
		順位	死亡 人數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 人 死 亡	十 萬 口 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因		433		189.02		436		190.03		
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	82		35.80	1	82		35.74		
C50	女性乳房癌(1)	4	25		20.98	2	32		26.79		
C22	肝和肝內膽管癌	3	54		23.57	3	56		24.41		
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	57		24.88	4	50		21.79		
C16	胃癌	5	32		13.97	5	26		11.33		
C25	胰臟癌	8	20		8.73	6	22		9.59		
C67	膀胱癌	16	6		2.62	7	18		7.85		
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	7		5.87	8	9		7.54		
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	10		9.10	9	8		7.27		
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	13	6		5.04	10	8		6.70		
	其他		134		58.50		125		54.48		

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		410	122.97		527	168.49		501	160.39		495	158.06		473	150.37
162	肺癌	1	85	25.49	1	113	36.13	1	105	33.62	1	110	35.12	1	96	30.52
153 154	結腸直腸癌	4	45	13.50	2	77	24.62	3	64	20.49	3	58	18.52	2	66	20.98
155	肝癌	2	72	21.59	3	69	22.06	2	73	23.37	2	84	26.82	3	64	20.35
174	女性乳癌(1)	3	24	14.17	4	26	15.96	4	30	18.39	6	19	11.59	4	20	12.11
151	胃癌	5	34	10.20	6	39	12.47	5	46	14.73	4	42	13.41	5	37	11.76
185	攝護腺癌(2)	7	10	6.09	5	22	14.67	6	18	12.06	5	19	12.74	6	16	10.71
183	卵巢癌(1)	8	8	4.72	7	11	6.75	12	7	4.29	7	12	7.32	7	14	8.48
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	13	3.90	13	13	4.16	9	17	5.44	8	20	6.39	8	26	8.27
179 180	子宮頸癌(1)	6	11	6.50	8	10	6.14	8	9	5.52	10	8	4.88	9	12	7.27
156	膽囊癌	20	3	0.90	11	15	4.80	10	15	4.80	11	12	3.83	10	22	6.99
	其他		105	31.49		132	42.20		117	37.46		111	35.44		100	31.79

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		501	159.36		549	175.55		572	183.58		544	173.97		580	184.93		582	185.71
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40	1	116	37.09	1	119	38.19	1	107	34.22	1	116	36.99	1	124	39.57
C50	女性乳房癌(1)	4	24	14.50	4	35	21.20	3	36	21.84	3	37	22.34	5	31	18.64	4	36	21.64
C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63	3	70	22.38	5	58	18.61	4	68	21.75	2	83	26.46	3	69	22.02
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86	2	71	22.70	2	70	22.47	2	83	26.54	4	65	20.72	2	91	29.04
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45	9	18	5.76	8	32	10.27	9	18	5.76	8	19	6.06	10	17	5.42
C25	胰臟癌	7	23	7.32	6	36	11.51	6	40	12.84	6	23	7.36	7	37	11.80	7	33	10.53
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	18	12.10	5	19	12.87	4	28	19.08	5	23	15.64	3	31	21.04	6	16	10.88
C16	胃癌	6	30	9.54	7	35	11.19	6	40	12.84	7	22	7.04	6	46	14.67	5	41	13.08
C91-C95	白血病	13	10	3.18	10	15	4.80	9	16	5.13	8	20	6.40	13	11	3.51	11	14	4.47
C54	子宮體癌(1)	15	5	3.02	20	3	1.82	16	5	3.03	21	2	1.21	25	1	0.60	16	4	2.40
	其他		129	41.03		131	41.89		128	41.08		141	45.09		140	44.64		137	43.71

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			103年		
		順位	死亡 人數	每 十 萬 人 死 亡 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 人 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		593	189.14		565	180.29
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	122	38.91	1	126	40.21
C50	女性乳房癌(1)	3	41	24.61	2	40	24.00
C22	肝和肝內膽管癌	4	76	24.24	3	74	23.61
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	78	24.88	4	68	21.70
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	26	8.29	5	31	9.89
C25	胰臟癌	5	44	14.03	5	31	9.89
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	17	11.57	7	14	9.54
C16	胃癌	7	31	9.89	8	25	7.98
C91-C95	白血病	10	14	4.47	9	17	5.42
C54	子宮體癌(1)	17	4	2.40	10	9	5.40
	其他		140	44.65		130	41.48

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		289	128.97		370	170.56		374	172.44		351	160.83		384	175.32
162	肺癌	1	50	22.31	1	70	32.27	1	80	36.89	1	62	28.41	1	84	38.35
155	肝癌	2	42	18.74	2	64	29.50	3	46	21.21	2	61	27.95	2	64	29.22
153 154	結腸直腸癌	4	37	16.51	4	45	20.74	2	56	25.82	3	43	19.70	3	41	18.72
151	胃癌	5	26	11.60	5	24	11.06	5	29	13.37	5	26	11.91	4	37	16.89
174	女性乳癌(1)	6	11	9.68	3	29	25.77	4	21	18.63	4	19	16.70	5	14	12.21
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	10	4.46	13	7	3.23	7	19	8.76	6	21	9.62	6	20	9.13
157	胰臟癌	11	9	4.02	6	19	8.76	9	14	6.45	7	16	7.33	7	18	8.22
150	食道癌	12	6	2.68	10	12	5.53	10	12	5.53	10	13	5.96	8	15	6.85
156	膽囊癌	12	6	2.68	10	12	5.53	12	7	3.23	12	10	4.58	9	14	6.39
185	攝護腺癌(2)	8	6	5.43	8	7	6.71	6	11	10.56	9	7	6.70	10	5	4.79
	其他		86	38.38		81	37.34		79	36.42		73	33.45		72	32.87

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		382	174.70		417	190.81		402	183.41		418	188.19		430	190.79		412	180.94
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47	1	85	38.89	1	85	38.78	1	84	37.82	1	85	37.71	1	91	39.96
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78	4	42	19.22	3	54	24.64	3	52	23.41	2	58	25.73	3	54	23.71
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35	2	62	28.37	2	63	28.74	2	68	30.61	3	54	23.96	2	59	25.91
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	8	7.71	7	11	10.65	5	17	16.45	5	13	12.45	5	16	15.14	5	13	12.20
C50	女性乳房癌(1)	5	14	12.19	3	25	21.70	4	26	22.44	4	23	19.54	4	22	18.38	4	18	14.86
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	12	5.49	9	14	6.41	12	11	5.02	8	21	9.45	8	16	7.10	7	21	9.22
C16	胃癌	4	33	15.09	6	26	11.90	6	20	9.12	7	24	10.81	7	21	9.32	6	26	11.42
C25	胰臟癌	8	14	6.40	5	30	13.73	7	14	6.39	6	25	11.26	6	22	9.76	8	19	8.34
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	11	5.03	11	11	5.03	10	12	5.47	10	12	5.40	9	15	6.66	9	15	6.59
C91-C95	白血病	6	17	7.77	12	9	4.12	10	12	5.47	13	6	2.70	9	15	6.66	11	9	3.95
	其他		88	40.24		102	46.67		88	40.15		90	40.52		106	47.03		87	38.21

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		427	185.96		424	183.61
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	78	33.97	1	84	36.38
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	60	26.13	2	69	29.88
C22	肝和肝內膽管癌	2	65	28.31	3	56	24.25
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	13.04	4	18	16.69
C50	女性乳房癌(1)	4	23	18.81	5	17	13.81
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	16	6.97	6	19	8.23
C16	胃癌	6	22	9.58	6	19	8.23
C25	胰臟癌	7	21	9.15	8	17	7.36
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	14	6.10	9	16	6.93
C91-C95	白血病	18	5	2.18	10	14	6.06
	其他		109	47.47		95	41.14

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		244	141.22		245	154.05		282	178.58		267	169.02		258	162.22
162	肺癌	1	48	27.78	1	53	33.32	1	53	33.56	1	57	36.08	1	64	40.24
153 154	結腸直腸癌	4	30	17.36	2	41	25.78	4	32	20.26	3	31	19.62	2	39	24.52
155	肝癌	2	41	23.73	3	34	21.38	3	34	21.53	2	41	25.95	3	32	20.12
179 180	子宮頸癌(1)	5	7	8.17	9	5	6.17	18	2	2.48	8	6	7.41	4	9	11.01
151	胃癌	3	34	19.68	4	21	13.20	5	25	15.83	5	20	12.66	5	12	7.55
200202203	非何杰金淋巴瘤	17	3	1.74	8	10	6.29	6	20	12.67	7	13	8.23	6	11	6.92
150	食道癌	11	6	3.47	12	6	3.77	10	9	5.70	12	6	3.80	6	11	6.92
157	胰臟癌	9	8	4.63	7	12	7.55	7	11	6.97	9	9	5.70	8	10	6.29
174	女性乳癌(1)	6	6	7.00	6	9	11.11	2	19	23.55	4	14	17.28	9	5	6.12
204-208	白血病	12	5	2.89	14	5	3.14	13	8	5.07	11	7	4.43	10	9	5.66
	其他		56	32.41		49	30.81		69	43.70		63	39.88		56	35.21

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		303	190.07		276	173.54		278	174.68		263	163.87		305	188.50		248	152.48
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64	1	57	35.84	1	64	40.22	1	56	34.89	1	62	38.32	1	51	31.36
C50	女性乳房癌(1)	4	16	19.48	4	15	18.27	4	14	17.01	4	15	18.04	5	11	13.10	3	19	22.46
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48	2	33	20.75	3	37	23.25	2	38	23.68	2	51	31.52	2	42	25.82
C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70	3	31	19.49	2	41	25.76	3	32	19.94	3	45	27.81	4	30	18.44
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	11.65	9	5	6.50	7	5	6.51	5	9	11.63	4	13	16.70	6	7	8.97
C25	胰臟癌	9	9	5.65	7	13	8.17	6	16	10.05	6	16	9.97	7	13	8.03	7	14	8.61
C16	胃癌	5	29	18.19	5	25	15.72	5	19	11.94	7	11	6.85	6	18	11.12	5	15	9.22
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	7	6	7.30	8	6	7.31	12	3	3.65	13	3	3.61	12	3	3.57	16	2	2.36
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	8	5.02	14	5	3.14	8	9	5.66	11	6	3.74	9	10	6.18	8	10	6.15
C15	食道癌	10	8	5.02	6	16	10.06	11	7	4.40	11	6	3.74	14	5	3.09	12	5	3.07
	其他		78	48.93		70	44.01		63	39.59		71	44.24		74	45.73		53	32.59

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年					104年				
		順位	死亡 人數	每 人 死 亡	十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 人 死 亡	十 萬 口 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因		291		178.24		317		194.56		
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	45		27.56	1	59		36.21		
C50	女性乳房癌(1)	4	14		16.45	2	22		25.87		
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	42		25.73	3	42		25.78		
C22	肝和肝內膽管癌	2	43		26.34	4	40		24.55		
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11		14.07	5	11		14.12		
C25	胰臟癌	5	24		14.70	6	21		12.89		
C16	胃癌	7	21		12.86	7	19		11.66		
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	8	8		9.40	8	8		9.41		
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	10		6.13	9	8		4.91		
C15	食道癌	9	10		6.13	9	8		4.91		
	其他		63		38.59		79		48.49		

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		230	168.33		205	158.94		228	178.60		273	215.19		259	204.70
162	肺癌	1	45	32.93	1	40	31.01	1	41	32.12	2	51	40.20	1	54	42.68
155	肝癌	2	39	28.54	1	40	31.01	3	34	26.63	1	57	44.93	2	40	31.61
153 154	結腸直腸癌	4	22	16.10	3	26	20.16	4	29	22.72	3	30	23.65	3	35	27.66
174	女性乳癌(1)	5	10	14.75	5	7	10.87	2	18	28.19	4	13	20.44	4	14	22.02
185	攝護腺癌(2)	12	3	4.36	13	3	4.64	10	4	6.27	7	6	9.48	5	10	15.89
179 180	子宮頸癌(1)	11	3	4.43	9	3	4.66	11	3	4.70	10	5	7.86	6	8	12.58
151	胃癌	3	30	21.96	4	15	11.63	5	14	10.97	8	12	9.46	7	14	11.06
157	胰臟癌	6	9	6.59	7	8	6.20	13	5	3.92	6	13	10.25	8	12	9.48
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	9	6.59	7	8	6.20	7	11	8.62	11	9	7.09	9	9	7.11
150	食道癌	9	8	5.86	14	3	2.33	6	14	10.97	9	11	8.67	10	8	6.32
	其他		52	38.06		52	40.32		55	43.08		66	52.02		55	43.47

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		267	212.93		255	205.60		255	205.65		244	194.24		288	225.49		282	218.07
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91	3	29	23.38	3	35	28.23	3	26	20.70	2	48	37.58	3	33	25.52
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66	1	56	45.15	1	56	45.16	1	60	47.76	1	56	43.84	1	59	45.63
C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47	2	36	29.03	2	47	37.90	2	36	28.66	3	39	30.53	2	53	40.99
C50	女性乳房癌(1)	4	16	25.32	4	11	17.55	4	9	14.33	4	12	18.81	4	11	16.93	4	9	13.65
C16	胃癌	5	14	11.17	5	21	16.93	6	14	11.29	5	16	12.74	5	16	12.53	5	14	10.83
C25	胰臟癌	15	5	3.99	8	12	9.68	9	7	5.65	7	10	7.96	6	14	10.96	5	14	10.83
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	3	4.82	6	8	13.04	7	5	8.17	9	4	6.47	8	6	9.56	12	3	4.73
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	9	4	6.33	14	2	3.19	8	4	6.37	10	4	6.27	10	4	6.16	14	3	4.55
C15	食道癌	6	9	7.18	11	7	5.64	5	15	12.10	12	5	3.98	9	10	7.83	8	9	6.96
C91-C95	白血病	6	9	7.18	12	6	4.84	9	7	5.65	16	3	2.39	14	5	3.91	16	5	3.87
	其他		64	51.04		67	54.02		56	45.16		68	54.13		79	61.85		80	61.86

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年					104年				
		順位	死亡 人數	每 十 萬 人 死 亡	十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 人 死 亡	十 萬 口 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因		236		180.99		300		229.09		
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	37		28.37	1	51		38.95		
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	57		43.71	2	48		36.65		
C22	肝和肝內膽管癌	3	36		27.61	3	45		34.36		
C50	女性乳房癌(1)	4	11		16.51	4	12		17.92		
C16	胃癌	5	15		11.50	5	22		16.80		
C25	胰臟癌	8	6		4.60	6	19		14.51		
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	6		9.41	7	8		12.50		
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	15	2		3.00	8	8		11.95		
C15	食道癌	13	5		3.83	9	11		8.40		
C91-C95	白血病	8	6		4.60	10	10		7.64		
	其他		55		42.18		66		50.40		

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		270	125.11		414	208.19		431	219.79		427	219.19		458	236.48
155	肝癌	1	50	23.17	2	71	35.70	2	55	28.05	2	72	36.96	1	94	48.54
162	肺癌	2	48	22.24	1	75	37.72	1	88	44.88	1	84	43.12	2	84	43.37
153 154	結腸直腸癌	4	26	12.05	3	47	23.64	3	42	21.42	3	67	34.39	3	55	28.40
174	女性乳癌(1)	6	8	7.60	5	15	15.35	4	19	19.68	5	15	15.60	4	18	18.77
151	胃癌	3	42	19.46	4	36	18.10	5	37	18.87	4	32	16.43	5	35	18.07
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	9	4.17	12	13	6.54	13	10	5.10	11	10	5.13	6	24	12.39
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.52	8	10	9.89	7	12	12.05	6	14	14.19	7	9	9.21
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	12	5.56	7	20	10.06	6	27	13.77	8	22	11.29	8	16	8.26
150	食道癌	16	4	1.85	10	14	7.04	11	18	9.18	15	6	3.08	9	16	8.26
156	膽囊癌	10	6	2.78	15	7	3.52	9	22	11.22	17	5	2.57	10	15	7.74
	其他		60	27.80		106	53.30		101	51.51		100	51.33		92	47.50

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		394	205.83		419	221.23		446	236.27		426	224.24		448	233.65		464	240.35
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54	1	79	41.71	1	86	45.56	1	91	47.90	1	90	46.94	1	101	52.32
C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70	1	79	41.71	2	77	40.79	2	61	32.11	3	60	31.29	2	82	42.48
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08	3	57	30.10	3	50	26.49	3	52	27.37	2	64	33.38	3	59	30.56
C50	女性乳房癌(1)	7	9	9.47	6	15	15.90	4	24	25.41	4	24	25.15	5	14	14.50	4	23	23.63
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	10.37	5	16	16.83	13	4	4.24	6	16	16.92	8	10	10.50	7	13	13.58
C16	胃癌	4	25	13.06	4	35	18.48	5	38	20.13	5	34	17.90	4	33	17.21	5	27	13.99
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75	7	20	10.56	7	23	12.18	7	17	8.95	6	23	12.00	5	27	13.99
C15	食道癌	16	6	3.13	8	17	8.98	14	8	4.24	11	10	5.26	9	16	8.34	10	15	7.77
C25	胰臟癌	5	20	10.45	8	17	8.98	8	21	11.12	7	17	8.95	7	22	11.47	8	17	8.81
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	9	4.70	14	7	3.70	10	11	5.83	9	14	7.37	11	13	6.78	11	10	5.18
	其他		89	46.50		77	40.65		104	55.09		90	47.37		103	53.72		90	46.62

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		458	235.96		459	235.96
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	100	51.52	1	91	46.78
C22	肝和肝內膽管癌	2	65	33.49	2	65	33.41
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	60	30.91	2	65	33.41
C50	女性乳房癌(1)	4	25	25.49	4	29	29.45
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	16	16.66	5	15	15.62
C16	胃癌	6	29	14.94	6	26	13.37
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	7	28	14.43	7	21	10.80
C15	食道癌	9	15	7.73	8	19	9.77
C25	胰臟癌	8	20	10.30	9	17	8.74
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	14	7.21	10	14	7.20
	其他		86	44.31		97	49.86

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		274	121.59		406	157.81		384	148.55		411	157.96		411	157.15
162	肺癌	1	53	23.52	1	90	34.98	1	84	32.50	1	88	33.82	1	85	32.50
155	肝癌	2	51	22.63	2	63	24.49	3	43	16.63	3	45	17.30	2	53	20.26
153 154	結腸直腸癌	5	28	12.42	4	45	17.49	2	44	17.02	2	53	20.37	3	43	16.44
174	女性乳癌(1)	3	16	14.36	3	25	19.18	4	19	14.47	4	21	15.83	4	19	14.20
151	胃癌	4	29	12.87	6	24	9.33	5	36	13.93	5	34	13.07	5	33	12.62
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.39	5	12	9.45	6	14	11.01	6	16	12.55	6	13	10.18
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	8.08	9	8	6.14	10	7	5.33	12	6	4.52	7	11	8.22
157	胰臟癌	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	7	24	9.22	8	16	6.12
183	卵巢癌(1)	9	4	3.59	15	4	3.07	16	3	2.28	8	9	6.78	9	8	5.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	9	16	6.15	10	15	5.74
	其他		65	28.84		211	82.01		202	78.14		203	78.02		215	82.20

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-8 · 臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		426	162.79		394	150.79		417	159.41		449	169.83		486	181.43		403	149.08
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83	1	82	31.38	1	95	36.32	1	104	39.34	1	96	35.84	1	69	25.52
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34	3	47	17.99	2	58	22.17	2	68	25.72	3	57	21.28	3	53	19.61
C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46	2	58	22.20	4	49	18.73	3	56	21.18	2	70	26.13	2	57	21.09
C50	女性乳房癌(1)	3	28	20.87	4	19	14.15	3	27	20.03	4	27	19.79	4	26	18.79	6	17	12.16
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	7.06	5	16	12.60	6	17	13.41	6	11	8.60	6	14	10.81	5	16	12.26
C16	胃癌	5	21	8.02	6	29	11.10	5	43	16.44	5	30	11.35	5	46	17.17	4	35	12.95
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	12	6	4.47	8	7	5.21	10	5	3.71	8	10	7.33	16	4	2.89	11	6	4.29
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	9	7	5.22	13	5	3.72	9	6	4.45	7	11	8.06	10	6	4.34	12	5	3.58
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	11	4.20	14	9	3.44	11	9	3.44	11	11	4.16	9	14	5.23	10	12	4.44
C25	胰臟癌	7	18	6.88	7	16	6.12	8	15	5.73	10	17	6.43	7	23	8.59	7	24	8.88
	其他		115	43.94		106	40.57		93	35.55		104	39.34		130	48.53		109	40.32

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		462	169.46		453	164.94
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	93	34.11	1	85	30.95
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	63	23.11	2	60	21.85
C22	肝和肝內膽管癌	3	69	25.31	3	56	20.39
C50	女性乳房癌(1)	2	41	29.03	4	28	19.66
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	7.61	5	23	17.40
C16	胃癌	5	33	12.10	6	32	11.65
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	20	2	1.42	7	14	9.83
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	15	4	2.83	8	12	8.42
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	17	6.24	9	18	6.55
C25	胰臟癌	7	19	6.97	10	16	5.83
	其他		111	40.71		109	39.69

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		139	123.11		193	170.72		186	164.58		206	182.05		195	171.83
162	肺癌	1	28	24.80	2	36	31.84	2	34	30.08	2	33	29.16	1	41	36.13
155	肝癌	2	23	20.37	1	37	32.73	1	39	34.51	1	38	33.58	2	30	26.43
153 154	結腸直腸癌	5	12	10.63	6	17	15.04	3	22	19.47	3	24	21.21	3	24	21.15
151	胃癌	3	16	14.17	4	19	16.81	6	12	10.62	4	19	16.79	4	15	13.22
174	女性乳癌(1)	4	6	10.80	3	10	17.73	4	9	15.96	5	8	14.14	5	7	12.30
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	6	5.31	15	4	3.54	9	6	5.31	7	8	7.07	6	11	9.69
185	攝護腺癌(2)	14	1	1.74	11	3	5.30	7	4	7.07	7	4	7.07	7	5	8.84
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	10	8.86	8	8	7.08	12	5	4.42	6	10	8.84	8	8	7.05
156	膽囊癌	10	4	3.54	8	8	7.08	9	6	5.31	11	5	4.42	8	8	7.05
179 180	子宮頸癌(1)	6	5	9.00	5	9	15.96	5	7	12.41	17	1	1.77	10	4	7.03
	其他		28	24.80		42	37.15		42	37.16		56	49.49		42	37.01

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-9 · 臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		186	163.60		206	181.64		215	189.28		195	169.45		222	189.24		226	189.72
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66	1	52	45.85	1	51	44.90	1	44	38.24	1	48	40.92	1	43	36.10
C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87	3	22	19.40	2	37	32.57	2	30	26.07	2	36	30.69	2	32	26.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47	2	28	24.69	4	25	22.01	3	23	19.99	4	30	25.57	4	22	18.47
C50	女性乳房癌(1)	2	14	24.46	4	8	13.97	3	15	26.05	4	10	17.09	3	18	30.12	3	13	21.38
C16	胃癌	3	26	22.87	5	13	11.46	6	13	11.45	5	12	10.43	6	11	9.38	6	13	10.91
C25	胰臟癌	7	8	7.04	5	13	11.46	9	7	6.16	6	10	8.69	8	8	6.82	9	9	7.56
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	5	4.40	9	7	6.17	--	-	-	6	10	8.69	8	8	6.82	5	15	12.59
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	5	4.40	10	6	5.29	11	5	4.40	12	4	3.48	12	4	3.41	12	5	4.20
C15	食道癌	7	8	7.04	14	4	3.53	7	9	7.92	13	3	2.61	7	9	7.67	10	7	5.88
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	4	7.09	7	6	10.69	8	4	7.14	9	3	5.30	5	8	13.90	7	6	10.29
	其他		33	29.03		47	41.44		49	43.14		46	39.97		42	35.80		61	51.21

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年					104年				
		順位	死亡 人數	每 十 萬 人 死 亡	十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 人 死 亡	十 萬 口 率		
C00-C97	所有癌症死亡原因		228		189.20		231		189.73		
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	45		37.34	1	45		36.96		
C22	肝和肝內膽管癌	2	36		29.87	2	33		27.10		
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	24		19.92	3	30		24.64		
C50	女性乳房癌(1)	5	10		16.23	4	10		16.05		
C16	胃癌	6	19		15.77	5	19		15.61		
C25	胰臟癌	8	8		6.64	6	14		11.50		
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	7		5.81	7	8		6.57		
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	5		4.15	8	7		5.75		
C15	食道癌	9	7		5.81	8	7		5.75		
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	4	10		16.98	10	3		5.05		
	其他		57		47.30		55		45.17		

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		198	88.79		314	120.54		306	117.01		357	135.62		373	140.72
162	肺癌	2	29	13.00	2	55	21.11	1	56	21.41	1	87	33.05	1	71	26.79
153 154	結腸直腸癌	4	19	8.52	3	41	15.74	3	41	15.68	4	33	12.54	2	52	19.62
155	肝癌	1	42	18.83	1	58	22.27	2	43	16.44	2	53	20.13	3	47	17.73
151	胃癌	3	25	11.21	6	19	7.29	7	24	9.18	4	33	12.54	4	33	12.45
174	女性乳癌(1)	5	8	7.20	4	13	9.80	4	15	11.22	3	19	14.08	5	16	11.74
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.79	5	12	9.39	6	12	9.39	9	7	5.46	6	15	11.65
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.79	9	13	4.99	15	5	1.91	10	10	3.80	7	16	6.04
183	卵巢癌(1)	8	3	2.70	15	4	3.01	10	6	4.49	11	5	3.70	8	8	5.87
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	6	2.69	10	11	4.22	9	12	4.59	8	16	6.08	9	15	5.66
157	胰臟癌	11	5	2.24	8	14	5.37	12	9	3.44	6	19	7.22	9	15	5.66
	其他		55	24.66		74	28.41		83	31.74		75	28.49		85	32.07

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		366	137.51		365	136.57		364	135.33		376	137.75		418	150.45		403	143.20
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55	1	74	27.69	1	77	28.63	1	85	31.14	1	71	25.55	1	89	31.62
C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80	3	59	22.08	3	46	17.10	2	56	20.52	2	63	22.68	2	69	24.52
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28	2	60	22.45	2	48	17.85	3	37	13.56	3	56	20.16	3	55	19.54
C50	女性乳房癌(1)	3	21	15.32	4	16	11.60	4	20	14.37	4	19	13.43	4	23	15.95	4	20	13.67
C16	胃癌	5	25	9.39	5	21	7.86	6	21	7.81	6	21	7.69	8	20	7.20	7	21	7.46
C25	胰臟癌	7	16	6.01	7	17	6.36	9	12	4.46	7	20	7.33	9	18	6.48	10	14	4.97
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	6.97	6	9	6.96	5	11	8.48	5	16	12.17	7	10	7.48	5	15	11.10
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	11	4.13	9	14	5.24	11	10	3.72	11	8	2.93	9	18	6.48	10	14	4.97
C15	食道癌	9	12	4.51	10	10	3.74	7	16	5.95	10	11	4.03	11	16	5.76	13	9	3.20
C54	子宮體癌(1)	--	-	-	20	1	0.72	19	2	1.44	13	4	2.83	15	4	2.77	8	8	5.47
	其他		92	34.57		84	31.43		101	37.55		99	36.27		119	42.83		89	31.62

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		398	139.99		458	159.77
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	88	30.95	1	84	29.30
C22	肝和肝內膽管癌	3	46	16.18	2	63	21.98
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	48	16.88	3	54	18.84
C50	女性乳房癌(1)	4	19	12.84	4	26	17.41
C16	胃癌	5	28	9.85	5	30	10.47
C25	胰臟癌	14	10	3.52	6	26	9.07
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	13	9.54	7	10	7.28
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	17	5.98	8	18	6.28
C15	食道癌	12	11	3.87	8	18	6.28
C54	子宮體癌(1)	20	2	1.35	10	9	6.03
	其他		116	40.80		120	41.86

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		322	107.80		476	164.67		456	158.15		489	169.80		533	185.31
162	肺癌	1	74	24.77	1	120	41.51	1	99	34.33	1	101	35.07	1	113	39.29
155	肝癌	2	62	20.76	2	66	22.83	2	67	23.24	2	83	28.82	2	83	28.86
174	女性乳癌(1)	5	10	6.67	4	26	17.74	6	13	8.87	3	28	19.09	3	29	19.75
153 154	結腸直腸癌	4	28	9.37	3	56	19.37	2	67	23.24	4	54	18.75	4	55	19.12
185	攝護腺癌(2)	7	7	4.70	6	15	10.53	4	18	12.69	6	15	10.62	5	16	11.36
151	胃癌	3	29	9.71	5	32	11.07	5	32	11.10	5	39	13.54	6	29	10.08
183	卵巢癌(1)	9	6	4.00	8	9	6.14	15	4	2.73	8	9	6.14	7	14	9.53
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	9	3.01	12	14	4.84	9	16	5.55	10	16	5.56	8	22	7.65
157	胰臟癌	10	11	3.68	11	15	5.19	7	22	7.63	12	15	5.21	9	21	7.30
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	6	2.01	7	24	8.30	9	16	5.55	7	19	6.60	10	19	6.61
	其他		80	26.78		99	34.25		102	35.38		110	38.20		132	45.89

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		475	165.76		482	169.15		483	169.95		546	191.04		498	172.93		600	207.38
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15	1	114	40.01	1	99	34.83	1	125	43.74	1	107	37.15	1	114	39.40
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38	4	45	15.79	3	59	20.76	3	67	23.44	3	54	18.75	2	73	25.23
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82	2	86	30.18	2	71	24.98	2	74	25.89	2	71	24.65	3	70	24.19
C50	女性乳房癌(1)	4	27	18.43	3	24	16.44	4	20	13.71	4	27	18.36	4	22	14.84	4	30	20.12
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	15	10.71	5	15	10.79	6	11	7.96	12	6	4.32	5	14	10.02	5	19	13.55
C25	胰臟癌	8	18	6.28	7	28	9.83	7	21	7.39	6	31	10.85	7	18	6.25	6	33	11.41
C16	胃癌	5	33	11.52	6	29	10.18	5	32	11.26	5	34	11.90	6	27	9.38	6	33	11.41
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93	8	14	4.91	9	17	5.98	7	20	7.00	12	13	4.51	8	31	10.71
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	11	8	5.46	12	6	4.11	10	7	4.80	18	4	2.72	8	9	6.07	9	12	8.05
C15	食道癌	7	19	6.63	13	10	3.51	8	20	7.04	8	17	5.95	10	15	5.21	10	23	7.95
	其他		102	35.60		111	38.95		126	44.34		141	49.33		148	51.39		162	55.99

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年					104年				
		順位	死 人	亡 數	每 十 萬 人 死 亡	十 萬 口 率	順位	死 人	亡 數	每 十 萬 人 死 亡	十 萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因			537		185.11			509		175.17
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1		125		43.09	1		105		36.14
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2		75		25.85	2		81		27.88
C22	肝和肝內膽管癌	3		66		22.75	3		65		22.37
C50	女性乳房癌(1)	4		31		20.71	4		22		14.66
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7		11		7.83	5		17		12.10
C25	胰臟癌	5		35		12.06	6		34		11.70
C16	胃癌	6		29		10.00	7		30		10.32
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8		21		7.24	8		20		6.88
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	11		7		4.68	9		7		4.66
C15	食道癌	9		16		5.52	10		13		4.47
	其他			121		41.71			115		39.58

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		277	114.03		375	150.60		399	160.59		401	161.17		463	185.33
162	肺癌	2	52	21.41	1	81	32.53	1	78	31.39	1	92	36.98	1	106	42.43
155	肝癌	1	58	23.88	2	72	28.91	2	64	25.76	2	63	25.32	2	61	24.42
153 154	結腸直腸癌	5	18	7.41	3	42	16.87	3	52	20.93	3	46	18.49	3	59	23.62
174	女性乳癌(1)	3	19	15.73	5	13	10.30	5	16	12.67	6	12	9.47	4	19	14.89
151	胃癌	4	22	9.06	4	34	13.65	4	32	12.88	4	34	13.67	5	33	13.21
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.64	6	9	7.33	6	13	10.64	7	8	6.56	6	15	12.28
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	2.47	11	11	4.42	8	16	6.44	8	15	6.03	7	26	10.41
179 180	子宮頸癌(1)	6	8	6.62	7	8	6.34	9	8	6.34	5	13	10.25	8	9	7.05
157	胰臟癌	7	10	4.12	9	13	5.22	11	12	4.83	10	13	5.22	9	17	6.80
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.65	10	12	4.82	7	17	6.84	10	13	5.22	10	16	6.40
	其他		78	32.11		80	32.13		91	36.63		92	36.98		102	40.83

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		464	185.70		432	173.56		424	170.54		444	177.07		482	190.33		463	181.70
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82	1	84	33.75	1	97	39.01	1	92	36.69	1	97	38.30	1	95	37.28
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62	3	57	22.90	2	59	23.73	2	73	29.11	2	70	27.64	2	72	28.26
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81	2	59	23.70	5	45	18.10	4	55	21.93	3	61	24.09	3	54	21.19
C50	女性乳房癌(1)	4	20	15.62	4	28	21.92	3	28	21.90	3	29	22.46	5	17	13.03	4	24	18.27
C25	胰臟癌	8	19	7.60	8	17	6.83	8	17	6.84	6	17	6.78	7	21	8.29	8	18	7.06
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	11.49	5	14	11.56	4	23	19.04	7	8	6.58	6	14	11.40	5	15	12.15
C16	胃癌	6	27	10.81	6	27	10.85	6	23	9.25	5	29	11.57	4	44	17.37	7	21	8.24
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.20	7	20	8.04	9	15	6.03	8	16	6.38	8	16	6.32	6	28	10.99
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	19	7.60	11	13	5.22	10	14	5.63	11	10	3.99	11	12	4.74	10	15	5.89
C15	食道癌	10	13	5.20	8	17	6.83	11	12	4.83	8	16	6.38	13	11	4.34	12	12	4.71
	其他		116	46.43		96	38.57		91	36.60		99	39.48		119	46.99		109	42.78

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年		
		順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		460	179.35		487	188.99
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	84	32.75	1	93	36.09
C22	肝和肝內膽管癌	3	58	22.61	2	68	26.39
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	65	25.34	3	64	24.84
C50	女性乳房癌(1)	4	22	16.62	4	24	18.02
C25	胰臟癌	5	32	12.48	5	32	12.42
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	14	11.28	6	15	12.05
C16	胃癌	6	30	11.70	7	26	10.09
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	8	19	7.41	8	25	9.70
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	13	5.07	9	14	5.43
C15	食道癌	9	18	7.02	10	11	4.27
	其他		105	40.94		115	44.63

伍、歷年主要癌症發生率

表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	247.37	216.08	34.38	28.83	38.69	35.97	34.08	29.37	26.82	22.51	16.02	12.04	12.32	11.68	4.68	4.05
85年	267.36	226.20	40.01	32.15	41.53	37.46	39.09	32.75	26.19	20.98	18.86	13.98	15.19	13.84	4.81	3.78
86年	266.91	220.52	37.80	29.26	44.42	39.08	36.72	30.44	26.25	20.38	21.40	15.83	12.86	11.45	5.70	4.54
87年	287.79	231.95	43.41	33.25	44.57	37.95	39.66	32.28	25.24	19.54	24.55	17.05	16.87	14.86	6.98	5.35
88年	306.62	268.49	43.38	36.36	46.89	42.54	42.84	38.20	24.29	20.45	29.10	23.72	18.40	16.97	6.95	5.66
89年	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90年	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91年	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92年	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93年	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94年	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95年	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26
96年	378.22	269.92	52.91	35.29	50.72	37.87	59.72	41.30	25.13	16.59	43.60	29.51	25.05	19.30	9.16	6.40
97年	419.14	290.36	57.04	37.19	53.42	38.00	70.42	48.07	26.67	16.95	55.16	34.93	28.80	21.56	9.99	6.85
98年	433.34	291.45	62.83	39.86	52.76	36.30	72.20	47.48	26.10	15.81	57.60	36.28	30.62	22.30	10.23	6.38
99年	456.61	303.85	61.07	38.75	54.41	37.43	80.47	53.22	26.61	15.61	58.37	36.42	28.59	20.26	9.82	6.30
100年	451.05	299.70	63.31	39.63	53.90	36.30	79.13	52.15	25.62	15.72	59.08	37.28	31.10	21.88	11.20	7.18
101年	459.72	298.65	61.77	37.67	52.36	34.50	83.56	53.18	24.66	14.53	57.65	35.21	30.89	21.68	10.97	6.89
102年	451.49	289.90	62.33	38.00	51.48	33.25	76.59	48.40	23.49	13.85	57.99	35.00	35.27	24.12	11.32	6.88

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.48	6.53	5.97	6.05	9.14	8.38	9.67	7.64	2.57	2.08	5.89	5.38	2.80	2.48	4.16	3.54
85年	6.34	5.59	5.50	5.29	8.93	8.13	10.46	8.09	1.91	1.53	4.73	4.10	3.36	3.18	3.21	2.99
86年	8.55	7.30	4.47	4.32	9.24	8.22	10.09	8.20	3.31	2.49	5.24	4.64	3.46	3.16	3.39	2.88
87年	7.06	5.71	5.37	5.20	7.29	6.22	12.66	9.50	2.91	2.31	5.98	5.06	2.53	2.46	3.61	2.86
88年	9.39	8.39	5.04	4.86	8.94	8.06	13.52	11.32	2.67	2.19	3.89	3.34	3.67	3.68	4.89	4.26
89年	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90年	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91年	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92年	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93年	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94年	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95年	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69
96年	10.96	7.94	9.78	8.19	10.02	7.85	11.19	7.32	4.07	2.78	6.18	4.67	3.13	2.59	4.07	2.97
97年	12.75	9.08	9.13	7.31	8.81	7.04	13.06	8.79	3.86	2.54	7.55	5.34	3.78	3.51	4.48	3.04
98年	11.19	7.77	9.84	7.76	10.00	7.84	13.41	8.28	3.57	2.21	6.51	4.63	3.25	2.95	4.60	3.33
99年	12.59	8.33	12.83	9.34	9.82	7.59	13.15	8.02	4.75	3.15	9.43	6.48	4.59	3.50	5.54	3.49
100年	10.89	7.25	11.83	9.23	9.25	7.21	14.10	8.70	4.39	2.49	7.99	5.77	2.90	2.25	4.54	2.94
101年	12.37	8.03	11.20	8.01	9.96	7.35	12.91	7.80	4.59	2.75	10.43	7.03	3.73	3.17	3.97	2.60
102年	11.55	7.43	11.40	8.32	8.06	6.00	13.95	8.19	4.34	2.59	9.77	6.54	3.57	2.86	4.42	2.83

表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	213.99	200.47	18.64	18.77	23.72	23.42	42.81	38.25	12.81	12.62	12.58	12.11	3.33	3.20	23.26	21.95
85年	249.83	225.27	19.40	18.26	28.26	27.09	47.28	40.79	15.28	14.93	14.66	13.20	3.67	3.49	26.58	24.20
86年	258.48	227.82	19.80	17.73	27.32	25.15	53.42	44.91	16.65	16.39	14.35	12.57	3.30	3.07	26.94	23.38
87年	282.48	240.29	21.06	18.80	31.62	27.55	55.26	45.34	16.12	14.77	12.39	10.47	3.34	2.97	24.48	20.76
88年	293.65	268.19	20.05	19.10	32.44	30.93	65.92	57.65	18.77	18.27	13.66	12.77	3.53	3.31	22.15	19.72
89年	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90年	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91年	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92年	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93年	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94年	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95年	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21
96年	328.84	236.19	32.11	22.18	48.16	33.66	92.48	66.76	19.53	13.51	14.06	9.49	5.62	3.78	12.06	8.53
97年	351.41	244.08	34.99	23.40	49.63	32.68	96.16	67.67	22.56	15.27	14.20	9.24	6.51	4.29	12.94	8.79
98年	396.37	269.25	43.95	28.41	54.34	35.37	109.65	76.05	21.68	13.79	15.29	9.64	8.54	5.54	14.11	9.59
99年	394.55	262.64	43.06	26.78	55.96	35.31	110.60	75.15	21.90	14.11	13.49	8.15	7.23	4.39	13.12	8.74
100年	408.04	269.40	41.47	25.97	60.89	37.26	113.70	76.63	23.13	14.31	15.06	9.29	9.89	6.18	13.53	9.05
101年	413.08	268.08	46.83	28.44	60.31	36.11	115.93	78.19	21.04	12.94	15.20	8.71	9.08	5.43	12.54	8.44
102年	418.53	266.57	46.69	27.57	58.07	33.93	121.15	80.63	21.27	12.16	13.82	8.11	9.17	5.18	10.88	6.94

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.20	6.62	2.88	3.04	1.89	1.99	4.24	4.19	4.32	4.50	2.88	2.27	2.05	2.09	3.11	3.03
85年	6.95	6.23	4.20	4.25	2.52	2.40	5.50	4.93	2.29	2.30	3.28	2.55	2.14	2.19	2.67	2.53
86年	7.60	6.52	2.53	2.68	2.30	2.04	6.60	5.96	2.46	2.17	3.61	3.02	1.84	1.92	4.22	3.86
87年	9.58	8.15	4.03	3.95	3.27	2.69	8.44	7.49	2.58	2.32	4.03	3.41	2.05	1.83	3.65	3.11
88年	9.54	8.62	3.00	3.06	2.10	2.08	6.76	6.17	2.18	2.16	3.23	2.73	2.25	2.13	5.41	5.18
89年	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90年	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91年	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92年	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93年	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94年	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95年	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67
96年	11.61	8.93	5.03	4.55	3.18	2.09	13.76	10.11	2.44	1.79	2.89	2.15	2.22	2.04	5.40	3.52
97年	12.35	9.00	5.25	4.19	3.85	2.48	16.79	11.52	3.55	2.64	3.40	2.60	2.96	2.61	5.18	3.21
98年	12.62	9.16	7.28	5.54	3.49	2.15	16.26	11.06	3.86	2.61	2.08	1.53	1.71	1.50	5.57	3.38
99年	13.79	9.96	6.19	4.66	4.20	2.58	19.76	13.57	3.83	2.44	3.02	2.13	2.51	2.17	4.65	2.88
100年	14.11	10.06	6.47	5.33	4.00	2.33	18.77	12.58	3.49	2.31	2.69	2.02	3.27	2.62	5.24	3.05
101年	11.89	8.56	7.49	5.79	3.75	2.21	19.81	13.16	3.82	2.48	2.52	1.80	2.52	1.94	4.76	2.73
102年	13.25	9.12	7.80	5.91	3.08	1.65	20.69	13.61	4.15	2.74	2.94	2.04	2.65	2.38	4.08	2.34

陸、附錄

【附錄 1】104 年臺北市十大死因出爐了 癌症續居首位，慢性疾病占了 7 項

104 年臺北市十大死因出爐了，惡性腫瘤仍續居首位，慢性疾病占了 7 項，每 100 人中有 64 人死於慢性疾病，十大死因與 103 年相比僅排名順序異動，自殺則連續 8 年退出十大。十大癌症死因仍以肺癌蟬聯第一，大腸癌續居第 2 名。

104 年臺北市民死亡人數為 1 萬 7,160 人，較 103 年增加 207 人(1.2%)；死亡率為每十萬人口 634.7 人，亦較 103 年增加 5.5 人(0.9%)，死亡者平均年齡為 75.3 歲，較全國 72.0 歲為高。如依 WHO 編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 325.6 人，較 103 年減少 6.9 人(-2.1%)，並較全國標準化死亡率 431.5 人低，在全國 22 縣市中，僅高於連江縣，為死亡率第二低的縣市。

十大主要死因死亡人數占總死亡人數的 7 成 6，慢性疾病占了 7 項(占 64.1%)，惡性腫瘤(占 29.3%)仍居首位，其餘依序為心臟疾病(占 13.9%)；腦血管疾病(占 6.7%)；肺炎(占 6.6%)；糖尿病(占 4.5%)；慢性下呼吸道疾病(占 3.7%)；腎炎、腎病症候群及腎病變(占 3.3%)；高血壓性疾病(占 2.7%)；敗血症(占 2.7%)；事故傷害(占 2.5%)。與 103 年比較，僅排名順序異動，敗血症前進 1 名為第 9 名、事故傷害退後 1 名為第 10 名，其餘與上年相同。

104 年臺北市十大主要死因標準化死亡率較 103 年增加者有 2 項，分別為肺炎(增 1.8%)、高血壓性疾病(增 1.3%)；減少者有 8 項，分別為糖尿病(減 14.2%)、腦血管疾病(減 10.3%)、心臟疾病(減 7.8%)、慢性下呼吸道疾病(減 7.8%)、腎炎、腎病症候群及腎病變(減 2.0%)、敗血症(減 1.3%)、事故傷害(減 0.9%)、惡性腫瘤(減 0.9%)。

依性別觀察，104 年兩性死因前二名皆為惡性腫瘤及心臟疾病，第三名男性為肺炎、女性為腦血管疾病，與 103 年比較，男性十大死因僅排名順序變動，肺炎前進 1 名，為第 3 名，腦血管疾病下滑 1 名為第 4 名，敗血症上升 1 名為第 8 名，腎炎、腎病症候群及腎病變下滑 1 名為第 9 名，其餘與上年相同；女性十大死因部分，骨骼肌肉系統及結締組織之疾病上升 2 名為第 8 名，血管及未明示之癡呆症上升 3 名為第 10 名，首次進入女性十大死因，慢性下呼吸道疾病下滑 3 名為第 11 名，退出女性十大死因。死亡人數、死亡率及標準化死亡率大致呈男高於女。男、女性標準化死亡率分別較 103 年減少 2.0% 及 1.6%，男性增幅最多為高血壓性疾病 6.9%，肺炎 2.7% 次之，減幅最多為腦血管疾病 11.5%。女性增幅最多為血管性及未明示之癡呆症 41.9%，骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 10.0% 次之，減幅最大為糖尿病 21.5%。

依年齡層觀察，104 年臺北市 15-24 歲青年死因前三名為事故傷害(占 32.1%)、惡性腫瘤(占 16.7%)及自殺(占 15.5%)；25-44 歲壯年則以惡性腫瘤(占 29.9%)為首、自殺(占 14.4%)及事故傷害(占 12.1%)次之；45-64 歲中年仍以惡性腫瘤(占 46.5%)居首位、心臟疾病(占 12.0%)及腦血管疾病(占 5.2%)次之；65 歲以上老年則以惡性腫瘤(占 25.5%)、心臟疾病(占 14.7%)及肺炎(占 8.0%)居前三名。

104 年臺北市民因自殺死亡人數為 318 人，較 103 年增加 7 人(2.3%)，其死亡人數依年齡層分以 45-64 歲占 42.8% 最多，25-44 歲占 26.7% 次之；若依自殺死亡方式區分，則以利用懸吊、絞勒及閉息死亡者占 33.0% 最多。104 年自殺標準化死亡率為每十萬人口 8.7 人，相較 103 年下降 4.4%，居 104 年臺北市主要死因第 11 順位，與 103 年順位相

同，繼 97 年連續 8 年退出十大主要死因。

104 年臺北市民癌症死亡人數為 5,025 人，較 103 年增加 122 人，平均約每 1 小時 45 分鐘就有 1 位市民因癌症死亡；死亡率為每十萬人口 185.9 人，死亡者平均年齡為 70.9 歲，較全國 68.4 歲高；若經標準化後之死亡率為 102.8 人，較 103 年減少 0.9%，並較全國標準化死亡率 128.0 人低，為全國各縣市中死亡率最低縣市。十大癌症死因仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其他依序為 2.結腸、直腸和肛門癌、3.肝和肝內膽管癌、4.女性乳房癌、5.前列腺(攝護腺)癌、6.胃癌、7.胰臟癌、8.口腔癌、9.非何杰金氏淋巴瘤、10.卵巢癌；與 103 年比較，非何杰金氏淋巴瘤前進 1 名為第 9 名，卵巢癌退後 1 名為第 10 名。

104 年臺北市十大癌症死因標準化死亡率較 103 年增加者有 3 項，增幅較多者為前列腺(攝護腺)癌(增 17.6%)、口腔癌(增 5.0%)；減少者有 7 項，減幅較多者為非何杰金氏淋巴瘤(減 6.1%)、卵巢癌(減 5.6%)。

若依性別觀察，104 年臺北市男性十大癌症死因除前列腺(攝護腺)癌前進 1 名至第 5 名、口腔癌後退 1 名至第 6 名外，其餘死因及順位與 103 年相同；男性標準化死亡率較 103 年減少 0.5%，其中以肝和肝內膽管癌減少 6.6%最多，非何杰金氏淋巴瘤減少 4.9%次之，增加最多為膀胱癌，增加 19.2%。女性十大癌症死因除子宮頸及部位未明示子宮癌與子宮體癌各前進 1 名分別為第 8、10 名，其中子宮體癌首次進入女性十大癌症；非何杰金氏淋巴瘤後退 1 名至第 9 名，白血病後退 1 名至第 11 名，退出女性十大癌症外，其餘死因與順位皆與 103 年相同；女性標準化死亡率較 103 年減少 0.6%，其中以非何杰金氏淋巴瘤減少 7.7%最多，氣管、支氣管和肺癌減少 7.6%次之，增幅最多為子宮體癌，增加 20.0%。

臺北市政府衛生局表示，癌症已連續 34 年為國人死因第 1 名，蟬聯臺北市十大死因之首長達 44 年，平日培養「定期篩檢、正確飲食、規律運動、體重控制、戒菸及戒檳」的健康生活型態，可預防癌症的發生。臺北市於今年

首次啟動「癌症防治便利網」，廣邀臺北市醫師公會、牙醫師公會及 NGO 團體等白色力量站出來，成為北市的「健康好站」，呼籲市民多加使用社區「健康好站」資源，藉由「厝邊醫生」提供綿密癌症防治網絡服務，降低癌症的發生，讓市民「健康好讚」，相關資訊請參閱臺北市政府衛生局網頁。

四項癌症篩檢資格一覽表

篩檢項目	篩檢資格
乳房 X 光攝影檢查	45-69 歲婦女、40-44 歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每 2 年 1 次
子宮頸抹片檢查	30 歲以上婦女，建議每 3 年進行 1 次
糞便潛血檢查	50 至未滿 75 歲民眾，每 2 年 1 次
口腔黏膜檢查	30 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每 2 年 1 次

資料來源：衛生福利部國民健康署

表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因

民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男性				女性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
	所有死亡原因	17,160	634.7	100.0	所有死亡原因	9,932	766.6	100.0	所有死亡原因	7,228	513.3	100.0
1	惡性腫瘤	5,025	185.9	29.3	惡性腫瘤	2,855	220.4	28.7	惡性腫瘤	2,170	154.1	30.0
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,381	88.1	13.9	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,415	109.2	14.2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	966	68.6	13.4
3	腦血管疾病	1,153	42.6	6.7	肺炎	685	52.9	6.9	腦血管疾病	486	34.5	6.7
4	肺炎	1,125	41.6	6.6	腦血管疾病	667	51.5	6.7	肺炎	440	31.2	6.1
5	糖尿病	773	28.6	4.5	慢性下呼吸道疾病	470	36.3	4.7	糖尿病	360	25.6	5.0
6	慢性下呼吸道疾病	636	23.5	3.7	糖尿病	413	31.9	4.2	腎炎、腎病症候群及腎病變	283	20.1	3.9
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	565	20.9	3.3	事故傷害	303	23.4	3.1	高血壓性疾病	226	16.1	3.1
8	高血壓性疾病	463	17.1	2.7	敗血症	285	22.0	2.9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	185	13.1	2.6
9	敗血症	462	17.1	2.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	282	21.8	2.8	敗血症	177	12.6	2.4
10	事故傷害	435	16.1	2.5	高血壓性疾病	237	18.3	2.4	血管性及未明示之癱瘓症	171	12.1	2.4
	其他	4,142	153.2	24.1	其他	2,320	179.1	23.4	其他	1,764	125.3	24.4

資料來源：衛生福利部。

表2 ICD-10 臺北市10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	103年		104年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	332.5	所有死亡原因	325.6	-2.1
1	惡性腫瘤	103.7	惡性腫瘤	102.8	-0.9
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	46.2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	42.6	-7.8
3	腦血管疾病	22.4	腦血管疾病	20.1	-10.3
4	肺炎	17.1	肺炎	17.4	1.8
5	糖尿病	16.2	糖尿病	13.9	-14.2
6	慢性下呼吸道疾病	10.3	慢性下呼吸道疾病	9.5	-7.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.9	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.7	-2.0
8	高血壓性疾病	7.5	高血壓性疾病	7.6	1.3
9	事故傷害	11.2	敗血症	7.5	-1.3
10	敗血症	7.6	事故傷害	11.1	-0.9

資料來源：衛生福利部。

表3 ICD-10 臺北市男性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	103年		104年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	422.8	所有死亡原因	414.3	-2.0
1	惡性腫瘤	127.7	惡性腫瘤	127.1	-0.5
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	61.8	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	57.0	-7.8
3	腦血管疾病	29.5	肺炎	22.8	2.7
4	肺炎	22.2	腦血管疾病	26.1	-11.5
5	慢性下呼吸道疾病	15.9	慢性下呼吸道疾病	15.0	-5.7
6	糖尿病	18.3	糖尿病	16.9	-7.7
7	事故傷害	17.0	事故傷害	16.9	-0.6
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11.0	敗血症	10.1	1.0
9	敗血症	10.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.6	-3.6
10	高血壓性疾病	8.7	高血壓性疾病	9.3	6.9

資料來源：衛生福利部。

表4 ICD-10 臺北市女性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	103年		104年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	254.3	所有死亡原因	250.2	-1.6
1	惡性腫瘤	83.1	惡性腫瘤	82.6	-0.6
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	33.1	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	30.5	-7.9
3	腦血管疾病	16.3	腦血管疾病	15.1	-7.4
4	肺炎	12.7	肺炎	12.6	-0.8
5	糖尿病	14.4	糖尿病	11.3	-21.5
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.9	-1.1
7	高血壓性疾病	6.6	高血壓性疾病	6.3	-4.5
8	慢性下呼吸道疾病	5.2	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5.5	10.0
9	敗血症	5.6	敗血症	5.3	-5.4
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5.0	血管性及未明示之癱瘓症	4.4	41.9

資料來源：衛生福利部。

表5 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因

民國104年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計			男			女					
	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
	所有癌症死亡原因	5,025	185.9	100.0	所有癌症死亡原因	2,855	220.4	100.0	所有癌症死亡原因	2,170	154.1	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	984	36.4	19.6	氣管、支氣管和肺癌	589	45.5	20.6	氣管、支氣管和肺癌	395	28.1	18.2
2	結腸、直腸和肛門癌	686	25.4	13.7	肝和肝內膽管癌	429	33.1	15.0	結腸、直腸和肛門癌	325	23.1	15.0
3	肝和肝內膽管癌	667	24.7	13.3	結腸、直腸和肛門癌	361	27.9	12.6	女性乳房癌	288	20.5	13.3
4	女性乳房癌①	288	20.5	5.7	胃癌	185	14.3	6.5	肝和肝內膽管癌	238	16.9	11.0
5	前列腺(攝護腺)癌②	163	12.6	3.2	前列腺(攝護腺)癌	163	12.6	5.7	胰臟癌	133	9.4	6.1
6	胃癌	295	10.9	5.9	口腔癌	161	12.4	5.6	胃癌	110	7.8	5.1
7	胰臟癌	273	10.1	5.4	胰臟癌	140	10.8	4.9	卵巢癌	77	5.5	3.5
8	口腔癌	183	6.8	3.6	食道癌	124	9.6	4.3	子宮頸及部位未明示子宮癌	70	5.0	3.2
9	非何杰金氏淋巴瘤	153	5.7	3.0	非何杰金氏淋巴瘤	88	6.8	3.1	非何杰金氏淋巴瘤	65	4.6	3.0
10	卵巢癌①	77	5.5	1.5	膀胱癌	86	6.6	3.0	子宮體癌	42	3.0	1.9
	其他	1,256	46.5	25.0	其他	529	40.8	18.5	其他	427	30.3	19.7

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表6 ICD-10 臺北市10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	103年		104年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死因	103.7	所有癌症死因	102.8	-0.9
1	氣管、支氣管和肺癌	20.3	氣管、支氣管和肺癌	19.7	-3.0
2	結腸、直腸和肛門癌	13.5	結腸、直腸和肛門癌	13.4	-0.7
3	肝和肝內膽管癌	14.2	肝和肝內膽管癌	13.7	-3.5
4	女性乳房癌①	12.7	女性乳房癌①	12.2	-3.9
5	前列腺(攝護腺)癌②	5.1	前列腺(攝護腺)癌②	6.0	17.6
6	胃癌	6.1	胃癌	5.8	-4.9
7	胰臟癌	5.5	胰臟癌	5.6	1.8
8	口腔癌	4.0	口腔癌	4.2	5.0
9	卵巢癌①	3.6	非何杰金氏淋巴瘤	3.1	-6.1
10	非何杰金氏淋巴瘤	3.3	卵巢癌①	3.4	-5.6

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表7 ICD-10 臺北市男性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	103年		104年		
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	127.7	所有癌症死亡原因	127.1	-0.5
1	氣管、支氣管和肺癌	25.8	氣管、支氣管和肺癌	25.9	0.4
2	肝和肝內膽管癌	21.2	肝和肝內膽管癌	19.8	-6.6
3	結腸、直腸和肛門癌	16.2	結腸、直腸和肛門癌	15.6	-3.7
4	胃癌	8.2	胃癌	7.9	-3.7
5	口腔癌	7.7	前列腺(攝護腺)癌	6.0	17.6
6	前列腺(攝護腺)癌	5.1	口腔癌	8.2	6.5
7	胰臟癌	6.3	胰臟癌	6.5	3.2
8	食道癌	6.0	食道癌	5.9	-1.7
9	非何杰金氏淋巴瘤	4.1	非何杰金氏淋巴瘤	3.9	-4.9
10	膀胱癌	2.6	膀胱癌	3.1	19.2

資料來源：衛生福利部。

表8 ICD-10 臺北市女性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	103年		104年		
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	83.1	所有癌症死亡原因	82.6	-0.6
1	氣管、支氣管和肺癌	15.7	氣管、支氣管和肺癌	14.5	-7.6
2	結腸、直腸和肛門癌	11.3	結腸、直腸和肛門癌	11.7	3.5
3	女性乳房癌	12.7	女性乳房癌	12.2	-3.9
4	肝和肝內膽管癌	8.2	肝和肝內膽管癌	8.6	4.9
5	胰臟癌	4.8	胰臟癌	4.8	0.0
6	胃癌	4.3	胃癌	4.0	-7.0
7	卵巢癌	3.6	卵巢癌	3.4	-5.6
8	非何杰金氏淋巴瘤	2.6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2.7	17.4
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2.3	非何杰金氏淋巴瘤	2.4	-7.7
10	白血病	1.8	子宮體癌	1.8	20.0

資料來源：衛生福利部。

【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較

順位	臺北市 2015					新北市 2015					桃園市 2015				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有死亡原因	17,160	634.72	325.57	100.00	所有死亡原因	22,086	556.50	398.87	100.00	所有死亡原因	11,577	556.04	410.60	100.00
1	惡性腫瘤	5,025	185.87	102.84	29.28	惡性腫瘤	6,695	168.69	119.64	30.31	惡性腫瘤	3,166	152.06	115.67	27.35
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,381	88.07	42.60	13.88	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	2,978	75.04	52.18	13.48	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	1,395	67.00	48.12	12.05
3	腦血管疾病	1,153	42.65	20.08	6.72	腦血管疾病	1,486	37.44	26.26	6.73	腦血管疾病	884	42.46	30.63	7.64
4	肺炎	1,125	41.61	17.37	6.56	肺炎	1,344	33.86	22.78	6.09	肺炎	635	30.50	20.37	5.49
5	糖尿病	773	28.59	13.87	4.50	糖尿病	1,205	30.36	21.75	5.46	糖尿病	623	29.92	21.98	5.38
6	慢性下呼吸道疾病	636	23.52	9.54	3.71	慢性下呼吸道疾病	789	19.88	13.47	3.57	事故傷害	535	25.70	21.57	4.62
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	565	20.90	9.68	3.29	事故傷害	759	19.12	15.69	3.44	高血壓性 疾病	520	24.98	16.79	4.49
8	高血壓性 疾病	463	17.13	7.65	2.70	腎炎、腎病症候群 及腎病變	618	15.57	11.08	2.80	慢性下呼吸 道疾病	382	18.35	12.01	3.30
9	敗血症	462	17.09	7.49	2.69	蓄意自我傷害（自 殺）	589	14.84	11.75	2.67	慢性肝病及肝 硬化	339	16.28	12.58	2.93
10	事故傷害	435	16.09	11.05	2.53	慢性肝病及肝 硬化	561	14.14	10.10	2.54	腎炎、腎病症 候群及腎病 變	323	15.51	11.12	2.79
	其他	4,142	153.21	83.40	24.14	其他	5,062	127.55	94.17	22.92	其他	2,775	133.28	99.76	23.97
11	蓄意自我傷害（自 殺）	318	11.76	8.72	1.85	高血壓性 疾病	558	14.06	9.58	2.53	蓄意自我傷 害（自 殺）	309	14.84	12.33	2.67
12	血管性及未明示之 癱瘓症	299	11.06	3.97	1.74	敗血症	457	11.52	7.95	2.07	敗血症	247	11.86	8.34	2.13
13	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	297	10.99	4.67	1.73	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	356	8.97	6.09	1.61	衰老/老邁	140	6.72	3.96	1.21
14	慢性肝病及肝 硬化	278	10.28	5.96	1.62	血管性及未明示之 癱瘓症	268	6.75	4.31	1.21	血管性及未 明示之 癱瘓症	97	4.66	2.83	0.84
15	帕金森病	180	6.66	2.95	1.05	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	181	4.56	3.35	0.82	原位與良性 腫瘤（ 惡性腫瘤 除外）	91	4.37	3.37	0.79

資料來源：衛生福利部。

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較(續)

順位	臺中市 2015					臺南市 2015					高雄市 2015				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有死亡原因	16,072	588.26	431.06	100.00	所有死亡原因	14,312	759.29	445.87	100.00	所有死亡原因	20,522	738.48	475.68	100.00
1	惡性腫瘤	4,833	176.89	131.76	30.07	惡性腫瘤	4,242	225.05	137.63	29.64	惡性腫瘤	6,045	217.53	140.75	29.46
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,538	56.29	40.13	9.57	心臟疾病(高血壓 性 疾病除外)	1,511	80.16	44.88	10.56	心臟疾病(高血壓 性 疾病除外)	2,042	73.48	45.98	9.95
3	腦血管疾病	1,047	38.32	27.46	6.51	肺炎	1,071	56.82	28.18	7.48	肺炎	1,508	54.27	31.64	7.35
4	糖尿病	1,012	37.04	26.94	6.30	腦血管疾病	959	50.88	28.40	6.70	腦血管疾病	1,257	45.23	27.89	6.13
5	肺炎	1,011	37.00	24.80	6.29	糖尿病	942	49.98	28.18	6.58	糖尿病	1,224	44.05	27.40	5.96
6	事故傷害	737	26.98	22.13	4.59	事故傷害	638	33.85	24.55	4.46	事故傷害	853	30.69	24.01	4.16
7	高血壓性 疾病	630	23.06	15.89	3.92	慢性下呼吸 道疾病	540	28.65	14.48	3.77	高血壓性 疾病	753	27.10	16.28	3.67
8	慢性下呼吸 道疾病	619	22.66	15.37	3.85	高血壓性 疾病	449	23.82	12.55	3.14	慢性下呼吸 道疾病	717	25.80	15.19	3.49
9	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	538	19.69	14.04	3.35	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	399	21.17	12.11	2.79	慢性肝病及 肝硬化	641	23.07	15.48	3.12
10	慢性肝病及 肝硬化	480	17.57	13.30	2.99	慢性肝病及 肝硬化	381	20.21	12.79	2.66	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	609	21.91	13.37	2.97
	其他	3,627	132.75	99.25	22.57	其他	3,180	168.71	102.11	22.22	其他	4,873	175.35	117.69	23.75
11	蓄意自我傷 害(自殺)	383	14.02	11.64	2.38	蓄意自我傷 害(自殺)	313	16.61	12.23	2.19	蓄意自我傷 害(自殺)	446	16.05	12.24	2.17
12	敗血症	308	11.27	7.96	1.92	敗血症	224	11.88	6.42	1.57	敗血症	444	15.98	9.55	2.16
13	衰老/老邁	166	6.08	3.62	1.03	衰老/老邁	170	9.02	4.20	1.19	原位與良性 腫瘤(惡性 腫瘤除外)	160	5.76	3.70	0.78
14	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	136	4.98	3.62	0.85	帕金森病	114	6.05	2.97	0.80	衰老/老邁	150	5.40	2.87	0.73
15	原位與良性 腫瘤(惡性 腫瘤除外)	130	4.76	3.41	0.81	原位與良性 腫瘤(惡性 腫瘤除外)	113	5.99	3.49	0.79	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	108	3.89	2.63	0.53

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較

順位	臺北市 2015					新北市 2015					桃園市 2015				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	惡性腫瘤	5,025	185.87	102.84	100.00	惡性腫瘤	6,695	168.69	119.64	100.00	惡性腫瘤	3,166	152.06	115.67	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	984	36.40	19.68	19.58	氣管、支氣管和肺癌	1,384	34.87	24.69	20.67	氣管、支氣管和肺癌	636	30.55	23.04	20.09
2	結腸、直腸和肛門癌	686	25.37	13.41	13.65	肝和肝內膽管癌	1,043	26.28	18.62	15.58	肝和肝內膽管癌	474	22.77	17.92	14.97
3	肝和肝內膽管癌	667	24.67	13.72	13.27	結腸、直腸和肛門癌	783	19.73	13.93	11.70	結腸、直腸和肛門癌	375	18.01	13.55	11.84
4	女性乳房癌(1)	288	20.45	12.15	5.73	女性乳房癌(1)	354	17.55	11.63	5.29	女性乳房癌(1)	164	15.78	11.56	5.18
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	163	12.58	5.97	3.24	胃癌	389	9.80	6.83	5.81	胃癌	178	8.55	6.27	5.62
6	胃癌	295	10.91	5.80	5.87	口腔癌	340	8.57	5.99	5.08	前列腺(攝護腺)癌(2)	86	8.25	6.20	2.72
7	胰臟癌	273	10.10	5.60	5.43	前列腺(攝護腺)癌(2)	150	7.69	5.42	2.24	口腔癌	165	7.92	5.90	5.21
8	口腔癌	183	6.77	4.24	3.64	胰臟癌	304	7.66	5.42	4.54	食道癌	151	7.25	5.32	4.77
9	非何杰金氏淋巴瘤	153	5.66	3.09	3.04	食道癌	246	6.20	4.35	3.67	胰臟癌	118	5.67	4.34	3.73
10	卵巢癌(1)	77	5.47	3.40	1.53	卵巢癌(1)	97	4.81	3.14	1.45	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	54	5.20	3.83	1.71
	其他	1,256	46.46	26.19	25.00	其他	1,605	40.44	29.44	23.97	其他	765	36.74	28.33	24.16
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	70	4.97	2.73	1.39	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	95	4.71	3.28	1.42	非何杰金氏淋巴瘤	98	4.71	3.40	3.10
12	食道癌	133	4.92	2.88	2.65	非何杰金氏淋巴瘤	182	4.59	3.37	2.72	卵巢癌(1)	38	3.66	2.71	1.20
13	膀胱癌	117	4.33	1.95	2.33	白血病	136	3.43	2.66	2.03	鼻咽癌	76	3.65	2.86	2.40
14	白血病	108	3.99	2.24	2.15	膀胱癌	123	3.10	2.11	1.84	白血病	76	3.65	2.96	2.40
15	子宮體癌(1)	42	2.98	1.76	0.84	鼻咽癌	110	2.77	1.98	1.64	膀胱癌	45	2.16	1.51	1.42

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較(續)

順位	臺中市 2015					臺南市 2015					高雄市 2015				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	惡性腫瘤	4,833	176.89	131.76	100.00	惡性腫瘤	4,242	225.05	137.63	100.00	惡性腫瘤	6,045	217.53	140.75	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	893	32.69	24.05	18.48	肝和肝內膽管癌	855	45.36	28.23	20.16	氣管、支氣管和肺癌	1,198	43.11	27.39	19.82
2	肝和肝內膽管癌	796	29.13	22.15	16.47	氣管、支氣管和肺癌	816	43.29	26.02	19.24	肝和肝內膽管癌	1,186	42.68	27.64	19.62
3	結腸、直腸和肛門癌	598	21.89	16.07	12.37	結腸、直腸和肛門癌	543	28.81	16.47	12.80	結腸、直腸和肛門癌	741	26.66	16.83	12.26
4	女性乳癌(1)	282	20.43	14.84	5.83	女性乳癌(1)	165	17.53	11.34	3.89	女性乳癌(1)	266	19.04	12.36	4.40
5	口腔癌	274	10.03	7.57	5.67	前列腺(攝護腺)癌(2)	120	12.71	7.75	2.83	口腔癌	392	14.11	9.35	6.48
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	125	9.25	6.72	2.59	胃癌	192	10.19	5.93	4.53	前列腺(攝護腺)癌(2)	142	10.28	6.46	2.35
7	胃癌	223	8.16	5.77	4.61	口腔癌	183	9.71	6.32	4.31	胃癌	267	9.61	6.06	4.42
8	胰臟癌	218	7.98	5.94	4.51	食道癌	149	7.90	5.05	3.51	胰臟癌	223	8.02	5.10	3.69
9	食道癌	215	7.87	5.75	4.45	胰臟癌	135	7.16	4.25	3.18	食道癌	209	7.52	4.87	3.46
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	73	5.29	3.66	1.51	膀胱癌	103	5.46	3.12	2.43	非何杰金氏淋巴瘤	145	5.22	3.47	2.40
	其他	1,136	41.58	31.59	23.51	其他	981	52.04	32.95	23.13	其他	1,276	45.92	30.58	21.11
11	非何杰金氏淋巴瘤	135	4.94	3.70	2.79	白血病	101	5.36	3.53	2.38	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	71	5.08	3.19	1.17
12	白血病	132	4.83	4.02	2.73	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	48	5.10	2.91	1.13	白血病	136	4.89	3.59	2.25
13	卵巢癌(1)	64	4.64	3.24	1.32	卵巢癌(1)	46	4.89	3.16	1.08	卵巢癌(1)	60	4.30	2.77	0.99
14	膀胱癌	76	2.78	2.04	1.57	非何杰金氏淋巴瘤	82	4.35	2.66	1.93	膀胱癌	118	4.25	2.58	1.95
15	鼻咽癌	59	2.16	1.61	1.22	鼻咽癌	67	3.55	2.39	1.58	鼻咽癌	96	3.45	2.38	1.59

【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

表1.臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2015				全國 2015				日本 2014(平成26年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
1	所有死亡原因	17,160	634.72	100.00	所有死亡原因	163,574	697.16	100.00	所有死亡原因	1,273,004	1014.90	100.00
1	惡性腫瘤	5,025	185.87	29.28	惡性腫瘤	46,829	199.59	28.63	惡性腫瘤	368,103	293.47	28.92
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,381	88.07	13.88	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	19,202	81.84	11.74	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	196,925	157.00	15.47
3	腦血管疾病	1,153	42.65	6.72	腦血管疾病	11,169	47.60	6.83	肺炎	119,650	95.39	9.40
4	肺炎	1,125	41.61	6.56	肺炎	10,761	45.86	6.58	腦血管疾病	114,207	91.05	8.97
5	糖尿病	773	28.59	4.50	糖尿病	9,530	40.62	5.83	老邁	75,389	60.10	5.92
6	慢性下呼吸道疾病	636	23.52	3.71	事故傷害	7,033	29.97	4.30	事故傷害	39,029	31.12	3.07
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	565	20.90	3.29	慢性下呼吸道疾病	6,383	27.20	3.90	腎衰竭	24,776	19.75	1.95
8	高血壓性疾病	463	17.13	2.70	高血壓性疾病	5,536	23.59	3.38	自殺	24,417	19.47	1.92
9	敗血症	462	17.09	2.69	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,762	20.30	2.91	主動脈瘤及剝離	16,423	13.09	1.29
10	事故傷害	435	16.09	2.53	慢性肝病及肝硬化	4,688	19.98	2.87	慢性阻塞性肺病	16,184	12.90	1.27
	其他	4,142	153.21	24.14	其他	37,681	160.60	23.04	其他	277,901	221.56	21.83
11	蓄意自我傷害（自殺）	318	11.76	1.85	蓄意自我傷害（自殺）	3,675	15.66	2.25	肝臟疾病	15,692	12.51	1.23
12	血管性及未明示之癡呆症	299	11.06	1.74	敗血症	3,428	14.61	2.10	糖尿病	13,669	10.90	1.07
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	297	10.99	1.73	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,624	6.92	0.99	敗血症	11,279	8.99	0.89
14	慢性肝病及肝硬化	278	10.28	1.62	衰老/老邁	1,440	6.14	0.88	原位及良性腫瘤	11,006	8.77	0.86
15	帕金森病	180	6.66	1.05	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,386	5.91	0.85	血管性及未明示之癡呆症	10,587	8.44	0.83

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2015				全國 2015				日本 2014(平成26年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	137	474.62	100.00	所有死亡原因	881	413.43	100.00	所有死亡原因	2,080	207.27	100.00
1	源於周產期的特定病況(1)	73	252.90	53.28	先天性畸形、變形及染色體異常	180	84.47	20.43	先天性畸形變形及染色體異常	751	74.84	36.11
2	先天性畸形變形及染色體異常	24	83.15	17.52	源於周產期的呼吸性疾患	117	54.91	13.28	源於周產期的特定病況	513	51.12	24.66
3	事故傷害	6	20.79	4.38	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	60	28.16	6.81	源於周產期的呼吸和心臟血管疾患	261	26.01	12.55
4	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	4	13.86	2.92	事故傷害	46	21.59	5.22	嬰兒猝死症候群（SIDS）	145	14.45	6.97
5	嬰兒猝死症候群（SIDS）	4	13.86	2.92	特發於周產期的感染	36	16.89	4.09	事故傷害	78	7.77	3.75
6	疝氣及腸阻塞	1	3.46	0.73	嬰兒猝死症候群（SIDS）	32	15.02	3.63	胎兒及新生兒出血及血液疾患	63	6.28	3.03
7	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	3.46	0.73	胎兒及新生兒出血及血液疾患	28	13.14	3.18	妊娠期間及胎兒生長有關的疾患	59	5.88	2.84
8	敗血症	1	3.46	0.73	心臟疾病（高血壓性心臟病除外）	19	8.92	2.16	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	52	5.18	2.50
9	貧血	1	3.46	0.73	肺炎	17	7.98	1.93	特發於周產期的感染	43	4.28	2.07
10	腦血管疾病	1	3.46	0.73	腦之其他疾患	14	6.57	1.59	敗血症	40	3.99	1.92
	其他	21	72.75	15.33	其他	332	155.80	37.68	其他	75	7.47	3.61

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

附註：(1)源於周產期的特定病況包含胎兒及新生兒受母體因素和妊娠、產程[臨產]及分娩併發症之影響、妊娠期長短和胎兒生長有關的疾患、生產創傷、特發於周產期的呼吸和心臟血管疾患、特發於周產期的感染(症)、胎兒及新生兒出血和血液疾患、特發於胎兒及新生兒的短暫性內分泌和(新陳)代謝(性)疾患、胎兒和新生兒消化系統疾患、侵及(侵犯、涉及)胎兒及新生兒體被[被膜、皮膚]和體溫調節的病況。

表3. 少年（1-14歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2015				全國 2015				日本 2014(平成26年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	29	8.24	100.00	所有死亡原因	416	13.72	100.00	所有死亡原因	1,693	11.23	100.00
1	惡性腫瘤	4	1.14	13.79	事故傷害	77	2.54	18.51	惡性腫瘤	286	1.90	16.89
2	事故傷害	3	0.85	10.34	惡性腫瘤	74	2.44	17.79	事故傷害	282	1.87	16.66
3	加害（他殺）	2	0.57	6.90	先天性畸形變形及染色體異常	41	1.35	9.86	先天性畸形變形及染色體異常	182	1.21	10.75
4	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.57	6.90	加害（他殺）	24	0.79	5.77	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	99	0.66	5.85
5	肺炎	2	0.57	6.90	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	23	0.76	5.53	自殺	92	0.61	5.43
6	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	0.28	3.45	肺炎	14	0.46	3.37	肺炎	83	0.55	4.90
7	流行性感冒	1	0.28	3.45	敗血症	7	0.23	1.68	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	66	0.44	3.90
8	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1	0.28	3.45	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	7	0.23	1.68	敗血症	37	0.25	2.19
9	敗血症	1	0.28	3.45	腦血管疾病	6	0.20	1.44	腸道感染症	34	0.23	2.01
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.28	3.45	蓄意自我傷害（自殺）	6	0.20	1.44	他殺	32	0.21	1.89
	其他	11	3.12	37.93	其他	137	4.52	32.93	其他	500	3.32	29.53

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2015				全國 2015				日本 2014(平成26年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	84	28.04	100.00	所有死亡原因	1,228	39.39	100.00	所有死亡原因	3,525	29.59	100.00
1	事故傷害	27	9.01	32.14	事故傷害	569	18.25	46.34	自殺	1,612	13.53	45.73
2	惡性腫瘤	14	4.67	16.67	蓄意自我傷害（自殺）	183	5.87	14.90	事故傷害	694	5.83	19.69
3	蓄意自我傷害（自殺）	13	4.34	15.48	惡性腫瘤	147	4.71	11.97	惡性腫瘤	316	2.65	8.96
4	加害（他殺）	4	1.34	4.76	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	43	1.38	3.50	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	181	1.52	5.13
5	人類免疫缺乏病毒（HIV） 疾病	2	0.67	2.38	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	24	0.77	1.95	先天性畸形變形及 染色體異常	59	0.50	1.67
6	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	0.67	2.38	加害（他殺）	23	0.74	1.87	腦血管疾病	49	0.41	1.39
7	先天性畸形變形及 染色體異常	2	0.67	2.38	腦血管疾病	18	0.58	1.47	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	40	0.34	1.13
8	慢性下呼吸道疾病	2	0.67	2.38	先天性畸形變形及 染色體異常	16	0.51	1.30	肺炎	29	0.24	0.82
9	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	1	0.33	1.19	肺炎	11	0.35	0.90	他殺	28	0.24	0.79
10	高血壓性 疾病	1	0.33	1.19	糖尿病	9	0.29	0.73	糖尿病	16	0.13	0.45
	其他	16	5.34	19.05	其他	185	5.93	15.07	其他	501	4.21	14.21

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2015				全國 2015				日本 2014(平成26年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	589	71.85	100.00	所有死亡原因	8,767	119.83	100.00	所有死亡原因	22,713	71.21	100.00
1	惡性腫瘤	176	21.47	29.88	惡性腫瘤	2,231	30.49	25.45	自殺	6,747	21.15	29.71
2	蓄意自我傷害（自殺）	85	10.37	14.43	事故傷害	1,325	18.11	15.11	惡性腫瘤	5,316	16.67	23.41
3	事故傷害	71	8.66	12.05	蓄意自我傷害（自殺）	1,165	15.92	13.29	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,239	7.02	9.86
4	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	55	6.71	9.34	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	729	9.96	8.32	事故傷害	1,947	6.10	8.57
5	慢性肝病及肝硬化	23	2.81	3.90	慢性肝病及肝硬化	696	9.51	7.94	腦血管疾病	1,348	4.23	5.93
6	腦血管疾病	22	2.68	3.74	腦血管疾病	352	4.81	4.02	肝臟疾病	607	1.90	2.67
7	肺炎	11	1.34	1.87	糖尿病	185	2.53	2.11	肺炎	300	0.94	1.32
8	糖尿病	9	1.10	1.53	肺炎	135	1.85	1.54	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	218	0.68	0.96
9	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	8	0.98	1.36	高血壓性 疾病	125	1.71	1.43	糖尿病	176	0.55	0.77
10	高血壓性 疾病	8	0.98	1.36	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	106	1.45	1.21	主動脈瘤及剝離	175	0.55	0.77
	其他	121	14.76	20.54	其他	1,718	23.48	19.60	其他	3,640	11.41	16.03

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2015				全國 2015				日本 2014(平成26年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	3,203	393.36	100.00	所有死亡原因	37,593	543.02	100.00	所有死亡原因	121,192	371.01	100.00
1	惡性腫瘤	1,489	182.86	46.49	惡性腫瘤	16,101	232.57	42.83	惡性腫瘤	54,154	165.79	44.68
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	385	47.28	12.02	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	3,763	54.36	10.01	心臟疾病(高血 壓性 疾病除外)	15,103	46.24	12.46
3	腦血管疾病	165	20.26	5.15	慢性肝病及肝硬化	2,149	31.04	5.72	腦血管疾病	9,046	27.69	7.46
4	蓄意自我傷害(自殺)	136	16.70	4.25	事故傷害	2,032	29.35	5.41	自殺	8,051	24.65	6.64
5	糖尿病	118	14.49	3.68	腦血管疾病	1,975	28.53	5.25	事故傷害	4,825	14.77	3.98
6	慢性肝病及肝硬化	100	12.28	3.12	糖尿病	1,768	25.54	4.70	肝臟疾病	4,381	13.41	3.61
7	事故傷害	87	10.68	2.72	蓄意自我傷害(自殺)	1,424	20.57	3.79	肺炎	3,245	9.93	2.68
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	74	9.09	2.31	肺炎	879	12.70	2.34	主動脈瘤及剝離	1,567	4.80	1.29
9	肺炎	67	8.23	2.09	腎炎、腎病症候群及腎病變	789	11.40	2.10	糖尿病	1,513	4.63	1.25
10	高血壓性 疾病	54	6.63	1.69	高血壓性 疾病	780	11.27	2.07	腎衰竭	1,003	3.07	0.83
	其他	528	64.84	16.48	其他	5,933	85.70	15.78	其他	18,304	56.04	15.10

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表7.老年人口(65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2015				全國 2015				日本 2014(平成26年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	13,118	3,364.85	100.00	所有死亡原因	114,689	3,991.08	100.00	所有死亡原因	1,121,260	3,411.61	100.00
1	惡性腫瘤	3,342	857.24	25.48	惡性腫瘤	28,270	983.77	24.65	惡性腫瘤	307,984	937.09	27.47
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,934	496.08	14.74	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	14,625	508.94	12.75	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)	179,224	545.32	15.98
3	肺炎	1,045	268.05	7.97	肺炎	9,705	337.73	8.46	肺炎	115,941	352.77	10.34
4	腦血管疾病	965	247.53	7.36	腦血管疾病	8,814	306.72	7.69	腦血管疾病	103,703	315.53	9.25
5	糖尿病	645	165.45	4.92	糖尿病	7,568	263.36	6.60	老邁	75,366	229.31	6.72
6	慢性下呼吸道疾病	605	155.19	4.61	慢性下呼吸道疾病	5,933	206.46	5.17	事故傷害	31,140	94.75	2.78
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	485	124.41	3.70	高血壓性疾病	4,629	161.09	4.04	腎衰竭	23,682	72.06	2.11
8	敗血症	416	106.71	3.17	腎炎、腎病症候群 及腎病變	3,885	135.19	3.39	慢性阻塞性肺病	15,755	47.94	1.41
9	高血壓性疾病	400	102.60	3.05	事故傷害	2,984	103.84	2.60	主動脈瘤及剝離	14,668	44.63	1.31
10	血管性及未明示之 癡呆症	298	76.44	2.27	敗血症	2,851	99.21	2.49	糖尿病	11,960	36.39	1.07
	其他	2,983	765.16	22.74	其他	25,425	884.77	22.17	其他	241,837	735.83	21.57

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標

表1.臺北市行政區別衛生統計指標 — 人口統計

中華民國104年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km ²	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km ²	9,951	22,580	20,451	27,555	16,909	21,358	23,045	21,954	8,739	5,597	9,106	4,661	4,538
年底人口數	總計		2,704,810	209,714	229,211	313,058	231,350	162,475	130,929	194,339	275,367	122,245	287,566	290,694	257,862
	男性	人	1,295,462	98,853	109,806	146,483	107,979	77,598	63,996	95,916	132,457	59,710	137,719	140,453	124,492
	女性		1,409,348	110,861	119,405	166,575	123,371	84,877	66,933	98,423	142,910	62,535	149,847	150,241	133,370
	性比例		91.92	89.17	91.96	87.94	87.52	91.42	95.61	97.45	92.69	95.48	91.91	93.49	93.34
人口變動	出生數	人	28,987	1,962	2,475	2,951	2,461	1,679	1,455	2,200	3,006	1,490	3,321	3,100	2,887
	死亡數	人	17,106	1,299	1,470	1,942	1,399	1,112	1,010	1,732	1,594	725	1,415	1,782	1,626
	粗出生率	%	10.72	9.34	10.79	9.42	10.66	10.30	11.11	11.31	10.95	12.24	11.58	10.67	11.20
	粗死亡率	%	6.33	6.18	6.41	6.20	6.06	6.82	7.71	8.90	5.80	5.95	4.94	6.13	6.31
	人口增加率	%	0.92	-3.61	-1.94	-2.03	3.70	-5.60	-0.34	-1.93	5.26	8.11	6.28	0.82	1.33
	自然增加率	%	4.39	3.16	4.38	3.22	4.60	3.48	3.40	2.41	5.14	6.28	6.65	4.54	4.89
	社會增加率	%	-3.47	-6.77	-6.32	-5.25	-0.90	-9.08	-3.73	-4.34	0.12	1.83	-0.37	-3.71	-3.57
生育率	一般生育率		42	38	43	38	41	41	44	46	42	46	42	42	43
	總生育率		1,340	1,240	1,325	1,275	1,290	1,325	1,335	1,425	1,380	1,415	1,360	1,305	1,360
	15-19歲		2	0	1	1	2	1	1	4	2	2	2	1	2
	20-24歲		13	8	13	8	12	11	14	24	11	19	13	14	15
	24-29歲	%	58	46	57	50	57	53	66	67	60	66	54	56	64
	30-34歲		112	113	109	107	110	112	108	113	121	116	117	110	112
	35-39歲		69	68	71	74	63	75	65	65	68	67	73	69	67
	40-44歲		13	12	13	14	13	12	13	11	14	13	13	10	11
45-49歲		1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	-	1	1	
人口組成 (年底)	14歲以下 (a)		377,428	31,616	28,995	47,240	29,228	26,432	17,771	22,641	39,841	16,844	42,363	38,251	36,206
	15-64歲 (b)	人	1,928,200	144,191	163,607	211,030	166,760	110,438	93,331	139,223	198,799	89,647	215,842	209,286	186,046
	65歲以上 (c)		399,182	33,907	36,609	54,788	35,362	25,605	19,827	32,475	36,727	15,754	29,361	43,157	35,610
人口組成結 構比(年底)	14歲以下		13.95	15.08	12.65	15.09	12.63	16.27	13.57	11.65	14.47	13.78	14.73	13.16	14.04
	15-64歲	%	71.29	68.76	71.38	67.41	72.08	67.97	71.28	71.64	72.19	73.33	75.06	72.00	72.15
	65歲以上		14.76	16.17	15.97	17.50	15.29	15.76	15.14	16.71	13.34	12.89	10.21	14.85	13.81
	扶養比(a+c)/b	%	40.28	45.44	40.10	48.35	38.73	47.12	40.28	39.59	38.52	36.36	33.23	38.90	38.60
老化指數c/a		105.76	107.25	126.26	115.98	120.99	96.87	111.57	143.43	92.18	93.53	69.31	112.83	98.35	

表2.臺北市行政區別衛生統計指標—醫療資源

中華民國104年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家	37	5	2	5	4	4	1	4	2	-	3	1	6
	診所		3,452	292	286	780	456	271	169	194	189	83	234	304	194
	護產機構		121	15	8	19	19	9	5	6	9	3	7	11	10
	精神復建機構		50	3	1	4	10	5	3	2	4	2	3	5	8
	其他醫療及醫事機構		230	21	23	36	39	17	13	13	13	7	24	17	7
	非醫事機構		1,017	74	86	85	94	98	62	87	88	47	87	107	102
	藥商		11,594	1,079	1,110	1,731	1,959	1,062	842	565	473	363	1,132	757	521
	病床數		總計	25,045	1,840	1,671	3,445	2,139	3,713	673	628	1,000	491	2,503	1,569
病床數	醫院病床	床	20,104	1,300	1,410	2,072	1,289	3,278	443	422	856	430	2,164	1,324	5,116
	一般急性病床		13,993	745	958	1,531	815	2,273	314	165	592	291	1,575	884	3,850
	一般慢性病床		619	103	133	-	20	-	-	79	-	-	-	-	284
	特殊病床		5,492	452	319	541	454	1,005	129	178	264	139	589	440	982
	診所病床		4,941	540	261	1,373	850	435	230	206	144	61	339	245	257
醫事人力 (醫療及醫事機構)	總計	人	50,914	3,678	3,248	7,087	5,191	7,673	1,443	1,539	2,600	1,094	4,552	3,802	9,007
	醫師		13,188	918	896	2,078	1,357	1,990	376	439	724	247	1,131	1,051	1,981
	西醫師		9,299	531	564	1,321	931	1,594	218	257	489	160	826	712	1,696
	中醫師		861	80	79	153	119	79	61	60	49	21	44	62	54
	牙醫師		3,028	307	253	604	307	317	97	122	186	66	261	277	231
	藥事人員		5,583	508	436	766	757	602	267	288	297	168	512	417	565
	護產人員		25,481	1,763	1,514	3,188	2,439	4,126	577	623	1,255	541	2,288	1,845	5,322
	醫檢人員		3,405	230	153	515	302	641	101	71	133	74	327	177	681
其他	3,257	259	249	540	336	314	122	118	191	64	294	312	458		
平均 每萬人 醫療資源	醫院	家	0.14	0.24	0.09	0.16	0.17	0.25	0.08	0.21	0.07	0.00	0.10	0.03	0.23
	診所	家	12.76	13.92	12.48	24.92	19.71	16.68	12.91	9.98	6.86	6.79	8.14	10.46	7.52
	病床數	床	92.59	87.74	72.90	110.04	92.46	228.53	51.40	32.31	36.32	40.17	87.04	53.97	208.37
	醫事人員數	人	188.24	175.38	141.70	226.38	224.38	472.26	110.21	79.19	94.42	89.49	158.29	130.79	349.30
	醫師	人	48.76	43.77	39.09	66.38	58.66	122.48	28.72	22.59	26.29	20.21	39.33	36.15	76.82
	西醫師	人	34.38	25.32	24.61	42.20	40.24	98.11	16.65	13.22	17.76	13.09	28.72	24.49	65.77
	中醫師	人	3.18	3.81	3.45	4.89	5.14	4.86	4.66	3.09	1.78	1.72	1.53	2.13	2.09
	牙醫師	人	11.19	14.64	11.04	19.29	13.27	19.51	7.41	6.28	6.75	5.40	9.08	9.53	8.96
	藥事人員	人	20.64	24.22	19.02	24.47	32.72	37.05	20.39	14.82	10.79	13.74	17.80	14.34	21.91
	護產人員	人	94.21	84.07	66.05	101.83	105.42	253.95	44.07	32.06	45.58	44.26	79.56	63.47	206.39
	醫檢人員	人	12.59	10.97	6.68	16.45	13.05	39.45	7.71	3.65	4.83	6.05	11.37	6.09	26.41
其他	人	12.04	12.35	10.86	17.25	14.52	19.33	9.32	6.07	6.94	5.24	10.22	10.73	17.76	

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計

中華民國104年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	腦血管疾病		3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3
	肺炎		4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4
	糖尿病		5	6	5	5	5	5	5	5	5	6	8	5	5
	慢性下呼吸道疾病		6	5	8	7	7	6	7	6	7	11	5	6	6
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		7	10	6	6	6	9	5	7	6	5	10	7	11
	高血壓性 疾病		8	7	7	8	9	8	11	10	9	7	12	8	7
	敗血症		9	8	10	9	10	7	7	8	8	13	7	10	10
	事故傷害		10	12	8	10	8	10	9	8	10	11	6	9	8
十大死因 死亡率	所有死亡原因	人/每十 萬人口	634.72	625.44	643.32	626.09	613.19	673.29	752.95	882.14	588.76	593.01	496.40	619.46	632.93
	惡性腫瘤		185.87	183.73	190.03	180.29	183.61	194.56	229.09	235.96	164.94	189.73	159.77	175.17	188.99
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		88.07	94.72	76.71	87.75	77.52	90.84	115.31	137.77	83.38	88.71	61.40	86.04	86.15
	腦血管疾病		42.65	43.79	40.53	44.36	40.71	41.12	57.27	61.17	34.59	41.89	36.63	39.23	42.30
	肺炎		41.61	48.07	48.38	40.85	35.94	47.26	43.53	64.77	43.33	35.32	23.72	37.51	39.97
	糖尿病		28.59	22.85	29.64	25.53	25.12	31.30	32.84	47.29	25.49	23.00	14.65	36.48	33.76
	慢性下呼吸道疾病		23.52	24.75	17.00	22.66	21.22	29.46	22.15	34.44	22.57	11.50	20.23	29.25	24.06
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		20.90	12.38	21.79	22.98	21.65	17.80	32.84	27.76	22.94	28.75	11.51	25.12	14.36
	高血壓性 疾病		17.13	19.04	18.31	17.87	16.89	19.03	13.75	25.19	16.38	18.89	10.81	15.83	16.69
	敗血症		17.09	18.56	15.69	16.27	15.59	21.48	22.15	26.73	18.93	9.03	15.35	13.42	14.75
事故傷害	16.09	10.47	17.00	14.36	18.19	17.19	19.09	26.73	13.84	11.50	16.74	14.45	15.52		

表3.臺北市行政區別衛生統計指標—ICD-10死因統計(續1)

中華民國104年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世 界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	325.57	292.93	319.90	259.39	316.50	314.63	400.99	412.09	307.80	361.83	340.19	320.83	354.18
	惡性腫瘤		102.84	94.55	102.25	83.82	101.41	100.26	127.23	120.66	95.06	120.52	112.15	98.15	111.14
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)		42.60	41.30	34.50	32.15	39.13	39.66	60.97	60.94	40.74	53.42	40.23	43.50	44.42
	腦血管疾病		20.08	17.52	19.12	16.37	19.04	18.43	27.91	25.82	17.82	23.28	23.64	17.91	22.12
	肺炎		17.37	17.06	19.46	13.41	15.37	17.86	21.09	23.98	18.06	17.58	13.65	16.20	18.40
	糖尿病		13.87	10.35	13.39	9.71	11.55	14.19	16.08	21.97	12.39	14.16	9.89	17.28	18.67
	慢性下呼吸道疾病		9.54	8.89	7.36	7.81	8.48	10.52	9.40	11.34	9.79	5.37	12.38	12.53	10.15
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		9.68	5.14	9.19	8.81	9.96	7.34	16.42	11.30	11.38	15.47	7.14	12.06	7.29
	高血壓性疾病		7.65	6.75	7.92	6.33	7.40	6.93	6.03	10.62	8.71	10.24	6.68	7.28	8.20
	敗血症		7.49	6.54	6.30	5.38	6.57	8.74	10.00	9.96	8.66	6.29	10.00	5.99	7.29
	事故傷害		11.05	7.57	10.13	8.07	13.30	12.65	11.90	17.56	8.47	10.77	13.73	10.14	11.37
十大死因 標準化 死亡率 區排名	所有死亡原因	區排名		11	7	12	8	9	2	1	10	3	5	6	4
	惡性腫瘤			11	6	12	7	8	1	2	10	3	4	9	5
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)			6	11	12	10	9	1	2	7	3	8	5	4
	腦血管疾病			11	6	12	7	8	1	2	10	4	3	9	5
	肺炎			8	3	12	10	6	2	1	5	7	11	9	4
	糖尿病			10	7	12	9	5	4	1	8	6	11	3	2
	慢性下呼吸道疾病			8	11	10	9	4	7	3	6	12	2	1	5
	腎炎、腎病症候 群及腎病變			12	7	8	6	9	1	5	4	2	11	3	10
	高血壓性疾病			9	5	11	6	8	12	1	3	2	10	7	4
	敗血症			8	9	12	7	4	1	3	5	10	2	11	6
	事故傷害			12	9	11	3	4	5	1	10	7	2	8	6

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續2完)

中華民國104年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	全部	人/每十 萬人口	634.72	625.44	643.32	626.09	613.19	673.29	752.95	882.14	588.76	593.01	496.40	619.46	632.93
	0歲		487.52	759.88	659.93	444.52	612.49	358.53	764.42	186.92	320.00	491.57	316.46	404.79	699.56
	1-4歲		14.36	11.13	20.21	14.72	9.96	13.45	-	-	25.13	-	23.42	8.27	26.41
	5-14歲		5.14	-	5.89	-	5.92	5.67	9.60	16.30	-	-	11.28	8.52	4.47
	15-24歲		28.04	31.09	20.48	18.17	29.88	11.50	28.87	39.90	24.31	50.34	33.09	24.51	34.31
	25-44歲		71.85	65.50	78.37	51.94	80.44	99.86	72.77	91.60	65.02	81.22	72.41	54.01	73.74
	45-64歲		393.36	316.10	385.70	300.52	392.74	351.75	503.17	600.63	349.59	388.34	386.50	406.80	432.58
	65歲以上		3,364.85	3,176.18	3,152.47	3,009.36	3,047.20	3,488.79	3,838.83	4,051.41	3,495.86	3,511.86	3,470.99	3,255.76	3,485.96
年齡別 死亡率 區排名	全部	區排名		7	4	6	9	3	2	1	11	10	12	8	5
	0歲			2	4	7	5	9	1	12	10	6	11	8	3
	1-4歲			7	4	5	8	6	10	10	2	10	3	9	1
	5-14歲			9	6	9	5	7	3	1	9	9	2	4	8
	15-24歲			5	10	11	6	12	7	2	9	1	4	8	3
	25-44歲			9	5	12	4	1	7	2	10	3	8	11	6
	45-64歲			11	8	12	5	9	2	1	10	6	7	4	3
	65歲以上			9	10	12	11	5	2	1	4	3	7	8	6

【附錄 5】主要名詞解釋與公式

本死因統計摘要係依據世界衛生組織所公告之「國際疾病與死因分類標準第十版 (ICD-10)」加註死因碼，所統計之死因為原死因 (Underlying causes of death)。

一、原 (肇始) 死因

死亡證明書上所填之死因係指所有導致死亡或與死亡相關的疾病、罹病狀況、或是造成這些傷害的意外或暴力環境等。

原死因係指(a)可引起一連串病症而導致直接死亡之疾病或傷害；(b)造成致命傷害之事故或暴力之環境。

二、孕產婦死亡

孕產婦死亡係指在懷孕期間或懷孕終止後 42 天內之婦女死亡，而不論其懷孕期長短或懷孕的位置為何；或任何與懷孕有關或因懷孕而加重之原因所導致之死亡。但不包括因事故或偶發原因所致之死亡。

孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數 * 100,000。

三、嬰兒死亡

嬰兒死亡係指嬰兒出生後未滿一歲之死亡數。

嬰兒死亡率 = 嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數 * 1,000。

四、新生兒死亡

新生兒死亡係指係指嬰兒出生後，在未滿四週（28天）內之死亡數。

新生兒死亡率 = 新生兒死亡數 / 活產嬰兒數 * 1,000。

五、年齡別死亡率

年齡別死亡率 = 年齡別死亡數 / 該年齡別年中人口數 * 100,000。

六、標準化死亡率

標準化死亡率是將兩國或兩地不同性別、年齡、城鄉、所得、職業、婚姻、種族等項組合，化成為同一的基礎，用以剔除其人口在組合上之差異，俾可受到純正而客觀的比較。本書刊所用的標準化死亡率是指去除年齡組成影響、以 WHO 2000 年世界人口結構為基準的死亡率。

標準化死亡率 = $\left[\sum (\text{年齡別死亡率} * \text{標準組年齡別人口數}) \right] / \text{標準組總人口數}$ 。