

中華民國 105 年
臺北市死因統計年報

臺北市政府衛生局編印

中華民國 106 年 10 月出版

凡 例

- 一、本年報編印之目的，係提供臺北市死因統計，以提供政府施政及學術研究之參考。
- 二、本年報內容計分：(一) 提要分析 (二) 人口統計指標 (三) 105 年死因統計 (四) 歷年死因統計 (五) 歷年主要癌症發生率等 5 類，凡 64 表；另附錄 7 表。
- 三、部分資料因尾數四捨五入，計算時仍以原始數據計算，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。
- 四、本年報各表所稱「年」係指全年；「年底」係指當年 12 月底。
- 五、本年報所用符號代表意義如下：
「—」經統計但無數據；「--」有數值，但該數值無意義；「…」數值不明或尚未產生資料；「0」代表有數值而不及半單位；「①」修正數。

目次

凡例

壹、提要分析

貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別.....	1
表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數.....	3
表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性.....	4
表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性.....	5
表F·臺北市各行政區年底人口數.....	6
表G·臺北市近十年各行政區年底人口數.....	7
表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	8
表I·臺北市近十年各行政區年中人口數.....	9

參、105年死因統計

一、主要死因統計

表 1·臺北市、全國主要死亡原因比較.....	11
表 2·ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3·ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

目 次

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因.....	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因.....	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因.....	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因.....	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因.....	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因.....	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因.....	23
表14 · ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因.....	24
表15 · ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因.....	25
表16 · ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因.....	26
表17 · ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因.....	27
表18 · ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因.....	28
表19 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因.....	29
表20 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因.....	30
表21 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式.....	31
表22 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式.....	32
表23 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式.....	33
表24 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因.....	34
表25 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況.....	35
表26 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	36
表27 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	37

目 次

二、行政區別死因統計

表28-1~28-12·ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	39
表29-1~29-12·ICD-10 臺北市十二區事故傷害死亡原因.....	51
表30-1~30-12·ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	63
表31-1~31-12·ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	75

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表32·臺北市歷年主要死亡原因.....	87
表33·臺北市歷年男性主要死亡原因.....	90
表34·臺北市歷年女性主要死亡原因.....	93
表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	96
表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	97
表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因.....	98
表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因.....	101
表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因.....	104
表40·臺北市歷年自殺死亡方式.....	107
表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	110
表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	113
表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	116
表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	118
表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	120

目 次

表46·臺北市歷年主要癌症死亡原因	122
表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因	125
表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因	128
表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	131
表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	133
表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	135
二、行政區別死因統計	
表52-1~52-12·臺北市十二區歷年主要死亡原因	137
表53-1~53-12·臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因	173
伍、歷年主要癌症發生率	
表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	209
表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	211
陸、附錄	
【附錄1】105年臺北市十大死因統計結果，慢性疾病囊括7項，癌症續居首席	213
【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較.....	225
【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較.....	229
【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標.....	236
【附錄5】主要名詞解釋與公式.....	241


壹、提要分析

105 年臺北市主要死因提要說明

一、標準化死亡率較上(104)年增加 2.2%，較 96 年則減少 8.5%

105 年臺北市市民死亡人數 1 萬 8,039 人，平均每 29 分鐘就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 668.0 人，分別較上年增加 33.3 人、5.3%；如依世界衛生組織(W.H.O.)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 332.8 人，較上年增加 2.2%，較 96 年則減少 8.5%。若與全國相較，105 年臺北市標準化死亡率較全國標準化死亡率每十萬人口 439.4 人低 24.3%，並在全國 22 縣市中，僅高於連江縣，為死亡率第二低的縣市。

依近 10 年資料觀察，剔除人口結構因素影響後臺北市市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則反之，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。(詳圖 1)




二、臺北市市民十大死因惡性腫瘤蟬連榜首

105 年臺北市市民十大死因中惡性腫瘤仍蟬居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、敗血症、事故傷害、高血壓性疾病；十大死因之死亡人數占總死亡人數 76.3%，其中仍以惡性腫瘤占 28.9% 最多，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 14.6% 次之，肺炎占 7.1% 居三。(詳表 1、圖 2)

表 1 ICD-10 105 年臺北市十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	18,039	100.0
1	惡性腫瘤	5,219	28.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,631	14.6
3	肺炎	1,274	7.1
4	腦血管疾病	1,206	6.7
5	糖尿病	829	4.6
6	慢性下呼吸道疾病	626	3.5
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	611	3.4
8	敗血症	529	2.9
9	事故傷害	457	2.5
10	高血壓性疾病	386	2.1
	其他	4,271	23.7



三、死亡年齡平均數較 96 年增加 3.6 歲

105 年臺北市民死亡年齡平均數為 75.7 歲，較全國高 3.2 歲，與 96 年比較則增加 3.6 歲，其中男性死亡年齡平均數為 74.6 歲，女性為 77.3 歲，男性較女性低 2.7 歲；十大死因中死亡年齡平均數以肺炎 84.0 歲最高，慢性下呼吸道疾病 83.4 歲次之，最低為事故傷害 64.3 歲。

若以死亡年齡中位數來看，105 年臺北市民死亡年齡中位數為 80 歲，較全國高 3 歲，與 96 年比較則增加 3 歲，其中男性死亡年齡中位數為 79 歲，女性為 81 歲，男性較女性低 2 歲；十大死因中死亡年齡中位數以肺炎 87 歲最高，慢性下呼吸道疾

病及敗血症 85 歲次之，最低為事故傷害 70 歲。(詳表 2)

表 2 ICD-10 105 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

單位：歲

死因別	所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性除外)	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	慢性下呼吸道疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	敗血症	事故傷害	高血壓性疾病	
												死亡年齡平均數
死亡年齡平均數	兩性	75.7	71.0	77.7	84.0	78.9	78.2	83.4	80.1	82.5	64.3	79.8
	男性	74.6	71.4	74.9	83.4	77.1	76.1	83.5	78.8	82.7	61.9	76.4
	女性	77.3	70.5	82.0	85.0	81.2	80.1	83.0	81.7	82.4	69.3	83.7
死亡年齡中位數	兩性	80	72	82	87	82	81	85	83	85	70	84
	男性	79	72	79	86	81	79	85	81.5	86	66	80
	女性	81	72	85	87	84	82	86	84	85	75	87


四、臺北市男性十大死因與上年同，僅順位改變

105 年臺北市男性死亡人數為 10,369 人，死亡率為每十萬男性人口 802.3 人，較上年增加 4.6%；標準化死亡率為每十萬男性人口 424.6 人，較上年增加 2.5%，較 96 年則減少 4.8%。

105 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、慢性下呼吸道疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、事故傷害、敗血症、高血壓性疾病；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 76.8%，其中仍以惡性腫瘤占 28.2% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 15.2%。(詳表 3、圖 3)

表 3 ICD-10 105 年臺北市男性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	10,369	100.0
1	惡性腫瘤	2,920	28.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,580	15.2
3	肺炎	780	7.5
4	腦血管疾病	692	6.7
5	慢性下呼吸道疾病	456	4.4
6	糖尿病	398	3.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	334	3.2
8	事故傷害	304	2.9
9	敗血症	290	2.8
10	高血壓性疾病	208	2.0
	其他	2,407	23.2




五、臺北市女性十大死因與上年同，僅順位改變

105 年臺北市女性死亡人數為 7,670 人，死亡率為每十萬女性人口 544.8 人，較上年增加 6.1%；標準化死亡率為每十萬女性人口 255.5 人，較上年增加 2.1%，較 96 年則減少 11.4%。

105 年女性十大死因之首亦為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、敗血症、血管性及未明示之癡呆症、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病及高血壓性疾病；女性十大死因死亡人數占女性總死亡人數 76.4%，其中亦以惡性腫瘤占 30.0% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 13.7%。(詳表 4、圖 4)

表 4 ICD-10 105 年臺北市女性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	7,670	100.0
1	惡性腫瘤	2,299	30.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,051	13.7
3	腦血管疾病	514	6.7
4	肺炎	494	6.4
5	糖尿病	431	5.6
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	277	3.6
7	敗血症	239	3.1
8	血管性及未明示之癡呆症	196	2.6
9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	182	2.4
10	高血壓性疾病	178	2.3
	其他	1,809	23.6



六、嬰兒(未滿1歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占5成3

105年臺北市未滿1歲嬰兒死亡人數為106人，死亡率為每十萬人口381.5人，分別較上年減少31人、減少19.6%。男嬰死亡率為每十萬人口423.8人，較上年減少18.4%；女嬰死亡率為336.0人，較上年減少21.1%。嬰兒主要死因前3項分別為(1)源於周產期的特定病況56人占52.8%，(2)先天性畸形變形及染色體異常25人占23.6%，(3)嬰兒猝死症候群(SIDS)4人占3.8%，3者合占嬰兒死亡人數的80.2%。

七、少年(1-14歲)惡性腫瘤居首位死因，占1成7

105年臺北市1-14歲少年死亡人數為47人，死亡率為每十萬人口13.5人，分別較上年增加18人、63.5%。少年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤8人占17.0%，(2)肺炎6人占12.8%，(3)事故傷害5人占10.6%，3者合占少年死亡人數的40.4%。

八、青年(15-24歲)事故傷害續居死因首位，占3成7

105年臺北市15-24歲青年死亡人數為86人，死亡率為每十萬人口29.3人，分別較上年增加2人、4.6%。青年主要死因前3項分別為(1)事故傷害32人占37.2%，(2)惡性腫瘤17人占19.8%，(3)蓄意自我傷害(自殺)13人占15.1%，3者合占青年死亡人數的72.1%。

九、壯年(25-44歲)死因之前二位為惡性腫瘤、蓄意自我傷害(自殺)

105年臺北市25-44歲壯年死亡人數為614人，死亡率為每十萬人口75.7人，分別較上年增加25人、5.4%。壯年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤190人占30.9%，(2)蓄意自我傷害(自殺)88人占14.3%，(3)心臟疾病(高血壓性除)75人占12.2%，3者合占壯年死亡人數的57.4%。

十、中年(45-64歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占4成6

105年臺北市45-64歲中年死亡人數為3,255人，死亡率為每十萬人口401.4人，分別較上年增加52人、2.1%。中年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤1,495人占45.9%，(2)心臟疾病

(高血壓性疾病除外) 453 人占 13.9%，(3)腦血管疾病 145 人占 4.5%，3 者合占中年死亡人數的 64.3%。

十一、老年(65-79 歲)死亡率以惡性腫瘤為首，占 3 成 9


105 年臺北市 65-79 歲老年死亡人數為 4,697 人，占總死亡人數的 26.0%，死亡率為每十萬人口 1,542.8 人，較上年減少 0.5%。65-79 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,821 人占 38.8%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 613 人占 13.1%，(3)腦血管疾病 291 人占 6.2%，3 者合占 65-79 歲老年死亡人數的 58.1%。

十二、老年(80 歲以上)死亡率亦以惡性腫瘤為首，占 1 成 8

105 年臺北市 80 歲以上老年死亡人數為 9,234 人，占總死亡人數的 51.2%，死亡率為每十萬人口 8,818.9 人，較上年增加 5.0%。80 歲以上老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,686 人占 18.3%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)1,483 人占 16.1%，(3)肺炎 957 人占 10.4%，3 者合占 80 歲以上老年死亡人數的 44.8%。

十三、行政區以萬華區標準化死亡率最高，大同區次之

105 年臺北市 12 個行政區死亡率以萬華區每十萬人口 898.7 人最高，大同區 737.9 人次之，內湖區 518.3 人最低；標準化後萬華區每十萬人口 414.0 人仍為最高，大同區 393.8 人次之，大安區 275.3 人最低。(詳圖 5)



十四、惡性腫瘤(癌症)

(一)「氣管、支氣管和肺癌」、「結腸、直腸和肛門癌」、「肝和肝內膽管癌」續居癌症死因前三位


105 年臺北市惡性腫瘤死亡人數為 5,219 人，占總死亡人數之 28.9%，死亡率為每十萬人口 193.3 人，較上年增加 4.0%；標準化死亡率為每十萬人口 105.0 人，較上年增加 2.1%，較 96 年則減少 11.2%。

105 年臺北市十大癌症死因中氣管、支氣管和肺癌仍居榜首，其次依序為結腸、直腸和肛門癌、肝和肝內膽管癌、女性乳房癌、前列腺(攝護腺)癌、胃癌、胰臟癌、口腔癌、卵巢癌、

非何杰金氏淋巴瘤；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數 75.6%，其中氣管、支氣管和肺癌占 20.5% 最多，結腸、直腸和肛門癌占 12.9% 次之，肝和肝內膽管癌占 12.9% 再次之。（詳表 5、圖 6）

表 5. ICD-10 105 年臺北市十大癌症死因

單位：人、%			
順位	癌症死因	死亡人數	死亡百分比
	所有癌症死因	5,219	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	1,070	20.5
2	結腸、直腸和肛門癌	675	12.9
2	肝和肝內膽管癌	672	12.9
4	女性乳房癌	302	5.8
5	前列腺(攝護腺)癌	167	3.2
6	胃癌	311	6.0
7	胰臟癌	260	5.0
8	口腔癌	208	4.0
9	卵巢癌	107	2.1
10	非何杰金氏淋巴瘤	174	3.3
	其他	1,273	24.4



(二) 男性癌症標準化死亡率較上年增加 0.5%、女性則增加 4.1%，惟男性癌症標準化死亡率仍為女性的 1.5 倍

105 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性為 2,920 人，女性為 2,299 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 127.8 人、每十萬女性人口 85.9 人，男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性增加 2.3%、女性增加 5.9%，標準化死亡率男性增加 0.5%，女性亦增加 4.1%。

105 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 71.0 歲，較全國高 2.4 歲，與 96 年比較則增加 1.7 歲，其中男性死亡年齡平均數為 71.4 歲，女性為 70.5 歲。105 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平

均數以前列腺(攝護腺)癌 82.2 歲最高，胃癌 73.8 歲次之，最低為卵巢癌 63.1 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，105 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 72 歲，較全國高 3 歲，與 96 年相同，其中男性死亡年齡中位數為 72 歲，女性為 72 歲。105 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡中位數以前列腺(攝護腺)癌 84 歲最高，胃癌及非何杰金氏淋巴瘤 76 歲次之，最低為女性乳房癌 62 歲。(詳表 6)

表 6. ICD-10 105 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數
單位：歲

死因別	所有癌症死因	氣管、支氣管和肺癌	結腸、直腸和肛門癌	肝和肝內膽管癌	女性乳房癌	前列腺(攝護腺)癌	胃癌	胰臟癌	口腔癌	卵巢癌	非何杰金氏淋巴瘤
		死亡年齡平均數	71.0	73.1	73.2	70.8	63.4	82.2	73.8	71.8	63.5
兩性	71.4	73.5	73.2	68.7	--	82.2	74.7	71.1	62.2	--	74.0
男性	70.5	72.4	73.3	74.5	63.4	--	72.2	72.8	71.3	63.1	76.3
女性	72	74	75	72	62	84	76	72	62.5	63	76
死亡年齡中位數	72	74	75	69	--	84	76	70	61	--	73
兩性	72	73	76	77	62	--	76	73	72.5	63	78
男性											
女性											

貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別

中華民國105年

項 目	單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積	平方公里	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度	人/平方公里	9,918	22,430	20,327	27,418	16,901	21,086	22,894	21,863	8,735	5,609	9,112	4,649	4,529
年底人口數	人	2,695,704	208,326	227,823	311,506	231,247	160,403	130,071	193,539	275,231	122,516	287,733	289,939	257,370
男性		1,289,510	97,953	108,923	145,617	107,850	76,610	63,469	95,212	132,153	59,907	137,619	140,011	124,186
女性		1,406,194	110,373	118,900	165,889	123,397	83,793	66,602	98,327	143,078	62,609	150,114	149,928	133,184
性比例		91.70	88.75	91.61	87.78	87.40	91.43	95.30	96.83	92.36	95.68	91.68	93.39	93.24
出生數	人	27,992	1,970	2,417	2,876	2,446	1,608	1,444	2,089	2,807	1,465	3,193	3,019	2,658
粗出生率	‰	10.37	9.42	10.58	9.21	10.58	9.96	11.07	10.77	10.20	11.97	11.10	10.40	10.32
死亡數	人	17,982	1,334	1,642	2,047	1,522	1,109	950	1,785	1,791	775	1,482	1,848	1,697
粗死亡率	‰	6.66	6.38	7.19	6.55	6.58	6.87	7.28	9.20	6.51	6.33	5.15	6.37	6.59
人口增加率		-3.37	-6.62	-6.06	-4.96	-0.45	-12.75	-6.55	-4.12	-0.49	2.22	0.58	-2.60	-1.91
自然增加率	‰	3.71	3.04	3.39	2.65	3.99	3.09	3.79	1.57	3.69	5.64	5.95	4.03	3.73
社會增加率		-7.08	-9.68	-9.47	-7.62	-4.44	-15.93	-10.36	-5.69	-4.18	-3.42	-5.37	-6.63	-5.64
14歲以下年底人口數(a)	人 比重(%)	375,128 13.92	31,333 15.04	28,658 12.58	47,306 15.19	29,214 12.63	25,951 16.18	17,659 13.58	22,469 11.61	39,480 14.34	16,840 13.75	42,345 14.72	38,064 13.13	35,809 13.91
15-64歲年底人口數(b)	人 比重(%)	1,901,446 70.54	141,425 67.89	160,799 70.58	206,982 66.45	164,686 71.22	108,042 67.36	91,694 70.50	137,348 70.97	197,201 71.65	89,030 72.67	214,031 74.39	206,225 71.13	183,983 71.49
65歲以上年底人口數(c)	人 比重(%)	419,130 15.55	35,568 17.07	38,366 16.84	57,218 18.37	37,347 16.15	26,410 16.46	20,718 15.93	33,722 17.42	38,550 14.01	16,646 13.59	31,357 10.90	45,650 15.74	37,578 14.60
扶養比 (a+c)/b	%	41.77	47.30	41.68	50.50	40.42	48.46	41.85	40.91	39.57	37.61	34.44	40.59	39.89
扶幼比 a/b		19.73	22.16	17.82	22.86	17.74	24.02	19.26	16.36	20.02	18.91	19.78	18.46	19.46
扶老比 c/b		22.04	25.15	23.86	27.64	22.68	24.44	22.59	24.55	19.55	18.70	14.65	22.14	20.42
老化指數 c/a		111.73	113.52	133.88	120.95	127.84	101.77	117.32	150.08	97.64	98.85	74.05	119.93	104.94

資料來源：本府民政局。

附註：本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
87	75.76	73.12	78.93	79.11	77.06	81.48
88	75.90	73.33	78.98	79.48	77.47	81.78
89	76.46	73.83	79.56	79.85	77.78	82.24
90	76.75	74.07	79.92	80.08	78.05	82.38
91	77.19	74.58	80.24	80.36	78.34	82.60
92	77.35	74.77	80.33	80.61	78.64	82.76
93	77.48	74.68	80.75	80.99	78.92	83.20
94	77.42	74.50	80.80	81.17	78.94	83.55
95	77.90	74.86	81.41	81.58	79.19	84.13
96	78.38	75.46	81.72	81.79	79.41	84.31
97	78.57	75.59	81.94	81.99	79.70	84.38
98	79.01	76.03	82.34	82.16	79.86	84.53
99	79.18	76.13	82.55	82.42	80.06	84.81
100	79.15	75.96	82.63	82.70	80.18	85.25
101	79.51	76.43	82.82	82.66	80.00	85.33
102	80.02	76.91	83.36	82.90	80.18	85.63
103	79.84	76.72	83.19	83.10	80.33	85.89
104	80.20	77.01	83.62	83.43	80.64	86.25
105	80.00	76.81	83.42	83.36	80.54	86.18

資料來源：內政部。

附註：本市配合內政部縣市數據公布係以近3年合併人口編算，例105年平均餘命採103-105年，104年則採102-104年3年合併人口計算。

表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數

年 別	總 計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
96年	2,630,756	20,497	93,288	314,682	334,216	837,173	720,426	310,474	
97年	2,626,096	20,251	90,589	304,529	325,271	827,928	738,785	318,745	
98年	2,615,176	19,295	88,872	292,745	317,673	815,122	755,775	325,696	
99年	2,613,100	18,733	89,279	280,706	313,173	808,277	772,772	330,161	
100年	2,634,870	21,842	92,078	269,451	312,649	813,915	789,884	335,053	
101年	2,662,097	27,281	96,621	259,149	313,265	821,078	801,277	343,428	
102年	2,679,871	27,573	105,081	250,714	309,256	823,715	807,903	355,631	
103年	2,694,416	27,029	112,644	243,526	303,418	823,648	812,586	371,566	
104年	2,703,563	28,102	118,347	233,663	299,539	819,784	814,274	389,855	
105年	2,700,257	27,296	122,333	226,649	293,139	810,848	810,837	409,156	
				百 分 比 (%)					
96年	100.00	0.78	3.55	11.96	12.70	31.82	27.38	11.80	
97年	100.00	0.77	3.45	11.60	12.39	31.53	28.13	12.14	
98年	100.00	0.74	3.40	11.19	12.15	31.17	28.90	12.45	
99年	100.00	0.72	3.42	10.74	11.98	30.93	29.57	12.63	
100年	100.00	0.83	3.49	10.23	11.87	30.89	29.98	12.72	
101年	100.00	1.02	3.63	9.73	11.77	30.84	30.10	12.90	
102年	100.00	1.03	3.92	9.36	11.54	30.74	30.15	13.27	
103年	100.00	1.00	4.18	9.04	11.26	30.57	30.16	13.79	
104年	100.00	1.04	4.38	8.64	11.08	30.32	30.12	14.42	
105年	100.00	1.01	4.53	8.39	10.86	30.03	30.03	15.15	

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性

年 別	男性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
96年	1,280,124	10,599	48,784	163,958	171,984	391,825	340,865	152,110	
97年	1,274,252	10,466	47,357	158,589	167,692	387,224	348,609	154,316	
98年	1,265,699	9,980	46,379	152,510	164,019	381,047	355,766	156,000	
99年	1,261,502	9,708	46,394	146,399	161,906	377,421	363,045	156,630	
100年	1,269,449	11,286	47,666	140,732	161,751	380,130	370,322	157,563	
101年	1,280,852	14,085	49,976	135,392	162,067	384,448	374,796	160,090	
102年	1,287,653	14,262	54,260	130,921	160,134	386,721	376,956	164,401	
103年	1,292,791	13,863	58,061	127,147	157,322	387,679	378,315	170,405	
104年	1,295,549	14,457	60,873	121,979	155,310	387,029	378,491	177,413	
105年	1,292,486	14,147	62,918	118,216	151,765	384,095	376,393	184,953	
				百 分 比 (%)					
96年	100.00	0.83	3.81	12.81	13.43	30.61	26.63	11.88	
97年	100.00	0.82	3.72	12.45	13.16	30.39	27.36	12.11	
98年	100.00	0.79	3.66	12.05	12.96	30.11	28.11	12.33	
99年	100.00	0.77	3.68	11.61	12.83	29.92	28.78	12.42	
100年	100.00	0.89	3.75	11.09	12.74	29.94	29.17	12.41	
101年	100.00	1.10	3.90	10.57	12.65	30.02	29.26	12.50	
102年	100.00	1.11	4.21	10.17	12.44	30.03	29.27	12.77	
103年	100.00	1.07	4.49	9.84	12.17	29.99	29.26	13.18	
104年	100.00	1.12	4.70	9.42	11.99	29.87	29.21	13.69	
105年	100.00	1.09	4.87	9.15	11.74	29.72	29.12	14.31	

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性

年 別	女性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
96年	1,350,632	9,898	44,504	150,725	162,232	445,348	379,562	158,364	
97年	1,351,844	9,786	43,232	145,940	157,579	440,704	390,176	164,429	
98年	1,349,477	9,316	42,493	140,235	153,654	434,075	400,009	169,696	
99年	1,351,598	9,025	42,885	134,307	151,268	430,856	409,727	173,531	
100年	1,365,422	10,556	44,412	128,720	150,898	433,785	419,562	177,490	
101年	1,381,245	13,196	46,646	123,757	151,199	436,630	426,481	183,338	
102年	1,392,218	13,312	50,821	119,793	149,123	436,994	430,947	191,230	
103年	1,401,625	13,166	54,583	116,379	146,097	435,969	434,271	201,161	
104年	1,408,014	13,645	57,474	111,685	144,230	432,755	435,784	212,442	
105年	1,407,771	13,150	59,416	108,433	141,374	426,753	434,444	224,203	
				百 分 比 (%)					
96年	100.00	0.73	3.30	11.16	12.01	32.97	28.10	11.73	
97年	100.00	0.72	3.20	10.80	11.66	32.60	28.86	12.16	
98年	100.00	0.69	3.15	10.39	11.39	32.17	29.64	12.57	
99年	100.00	0.67	3.17	9.94	11.19	31.88	30.31	12.84	
100年	100.00	0.77	3.25	9.43	11.05	31.77	30.73	13.00	
101年	100.00	0.96	3.38	8.96	10.95	31.61	30.88	13.27	
102年	100.00	0.96	3.65	8.60	10.71	31.39	30.95	13.74	
103年	100.00	0.94	3.89	8.30	10.42	31.10	30.98	14.35	
104年	100.00	0.97	4.08	7.93	10.24	30.74	30.95	15.09	
105年	100.00	0.93	4.22	7.70	10.04	30.31	30.86	15.93	

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F·臺北市各行政區年齡別年底人口數

中華民國105年底

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
105年底人口數	2,695,704	208,326	227,823	311,506	231,247	160,403	130,071	193,539	275,231	122,516	287,733	289,939	257,370
0歲	26,809	1,884	2,323	2,772	2,362	1,540	1,372	2,011	2,682	1,406	3,053	2,868	2,536
1-4	122,806	9,189	10,196	14,011	10,346	7,636	6,180	8,684	12,360	6,078	13,693	12,689	11,744
5-9	111,067	9,805	8,197	15,141	8,452	8,022	4,976	5,941	11,714	4,717	12,647	10,892	10,563
10-14	114,446	10,455	7,942	15,382	8,054	8,753	5,131	5,833	12,724	4,639	12,952	11,615	10,966
15-19	139,035	10,890	10,926	16,152	10,578	8,419	6,302	8,748	15,738	6,434	16,573	14,881	13,394
20-24	149,903	10,876	12,624	15,844	11,998	8,132	6,872	10,525	16,572	7,083	18,192	16,487	14,698
25-29	156,428	10,783	13,660	15,004	13,336	8,233	7,627	11,702	15,832	7,698	19,079	17,732	15,742
30-34	201,232	13,448	17,481	19,226	17,702	10,969	10,299	15,605	20,075	10,231	23,235	22,726	20,235
35-39	236,650	16,917	20,119	24,416	20,772	13,606	12,374	17,932	23,422	12,201	26,019	25,426	23,446
40-44	210,866	16,780	17,429	23,901	17,959	13,032	10,160	14,621	22,338	10,233	22,481	21,523	20,409
45-49	204,890	16,200	16,869	23,681	17,686	12,096	9,560	14,096	22,667	9,332	22,082	21,284	19,337
50-54	206,063	15,513	17,519	23,388	18,432	11,562	9,666	14,917	22,111	9,094	23,322	21,514	19,025
55-59	201,803	15,036	17,203	22,509	18,274	11,170	9,448	14,892	20,116	8,589	22,943	22,456	19,167
60-64	194,576	14,982	16,969	22,861	17,949	10,823	9,386	14,310	18,330	8,135	20,105	22,196	18,530
65-69	152,844	12,998	14,028	20,424	14,099	9,282	7,255	11,402	13,867	6,226	12,500	16,908	13,855
70-74	88,216	7,649	8,322	12,070	7,757	5,293	4,412	6,939	8,155	3,629	6,237	9,612	8,141
75-79	72,967	5,972	6,493	9,695	6,420	4,616	4,027	6,351	6,500	3,003	5,100	8,157	6,633
80-84	49,602	4,052	4,346	6,799	4,501	3,348	2,773	4,398	4,411	1,832	3,535	5,326	4,281
85-89	34,799	2,993	3,156	4,896	2,982	2,326	1,438	3,049	3,467	1,287	2,596	3,614	2,995
90-94	15,934	1,446	1,564	2,494	1,232	1,160	611	1,240	1,667	530	1,125	1,566	1,299
95-99	4,058	378	386	724	303	327	167	284	415	127	228	393	326
100歲以上	710	80	71	116	53	58	35	59	68	12	36	74	48

資料來源：本府民政局。

表G·臺北市近十年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	96年底	97年底	98年底	99年底	100年底	101年底	102年底	103年底	104年底	105年底
臺北市	2,629,269	2,622,923	2,607,428	2,618,772	2,650,968	2,673,226	2,686,516	2,702,315	2,704,810	2,695,704
松山區	210,986	210,097	207,995	208,434	209,948	210,905	210,343	210,473	209,714	208,326
信義區	228,868	227,770	225,364	225,092	226,541	227,734	228,496	229,657	229,211	227,823
大安區	314,924	313,848	311,612	311,565	313,846	313,426	313,363	313,693	313,058	311,506
中山區	218,483	218,841	218,245	220,126	224,102	226,659	228,753	230,496	231,350	231,247
中正區	159,486	159,337	158,752	159,536	161,449	162,154	163,140	163,388	162,475	160,403
大同區	126,128	124,653	123,399	124,600	126,640	128,809	129,820	130,973	130,929	130,071
萬華區	192,470	190,361	188,437	189,099	190,855	192,628	193,480	194,715	194,339	193,539
文山區	261,666	261,719	260,869	262,307	266,442	269,310	271,341	273,921	275,367	275,231
南港區	113,716	113,672	113,149	114,023	116,131	118,490	119,752	121,257	122,245	122,516
內湖區	265,518	266,808	267,704	270,245	275,652	280,025	282,842	285,767	287,566	287,733
士林區	287,048	286,065	283,855	284,539	287,072	288,894	289,742	290,455	290,694	289,939
北投區	249,976	249,752	248,047	249,206	252,290	254,192	255,444	257,520	257,862	257,370

資料來源：本府民政局。

表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數

中華民國105年中

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
105年中人口數	2,700,257	209,020	228,517	312,282	231,299	161,439	130,500	193,939	275,299	122,381	287,650	290,317	257,616
0歲	27,296	1,903	2,351	2,833	2,360	1,606	1,376	2,048	2,769	1,410	3,126	2,889	2,628
1-4	122,333	9,199	10,162	13,965	10,369	7,633	6,207	8,661	12,309	6,034	13,508	12,584	11,705
5-9	109,992	9,725	8,143	14,863	8,294	8,025	4,923	5,888	11,631	4,663	12,494	10,888	10,458
10-14	116,657	10,648	8,172	15,613	8,199	8,928	5,210	5,960	12,952	4,735	13,227	11,798	11,218
15-19	142,901	11,240	11,198	16,639	10,858	8,721	6,533	8,935	16,158	6,529	17,094	15,264	13,736
20-24	150,238	10,858	12,667	15,808	12,041	8,170	6,909	10,622	16,436	7,120	18,265	16,596	14,749
25-29	156,889	10,798	13,733	15,050	13,339	8,255	7,686	11,744	15,829	7,739	19,104	17,851	15,764
30-34	208,586	13,950	18,151	20,002	18,359	11,376	10,744	16,246	20,741	10,614	23,807	23,519	21,080
35-39	237,436	17,080	20,243	24,694	20,763	13,796	12,392	17,973	23,598	12,156	26,009	25,330	23,406
40-44	207,938	16,671	17,133	23,613	17,716	12,891	9,953	14,352	22,057	9,992	22,121	21,268	20,175
45-49	206,140	16,272	17,079	23,830	17,841	12,182	9,652	14,185	22,841	9,361	22,283	21,399	19,218
50-54	207,107	15,637	17,586	23,536	18,508	11,641	9,685	14,932	22,020	9,056	23,616	21,685	19,208
55-59	203,386	15,208	17,393	22,745	18,345	11,329	9,566	14,986	20,126	8,690	23,032	22,718	19,251
60-64	194,204	15,097	17,022	23,093	17,957	10,882	9,394	14,315	18,197	8,085	19,606	22,128	18,431
65-69	144,631	12,434	13,341	19,552	13,298	8,876	6,864	10,763	13,091	5,846	11,595	15,907	13,067
70-74	88,117	7,566	8,304	11,960	7,712	5,309	4,437	7,052	8,092	3,660	6,234	9,629	8,163
75-79	71,701	5,821	6,340	9,519	6,301	4,615	4,035	6,278	6,383	2,929	5,027	7,986	6,468
80-84	49,821	4,067	4,353	6,794	4,580	3,369	2,736	4,429	4,436	1,828	3,574	5,356	4,301
85-89	34,748	3,005	3,206	4,944	2,935	2,312	1,409	3,019	3,524	1,288	2,592	3,544	2,975
90-94	15,593	1,402	1,510	2,444	1,193	1,157	594	1,233	1,642	516	1,097	1,544	1,263
95-99	3,819	365	362	665	284	310	159	267	407	122	209	364	308
100歲以上	728	79	74	126	53	62	40	59	66	13	33	76	50

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I·臺北市近十年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年
臺北市	2,630,756	2,626,096	2,615,176	2,613,100	2,634,870	2,662,097	2,679,871	2,694,416	2,703,563	2,700,257
松山區	210,204	210,542	209,046	208,215	209,191	210,427	210,624	210,408	210,094	209,020
信義區	230,172	228,319	226,567	225,228	225,817	227,138	228,115	229,077	229,434	228,517
大安區	314,548	314,386	312,730	311,589	312,706	313,636	313,395	313,528	313,376	312,282
中山區	219,033	218,662	218,543	219,186	222,114	225,381	227,706	229,625	230,923	231,299
中正區	159,045	159,412	159,045	159,144	160,493	161,802	162,647	163,264	162,932	161,439
大同區	126,526	125,391	124,026	124,000	125,620	127,725	129,315	130,397	130,951	130,500
萬華區	193,675	191,416	189,399	188,768	189,977	191,742	193,054	194,098	194,527	193,939
文山區	261,542	261,693	261,294	261,588	264,375	267,876	270,326	272,631	274,644	275,299
南港區	113,487	113,694	113,411	113,586	115,077	117,311	119,121	120,505	121,751	122,381
內湖區	265,071	266,163	267,256	268,975	272,949	277,839	281,434	284,305	286,667	287,650
士林區	287,630	286,557	284,960	284,197	285,806	287,983	289,318	290,099	290,575	290,317
北投區	249,825	249,864	248,900	248,627	250,748	253,241	254,818	256,482	257,691	257,616

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

參、105 年死因統計

一、主要死因統計

表1·ICD-10 臺北市、全國主要死亡原因比較
中華民國105年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾病碼 ICD 10	死亡原因	臺北市					全國				
		順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
A00-Y98	所有死亡原因		18,039	668.05	332.75	100.00		172,418	733.20	439.36	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	5,219	193.28	105.00	28.93	1	47,760	203.10	126.76	27.70
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,631	97.44	45.78	14.59	2	20,812	88.50	50.34	12.07
J12-J18	肺炎	3	1,274	47.18	19.36	7.06	3	12,212	51.93	26.92	7.08
I60-I69	腦血管疾病	4	1,206	44.66	20.76	6.69	4	11,846	50.37	28.59	6.87
E10-E14	糖尿病	5	829	30.70	14.50	4.60	5	9,960	42.35	24.51	5.78
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	626	23.18	9.64	3.47	7	6,787	28.86	15.08	3.94
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	611	22.63	10.24	3.39	9	5,226	22.22	12.44	3.03
A40-A41	敗血症	8	529	19.59	8.15	2.93	11	3,787	16.10	8.87	2.20
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	457	16.92	11.14	2.53	6	7,206	30.64	23.07	4.18
I10-I15	高血壓性疾病	10	386	14.29	6.37	2.14	8	5,881	25.01	13.48	3.41
	其他		4,271	158.17	81.82	23.68		40,941	174.10	109.30	23.75
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	11	344	12.74	4.40	1.91	14	1,622	6.90	3.18	0.94
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	319	11.81	4.67	1.77	13	1,715	7.29	4.20	0.99
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13	308	11.41	8.38	1.71	12	3,765	16.01	12.29	2.18
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	279	10.33	5.97	1.55	10	4,738	20.15	13.39	2.75
G20-G21	帕金森病	15	206	7.63	3.29	1.14	17	1,167	4.96	2.62	0.68

資料來源：衛生福利部。

表2. ICD-10 全國縣市別死亡概況

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口

縣市別	總 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
總 計	172,418	733.20	439.36	102,985	879.04	569.11	69,433	588.40	321.24
新北市	23,190	583.41	402.34	14,174	726.18	523.99	9,016	445.66	295.88
臺北市	18,039	668.05	332.75	10,369	802.25	424.60	7,670	544.83	255.48
桃園市	12,681	596.26	427.72	8,005	753.57	547.59	4,676	439.27	316.33
臺中市	16,892	612.95	434.80	10,059	738.73	554.95	6,833	490.11	328.01
臺南市	15,241	808.20	461.43	8,827	935.62	591.15	6,414	680.64	342.93
高雄市	21,331	767.54	478.15	12,950	938.39	616.58	8,381	599.02	351.60
宜蘭縣	3,837	838.09	445.32	2,251	970.39	573.58	1,586	702.21	323.19
新竹縣	3,781	694.07	442.86	2,301	825.55	566.99	1,480	556.31	319.04
苗栗縣	5,079	904.46	474.32	2,965	1,023.83	606.30	2,114	777.34	339.07
彰化縣	10,444	810.80	447.79	6,107	928.60	590.64	4,337	687.92	314.88
南投縣	4,981	981.81	503.33	2,990	1,149.18	661.89	1,991	805.61	348.12
雲林縣	7,249	1,039.65	506.79	4,173	1,151.47	663.37	3,076	918.63	350.26
嘉義縣	5,757	1,112.29	498.22	3,372	1,251.69	660.38	2,385	960.98	336.10
屏東縣	8,505	1,014.28	562.14	5,162	1,202.32	727.57	3,343	816.99	399.03
臺東縣	2,570	1,159.61	642.03	1,579	1,376.76	833.29	991	926.71	447.34
花蓮縣	3,390	1,022.85	575.39	2,161	1,279.80	767.14	1,229	755.97	389.44
澎湖縣	975	948.60	459.97	589	1,112.15	624.16	386	774.74	298.90
基隆市	2,929	787.15	443.09	1,723	922.71	563.36	1,206	650.59	334.35
新竹市	2,700	619.69	415.80	1,585	735.50	526.97	1,115	506.36	318.41
嘉義市	2,056	761.14	446.61	1,203	913.73	589.50	853	616.06	324.30
金門縣	739	551.67	337.69	411	612.69	427.78	328	490.47	250.81
連江縣	52	413.65	266.79	29	404.21	295.95	23	426.20	229.26

資料來源：衛生福利部。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3·ICD-10 臺北市主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有死亡原因	18,039	668.05	332.75	100.00	所有死亡原因	10,369	802.25	424.60	100.00	所有死亡原因	7,670	544.83	255.48	100.00
1	惡性腫瘤	5,219	193.28	105.00	28.93	惡性腫瘤	2,920	225.92	127.78	28.16	惡性腫瘤	2,299	163.31	85.94	29.97
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,631	97.44	45.78	14.59	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,580	122.25	63.29	15.24	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,051	74.66	31.13	13.70
3	肺炎	1,274	47.18	19.36	7.06	肺炎	780	60.35	26.06	7.52	腦血管疾病	514	36.51	15.42	6.70
4	腦血管疾病	1,206	44.66	20.76	6.69	腦血管疾病	692	53.54	27.20	6.67	肺炎	494	35.09	13.78	6.44
5	糖尿病	829	30.70	14.50	4.60	慢性下呼吸道疾病	456	35.28	15.27	4.40	糖尿病	431	30.62	13.33	5.62
6	慢性下呼吸道疾病	626	23.18	9.64	3.47	糖尿病	398	30.79	15.92	3.84	腎炎、腎病症候群及腎病變	277	19.68	8.33	3.61
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	611	22.63	10.24	3.39	腎炎、腎病症候群及腎病變	334	25.84	12.57	3.22	敗血症	239	16.98	6.93	3.12
8	敗血症	529	19.59	8.15	2.93	事故傷害	304	23.52	16.38	2.93	血管性及未明示之癱瘓症	196	13.92	4.73	2.56
9	事故傷害	457	16.92	11.14	2.53	敗血症	290	22.44	9.62	2.80	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	182	12.93	5.01	2.37
10	高血壓性疾病	386	14.29	6.37	2.14	高血壓性疾病	208	16.09	8.07	2.01	高血壓性疾病	178	12.64	4.98	2.32
	其他	4,271	158.17	81.82	23.68	其他	2,407	186.23	102.44	23.21	其他	1,809	128.50	65.89	23.59
11	血管性及未明示之癱瘓症	344	12.74	4.40	1.91	蓄意自我傷害（自殺）	197	15.24	11.07	1.90	慢性下呼吸道疾病	170	12.08	4.96	2.22
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	319	11.81	4.67	1.77	慢性肝病及肝硬化	190	14.70	9.09	1.83	事故傷害	153	10.87	6.37	1.99
13	蓄意自我傷害（自殺）	308	11.41	8.38	1.71	血管性及未明示之癱瘓症	148	11.45	4.06	1.43	蓄意自我傷害（自殺）	111	7.88	6.09	1.45
14	慢性肝病及肝硬化	279	10.33	5.97	1.55	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	137	10.60	4.36	1.32	慢性肝病及肝硬化	89	6.32	3.25	1.16
15	帕金森病	206	7.63	3.29	1.14	帕金森病	130	10.06	4.51	1.25	帕金森病	76	5.40	2.27	0.99

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為 2,700,257 人，其中男性為 1,292,486 人，女性為 1,407,771 人。

表4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	18,039	668.05	106	388.34	47	13.47	86	29.34	614	75.72	3,255	401.44	4,697	1,542.79	9,234	8,818.85
1	C00-C97	惡性腫瘤	5,219	193.28	2	7.33	8	2.29	17	5.80	190	23.43	1,495	184.38	1,821	598.13	1,686	1,610.20
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,631	97.44	1	3.66	4	1.15	2	0.68	75	9.25	453	55.87	613	201.35	1,483	1,416.33
3	J12-J18	肺炎	1,274	47.18	1	3.66	6	1.72	1	0.34	12	1.48	69	8.51	228	74.89	957	913.97
4	I60-I69	腦血管疾病	1,206	44.66	-	-	-	-	3	1.02	36	4.44	145	17.88	291	95.58	731	698.14
5	E10-E14	糖尿病	829	30.70	-	-	-	-	-	-	11	1.36	109	13.44	264	86.71	445	424.99
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	626	23.18	-	-	1	0.29	-	-	4	0.49	34	4.19	124	40.73	463	442.18
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	611	22.63	-	-	-	-	-	-	5	0.62	70	8.63	172	56.50	364	347.64
8	A40-A41	敗血症	529	19.59	-	-	-	-	1	0.34	6	0.74	47	5.80	95	31.20	380	362.92
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	457	16.92	1	3.66	5	1.43	32	10.92	56	6.91	107	13.20	104	34.16	152	145.17
10	I10-I15	高血壓性 其他	386	14.29	-	-	-	-	-	-	8	0.99	57	7.03	83	27.26	238	227.30
		其他	4,271	158.17	101	370.02	23	6.59	30	10.23	211	26.02	669	82.51	902	296.27	2,335	2,230.02
11	F01-F03	血管性及未明示之癱 呆症	344	12.74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	28	9.20	315	300.84
12	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	319	11.81	2	7.33	-	-	-	-	7	0.86	19	2.34	43	14.12	248	236.85
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	308	11.41	-	-	-	-	13	4.43	88	10.85	106	13.07	67	22.01	34	32.47
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	279	10.33	-	-	-	-	-	-	15	1.85	113	13.94	89	29.23	62	59.21
15	G20-G21	帕金森病	206	7.63	-	-	-	-	1	0.34	-	-	9	1.11	52	17.08	144	137.53

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為人 2,700,257。

表5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況
中華民國105年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	10,369	802.25	61	431.20	24	13.25	60	39.53	381	99.19	2,107	559.79	2,778	2,037.34	4,958	10,201.96
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,920	225.92	1	7.07	5	2.76	11	7.25	83	21.61	823	218.65	1,029	754.65	968	1,991.83
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,580	122.25	-	-	2	1.10	1	0.66	64	16.66	365	96.97	392	287.49	756	1,555.60
3	J12-J18	肺炎	780	60.35	1	7.07	2	1.10	1	0.66	10	2.60	48	12.75	153	112.21	565	1,162.59
4	I60-I69	腦血管疾病	692	53.54	-	-	-	-	3	1.98	23	5.99	102	27.10	182	133.48	382	786.03
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	456	35.28	-	-	-	-	-	-	3	0.78	21	5.58	96	70.40	336	691.38
6	E10-E14	糖尿病	398	30.79	-	-	-	-	-	-	9	2.34	70	18.60	137	100.47	182	374.50
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	334	25.84	-	-	-	-	-	-	3	0.78	49	13.02	94	68.94	188	386.84
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	304	23.52	-	-	4	2.21	27	17.79	41	10.67	78	20.72	61	44.74	93	191.36
9	A40-A41	敗血症	290	22.44	-	-	-	-	-	-	2	0.52	26	6.91	55	40.34	207	425.94
10	I10-I15	高血壓性 疾病	208	16.09	-	-	-	-	-	-	7	1.82	45	11.96	48	35.20	108	222.23
		其他	2,407	186.23	59	417.06	11	6.07	17	11.20	136	35.41	480	127.53	531	389.43	1,173	2,413.65
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	197	15.24	-	-	-	-	7	4.61	50	13.02	72	19.13	41	30.07	27	55.56
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	190	14.70	-	-	-	-	-	-	15	3.91	93	24.71	48	35.20	34	69.96
13	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	148	11.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10.27	134	275.73
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	137	10.60	1	7	-	-	-	-	2	0.52	6	1.59	25	18.33	103	211.94
15	G20-G21	帕金森病	130	10.06	-	-	-	-	1	0.66	-	-	3	0.80	34	24.94	92	189.31

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,292,486人。

表6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況
中華民國105年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
	A00-Y98	總計	7,670	544.83	45	342.22	23	13.70	26	18.39	233	54.60	1,148	264.25	1,919	1,141.62	4,276	7,620.88
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,299	163.31	1	7.60	3	1.79	6	4.24	107	25.07	672	154.68	792	471.16	718	1,279.65
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,051	74.66	1	7.60	2	1.19	1	0.71	11	2.58	88	20.26	221	131.47	727	1,295.69
3	I60-I69	腦血管疾病	514	36.51	-	-	-	-	-	-	13	3.05	43	9.90	109	64.84	349	622.00
4	J12-J18	肺炎	494	35.09	-	-	4	2.38	-	-	2	0.47	21	4.83	75	44.62	392	698.64
5	E10-E14	糖尿病	431	30.62	-	-	-	-	-	-	2	0.47	39	8.98	127	75.55	263	468.73
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	277	19.68	-	-	-	-	-	-	2	0.47	21	4.83	78	46.40	176	313.68
7	A40-A41	敗血症	239	16.98	-	-	-	-	1	0.71	4	0.94	21	4.83	40	23.80	173	308.33
8	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	196	13.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	14	8.33	181	322.59
9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	182	12.93	1	7.60	-	-	-	-	5	1.17	13	2.99	18	10.71	145	258.43
10	I10-I15	高血壓性疾病	178	12.64	-	-	-	-	-	-	1	0.23	12	2.76	35	20.82	130	231.69
		其他	1,809	128.50	42	319.40	14	8.34	18	12.73	86	20.15	217	49.95	410	243.91	1,022	1,821.45
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	170	12.08	-	-	1	0.60	-	-	1	0.23	13	2.99	28	16.66	127	226.35
12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	153	10.87	1	7.60	1	0.60	5	3.54	15	3.51	29	6.68	43	25.58	59	105.15
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	111	7.88	-	-	-	-	6	4.24	38	8.90	34	7.83	26	15.47	7	12.48
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	89	6.32	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.60	41	24.39	28	49.90
15	G20-G21	帕金森病	76	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.38	18	10.71	52	92.68

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,407,771人。

表7·ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	106	381.50	100.00		所有死亡原因	61	423.82	100.00		所有死亡原因	45	336.02	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	56	201.55	52.83	P00-P96	源於周產期的特定病況	34	236.23	55.74	P00-P96	源於周產期的特定病況	22	164.28	48.89
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	25	89.98	23.58	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	13	90.32	21.31	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	12	89.61	26.67
3	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	4	14.40	3.77	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	2	13.90	3.28	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	2	14.93	4.44
4	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.20	1.89	J12-J18	肺炎	1	6.95	1.64	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	7.47	2.22
5	C00-C97	惡性腫瘤	2	7.20	1.89	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	6.95	1.64	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	7.47	2.22
6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	3.60	0.94	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.95	1.64	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	7.47	2.22
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	3.60	0.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	6.95	1.64	C00-C97	惡性腫瘤	1	7.47	2.22
8	J12-J18	肺炎	1	3.60	0.94						G00, G03	腦膜炎	1	7.47	2.22
9	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	3.60	0.94										
10	G00, G03	腦膜炎	1	3.60	0.94										
		其他	12	43.19	11.32		其他	8	55.58	13.11		其他	4	29.87	8.89

資料來源：衛生福利部。

附註：出生發生數為27,785人，其中男性為14,393人，女性為13,392人。

表8·ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	106	388.34	100.00		所有死亡原因	61	431.20	100.00		所有死亡原因	45	342.22	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	56	205.16	52.83	P00-P96	源於周產期的特定病況	34	240.34	55.74	P00-P96	源於周產期的特定病況	22	167.31	48.89
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	25	91.59	23.58	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	13	91.90	21.31	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	12	91.26	26.67
3	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	4	14.65	3.77	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	14.14	3.28	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	15.21	4.44
4	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.33	1.89	J12-J18	肺炎	1	7.07	1.64	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	7.60	2.22
5	C00-C97	惡性腫瘤	2	7.33	1.89	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	7.07	1.64	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	7.60	2.22
6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	3.66	0.94	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	7.07	1.64	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	7.60	2.22
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	3.66	0.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	7.07	1.64	C00-C97	惡性腫瘤	1	7.60	2.22
8	J12-J18	肺炎	1	3.66	0.94						G00, G03	腦膜炎	1	7.60	2.22
9	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	3.66	0.94										
10	G00, G03	腦膜炎	1	3.66	0.94										
		其他	12	43.96	11.32		其他	8	56.55	13.11		其他	4	30.42	8.89

資料來源：衛生福利部。

附註：0歲年中人口數為27,296人，其中男性為14,147人，女性為13,150人。

表9·ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
		所有死亡原因	47	13.47	100.00		所有死亡原因	24	13.25	100.00		所有死亡原因	23	13.70	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	8	2.29	17.02	C00-C97	惡性腫瘤	5	2.76	20.83	J12-J18	肺炎	4	2.38	17.39
2	J12-J18	肺炎	6	1.72	12.77	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	2.21	16.67	C00-C97	惡性腫瘤	3	1.79	13.04
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	1.43	10.64	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	1.10	8.33	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	2	1.19	8.70
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	4	1.15	8.51	J12-J18	肺炎	2	1.10	8.33	J10-J11	流行性感 冒	2	1.19	8.70
5	J10-J11	流行性感 冒	3	0.86	6.38	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	1	0.55	4.17	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	1	0.60	4.35
6	X85-Y09, Y87.1	加害（他殺）	2	0.57	4.26	J10-J11	流行性感 冒	1	0.55	4.17	L00-L99	皮膚及皮下組織疾 病	1	0.60	4.35
7	L00-L99	皮膚及皮下組織疾 病	1	0.29	2.13						Q00-Q99	先天性畸形變形及 染 色體異常	1	0.60	4.35
8	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染 色體異常	1	0.29	2.13						V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	0.60	4.35
9	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	0.29	2.13						K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	0.60	4.35
10	D00-D48	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	1	0.29	2.13						D00-D48	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	1	0.60	4.35
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.29	2.13						J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.60	4.35
		其他	14	4.01	29.79		其他	9	4.97	37.50		其他	5	2.98	21.74

資料來源：衛生福利部。

附註：1-14歲年中人口數為348,982人，其中男性為181,134人，女性為167,849人。

表10·ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	86	29.34	100.00		所有死亡原因	60	39.53	100.00		所有死亡原因	26	18.39	100.00
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	32	10.92	37.21	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	17.79	45.00	C00-C97	惡性腫瘤	6	4.24	23.08
2	C00-C97	惡性腫瘤	17	5.80	19.77	C00-C97	惡性腫瘤	11	7.25	18.33	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	6	4.24	23.08
3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	13	4.43	15.12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	4.61	11.67	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	3.54	19.23
4	I60-I69	腦血管疾病	3	1.02	3.49	I60-I69	腦血管疾病	3	1.98	5.00	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.71	3.85
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	0.68	2.33	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.32	3.33	A40-A41	敗血症	1	0.71	3.85
6	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.68	2.33	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.66	1.67					
7	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.34	1.16	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.66	1.67					
8	G20-G21	帕金森病	1	0.34	1.16	G20-G21	帕金森病	1	0.66	1.67					
9	J12-J18	肺炎	1	0.34	1.16	J12-J18	肺炎	1	0.66	1.67					
10	A40-A41	敗血症	1	0.34	1.16										
		其他	13	4.43	15.12		其他	6	3.95	10.00		其他	7	4.95	26.92

資料來源：衛生福利部。

附註：15-24歲年中人口數為299,539人，其中男性為155,310人，女性為144,230人。

表11·ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	614	75.72	100.00		所有死亡原因	381	99.19	100.00		所有死亡原因	233	54.60	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	190	23.43	30.94	C00-C97	惡性腫瘤	83	21.61	21.78	C00-C97	惡性腫瘤	107	25.07	45.92
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	88	10.85	14.33	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	64	16.66	16.80	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	38	8.90	16.31
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	75	9.25	12.21	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	50	13.02	13.12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	15	3.51	6.44
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	56	6.91	9.12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	41	10.67	10.76	I60-I69	腦血管疾病	13	3.05	5.58
5	I60-I69	腦血管疾病	36	4.44	5.86	I60-I69	腦血管疾病	23	5.99	6.04	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	2.58	4.72
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	15	1.85	2.44	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	15	3.91	3.94	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	1.17	2.15
7	J12-J18	肺炎	12	1.48	1.95	J12-J18	肺炎	10	2.60	2.62	A40-A41	敗血症	4	0.94	1.72
8	E10-E14	糖尿病	11	1.36	1.79	E10-E14	糖尿病	9	2.34	2.36	J12-J18	肺炎	2	0.47	0.86
9	I10-I15	高血壓性疾病	8	0.99	1.30	I10-I15	高血壓性疾病	7	1.82	1.84	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	0.47	0.86
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	0.86	1.14	B20-B24	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	5	1.30	1.31	E10-E14	糖尿病	2	0.47	0.86
		其他	116	14.31	18.89	I71	主動脈瘤及剝離	5	1.30	1.31		其他	34	7.97	14.59
		其他	116	14.31	18.89		其他	69	17.96	18.11		其他	34	7.97	14.59

資料來源：衛生福利部。

附註：25-44歲年中人口數為810,848人，其中男性為384,095人，女性為426,753人。

表12·ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	3,255	401.44	100.00		所有死亡原因	2,107	559.79	100.00		所有死亡原因	1,148	264.25	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,495	184.38	45.93	C00-C97	惡性腫瘤	823	218.65	39.06	C00-C97	惡性腫瘤	672	154.68	58.54
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	453	55.87	13.92	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	365	96.97	17.32	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	88	20.26	7.67
3	I60-I69	腦血管疾病	145	17.88	4.45	I60-I69	腦血管疾病	102	27.10	4.84	I60-I69	腦血管疾病	43	9.90	3.75
4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	113	13.94	3.47	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	93	24.71	4.41	E10-E14	糖尿病	39	8.98	3.40
5	E10-E14	糖尿病	109	13.44	3.35	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	78	20.72	3.70	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	34	7.83	2.96
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	107	13.20	3.29	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	72	19.13	3.42	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	29	6.68	2.53
7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	106	13.07	3.26	E10-E14	糖尿病	70	18.60	3.32	J12-J18	肺炎	21	4.83	1.83
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	70	8.63	2.15	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	49	13.02	2.33	A40-A41	敗血症	21	4.83	1.83
9	J12-J18	肺炎	69	8.51	2.12	J12-J18	肺炎	48	12.75	2.28	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	4.83	1.83
10	I10-I15	高血壓性疾病	57	7.03	1.75	I10-I15	高血壓性疾病	45	11.96	2.14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	20	4.60	1.74
		其他	531	65.49	16.31		其他	362	96.18	17.18		其他	160	36.83	13.94

資料來源：衛生福利部。

附註：45-64歲年中人口數為810,837人，其中男性為376,393人，女性為434,444人。

表13·ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因	4,697	1,542.79	100.00	C00-C97	所有死亡原因	2,778	2,037.34	100.00	C00-C97	所有死亡原因	1,919	1,141.62	100.00
		惡性腫瘤	1,821	598.13	38.77		惡性腫瘤	1,029	754.65	37.04		惡性腫瘤	792	471.16	41.27
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	613	201.35	13.05	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	392	287.49	14.11	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	221	131.47	11.52
3	I60-I69	腦血管疾病	291	95.58	6.20	I60-I69	腦血管疾病	182	133.48	6.55	E10-E14	糖尿病	127	75.55	6.62
4	E10-E14	糖尿病	264	86.71	5.62	J12-J18	肺炎	153	112.21	5.51	I60-I69	腦血管疾病	109	64.84	5.68
5	J12-J18	肺炎	228	74.89	4.85	E10-E14	糖尿病	137	100.47	4.93	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	78	46.40	4.06
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	172	56.50	3.66	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	96	70.40	3.46	J12-J18	肺炎	75	44.62	3.91
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	124	40.73	2.64	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	94	68.94	3.38	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	43	25.58	2.24
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	104	34.16	2.21	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	61	44.74	2.20	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	41	24.39	2.14
9	A40-A41	敗血症	95	31.20	2.02	A40-A41	敗血症	55	40.34	1.98	A40-A41	敗血症	40	23.80	2.08
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	89	29.23	1.89	I10-I15	高血壓性疾病	48	35.20	1.73	I10-I15	高血壓性疾病	35	20.82	1.82
		其他	896	294.30	19.08		其他	531	389.43	19.11		其他	358	212.98	18.66
11	I10-I15	高血壓性疾病	83	27.26	1.77	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	48	35.20	1.73	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	28	16.66	1.46
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	67	22.01	1.43	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	41	30.07	1.48	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	26	15.47	1.35
13	G20-G21	帕金森病	52	17.08	1.11	G20-G21	帕金森病	34	24.94	1.22	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	19	11.30	0.99
14	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	47	15.44	1.00	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	28	20.53	1.01	G20-G21	帕金森病	18	10.71	0.94
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	43	14.12	0.92	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	18.33	0.90	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	18	10.71	0.94

資料來源：衛生福利部。

附註：65-79歲年中人口數為304,449人，其中男性為136,355人，女性為168,094人。

表14·ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
		所有死亡原因	9,234	8,818.85	100.00		所有死亡原因	4,958	10,201.96	100.00		所有死亡原因	4,276	7,620.88	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,686	1,610.20	18.26	C00-C97	惡性腫瘤	968	1,991.83	19.52	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	727	1,295.69	17.00
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,483	1,416.33	16.06	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	756	1,555.60	15.25	C00-C97	惡性腫瘤	718	1,279.65	16.79
3	J12-J18	肺炎	957	913.97	10.36	J12-J18	肺炎	565	1,162.59	11.40	J12-J18	肺炎	392	698.64	9.17
4	I60-I69	腦血管疾病	731	698.14	7.92	I60-I69	腦血管疾病	382	786.03	7.70	I60-I69	腦血管疾病	349	622.00	8.16
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	463	442.18	5.01	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	336	691.38	6.78	E10-E14	糖尿病	263	468.73	6.15
6	E10-E14	糖尿病	445	424.99	4.82	A40-A41	敗血症	207	425.94	4.18	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	181	322.59	4.23
7	A40-A41	敗血症	380	362.92	4.12	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	188	386.84	3.79	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	176	313.68	4.12
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	364	347.64	3.94	E10-E14	糖尿病	182	374.50	3.67	A40-A41	敗血症	173	308.33	4.05
9	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	315	300.84	3.41	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	134	275.73	2.70	M00-M99	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	145	258.43	3.39
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	248	236.85	2.69	I10-I15	高血壓性疾病	108	222.23	2.18	I10-I15	高血壓性疾病	130	231.69	3.04
		其他	2,162	2,064.80	23.41		其他	1,132	2,329.29	22.83		其他	1,022	1,821.45	23.90
11	I10-I15	高血壓性疾病	238	227.30	2.58	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	103	211.94	2.08	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	127	226.35	2.97
12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	152	145.17	1.65	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	93	191.36	1.88	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	59	105.15	1.38
13	G20-G21	帕金森病	144	137.53	1.56	G20-G21	帕金森病	92	189.31	1.86	G20-G21	帕金森病	52	92.68	1.22
14	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	91	86.91	0.99	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	51	104.94	1.03	D00-D48	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	40	71.29	0.94
15	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	80	76.40	0.87	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	43	88.48	0.87	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	37	65.94	0.87

資料來源：衛生福利部。

附註：80歲以上年中人口數為104,708人，其中男性為48,599人，女性為56,109人。

表15·ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
總計	457	16.92	159	5.89	122	4.52	25	0.93	32	1.19	12	0.44	28	1.04	79	2.93
0歲	1	3.66	-	-	-	-	-	-	1	3.66	-	-	-	-	-	-
1-14歲	5	1.43	1	0.29	2	0.57	1	0.29	1	0.29	-	-	-	-	-	-
15-24歲	32	10.92	24	8.19	1	0.34	3	1.02	-	-	-	-	3	1.02	1	0.34
25-44歲	56	6.91	27	3.33	9	1.11	6	0.74	1	0.12	1	0.12	9	1.11	3	0.37
45-64歲	107	13.20	38	4.69	28	3.45	7	0.86	5	0.62	4	0.49	13	1.60	12	1.48
65-79歲	104	34.16	43	14.12	27	8.87	6	1.97	9	2.96	5	1.64	2	0.66	12	3.94
80歲以上	152	145.17	26	24.83	55	52.53	2	1.91	15	14.33	2	1.91	1	0.96	51	48.71

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,700,257人。

表16·ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	304	23.52	105	8.12	88	6.81	18	1.39	16	1.24	6	0.46	22	1.70	49	3.79
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	4	2.21	-	-	2	1.10	1	0.55	1	0.55	-	-	-	-	-	-
15-24歲	27	17.79	19	12.52	1	0.66	3	1.98	-	-	-	-	3	1.98	1	0.66
25-44歲	41	10.67	21	5.47	7	1.82	3	0.78	-	-	1	0.26	7	1.82	2	0.52
45-64歲	78	20.72	26	6.91	24	6.38	5	1.33	3	0.80	3	0.80	11	2.92	6	1.59
65-79歲	61	44.74	23	16.87	17	12.47	4	2.93	6	4.40	2	1.47	1	0.73	8	5.87
80歲以上	93	191.36	16	32.92	37	76.13	2	4.12	6	12.35	-	-	-	-	32	65.85

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,292,486人。

表17·ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	153	10.87	54	3.84	34	2.42	7	0.50	16	1.14	6	0.43	6	0.43	30	2.13
0歲	1	7.60	-	-	-	-	-	-	1	7.60	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.60	1	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	5	3.54	5	3.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44歲	15	3.51	6	1.41	2	0.47	3	0.70	1	0.23	-	-	2	0.47	1	0.23
45-64歲	29	6.68	12	2.76	4	0.92	2	0.46	2	0.46	1	0.23	2	0.46	6	1.38
65-79歲	43	25.58	20	11.90	10	5.95	2	1.19	3	1.78	3	1.78	1	0.59	4	2.38
80歲以上	59	105.15	10	17.82	18	32.08	-	-	9	16.04	2	3.56	1	1.78	19	33.86

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,407,771人。

表18·ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
總計	159	5.89	43	1.59	8	0.30	40	1.48	5	0.19	1	0.04	60	2.22	2	0.07
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.29	-	-
15-24歲	24	8.19	1	0.34	-	-	14	4.78	-	-	-	-	9	3.07	-	-
25-44歲	27	3.33	5	0.62	-	-	8	0.99	2	0.25	-	-	12	1.48	-	-
45-64歲	38	4.69	7	0.86	2	0.25	12	1.48	2	0.25	1	0.12	13	1.60	1	0.12
65-79歲	43	14.12	15	4.93	5	1.64	5	1.64	1	0.33	-	-	16	5.26	1	0.33
80歲以上	26	24.83	15	14.33	1	0.96	1	0.96	-	-	-	-	9	8.60	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,700,257人。

表19·ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	105	8.12	21	1.62	8	0.62	33	2.55	3	0.23	1	0.08	39	3.02	-	-
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	19	12.52	1	0.66	-	-	11	7.25	-	-	-	-	7	4.61	-	-
25-44歲	21	5.47	4	1.04	-	-	6	1.56	1	0.26	-	-	10	2.60	-	-
45-64歲	26	6.91	3	0.80	2	0.53	11	2.92	1	0.27	1	0.27	8	2.13	-	-
65-79歲	23	16.87	5	3.67	5	3.67	4	2.93	1	0.73	-	-	8	5.87	-	-
80歲以上	16	32.92	8	16.46	1	2.06	1	2.06	-	-	-	-	6	12.35	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,292,486人。

表20·ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	54	3.84	22	1.56	-	-	7	0.50	2	0.14	-	-	21	1.49	2	0.14
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.60	-	-
15-24歲	5	3.54	-	-	-	-	3	2.12	-	-	-	-	2	1.41	-	-
25-44歲	6	1.41	1	0.23	-	-	2	0.47	1	0.23	-	-	2	0.47	-	-
45-64歲	12	2.76	4	0.92	-	-	1	0.23	1	0.23	-	-	5	1.15	1	0.23
65-79歲	20	11.90	10	5.95	-	-	1	0.59	-	-	-	-	8	4.76	1	0.59
80歲以上	10	17.82	7	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.35	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,407,771人。

表21·ICD-10 臺北市自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	308	11.41	-	-	-	-	13	4.43	88	10.85	106	13.07	67	22.01	34	32.47
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	4	0.15	-	-	-	-	1	0.34	3	0.37	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	-	-	-	-	-	-	1	0.12	2	0.25	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	67	2.48	-	-	-	-	3	1.02	32	3.95	22	2.71	10	3.28	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	1	0.33	1	0.96
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	1	0.33	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	104	3.85	-	-	-	-	4	1.36	21	2.59	34	4.19	28	9.20	17	16.24
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	38	1.41	-	-	-	-	2	0.68	5	0.62	17	2.10	9	2.96	5	4.78
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.30	-	-	-	-	-	-	4	0.49	4	0.49	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	68	2.52	-	-	-	-	3	1.02	19	2.34	21	2.59	15	4.93	10	9.55
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	5	0.19	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	2	0.66	1	0.96

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,700,257人。

表22·ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	197	15.24	-	-	-	-	7	4.61	50	13.02	72	19.13	41	30.07	27	55.56
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	-	-	2	0.52	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.27	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.27	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	42	3.25	-	-	-	-	2	1.32	20	5.21	13	3.45	7	5.13	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.53	1	0.73	1	2.06
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.53	1	0.73	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	67	5.18	-	-	-	-	2	1.32	11	2.86	26	6.91	15	11.00	13	26.75
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	25	1.93	-	-	-	-	1	0.66	2	0.52	13	3.45	5	3.67	4	8.23
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.73	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	7	0.54	-	-	-	-	-	-	4	1.04	3	0.80	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	39	3.02	-	-	-	-	2	1.32	9	2.34	10	2.66	9	6.60	9	18.52
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.27	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	4	0.31	-	-	-	-	-	-	2	0.52	-	-	2	1.47	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,292,486人。

表23·ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	女性人口 死亡率	人數	女性人口 死亡率	人數	女性人口 死亡率	人數	女性人口 死亡率	人數	女性人口 死亡率	人數	女性人口 死亡率	人數	女性人口 死亡率	人數	女性人口 死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	111	7.88	-	-	-	-	6	4.24	38	8.90	34	7.83	26	15.47	7	12.48
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.14	-	-	-	-	1	0.71	1	0.23	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.23	1	0.23	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	25	1.78	-	-	-	-	1	0.71	12	2.81	9	2.07	3	1.78	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	37	2.63	-	-	-	-	2	1.41	10	2.34	8	1.84	13	7.73	4	7.13
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.92	-	-	-	-	1	0.71	3	0.70	4	0.92	4	2.38	1	1.78
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	29	2.06	-	-	-	-	1	0.71	10	2.34	11	2.53	6	3.57	1	1.78
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.78

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,407,771人。

表24·ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	5,219	193.28	105.00	100.00	惡性腫瘤	2,920	225.92	127.78	100.00	惡性腫瘤	2,299	163.31	85.94	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	1,070	39.63	20.84	20.50	氣管、支氣管和肺癌	626	48.43	26.77	21.44	氣管、支氣管和肺癌	444	31.54	15.98	19.31
2	結腸、直腸和肛門癌	675	25.00	12.92	12.93	肝和肝內膽管癌	430	33.27	19.73	14.73	女性乳房癌	302	21.45	12.52	13.14
3	肝和肝內膽管癌	672	24.89	13.63	12.88	結腸、直腸和肛門癌	376	29.09	15.98	12.88	結腸、直腸和肛門癌	299	21.24	10.44	13.01
4	女性乳房癌(1)	302	21.45	12.52	5.79	胃癌	197	15.24	7.96	6.75	肝和肝內膽管癌	242	17.19	8.52	10.53
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	167	12.92	5.76	3.20	口腔癌	180	13.93	8.91	6.16	胃癌	114	8.10	4.05	4.96
6	胃癌	311	11.52	5.83	5.96	前列腺(攝護腺)癌	167	12.92	5.76	5.72	胰臟癌	113	8.03	4.09	4.92
7	胰臟癌	260	9.63	5.14	4.98	胰臟癌	147	11.37	6.38	5.03	卵巢癌	107	7.60	4.52	4.65
8	口腔癌	208	7.70	4.65	3.99	食道癌	108	8.36	5.13	3.70	非何杰金氏淋巴瘤	76	5.40	2.59	3.31
9	卵巢癌(1)	107	7.60	4.52	2.05	非何杰金氏淋巴瘤	98	7.58	4.09	3.36	子宮頸及部位未明示子宮癌	72	5.11	3.07	3.13
10	非何杰金氏淋巴瘤	174	6.44	3.29	3.33	膀胱癌	76	5.88	3.11	2.60	白血病	63	4.48	2.69	2.74
	其他	1,273	47.14	26.86	24.39	其他	515	39.85	23.97	17.64	其他	467	33.17	17.46	20.31
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	72	5.11	3.07	1.38	白血病	70	5.42	3.38	2.40	子宮體癌	47	3.34	1.85	2.04
12	白血病	133	4.93	3.01	2.55	鼻咽癌	45	3.48	2.28	1.54	腎臟癌	33	2.34	1.20	1.44
13	食道癌	123	4.56	2.68	2.36	膽囊和其他膽道癌	36	2.79	1.49	1.23	膀胱癌	32	2.27	1.02	1.39
14	膀胱癌	108	4.00	1.96	2.07	腎臟癌	36	2.79	1.52	1.23	口腔癌	28	1.99	1.04	1.22
15	子宮體癌(1)	47	3.34	1.85	0.90	腦癌	35	2.71	2.10	1.20	膽囊和其他膽道癌	27	1.92	0.88	1.17

資料來源：衛生福利部。

附註：1.臺北市年中人口數為2,700,257人，其中男性1,292,486人，女性1,407,771人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表25·ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	5,219	193.28	2	7.33	8	2.29	17	5.80	190	23.43	1,495	184.38	1,821	598.13	1,686	1,610.20		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,070	39.63	-	-	-	-	-	-	20	2.47	265	32.68	406	133.36	379	361.96		
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	675	25.00	-	-	-	-	-	-	16	1.97	178	21.95	223	73.25	258	246.40		
3	C22	肝和肝內膽管癌	672	24.89	-	-	1	0.29	-	-	23	2.84	182	22.45	276	90.66	190	181.46		
4	C50	女性乳房癌(1)	302	21.45	-	-	-	-	1	0.71	23	5.39	144	33.15	90	53.54	44	78.42		
5	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	167	12.92	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.39	44	32.27	114	234.58		
6	C16	胃癌	311	11.52	-	-	-	-	-	-	10	1.23	80	9.87	95	31.20	126	120.34		
7	C25	胰臟癌	260	9.63	-	-	-	-	-	-	4	0.49	69	8.51	101	33.17	86	82.13		
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	208	7.70	-	-	-	-	-	-	12	1.48	102	12.58	69	22.66	25	23.88		
9	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	107	7.60	-	-	-	-	1	0.71	11	2.58	48	11.05	33	19.63	14	24.95		
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	174	6.44	-	-	-	-	-	-	5	0.62	32	3.95	64	21.02	73	69.72		
		其他	1,273	47.14	2	7.33	7	2.01	15	5.12	66	8.14	386	47.61	420	137.95	377	360.05		
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	72	5.11	-	-	-	-	-	-	10	2.34	28	6.45	21	12.49	13	23.17		
12	C91-C95	白血病	133	4.93	-	-	3	0.86	4	1.36	9	1.11	34	4.19	48	15.77	35	33.43		
13	C15	食道癌	123	4.56	-	-	-	-	-	-	3	0.37	65	8.02	35	11.50	20	19.10		
14	C67	膀胱癌	108	4.00	-	-	-	-	-	-	1	0.12	21	2.59	34	11.17	52	49.66		
15	C54	子宮體癌(1)	47	3.34	-	-	-	-	-	-	1	0.23	21	4.83	17	10.11	8	14.26		

資料來源：衛生福利部。

附註：1.臺北市年中人口數為2,700,257人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表26·ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國105年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,920	225.92	1	7.07	5	2.76	11	7.25	83	21.61	823	218.65	1,029	754.65	968	1,991.83		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	626	48.43	-	-	-	-	-	-	10	2.60	145	38.52	246	180.41	225	462.98		
2	C22	肝和肝內膽管癌	430	33.27	-	-	-	-	-	-	18	4.69	142	37.73	168	123.21	102	209.88		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	376	29.09	-	-	-	-	-	-	7	1.82	94	24.97	140	102.67	135	277.79		
4	C16	胃癌	197	15.24	-	-	-	-	-	-	4	1.04	45	11.96	66	48.40	82	168.73		
5	C00-C06, C09-C10	口腔癌	180	13.93	-	-	-	-	-	-	11	2.86	96	25.51	56	41.07	17	34.98		
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	167	12.92	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.39	44	32.27	114	234.58		
7	C25	胰臟癌	147	11.37	-	-	-	-	-	-	3	0.78	44	11.69	53	38.87	47	96.71		
8	C15	食道癌	108	8.36	-	-	-	-	-	-	3	0.78	60	15.94	29	21.27	16	32.92		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	98	7.58	-	-	-	-	-	-	1	0.26	22	5.84	37	27.14	38	78.19		
10	C67	膀胱癌	76	5.88	-	-	-	-	-	-	1	0.26	16	4.25	22	16.13	37	76.13		
		其他	515	39.85	1	7.07	5	2.76	11	7.25	25	6.51	150	39.85	168	123.21	155	318.94		
11	C91-C95	白血病	70	5.42	-	-	2	1.10	2	1.32	4	1.04	17	4.52	24	17.60	21	43.21		
12	C11	鼻咽癌	45	3.48	-	-	-	-	-	-	4	1.04	23	6.11	15	11.00	3	6.17		
13	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	36	2.79	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.13	15	11.00	13	26.75		
14	C64	腎臟癌	36	2.79	-	-	-	-	-	-	1	0.26	13	3.45	10	7.33	12	24.69		
15	C71	腦癌	35	2.71	-	-	2	1.10	4	2.64	5	1.30	9	2.39	8	5.87	7	14.40		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,292,486人。

表27·ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國105年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,299	163.31	1	7.60	3	1.79	6	4.24	107	25.07	672	154.68	792	471.16	718	1,279.65		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	444	31.54	-	-	-	-	-	-	10	2.34	120	27.62	160	95.18	154	274.47		
2	C50	女性乳房癌	302	21.45	-	-	-	-	1	0.71	23	5.39	144	33.15	90	53.54	44	78.42		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	299	21.24	-	-	-	-	-	-	9	2.11	84	19.34	83	49.38	123	219.22		
4	C22	肝和肝內膽管癌	242	17.19	-	-	1	0.60	-	-	5	1.17	40	9.21	108	64.25	88	156.84		
5	C16	胃癌	114	8.10	-	-	-	-	-	-	6	1.41	35	8.06	29	17.25	44	78.42		
6	C25	胰臟癌	113	8.03	-	-	-	-	-	-	1	0.23	25	5.75	48	28.56	39	69.51		
7	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	107	7.60	-	-	-	-	1	0.71	11	2.58	48	11.05	33	19.63	14	24.95		
8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	76	5.40	-	-	-	-	-	-	4	0.94	10	2.30	27	16.06	35	62.38		
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	72	5.11	-	-	-	-	-	-	10	2.34	28	6.45	21	12.49	13	23.17		
10	C91-C95	白血病	63	4.48	-	-	1	0.60	2	1.41	5	1.17	17	3.91	24	14.28	14	24.95		
		其他	467	33.17	1	7.60	1	0.60	2	1.41	23	5.39	121	27.85	169	100.54	150	267.34		
11	C54	子宮體癌	47	3.34	-	-	-	-	-	-	1	0.23	21	4.83	17	10.11	8	14.26		
12	C64	腎臟癌	33	2.34	-	-	-	-	-	-	2	0.47	4	0.92	11	6.54	16	28.52		
13	C67	膀胱癌	32	2.27	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.15	12	7.14	15	26.73		
14	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	28	1.99	-	-	-	-	-	-	1	0.23	6	1.38	13	7.73	8	14.26		
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	27	1.92	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.46	12	7.14	13	23.17		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,407,771人。

參、105 年死因統計

二、行政區別死因統計

表28-1·ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,357	649.22	294.60	100.00	所有死亡原因	770	782.50	370.23	100.00	所有死亡原因	587	530.66	232.95	100.00
1	惡性腫瘤	414	198.07	103.45	30.51	惡性腫瘤	233	236.78	124.24	30.26	惡性腫瘤	181	163.63	87.28	30.83
2	心臟疾病（高血壓 性除除外）	183	87.55	38.28	13.49	心臟疾病（高血壓 性除除外）	112	113.82	55.53	14.55	心臟疾病（高血壓 性除除外）	71	64.19	24.21	12.10
3	肺炎	108	51.67	17.81	7.96	肺炎	68	69.10	23.55	8.83	腦血管疾病	41	37.06	14.92	6.98
4	腦血管疾病	93	44.49	18.64	6.85	腦血管疾病	52	52.84	23.06	6.75	肺炎	40	36.16	12.89	6.81
5	糖尿病	55	26.31	9.98	4.05	敗血症	32	32.52	11.54	4.16	糖尿病	28	25.31	9.14	4.77
6	敗血症	52	24.88	8.71	3.83	慢性下呼吸道疾病	28	28.45	10.60	3.64	敗血症	20	18.08	6.36	3.41
7	慢性下呼吸道疾病	43	20.57	7.57	3.17	糖尿病	27	27.44	10.96	3.51	腎炎、腎病症候群 及腎病變	18	16.27	6.58	3.07
8	腎炎、腎病症候群 及腎病變	36	17.22	6.87	2.65	事故傷害	25	25.41	20.61	3.25	慢性下呼吸道疾病	15	13.56	5.06	2.56
9	事故傷害	35	16.74	12.31	2.58	腎炎、腎病症候群 及腎病變	18	18.29	7.17	2.34	高血壓性除除外	15	13.56	4.58	2.56
10	血管性及未明示之 癡呆症	29	13.87	3.98	2.14	帕金森病	14	14.23	6.46	1.82	血管性及未明示之 癡呆症	15	13.56	3.88	2.56
	其他	309	147.83	67.00	22.77	其他	161	163.61	76.51	20.91	其他	143	129.27	58.05	24.36
11	高血壓性除除外	27	12.92	4.48	1.99	血管性及未明示之 癡呆症	14	14.23	4.10	1.82	蓄意自我傷害（自 殺）	10	9.04	7.86	1.70
12	帕金森病	24	11.48	4.54	1.77	慢性肝病及肝硬化	13	13.21	7.47	1.69	事故傷害	10	9.04	4.59	1.70
13	慢性肝病及肝硬化	20	9.57	5.18	1.47	高血壓性除除外	12	12.19	4.31	1.56	帕金森病	10	9.04	3.05	1.70
14	骨骼肌肉系統及結 締組織之除除外	18	8.61	3.06	1.33	骨骼肌肉系統及結 締組織之除除外	10	10.16	4.27	1.30	骨骼肌肉系統及結 締組織之除除外	8	7.23	2.11	1.36
15	蓄意自我傷害（自 殺）	17	8.13	6.46	1.25	蓄意自我傷害（自 殺）(1)	7	7.11	5.12	0.91	慢性肝病及肝硬化	7	6.33	3.23	1.19

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除除外）死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、7.11人，每十萬人口標準化死亡率為2.90人。

表28-2·ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	1,635	715.48	333.55	100.00	所有死亡原因	924	844.88	408.93	100.00	所有死亡原因	711	596.71	270.36	100.00
	惡性腫瘤	488	213.55	109.72	29.85	惡性腫瘤	258	235.91	124.93	27.92	惡性腫瘤	230	193.03	96.45	32.35
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	224	98.02	44.76	13.70	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	150	137.16	65.90	16.23	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	74	62.11	28.01	10.41
3	肺炎	125	54.70	21.82	7.65	肺炎	79	72.24	28.54	8.55	肺炎	46	38.61	15.66	6.47
4	腦血管疾病	90	39.38	17.52	5.50	腦血管疾病	47	42.98	19.60	5.09	腦血管疾病	43	36.09	15.71	6.05
5	糖尿病	72	31.51	13.81	4.40	慢性下呼吸道疾病	37	33.83	13.38	4.00	糖尿病	36	30.21	12.82	5.06
6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	60	26.26	11.10	3.67	糖尿病	36	32.92	15.25	3.90	敗血症	28	23.50	9.25	3.94
7	敗血症	57	24.94	8.98	3.49	腎炎、腎病症候群 及腎病變	32	29.26	13.87	3.46	腎炎、腎病症候群 及腎病變	28	23.50	9.11	3.94
8	慢性下呼吸道疾病	54	23.63	8.83	3.30	敗血症	29	26.52	8.51	3.14	血管性及未明示之 癡呆症	18	15.11	4.81	2.53
9	高血壓性疾病	38	16.63	7.06	2.32	慢性肝病及肝硬化	25	22.86	13.60	2.71	慢性下呼吸道疾病	17	14.27	5.15	2.39
10	慢性肝病及肝硬化	33	14.44	7.95	2.02	高血壓性疾病	23	21.03	9.67	2.49	高血壓性疾病	15	12.59	4.97	2.11
	其他	394	172.42	82.00	24.10	其他	208	190.19	95.69	22.51	其他	176	147.71	68.42	24.75
11	血管性及未明示之 癡呆症	32	14.00	4.09	1.96	事故傷害	14	12.80	9.41	1.52	事故傷害	14	11.75	7.78	1.97
12	事故傷害	28	12.25	8.44	1.71	血管性及未明示之 癡呆症	14	12.80	3.52	1.52	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	12	10.07	3.42	1.69
13	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	25	10.94	3.90	1.53	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	13	11.89	4.72	1.41	慢性肝病及肝硬化	8	6.71	3.16	1.13
14	帕金森病	19	8.31	3.23	1.16	帕金森病	12	10.97	4.67	1.30	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	8	6.71	2.52	1.13
15	蓄意自我傷害（自 殺）	17	7.44	4.31	1.04	蓄意自我傷害（自 殺）	10	9.14	5.06	1.08	蓄意自我傷害（自 殺）(1)	7	5.87	3.72	0.98

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：帕金森病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、5.87人，每十萬人口標準化死亡率為2.12人。

表28-3 · ICD-10 臺北市大安區主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	2,090	669.27	275.35	100.00	所有死亡原因	1,166	798.36	344.61	100.00	所有死亡原因	924	555.85	217.44	100.00
	惡性腫瘤	616	197.26	91.83	29.47	惡性腫瘤	339	232.11	111.86	29.07	惡性腫瘤	277	166.63	75.02	29.98
2	心臟疾病（高血壓 性除除外）	323	103.43	37.90	15.45	心臟疾病（高血壓 性除除外）	169	115.71	45.53	14.49	心臟疾病（高血壓 性除除外）	154	92.64	31.90	16.67
3	肺炎	128	40.99	12.73	6.12	肺炎	80	54.78	17.47	6.86	腦血管疾病	48	28.88	9.64	5.19
4	腦血管疾病	120	38.43	14.57	5.74	腦血管疾病	72	49.30	20.89	6.17	肺炎	48	28.88	8.73	5.19
5	糖尿病	90	28.82	11.05	4.31	糖尿病	46	31.50	13.12	3.95	糖尿病	44	26.47	9.48	4.76
6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	78	24.98	8.92	3.73	腎炎、腎病症候群 及腎病變	43	29.44	9.97	3.69	腎炎、腎病症候群 及腎病變	35	21.05	7.93	3.79
7	慢性下呼吸道疾病	59	18.89	6.29	2.82	慢性下呼吸道疾病	39	26.70	8.45	3.34	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	25	15.04	4.55	2.71
8	敗血症	50	16.01	5.12	2.39	事故傷害	28	19.17	11.51	2.40	敗血症	24	14.44	4.76	2.60
9	事故傷害	47	15.05	8.34	2.25	敗血症	26	17.80	5.45	2.23	慢性下呼吸道疾病	20	12.03	4.40	2.16
10	蓄意自我傷害（自 殺）	36	11.53	8.02	1.72	慢性肝病及肝硬化	21	14.38	7.32	1.80	血管性及未明示之 癡呆症	20	12.03	3.30	2.16
	其他	543	173.88	70.57	25.98	其他	303	207.46	93.05	25.99	其他	229	137.76	57.72	24.78
11	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	36	11.53	3.63	1.72	高血壓性疾病	21	14.38	4.50	1.80	事故傷害	19	11.43	5.59	2.06
12	高血壓性疾病	35	11.21	3.57	1.67	帕金森病	20	13.69	3.99	1.72	蓄意自我傷害（自 殺）	18	10.83	7.99	1.95
13	血管性及未明示之 癡呆症	35	11.21	2.91	1.67	蓄意自我傷害（自 殺）	18	12.32	8.17	1.54	高血壓性疾病	14	8.42	2.78	1.52
14	帕金森病	30	9.61	2.89	1.44	血管性及未明示之 癡呆症	15	10.27	2.42	1.29	帕金森病	10	6.02	1.92	1.08
15	慢性肝病及肝硬化	29	9.29	4.40	1.39	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病(1)	11	7.53	2.63	0.94	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	9	5.41	1.54	0.97

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）死亡人數、每十萬人口死亡率亦為11人、7.53人，每十萬人口標準化死亡率為2.56人。

表28-4 · ICD-10 臺北市中山區主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,527	660.19	318.27	100.00	所有死亡原因	844	782.10	401.41	100.00	所有死亡原因	683	553.56	251.18	100.00
1	惡性腫瘤	486	210.12	110.82	31.83	惡性腫瘤	252	233.52	130.80	29.86	惡性腫瘤	234	189.65	94.13	34.26
2	心臟疾病（高血壓 性除外）	220	95.12	43.09	14.41	心臟疾病（高血壓 性除外）	137	126.95	62.36	16.23	心臟疾病（高血壓 性除外）	83	67.27	27.74	12.15
3	肺炎	119	51.45	21.68	7.79	肺炎	78	72.28	32.87	9.24	腦血管疾病	46	37.28	13.96	6.73
4	腦血管疾病	90	38.91	16.02	5.89	腦血管疾病	44	40.77	18.80	5.21	肺炎	41	33.23	12.74	6.00
5	糖尿病	68	29.40	12.97	4.45	糖尿病	31	28.73	14.15	3.67	糖尿病	37	29.99	12.07	5.42
6	敗血症	45	19.46	8.72	2.95	慢性下呼吸道疾病	28	25.95	10.81	3.32	敗血症	21	17.02	7.87	3.07
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	43	18.59	8.27	2.82	腎炎、腎病症候群 及腎病變	24	22.24	10.57	2.84	腎炎、腎病症候群 及腎病變	19	15.40	6.41	2.78
8	慢性下呼吸道疾病	39	16.86	7.03	2.55	敗血症	24	22.24	9.92	2.84	蓄意自我傷害（自 殺）	15	12.16	8.74	2.20
9	事故傷害	38	16.43	9.16	2.49	事故傷害	23	21.31	12.03	2.73	事故傷害	15	12.16	6.73	2.20
10	蓄意自我傷害（自 殺）	35	15.13	9.75	2.29	蓄意自我傷害（自 殺）	20	18.53	11.19	2.37	高血壓性除外）	15	12.16	4.89	2.20
	其他	344	148.73	70.76	22.53	其他	183	169.58	87.91	21.68	其他	157	127.25	55.90	22.99
11	高血壓性除外）	33	14.27	6.77	2.16	高血壓性除外）	18	16.68	9.21	2.13	骨骼肌肉系統及結 締組織之除外）	13	10.54	3.59	1.90
12	骨骼肌肉系統及結 締組織之除外）	25	10.81	3.91	1.64	骨骼肌肉系統及結 締組織之除外）	12	11.12	4.23	1.42	慢性下呼吸道除外）	11	8.92	3.88	1.61
13	血管性及未明示之 癱瘓症	17	7.35	2.96	1.11	帕金森病	11	10.19	5.51	1.30	血管性及未明示之 癱瘓症	11	8.92	3.17	1.61
14	慢性肝病及肝硬化	16	6.92	3.55	1.05	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	10	9.27	4.30	1.18	慢性肝病及肝硬化	9	7.29	3.92	1.32
15	帕金森病	16	6.92	3.45	1.05	慢性肝病及肝硬化	7	6.49	3.05	0.83	帕金森病(1)	5	4.05	1.66	0.73

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.05人，每十萬人口標準化死亡率為1.50人。

表28-5 · ICD-10 臺北市中正區主要死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	1,088	673.94	307.29	100.00	所有死亡原因	606	785.95	373.87	100.00	所有死亡原因	482	571.53	248.50	100.00
	惡性腫瘤	314	194.50	102.13	28.86	惡性腫瘤	168	217.89	117.03	27.72	惡性腫瘤	146	173.12	89.00	30.29
2	心臟疾病（高血壓 性除除外）	151	93.53	37.73	13.88	心臟疾病（高血壓 性除除外）	93	120.62	53.28	15.35	心臟疾病（高血壓 性除除外）	58	68.77	24.38	12.03
3	腦血管疾病	79	48.93	19.99	7.26	腦血管疾病	42	54.47	22.97	6.93	腦血管疾病	37	43.87	17.31	7.68
4	肺炎	67	41.50	14.43	6.16	肺炎	42	54.47	19.88	6.93	糖尿病	30	35.57	13.79	6.22
5	糖尿病	54	33.45	14.41	4.96	慢性下呼吸道疾病	30	38.91	13.65	4.95	肺炎	25	29.64	9.66	5.19
6	慢性下呼吸道疾病	40	24.78	9.15	3.68	糖尿病	24	31.13	15.29	3.96	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	17	20.16	6.10	3.53
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	36	22.30	8.62	3.31	腎炎、腎病症候群 及腎病變	22	28.53	11.51	3.63	血管性及未明示之 癱瘓症	17	20.16	5.98	3.53
8	敗血症	32	19.82	7.48	2.94	敗血症	18	23.35	9.19	2.97	事故傷害	16	18.97	11.50	3.32
9	事故傷害	30	18.58	14.16	2.76	事故傷害	14	18.16	16.39	2.31	敗血症	14	16.60	6.09	2.90
10	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	27	16.72	5.46	2.48	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	10	12.97	4.95	1.65	腎炎、腎病症候群 及腎病變	14	16.60	6.04	2.90
	其他	258	159.81	73.73	23.71	其他	143	185.46	89.74	23.60	其他	108	128.06	58.66	22.41
11	血管性及未明示之 癱瘓症	27	16.72	4.67	2.48	血管性及未明示之 癱瘓症	10	12.97	3.15	1.65	慢性下呼吸道疾病	10	11.86	5.01	2.07
12	高血壓性除除外	18	11.15	5.51	1.65	蓄意自我傷害（自 殺）	9	11.67	8.55	1.49	高血壓性除除外	10	11.86	4.97	2.07
13	慢性肝病及肝硬化	14	8.67	3.86	1.29	高血壓性除除外	8	10.38	6.21	1.32	慢性肝病及肝硬化	9	10.67	4.62	1.87
14	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除除外）	14	8.67	3.09	1.29	帕金森病	8	10.38	3.08	1.32	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除除外）	8	9.49	3.43	1.66
15	蓄意自我傷害（自 殺）	13	8.05	5.89	1.19	結核病(1)	6	7.78	3.29	0.99	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除除外）	6	7.11	2.67	1.24

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除除外）、膽結石及其他膽囊疾患死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、7.78人，每十萬人口標準化死亡率分別為2.73人、2.17人。

表28-6 · ICD-10 臺北市大同區主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	963	737.93	393.81	100.00	所有死亡原因	565	886.52	519.12	100.00	所有死亡原因	398	596.10	283.06	100.00
1	惡性腫瘤	270	206.90	111.16	28.04	惡性腫瘤	164	257.33	147.66	29.03	惡性腫瘤	106	158.76	80.01	26.63
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	150	114.94	59.19	15.58	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	94	147.49	86.61	16.64	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	56	83.87	34.38	14.07
3	腦血管疾病	72	55.17	27.93	7.48	腦血管疾病	42	65.90	37.81	7.43	腦血管疾病	30	44.93	18.94	7.54
4	肺炎	68	52.11	25.44	7.06	肺炎	39	61.19	34.82	6.90	肺炎	29	43.43	17.35	7.29
5	糖尿病	43	32.95	16.85	4.47	糖尿病	23	36.09	20.44	4.07	糖尿病	20	29.95	13.47	5.03
6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	30	22.99	10.70	3.12	慢性下呼吸道疾病	22	34.52	17.66	3.89	敗血症	16	23.96	10.61	4.02
7	慢性下呼吸道疾病	30	22.99	10.29	3.12	事故傷害	19	29.81	18.76	3.36	腎炎、腎病症候群 及腎病變	14	20.97	8.56	3.52
8	事故傷害	27	20.69	13.33	2.80	腎炎、腎病症候群 及腎病變	16	25.10	13.29	2.83	高血壓性疾病	13	19.47	8.66	3.27
9	敗血症	26	19.92	9.16	2.70	慢性肝病及肝硬化	14	21.97	13.15	2.48	血管性及未明示之 癱瘓症	9	13.48	4.49	2.26
10	高血壓性疾病	21	16.09	7.66	2.18	蓄意自我傷害（自 殺）	13	20.40	15.86	2.30	事故傷害	8	11.98	8.80	2.01
	其他	226	173.18	102.11	23.47	其他	119	186.72	113.05	21.06	其他	97	145.28	77.79	24.37
11	蓄意自我傷害（自 殺）	18	13.79	10.65	1.87	敗血症	10	15.69	7.47	1.77	慢性下呼吸道疾病	8	11.98	4.35	2.01
12	慢性肝病及肝硬化	17	13.03	7.66	1.77	高血壓性疾病	8	12.55	6.49	1.42	蓄意自我傷害（自 殺）	5	7.49	5.51	1.26
13	血管性及未明示之 癱瘓症	13	9.96	3.87	1.35	帕金森病	7	10.98	5.25	1.24	皮膚及皮下組織疾 病	4	5.99	2.08	1.01
14	帕金森病	10	7.66	3.44	1.04	源於周產期的特定 病況	6	9.41	14.93	1.06	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	4	5.99	1.96	1.01
15	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）(1)	8	6.13	2.50	0.83	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	6	9.41	4.52	1.06	慢性肝病及肝硬化 (2)	3	4.49	2.45	0.75

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、6.13人，每十萬人口標準化死亡率為2.29人。

(2)女性：帕金森病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、4.49人，每十萬人口標準化死亡率為2.10人。

表28-7·ICD-10 臺北市萬華區主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	1,743	898.74	413.96	100.00	所有死亡原因	1,050	1,098.74	543.26	100.00	所有死亡原因	693	704.45	296.99	100.00
2	惡性腫瘤	456	235.13	117.14	26.16	惡性腫瘤	273	285.67	147.90	26.00	惡性腫瘤	183	186.02	89.40	26.41
3	心臟疾病（高血壓 性除疾病外）	277	142.83	62.50	15.89	心臟疾病（高血壓 性除疾病外）	163	170.57	81.46	15.52	心臟疾病（高血壓 性除疾病外）	114	115.88	46.05	16.45
4	肺炎	137	70.64	27.55	7.86	肺炎	89	93.13	37.72	8.48	腦血管疾病	54	54.89	20.71	7.79
5	腦血管疾病	129	66.52	28.18	7.40	腦血管疾病	75	78.48	36.10	7.14	糖尿病	50	50.83	20.08	7.22
6	糖尿病	96	49.50	21.90	5.51	慢性下呼吸道疾病	53	55.46	24.42	5.05	肺炎	48	48.79	19.09	6.93
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	68	35.06	15.06	3.90	糖尿病	46	48.14	23.48	4.38	腎炎、腎病症候群 及腎病變	35	35.58	14.04	5.05
8	慢性下呼吸道疾病	66	34.03	14.30	3.79	腎炎、腎病症候群 及腎病變	33	34.53	16.38	3.14	高血壓性除疾病	19	19.31	7.21	2.74
9	高血壓性除疾病	42	21.66	9.51	2.41	蓄意自我傷害（自 殺）	23	24.07	17.49	2.19	敗血症	18	18.30	6.69	2.60
10	敗血症	39	20.11	8.49	2.24	事故傷害	23	24.07	16.13	2.19	骨骼肌肉系統及結 締組織之除疾病	17	17.28	6.57	2.45
11	事故傷害	37	19.08	11.76	2.12	高血壓性除疾病	23	24.07	12.27	2.19	事故傷害	14	14.23	7.37	2.02
12	其他	396	204.19	97.57	22.72	其他	249	260.56	129.90	23.71	其他	141	143.33	59.78	20.35
13	蓄意自我傷害（自 殺）	34	17.53	12.39	1.95	慢性肝病及肝硬化	21	21.97	14.03	2.00	慢性下呼吸道除疾病	13	13.21	5.56	1.88
14	慢性肝病及肝硬化	31	15.98	9.24	1.78	敗血症	21	21.97	10.68	2.00	血管性及未明示之 癱瘓症	12	12.20	3.82	1.73
15	骨骼肌肉系統及結 締組織之除疾病	31	15.98	6.50	1.78	血管性及未明示之 癱瘓症	15	15.70	4.76	1.43	蓄意自我傷害（自 殺）	11	11.18	7.52	1.59
16	血管性及未明示之 癱瘓症	27	13.92	4.30	1.55	骨骼肌肉系統及結 締組織之除疾病	14	14.65	6.37	1.33	慢性肝病及肝硬化	10	10.17	4.79	1.44
17	帕金森病	20	10.31	3.65	1.15	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除疾病）(1)	12	12.56	5.09	1.14	帕金森病	8	8.13	2.74	1.15

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：帕金森病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為12人、12.56人，每十萬人口標準化死亡率為4.79人。

表28-8 · ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,809	657.10	338.63	100.00	所有死亡原因	1074	811.76	441.32	100.00	所有死亡原因	735	514.01	254.88	100.00
1	惡性腫瘤	485	176.17	99.56	26.81	惡性腫瘤	281	212.39	125.86	26.16	惡性腫瘤	204	142.66	78.71	27.76
2	心臟疾病（高血壓 性除除外）	283	102.80	49.25	15.64	心臟疾病（高血壓 性除除外）	180	136.05	71.14	16.76	心臟疾病（高血壓 性除除外）	103	72.03	30.89	14.01
3	肺炎	133	48.31	20.79	7.35	肺炎	76	57.44	24.24	7.08	腦血管疾病	58	40.56	18.55	7.89
4	腦血管疾病	128	46.49	22.26	7.08	腦血管疾病	70	52.91	27.13	6.52	肺炎	57	39.86	18.38	7.76
5	慢性下呼吸道疾病	74	26.88	12.17	4.09	慢性下呼吸道疾病	56	42.33	19.19	5.21	糖尿病	44	30.77	15.18	5.99
6	糖尿病	73	26.52	13.65	4.04	腎炎、腎病症候群 及腎病變	43	32.50	19.28	4.00	血管性及未明示之 癱瘓症	27	18.88	6.55	3.67
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	67	24.34	12.55	3.70	事故傷害	40	30.23	19.04	3.72	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	26	18.18	7.53	3.54
8	敗血症	59	21.43	9.22	3.26	敗血症	38	28.72	12.19	3.54	腎炎、腎病症候群 及腎病變	24	16.78	7.33	3.27
9	高血壓性疾病	52	18.89	8.85	2.87	糖尿病	29	21.92	11.92	2.70	高血壓性疾病	23	16.08	6.49	3.13
10	事故傷害	48	17.44	10.89	2.65	高血壓性疾病	29	21.92	11.82	2.70	敗血症	21	14.69	6.53	2.86
	其他	407	147.84	79.45	22.50	其他	232	175.35	99.51	21.60	其他	148	103.50	58.74	20.14
11	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	45	16.35	6.20	2.49	慢性肝病及肝硬化	23	17.38	11.39	2.14	慢性下呼吸道疾病	18	12.59	6.46	2.45
12	血管性及未明示之 癱瘓症	44	15.98	5.62	2.43	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	19	14.36	4.77	1.77	蓄意自我傷害（自 殺）	14	9.79	7.91	1.90
13	蓄意自我傷害（自 殺）	30	10.90	8.11	1.66	血管性及未明示之 癱瘓症	17	12.85	5.07	1.58	事故傷害	8	5.59	3.14	1.09
14	慢性肝病及肝硬化	27	9.81	6.02	1.49	蓄意自我傷害（自 殺）	16	12.09	8.27	1.49	帕金森病	8	5.59	2.88	1.09
15	帕金森病	16	5.81	2.94	0.88	主動脈瘤及剝離	9	6.80	4.97	0.84	主動脈瘤及剝離(1)	4	2.80	1.52	0.54

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：慢性肝病及肝硬化、原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）、膽結石及其他膽囊疾患死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.80人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.49人、1.35人、1.19人。

表28-9 · ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
1	所有死亡原因	780	637.36	373.37	100.00	所有死亡原因	462	772.47	480.92	100.00	所有死亡原因	318	508.21	283.41	100.00
2	惡性腫瘤	213	174.05	107.15	27.31	惡性腫瘤	115	192.28	125.64	24.89	惡性腫瘤	98	156.62	91.78	30.82
3	心臟疾病（高血壓 性除外）	122	99.69	55.93	15.64	心臟疾病（高血壓 性除外）	75	125.40	77.03	16.23	心臟疾病（高血壓 性除外）	47	75.11	37.33	14.78
4	腦血管疾病	55	44.94	24.21	7.05	腦血管疾病	39	65.21	38.90	8.44	糖尿病	16	25.57	13.81	5.03
5	肺炎	55	44.94	22.80	7.05	肺炎	39	65.21	36.43	8.44	腦血管疾病	16	25.57	11.95	5.03
6	糖尿病	35	28.60	16.50	4.49	慢性下呼吸道疾病	27	45.14	24.89	5.84	肺炎	16	25.57	11.83	5.03
7	慢性下呼吸道疾病	33	26.97	13.81	4.23	糖尿病	19	31.77	19.36	4.11	敗血症	14	22.37	10.41	4.40
8	敗血症	31	25.33	12.11	3.97	敗血症	17	28.42	14.22	3.68	腎炎、腎病症候群 及腎病變	13	20.78	11.39	4.09
9	腎炎、腎病症候群 及腎病變	25	20.43	11.47	3.21	事故傷害	15	25.08	18.66	3.25	血管性及未明示之 癱瘓症	11	17.58	7.61	3.46
10	事故傷害	24	19.61	13.60	3.08	蓄意自我傷害（自 殺）	12	20.06	16.34	2.60	事故傷害	9	14.38	8.44	2.83
11	血管性及未明示之 癱瘓症	19	15.53	6.93	2.44	腎炎、腎病症候群 及腎病變	12	20.06	11.98	2.60	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	8	12.79	7.36	2.52
12	其他	168	137.28	88.87	21.54	其他	92	153.82	97.47	19.91	其他	70	111.87	71.50	22.01
13	蓄意自我傷害（自 殺）	16	13.07	9.82	2.05	慢性肝病及肝硬化	9	15.05	9.40	1.95	慢性下呼吸道疾病	6	9.59	4.84	1.89
14	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	15	12.26	6.58	1.92	血管性及未明示之 癱瘓症	8	13.38	6.64	1.73	高血壓性疾病	6	9.59	4.38	1.89
15	慢性肝病及肝硬化	14	11.44	6.99	1.79	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	7	11.70	5.54	1.52	慢性肝病及肝硬化	5	7.99	4.39	1.57
16	帕金森病	8	6.54	3.74	1.03	帕金森病	5	8.36	5.43	1.08	蓄意自我傷害（自 殺）	4	6.39	4.08	1.26
17	高血壓性疾病	8	6.54	3.06	1.03	先天性畸形變形及 染色體異常(1)	3	5.02	7.34	0.65	源於周產期的特定 病況(2)	3	4.79	8.07	0.94

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：流行性感、原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)、主動脈瘤及剝離死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、5.02人，每十萬人口標準化死亡率分別為3.92人、3.07人、3.00人。

(2)女性：帕金森病、皮膚及皮下組織疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、4.79人，每十萬人口標準化死亡率分別為2.73人、2.14人。

表28-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有死亡原因	1,491	518.34	345.19	100.00	所有死亡原因	854	620.33	440.92	100.00	所有死亡原因	637	424.72	268.42	100.00
1	惡性腫瘤	461	160.26	109.90	30.92	惡性腫瘤	251	182.32	131.78	29.39	惡性腫瘤	210	140.02	91.98	32.97
2	心臟疾病（高血壓 性除除外）	200	69.53	45.98	13.41	心臟疾病（高血壓 性除除外）	125	90.80	65.95	14.64	心臟疾病（高血壓 性除除外）	75	50.01	29.51	11.77
3	腦血管疾病	114	39.63	26.16	7.65	腦血管疾病	75	54.48	39.63	8.78	腦血管疾病	39	26.00	15.64	6.12
4	肺炎	82	28.51	16.12	5.50	肺炎	45	32.69	19.59	5.27	肺炎	37	24.67	13.37	5.81
5	糖尿病	69	23.99	16.59	4.63	糖尿病	37	26.88	20.67	4.33	糖尿病	32	21.34	13.33	5.02
6	敗血症	53	18.43	11.05	3.55	事故傷害	35	25.42	19.48	4.10	敗血症	27	18.00	10.25	4.24
7	事故傷害	47	16.34	11.84	3.15	慢性下呼吸道疾病	28	20.34	13.34	3.28	血管性及未明示之 癱瘓症	23	15.34	8.18	3.61
8	慢性下呼吸道疾病	44	15.30	8.75	2.95	敗血症	26	18.89	12.66	3.04	腎炎、腎病症候群 及腎病變	17	11.33	7.33	2.67
9	血管性及未明示之 癱瘓症	42	14.60	7.94	2.82	腎炎、腎病症候群 及腎病變	22	15.98	11.82	2.58	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	17	11.33	5.95	2.67
10	腎炎、腎病症候群 及腎病變	39	13.56	9.20	2.62	高血壓性疾病	20	14.53	9.05	2.34	慢性下呼吸道疾病	16	10.67	5.41	2.51
	其他	340	118.20	81.66	22.80	其他	190	138.01	96.95	22.25	其他	144	96.01	67.47	22.61
11	高血壓性疾病	31	10.78	6.47	2.08	血管性及未明示之 癱瘓症	19	13.80	7.63	2.22	事故傷害	12	8.00	5.16	1.88
12	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	29	10.08	5.18	1.95	蓄意自我傷害（自 殺）	16	11.62	9.69	1.87	高血壓性疾病	11	7.33	4.33	1.73
13	蓄意自我傷害（自 殺）	23	8.00	6.35	1.54	慢性肝病及肝硬化	15	10.90	8.05	1.76	帕金森病	9	6.00	3.92	1.41
14	慢性肝病及肝硬化	22	7.65	5.52	1.48	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	12	8.72	4.41	1.41	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	9	6.00	3.84	1.41
15	帕金森病	19	6.61	4.64	1.27	帕金森病(1)	10	7.26	5.36	1.17	蓄意自我傷害（自 殺）(2)	7	4.67	3.68	1.10

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：主動脈瘤及剝離死亡人數、每十萬人口死亡率亦為10人、7.26人，每十萬人口標準化死亡率為5.32人。

(2)女性：慢性肝病及肝硬化死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、4.67人，每十萬人口標準化死亡率為3.21人。

表28-11·ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	1,861	641.02	324.26	100.00	所有死亡原因	1,064	758.74	420.03	100.00	所有死亡原因	797	531.03	243.29	100.00
2	惡性腫瘤	566	194.96	105.59	30.41	惡性腫瘤	323	230.33	131.14	30.36	惡性腫瘤	243	161.91	84.50	30.49
3	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	236	81.29	38.26	12.68	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	130	92.70	48.80	12.22	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	106	70.63	29.34	13.30
4	肺炎	124	42.71	18.10	6.66	肺炎	66	47.06	22.53	6.20	肺炎	58	38.64	14.56	7.28
5	腦血管疾病	111	38.23	18.62	5.96	腦血管疾病	63	44.93	25.55	5.92	糖尿病	50	33.31	13.71	6.27
6	糖尿病	90	31.00	14.37	4.84	慢性下呼吸道疾病	57	40.65	19.00	5.36	腦血管疾病	48	31.98	12.81	6.02
7	慢性下呼吸道疾病	75	25.83	10.76	4.03	事故傷害	42	29.95	20.88	3.95	腎炎、腎病症候群 及腎病變	32	21.32	8.42	4.02
8	腎炎、腎病症候群 及腎病變	68	23.42	10.08	3.65	糖尿病	40	28.52	15.08	3.76	敗血症	22	14.66	5.53	2.76
9	事故傷害	58	19.98	13.41	3.12	腎炎、腎病症候群 及腎病變	36	25.67	12.01	3.38	血管性及未明示之 癱瘓症	21	13.99	4.76	2.63
10	敗血症	48	16.53	7.13	2.58	蓄意自我傷害（自 殺）	23	16.40	12.69	2.16	慢性下呼吸道疾病	18	11.99	4.24	2.26
11	高血壓性疾病	40	13.78	5.79	2.15	其他	258	183.98	103.17	24.25	高血壓性疾病	18	11.99	3.99	2.26
12	其他	445	153.28	82.13	23.91	其他	258	183.98	103.17	24.25	其他	181	120.60	61.44	22.71
13	血管性及未明示之 癱瘓症	36	12.40	4.54	1.93	高血壓性疾病	22	15.69	7.85	2.07	事故傷害	16	10.66	6.76	2.01
14	慢性肝病及肝硬化	29	9.99	6.34	1.56	慢性肝病及肝硬化	21	14.98	10.59	1.97	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	16	10.66	3.65	2.01
15	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	29	9.99	3.96	1.56	血管性及未明示之 癱瘓症	15	10.70	4.36	1.41	慢性肝病及肝硬化	8	5.33	2.43	1.00
16	蓄意自我傷害（自 殺）	26	8.96	6.83	1.40	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	13	9.27	4.32	1.22	帕金森病	7	4.66	2.20	0.88
17	帕金森病	17	5.86	2.72	0.91	帕金森病(1)	10	7.13	3.43	0.94	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	6	4.00	1.78	0.75

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：主動脈瘤及剝離死亡人數、每十萬人口死亡率亦為10人、7.13人，每十萬人口標準化死亡率為3.15人。

表28-12·ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	1,695	657.96	352.36	100.00	所有死亡原因	990	796.21	456.14	100.00	所有死亡原因	705	528.97	266.60	100.00
2	惡性腫瘤	450	174.68	100.96	26.55	惡性腫瘤	263	211.52	128.67	26.57	惡性腫瘤	187	140.31	78.19	26.52
3	心臟疾病（高血壓 性除除外）	262	101.70	52.30	15.46	心臟疾病（高血壓 性除除外）	152	122.25	70.86	15.35	心臟疾病（高血壓 性除除外）	110	82.53	36.62	15.60
4	肺炎	128	49.69	21.07	7.55	肺炎	79	63.54	29.34	7.98	腦血管疾病	54	40.52	18.60	7.66
5	腦血管疾病	125	48.52	24.26	7.37	腦血管疾病	71	57.10	31.09	7.17	肺炎	49	36.77	14.27	6.95
6	糖尿病	84	32.61	16.28	4.96	慢性下呼吸道疾病	51	41.02	18.06	5.15	糖尿病	44	33.01	15.10	6.24
7	慢性下呼吸道疾病	69	26.78	11.38	4.07	糖尿病	40	32.17	17.80	4.04	腎炎、腎病症候群 及腎病變	28	21.01	8.79	3.97
8	腎炎、腎病症候群 及腎病變	61	23.68	11.31	3.60	腎炎、腎病症候群 及腎病變	33	26.54	14.64	3.33	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	19	14.26	7.58	2.70
9	蓄意自我傷害（自 殺）	43	16.69	13.26	2.54	蓄意自我傷害（自 殺）	30	24.13	18.39	3.03	高血壓性疾病	19	14.26	6.19	2.70
10	高血壓性疾病	41	15.92	8.02	2.42	事故傷害	26	20.91	16.00	2.63	慢性下呼吸道疾病	18	13.51	5.74	2.55
11	事故傷害	38	14.75	10.93	2.24	敗血症	23	18.50	9.08	2.32	敗血症	14	10.50	4.31	1.99
12	其他	394	152.94	82.60	23.24	其他	222	178.54	102.22	22.42	其他	163	122.30	71.19	23.12
13	敗血症	37	14.36	6.44	2.18	高血壓性疾病	22	17.69	10.28	2.22	蓄意自我傷害（自 殺）	13	9.75	8.97	1.84
14	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	31	12.03	6.26	1.83	慢性肝病及肝硬化	16	12.87	8.37	1.62	事故傷害	12	9.00	6.43	1.70
15	慢性肝病及肝硬化	27	10.48	6.62	1.59	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	14	11.26	5.66	1.41	血管性及未明示之 癱瘓症	12	9.00	3.13	1.70
16	血管性及未明示之 癱瘓症	23	8.93	3.28	1.36	帕金森病	13	10.46	4.80	1.31	慢性肝病及肝硬化	11	8.25	5.02	1.56
17	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）(1)	17	6.60	3.39	1.00	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	12	9.65	4.98	1.21	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	8	6.00	2.93	1.13

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：帕金森病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為17人、6.60人，每十萬人口標準化死亡率為2.87人。

表29-1 · ICD-10 臺北市松山區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	35	16.74	100.00	25	25.41	100.00	10	9.04	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	13	6.22	37.14	10	10.16	40.00	3	2.71	30.00
W00-W19	跌倒(落)	10	4.78	28.57	8	8.13	32.00	2	1.81	20.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.48	2.86	1	1.02	4.00	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.91	11.43	1	1.02	4.00	3	2.71	30.00
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.48	2.86	1	1.02	4.00	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.96	5.71	1	1.02	4.00	1	0.90	10.00
	其他	4	1.91	11.43	3	3.05	12.00	1	0.90	10.00

資料來源：衛生福利部。

表29-2 · ICD-10 臺北市信義區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	28	12.25	100.00	14	12.80	100.00	14	11.75	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	13	5.69	46.43	8	7.31	57.14	5	4.20	35.71
W00-W19	跌倒(落)	6	2.63	21.43	2	1.83	14.29	4	3.36	28.57
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.44	3.57	1	0.91	7.14	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.31	10.71	1	0.91	7.14	2	1.68	14.29
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.44	3.57	-	-	-	1	0.84	7.14
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.44	3.57	1	0.91	7.14	-	-	-
	其他	3	1.31	10.71	1	0.91	7.14	2	1.68	14.29

資料來源：衛生福利部。

表29-3 · ICD-10 臺北市大安區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	47	15.05	100.00	28	19.17	100.00	19	11.43	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	12	3.84	25.53	6	4.11	21.43	6	3.61	31.58
W00-W19	跌倒(落)	11	3.52	23.40	8	5.48	28.57	3	1.80	15.79
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	0.96	6.38	1	0.68	3.57	2	1.20	10.53
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.28	8.51	1	0.68	3.57	3	1.80	15.79
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.64	4.26	1	0.68	3.57	1	0.60	5.26
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.64	4.26	2	1.37	7.14	-	-	-
	其他	13	4.16	27.66	9	6.16	32.14	4	2.41	21.05

資料來源：衛生福利部。

表29-4 · ICD-10 臺北市中山區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	38	16.43	100.00	23	21.31	100.00	15	12.16	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	8	3.46	21.05	4	3.71	17.39	4	3.24	26.67
W00-W19	跌倒(落)	14	6.05	36.84	8	7.41	34.78	6	4.86	40.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.43	2.63	1	0.93	4.35	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.86	5.26	1	0.93	4.35	1	0.81	6.67
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.86	5.26	-	-	-	2	1.62	13.33
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.30	7.89	3	2.78	13.04	-	-	-
	其他	8	3.46	21.05	6	5.56	26.09	2	1.62	13.33

資料來源：衛生福利部。

表29-5 · ICD-10 臺北市中正區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	30	18.58	100.00	14	18.16	100.00	16	18.97	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	6	3.72	20.00	3	3.89	21.43	3	3.56	18.75
W00-W19	跌倒(落)	8	4.96	26.67	5	6.48	35.71	3	3.56	18.75
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.86	10.00	2	2.59	14.29	1	1.19	6.25
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.86	10.00	-	-	-	3	3.56	18.75
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.62	3.33	1	1.30	7.14	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.24	6.67	1	1.30	7.14	1	1.19	6.25
	其他	7	4.34	23.33	2	2.59	14.29	5	5.93	31.25

資料來源：衛生福利部。

表29-6 · ICD-10 臺北市大同區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	27	20.69	100.00	19	29.81	100.00	8	11.98	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	8	6.13	29.63	5	7.85	26.32	3	4.49	37.50
W00-W19	跌倒(落)	9	6.90	33.33	8	12.55	42.11	1	1.50	12.50
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	1.53	7.41	1	1.57	5.26	1	1.50	12.50
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	1.53	7.41	1	1.57	5.26	1	1.50	12.50
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.77	3.70	1	1.57	5.26	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.77	3.70	1	1.57	5.26	-	-	-
	其他	4	3.07	14.81	2	3.14	10.53	2	3.00	25.00

資料來源：衛生福利部。

表29-7 · ICD-10 臺北市萬華區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	37	19.08	100.00	23	24.07	100.00	14	14.23	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	16	8.25	43.24	11	11.51	47.83	5	5.08	35.71
W00-W19	跌倒(落)	10	5.16	27.03	6	6.28	26.09	4	4.07	28.57
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	3.09	16.22	4	4.19	17.39	2	2.03	14.29
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.03	5.41	1	1.05	4.35	1	1.02	7.14
	其他	3	1.55	8.11	1	1.05	4.35	2	2.03	14.29

資料來源：衛生福利部。

表29-8 · ICD-10 臺北市文山區事故傷害死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	48	17.44	100.00	40	30.23	100.00	8	5.59	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	18	6.54	37.50	15	11.34	37.50	3	2.10	37.50
W00-W19	跌倒(落)	13	4.72	27.08	11	8.31	27.50	2	1.40	25.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	1.45	8.33	3	2.27	7.50	1	0.70	12.50
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	1.82	10.42	4	3.02	10.00	1	0.70	12.50
	其他	8	2.91	16.67	7	5.29	17.50	1	0.70	12.50

資料來源：衛生福利部。

表29-9 · ICD-10 臺北市南港區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	24	19.61	100.00	15	25.08	100.00	9	14.38	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	9	7.35	37.50	3	5.02	20.00	6	9.59	66.67
W00-W19	跌倒(落)	5	4.09	20.83	5	8.36	33.33	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.82	4.17	1	1.67	6.67	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.63	8.33	2	3.34	13.33	-	-	-
	其他	7	5.72	29.17	4	6.69	26.67	3	4.79	33.33

資料來源：衛生福利部。

表29-10 · ICD-10 臺北市內湖區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	47	16.34	100.00	35	25.42	100.00	12	8.00	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	12	4.17	25.53	9	6.54	25.71	3	2.00	25.00
W00-W19	跌倒(落)	12	4.17	25.53	9	6.54	25.71	3	2.00	25.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	1.39	8.51	3	2.18	8.57	1	0.67	8.33
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.39	8.51	4	2.91	11.43	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.70	4.26	1	0.73	2.86	1	0.67	8.33
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	1.74	10.64	3	2.18	8.57	2	1.33	16.67
	其他	8	2.78	17.02	6	4.36	17.14	2	1.33	16.67

資料來源：衛生福利部。

表29-11 · ICD-10 臺北市士林區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	58	19.98	100.00	42	29.95	100.00	16	10.66	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	31	10.68	53.45	23	16.40	54.76	8	5.33	50.00
W00-W19	跌倒(落)	13	4.48	22.41	10	7.13	23.81	3	2.00	18.75
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.34	1.72	1	0.71	2.38	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.69	3.45	1	0.71	2.38	1	0.67	6.25
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.34	1.72	-	-	-	1	0.67	6.25
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.34	1.72	1	0.71	2.38	-	-	-
	其他	9	3.10	15.52	6	4.28	14.29	3	2.00	18.75

資料來源：衛生福利部。

表29-12 · ICD-10 臺北市北投區事故傷害死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	38	14.75	100.00	26	20.91	100.00	12	9.00	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	13	5.05	34.21	8	6.43	30.77	5	3.75	41.67
W00-W19	跌倒(落)	11	4.27	28.95	8	6.43	30.77	3	2.25	25.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	1.55	10.53	3	2.41	11.54	1	0.75	8.33
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.78	5.26	2	1.61	7.69	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.39	2.63	1	0.80	3.85	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.78	5.26	2	1.61	7.69	-	-	-
	其他	5	1.94	13.16	2	1.61	7.69	3	2.25	25.00

資料來源：衛生福利部。

表30-1 · ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	17	8.13	100.00	7	7.11	100.00	10	9.04	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	2.87	35.29	4	4.06	57.14	2	1.81	20.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.48	5.88	1	1.02	14.29	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	2.39	29.41	-	-	-	5	4.52	50.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.96	11.76	1	1.02	14.29	1	0.90	10.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	1.44	17.65	1	1.02	14.29	2	1.81	20.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-2 · ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	17	7.44	100.00	10	9.14	100.00	7	5.87	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	5.88	1	0.91	10.00	-	-	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	6	2.63	35.29	5	4.57	50.00	1	0.84	14.29			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.31	17.65	1	0.91	10.00	2	1.68	28.57			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	3.06	41.18	3	2.74	30.00	4	3.36	57.14			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-3 · ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	36	11.53	100.00	18	12.32	100.00	18	10.83	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	3.20	27.78	5	3.42	27.78	5	3.01	27.78			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	10	3.20	27.78	5	3.42	27.78	5	3.01	27.78			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	0.96	8.33	2	1.37	11.11	1	0.60	5.56			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.32	2.78	1	0.68	5.56	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	10	3.20	27.78	4	2.74	22.22	6	3.61	33.33			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.64	5.56	1	0.68	5.56	1	0.60	5.56			

資料來源：衛生福利部。

表30-4 · ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	35	15.13	100.00	20	18.53	100.00	15	12.16	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.43	2.86	-	-	-	1	0.81	6.67			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.43	2.86	1	0.93	5.00	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	2.59	17.14	3	2.78	15.00	3	2.43	20.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	14	6.05	40.00	8	7.41	40.00	6	4.86	40.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.30	8.57	2	1.85	10.00	1	0.81	6.67			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.43	2.86	1	0.93	5.00	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	9	3.89	25.71	5	4.63	25.00	4	3.24	26.67			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-5 · ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	13	8.05	100.00	9	11.67	100.00	4	4.74	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	1.24	15.38	2	2.59	22.22	-	-	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	4	2.48	30.77	3	3.89	33.33	1	1.19	25.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	1.24	15.38	-	-	-	2	2.37	50.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	1.24	15.38	2	2.59	22.22	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	1.86	23.08	2	2.59	22.22	1	1.19	25.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-6 · ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	18	13.79	100.00	13	20.40	100.00	5	7.49	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	1.53	11.11	1	1.57	7.69	1	1.50	20.00			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.77	5.56	1	1.57	7.69	-	-	-			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	8	6.13	44.44	6	9.41	46.15	2	3.00	40.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	5	3.83	27.78	4	6.28	30.77	1	1.50	20.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	2	1.53	11.11	1	1.57	7.69	1	1.50	20.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-7 · ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	34	17.53	100.00	23	24.07	100.00	11	11.18	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	5.16	29.41	6	6.28	26.09	4	4.07	36.36			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	3.61	20.59	4	4.19	17.39	3	3.05	27.27			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	7	3.61	20.59	5	5.23	21.74	2	2.03	18.18			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	1.03	5.88	2	2.09	8.70	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	4.13	23.53	6	6.28	26.09	2	2.03	18.18			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-8 · ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	30	10.90	100.00	16	12.09	100.00	14	9.79	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.36	3.33	-	-	-	1	0.70	7.14			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	2.18	20.00	1	0.76	6.25	5	3.50	35.71			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	4.36	40.00	8	6.05	50.00	4	2.80	28.57			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.09	10.00	3	2.27	18.75	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	2.18	20.00	2	1.51	12.50	4	2.80	28.57			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.73	6.67	2	1.51	12.50	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-9 · ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	16	13.07	100.00	12	20.06	100.00	4	6.39	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	6.54	50.00	7	11.70	58.33	1	1.60	25.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	4	3.27	25.00	3	5.02	25.00	1	1.60	25.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.82	6.25	-	-	-	1	1.60	25.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	2.45	18.75	2	3.34	16.67	1	1.60	25.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-10 · ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	23	8.00	100.00	16	11.62	100.00	7	4.67	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.35	4.35	1	0.73	6.25	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.35	4.35	-	-	-	1	0.67	14.29			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.70	8.70	2	1.45	12.50	-	-	-			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.35	4.35	1	0.73	6.25	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	9	3.13	39.13	5	3.63	31.25	4	2.67	57.14			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.70	8.70	2	1.45	12.50	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.35	4.35	-	-	-	1	0.67	14.29			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.70	8.70	1	0.73	6.25	1	0.67	14.29			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	1.39	17.39	4	2.91	25.00	-	-	-			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表30-11 · ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	26	8.96	100.00	23	16.40	100.00	3	2.00	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.34	3.85	1	0.71	4.35	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	1.03	11.54	3	2.14	13.04	-	-	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.69	7.69	2	1.43	8.70	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	11	3.79	42.31	11	7.84	47.83	-	-	-	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.34	3.85	-	-	-	1	0.67	33.33	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.34	3.85	1	0.71	4.35	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	1.72	19.23	3	2.14	13.04	2	1.33	66.67	-	-	-
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.34	3.85	1	0.71	4.35	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.34	3.85	1	0.71	4.35	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-12 · ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計				男 性				女 性			
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	43	16.69	100.00	30	24.13	100.00	13	9.75	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	12	4.66	27.91	7	5.63	23.33	5	3.75	38.46			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.78	4.65	2	1.61	6.67	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.39	2.33	1	0.80	3.33	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	14	5.43	32.56	9	7.24	30.00	5	3.75	38.46			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	6	2.33	13.95	5	4.02	16.67	1	0.75	7.69			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	3.11	18.60	6	4.83	20.00	2	1.50	15.38			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-1 · ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	414	198.07	103.45	100.00	所有癌症死亡原因	233	236.78	124.24	100.00	所有癌症死亡原因	181	163.63	87.28	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	73	34.92	17.20	17.63	氣管、支氣管和肺癌	46	46.75	23.97	19.74	女性乳房癌	29	26.22	16.09	16.02
2	肝和肝內膽管癌	62	29.66	15.77	14.98	肝和肝內膽管癌	42	42.68	24.09	18.03	氣管、支氣管和肺癌	27	24.41	11.63	14.92
3	女性乳房癌(1)	29	26.22	16.09	7.00	結腸、直腸和肛門癌	32	32.52	15.12	13.73	肝和肝內膽管癌	20	18.08	8.98	11.05
4	結腸、直腸和肛門癌	49	23.44	10.37	11.84	前列腺(攝護腺)癌	17	17.28	8.06	7.30	結腸、直腸和肛門癌	17	15.37	6.46	9.39
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	17	17.28	8.06	4.11	胰臟癌	15	15.24	7.99	6.44	胰臟癌	12	10.85	5.30	6.63
6	胰臟癌	27	12.92	6.48	6.52	口腔癌	14	14.23	9.40	6.01	卵巢癌	9	8.14	6.49	4.97
7	胃癌	20	9.57	4.33	4.83	胃癌	13	13.21	5.96	5.58	非何杰金氏淋巴瘤	9	8.14	3.76	4.97
8	非何杰金氏淋巴瘤	19	9.09	4.40	4.59	非何杰金氏淋巴瘤	10	10.16	5.15	4.29	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	7.23	3.89	4.42
9	卵巢癌(1)	9	8.14	6.49	2.17	食道癌	6	6.10	4.01	2.58	胃癌	7	6.33	2.93	3.87
10	口腔癌	16	7.65	4.78	3.86	膀胱癌	6	6.10	2.51	2.58	腎臟癌	6	5.42	2.93	3.31
	其他	93	44.49	24.45	22.46	其他	32	32.52	17.97	13.73	其他	37	33.45	18.83	20.44
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	7.23	3.89	1.93	間皮和軟組織癌	5	5.08	3.29	2.15	白血病	5	4.52	3.54	2.76
12	膀胱癌	11	5.26	2.00	2.66	腦癌	4	4.06	2.20	1.72	膀胱癌	5	4.52	1.61	2.76
13	食道癌	7	3.35	1.92	1.69	鼻咽癌	4	4.06	2.46	1.72	子宮體癌	3	2.71	1.24	1.66
14	腎臟癌	7	3.35	1.86	1.69	膽囊和其他膽道癌	3	3.05	1.66	1.29	口腔癌	2	1.81	1.00	1.10
15	間皮和軟組織癌	7	3.35	2.28	1.69	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	2.03	0.79	0.86	間皮和軟組織癌(3)	2	1.81	1.33	1.10

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：黑色素瘤和其他皮膚癌、鼻咽癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.81人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.90人、1.10人。

表31-2 · ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	436	213.55	109.72	100.00	所有癌症死亡原因	258	235.91	124.93	100.00	所有癌症死亡原因	230	193.03	96.45	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	82	45.07	22.79	18.81	氣管、支氣管和肺癌	62	56.69	29.73	24.03	氣管、支氣管和肺癌	41	34.41	17.10	17.83
2	結腸、直腸和肛門癌	32	30.63	14.25	7.34	結腸、直腸和肛門癌	35	32.00	14.24	13.57	結腸、直腸和肛門癌	35	29.37	14.12	15.22
3	女性乳房癌(1)	56	27.70	15.85	12.84	肝和肝內膽管癌	28	25.60	14.05	10.85	女性乳房癌	33	27.70	15.85	14.35
4	肝和肝內膽管癌	50	19.69	9.98	11.47	口腔癌	17	15.54	9.99	6.59	肝和肝內膽管癌	17	14.27	6.51	7.39
5	胰臟癌	26	14.00	6.91	5.96	胃癌	17	15.54	7.79	6.59	胰臟癌	16	13.43	6.40	6.96
6	胃癌	22	13.13	6.32	5.05	胰臟癌	16	14.63	7.48	6.20	胃癌	13	10.91	5.04	5.65
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	18	9.14	3.85	4.13	食道癌	11	10.06	5.98	4.26	卵巢癌	10	8.39	4.25	4.35
8	口腔癌	9	8.75	5.15	2.06	白血病	11	10.06	5.27	4.26	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	6.71	3.93	3.48
9	卵巢癌(1)	8	8.39	4.25	1.83	前列腺(攝護腺)癌	10	9.14	3.85	3.88	白血病	8	6.71	3.38	3.48
10	白血病	8	8.31	4.36	1.83	鼻咽癌	6	5.49	3.38	2.33	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.20	2.06	2.17
	其他	125	61.22	27.33	28.67	其他	45	41.15	23.17	17.44	其他	44	36.93	17.82	19.13
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	6.71	3.93	1.83	膽囊和其他膽道癌	6	5.49	2.90	2.33	膀胱癌	5	4.20	1.42	2.17
12	食道癌	13	5.69	3.26	2.98	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.57	2.62	1.94	腦癌	3	2.52	1.46	1.30
13	非何杰金氏淋巴瘤	10	4.38	2.31	2.29	膀胱癌	5	4.57	1.46	1.94	子宮體癌	3	2.52	1.44	1.30
14	膀胱癌	10	4.38	1.41	2.29	腦癌	3	2.74	4.01	1.16	口腔癌	3	2.52	1.18	1.30
15	膽囊和其他膽道癌	9	3.94	1.72	2.06	喉癌	3	2.74	1.45	1.16	膽囊和其他膽道癌	3	2.52	0.88	1.30

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-3 · ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	616	197.26	91.83	100.00	所有癌症死亡原因	339	232.11	111.86	100.00	所有癌症死亡原因	277	166.63	75.02	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	134	42.91	18.99	21.75	氣管、支氣管和肺癌	71	48.61	23.03	20.94	氣管、支氣管和肺癌	63	37.90	15.77	22.74
2	結腸、直腸和肛門癌	80	25.62	12.11	12.99	肝和肝內膽管癌	41	28.07	13.94	12.09	結腸、直腸和肛門癌	39	23.46	10.92	14.08
3	肝和肝內膽管癌	71	22.74	10.08	11.53	結腸、直腸和肛門癌	41	28.07	13.49	12.09	女性乳房癌	34	20.45	11.31	12.27
4	女性乳房癌(1)	34	20.45	11.31	5.52	胃癌	25	17.12	7.11	7.37	肝和肝內膽管癌	30	18.05	7.01	10.83
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	21	14.38	4.59	3.41	前列腺(攝護腺)癌	21	14.38	4.59	6.19	胃癌	16	9.63	4.68	5.78
6	胃癌	41	13.13	5.82	6.66	胰臟癌	19	13.01	6.99	5.60	胰臟癌	12	7.22	2.82	4.33
7	胰臟癌	31	9.93	4.67	5.03	口腔癌	17	11.64	6.55	5.01	卵巢癌	11	6.62	3.48	3.97
8	非何杰金氏淋巴瘤	25	8.01	2.99	4.06	非何杰金氏淋巴瘤	15	10.27	4.12	4.42	非何杰金氏淋巴瘤	10	6.02	2.04	3.61
9	口腔癌	21	6.72	3.42	3.41	膀胱癌	14	9.59	4.24	4.13	白血病	6	3.61	2.45	2.17
10	卵巢癌(1)	11	6.62	3.48	1.79	白血病	10	6.85	4.91	2.95	子宮體癌	6	3.61	1.82	2.17
	其他	147	47.07	23.53	23.86	其他	65	44.51	22.88	19.17	其他	50	30.08	12.74	18.05
11	膀胱癌	17	5.44	2.19	2.76	食道癌	9	6.16	4.10	2.65	食道癌	4	2.41	1.33	1.44
12	白血病	16	5.12	3.72	2.60	膽囊和其他膽道癌	6	4.11	1.76	1.77	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	2.41	1.20	1.44
13	食道癌	13	4.16	2.64	2.11	腦癌	5	3.42	1.92	1.47	腎臟癌	4	2.41	1.06	1.44
14	子宮體癌(1)	6	3.61	1.82	0.97	腎臟癌	5	3.42	1.68	1.47	口腔癌	4	2.41	0.83	1.44
15	腎臟癌(3)	9	2.88	1.35	1.46	間皮和軟組織癌(4)	4	2.74	1.25	1.18	腦癌(5)	3	1.80	0.91	1.08

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、2.88人，每十萬人口標準化死亡率為1.15人。

(4)男性：喉癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.74人，每十萬人口標準化死亡率為1.20人。

(5)女性：膽囊和其他膽道癌、膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、1.80人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.66人、0.56人。

表31-4 · ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	486	210.12	110.82	100.00	所有癌症死亡原因	252	233.52	130.80	100.00	所有癌症死亡原因	234	189.65	94.13	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	101	43.67	23.10	20.78	氣管、支氣管和肺癌	57	52.82	29.93	22.62	氣管、支氣管和肺癌	44	35.66	17.61	18.80
2	結腸、直腸和肛門癌	68	29.40	14.92	13.99	肝和肝內膽管癌	38	35.21	20.02	15.08	結腸、直腸和肛門癌	30	24.31	11.65	12.82
3	肝和肝內膽管癌	65	28.10	14.48	13.37	結腸、直腸和肛門癌	38	35.21	18.99	15.08	肝和肝內膽管癌	27	21.88	9.77	11.54
4	女性乳房癌(1)	23	18.64	10.18	4.73	口腔癌	16	14.83	9.14	6.35	女性乳房癌	23	18.64	10.18	9.83
5	胃癌	31	13.40	6.73	6.38	胃癌	16	14.83	7.63	6.35	胃癌	15	12.16	6.06	6.41
6	胰臟癌	24	10.38	5.45	4.94	非何杰金氏淋巴瘤	12	11.12	6.38	4.76	卵巢癌	12	9.73	5.57	5.13
7	卵巢癌(1)	12	9.73	5.57	2.47	胰臟癌	12	11.12	5.99	4.76	胰臟癌	12	9.73	5.07	5.13
8	口腔癌	19	8.21	4.84	3.91	膀胱癌	8	7.41	4.10	3.17	腎臟癌	10	8.10	3.78	4.27
9	非何杰金氏淋巴瘤	19	8.21	4.18	3.91	食道癌	7	6.49	4.05	2.78	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.67	2.43	2.99
10	腎臟癌	13	5.62	2.68	2.67	前列腺(攝護腺)癌	6	5.56	2.55	2.38	白血病	6	4.86	2.37	2.56
	其他	111	47.99	25.66	22.84	其他	42	38.92	22.02	16.67	其他	48	38.90	19.66	20.51
11	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	5.56	2.55	1.23	鼻咽癌	5	4.63	2.43	1.98	間皮和軟組織癌	5	4.05	2.51	2.14
12	白血病	10	4.32	2.23	2.06	白血病	4	3.71	1.99	1.59	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	4.05	2.27	2.14
13	膀胱癌	10	4.32	2.07	2.06	腦癌	3	2.78	1.61	1.19	子宮體癌	4	3.24	1.48	1.71
14	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	5	4.05	2.27	1.03	腎臟癌	3	2.78	1.26	1.19	膽囊和其他膽道癌	4	3.24	1.42	1.71
15	食道癌	8	3.46	1.99	1.65	膽囊和其他膽道癌(3)	2	1.85	1.06	0.79	口腔癌	3	2.43	1.35	1.28

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.85人，每十萬人口標準化死亡率為0.79人。

表31-5 · ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	314	194.50	102.13	100.00	所有癌症死亡原因	168	217.89	117.03	100.00	所有癌症死亡原因	146	173.12	89.00	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	54	33.45	17.26	17.20	氣管、支氣管和肺癌	36	46.69	25.08	21.43	女性乳房癌	27	32.02	17.25	18.49
2	女性乳房癌(1)	27	32.02	17.25	8.60	肝和肝內膽管癌	29	37.61	20.97	17.26	結腸、直腸和肛門癌	23	27.27	12.99	15.75
3	肝和肝內膽管癌	43	26.64	14.12	13.69	結腸、直腸和肛門癌	19	24.64	12.43	11.31	氣管、支氣管和肺癌	18	21.34	10.57	12.33
4	結腸、直腸和肛門癌	42	26.02	12.70	13.38	口腔癌	11	14.27	9.42	6.55	肝和肝內膽管癌	14	16.60	8.26	9.59
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	10	12.97	4.13	3.18	前列腺(攝護腺)癌	10	12.97	4.13	5.95	非何杰金氏淋巴瘤	7	8.30	4.37	4.79
6	胃癌	16	9.91	5.38	5.10	胃癌	9	11.67	6.68	5.36	胰臟癌	7	8.30	4.05	4.79
7	口腔癌	15	9.29	5.66	4.78	非何杰金氏淋巴瘤	8	10.38	5.29	4.76	胃癌	7	8.30	4.18	4.79
8	非何杰金氏淋巴瘤	15	9.29	4.89	4.78	食道癌	6	7.78	5.20	3.57	卵巢癌	5	5.93	3.49	3.42
9	胰臟癌	13	8.05	4.04	4.14	胰臟癌	6	7.78	4.01	3.57	白血病	5	5.93	2.83	3.42
10	卵巢癌(1)	5	5.93	3.49	1.59	膽囊和其他膽道癌	4	5.19	3.37	2.38	口腔癌	4	4.74	2.46	2.74
	其他	74	45.84	25.01	23.57	其他	30	38.91	20.44	17.86	其他	29	34.39	18.55	19.86
11	白血病	9	5.57	2.89	2.87	白血病	4	5.19	2.94	2.38	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	3.56	2.02	2.05
12	食道癌	8	4.96	3.30	2.55	腎臟癌	4	5.19	2.49	2.38	子宮體癌	3	3.56	1.75	2.05
13	膀胱癌	6	3.72	1.36	1.91	膀胱癌	3	3.89	0.95	1.79	膀胱癌	3	3.56	1.66	2.05
14	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	3.56	2.02	0.96	間皮和軟組織癌	2	2.59	1.06	1.19	腦癌	2	2.37	2.16	1.37
15	子宮體癌(1)	3	3.56	1.75	0.96	主唾液腺癌(3)	1	1.30	1.00	0.60	食道癌	2	2.37	1.67	1.37

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：黑色素瘤和其他皮膚癌、腦癌、鼻咽癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.30人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.00人、0.73人、0.59人。

表31-6 · ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	270	206.90	111.16	100.00	所有癌症死亡原因	164	257.33	147.66	100.00	所有癌症死亡原因	106	158.76	80.01	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	66	50.57	26.45	24.44	氣管、支氣管和肺癌	41	64.33	36.63	25.00	氣管、支氣管和肺癌	25	37.44	17.72	23.58
2	前列腺(攝護腺)癌(2)	17	26.67	12.77	6.30	肝和肝內膽管癌	19	29.81	18.52	11.59	結腸、直腸和肛門癌	15	22.47	9.75	14.15
3	結腸、直腸和肛門癌	33	25.29	12.29	12.22	結腸、直腸和肛門癌	18	28.24	15.01	10.98	肝和肝內膽管癌	13	19.47	8.84	12.26
4	肝和肝內膽管癌	32	24.52	13.54	11.85	前列腺(攝護腺)癌	17	26.67	12.77	10.37	女性乳房癌	9	13.48	7.14	8.49
5	胃癌	20	15.33	8.24	7.41	胃癌	13	20.40	11.49	7.93	胃癌	7	10.48	5.60	6.60
6	女性乳房癌(1)	9	13.48	7.14	3.33	胰臟癌	10	15.69	8.82	6.10	胰臟癌	5	7.49	3.82	4.72
7	胰臟癌	15	11.49	6.14	5.56	口腔癌	9	14.12	8.70	5.49	白血病	4	5.99	4.48	3.77
8	口腔癌	10	7.66	4.53	3.70	食道癌	9	14.12	8.45	5.49	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	5.99	3.61	3.77
9	食道癌	9	6.90	3.96	3.33	白血病	3	4.71	2.71	1.83	子宮體癌	2	3.00	2.03	1.89
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	4	5.99	3.61	1.48	鼻咽癌	3	4.71	2.70	1.83	膀胱癌	2	3.00	1.78	1.89
	其他	55	42.15	24.79	20.37	其他	22	34.52	21.87	13.41	其他	20	29.95	15.24	18.87
11	白血病	7	5.36	3.58	2.59	膀胱癌	3	4.71	2.41	1.83	甲狀腺癌	2	3.00	1.31	1.89
12	膀胱癌	5	3.83	2.03	1.85	腦癌	2	3.14	3.20	1.22	卵巢癌	2	3.00	1.22	1.89
13	鼻咽癌	4	3.07	1.64	1.48	腎臟癌	2	3.14	2.04	1.22	膽囊和其他膽道癌	2	3.00	1.13	1.89
14	子宮體癌(1)	2	3.00	2.03	0.74	喉癌	2	3.14	1.90	1.22	腦癌	1	1.50	2.76	0.94
15	卵巢癌(1)	2	3.00	1.22	0.74	非何杰金氏淋巴瘤(3)	2	3.14	1.87	1.22	口腔癌(4)	1	1.50	0.85	0.94

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.14人，每十萬人口標準化死亡率為1.51人。

(4)女性：間皮和軟組織癌、非何杰金氏淋巴瘤、骨和關節軟骨癌、鼻咽癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.50人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.76人、0.67人、0.58人、0.58人。

表31-7 · ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	456	235.13	117.14	100.00	所有癌症死亡原因	273	285.67	147.90	100.00	所有癌症死亡原因	183	186.02	89.40	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	84	43.31	20.29	18.42	氣管、支氣管和肺癌	48	50.23	23.61	17.58	氣管、支氣管和肺癌	36	36.59	17.37	19.67
2	肝和肝內膽管癌	63	32.48	16.41	13.82	肝和肝內膽管癌	40	41.86	21.98	14.65	女性乳房癌	26	26.43	14.82	14.21
3	結腸、直腸和肛門癌	57	29.39	14.25	12.50	結腸、直腸和肛門癌	33	34.53	18.41	12.09	結腸、直腸和肛門癌	24	24.40	11.03	13.11
4	女性乳房癌(1)	26	26.43	14.82	5.70	胃癌	24	25.11	12.01	8.79	肝和肝內膽管癌	23	23.38	11.22	12.57
5	胃癌	34	17.53	7.37	7.46	口腔癌	20	20.93	12.42	7.33	胃癌	10	10.17	3.44	5.46
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	12	12.56	4.57	2.63	胰臟癌	15	15.70	9.04	5.49	胰臟癌	8	8.13	3.47	4.37
7	胰臟癌	23	11.86	6.06	5.04	食道癌	14	14.65	8.55	5.13	白血病	7	7.12	4.64	3.83
8	口腔癌	20	10.31	5.86	4.39	前列腺(攝護腺)癌	12	12.56	4.57	4.40	非何杰金氏淋巴瘤	6	6.10	2.97	3.28
9	食道癌	15	7.73	4.34	3.29	膀胱癌	7	7.32	3.51	2.56	子宮體癌	5	5.08	2.90	2.73
10	非何杰金氏淋巴瘤	13	6.70	3.17	2.85	非何杰金氏淋巴瘤	7	7.32	3.21	2.56	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	5.08	2.47	2.73
	其他	109	56.20	29.41	23.90	其他	53	55.46	30.59	19.41	其他	33	33.55	15.07	18.03
11	白血病	11	5.67	3.27	2.41	鼻咽癌	4	4.19	3.15	1.47	卵巢癌	3	3.05	1.84	1.64
12	子宮體癌(1)	5	5.08	2.90	1.10	白血病	4	4.19	1.98	1.47	膽囊和其他膽道癌	3	3.05	1.08	1.64
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	5	5.08	2.47	1.10	喉癌	4	4.19	1.98	1.47	腦癌	2	2.03	1.01	1.09
14	膀胱癌	9	4.64	2.10	1.97	腎臟癌	4	4.19	1.85	1.47	膀胱癌	2	2.03	0.83	1.09
15	腎臟癌(3)	6	3.09	1.29	1.32	鼻腔、中耳和副鼻竇癌(4)	3	3.14	1.68	1.10	腎臟癌	2	2.03	0.79	1.09

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、3.09人，每十萬人口標準化死亡率為1.08人。

(4)男性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、3.14人，每十萬人口標準化死亡率為1.09人。

表31-8 · ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	485	176.17	99.56	100.00	所有癌症死亡原因	257	212.39	125.86	100.00	所有癌症死亡原因	204	142.66	78.71	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	85	30.88	17.94	17.53	氣管、支氣管和肺癌	50	41.57	25.61	19.46	女性乳房癌	36	25.18	15.31	17.65
2	女性乳房癌(1)	36	25.18	15.31	7.42	結腸、直腸和肛門癌	36	29.48	17.00	14.01	氣管、支氣管和肺癌	30	20.98	11.87	14.71
3	結腸、直腸和肛門癌	62	22.52	11.71	12.78	肝和肝內膽管癌	26	24.19	15.06	10.12	結腸、直腸和肛門癌	23	16.08	7.68	11.27
4	肝和肝內膽管癌	50	18.16	10.04	10.31	口腔癌	23	18.90	11.73	8.95	肝和肝內膽管癌	18	12.59	6.00	8.82
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	20	15.12	7.79	4.12	胃癌	19	15.12	8.03	7.39	卵巢癌	15	10.49	6.22	7.35
6	胃癌	30	10.90	5.43	6.19	前列腺(攝護腺)癌	16	15.12	7.79	6.23	胰臟癌	11	7.69	4.10	5.39
7	卵巢癌(1)	15	10.49	6.22	3.09	胰臟癌	14	12.09	7.24	5.45	胃癌	10	6.99	3.30	4.90
8	口腔癌	27	9.81	5.81	5.57	非何杰金氏淋巴瘤	10	9.83	5.91	3.89	白血病	7	4.90	2.67	3.43
9	胰臟癌	27	9.81	5.47	5.57	食道癌	9	7.56	4.75	3.50	非何杰金氏淋巴瘤	7	4.90	2.36	3.43
10	非何杰金氏淋巴瘤	20	7.26	4.00	4.12	膀胱癌	8	5.29	3.44	3.11	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	4.20	2.53	2.94
	其他	113	41.05	23.95	23.30	其他	46	33.26	19.29	17.90	其他	41	28.67	16.68	20.10
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	4.20	2.53	1.24	鼻咽癌	5	3.78	2.75	1.95	膽囊和其他膽道癌	6	4.20	2.24	2.94
12	食道癌	11	4.00	2.42	2.27	膽囊和其他膽道癌	5	3.78	2.04	1.95	子宮體癌	4	2.80	1.62	1.96
13	膽囊和其他膽道癌	11	4.00	2.17	2.27	腎臟癌	4	3.02	1.51	1.56	間皮和軟組織癌	4	2.80	1.38	1.96
14	膀胱癌	10	3.63	2.12	2.06	間皮和軟組織癌	3	2.27	1.63	1.17	腦癌	3	2.10	1.84	1.47
15	白血病	9	3.27	1.89	1.86	腦癌	3	2.27	1.59	1.17	膀胱癌	3	2.10	1.00	1.47

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-9 · ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	213	174.05	107.15	100.00	所有癌症死亡原因	115	192.28	125.64	100.00	所有癌症死亡原因	98	156.62	91.78	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	44	35.95	21.17	20.66	氣管、支氣管和肺癌	25	41.80	26.53	21.74	氣管、支氣管和肺癌	19	30.37	16.97	19.39
2	肝和肝內膽管癌	35	28.60	18.05	16.43	肝和肝內膽管癌	23	38.46	25.95	20.00	女性乳房癌	15	23.97	15.64	15.31
3	女性乳房癌(1)	15	23.97	15.64	7.04	結腸、直腸和肛門癌	21	35.11	22.26	18.26	肝和肝內膽管癌	12	19.18	11.02	12.24
4	結腸、直腸和肛門癌	29	23.70	13.98	13.62	食道癌	6	10.03	7.35	5.22	結腸、直腸和肛門癌	8	12.79	6.69	8.16
5	卵巢癌(1)	6	9.59	6.27	2.82	口腔癌	4	6.69	4.85	3.48	卵巢癌	6	9.59	6.27	6.12
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	4	6.69	3.77	1.88	白血病	4	6.69	4.47	3.48	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.79	3.10	3.06
7	口腔癌	6	4.90	3.59	2.82	胰臟癌	4	6.69	4.13	3.48	子宮體癌	3	4.79	2.97	3.06
8	食道癌	6	4.90	3.47	2.82	膀胱癌	4	6.69	3.79	3.48	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.79	2.65	3.06
9	膀胱癌	6	4.90	2.93	2.82	前列腺(攝護腺)癌	4	6.69	3.77	3.48	胃癌	3	4.79	2.44	3.06
10	白血病	6	4.90	2.90	2.82	胃癌	3	5.02	3.21	2.61	口腔癌	2	3.20	2.40	2.04
	其他	56	45.76	27.92	26.29	其他	17	28.42	19.34	14.78	其他	24	38.36	21.64	24.49
11	胰臟癌	6	4.90	2.83	2.82	鼻咽癌	2	3.34	2.67	1.74	膀胱癌	2	3.20	2.11	2.04
12	胃癌	6	4.90	2.78	2.82	腎臟癌	2	3.34	1.56	1.74	鼻咽癌	2	3.20	2.03	2.04
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	4.79	3.10	1.41	甲狀腺癌	1	1.67	2.48	0.87	胰臟癌	2	3.20	1.89	2.04
14	子宮體癌(1)	3	4.79	2.97	1.41	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	1.67	1.24	0.87	白血病	2	3.20	1.73	2.04
15	鼻咽癌(3)	4	3.27	2.32	1.88	間皮和軟組織癌(4)	1	1.67	1.22	0.87	主唾液腺癌(5)	1	1.60	1.16	1.02

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：非何杰金氏淋巴瘤之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、3.27人，每十萬人口標準化死亡率為1.83人。

(4)男性：喉癌、腦癌、非何杰金氏淋巴瘤、黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.67人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.15人、0.95人、0.61人、0.61人。

(5)女性：膽囊和其他膽道癌、腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.60人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.11人、0.93人。

表31-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	461	160.26	109.90	100.00	所有癌症死亡原因	251	198.80	148.10	100.00	所有癌症死亡原因	210	140.02	91.98	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	85	29.55	19.71	18.44	氣管、支氣管和肺癌	50	40.05	31.55	19.92	氣管、支氣管和肺癌	35	23.34	14.97	16.67
2	結腸、直腸和肛門癌	62	21.55	14.69	13.45	肝和肝內膽管癌	39	33.50	26.49	15.54	結腸、直腸和肛門癌	33	22.00	13.95	15.71
3	肝和肝內膽管癌	61	21.21	15.11	13.23	結腸、直腸和肛門癌	29	14.56	12.15	11.55	女性乳房癌	24	16.00	11.17	11.43
4	女性乳房癌(1)	24	16.00	11.17	5.21	口腔癌	23	13.11	9.89	9.16	肝和肝內膽管癌	22	14.67	9.97	10.48
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	14	10.17	5.83	3.04	胃癌	16	12.38	9.59	6.37	卵巢癌	12	8.00	4.85	5.71
6	胃癌	24	8.34	5.92	5.21	前列腺(攝護腺)癌	14	10.92	7.46	5.58	胰臟癌	11	7.33	4.91	5.24
7	口腔癌	24	8.34	5.49	5.21	非何杰金氏淋巴瘤	12	10.20	8.07	4.78	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	6.67	4.69	4.76
8	卵巢癌(1)	12	8.00	4.85	2.60	白血病	11	8.01	4.84	4.38	非何杰金氏淋巴瘤	9	6.00	3.95	4.29
9	非何杰金氏淋巴瘤	21	7.30	4.98	4.56	膀胱癌	8	7.28	4.92	3.19	胃癌	8	5.33	3.06	3.81
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	10	6.67	4.69	2.17	食道癌	8	7.28	3.95	3.19	白血病	6	4.00	2.96	2.86
	其他	124	43.11	30.19	26.90	其他	41	41.51	29.19	16.33	其他	40	26.67	17.50	19.05
11	白血病	17	5.91	4.30	3.69	胰臟癌	6	7.28	5.30	2.39	腦癌	5	3.33	2.29	2.38
12	胰臟癌	17	5.91	4.01	3.69	腦癌	4	5.83	3.79	1.59	間皮和軟組織癌	5	3.33	2.24	2.38
13	食道癌	10	3.48	2.16	2.17	鼻咽癌	4	4.37	3.06	1.59	鼻咽癌	4	2.67	1.92	1.90
14	腦癌	9	3.13	2.65	1.95	間皮和軟組織癌	3	3.64	2.11	1.20	食道癌	2	1.33	0.91	0.95
15	膀胱癌	9	3.13	2.19	1.95	喉癌(3)	2	2.91	2.13	0.80	腎臟癌(4)	2	1.33	0.85	0.95

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、2.91人，每十萬人口標準化死亡率為1.10人。

(4)女性：子宮體癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.33人，每十萬人口標準化死亡率為0.74人。

表31-11 · ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因

中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	566	194.96	105.59	100.00	所有癌症死亡原因	323	230.33	131.14	100.00	所有癌症死亡原因	243	161.91	84.50	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	134	46.16	23.67	23.67	氣管、支氣管和肺癌	71	50.63	27.48	21.98	氣管、支氣管和肺癌	63	41.98	20.66	25.93
2	肝和肝內膽管癌	83	28.59	15.73	14.66	肝和肝內膽管癌	58	41.36	24.07	17.96	結腸、直腸和肛門癌	28	18.66	9.15	11.52
3	結腸、直腸和肛門癌	69	23.77	12.47	12.19	結腸、直腸和肛門癌	41	29.24	16.60	12.69	女性乳房癌	26	17.32	9.28	10.70
4	女性乳房癌(1)	26	17.32	9.28	4.59	胃癌	24	17.11	8.82	7.43	肝和肝內膽管癌	25	16.66	8.83	10.29
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	23	16.40	8.66	4.06	前列腺(攝護腺)癌	23	16.40	8.66	7.12	卵巢癌	12	8.00	4.63	4.94
6	胃癌	35	12.06	6.33	6.18	食道癌	16	11.41	6.43	4.95	胃癌	11	7.33	4.35	4.53
7	胰臟癌	24	8.27	4.16	4.24	口腔癌	15	10.70	7.42	4.64	胰臟癌	10	6.66	3.33	4.12
8	卵巢癌(1)	12	8.00	4.63	2.12	胰臟癌	14	9.98	5.11	4.33	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	6.00	3.65	3.70
9	口腔癌	18	6.20	3.94	3.18	膀胱癌	6	4.28	2.98	1.86	子宮體癌	7	4.66	2.43	2.88
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	6.00	3.65	1.59	白血病	5	3.57	2.58	1.55	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.00	1.83	2.47
	其他	133	45.81	25.90	23.50	其他	50	35.66	21.00	15.48	其他	46	30.65	16.37	18.93
11	食道癌	16	5.51	2.96	2.83	腎臟癌	5	3.57	1.99	1.55	白血病	4	2.67	1.86	1.65
12	子宮體癌(1)	7	4.66	2.43	1.24	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.57	1.86	1.55	間皮和軟組織癌	4	2.67	1.47	1.65
13	非何杰金氏淋巴瘤	11	3.79	1.87	1.94	間皮和軟組織癌	4	2.85	2.29	1.24	黑色素瘤和其他皮膚癌	4	2.67	0.94	1.65
14	白血病	9	3.10	2.23	1.59	鼻咽癌	4	2.85	1.97	1.24	鼻咽癌	3	2.00	1.24	1.23
15	間皮和軟組織癌(3)	8	2.76	1.91	1.41	腦癌(4)	4	2.85	1.49	1.24	腎臟癌(5)	3	2.00	1.18	1.23

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、2.76人，每十萬人口標準化死亡率為1.59人。

(4)男性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.85人，每十萬人口標準化死亡率為1.30人。

(5)女性：膽囊和其他膽道癌、口腔癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.00人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.09人、0.91人。

表31-12 · ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因
中華民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	450	174.68	100.96	100.00	所有癌症死亡原因	263	211.52	128.67	100.00	所有癌症死亡原因	187	140.31	78.19	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	107	41.53	23.13	23.78	氣管、支氣管和肺癌	64	51.47	30.49	24.33	氣管、支氣管和肺癌	43	32.26	17.17	22.99
2	肝和肝內膽管癌	62	24.07	14.16	13.78	肝和肝內膽管癌	41	32.97	21.07	15.59	結腸、直腸和肛門癌	24	18.01	9.69	12.83
3	結腸、直腸和肛門癌	54	20.96	12.04	12.00	結腸、直腸和肛門癌	30	24.13	14.98	11.41	肝和肝內膽管癌	21	15.76	8.56	11.23
4	女性乳房癌(1)	20	15.01	8.63	4.44	胃癌	17	13.67	7.27	6.46	女性乳房癌	20	15.01	8.63	10.70
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	10.46	4.91	2.89	胰臟癌	14	11.26	6.81	5.32	卵巢癌	10	7.50	4.80	5.35
6	胃癌	24	9.32	4.78	5.33	前列腺(攝護腺)癌	13	10.46	4.91	4.94	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	5.25	3.25	3.74
7	胰臟癌	21	8.15	4.81	4.67	白血病	12	9.65	5.58	4.56	胰臟癌	7	5.25	3.05	3.74
8	卵巢癌(1)	10	7.50	4.80	2.22	口腔癌	9	7.24	4.68	3.42	胃癌	7	5.25	2.70	3.74
9	白血病	15	5.82	3.09	3.33	非何杰金氏淋巴瘤	8	6.43	4.05	3.04	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.50	2.45	3.21
10	非何杰金氏淋巴瘤	14	5.43	3.15	3.11	食道癌	6	4.83	3.36	2.28	子宮體癌	5	3.75	2.45	2.67
	其他	110	42.70	26.33	24.44	其他	49	39.41	25.45	18.63	其他	37	27.76	15.44	19.79
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	5.25	3.25	1.56	膀胱癌	5	4.02	2.01	1.90	腦癌	4	3.00	1.95	2.14
12	口腔癌	12	4.66	2.91	2.67	腦癌	4	3.22	3.20	1.52	膀胱癌	3	2.25	1.42	1.60
13	子宮體癌(1)	5	3.75	2.45	1.11	鼻咽癌	4	3.22	2.15	1.52	口腔癌	3	2.25	1.40	1.60
14	腦癌	8	3.11	2.59	1.78	喉癌	4	3.22	2.14	1.52	白血病	3	2.25	1.05	1.60
15	膀胱癌	8	3.11	1.71	1.78	間皮和軟組織癌	3	2.41	2.15	1.14	間皮和軟組織癌	2	1.50	0.62	1.07

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表32·臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
01-56	所有死亡原因		11,551	437.00	473.41		13,733	523.20	392.14		14,339	547.41	392.62		13,875	528.71	364.83		14,486	550.64	363.48
08-14	惡性腫瘤	1	3,180	120.31	126.30	1	4,202	160.09	122.12	1	4,290	163.78	120.21	1	4,423	168.54	118.90	1	4,566	173.56	118.18
25-27-28*	心臟疾病	3	1,257	47.56	52.39	2	1,732	65.99	46.85	2	1,665	63.56	42.87	2	1,527	58.19	38.38	2	1,642	62.42	39.41
29	腦血管疾病	2	1,306	49.41	53.45	3	1,240	47.24	33.77	3	1,367	52.19	35.74	3	1,182	45.04	29.23	3	1,289	49.00	30.31
181	糖尿病	5	620	23.46	25.12	4	893	34.02	24.96	4	988	37.72	26.19	4	946	36.05	23.79	4	958	36.42	23.27
321	肺炎	7	372	14.07	16.31	7	447	17.03	11.49	5	572	21.84	13.82	5	575	21.91	13.32	5	688	26.15	14.96
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	358	13.54	14.96	5	503	19.16	13.77	6	544	20.77	13.94	6	485	18.48	12.19	6	549	20.87	12.78
E47-E53	事故傷害	4	752	28.45	28.41	6	463	17.64	15.78	8	415	15.84	14.03	8	379	14.44	12.68	7	372	14.14	11.97
E54	自殺	10	206	7.79	7.56	8	346	13.18	10.93	7	467	17.83	14.79	7	454	17.30	14.12	8	364	13.84	11.27
347	慢性肝病及肝硬化	6	380	14.38	14.81	9	333	12.69	9.96	9	323	12.33	9.20	9	317	12.08	8.86	9	331	12.58	8.92
038	敗血症	13	96	3.63	4.04	12	94	3.58	2.52	11	150	5.73	3.78	11	145	5.53	3.48	10	188	7.15	4.07
26	高血壓性疾病	9	292	11.05	12.14	10	167	6.36	4.43	10	162	6.18	4.14	10	176	6.71	4.30	11	141	5.36	3.17
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	190	7.19	7.76	11	113	4.31	2.92	12	109	4.16	2.79	12	92	3.51	2.26	12	97	3.69	2.23
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	76	2.88	3.05	14	70	2.67	1.89	13	77	2.94	2.06	13	79	3.01	1.89	13	80	3.04	1.87
02	結核病	15	80	3.03	3.20	13	74	2.82	2.01	14	60	2.29	1.62	14	68	2.59	1.63	14	57	2.17	1.32
44	先天性畸形	12	99	3.75	5.51	15	48	1.83	3.32	16	39	1.49	2.66	15	42	1.60	2.92	15	48	1.82	3.51
	其他		2,287	86.52	98.40		3,008	114.60	85.42		3,111	118.77	84.77		2,985	113.74	76.88		3,116	118.45	76.24

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表32·臺北市歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		15,119	575.72	366.18		14,870	568.60	347.27		15,047	575.83	338.78		15,834	600.94	343.47		16,397	615.94	344.34
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10	112.87	1	4,563	174.48	111.24	1	4,632	177.26	110.14	1	4,732	179.59	109.78	1	4,981	187.11	111.52
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2,014	76.69	46.14	2	1,768	67.61	39.98	2	1,723	65.94	36.69	2	1,905	72.30	38.51	2	2,028	76.18	40.21
J12-J18	肺炎	4	950	36.18	20.14	4	840	32.12	16.59	4	899	34.40	16.89	4	942	35.75	16.96	4	905	34.00	15.54
I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66	27.26	3	1,128	43.13	24.61	3	1,047	40.07	21.91	3	1,137	43.15	23.13	3	1,186	44.55	22.94
E10-E14	糖尿病	5	716	27.26	16.89	5	825	31.55	18.86	5	769	29.43	16.78	5	775	29.41	16.39	5	817	30.69	16.63
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98	9.27	6	496	18.97	9.85	7	465	17.79	8.87	6	582	22.09	10.48	6	591	22.20	10.31
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	491	18.70	11.20	7	451	17.25	9.72	6	474	18.14	10.07	8	448	17.00	8.89	9	531	19.95	10.62
A40-A41	敗血症	6	513	19.53	11.27	8	441	16.86	9.44	8	449	17.18	9.25	7	566	21.48	10.81	7	559	21.00	10.47
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	389	14.81	11.94	10	377	14.42	11.20	11	359	13.74	10.71	10	402	15.26	10.92	10	430	16.15	11.31
I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24	8.21	9	385	14.72	8.17	9	422	16.15	8.49	9	446	16.93	8.47	8	536	20.13	9.74
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	17	69	2.63	1.29	15	112	4.28	2.06	15	116	4.44	2.00	14	136	5.16	2.18	15	129	4.85	1.94
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	281	10.70	5.87	13	340	13.00	6.39	10	380	14.54	6.79	13	217	8.24	4.45	13	167	6.27	3.41
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	370	14.09	11.40	12	341	13.04	10.39	12	329	12.59	9.67	12	306	11.61	8.98	11	333	12.51	9.82
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27	7.69	11	349	13.35	8.79	13	318	12.17	7.90	11	315	11.96	7.65	12	286	10.74	6.77
G20-G21	帕金森病	15	93	3.54	1.88	16	92	3.52	1.89	16	111	4.25	2.10	16	121	4.59	2.33	14	158	5.94	2.92
	其他		2,451	93.33	62.86		2,362	90.32	58.09		2,554	97.74	60.52		2,804	106.42	63.54		2,760	103.68	60.21

表32·臺北市歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		16,100	600.78	326.27		16,953	629.19	332.49		17,160	634.72	325.57		18,039	668.05	332.75
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,919	183.55	106.98	1	4,903	181.97	103.66	1	5,025	185.87	102.84	1	5,219	193.28	105.00
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,075	77.43	39.81	2	2,489	92.38	46.23	2	2,381	88.07	42.60	2	2,631	97.44	45.78
J12-J18	肺炎	4	883	32.95	14.46	4	1,060	39.34	17.10	4	1,125	41.61	17.37	3	1,274	47.18	19.36
I60-I69	腦血管疾病	3	1,210	45.15	22.34	3	1,212	44.98	22.40	3	1,153	42.65	20.08	4	1,206	44.66	20.76
E10-E14	糖尿病	5	860	32.09	16.84	5	854	31.70	16.16	5	773	28.59	13.87	5	829	30.70	14.50
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	573	21.38	9.73	6	657	24.38	10.28	6	636	23.52	9.54	6	626	23.18	9.64
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	488	18.21	9.13	7	556	20.64	9.89	7	565	20.90	9.68	7	611	22.63	10.24
A40-A41	敗血症	9	466	17.39	8.18	10	445	16.52	7.62	9	462	17.09	7.49	8	529	19.59	8.15
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	406	15.15	10.47	9	458	17.00	11.23	10	435	16.09	11.05	9	457	16.92	11.14
I10-I15	高血壓性疾病	7	493	18.40	8.66	8	461	17.11	7.55	8	463	17.13	7.65	10	386	14.29	6.37
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	15	142	5.30	2.11	14	198	7.35	2.78	12	299	11.06	3.97	11	344	12.74	4.40
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	191	7.13	3.62	12	309	11.47	5.02	13	297	10.99	4.67	12	319	11.81	4.67
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	261	9.74	7.40	11	311	11.54	9.06	11	318	11.76	8.72	13	308	11.41	8.38
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	310	11.57	6.99	13	284	10.54	6.29	14	278	10.28	5.96	14	279	10.33	5.97
G20-G21	帕金森病	14	155	5.78	2.71	15	135	5.01	2.23	15	180	6.66	2.95	15	206	7.63	3.29
	其他		2,668	99.56	56.83		2,621	97.28	55.00		2,770	102.46	57.14		2,815	104.25	55.12

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
01-56	所有死亡原因		7,172	541.89	552.47		8,352	647.93	474.26		8,763	683.06	480.28		8,387	654.67	445.74		8,633	674.39	445.81
08-14	惡性腫瘤	1	1,977	149.38	148.48	1	2,594	201.24	149.63	1	2,630	205.00	148.15	1	2,695	210.37	146.09	1	2,757	215.37	146.53
25-27-28*	心臟疾病	3	791	59.77	61.02	2	1,107	85.88	59.64	2	1,060	82.62	54.25	2	971	75.79	49.62	2	1,026	80.15	51.54
29	腦血管疾病	2	800	60.45	60.80	3	725	56.24	39.19	3	822	64.07	43.39	3	680	53.08	34.17	3	768	59.99	37.36
181	糖尿病	5	328	24.78	25.13	4	440	34.13	24.46	4	521	40.61	27.75	4	473	36.92	24.11	4	495	38.67	25.11
321	肺炎	7	245	18.51	20.24	6	300	23.27	14.96	5	370	28.84	17.20	5	373	29.12	17.22	5	446	34.84	19.16
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	185	13.98	14.57	7	278	21.57	14.97	6	324	25.26	16.55	8	261	20.37	13.06	6	272	21.25	12.61
E47-E53	事故傷害	4	535	40.42	39.71	5	342	26.53	23.74	8	312	24.32	21.46	7	281	21.93	19.32	7	265	20.70	17.90
E54	自殺	11	123	9.29	8.97	8	225	17.46	14.81	7	313	24.40	20.52	6	309	24.12	20.00	8	228	17.81	14.72
347	慢性肝病及肝硬化	6	273	20.63	20.35	9	222	17.22	13.87	9	192	14.97	11.51	9	210	16.39	12.38	9	222	17.34	12.80
038	敗血症	14	50	3.78	3.89	13	54	4.19	2.83	11	73	5.69	3.62	11	73	5.70	3.34	10	82	6.41	3.70
26	高血壓性疾病	9	167	12.62	12.56	10	82	6.36	4.29	10	106	8.26	5.49	10	94	7.34	4.78	11	69	5.39	3.04
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	131	9.90	10.03	11	73	5.66	3.64	12	71	5.53	3.57	12	58	4.53	2.83	12	61	4.77	2.83
02	胃及十二指腸之潰瘍	13	58	4.38	4.31	14	43	3.34	2.25	13	52	4.05	2.78	14	43	3.36	2.06	13	48	3.75	2.30
02	結核病	12	71	5.36	5.31	12	59	4.58	3.14	14	50	3.90	2.70	13	53	4.14	2.46	14	40	3.12	1.84
44	先天性畸形	16	48	3.63	5.11	16	25	1.94	3.25	17	17	1.33	2.20	16	16	1.25	2.40	15	23	1.80	3.55
	其他		1,390	105.02	111.99		1,783	138.32	99.59		1,850	144.20	99.15		1,797	140.27	91.90		1,831	143.03	90.82

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		8,992	705.67	449.24		8,782	693.85	425.20		8,882	704.08	421.30		9,359	737.25	426.54		9,628	751.69	429.77
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,698	211.73	140.18	1	2,671	211.03	134.11	1	2,771	219.66	137.29	1	2,749	216.55	132.95	1	2,937	229.30	138.02
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1,278	100.29	60.74	2	1,101	86.99	52.89	2	1,039	82.36	47.58	2	1,155	90.98	50.79	2	1,246	97.28	54.52
J12-J18	肺炎	4	619	48.58	26.32	4	528	41.72	21.04	4	548	43.44	21.00	4	605	47.66	22.21	4	563	43.96	20.08
I60-I69	腦血管疾病	3	677	53.13	32.56	3	647	51.12	29.05	3	602	47.72	26.99	3	697	54.91	29.93	3	679	53.01	28.56
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	337	26.45	13.76	6	377	29.79	15.11	6	335	26.56	12.91	5	445	35.05	16.00	5	430	33.57	15.24
E10-E14	糖尿病	5	352	27.62	17.36	5	423	33.42	20.41	5	384	30.44	17.70	6	393	30.96	18.33	6	414	32.32	18.20
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	240	18.83	11.24	8	249	19.67	10.79	8	234	18.55	10.57	9	236	18.59	9.68	10	255	19.91	11.13
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	269	21.11	17.19	7	260	20.54	16.29	7	258	20.45	16.18	8	267	21.03	15.84	8	285	22.25	16.23
A40-A41	敗血症	8	263	20.64	11.78	10	233	18.41	10.28	10	230	18.23	9.72	7	337	26.55	13.53	7	308	24.05	11.78
I10-I15	高血壓性疾病	11	204	16.01	9.43	12	206	16.28	9.25	9	231	18.31	9.74	10	230	18.12	9.32	9	274	21.39	10.76
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	231	18.13	15.00	9	234	18.49	14.83	11	212	16.81	13.01	12	188	14.81	11.63	11	207	16.16	12.59
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	197	15.46	10.94	11	232	18.33	12.76	12	198	15.70	10.91	11	211	16.62	11.40	12	187	14.60	9.70
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	19	31	2.43	1.15	18	44	3.48	1.58	17	55	4.36	1.97	16	63	4.96	2.10	16	64	5.00	2.00
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	132	10.36	5.63	13	142	11.22	5.05	13	170	13.48	6.09	13	82	6.46	3.30	14	73	5.70	2.96
G20-G21	帕金森病	15	56	4.39	2.24	15	62	4.90	2.56	16	64	5.07	2.28	15	70	5.51	2.83	13	96	7.50	3.72
	其他		1,408	110.50	73.72		1,373	108.48	69.20		1,551	122.95	77.35		1,631	128.48	76.71		1,610	125.70	74.28

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		9,436	732.81	409.56		9,908	766.40	422.76		9,932	766.62	414.33		10,369	802.25	424.60
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,854	221.64	130.87	1	2,824	218.44	127.74	1	2,855	220.37	127.13	1	2,920	225.92	127.78
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,252	97.23	53.17	2	1,480	114.48	61.76	2	1,415	109.22	56.98	2	1,580	122.25	63.29
J12-J18	肺炎	4	575	44.65	19.94	4	638	49.35	22.19	3	685	52.87	22.79	3	780	60.35	26.06
I60-I69	腦血管疾病	3	699	54.28	28.22	3	722	55.85	29.48	4	667	51.48	26.11	4	692	53.54	27.20
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	431	33.47	15.30	5	476	36.82	15.91	5	470	36.28	15.00	5	456	35.28	15.27
E10-E14	糖尿病	6	428	33.24	18.44	6	433	33.49	18.27	6	413	31.88	16.92	6	398	30.79	15.92
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	242	18.79	9.69	8	284	21.97	10.97	9	282	21.77	10.57	7	334	25.84	12.57
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	271	21.05	15.04	7	318	24.60	16.98	7	303	23.39	16.86	8	304	23.52	16.38
A40-A41	敗血症	7	274	21.28	10.03	9	269	20.81	10.00	8	285	22.00	10.05	9	290	22.44	9.62
I10-I15	高血壓性疾病	9	255	19.80	9.82	10	241	18.64	8.72	10	237	18.29	9.34	10	208	16.09	8.07
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	166	12.89	9.96	12	181	14.00	10.85	11	205	15.82	11.73	11	197	15.24	11.07
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	198	15.38	10.12	11	188	14.54	9.34	12	173	13.35	8.46	12	190	14.70	9.09
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	17	63	4.89	1.88	15	84	6.50	2.52	13	128	9.88	3.60	13	148	11.45	4.06
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	88	6.83	3.32	13	148	11.45	5.05	15	112	8.64	3.68	14	137	10.60	4.36
G20-G21	帕金森病	13	94	7.30	3.49	14	91	7.04	3.16	14	116	8.95	4.19	15	130	10.06	4.51
	其他		1,546	120.06	70.26		1,531	118.43	69.82		1,586	122.42	70.93		1,605	124.18	69.36

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		4,379	331.81	385.49		5,381	402.84	312.67		5,576	417.20	309.11		5,488	408.57	288.49		5,853	433.35	288.22
08-14	惡性腫瘤	1	1,203	91.16	101.11	1	1,608	120.38	94.63	1	1,660	124.20	93.11	1	1,728	128.65	92.46	1	1,809	133.94	91.74
25-27-28	心臟疾病	3	466	35.31	42.12	2	625	46.79	34.35	2	605	45.27	31.66	2	556	41.39	27.76	2	616	45.61	28.56
29	腦血管疾病	2	506	38.34	45.36	3	515	38.55	28.72	3	545	40.78	28.68	3	502	37.37	24.78	3	521	38.57	24.01
181	糖尿病	4	292	22.13	25.80	4	453	33.91	26.02	4	467	34.94	25.11	4	473	35.21	23.87	4	463	34.28	22.06
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	173	13.11	15.50	5	225	16.84	12.63	5	220	16.46	11.53	5	224	16.68	11.39	5	277	20.51	13.06
321	肺炎	7	127	9.62	11.80	6	147	11.00	7.84	6	202	15.11	10.25	6	202	15.04	9.47	6	242	17.92	10.74
E54	自殺	10	83	6.29	6.04	7	121	9.06	7.40	7	154	11.52	9.63	7	145	10.80	8.87	7	136	10.07	8.15
347	慢性肝病及肝硬化	9	107	8.11	9.33	9	111	8.31	6.60	8	131	9.80	7.32	8	107	7.97	5.79	8	109	8.07	5.54
E47-E53	事故傷害	5	217	16.44	17.14	7	121	9.06	8.26	9	103	7.71	7.05	9	98	7.30	6.30	9	107	7.92	6.42
038	敗血症	13	46	3.49	4.19	11	40	2.99	2.15	10	77	5.76	4.00	11	72	5.36	3.59	10	106	7.85	4.59
26	高血壓性疾病	8	125	9.47	11.43	10	85	6.36	4.65	11	56	4.19	2.87	10	82	6.10	3.95	11	72	5.33	3.29
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	59	4.47	5.14	11	40	2.99	2.20	12	38	2.84	1.97	13	34	2.53	1.69	12	36	2.67	1.66
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	18	1.36	1.60	13	27	2.02	1.51	13	25	1.87	1.36	12	36	2.68	1.74	13	32	2.37	1.45
44	先天性畸形	12	51	3.86	5.94	14	23	1.72	3.40	14	22	1.65	3.15	14	26	1.94	3.45	14	25	1.85	3.44
200	貧血	17	10	0.76	0.82	16	17	1.27	0.99	16	13	0.97	0.76	15	21	1.56	1.06	15	20	1.48	0.96
	其他		896	67.89	82.17		1,223	91.56	71.32		1,258	94.13	70.66		1,182	88.00	62.32		1,282	94.92	62.55

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		6,127	453.23	291.00		6,088	451.14	276.88		6,165	456.13	265.58		6,475	474.21	270.05		6,769	490.07	269.77
C00-C97	惡性腫瘤	1	1,769	130.86	87.54	1	1,892	140.20	90.07	1	1,861	137.69	85.62	1	1,983	145.23	89.19	1	2,044	147.98	88.40
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	736	54.44	32.75	2	667	49.43	28.58	2	684	50.61	27.23	2	750	54.93	27.89	2	782	56.62	28.04
I60-I69	腦血管疾病	3	522	38.61	22.90	3	481	35.64	20.63	3	445	32.92	17.61	3	440	32.22	17.12	3	507	36.71	18.18
J12-J18	肺炎	5	331	24.49	14.14	5	312	23.12	12.35	5	351	25.97	12.95	5	337	24.68	12.06	5	342	24.76	11.42
E10-E14	糖尿病	4	364	26.93	16.79	4	402	29.79	17.72	4	385	28.48	16.12	4	382	27.98	14.97	4	403	29.18	15.39
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	251	18.57	11.35	7	202	14.97	8.70	6	240	17.76	9.80	8	212	15.53	8.19	6	276	19.98	10.28
A40-A41	敗血症	7	250	18.49	10.99	6	208	15.41	8.77	7	219	16.20	8.98	6	229	16.77	8.39	8	251	18.17	9.22
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	15	38	2.81	1.48	14	68	5.04	2.57	14	61	4.51	2.11	14	73	5.35	2.32	14	65	4.71	1.91
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	149	11.02	6.25	8	198	14.67	7.76	8	210	15.54	7.61	10	135	9.89	5.54	13	94	6.81	3.86
I10-I15	高血壓性疾病	8	170	12.58	7.27	9	179	13.26	7.33	9	191	14.13	7.43	7	216	15.82	7.81	7	262	18.97	8.90
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	109	8.06	4.57	10	119	8.82	4.61	10	130	9.62	4.94	9	137	10.03	5.06	9	161	11.66	5.67
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	120	8.88	6.98	11	117	8.67	6.49	13	101	7.47	5.74	10	135	9.89	6.49	10	145	10.50	6.82
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	139	10.28	8.19	13	107	7.93	6.48	12	117	8.66	6.70	12	118	8.64	6.65	11	126	9.12	7.31
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	99	7.32	4.87	11	117	8.67	5.38	11	120	8.88	5.36	13	104	7.62	4.44	12	99	7.17	4.18
G20-G21	帕金森病	17	37	2.74	1.52	17	30	2.22	1.23	15	47	3.48	1.90	16	51	3.74	1.90	15	62	4.49	2.23
	其他		1,043	77.15	53.41		989	73.29	48.21		1,003	74.21	45.47		1,173	85.91	52.02		1,150	83.26	47.95

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		6,664	478.66	253.90		7,045	502.63	254.34		7,228	513.35	250.23		7,670	544.83	255.48
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,065	148.32	86.24	1	2,079	148.33	83.12	1	2,170	154.12	82.57	1	2,299	163.31	85.94
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	823	59.11	28.39	2	1,009	71.99	33.14	2	966	68.61	30.53	2	1,051	74.66	31.13
I60-I69	腦血管疾病	3	511	36.70	17.36	3	490	34.96	16.33	3	486	34.52	15.13	3	514	36.51	15.42
J12-J18	肺炎	5	308	22.12	9.54	4	422	30.11	12.67	4	440	31.25	12.64	4	494	35.09	13.78
E10-E14	糖尿病	4	432	31.03	15.60	5	421	30.04	14.40	5	360	25.57	11.32	5	431	30.62	13.33
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	6	246	17.67	8.67	6	272	19.41	9.01	6	283	20.10	8.92	6	277	19.68	8.33
A40-A41	敗血症	8	192	13.79	6.53	9	176	12.56	5.61	9	177	12.57	5.31	7	239	16.98	6.93
F01-F03	血管性及未明示之癱 呆症	14	79	5.67	2.33	13	114	8.13	3.08	10	171	12.14	4.37	8	196	13.92	4.73
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	12	103	7.40	3.88	10	161	11.49	5.03	8	185	13.14	5.53	9	182	12.93	5.01
I10-I15	高血壓性疾病	7	238	17.10	7.74	7	220	15.70	6.59	7	226	16.05	6.33	10	178	12.64	4.98
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	142	10.20	4.64	8	181	12.91	5.21	11	166	11.79	4.75	11	170	12.08	4.96
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	135	9.70	6.34	11	140	9.99	6.00	12	132	9.37	5.72	12	153	10.87	6.37
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13	95	6.82	5.17	12	130	9.27	7.58	13	113	8.03	6.07	13	111	7.88	6.09
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	112	8.04	4.28	14	96	6.85	3.62	14	105	7.46	3.83	14	89	6.32	3.25
G20-G21	帕金森病	15	61	4.38	2.03	16	44	3.14	1.41	16	64	4.55	1.92	15	76	5.40	2.27
	其他		1,122	80.59	45.16		1,090	77.77	41.54		1,184	84.09	45.31		1,210	85.95	42.95

表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數 (人)	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 84年	111	63	48	3.26	202	112	90	5.93	-	-
民國 94年	51	27	24	2.44	89	44	45	4.26	1	4.79
民國 95年	40	20	20	1.88	69	30	39	3.24	1	4.70
民國 96年	56	34	22	2.61	89	57	32	4.15	1	4.66
民國 97年	59	33	26	2.89	95	51	44	4.65	1	4.90
民國 98年	32	18	14	1.64	69	34	35	3.54	-	-
民國 99年	52	30	22	2.78	71	41	30	3.80	1	5.35
民國 100年	63	30	33	2.48	96	50	46	3.77	-	-
民國 101年	71	43	28	2.35	105	62	43	3.47	3	9.92
民國 102年	67	41	26	2.56	100	55	45	3.82	2	7.64
民國 103年	71	40	31	2.43	110	70	40	3.77	-	-
民國 104年	94	55	39	3.26	137	78	59	4.75	3	10.39
民國 105年	68	42	26	2.45	106	61	45	3.82	1	3.60

資料來源：衛生福利部。

附註：1. 新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000。

2. 嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000

3. 孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數) × 100,000。

表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率

單位：人 / 每十萬人口

年別	總計	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
84年	437.00	682.71	32.62	18.42	27.06	60.57	77.17	65.05	90.99	113.30	160.75	261.74	386.95	681.57	1,081.85	1,676.13	2,664.91	4,267.21	7,274.45	11,039.79
94年	547.41	426.71	21.69	15.85	13.42	41.51	38.86	53.63	86.38	104.37	164.56	240.15	350.28	464.27	850.95	1,295.29	2,034.07	3,557.58	6,002.50	11,305.33
95年	528.71	340.67	29.64	11.84	15.21	34.40	44.62	63.55	65.17	112.92	155.35	237.33	365.65	507.15	721.45	1,150.53	2,001.99	3,249.51	5,306.01	10,046.38
96年	550.64	434.21	20.37	17.43	7.01	25.78	39.69	52.14	56.09	98.39	148.71	246.28	311.48	475.52	708.13	1,171.78	2,041.12	3,320.52	5,341.79	10,629.20
97年	575.72	469.11	23.18	16.16	12.47	19.20	45.78	48.92	66.26	105.37	157.67	230.61	330.13	455.61	699.50	1,124.34	2,016.68	3,257.44	5,549.18	10,992.30
98年	568.60	357.61	21.38	13.08	5.53	26.88	36.77	40.38	63.46	85.57	148.62	225.80	314.22	467.69	638.77	1,116.63	1,912.70	3,080.41	5,353.26	10,468.26
99年	575.83	379.01	17.92	10.66	10.08	23.18	29.30	45.38	63.43	87.69	135.15	207.88	295.07	466.23	627.12	1,073.08	1,722.41	3,119.39	5,172.92	10,733.81
100年	600.94	439.53	17.38	6.91	9.11	23.22	31.96	38.62	61.99	82.84	147.77	212.79	323.21	449.50	647.50	1,009.22	1,742.48	3,149.19	5,256.75	11,145.17
101年	615.94	384.89	30.01	10.62	13.00	22.57	31.22	54.76	55.70	92.04	135.16	209.92	316.51	450.09	642.50	1,046.14	1,634.99	3,111.78	5,368.53	11,362.42
102年	600.78	362.67	15.23	15.26	10.77	27.43	32.79	32.30	39.45	71.26	120.77	221.67	333.36	461.62	598.90	951.72	1,608.36	2,787.57	5,146.12	10,998.33
103年	629.19	406.98	15.98	14.45	12.05	20.39	44.92	33.31	45.32	90.65	131.91	210.82	299.87	453.63	634.57	930.83	1,612.32	2,781.10	5,270.99	11,547.13
104年	634.72	487.52	14.36	4.55	5.65	22.23	33.75	45.47	49.56	68.93	119.14	188.47	315.60	438.19	653.41	919.01	1,564.10	2,713.61	5,014.33	11,595.10
105年	668.05	388.34	17.17	11.82	11.14	22.39	35.94	39.52	46.02	74.97	133.69	202.29	324.95	449.88	643.65	943.09	1,522.98	2,776.81	5,148.48	12,150.42

資料來源：衛生福利部。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
E47-E53		752	28.45	463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14
E47	運輸事故	393	14.87	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54
E48	意外中毒	39	1.48	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	97	3.67	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31
E51	火及火焰所致之事故傷害	30	1.13	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27
E52	其他事故傷害，包括後期影響	191	7.23	140	5.33	83	3.17	90	3.43	82	3.12
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	1	0.04	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
V01-X59, Y85-Y86		389	14.81	377	14.42	359	13.74	402	15.26	430	16.15	406	15.15
V01-V99	運輸事故傷害	153	5.83	165	6.31	154	5.89	147	5.58	152	5.71	150	5.60
W00-W19	跌倒(落)	91	3.47	72	2.75	83	3.18	100	3.80	96	3.61	88	3.28
W65-W74	意外溺死和淹沒	26	0.99	17	0.65	16	0.61	27	1.02	14	0.53	15	0.56
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	19	0.72	24	0.92	26	0.99	26	0.99	24	0.90	21	0.78
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	6	0.23	7	0.27	6	0.23	5	0.19	16	0.60	9	0.34
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	25	0.95	26	0.99	20	0.77	16	0.61	19	0.71	28	1.04
	其他	69	2.63	66	2.52	54	2.07	81	3.07	109	4.09	95	3.54

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		死 人	亡 數	每 十 萬 口 率	死 人	亡 數	每 十 萬 口 率	死 人	亡 數	每 十 萬 口 率
V01-X59, Y85-Y86		458		17.00	435		16.09	457		16.92
V01-V99	運輸事故傷害	142		5.27	131		4.85	159		5.89
W00-W19	跌倒(落)	118		4.38	99		3.66	122		4.52
W65-W74	意外溺死和淹沒	16		0.59	22		0.81	25		0.93
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	23		0.85	34		1.26	32		1.19
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	6		0.22	8		0.30	12		0.44
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	31		1.15	35		1.29	28		1.04
	其他	122		4.53	106		3.92	79		2.93

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
E47-E53		535	40.42	342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70
E47	運輸事故	278	21.00	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06
E48	意外中毒	32	2.42	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	69	5.21	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16
E51	火及火焰所致之事故傷害	21	1.59	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31
E52	其他事故傷害，包括後期影響	134	10.12	110	8.53	68	5.30	70	5.46	63	4.92
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	1	0.08	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		269	21.11	377	20.54	258	20.45	267	21.03	285	22.25	271	21.05
V01-V99	運輸事故傷害	104	8.16	110	8.69	113	8.96	97	7.64	108	8.43	102	7.92
W00-W19	跌倒(落)	66	5.18	55	4.35	64	5.07	67	5.28	72	5.62	66	5.13
W65-W74	意外溺死和淹沒	21	1.65	13	1.03	11	0.87	19	1.50	10	0.78	10	0.78
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	13	1.02	15	1.19	18	1.43	15	1.18	12	0.94	12	0.93
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	5	0.39	7	0.55	3	0.24	5	0.39	6	0.47	6	0.47
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	17	1.33	14	1.11	14	1.11	14	1.10	12	0.94	22	1.71
	其他	43	3.37	46	3.63	35	2.77	50	3.94	65	5.07	53	4.12

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
V01-X59, Y85-Y86		318	24.60	303	23.39	304	23.52			
V01-V99	運輸事故傷害	99	7.66	83	6.41	105	8.12			
W00-W19	跌倒(落)	86	6.65	71	5.48	88	6.81			
W65-W74	意外溺死和淹沒	14	1.08	20	1.54	18	1.39			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	14	1.08	26	2.01	16	1.24			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	5	0.39	4	0.31	6	0.46			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	27	2.09	28	2.16	22	1.70			
	其他	73	5.65	71	5.48	49	3.79			

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
E47-E53		217	16.44	121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92
E47	運輸事故	115	8.71	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15
E48	意外中毒	7	0.53	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	28	2.12	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55
E51	火及火焰所致之事故傷害	9	0.68	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22
E52	其他事故傷害，包括後期影響	57	4.32	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		120	8.88	377	8.67	101	7.47	135	9.89	145	10.50	135	9.70
V01-V99	運輸事故傷害	49	3.62	55	4.08	41	3.03	50	3.66	44	3.19	48	3.45
W00-W19	跌倒(落)	25	1.85	17	1.26	19	1.41	33	2.42	24	1.74	22	1.58
W65-W74	意外溺死和淹沒	5	0.37	4	0.30	5	0.37	8	0.59	4	0.29	5	0.36
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	0.44	9	0.67	8	0.59	11	0.81	12	0.87	9	0.65
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.07	-	-	3	0.22	-	-	10	0.72	3	0.22
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	8	0.59	12	0.89	6	0.44	2	0.15	7	0.51	6	0.43
	其他	26	1.92	20	1.48	19	1.41	31	2.27	44	3.19	42	3.02

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			
V01-X59, Y85-Y86		140	9.99	132	9.37	153	10.87			
V01-V99	運輸事故傷害	43	3.07	48	3.41	54	3.84			
W00-W19	跌倒(落)	32	2.28	28	1.99	34	2.42			
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.14	2	0.14	7	0.50			
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	9	0.64	8	0.57	16	1.14			
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.07	4	0.28	6	0.43			
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	0.29	7	0.50	6	0.43			
	其他	49	3.50	35	2.49	30	2.13			

表40·臺北市歷年自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年			93年			94年			95年			96年		
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率
E54	自殺總計	206	7.79	346	13.18	467	17.83	454	17.30	364	13.84					
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80					
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-	-	-					
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84					
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	109	4.12	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79					
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	18	0.68	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25					
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08					
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15					
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	1.51	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66					
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27					
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表40·臺北市歷年自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	370	14.09	341	13.04	329	12.59	306	11.61	333	12.51	261	9.74
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	1	0.04	-	-	1	0.04	3	0.11	2	0.07
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	6	0.23	5	0.19	9	0.34	7	0.26	4	0.15
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	-	-	-	-	2	0.08	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	124	4.72	99	3.79	100	3.83	72	2.73	82	3.08	55	2.05
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	6	0.23	9	0.34	11	0.42	6	0.23	4	0.15
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	6	0.23	2	0.08	1	0.04	1	0.04	2	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	109	4.17	113	4.32	126	4.78	103	3.87	77	2.87
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	25	0.96	24	0.92	25	0.95	34	1.28	28	1.04
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	2	0.08	4	0.15
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	5	0.19	4	0.15	1	0.04	4	0.15	5	0.19
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	4	0.15	10	0.38	6	0.23	8	0.30	3	0.11
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	68	2.60	55	2.10	52	1.97	71	2.67	67	2.50
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.11	-	-
X82	利用機車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	3	0.11	4	0.15	1	0.04	2	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	6	0.23	1	0.04	-	-	4	0.15	6	0.22

表40·臺北市歷年自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103年					104年					105年				
		死 人	亡 數	每 人 死	十 萬 人 口 率	萬 口 率	死 人	亡 數	每 人 死	十 萬 人 口 率	萬 口 率	死 人	亡 數	每 人 死	十 萬 人 口 率	萬 口 率
X60-X84,Y87.0	自殺總計	311			11.54		318			11.76		308			11.41	
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	7			0.26		5			0.18		4			0.15	
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-			-		1			0.04		-			-	
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2			0.07		3			0.11		3			0.11	
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-			-		-			-		1			0.04	
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-			-		-			-		-			-	
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	76			2.82		81			3.00		67			2.48	
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7			0.26		8			0.30		4			0.15	
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1			0.04		2			0.07		3			0.11	
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	104			3.86		105			3.88		104			3.85	
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	32			1.19		20			0.74		38			1.41	
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2			0.07		5			0.18		1			0.04	
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-			-		-			-		-			-	
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-			-		3			0.11		1			0.04	
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	6			0.22		9			0.33		8			0.30	
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	70			2.60		69			2.55		68			2.52	
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-			-		-			-		-			-	
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2			0.07		1			0.04		1			0.04	
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-			-		1			0.04		-			-	
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2			0.07		5			0.18		5			0.19	

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十 萬 男性 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性 人口 死亡 率
E54	自殺總計	123	9.29	225	17.46	313	24.40	309	24.12	228	17.81
E950	以固體或液體物質自殺及自 為中毒	11	0.83	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自 為中毒	-	-	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及 自傷	71	5.36	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	8	0.60	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.15	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16
E957	由高處跳下自殺及自傷	24	1.81	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89
E958	其他及未明示之方式自殺及 自傷	7	0.53	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	231	18.13	234	18.49	212	16.81	188	14.81	207	16.16	166	12.89
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	2	0.16
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	3	0.24	2	0.16	6	0.47	3	0.23	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	6.36	72	5.69	70	5.55	43	3.39	59	4.61	40	3.11
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	3	0.24	7	0.55	8	0.63	5	0.39	3	0.23
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.32	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	81	6.40	80	6.34	83	6.54	62	4.84	56	4.35
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	19	1.50	13	1.03	17	1.34	21	1.64	17	1.32
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.16	4	0.31
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	4	0.32	1	0.08	1	0.08	2	0.16	5	0.39
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	2	0.16	7	0.55	3	0.24	5	0.39	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	37	2.92	26	2.06	25	1.97	40	3.12	32	2.49
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.16	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	3	0.24	-	-	1	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	5	0.40	1	0.08	-	-	2.00	0.16	4	0.31

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103年					104年					105年				
		死 人	亡 數	每 人 死	十 萬 人	口 率	死 人	亡 數	每 人 死	十 萬 人	口 率	死 人	亡 數	每 人 死	十 萬 人	口 率
X60-X84,Y87.0	自殺總計	181		14.00		205		15.82		197		15.24				
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1		0.08		2		0.15		2		0.15				
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-		1		0.08		-		-				
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1		0.08		2		0.15		1		0.08				
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		1		0.08				
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-				
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	52		4.02		56		4.32		42		3.25				
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7		0.54		4		0.31		4		0.31				
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		1		0.08		3		0.23				
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	67		5.18		72		5.56		67		5.18				
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	14		1.08		12		0.93		25		1.93				
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2		0.15		5		0.39		-		-				
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-				
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-		-		2		0.15		1		0.08				
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	4		0.31		7		0.54		7		0.54				
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	32		2.48		38		2.93		39		3.02				
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-				
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1		0.08		1		0.08		1		0.08				
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-				
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-		-		2		0.15		4		0.31				

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
E54	自殺總計	83	6.29	121	9.06	154	11.52	145	10.80	136	10.07
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	14	1.06	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.08	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	38	2.88	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	10	0.76	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	2	0.15	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28	107	7.93	117	8.66	118	8.64	126	9.12	95	6.82
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	3	0.22	3	0.22	3	0.22	4	0.29	4	0.29
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	43	3.18	27	2.00	30	2.22	29	2.12	23	1.67	15	1.08
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	3	0.22	2	0.15	3	0.22	1	0.07	1	0.07
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	2	0.15	1	0.07	-	-	-	-	1	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	28	2.07	33	2.44	43	3.15	41	2.97	21	1.51
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	6	0.44	11	0.81	8	0.59	13	0.94	11	0.79
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	3	0.22	-	-	2	0.14	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	2	0.15	3	0.22	3	0.22	3	0.22	3	0.22
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	31	2.30	29	2.15	27	1.98	31	2.24	35	2.51
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	3	0.22	1	0.07	1	0.07	1	0.07	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-	2	0.14	2	0.14

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103年					104年					105年				
		死 人	亡 數	每 人 死	十 萬 人 口 率	萬 口 率	死 人	亡 數	每 人 死	十 萬 人 口 率	萬 口 率	死 人	亡 數	每 人 死	十 萬 人 口 率	萬 口 率
X60-X84,Y87.0	自殺總計	130		9.27		113		8.03		111		7.88				
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	6		0.43		3		0.21		2		0.14				
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-		-		-		-		-		-				
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1		0.07		1		0.07		2		0.14				
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-				
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		-		-		-		-				
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	24		1.71		25		1.78		25		1.78				
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-		-		4		0.28		-		-				
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1		0.07		1		0.07		-		-				
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	37		2.64		33		2.34		37		2.63				
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	18		1.28		8		0.57		13		0.92				
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-		-		-		-		1		0.07				
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-				
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-		-		1		0.07		-		-				
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2		0.14		2		0.14		1		0.07				
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	38		2.71		31		2.20		29		2.06				
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-		-		-		-		-		-				
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1		0.07		-		-		-		-				
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-		-		1		0.07		-		-				
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2		0.14		3		0.21		1		0.07				

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
93年	523.20	392.14	160.09	122.12	65.99	46.85	47.24	33.77	34.02	24.96	17.03	11.49	19.16	13.77	17.64	15.78
94年	547.41	392.62	163.78	120.21	63.56	42.87	52.19	35.74	37.72	26.19	21.84	13.82	20.77	13.94	15.84	14.03
95年	528.71	364.83	168.54	118.90	58.19	38.38	45.04	29.23	36.05	23.79	21.91	13.32	18.48	12.19	14.44	12.68
96年	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		糖尿病		慢性下呼吸道疾病		腎炎、腎病微候群及腎病變	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	36.18	20.14	45.66	27.26	27.26	16.89	16.98	9.27	18.70	11.20
98年	568.60	347.27	174.48	111.24	67.61	39.98	32.12	16.59	43.13	24.61	31.55	18.86	18.97	9.85	17.25	9.72
99年	575.83	338.78	177.26	110.14	65.94	36.69	34.40	16.89	40.07	21.91	29.43	16.78	17.79	8.87	18.14	10.07
100年	600.94	343.47	179.59	109.78	72.30	38.51	35.75	16.96	43.15	23.13	29.41	16.39	22.09	10.48	17.00	8.89
101年	615.94	344.34	187.11	111.52	76.18	40.21	34.00	15.54	44.55	22.94	30.69	16.63	22.20	10.31	19.95	10.62
102年	600.78	326.27	183.55	106.98	77.43	39.81	32.95	14.46	45.15	22.34	32.09	16.84	21.38	9.73	18.21	9.13
103年	629.19	332.49	181.97	103.66	92.38	46.23	39.34	17.10	44.98	22.40	31.70	16.16	24.38	10.28	20.64	9.89
104年	634.72	325.57	185.87	102.84	88.07	42.60	41.61	17.37	42.65	20.08	28.59	13.87	23.52	9.54	20.90	9.68
105年	668.05	332.75	193.28	105.00	97.44	45.78	47.18	19.36	44.66	20.76	30.70	14.50	23.18	9.64	22.63	10.24

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
93年	13.18	10.93	12.69	9.96	3.58	2.52	6.36	4.43	4.31	2.92	2.67	1.89	2.82	2.01	1.83	3.32
94年	17.83	14.79	12.33	9.20	5.73	3.78	6.18	4.14	4.16	2.79	2.94	2.06	2.29	1.62	1.49	2.66
95年	17.30	14.12	12.08	8.86	5.53	3.48	6.71	4.30	3.51	2.26	3.01	1.89	2.59	1.63	1.60	2.92
96年	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年別	敗血症		事故傷害		高血壓性疾病		血管性及未明示之癡呆症		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	19.53	11.27	14.81	11.94	14.24	8.21	2.63	1.29	10.70	5.87	14.09	11.40	11.27	7.69	3.54	1.88
98年	16.86	9.44	14.42	11.20	14.72	8.17	4.28	2.06	13.00	6.39	13.04	10.39	13.35	8.79	3.52	1.89
99年	17.18	9.25	13.74	10.71	16.15	8.49	4.44	2.00	14.54	6.79	12.59	9.67	12.17	7.90	4.25	2.10
100年	21.48	10.81	15.26	10.92	16.93	8.47	5.16	2.18	8.24	4.45	11.61	8.98	11.96	7.65	4.59	2.33
101年	21.00	10.47	16.15	11.31	20.13	9.74	4.85	1.94	6.27	3.41	12.51	9.82	10.74	6.77	5.94	2.92
102年	17.39	8.18	15.15	10.47	18.40	8.66	5.30	2.11	7.13	3.62	9.74	7.40	11.57	6.99	5.78	2.71
103年	16.52	7.62	17.00	11.23	17.11	7.55	7.35	2.78	11.47	5.02	11.54	9.06	10.54	6.29	5.01	2.23
104年	17.09	7.49	16.09	11.05	17.13	7.65	11.06	3.97	10.99	4.67	11.76	8.72	10.28	5.96	6.66	2.95
105年	19.59	8.15	16.92	11.14	14.29	6.37	12.74	4.40	11.81	4.67	11.41	8.38	10.33	5.97	7.63	3.29

表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
93年	647.93	474.26	201.24	149.63	85.88	59.64	56.24	39.19	34.13	24.46	23.27	14.96	21.57	14.97	26.53	23.74
94年	683.06	480.28	205.00	148.15	82.62	54.25	64.07	43.39	40.61	27.75	28.84	17.20	25.26	16.55	24.32	21.46
95年	654.67	445.74	210.37	146.09	75.79	49.62	53.08	34.17	36.92	24.11	29.12	17.22	20.37	13.06	21.93	19.32
96年	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		慢性下呼吸道疾病		糖尿病		腎炎、腎病微候群 及腎病變	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	48.58	26.32	53.13	32.56	26.45	13.76	27.62	17.36	18.83	11.24
98年	693.85	425.20	211.03	134.11	86.99	52.89	41.72	21.04	51.12	29.05	29.79	15.11	33.42	20.41	19.67	10.79
99年	704.08	421.30	219.66	137.29	82.36	47.58	43.44	21.00	47.72	26.99	26.56	12.91	30.44	17.70	18.55	10.57
100年	737.25	426.54	216.55	132.95	90.98	50.79	47.66	22.21	54.91	29.93	35.05	16.00	30.96	18.33	18.59	9.68
101年	751.69	429.77	229.30	138.02	97.28	54.52	43.96	20.08	53.01	28.56	33.57	15.24	32.32	18.20	19.91	11.13
102年	732.81	409.56	221.64	130.87	97.23	53.17	44.65	19.94	54.28	28.22	33.47	15.30	33.24	18.44	18.79	9.69
103年	766.40	422.76	218.44	127.74	114.48	61.76	49.35	22.19	55.85	29.48	36.82	15.91	33.49	18.27	21.97	10.97
104年	766.62	414.33	220.37	127.13	109.22	56.98	52.87	22.79	51.48	26.11	36.28	15.00	31.88	16.92	21.77	10.57
105年	802.25	424.60	225.92	127.78	122.25	63.29	60.35	26.06	53.54	27.20	35.28	15.27	30.79	15.92	25.84	12.57

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
93年	17.46	14.81	17.22	13.87	4.19	2.83	6.36	4.29	5.66	3.64	3.34	2.25	4.58	3.14	1.94	3.25
94年	24.40	20.52	14.97	11.51	5.69	3.62	8.26	5.49	5.53	3.57	4.05	2.78	3.90	2.70	1.33	2.20
95年	24.12	20.00	16.39	12.38	5.70	3.34	7.34	4.78	4.53	2.83	3.36	2.06	4.14	2.46	1.25	2.40
96年	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年別	事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		血管性及未明示之癱瘓症		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	21.11	17.19	20.64	11.78	16.01	9.43	18.13	15.00	15.46	10.94	2.43	1.15	10.36	5.63	4.39	2.24
98年	20.54	16.29	18.41	10.28	16.28	9.25	18.49	14.83	18.33	12.76	3.48	1.58	11.22	5.05	4.90	2.56
99年	20.45	16.18	18.23	9.72	18.31	9.74	16.81	13.01	15.70	10.91	4.36	1.97	13.48	6.09	5.07	2.28
100年	21.03	15.84	26.55	13.53	18.12	9.32	14.81	11.63	16.62	11.40	4.96	2.10	6.46	3.30	5.51	2.83
101年	22.25	16.23	24.05	11.78	21.39	10.76	16.16	12.59	14.60	9.70	5.00	2.00	5.70	2.96	7.50	3.72
102年	21.05	15.04	21.28	10.03	19.80	9.82	12.89	9.96	15.38	10.12	4.89	1.88	6.83	3.32	7.30	3.49
103年	24.60	16.98	20.81	10.00	18.64	8.72	14.00	10.85	14.54	9.34	6.50	2.52	11.45	5.05	7.04	3.16
104年	23.39	16.86	22.00	10.05	18.29	9.34	15.82	11.73	13.35	8.46	9.88	3.60	8.64	3.68	8.95	4.19
105年	23.52	16.38	22.44	9.62	16.09	8.07	15.24	11.07	14.70	9.09	11.45	4.06	10.60	4.36	10.06	4.51

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎徵候群及腎性病變		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
93年	402.84	312.67	120.38	94.63	46.79	34.35	38.55	28.72	33.91	26.02	16.84	12.63	11.00	7.84	9.06	8.26
94年	417.20	309.11	124.20	93.11	45.27	31.66	40.78	28.68	34.94	25.11	16.46	11.53	15.11	10.25	11.52	9.63
95年	408.57	288.49	128.65	92.46	41.39	27.76	37.37	24.78	35.21	23.87	16.68	11.39	15.04	9.47	10.80	8.87
96年	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		腎炎、腎病徵候群及腎病變		敗血症	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	38.61	22.90	24.49	14.14	26.93	16.79	18.57	11.35	18.49	10.99
98年	451.14	276.88	140.20	90.07	49.43	28.58	35.64	20.63	23.12	12.35	29.79	17.72	14.97	8.70	15.41	8.77
99年	456.13	265.58	137.69	85.62	50.61	27.23	32.92	17.61	25.97	12.95	28.48	16.12	17.76	9.80	16.20	8.98
100年	474.21	270.05	145.23	89.19	54.93	27.89	32.22	17.12	24.68	12.06	27.98	14.97	15.53	8.19	16.77	8.39
101年	490.07	269.77	147.98	88.40	56.62	28.04	36.71	18.18	24.76	11.42	29.18	15.39	19.98	10.28	18.17	9.22
102年	478.66	253.90	148.32	86.24	59.11	28.39	36.70	17.36	22.12	9.54	31.03	15.60	17.67	8.67	13.79	6.53
103年	502.63	254.34	148.33	83.12	71.99	33.14	34.96	16.33	30.11	12.67	30.04	14.40	19.41	9.01	12.56	5.61
104年	513.35	250.23	154.12	82.57	68.61	30.53	34.52	15.13	31.25	12.64	25.57	11.32	20.10	8.92	12.57	5.31
105年	544.83	255.48	163.31	85.94	74.66	31.13	36.51	15.42	35.09	13.78	30.62	13.33	19.68	8.33	16.98	6.93

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
93年	8.31	6.60	9.06	7.40	2.99	2.15	6.36	4.65	2.99	2.20	2.02	1.51	1.72	3.40	1.27	0.99
94年	9.80	7.32	7.71	7.05	5.76	4.00	4.19	2.87	2.84	1.97	1.87	1.36	1.65	3.15	0.97	0.76
95年	7.97	5.79	7.30	6.30	5.36	3.59	6.10	3.95	2.53	1.69	2.68	1.74	1.94	3.45	1.56	1.06
96年	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年別	血管性及未明示之癱瘓症		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		高血壓性疾病		慢性下呼吸道疾病		事故傷害		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	2.81	1.48	11.02	6.25	12.58	7.27	8.06	4.57	8.88	6.98	10.28	8.19	7.32	4.87	2.74	1.52
98年	5.04	2.57	14.67	7.76	13.26	7.33	8.82	4.61	8.67	6.49	7.93	6.48	8.67	5.38	2.22	1.23
99年	4.51	2.11	15.54	7.61	14.13	7.43	9.62	4.94	7.47	5.74	8.66	6.70	8.88	5.36	3.48	1.90
100年	5.35	2.32	9.89	5.54	15.82	7.81	10.03	5.06	9.89	6.49	8.64	6.65	7.62	4.44	3.74	1.90
101年	4.71	1.91	6.81	3.86	18.97	8.90	11.66	5.67	10.50	6.82	9.12	7.31	7.17	4.18	4.49	2.23
102年	5.67	2.33	7.40	3.88	17.10	7.74	10.20	4.64	9.70	6.34	6.82	5.17	8.04	4.28	4.38	2.03
103年	8.13	3.08	11.49	5.03	15.70	6.59	12.91	5.21	9.99	6.00	9.27	7.58	6.85	3.62	3.14	1.41
104年	12.14	4.37	13.14	5.53	16.05	6.33	11.79	4.75	9.37	5.72	8.03	6.07	7.46	3.83	4.55	1.92
105年	13.92	4.73	12.93	5.01	12.64	4.98	12.08	4.96	10.87	6.37	7.88	6.09	6.32	3.25	5.40	2.27

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		3,180	120.31		4,202	160.09		4,290	163.78		4,423	168.54		4,566	173.56
162	肺癌	1	615	23.27	1	880	33.53	1	870	33.21	1	910	34.68	1	987	37.52
155	肝癌	2	570	21.56	2	677	25.79	2	607	23.17	2	702	26.75	2	666	25.32
153 154	結腸直腸癌	3	329	12.45	3	518	19.73	3	542	20.69	3	532	20.27	3	557	21.17
174	女性乳癌(1)	5	135	10.23	4	203	15.20	4	224	16.76	4	209	15.56	4	203	15.03
151	胃癌	4	328	12.41	5	311	11.85	5	354	13.51	5	363	13.83	5	329	12.51
185	攝護腺癌(2)	7	51	3.85	6	122	9.46	6	133	10.37	6	129	10.07	6	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	92	3.48	9	148	5.64	7	181	6.91	8	175	6.67	7	217	8.25
157	胰臟癌	9	97	3.67	8	164	6.25	9	168	6.41	7	178	6.78	8	178	6.77
179 180	子宮頸癌(1)	6	108	8.18	7	87	6.51	8	86	6.43	10	81	6.03	9	89	6.59
156	膽囊癌	15	64	2.42	11	125	4.76	12	120	4.58	12	116	4.42	10	149	5.66
183	卵巢癌(1)	11	44	3.33	12	58	4.34	14	50	3.74	11	73	5.43	11	74	5.48
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	78	2.95	10	138	5.26	10	146	5.57	9	166	6.33	12	134	5.09
150	食道癌	14	75	2.84	14	106	4.04	11	126	4.81	14	97	3.70	13	126	4.79
204-208	白血病	8	100	3.78	13	108	4.11	13	100	3.82	13	98	3.73	14	107	4.07
188	膀胱癌	17	57	2.16	15	92	3.51	16	66	2.52	16	82	3.12	15	91	3.46
	其他		437	16.53		465	17.72		517	19.74		512	19.51		523	19.88

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		4,467	170.10		4,563	174.48		4,632	177.26		4,732	179.59		4,981	187.11		4,919	183.55
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34	1	967	36.98	1	990	37.89	1	1,014	38.48	1	1,018	38.24	1	988	36.87
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59	3	592	22.64	3	570	21.81	3	609	23.11	3	648	24.34	3	631	23.55
C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69	2	665	25.43	2	644	24.65	2	672	25.50	2	697	26.18	2	700	26.12
C50	女性乳房癌(1)	4	228	16.87	4	236	17.49	4	266	19.68	4	283	20.73	4	243	17.59	4	264	18.96
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	124	9.73	6	142	11.22	6	144	11.41	6	132	10.40	5	176	13.74	5	155	12.04
C16	胃癌	5	312	11.88	5	319	12.20	5	307	11.75	5	285	10.82	6	329	12.36	6	315	11.75
C25	胰臟癌	7	192	7.31	7	237	9.06	7	211	8.07	7	231	8.77	7	232	8.71	7	231	8.62
C00-C06, C09- C10, C12-C14 C56, C57.0- C57.4	口腔癌	9	131	4.99	8	148	5.66	9	151	5.78	8	153	5.81	9	169	6.35	8	203	7.57
	卵巢癌(1)	13	58	4.29	11	65	4.82	12	66	4.88	11	65	4.76	8	88	6.37	9	85	6.11
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	131	4.99	12	119	4.55	8	152	5.82	9	149	5.65	10	147	5.52	10	154	5.75
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	75	5.55	9	69	5.11	10	71	5.25	10	74	5.42	12	63	4.56	11	80	5.75
C91-C95	白血病	11	121	4.61	13	106	4.05	13	107	4.09	13	112	4.25	13	110	4.13	13	113	4.22
C15	食道癌	12	120	4.57	10	129	4.93	11	137	5.24	12	115	4.36	11	133	5.00	12	121	4.52
C67	膀胱癌	15	80	3.05	14	80	3.06	14	95	3.64	14	78	2.96	14	85	3.19	14	84	3.13
C54	子宮體癌(1)	17	28	2.07	19	23	1.70	18	29	2.15	18	34	2.49	18	35	2.53	15	39	2.80
	其他		671	25.55		666	25.47		692	26.48		726	27.55		808	30.35		756	28.21

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年		104年		105年				
		順位	死亡 人數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死亡 人數	每 十 萬 口 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		4,903	181.97		5,025	185.87		5,219	193.28
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	992	36.82	1	984	36.40	1	1,070	39.63
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	666	24.72	2	686	25.37	2	675	25.00
C22	肝和肝內膽管癌	2	666	24.72	3	667	24.67	3	672	24.89
C50	女性乳房癌(1)	4	289	20.62	4	288	20.45	4	302	21.45
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	151	11.68	5	163	12.58	5	167	12.92
C16	胃癌	6	312	11.58	6	295	10.91	6	311	11.52
C25	胰臟癌	7	257	9.54	7	273	10.10	7	260	9.63
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	8	174	6.46	8	183	6.77	8	208	7.70
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	9	84	5.99	10	77	5.47	9	107	7.60
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	155	5.75	9	153	5.66	10	174	6.44
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	12	58	4.14	11	70	4.97	11	72	5.11
C91-C95	白血病	13	98	3.64	14	108	3.99	12	133	4.93
C15	食道癌	11	135	5.01	12	133	4.92	13	123	4.56
C67	膀胱癌	14	93	3.45	13	117	4.33	14	108	4.00
C54	子宮體癌(1)	17	35	2.50	15	42	2.98	15	47	3.34
	其他		738	27.39		786	29.07		790	29.26

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		1,977	149.38		2,594	201.24		2,630	205.00		2,695	210.37		2,757	215.37
162	肺癌	2	414	31.28	1	599	46.47	1	562	43.81	1	608	47.46	1	635	49.60
155	肝癌	1	436	32.94	2	495	38.40	2	445	34.69	2	518	40.43	2	488	38.12
153 154	結腸直腸癌	4	191	14.43	3	306	23.74	3	306	23.85	3	316	24.67	3	308	24.06
151	胃癌	3	212	16.02	4	198	15.36	4	236	18.40	4	240	18.73	4	214	16.72
185	攝護腺癌	11	51	3.85	5	122	9.46	5	133	10.37	6	129	10.07	5	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	66	4.99	7	91	7.06	8	115	8.96	7	112	8.74	6	129	10.08
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	73	5.52	5	122	9.46	6	133	10.37	5	147	11.47	7	117	9.14
150	食道癌	8	64	4.84	7	91	7.06	7	116	9.04	9	87	6.79	8	107	8.36
157	胰臟癌	9	63	4.76	9	89	6.90	9	103	8.03	8	96	7.49	9	91	7.11
156	膽囊癌	16	27	2.04	11	65	5.04	10	70	5.46	11	60	4.68	10	89	6.95
204-208	白血病	7	65	4.91	10	68	5.28	11	59	4.60	12	54	4.22	11	68	5.31
188	膀胱癌	12	42	3.17	12	62	4.81	13	45	3.51	13	50	3.90	12	65	5.08
147	鼻咽癌	9	63	4.76	13	55	4.27	12	59	4.60	10	65	5.07	13	63	4.92
191	腦癌	14	29	2.19	15	26	2.02	14	32	2.49	14	33	2.58	14	26	2.03
161	喉癌	15	28	2.12	16	18	1.40	15	20	1.56	16	20	1.56	15	19	1.48
	其他		153	11.56		187	14.51		196	15.28		160	12.49		202	15.78

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73		2,671	211.03		2,771	219.66		2,749	216.55		2,937	229.30		2,854	221.64
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54	1	596	47.09	1	617	48.91	1	639	50.34	1	633	49.42	1	610	47.37
C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30	2	449	35.47	2	443	35.12	2	474	37.34	2	475	37.08	2	485	37.67
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13	3	311	24.57	3	331	26.24	3	325	25.60	3	371	28.97	3	358	27.80
C16	胃癌	4	218	17.11	4	203	16.04	4	197	15.62	4	191	15.05	4	203	15.85	4	189	14.68
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02	7	136	10.75	6	139	11.02	5	132	10.40	6	146	11.40	5	175	13.59
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73	5	142	11.22	5	144	11.41	5	132	10.40	5	176	13.74	6	155	12.04
C25	胰臟癌	7	114	8.95	6	137	10.82	7	126	9.99	7	111	8.74	8	123	9.60	7	123	9.55
C15	食道癌	8	107	8.40	8	109	8.61	8	115	9.12	8	104	8.19	7	127	9.92	8	110	8.54
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96	9	77	6.08	9	102	8.09	9	94	7.40	9	86	6.71	9	80	6.21
C67	膀胱癌	12	57	4.47	11	56	4.42	11	63	4.99	11	53	4.18	12	55	4.29	11	57	4.43
C91-C95	白血病	9	76	5.96	10	64	5.06	10	65	5.15	10	63	4.96	10	71	5.54	10	70	5.44
C11	鼻咽癌	11	61	4.79	12	49	3.87	12	56	4.44	13	42	3.31	11	56	4.37	12	56	4.35
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43	13	38	3.00	15	30	2.38	15	32	2.52	14	40	3.12	15	28	2.17
C64	腎臟癌	14	26	2.04	13	38	3.00	14	39	3.09	12	48	3.78	15	37	2.89	14	39	3.03
C71	腦癌	14	26	2.04	15	35	2.77	13	41	3.25	13	42	3.31	13	44	3.44	13	46	3.57
	其他		253	19.85		231	18.25		263	20.85		267	21.03		294	22.95		273	21.20

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,824	218.44		2,855	220.37		2,920	225.92
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	588	45.48	1	589	45.46	1	626	48.43
C22	肝和肝內膽管癌	2	447	34.58	2	429	33.11	2	430	33.27
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	364	28.16	3	361	27.86	3	376	29.09
C16	胃癌	4	199	15.39	4	185	14.28	4	197	15.24
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	5	152	11.76	6	161	12.43	5	180	13.93
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	151	11.68	5	163	12.58	6	167	12.92
C25	胰臟癌	7	133	10.29	7	140	10.81	7	147	11.37
C15	食道癌	8	124	9.59	8	124	9.57	8	108	8.36
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	92	7.12	9	88	6.79	9	98	7.58
C67	膀胱癌	10	66	5.11	10	86	6.64	10	76	5.88
C91-C95	白血病	12	55	4.25	11	68	5.25	11	70	5.42
C11	鼻咽癌	11	62	4.80	12	61	4.71	12	45	3.48
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	45	3.48	14	37	2.86	13	36	2.79
C64	腎臟癌	14	32	2.48	13	43	3.32	14	36	2.79
C71	腦癌	15	30	2.32	15	31	2.39	15	35	2.71
	其他		284	21.97		289	22.31		293	22.67

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		1,203	91.16		1,608	120.38		1,660	124.20		1,728	128.65		1,809	133.94
162	肺癌	1	201	15.23	1	281	21.04	1	308	23.05	1	302	22.48	1	352	26.06
153 154	結腸直腸癌	2	138	10.46	2	212	15.87	2	236	17.66	2	216	16.08	2	249	18.44
174	女性乳癌	3	135	10.23	3	203	15.20	3	224	16.76	3	209	15.56	3	203	15.03
155	肝癌	4	134	10.15	4	182	13.62	4	162	12.12	4	184	13.70	4	178	13.18
151	胃癌	5	116	8.79	5	113	8.46	5	118	8.83	5	123	9.16	5	115	8.51
179 180	子宮頸癌	6	108	8.18	6	87	6.51	6	86	6.43	7	81	6.03	6	89	6.59
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	11	26	1.97	10	57	4.27	7	66	4.94	9	63	4.69	7	88	6.52
157	胰臟癌	10	34	2.58	7	75	5.61	8	65	4.86	6	82	6.10	8	87	6.44
183	卵巢癌	7	44	3.33	9	58	4.34	10	50	3.74	8	73	5.43	9	74	5.48
156	膽囊癌	8	37	2.80	8	60	4.49	9	50	3.74	10	56	4.17	10	60	4.44
204-208	白血病	9	35	2.65	11	40	2.99	11	41	3.07	11	44	3.28	11	39	2.89
182	子宮體癌	19	8	0.61	14	22	1.65	13	22	1.65	13	25	1.86	12	26	1.93
188	膀胱癌	15	15	1.14	12	30	2.25	14	21	1.57	15	32	2.38	13	26	1.93
191	腦癌	12	23	1.74	13	24	1.80	12	25	1.87	16	22	1.64	14	20	1.48
150	食道癌	16	11	0.83	18	15	1.12	18	10	0.75	19	10	0.74	15	19	1.41
	其他		138	10.46		149	11.15		176	13.17		206	15.34		184	13.62

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		1,769	130.86		1,892	140.20		1,861	137.69		1,983	145.23		2,044	147.98		2,065	148.32
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78	1	371	27.49	1	373	27.60	1	375	27.46	1	385	27.87	1	378	27.15
C50	女性乳房癌	3	228	16.87	3	236	17.49	2	266	19.68	3	283	20.73	3	243	17.59	3	264	18.96
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31	2	281	20.82	3	239	17.68	2	284	20.80	2	277	20.05	2	273	19.61
C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76	4	216	16.01	4	201	14.87	4	198	14.50	4	222	16.07	4	215	15.44
C16	胃癌	5	94	6.95	5	116	8.60	5	110	8.14	6	94	6.88	5	126	9.12	5	126	9.05
C25	胰臟癌	6	78	5.77	6	100	7.41	6	85	6.29	5	120	8.79	6	109	7.89	6	108	7.76
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	8	58	4.29	8	65	4.82	8	66	4.88	8	65	4.76	7	88	6.37	7	85	6.11
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07	9	42	3.11	9	50	3.70	9	55	4.03	9	61	4.42	9	74	5.32
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	75	5.55	7	69	5.11	7	71	5.25	7	74	5.42	8	63	4.56	8	80	5.75
C91-C95	白血病	10	45	3.33	9	42	3.11	10	42	3.11	10	49	3.59	10	39	2.82	10	43	3.09
C54	子宮體癌	12	28	2.07	14	23	1.70	12	29	2.15	11	34	2.49	12	35	2.53	11	39	2.80
C64	腎臟癌	17	22	1.63	12	25	1.85	14	25	1.85	14	27	1.98	17	22	1.59	16	23	1.65
C67	膀胱癌	14	23	1.70	13	24	1.78	11	32	2.37	15	25	1.83	13	30	2.17	14	27	1.94
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	18	16	1.18	19	12	0.89	17	12	0.89	17	21	1.54	16	23	1.67	13	28	2.01
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	11	35	2.59	11	35	2.59	15	22	1.63	11	34	2.49	11	37	2.68	15	25	1.80
	其他		230	17.01		235	17.41		238	17.61		245	17.94		284	20.56		277	19.90

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,079	148.33		2,170	154.12		2,299	163.31
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	404	28.82	1	395	28.05	1	444	31.54
C50	女性乳房癌	3	289	20.62	3	288	20.45	2	302	21.45
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	302	21.55	2	325	23.08	3	299	21.24
C22	肝和肝內膽管癌	4	219	15.62	4	238	16.90	4	242	17.19
C16	胃癌	6	113	8.06	6	110	7.81	5	114	8.10
C25	胰臟癌	5	124	8.85	5	133	9.45	6	113	8.03
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	7	84	5.99	7	77	5.47	7	107	7.60
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	63	4.49	9	65	4.62	8	76	5.40
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	58	4.14	8	70	4.97	9	72	5.11
C91-C95	白血病	10	43	3.07	11	40	2.84	10	63	4.48
C54	子宮體癌	11	35	2.50	10	42	2.98	11	47	3.34
C64	腎臟癌	15	25	1.78	14	30	2.13	12	33	2.34
C67	膀胱癌	14	27	1.93	13	31	2.20	13	32	2.27
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	17	22	1.57	16	22	1.56	14	28	1.99
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.21	12	36	2.56	15	27	1.92
	其他		240	17.12		268	19.03		300	21.31

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
93年	160.09	122.12	33.53	25.03	25.79	20.05	19.73	14.86	15.20	11.80	11.85	8.66	9.46	5.88	5.64	4.32
94年	163.78	120.21	33.21	23.58	23.17	17.60	20.69	14.85	16.76	12.67	13.51	9.41	10.37	6.14	6.91	5.12
95年	168.54	118.90	34.68	23.70	26.75	19.75	20.27	14.03	15.56	11.37	13.83	9.15	10.07	5.68	6.67	4.78
96年	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		結腸、直腸和肛門癌		肝和肝內膽管癌		女性乳房癌		前列腺(攝護腺)癌		胃癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	170.10	112.87	35.34	22.90	21.59	13.90	26.69	18.47	16.87	11.66	9.73	5.35	11.88	7.51	7.31	4.85
98年	174.48	111.24	36.98	22.87	22.64	14.01	25.43	16.63	17.49	11.55	11.22	5.88	12.20	7.31	9.06	5.74
99年	177.26	110.14	37.89	22.60	21.81	13.10	24.65	15.83	19.68	12.87	11.41	5.86	11.75	6.67	8.07	5.06
100年	179.59	109.78	38.48	22.83	23.11	13.85	25.50	15.95	20.73	13.50	10.40	5.12	10.82	6.21	8.77	5.30
101年	187.11	111.52	38.24	22.23	24.34	13.77	26.18	16.07	17.59	10.88	13.74	6.72	12.36	6.83	8.71	5.19
102年	183.55	106.98	36.87	20.72	23.55	13.36	26.12	15.44	18.96	11.90	12.04	5.87	11.75	6.27	8.62	4.89
103年	181.97	103.66	36.82	20.34	24.72	13.54	24.72	14.18	20.62	12.73	11.68	5.14	11.58	6.07	9.54	5.48
104年	185.87	102.84	36.40	19.68	25.37	13.41	24.67	13.72	20.45	12.15	12.58	5.97	10.91	5.80	10.10	5.60
105年	193.28	105.00	39.63	20.84	25.00	12.92	24.89	13.63	21.45	12.52	12.92	5.76	11.52	5.83	9.63	5.14

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
93年	6.25	4.84	6.51	4.90	4.76	3.56	4.34	3.38	5.26	4.26	4.04	3.19	4.11	3.43	3.51	2.44
94年	6.41	4.61	6.43	4.89	4.58	3.44	3.74	2.76	5.57	4.30	4.81	3.76	3.82	3.07	2.52	1.74
95年	6.78	4.75	6.03	4.26	4.42	3.04	5.43	3.91	6.33	4.81	3.70	2.66	3.73	2.77	3.12	1.97
96年	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年別	口腔癌		卵巢癌		非何杰金氏淋巴瘤		子宮頸及部位未明示子宮癌		白血病		食道癌		膀胱癌		子宮體癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	4.99	3.43	4.29	2.96	4.99	3.18	5.55	3.62	4.61	3.42	4.57	3.16	3.05	1.83	2.07	1.42
98年	5.66	3.78	4.82	3.36	4.55	2.85	5.11	3.31	4.05	2.92	4.93	3.23	3.06	1.72	1.70	1.15
99年	5.78	3.90	4.88	3.21	5.82	3.39	5.25	3.39	4.09	2.78	5.24	3.43	3.64	1.97	2.15	1.46
100年	5.81	3.86	4.76	3.25	5.65	3.30	5.42	3.23	4.25	2.95	4.36	2.71	2.96	1.57	2.49	1.67
101年	6.35	3.97	6.37	4.09	5.52	3.30	4.56	2.87	4.13	2.87	5.00	3.13	3.19	1.57	2.53	1.53
102年	7.57	4.88	6.11	3.79	5.75	3.24	5.75	3.25	4.22	2.89	4.52	2.76	3.13	1.59	2.80	1.73
103年	6.46	3.97	5.99	3.60	5.75	3.29	4.14	2.27	3.64	2.35	5.01	3.04	3.45	1.72	2.50	1.48
104年	6.77	4.24	5.47	3.40	5.66	3.09	4.97	2.73	3.99	2.24	4.92	2.88	4.33	1.95	2.98	1.76
105年	7.70	4.65	7.60	4.52	6.44	3.29	5.11	3.07	4.93	3.01	4.56	2.68	4.00	1.96	3.34	1.85

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤		口腔癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
93年	201.24	149.63	46.47	33.20	38.40	30.08	23.74	17.23	15.36	10.60	9.46	5.88	7.06	5.28	9.46	7.95
94年	205.00	148.15	43.81	30.08	34.69	26.89	23.85	16.86	18.40	12.46	10.37	6.14	8.96	6.51	10.37	8.18
95年	210.37	146.09	47.46	31.25	40.43	30.73	24.67	17.02	18.73	11.98	10.07	5.68	8.74	6.09	11.47	9.00
96年	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		胃癌		口腔癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	17.11	10.69	9.02	6.44	9.73	5.35	8.95	6.11
98年	211.03	134.11	47.09	28.32	35.47	24.25	24.57	15.19	16.04	9.38	10.75	7.48	11.22	5.88	10.82	6.77
99年	219.66	137.29	48.91	29.60	35.12	23.28	26.24	15.97	15.62	8.91	11.02	7.70	11.41	5.86	9.99	6.41
100年	216.55	132.95	50.34	30.02	37.34	24.12	25.60	15.83	15.05	8.67	10.40	7.26	10.40	5.12	8.74	5.44
101年	229.30	138.02	49.42	28.92	37.08	24.29	28.97	16.89	15.85	8.46	11.40	7.44	13.74	6.72	9.60	5.89
102年	221.64	130.87	47.37	26.87	37.67	23.37	27.80	16.17	14.68	7.83	13.59	9.10	12.04	5.87	9.55	5.59
103年	218.44	127.74	45.48	25.78	34.58	21.20	28.16	16.21	15.39	8.16	11.76	7.72	11.68	5.14	10.29	6.30
104年	220.37	127.13	45.46	25.93	33.11	19.76	27.86	15.56	14.28	7.92	12.43	8.20	12.58	5.97	10.81	6.52
105年	225.92	127.78	48.43	26.77	33.27	19.73	29.09	15.98	15.24	7.96	13.93	8.91	12.92	5.76	11.37	6.38

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
93年	7.06	5.68	6.90	5.20	5.04	3.74	5.28	4.16	4.81	3.12	4.27	3.39	2.02	1.75	1.40	1.00
94年	9.04	7.40	8.03	5.72	5.46	4.02	4.60	3.50	3.51	2.20	4.60	3.67	2.49	2.11	1.56	1.04
95年	6.79	4.87	7.49	5.21	4.68	3.22	4.22	2.91	3.90	2.30	5.07	4.16	2.58	2.02	1.56	0.99
96年	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99
年別	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		膀胱癌		白血病		鼻咽癌		膽囊和其他膽道癌		腎臟癌		腦癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	8.40	5.90	5.96	3.65	4.47	2.62	5.96	4.28	4.79	3.61	2.43	1.62	2.04	1.37	2.04	1.86
98年	8.61	5.89	6.08	3.83	4.42	2.44	5.06	3.61	3.87	2.83	3.00	1.81	3.00	2.05	2.77	2.07
99年	9.12	6.19	8.09	4.61	4.99	2.63	5.15	3.38	4.44	2.99	2.38	1.64	3.09	1.93	3.25	2.40
100年	8.19	5.30	7.40	4.35	4.18	2.13	4.96	3.26	3.31	2.41	2.52	1.41	3.78	2.13	3.31	2.45
101年	9.92	6.46	6.71	4.13	4.29	1.98	5.54	3.72	4.37	2.97	3.12	1.97	2.89	1.69	3.44	2.54
102年	8.54	5.40	6.21	3.43	4.43	2.33	5.44	3.73	4.35	3.02	2.17	1.15	3.03	1.89	3.57	2.43
103年	9.59	6.04	7.12	4.12	5.11	2.60	4.25	2.91	4.80	3.28	3.48	2.09	2.48	1.44	2.32	1.78
104年	9.57	5.93	6.79	3.90	6.64	3.08	5.25	3.07	4.71	3.19	2.86	1.64	3.32	1.95	2.39	1.56
105年	8.36	5.13	7.58	4.09	5.88	3.11	5.42	3.38	3.48	2.28	2.79	1.49	2.79	1.52	2.71	2.10

表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
93年	120.38	94.63	21.04	16.41	15.87	12.42	15.20	11.80	13.62	10.67	8.46	6.55	6.51	4.90	4.27	3.40
94年	124.20	93.11	23.05	16.99	17.66	12.94	16.76	12.67	12.12	9.11	8.83	6.35	6.43	4.89	4.94	3.79
95年	128.65	92.46	22.48	15.97	16.08	11.23	15.56	11.37	13.70	9.88	9.16	6.31	6.03	4.26	4.69	3.44
96年	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		女性乳房癌		結腸、直腸和肛門癌		肝和肝內膽管癌		胃癌		胰臟癌		卵巢癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	130.86	87.54	24.78	16.27	16.87	11.66	17.31	11.20	15.76	10.79	6.95	4.47	5.77	3.76	4.29	2.96
98年	140.20	90.07	27.49	17.54	17.49	11.55	20.82	12.92	16.01	9.98	8.60	5.30	7.41	4.75	4.82	3.36
99年	137.69	85.62	27.60	16.36	19.68	12.87	17.68	10.57	14.87	9.27	8.14	4.62	6.29	3.86	4.88	3.21
100年	145.23	89.19	27.46	16.41	20.73	13.50	20.80	12.16	14.50	8.92	6.88	3.97	8.79	5.20	4.76	3.25
101年	147.98	88.40	27.87	16.31	17.59	10.88	20.05	11.11	16.07	9.11	9.12	5.32	7.89	4.57	6.37	4.09
102年	148.32	86.24	27.15	15.36	18.96	11.90	19.61	10.93	15.44	8.66	9.05	4.87	7.76	4.29	6.11	3.79
103年	148.33	83.12	28.82	15.72	20.62	12.73	21.55	11.34	15.62	8.23	8.06	4.26	8.85	4.80	5.99	3.60
104年	154.12	82.57	28.05	14.50	20.45	12.15	23.08	11.66	16.90	8.63	7.81	4.04	9.45	4.82	5.47	3.40
105年	163.31	85.94	31.54	15.98	21.45	12.52	21.24	10.44	17.19	8.52	8.10	4.05	8.03	4.09	7.60	4.52

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
93年	5.61	4.50	4.34	3.38	4.49	3.43	2.99	2.65	1.65	1.34	2.25	1.66	1.80	1.70	1.12	0.86
94年	4.86	3.55	3.74	2.76	3.74	2.88	3.07	2.58	1.65	1.33	1.57	1.20	1.87	1.63	0.75	0.52
95年	6.10	4.35	5.43	3.91	4.17	2.93	3.28	2.52	1.86	1.41	2.38	1.62	1.64	1.30	0.74	0.56
96年	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94
年別	非何杰金氏淋巴瘤		子宮頸及部位未明示子宮癌		白血病		子宮體癌		腎臟癌		膀胱癌		口腔癌		膽囊和其他膽道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	4.07	2.73	5.55	3.62	3.33	2.61	2.07	1.42	1.63	1.05	1.70	1.05	1.18	0.74	2.59	1.68
98年	3.11	1.96	5.11	3.31	3.11	2.22	1.70	1.15	1.85	1.14	1.78	1.03	0.89	0.53	2.59	1.67
99年	3.70	2.25	5.25	3.39	3.11	2.19	2.15	1.46	1.85	1.12	2.37	1.32	0.89	0.57	1.63	1.02
100年	4.03	2.32	5.42	3.23	3.59	2.67	2.49	1.67	1.98	1.11	1.83	1.03	1.54	0.92	2.49	1.52
101年	4.42	2.61	4.56	2.87	2.82	2.11	2.53	1.53	1.59	0.90	2.17	1.16	1.67	0.93	2.68	1.48
102年	5.32	3.09	5.75	3.25	3.09	2.15	2.80	1.73	1.65	0.92	1.94	0.96	2.01	1.22	1.80	0.98
103年	4.49	2.57	4.14	2.27	3.07	1.81	2.50	1.48	1.78	1.00	1.93	0.95	1.57	0.77	2.21	1.15
104年	4.62	2.40	4.97	2.73	2.84	1.50	2.98	1.76	2.13	1.08	2.20	0.98	1.56	0.84	2.56	1.24
105年	5.40	2.59	5.11	3.07	4.48	2.69	3.34	1.85	2.34	1.20	2.27	1.02	1.99	1.04	1.92	0.88

肆、歷年死因統計

二、行政區別死因統計

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		797	375.45	416.72		960	466.52	338.51		1,024	494.61	338.43		963	461.29	311.91		1,011	480.96	304.56
08-14	惡性腫瘤	1	224	105.52	113.20	1	304	147.73	109.05	1	313	151.18	108.08	1	345	165.26	112.76	1	332	157.94	103.23
25-27-28*	心臟疾病	3	91	42.87	49.51	2	101	49.08	33.77	2	134	64.72	42.17	2	104	49.82	31.91	2	108	51.38	31.42
29	腦血管疾病	2	103	48.52	52.72	3	81	39.36	27.79	3	91	43.95	28.56	3	73	34.97	21.58	3	86	40.91	24.13
181	糖尿病	4	42	19.79	21.41	4	62	30.13	20.77	4	67	32.36	21.59	4	65	31.14	18.86	4	79	37.58	22.53
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	26	12.25	14.34	7	27	13.12	13.86	7	33	15.94	10.849	8	26	12.45	7.48	5	41	19.50	10.66
321	肺炎	6	27	12.72	14.99	5	42	20.41	12.21	5	41	19.80	12.18	7	28	13.41	7.73	6	37	17.60	8.94
E54	自殺	10	17	8.01	7.75	9	18	8.75	7.03	9	20	9.66	8.07	6	30	14.37	12.01	7	29	13.80	11.28
E47-E53	事故傷害	5	30	14.13	14.38	6	38	18.47	12.94	6	35	16.91	14.15	5	34	16.29	14.98	8	26	12.37	12.27
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	9.89	10.64	8	20	9.72	7.26	8	22	10.63	7.03	8	26	12.45	8.54	9	17	8.09	5.56
038	敗血症	12	7	3.30	3.52	12	9	4.37	3.10	11	10	4.83	3.01	15	3	1.44	0.92	10	14	6.66	3.41
	其他		209	98.45	114.26		258	125.38	90.73		258	124.62	82.74		229	109.69	75.15		242	115.13	71.13

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,057	502.04	305.11		1,044	499.41	286.26		1,085	521.10	285.11		1,218	582.24	307.51		1,189	565.04	287.52
C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34	90.74	1	331	158.34	96.34	1	352	169.06	99.86	1	386	184.52	109.51	1	369	175.36	96.84
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	140	66.50	37.91	2	124	59.32	32.78	2	145	69.64	34.19	2	165	78.88	36.65	2	160	76.04	34.94
J12-J18	肺炎	4	63	29.92	17.22	5	48	22.96	10.76	5	56	26.90	12.04	4	73	34.90	14.29	4	53	25.19	10.11
I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32	24.08	3	78	37.31	20.09	3	70	33.62	16.86	3	87	41.59	20.06	3	92	43.72	20.30
E10-E14	糖尿病	5	49	23.27	13.53	4	72	34.44	18.81	4	59	28.34	14.64	5	50	23.90	12.69	5	47	22.34	11.00
A40-A41	敗血症	6	46	21.85	12.07	6	34	16.26	8.68	8	28	13.45	7.27	6	42	20.08	9.57	6	38	18.06	8.06
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	27	12.82	6.32	8	33	15.79	7.50	6	32	15.37	6.79	9	29	13.86	6.22	8	33	15.68	5.89
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	31	14.72	8.71	10	21	10.05	4.82	7	30	14.41	7.66	7	36	17.21	8.52	10	29	13.78	6.51
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	22	10.45	8.37	11	20	9.57	7.50	11	24	11.53	8.99	10	21	10.04	8.31	9	32	15.21	11.52
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	27	1	0.47	0.20	14	10	4.78	2.06	15	8	3.84	1.51	11	20	9.56	3.29	15	10	4.75	1.67
	其他		285	135.37	85.96		273	130.59	76.92		281	134.96	75.30		309	147.71	78.40		326	154.92	75.75

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順 位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順 位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順 位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順 位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順 位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,176	479.31	492.27		1,331	569.90	390.54		1,366	589.70	386.92		1,271	549.91	341.85		1,363	592.17	355.26
08-14	惡性腫瘤	1	303	123.50	121.50	1	373	159.71	112.37	1	430	185.63	126.68	1	401	173.50	113.16	1	427	185.51	116.31
25-27-28*	心臟疾病	2	121	49.32	50.71	2	178	76.22	47.58	3	159	68.64	40.03	2	134	57.98	33.71	2	167	72.55	41.68
29	腦血管疾病	3	120	48.91	48.82	3	115	49.24	32.06	2	163	70.37	43.54	3	105	45.43	27.28	3	133	57.78	30.89
181	糖尿病	5	59	24.05	23.40	4	74	31.69	21.30	4	80	34.54	21.74	3	105	45.43	28.66	4	76	33.02	19.69
321	肺炎	6	48	19.56	20.44	6	52	22.27	13.10	5	51	22.02	12.46	5	61	26.39	13.52	5	65	28.24	14.85
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	33	13.45	13.33	5	59	25.26	16.94	6	50	21.58	13.21	6	45	19.47	11.14	6	40	17.38	10.28
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.67	14.26	9	32	13.70	10.13	8	31	13.38	19.42	9	23	9.95	7.05	7	29	12.60	8.38
E54	自殺	11	16	6.52	5.99	8	35	14.99	11.81	7	45	19.43	15.35	7	40	17.31	13.73	8	27	11.73	8.86
E47-E53	事故傷害	4	81	33.01	31.34	7	39	16.70	12.87	9	27	11.66	9.75	8	28	12.11	8.83	9	24	10.43	7.17
26	高血壓性疾病	8	34	13.86	14.56	10	21	8.99	5.56	10	18	7.77	5.02	10	17	7.36	3.49	10	15	6.52	3.79
	其他		325	132.46	147.92		353	151.15	106.82		312	134.69	79.72		312	134.99	81.28		360	156.40	93.36

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77	350.41		1,357	598.94	343.00		1,336	593.18	328.10		1,382	612.00	322.46		1,513	666.11	345.11
C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88	110.89	1	437	192.88	114.86	1	424	188.25	110.88	1	441	195.29	114.01	1	455	200.32	109.20
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	181	79.28	43.10	2	142	62.67	34.96	2	143	63.49	31.30	2	147	65.10	31.01	2	184	81.01	39.29
J12-J18	肺炎	4	87	38.10	19.25	5	74	32.66	15.76	3	93	41.29	17.91	4	87	38.53	17.35	4	94	41.38	17.44
I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37	27.10	3	111	48.99	26.33	4	82	36.41	17.83	3	93	41.18	20.10	3	99	43.59	21.34
E10-E14	糖尿病	5	51	22.34	12.74	4	81	35.75	18.51	5	56	24.86	13.88	7	49	21.70	11.33	5	63	27.74	15.04
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	47	20.59	11.95	9	42	18.54	9.61	6	45	19.98	10.29	9	36	15.94	7.57	8	52	22.89	11.17
A40-A41	敗血症	6	47	20.59	10.86	7	48	21.19	11.55	9	36	15.98	7.32	5	66	29.23	13.37	7	54	23.77	10.42
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	45	19.71	9.97	6	49	21.63	9.94	7	42	18.65	9.14	6	57	25.24	10.95	6	59	25.98	11.23
I10-I15	高血壓性疾病	9	41	17.96	9.81	8	44	19.42	10.20	12	32	14.21	8.07	8	40	17.71	8.54	9	47	20.69	9.14
J40-J47	慢性肝病及肝硬化	13	22	9.64	6.24	11	30	13.24	8.19	11	33	14.65	8.86	10	27	11.96	7.41	10	33	14.53	8.52
	其他		309	135.34	88.50		299	131.97	83.09		350	155.40	92.62		339	150.12	80.82		373	164.22	75.75

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,425	624.68	320.26		1,475	643.89	316.23		1,476	643.32	319.90		1,635	715.48	333.55
C00-C97	惡性腫瘤	1	447	195.95	107.17	1	433	189.02	104.37	1	436	190.03	102.25	1	488	213.55	109.72
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	172	75.40	34.24	2	191	83.38	39.14	2	176	76.71	34.50	2	224	98.02	44.76
J12-J18	肺炎	4	76	33.32	13.20	3	127	55.44	20.93	3	111	48.38	19.46	3	125	54.70	21.82
I60-I69	腦血管疾病	3	103	45.15	19.20	4	101	44.09	20.21	4	93	40.53	19.12	4	90	39.38	17.52
E10-E14	糖尿病	5	70	30.69	14.99	5	69	30.12	15.06	5	68	29.64	13.39	5	72	31.51	13.81
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	49	21.48	10.04	6	62	27.07	12.10	6	50	21.79	9.19	6	60	26.26	11.10
A40-A41	敗血症	6	49	21.48	9.39	8	48	20.95	9.08	10	36	15.69	6.30	7	57	24.94	8.98
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	49	21.48	8.64	7	54	23.57	8.62	8	39	17.00	7.36	8	54	23.63	8.83
I10-I15	高血壓性疾病	10	29	12.71	5.83	10	31	13.53	6.04	7	42	18.31	7.92	9	38	16.63	7.06
J40-J47	慢性肝病及肝硬化	10	29	12.71	6.84	12	22	9.60	5.79	13	27	11.77	7.43	10	33	14.44	7.95
	其他		352	154.31	90.72		337	147.11	74.89		398	173.47	92.98		394	172.42	82.00

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,416	424.70	386.23		1,584	506.42	319.61		1,638	524.39	311.95		1,546	493.66	282.16		1,598	508.03	276.93
08-14	惡性腫瘤	1	410	122.97	110.66	1	527	168.49	111.30	1	501	160.39	99.34	1	495	158.06	94.53	1	473	150.37	90.00
25-27-28*	心臟疾病	2	184	55.19	49.75	2	210	67.14	37.16	2	225	72.03	38.67	2	174	55.56	29.16	2	194	61.68	29.86
29	腦血管疾病	3	169	50.69	44.05	3	126	40.28	24.35	3	142	45.46	25.58	3	121	38.64	19.87	3	145	46.10	21.44
181	糖尿病	5	74	22.19	19.74	4	107	34.21	20.70	4	106	33.94	18.87	4	105	33.53	17.42	4	118	37.51	20.00
321	肺炎	6	49	14.70	13.12	6	51	16.31	8.49	5	89	28.49	13.64	6	46	14.69	6.57	5	78	24.80	10.89
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	45	13.50	12.67	5	63	20.14	11.99	6	78	24.97	13.24	5	58	18.52	10.25	6	61	19.39	9.48
E47-E53	事故傷害	4	80	23.99	22.73	7	43	13.75	12.35	7	44	14.09	11.96	8	37	11.81	10.00	7	37	11.76	8.98
E54	自殺	9	24	7.20	6.30	8	35	11.19	8.30	8	40	12.81	9.30	7	40	12.77	10.22	8	36	11.45	8.61
038	敗血症	12	10	3.00	2.79	12	11	3.52	2.03	14	6	1.92	0.86	11	22	7.02	3.41	9	25	7.95	3.58
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.60	5.76	9	25	7.99	5.42	9	30	9.60	6.77	8	37	11.81	7.33	10	22	6.99	3.78
	其他		349	104.68	98.66		386	123.41	77.52		377	120.69	73.73		411	131.24	73.39		409	130.03	70.31

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51	288.84		1,667	533.05	272.15		1,779	570.94	277.62		1,816	580.74	275.56		1,818	579.65	270.29
C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36	90.51	1	549	175.55	98.92	1	572	183.58	96.42	1	544	173.97	93.07	1	580	184.93	94.20
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	237	75.39	36.28	2	200	63.95	30.96	2	213	68.36	30.67	2	233	74.51	31.26	2	210	66.96	29.84
J12-J18	肺炎	4	92	29.26	11.80	4	98	31.34	12.51	4	108	34.66	13.68	4	100	31.98	11.50	4	96	30.61	10.66
I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67	20.32	3	115	36.77	17.01	3	129	41.40	17.92	3	129	41.25	17.14	3	153	48.78	20.61
E10-E14	糖尿病	5	74	23.54	12.29	5	75	23.98	12.25	5	78	25.03	11.66	5	79	25.26	10.76	6	70	22.32	9.47
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	55	17.49	8.53	7	49	15.67	6.88	9	45	14.44	6.70	9	51	16.31	6.38	9	60	19.13	7.70
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	63	20.04	8.79	6	56	17.91	7.37	7	48	15.40	5.64	6	72	23.02	8.60	7	68	21.68	7.68
A40-A41	敗血症	8	54	17.18	7.80	10	41	13.11	5.46	6	57	18.29	7.89	7	59	18.87	7.66	5	72	22.96	9.02
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	45	14.31	10.65	11	38	12.15	7.15	11	43	13.80	7.98	8	55	17.59	10.72	10	46	14.67	8.01
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	30	9.54	7.17	13	31	9.91	7.35	12	37	11.87	7.70	12	33	10.55	8.40	11	32	10.20	8.41
	其他		433	137.73	74.70		415	132.70	66.29		449	144.10	71.36		461	147.42	70.07		431	137.42	75.75

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,846	589.03	265.06		2,054	655.12	289.90		1,962	626.09	259.39		2,090	669.27	275.35
C00-C97	惡性腫瘤	1	582	185.71	94.86	1	593	189.14	93.05	1	565	180.29	83.82	1	616	197.26	91.83
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	269	85.83	35.58	2	317	101.11	41.22	2	275	87.75	32.15	2	323	103.43	37.90
J12-J18	肺炎	4	89	28.40	8.98	4	120	38.27	13.38	4	128	40.85	13.41	3	128	40.99	12.73
I60-I69	腦血管疾病	3	136	43.40	16.86	3	148	47.20	19.41	3	139	44.36	16.37	4	120	38.43	14.57
E10-E14	糖尿病	5	87	27.76	11.66	5	96	30.62	12.21	5	80	25.53	9.71	5	90	28.82	11.05
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	43	13.72	5.16	8	58	18.50	6.53	6	72	22.98	8.81	6	78	24.98	8.92
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	72	22.97	8.55	6	85	27.11	9.44	7	71	22.66	7.81	7	59	18.89	6.29
A40-A41	敗血症	7	56	17.87	6.08	10	42	13.40	5.09	9	51	16.27	5.38	8	50	16.01	5.12
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	44	14.04	9.85	9	44	14.03	9.46	10	45	14.36	8.07	9	47	15.05	8.34
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	21	6.70	4.90	13	26	8.29	7.63	15	21	6.70	6.13	10	36	11.53	8.02
	其他		447	142.63	62.58		525	167.45	72.48		515	164.34	67.73		543	173.88	70.57

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		987	440.48	464.15		1,123	517.67	383.52		1,178	543.14	389.31		1,106	506.77	348.65		1,230	561.56	369.71
08-14	惡性腫瘤	1	289	128.97	131.63	1	370	170.56	126.90	1	374	172.44	123.37	1	351	160.83	110.34	1	384	175.32	114.11
25-27-28*	心臟疾病	2	124	55.34	58.98	2	154	70.99	50.46	2	146	67.32	45.60	2	138	63.23	42.24	2	147	67.11	42.14
29	腦血管疾病	3	106	47.31	50.82	3	83	38.26	27.41	3	102	47.03	31.46	3	105	48.11	30.71	3	109	49.76	32.01
181	糖尿病	5	47	20.98	21.96	4	71	32.73	23.36	4	91	41.96	28.41	4	71	32.53	21.35	4	86	39.26	24.71
321	肺炎	7	32	14.28	16.79	5	35	16.13	11.39	5	49	22.59	15.23	6	48	21.99	13.75	5	67	30.59	19.15
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	25	11.16	12.71	7	31	14.29	10.64	7	36	16.60	11.06	7	27	12.37	8.36	6	44	20.09	12.40
E47-E53	事故傷害	4	64	28.56	27.70	9	27	12.45	10.51	8	33	15.22	13.40	8	23	10.54	10.43	7	31	14.15	12.47
E54	自殺	10	20	8.93	7.81	5	35	16.13	12.80	6	44	20.29	17.34	5	49	22.45	18.01	8	29	13.24	10.66
347	慢性肝病及肝硬化	6	37	16.51	16.04	8	30	13.83	10.25	9	27	12.45	9.08	9	22	10.08	7.12	9	23	10.50	7.34
038	敗血症	15	4	1.79	2.11	12	5	2.30	1.58	10	15	6.92	4.44	11	11	5.04	3.61	10	21	9.59	6.23
	其他		239	106.66	117.60		282	129.99	98.22		261	120.34	89.92		261	119.59	82.73		289	131.94	88.49

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,264	578.06	365.58		1,192	545.43	326.95		1,261	575.31	338.60		1,341	603.74	344.73		1,412	626.49	346.62
C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70	114.39	1	417	190.81	117.29	1	402	183.41	110.80	1	418	188.19	111.16	1	430	190.79	112.43
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	167	76.37	45.89	2	143	65.43	37.90	2	145	66.15	35.98	2	156	70.23	36.66	2	153	67.89	36.01
J12-J18	肺炎	4	70	32.01	18.02	4	76	34.78	18.90	4	73	33.31	17.01	4	73	32.87	15.31	4	78	34.61	15.94
I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22	31.21	3	96	43.93	24.46	3	89	40.60	22.88	3	101	45.47	23.70	3	96	42.59	21.64
E10-E14	糖尿病	5	69	31.56	19.49	5	47	21.51	13.09	5	63	28.74	15.36	5	66	29.71	16.69	5	75	33.28	18.00
A40-A41	敗血症	7	37	16.92	9.68	7	36	16.47	9.18	7	42	19.16	10.53	6	61	27.46	14.48	8	51	22.63	11.03
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	36	16.46	9.55	6	39	17.85	9.90	6	46	20.99	11.43	9	35	15.76	8.84	6	59	26.18	14.46
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	30	13.72	7.78	10	29	13.27	6.90	11	31	14.14	6.90	7	37	16.66	8.08	9	46	20.41	9.97
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	18	8.23	6.75	11	28	12.81	10.11	9	34	15.51	12.55	11	31	13.96	9.25	10	38	16.86	11.08
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	9	32	14.63	10.88	9	31	14.18	11.24	9	34	15.51	13.10	9	35	15.76	11.63	11	37	16.42	12.07
	其他		311	142.23	91.94		250	114.39	67.98		302	137.78	82.06		328	147.67	88.93		349	154.85	75.75

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,350	592.87	320.24		1,431	623.19	331.74		1,416	613.19	316.50		1,527	660.19	318.27
C00-C97	惡性腫瘤	1	412	180.94	103.00	1	427	185.96	103.84	1	424	183.61	101.41	1	486	210.12	110.82
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	173	75.98	40.31	2	208	90.58	47.38	2	179	77.52	39.13	2	220	95.12	43.09
J12-J18	肺炎	4	76	33.38	15.08	4	74	32.23	14.80	4	83	35.94	15.37	3	119	51.45	21.68
I60-I69	腦血管疾病	3	88	38.65	19.42	3	101	43.98	22.72	3	94	40.71	19.04	4	90	38.91	16.02
E10-E14	糖尿病	5	65	28.55	15.01	5	68	29.61	15.11	5	58	25.12	11.55	5	68	29.40	12.97
A40-A41	敗血症	9	36	15.81	8.36	9	37	16.11	7.33	10	36	15.59	6.57	6	45	19.46	8.72
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	33	14.49	7.41	7	47	20.47	9.35	6	50	21.65	9.96	7	43	18.59	8.27
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	52	22.84	10.29	6	53	23.08	10.20	7	49	21.22	8.48	8	39	16.86	7.03
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	52	22.84	14.73	12	27	11.76	7.11	8	42	18.19	13.30	9	38	16.43	9.16
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	21	9.22	6.62	10	30	13.06	10.14	12	29	12.56	9.44	10	35	15.13	9.75
	其他		342	150.19	80.01		359	156.34	83.76		372	161.09	82.25		344	148.73	70.76

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		786	454.91	404.71		858	539.48	342.76		892	564.88	349.02		843	533.65	316.60		874	549.53	305.47
08-14	惡性腫瘤	1	244	141.22	125.31	1	245	154.05	101.80	1	282	178.58	117.47	1	267	169.02	105.69	1	258	162.22	96.45
25-27-28*	心臟疾病	3	77	44.57	38.37	2	113	71.05	41.02	2	102	64.59	37.30	2	80	50.64	26.31	2	86	54.07	27.11
29	腦血管疾病	2	86	49.77	43.48	3	89	55.96	32.15	3	88	55.73	34.22	3	62	39.25	21.31	3	75	47.16	23.89
181	糖尿病	4	39	22.57	19.47	4	59	37.10	23.32	4	58	36.73	21.53	4	53	33.55	18.87	4	58	36.47	19.78
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	9	20	11.58	10.08	5	34	21.38	12.02	7	23	14.57	7.59	6	31	19.62	11.00	5	52	32.70	16.17
321	肺炎	7	27	15.63	14.22	6	24	15.09	7.71	5	30	19.00	10.17	5	51	32.28	15.33	6	38	23.89	11.51
E47-E53	事故傷害	5	32	18.52	17.29	8	21	13.20	9.44	6	24	15.20	13.39	8	25	15.83	13.12	7	25	15.72	12.26
E54	自殺	11	8	4.63	4.35	7	22	13.83	11.94	8	19	12.03	9.39	9	24	15.19	14.32	8	22	13.83	11.16
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	15.63	14.81	8	21	13.20	9.72	9	18	11.40	7.39	7	26	16.46	8.94	9	17	10.69	7.29
26	高血壓性疾病	6	30	17.36	15.38	10	11	6.92	3.65	10	10	6.33	3.06	10	14	8.86	4.73	10	10	6.29	2.79
	其他		196	113.44	101.95		219	137.70	89.99		238	150.72	87.49		210	132.94	76.99		233	146.50	77.06

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		957	600.33	331.54		897	563.99	308.67		885	556.10	290.83		957	596.29	307.13		999	617.42	308.90
C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07	111.73	1	276	173.54	103.34	1	278	174.68	99.77	1	263	163.87	93.15	1	305	188.50	106.54
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	127	79.67	42.36	2	116	72.94	37.95	2	103	64.72	34.02	2	118	73.52	35.53	2	129	79.73	35.84
I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54	21.19	3	58	36.47	18.09	3	56	35.19	17.22	3	54	33.65	16.20	3	73	45.12	19.35
J12-J18	肺炎	4	70	43.91	19.59	4	49	30.81	12.60	4	51	32.05	12.28	4	52	32.40	13.63	4	71	43.88	17.63
E10-E14	糖尿病	7	30	18.82	10.26	5	46	28.92	15.90	7	32	20.11	9.59	5	38	23.68	12.14	7	39	24.10	10.72
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	22	13.80	6.08	8	27	16.98	8.26	9	21	13.20	4.97	8	30	18.69	7.82	8	32	19.78	7.95
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病變	6	35	21.96	10.66	6	31	19.49	9.09	10	18	11.31	5.39	6	31	19.32	8.56	8	32	19.78	9.49
A40-A41	敗血症	5	41	25.72	12.83	6	31	19.49	9.13	6	36	22.62	9.46	6	31	19.32	8.79	5	42	25.96	12.71
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	13.17	11.18	9	23	14.46	11.63	13	15	9.43	5.56	8	30	18.69	11.84	10	24	14.83	10.38
M00-M99	骨骼肌肉系統及 結締組織之疾病	10	19	11.92	4.95	12	19	11.95	5.17	8	25	15.71	6.33	13	14	8.72	3.47	14	9	5.56	2.67
	其他		218	136.75	80.71		221	138.95	77.51		250	157.09	86.24		296	184.43	96.00		243	150.18	75.75

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	
A00-Y98	所有死亡原因		892	548.43	264.45		1,093	669.47	321.84		1,097	673.29	314.63		1,088	673.94	307.29
C00-C97	惡性腫瘤	1	248	152.48	79.50	1	291	178.24	95.13	1	317	194.56	100.26	1	314	194.50	102.13
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	121	74.39	35.70	2	179	109.64	49.31	2	148	90.84	39.66	2	151	93.53	37.73
I60-I69	腦血管疾病	4	57	35.05	15.18	3	94	57.58	25.41	4	67	41.12	18.43	3	79	48.93	19.99
J12-J18	肺炎	3	76	46.73	16.61	4	78	47.78	17.15	3	77	47.26	17.86	4	67	41.50	14.43
E10-E14	糖尿病	5	47	28.90	13.51	5	45	27.56	12.75	5	51	31.30	14.19	5	54	33.45	14.41
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	31	19.06	8.15	6	33	20.21	8.31	6	48	29.46	10.52	6	40	24.78	9.15
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	31	19.06	8.02	6	33	20.21	8.65	9	29	17.80	7.34	7	36	22.30	8.62
A40-A41	敗血症	10	21	12.91	4.99	8	31	18.99	8.84	7	35	21.48	8.74	8	32	19.82	7.48
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	24	14.76	9.22	9	29	17.76	10.02	10	28	17.19	12.65	9	30	18.58	14.16
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	16	9.84	4.84	12	21	12.86	5.43	12	23	14.12	5.25	10	27	16.72	5.46
	其他		220	135.26	68.73		259	158.64	80.84		274	168.17	79.73		258	159.81	73.73

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		733	536.47	552.72		766	593.91	430.17		867	679.14	490.25		802	632.16	431.17		810	640.19	415.86
08-14	惡性腫瘤	1	230	168.33	172.79	1	205	158.94	119.59	1	228	178.60	130.70	1	273	215.19	148.40	1	259	204.70	136.29
25-27-28*	心臟疾病	2	73	53.43	55.15	2	89	69.01	47.71	2	95	74.42	46.89	2	96	75.67	49.95	2	94	74.29	48.80
29	腦血管疾病	3	72	52.70	53.79	3	73	56.60	39.88	3	89	69.72	50.44	4	55	43.35	27.79	3	68	53.74	34.48
181	糖尿病	4	48	35.13	36.22	4	60	46.52	33.65	4	63	49.35	34.45	3	56	44.14	29.38	4	50	39.52	24.78
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	30	21.96	22.93	5	33	25.59	18.87	5	42	32.90	23.19	6	25	19.71	13.26	5	35	27.66	17.33
321	肺炎	8	22	16.10	16.94	6	32	24.81	16.63	7	25	19.58	12.88	5	29	22.86	14.12	6	29	22.92	13.40
E47-E53	事故傷害	5	47	34.40	33.69	8	20	15.51	11.96	8	24	18.80	17.98	8	20	15.76	13.61	7	24	18.97	14.65
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.30	18.40	7	21	16.28	12.64	9	22	17.23	12.65	10	10	7.88	5.50	7	24	18.97	12.70
E54	自殺	11	10	7.32	7.33	9	19	14.73	12.08	6	30	23.50	19.84	7	22	17.34	14.17	9	18	14.23	11.77
038	敗血症	10	12	8.78	9.53	12	6	4.65	3.16	10	18	14.10	8.75	9	11	8.67	5.50	10	13	10.27	5.58
	其他		164	120.03	125.95		208	161.27	114.00		231	180.95	132.47		205	161.59	109.48		196	154.91	96.08

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		893	712.17	452.82		859	692.60	420.80		806	650.00	378.19		859	683.81	392.95		926	725.00	414.81
C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93	139.52	1	255	205.60	128.29	1	255	205.65	125.45	1	244	194.24	117.42	1	288	225.48	133.64
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	118	94.11	58.79	2	105	84.66	48.81	2	83	66.94	37.30	2	98	78.01	43.23	2	142	111.18	60.86
I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84	30.62	3	84	67.73	38.53	3	58	46.77	24.92	3	61	48.56	25.54	3	65	50.89	27.40
J12-J18	肺炎	4	61	48.65	27.90	5	41	33.06	17.33	4	49	39.52	19.33	4	56	44.58	23.36	5	40	31.32	14.99
E10-E14	糖尿病	5	55	43.86	28.02	4	58	46.76	27.53	5	43	34.68	19.34	5	48	38.21	21.30	4	41	32.10	17.49
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	23	18.34	11.73	8	26	20.96	11.57	7	28	22.58	12.11	7	26	20.70	11.24	8	25	19.57	10.32
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	26	20.74	11.40	7	27	21.77	11.66	8	23	18.55	9.43	8	25	19.90	10.53	7	30	23.49	11.44
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	16.75	11.45	8	26	20.96	14.30	10	17	13.71	10.58	10	20	15.92	10.46	10	21	16.44	12.21
A40-A41	敗血症	6	32	25.52	14.71	6	32	25.80	15.01	6	32	25.81	14.64	6	39	31.05	15.90	6	34	26.62	13.91
I10-I15	高血壓性疾病	9	21	16.75	10.00	11	17	13.71	8.05	12	15	12.10	6.41	9	22	17.51	8.53	12	15	11.74	6.33
	其他		204	162.69	108.68		188	151.58	99.72		203	163.71	98.68		220	175.13	105.44		225	176.16	75.75

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年											
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率				
A00-Y98	所有死亡原因		889	687.47	383.25		843	646.49	350.58		986	752.95	400.99		963	737.93	393.81								
C00-C97	惡性腫瘤	1	282	218.07	124.15	1	236	180.99	102.39	1	300	229.09	127.23	1	270	206.90	111.16								
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	125	96.66	53.92	2	139	106.60	54.84	2	151	115.31	60.97	2	150	114.94	59.19								
I60-I69	腦血管疾病	3	59	45.63	23.66	3	55	42.18	22.03	3	75	57.27	27.91	3	72	55.17	27.93								
J12-J18	肺炎	5	47	36.35	18.59	4	53	40.65	19.56	4	57	43.53	21.09	4	68	52.11	25.44								
E10-E14	糖尿病	4	49	37.89	20.13	5	45	34.51	18.52	5	43	32.84	16.08	5	43	32.95	16.85								
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	25	19.33	9.79	7	25	19.17	9.23	5	43	32.84	16.42	6	30	22.99	10.70								
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	32	24.75	11.79	6	41	31.44	14.75	7	29	22.15	9.40	6	30	22.99	10.29								
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	16	12.37	10.28	9	20	15.34	8.96	9	25	19.09	11.90	8	27	20.69	13.33								
A40-A41	敗血症	7	29	22.43	12.18	9	20	15.34	7.72	7	29	22.15	10.00	9	26	19.92	9.16								
I10-I15	高血壓性疾病	9	20	15.47	8.31	8	23	17.64	8.04	11	18	13.75	6.03	10	21	16.09	7.66								
	其他		205	158.53	90.45		186	142.64	84.54		216	164.95	93.96		226	173.18	102.11								

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,094	506.93	512.04		1,391	699.50	473.22		1,454	741.48	472.87		1,428	733.02	451.74		1,493	770.88	449.83
08-14	惡性腫瘤	1	270	125.11	121.67	1	414	208.19	142.34	1	431	219.79	142.95	1	427	219.19	140.31	1	458	236.48	142.80
25-27-28*	心臟疾病	2	136	63.02	66.08	2	160	80.46	52.18	2	142	72.41	43.14	2	149	76.48	44.31	2	160	82.61	48.02
29	腦血管疾病	3	127	58.85	59.62	3	125	62.86	39.07	3	139	70.88	43.19	3	138	70.84	41.15	3	126	65.06	37.54
181	糖尿病	5	57	26.41	26.00	4	92	46.26	30.19	4	113	57.63	36.08	4	119	61.08	36.71	4	109	56.28	31.57
321	肺炎	8	30	13.90	15.91	8	43	21.62	12.59	5	60	30.60	16.82	6	49	25.15	12.86	5	87	44.92	21.89
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	35	16.22	16.24	6	54	27.16	17.23	7	45	22.95	13.06	5	58	29.77	17.75	6	63	32.53	16.74
347	慢性肝病及肝硬化	6	43	19.93	19.40	7	53	26.65	20.28	9	28	14.28	9.28	8	35	17.97	12.60	7	42	21.69	13.72
E54	自殺	11	19	8.80	8.27	9	33	16.59	13.23	6	58	29.58	23.44	6	49	25.15	19.60	8	37	19.10	14.47
E47-E53	事故傷害	4	73	33.83	32.04	5	60	30.17	25.38	8	37	18.87	15.47	9	32	16.43	13.17	9	34	17.56	13.70
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	9	24	11.12	10.43	13	11	5.53	3.69	11	16	8.16	4.86	13	7	3.59	1.92	10	14	7.23	3.76
	其他		280	129.74	136.38		346	174.00	117.04		385	196.33	124.58		365	187.36	111.37		363	187.43	105.62

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68	450.30		1,552	819.43	447.32		1,525	807.87	433.84		1,578	830.63	426.38		1,616	842.80	427.68
C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83	122.62	1	419	221.23	125.53	1	446	236.27	132.66	1	426	224.24	121.90	1	448	233.65	127.77
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	203	106.05	56.99	2	175	92.40	47.78	2	167	88.47	45.11	2	185	97.38	45.99	2	207	107.96	50.58
J12-J18	肺炎	3	111	57.99	28.01	5	95	50.16	21.34	4	107	56.68	25.11	4	110	57.90	24.84	4	102	53.20	21.15
I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29	28.82	3	118	62.30	32.66	3	114	60.39	30.20	3	116	61.06	31.08	3	121	63.11	30.02
E10-E14	糖尿病	5	88	45.97	24.11	4	105	55.44	29.81	5	86	45.56	23.81	5	108	56.85	27.65	5	90	46.94	22.73
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	61	31.87	16.89	9	47	24.82	12.32	8	48	25.43	12.97	8	50	26.32	12.08	9	43	22.43	11.20
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	50	26.12	12.13	8	52	27.46	11.92	10	39	20.66	9.26	6	62	32.64	13.30	6	66	34.42	14.17
I10-I15	高血壓性疾病	11	39	20.37	9.94	11	43	22.70	10.84	7	49	25.96	12.67	7	57	30.00	13.98	7	61	31.81	15.24
A40-A41	敗血症	9	46	24.03	11.95	6	60	31.68	16.88	6	60	31.79	14.88	9	44	23.16	10.08	8	58	30.25	12.72
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	45	23.51	17.52	12	32	16.90	11.97	11	33	17.48	14.37	12	34	17.90	11.84	9	43	22.43	15.38
	其他		363	189.64	121.32		406	214.36	126.27		376	199.19	112.80		386	203.18	113.64		377	196.62	75.75

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,604	830.86	409.75		1,651	850.60	405.16		1,716	882.14	412.09		1,743	898.74	413.96
C00-C97	惡性腫瘤	1	464	240.35	128.59	1	458	235.96	121.04	1	459	235.96	120.66	1	456	235.13	117.14
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	215	111.37	49.65	2	253	130.35	59.90	2	268	137.77	60.94	2	277	142.83	62.50
J12-J18	肺炎	5	85	44.03	17.24	3	108	55.64	21.57	3	126	64.77	23.98	3	137	70.64	27.55
I60-I69	腦血管疾病	3	123	63.71	28.28	3	108	55.64	23.79	4	119	61.17	25.82	4	129	66.52	28.18
E10-E14	糖尿病	4	88	45.58	21.54	5	100	51.52	24.77	5	92	47.29	21.97	5	96	49.50	21.90
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	45	23.31	10.51	6	66	34.00	14.98	6	67	34.44	11.34	6	68	35.06	15.06
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	57	29.53	11.93	7	61	31.43	10.63	7	54	27.76	11.30	7	66	34.03	14.30
I10-I15	高血壓性疾病	6	60	31.08	13.48	9	49	25.25	10.47	8	52	26.73	17.56	8	42	21.66	9.51
A40-A41	敗血症	9	43	22.27	9.47	10	43	22.15	8.32	8	52	26.73	9.96	9	39	20.11	8.49
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	42	21.76	13.41	8	52	26.79	16.86	10	49	25.19	10.62	10	37	19.08	11.76
	其他		382	197.87	105.65		353	181.87	92.83		378	194.32	97.95		396	204.19	97.57

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,041	461.94	512.44		1,277	496.35	392.35		1,297	501.74	377.83		1,301	500.03	360.44		1,402	536.05	368.85
08-14	惡性腫瘤	1	274	121.59	129.12	1	406	157.81	128.43	1	384	148.55	113.36	1	411	157.96	117.84	1	411	157.15	113.05
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.16	47.41	2	165	64.13	48.62	2	148	57.25	40.41	2	133	51.12	33.87	2	168	64.23	42.38
29	腦血管疾病	2	121	53.69	58.88	3	133	51.70	39.73	3	113	43.71	31.45	3	119	45.74	31.14	3	116	44.35	29.52
181	糖尿病	5	70	31.06	33.39	4	79	30.71	22.83	4	79	30.56	23.60	4	71	27.29	19.76	4	84	32.12	20.84
321	肺炎	8	30	13.31	16.05	6	41	15.94	10.85	5	57	22.05	14.27	5	59	22.68	14.74	5	74	28.29	16.39
E54	自殺	12	11	4.88	4.77	7	35	13.60	12.05	7	44	17.02	14.99	7	42	16.14	13.27	6	51	19.50	15.91
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	43	19.08	20.79	5	42	16.32	12.41	6	51	19.73	13.80	6	49	18.83	13.21	7	47	17.97	12.11
E47-E53	事故傷害	4	88	39.05	40.11	9	27	10.49	9.97	8	42	16.25	14.70	8	33	12.68	10.79	8	35	13.38	11.25
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	12.87	13.43	8	30	11.66	9.72	9	29	11.22	8.88	9	27	10.38	8.25	9	29	11.09	8.64
038	敗血症	14	9	3.99	4.61	13	7	2.72	1.96	11	15	5.80	4.05	11	17	6.53	4.51	10	20	7.65	4.55
	其他		271	120.25	143.88		312	121.27	95.78		335	129.59	98.32		340	130.68	93.04		367	140.32	94.21

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39	355.06		1,406	538.09	344.02		1,454	555.84	338.70		1,551	586.67	340.24		1,619	604.38	349.18
C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79	118.80	1	394	150.79	101.78	1	417	159.41	103.33	1	449	169.83	106.17	1	486	181.43	114.23
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	188	71.84	44.69	2	166	63.53	39.82	2	150	57.34	32.62	2	193	73.00	41.56	2	171	63.84	34.40
J12-J18	肺炎	4	86	32.86	19.04	5	64	24.49	13.41	4	86	32.88	17.27	4	90	34.04	15.64	4	103	38.45	18.42
I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98	24.05	3	105	40.18	22.36	3	103	39.37	22.01	3	125	47.28	27.89	3	125	46.66	25.55
J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	9	38	14.52	8.46	6	58	22.20	12.08	6	63	24.08	12.15	6	71	26.86	12.89	6	66	24.64	11.30
E10-E14	糖尿病	5	60	22.93	14.47	4	68	26.02	16.29	5	80	30.58	17.62	5	81	30.64	17.71	5	81	30.24	17.29
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病變	6	46	17.58	11.13	8	43	16.46	10.46	8	53	20.26	11.99	9	42	15.89	8.55	8	58	21.65	11.96
A40-A41	敗血症	7	45	17.20	11.44	11	32	12.25	6.97	9	41	15.67	9.43	7	67	25.34	12.56	9	57	21.28	11.23
I10-I15	高血壓性 疾病	10	35	13.37	8.59	7	51	19.52	11.14	6	63	24.08	13.61	8	59	22.32	11.22	7	61	22.77	11.71
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	41	15.67	13.19	10	38	14.54	11.88	11	32	12.23	10.01	10	37	14.00	10.78	10	41	15.31	9.21
	其他		321	122.66	81.20		387	148.11	97.83		366	139.91	88.66		337	127.47	75.27		370	138.12	75.75

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,514	560.07	319.09		1,678	615.48	342.44		1,617	588.76	307.80		1,809	657.10	338.63
C00-C97	惡性腫瘤	1	403	149.08	93.22	1	462	169.46	102.13	1	453	164.94	95.06	1	485	176.17	99.56
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	201	74.35	38.66	2	236	86.56	45.71	2	229	83.38	40.74	2	283	102.80	49.25
J12-J18	肺炎	4	96	35.51	17.02	3	117	42.92	19.61	3	119	43.33	18.06	3	133	48.31	20.79
I60-I69	腦血管疾病	3	122	45.13	24.50	4	109	39.98	21.44	4	95	34.59	17.82	4	128	46.49	22.26
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	45	16.65	8.41	7	65	23.84	10.14	7	62	22.57	9.79	5	74	26.88	12.17
E10-E14	糖尿病	5	91	33.66	18.89	5	82	30.08	16.46	5	70	25.49	12.39	6	73	26.52	13.65
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	54	19.98	10.97	6	66	24.21	12.28	6	63	22.94	11.38	7	67	24.34	12.55
A40-A41	敗血症	7	59	21.83	10.51	8	59	21.64	10.54	8	52	18.93	8.66	8	59	21.43	9.22
I10-I15	高血壓性疾病	6	61	22.57	10.82	10	39	14.31	6.01	9	45	16.38	8.71	9	52	18.89	8.85
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	39	14.43	9.53	9	52	19.07	12.02	10	38	13.84	8.47	10	48	17.44	10.89
	其他		343	126.88	76.56		391	143.42	86.10		391	142.37	76.72		407	147.84	79.45

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		469	415.37	546.64		567	501.54	440.30		587	519.39	432.63		649	573.55	463.19		596	525.17	407.61
08-14	惡性腫瘤	1	139	123.11	156.95	1	193	170.72	146.42	1	186	164.58	138.32	1	206	182.05	149.20	1	195	171.83	132.30
25-27-28*	心臟疾病	3	43	38.08	53.74	2	78	68.99	60.74	2	66	58.40	48.04	2	68	60.09	47.94	2	64	56.39	41.90
29	腦血管疾病	2	49	43.40	59.01	3	48	42.46	36.54	3	55	48.67	38.94	3	61	53.91	41.50	3	60	52.87	39.39
181	糖尿病	5	27	23.91	30.41	4	34	30.07	26.64	4	44	38.93	32.92	4	41	36.23	28.65	4	27	23.79	17.44
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	10	8	7.09	9.02	6	22	19.46	16.67	7	23	20.35	16.87	8	17	15.02	11.78	5	25	22.03	15.92
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	20.37	24.52	7	17	15.04	13.32	9	10	8.85	7.83	9	15	13.26	10.66	6	22	19.39	14.95
E47-E53	事故傷害	4	32	28.34	30.47	5	30	26.54	24.59	5	25	22.12	20.42	5	30	26.51	23.81	7	19	16.74	17.59
E54	自殺	8	11	9.74	10.82	8	13	11.50	10.27	6	24	21.24	17.91	5	30	26.51	21.67	8	14	12.34	10.40
321	肺炎	13	7	6.20	9.81	9	10	8.85	7.46	8	11	9.73	7.74	7	28	24.74	18.57	8	14	12.34	8.60
038	敗血症	14	5	4.43	6.19	11	3	2.65	2.41	12	5	4.42	3.87	11	7	6.19	5.30	10	10	8.81	6.31
	其他		125	110.71	155.70		119	105.26	95.24		138	122.11	99.76		146	129.03	104.10		146	128.65	102.81

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24	404.97		667	588.13	413.85		704	619.79	424.60		662	575.27	384.04		703	599.26	389.06
C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60	121.11	1	206	181.64	130.59	1	215	189.28	134.00	1	195	169.45	116.63	1	222	189.24	127.96
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	75	65.97	44.97	2	79	69.66	50.43	2	74	65.15	43.64	2	91	79.08	50.10	2	83	70.75	45.08
I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74	32.00	3	48	42.32	28.34	3	54	47.54	32.10	3	48	41.71	26.24	3	52	44.33	27.32
J12-J18	肺炎	3	58	51.01	35.70	4	42	37.03	23.28	4	44	38.74	23.58	4	43	37.37	22.15	4	48	40.92	22.37
E10-E14	糖尿病	5	31	27.27	20.03	5	33	29.10	21.39	6	33	29.05	19.03	5	36	31.28	20.87	5	39	33.24	20.86
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	20	17.59	11.63	7	22	19.40	12.13	5	37	32.57	20.48	6	28	24.33	14.96	7	28	23.87	15.04
A40-A41	敗血症	9	19	16.71	11.78	12	12	10.58	6.22	10	18	15.85	10.45	7	19	16.51	10.58	6	29	24.72	15.03
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	19	16.71	12.35	7	22	19.40	13.09	7	25	22.01	14.46	7	19	16.51	10.35	12	17	14.49	9.71
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	24	21.11	17.83	9	20	17.63	14.89	8	21	18.49	15.80	9	17	14.77	11.79	11	18	15.34	10.17
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	14	3	2.64	1.68	15	5	4.41	2.70	15	5	4.40	2.35	15	5	4.34	2.22	18	3	2.56	1.57
	其他		142	124.90	95.89		178	156.95	110.79		178	156.71	108.71		161	139.91	98.15		164	139.80	75.75

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		782	350.67	533.92		1,097	421.12	440.93		1,048	400.74	403.33		1,044	396.61	378.76		1,107	417.62	378.58
08-14	惡性腫瘤	1	198	88.79	126.68	1	314	120.54	128.00	1	306	117.01	117.36	1	357	135.62	126.93	1	373	140.72	127.74
25-27-28*	心臟疾病	2	84	37.67	61.13	2	160	61.42	62.42	2	115	43.97	44.19	2	105	39.89	39.44	2	134	50.55	45.09
29	腦血管疾病	3	71	31.84	53.36	3	90	34.55	35.90	3	107	40.91	41.26	3	104	39.51	38.27	3	96	36.22	33.17
181	糖尿病	5	41	18.39	31.21	4	65	24.95	27.88	4	74	28.30	27.85	4	60	22.79	21.50	4	73	27.54	25.69
321	肺炎	8	24	10.76	20.36	8	31	11.90	12.28	9	35	13.38	12.80	7	37	14.06	13.51	5	51	19.24	17.07
E54	自殺	7	26	11.66	13.75	6	39	14.97	12.99	6	39	14.91	13.18	5	43	16.34	16.08	6	34	12.83	11.20
E47-E53	事故傷害	4	56	25.11	27.25	5	52	19.96	19.36	8	36	13.77	13.82	8	35	13.30	12.36	6	34	12.83	12.42
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	20	8.97	14.06	7	33	12.67	13.66	7	39	14.91	14.97	6	42	15.96	15.46	8	33	12.45	10.91
347	慢性肝病及肝硬化	6	30	13.45	17.26	9	28	10.75	11.17	5	41	15.68	15.55	9	34	12.92	12.24	9	30	11.32	9.99
26	高血壓性疾病	11	16	7.17	12.08	11	11	4.22	4.96	10	23	8.79	8.94	10	14	5.32	4.77	10	15	5.66	5.15
	其他		216	96.86	156.78		274	105.18	112.31		233	89.09	93.41		213	80.92	78.20		234	88.28	80.15

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,183	444.46	378.30		1,170	437.78	357.42		1,183	439.82	352.11		1,238	453.56	352.86		1,382	497.41	376.04
C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51	118.35	1	365	136.57	114.55	1	364	135.33	110.36	1	376	137.75	113.21	1	418	150.45	118.25
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	153	57.48	49.08	2	133	49.77	38.51	2	133	49.45	39.58	2	129	47.26	37.64	2	152	54.71	39.03
I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95	31.77	3	90	33.68	26.75	3	87	32.35	25.63	3	95	34.81	25.67	3	105	37.79	27.47
J12-J18	肺炎	5	63	23.67	19.12	5	60	22.45	16.75	5	54	20.08	14.41	5	54	19.78	13.31	5	65	23.39	15.99
E10-E14	糖尿病	4	68	25.55	22.23	4	65	24.32	19.61	4	62	23.05	19.20	4	69	25.28	19.67	4	77	27.71	21.25
A40-A41	敗血症	6	42	15.78	12.45	10	31	11.60	9.48	13	24	8.92	6.67	9	31	11.36	7.90	7	45	16.20	12.19
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	33	12.40	11.36	6	41	15.34	14.16	6	42	15.61	13.93	7	40	14.65	11.00	9	43	15.48	12.77
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	28	10.52	8.83	11	29	10.85	8.32	9	35	13.01	9.01	6	46	16.85	11.02	6	47	16.92	12.06
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	17	6	2.25	1.76	14	18	6.74	5.01	14	16	5.95	4.43	15	12	4.40	2.97	13	14	5.04	2.94
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	33	12.40	10.01	8	36	13.47	11.24	7	40	14.87	11.87	10	30	10.99	8.06	7	45	16.20	12.62
	其他		290	108.96	93.34		302	113.00	93.04		326	121.20	97.02		356	130.43	102.41		371	133.53	101.47

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,322	469.74	340.25		1,364	479.77	338.86		1,423	496.40	340.19		1,491	518.34	345.19
C00-C97	惡性腫瘤	1	403	143.20	105.15	1	398	139.99	103.82	1	458	159.77	112.15	1	461	160.26	109.90
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	161	57.21	41.46	2	209	73.51	50.04	2	176	61.40	40.23	2	200	69.53	45.98
I60-I69	腦血管疾病	3	109	38.73	26.89	3	105	36.93	25.50	3	105	36.63	23.64	3	114	39.63	26.16
J12-J18	肺炎	5	58	20.61	11.98	6	59	20.75	12.93	4	68	23.72	13.65	4	82	28.51	16.12
E10-E14	糖尿病	4	66	23.45	17.63	4	61	21.46	14.81	8	42	14.65	9.89	5	69	23.99	16.59
A40-A41	敗血症	8	37	13.15	8.59	11	29	10.20	5.90	7	44	15.35	10.00	6	53	18.43	11.05
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	34	12.08	8.83	7	43	15.12	11.56	6	48	16.74	13.73	7	47	16.34	11.84
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	56	19.90	13.19	4	61	21.46	13.37	5	58	20.23	12.38	8	44	15.30	8.75
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	14	14	4.97	2.95	14	19	6.68	3.52	10	33	11.51	6.23	9	42	14.60	7.94
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	38	13.50	10.23	10	30	10.55	7.45	10	33	11.51	7.14	10	39	13.56	9.20
	其他		346	122.94	93.35		350	123.11	89.96		358	124.88	91.15		340	118.20	81.66

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,192	399.07	480.62		1,462	505.78	409.93		1,588	550.74	424.34		1,527	530.24	389.46		1,569	545.49	385.22
08-14	惡性腫瘤	1	322	107.80	123.59	1	476	164.67	131.52	1	456	158.15	122.44	1	489	169.80	126.48	1	533	185.31	133.51
25-27-28*	心臟疾病	3	129	43.19	53.54	2	161	55.70	43.66	2	171	59.31	44.17	2	171	59.38	41.99	2	162	56.32	37.83
29	腦血管疾病	2	163	54.57	66.78	3	150	51.89	40.14	3	135	46.82	34.83	3	107	37.16	25.87	3	137	47.63	31.29
181	糖尿病	5	65	21.76	27.61	4	107	37.02	28.91	4	105	36.42	26.71	4	105	36.46	25.84	4	107	37.20	25.08
321	肺炎	7	40	13.39	18.36	7	42	14.53	11.00	5	77	26.70	19.19	5	71	24.65	17.35	5	76	26.42	16.12
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	37	12.39	15.15	6	44	15.22	11.71	6	61	21.16	15.58	6	53	18.40	12.71	6	60	20.86	13.84
E47-E53	事故傷害	4	85	28.46	29.23	5	63	21.79	19.64	8	43	14.91	13.56	7	45	15.63	14.32	7	43	14.95	12.86
E54	自殺	9	26	8.70	9.29	8	30	10.38	9.03	7	49	16.99	14.16	8	43	14.93	11.86	8	38	13.21	11.18
347	慢性肝病及肝硬化	6	41	13.73	15.18	9	24	8.30	6.69	9	36	12.49	9.64	9	30	10.42	8.23	9	31	10.78	8.03
038	敗血症	13	8	2.68	3.16	10	13	4.50	3.51	10	19	6.59	4.92	11	18	6.25	4.20	10	19	6.61	4.00
	其他		276	92.40	118.73		352	121.77	104.12		436	151.21	119.15		395	137.16	100.60		363	126.20	91.48

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50	389.90		1,620	568.50	365.70		1,595	561.23	346.64		1,710	598.31	362.26		1,708	593.09	347.26
C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76	113.15	1	482	169.15	110.67	1	483	169.95	109.04	1	546	191.04	118.60	1	498	172.93	105.87
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	231	80.61	51.65	2	216	75.80	48.77	2	186	65.45	39.89	2	190	66.48	37.56	2	227	78.82	43.55
J12-J18	肺炎	4	97	33.85	20.06	5	93	32.64	18.37	4	91	32.02	16.78	3	113	39.54	21.12	5	96	33.34	16.86
I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02	28.91	3	115	40.36	24.69	3	116	40.82	23.32	4	106	37.09	21.44	3	110	38.20	20.21
E10-E14	糖尿病	5	75	26.17	17.02	4	97	34.04	21.28	4	91	32.02	19.02	5	83	29.04	16.93	4	102	35.42	19.33
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	46	16.05	9.28	6	56	19.65	11.29	7	50	17.59	10.05	6	63	22.04	10.82	6	60	20.83	10.04
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	53	18.50	11.53	7	53	18.60	11.07	6	53	18.65	10.79	8	51	17.84	10.25	7	58	20.14	10.77
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	49	17.10	15.45	9	38	13.34	10.51	13	28	9.85	8.09	10	43	15.05	12.14	9	48	16.67	12.83
A40-A41	敗血症	6	59	20.59	12.75	8	42	14.74	8.28	8	44	15.48	8.74	6	63	22.04	11.70	10	47	16.32	8.74
I10-I15	高血壓性疾病	12	31	10.82	6.70	12	31	10.88	6.20	9	40	14.07	8.07	9	46	16.09	8.45	7	58	20.14	10.27
	其他		407	142.03	103.40		397	139.32	94.57		413	145.32	92.85		406	142.05	93.25		404	140.29	88.79

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,809	625.26	351.82		1,805	622.20	335.93		1,800	619.46	320.83		1,861	641.02	324.26
C00-C97	惡性腫瘤	1	600	207.38	122.24	1	537	185.11	106.70	1	509	175.17	98.15	1	566	194.96	105.59
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	208	71.89	38.91	2	252	86.87	44.38	2	250	86.04	43.50	2	236	81.29	38.26
J12-J18	肺炎	5	90	31.11	14.00	4	104	35.85	15.74	4	109	37.51	16.20	3	124	42.71	18.10
I60-I69	腦血管疾病	3	147	50.81	26.94	3	124	42.74	21.62	3	114	39.23	17.91	4	111	38.23	18.62
E10-E14	糖尿病	4	106	36.64	20.04	5	91	31.37	16.27	5	106	36.48	17.28	5	90	31.00	14.37
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	58	20.05	9.68	6	76	26.20	11.36	6	85	29.25	12.53	6	75	25.83	10.76
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	62	21.43	10.53	8	53	18.27	8.99	7	73	25.12	12.06	7	68	23.42	10.08
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	46	15.90	12.37	7	59	20.34	13.42	9	42	14.45	10.14	8	58	19.98	13.41
A40-A41	敗血症	10	41	14.17	7.08	9	49	16.89	8.30	10	39	13.42	5.99	9	48	16.53	7.13
I10-I15	高血壓性疾病	8	50	17.28	7.93	10	44	15.17	7.04	8	46	15.83	7.28	10	40	13.78	5.79
	其他		401	138.60	82.10		416	143.40	82.11		427	146.95	79.79		445	153.28	82.13

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,078	443.77	525.00		1,317	528.90	428.42		1,400	563.46	441.02		1,395	560.68	423.62		1,433	573.60	424.32
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.03	129.94	1	375	150.60	123.14	1	399	160.59	127.39	1	401	161.17	121.33	1	463	185.33	138.24
25-27-28*	心臟疾病	3	100	41.17	50.55	2	163	65.46	50.99	2	168	67.62	51.55	2	175	70.34	52.55	2	158	63.24	45.28
29	腦血管疾病	2	119	48.99	58.76	3	127	51.00	39.93	3	137	55.14	40.95	3	132	53.05	38.66	3	138	55.24	37.42
181	糖尿病	5	51	20.99	24.62	4	83	33.33	27.29	4	108	43.47	32.61	4	95	38.18	26.50	4	91	36.43	26.67
321	肺炎	7	36	14.82	18.81	6	48	19.28	15.08	7	47	18.92	13.31	5	68	27.33	18.90	5	72	28.82	18.74
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.82	17.49	7	46	18.47	14.65	5	63	25.36	18.55	6	54	21.70	16.30	6	48	19.21	13.04
347	慢性肝病及肝硬化	6	46	18.94	20.87	8	32	12.85	9.94	9	29	11.67	9.24	9	32	12.86	10.28	7	45	18.01	13.82
E47-E53	事故傷害	4	84	34.58	35.77	5	54	21.69	20.71	8	45	18.11	15.40	8	37	14.87	13.44	8	40	16.01	12.86
E54	自殺	10	18	7.41	7.68	8	32	12.85	10.80	6	55	22.14	18.94	7	42	16.88	13.32	9	29	11.61	10.02
038	敗血症	14	12	4.94	6.09	12	9	3.61	2.97	10	15	6.04	4.56	10	18	7.23	4.51	10	18	7.21	4.62
	其他		299	123.09	154.42		348	139.75	112.92		334	134.43	108.52		341	137.05	107.83		331	132.49	103.61

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				98年				99年				100年				101年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13	426.24		1,439	578.14	390.92		1,434	576.77	368.89		1,522	606.98	384.65		1,512	597.06	367.35
C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70	131.99	1	432	173.56	118.85	1	424	170.54	114.79	1	444	177.07	116.33	1	482	190.33	120.29
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	194	77.64	51.94	2	169	67.90	42.82	2	181	72.80	43.99	2	200	79.76	47.65	2	210	82.92	50.01
J12-J18	肺炎	4	92	36.82	22.98	4	100	40.18	24.19	4	87	34.99	19.28	4	91	36.29	18.91	5	59	23.30	11.23
I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83	34.85	3	110	44.19	28.96	3	89	35.80	21.68	3	122	48.65	28.81	3	95	37.51	20.93
E10-E14	糖尿病	5	66	26.41	17.15	5	78	31.34	21.46	5	86	34.59	21.84	5	68	27.12	16.38	4	93	36.72	22.15
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	51	20.41	12.66	6	58	23.30	13.44	6	44	17.70	10.03	6	62	24.73	13.48	6	56	22.11	11.29
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	52	20.81	13.80	8	42	16.87	11.14	7	43	17.29	10.33	9	41	16.35	9.73	7	53	20.93	12.27
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	9	43	17.21	14.33	7	44	17.68	14.04	8	38	15.28	12.13	10	40	15.95	12.79	11	28	11.06	9.28
I10-I15	高血壓性疾病	10	38	15.21	10.01	12	30	12.05	7.83	9	36	14.48	8.33	11	34	13.56	7.05	8	43	16.98	9.10
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	36	14.41	11.60	10	39	15.67	13.96	10	35	14.08	10.87	7	48	19.14	14.99	8	43	16.98	12.80
	其他		369	147.68	104.93		337	135.40	94.23		371	149.22	95.62		372	148.36	98.53		350	138.21	88.00

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	102年				103年				104年				105年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,521	596.90	352.92		1,578	615.25	355.76		1,631	632.93	354.18		1,695	657.96	352.36
C00-C97	惡性腫瘤	1	463	181.70	113.59	1	460	179.35	110.46	1	487	188.99	111.14	1	450	174.68	100.96
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	206	80.84	45.47	2	216	84.22	45.56	2	222	86.15	44.42	2	262	101.70	52.30
J12-J18	肺炎	5	79	31.00	16.15	4	104	40.55	18.88	4	103	39.97	18.40	3	128	49.69	21.07
I60-I69	腦血管疾病	3	109	42.78	22.80	3	106	41.33	22.59	3	109	42.30	22.12	4	125	48.52	24.26
E10-E14	糖尿病	4	89	34.93	19.01	5	96	37.43	20.21	5	87	33.76	18.67	5	84	32.61	16.28
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	62	24.33	12.49	6	68	26.51	13.19	6	62	24.06	10.15	6	69	26.78	11.38
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	45	17.66	9.93	7	54	21.05	11.79	11	37	14.36	7.29	7	61	23.68	11.31
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	26	10.20	7.72	11	37	14.43	11.22	9	39	15.13	10.61	8	43	16.69	13.26
I10-I15	高血壓性疾病	7	51	20.01	10.36	8	51	19.88	9.95	7	43	16.69	8.20	9	41	15.92	8.02
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	37	14.52	10.81	9	47	18.32	13.69	8	40	15.52	11.37	10	38	14.75	10.93
	其他		354	138.92	84.59		339	132.17	78.22		402	156.00	91.81		394	152.94	82.60

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		224	105.52		304	147.73		313	151.18		345	165.26		332	157.94
162	肺癌	1	38	17.90	1	76	36.93	1	66	31.88	1	61	29.22	1	86	40.91
155	肝癌	2	34	16.02	4	37	17.98	2	51	24.63	2	50	23.95	2	44	20.93
153 154	結腸直腸癌	2	34	16.02	3	40	19.44	3	42	20.29	3	43	20.60	3	40	19.03
174	女性乳癌(1)	4	9	8.30	2	21	19.65	4	17	15.77	4	20	18.34	4	18	16.34
185	攝護腺癌(2)	11	3	2.89	7	8	8.09	5	10	10.08	6	14	14.04	5	11	11.00
179 180	子宮頸癌(1)	7	6	5.53	22	1	0.94	15	3	2.78	14	4	3.67	6	12	10.89
151	胃癌	5	16	7.54	5	19	9.23	7	15	7.25	5	34	16.29	7	21	9.99
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	7	3.30	5	19	9.23	6	15	7.25	8	17	8.14	8	20	9.51
157	胰臟癌	9	8	3.77	9	10	4.86	8	12	5.80	8	17	8.14	9	16	7.61
204-208	白血病	14	5	2.36	13	6	2.92	18	2	0.97	12	9	4.31	10	12	5.71
	其他		64	30.15		67	32.56		80	38.64		76	36.41		52	24.74

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		306	145.34		331	158.34		352	169.06		386	184.52		369	175.36		389	184.69
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92	1	81	38.75	1	77	36.98	1	81	38.72	1	82	38.97	1	65	30.86
C22	肝和肝內膽管癌	2	44	20.90	3	51	24.40	4	35	16.81	2	57	27.25	3	48	22.81	4	47	22.31
C50	女性乳房癌(1)	4	16	14.47	4	15	13.66	2	25	22.85	4	22	19.99	4	25	22.57	3	26	23.44
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10	2	54	25.83	3	46	22.09	3	54	25.81	2	49	23.29	2	52	24.69
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	14.00	6	7	7.06	10	7	7.09	5	14	14.12	5	16	16.06	6	15	15.05
C25	胰臟癌	7	20	9.50	7	12	5.74	12	11	5.28	7	17	8.13	6	18	8.55	7	19	9.02
C16	胃癌	6	22	10.45	5	18	8.61	5	21	10.09	6	26	12.43	6	18	8.55	5	35	16.62
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	12	5.70	13	7	3.35	8	15	7.20	8	13	6.21	9	10	4.75	10	14	6.65
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	13	4	3.62	8	6	5.46	6	11	10.05	14	4	3.63	17	2	1.81	8	9	8.11
C00-C06, C09-C10,	口腔癌	12	8	3.80	14	5	2.39	13	10	4.80	11	9	4.30	13	8	3.80	11	11	5.22
	其他		67	31.82		75	35.88		94	45.15		89	42.54		93	44.20		96	45.58

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		380	180.60		386	183.73		414	198.07
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	73	34.69	1	82	39.03	1	73	34.92
C22	肝和肝內膽管癌	3	52	24.71	4	46	21.90	2	62	29.66
C50	女性乳房癌(1)	4	27	24.34	3	26	23.43	3	29	26.22
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	57	27.09	2	52	24.75	4	49	23.44
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	19	19.10	5	21	21.18	5	17	17.28
C25	胰臟癌	7	18	8.55	6	24	11.42	6	27	12.92
C16	胃癌	6	23	10.93	7	21	10.00	7	20	9.57
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	14	7	3.33	10	11	5.24	8	19	9.09
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	8	9	8.11	9	6	5.41	9	9	8.14
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	12	8	3.80	8	17	8.09	10	16	7.65
	其他		87	41.35		80	38.08		93	44.49

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		303	123.50		373	159.71		430	185.63		401	173.50		427	185.51
162	肺癌	1	65	26.49	1	71	30.40	1	81	34.97	1	84	36.34	1	103	44.75
155	肝癌	2	56	22.82	2	66	28.26	2	63	27.20	2	55	23.80	2	54	23.46
153 154	結腸直腸癌	3	30	12.23	3	41	17.56	5	51	22.02	3	50	21.63	3	48	20.85
174	女性乳癌(1)	6	8	6.62	7	9	7.62	3	28	23.80	4	21	17.81	4	24	20.35
185	攝護腺癌(2)	15	3	2.41	5	12	10.40	6	12	10.53	6	11	9.71	5	17	15.14
151	胃癌	4	25	10.19	4	29	12.42	4	52	22.45	5	38	16.44	6	30	13.03
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	10	4.08	6	19	8.14	7	24	10.36	10	14	6.06	7	21	9.12
156	膽囊癌	9	9	3.67	12	10	4.28	15	7	3.02	9	15	6.49	8	18	7.82
157	胰臟癌	7	10	4.08	9	15	6.42	8	17	7.34	7	18	7.79	9	16	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	8	3.26	10	12	5.14	9	14	6.04	7	18	7.79	10	12	5.21
	其他		79	32.20		89	38.11		81	34.97		77	33.31		84	36.49

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		397	173.88		437	192.88		424	188.25		441	195.29		455	200.32		447	195.95
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60	1	87	38.40	1	84	37.30	1	85	37.64	1	108	47.55	1	87	38.14
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02	2	67	29.57	3	43	19.09	4	54	23.91	3	55	24.21	4	43	18.85
C50	女性乳房癌(1)	4	23	19.59	4	25	21.39	4	22	18.87	2	38	32.44	5	23	19.50	3	29	24.46
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15	3	54	23.83	2	61	27.08	3	61	27.01	2	58	25.54	2	60	26.30
C25	胰臟癌	7	22	9.64	7	26	11.48	5	30	13.32	5	28	12.40	8	18	7.92	10	17	7.45
C16	胃癌	5	27	11.83	5	40	17.65	7	23	10.21	7	26	11.51	6	29	12.77	6	34	14.90
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	9.92	6	16	14.59	6	12	11.04	9	9	8.28	4	24	21.98	5	17	15.52
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	15	6.57	14	8	3.53	9	12	5.33	11	13	5.76	10	14	6.16	8	20	8.77
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	15	4	3.41	10	5	4.28	16	4	3.43	6	14	11.95	7	14	11.87	7	11	9.28
C91-C95	白血病	10	11	4.82	14	8	3.53	10	11	4.88	14	9	3.99	16	6	2.64	13	9	3.95
	其他		95	41.61		101	44.58		122	54.17		104	46.06		106	46.67		120	52.61

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		433	189.02		436	190.03		436	213.55
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	82	35.80	1	82	35.74	1	82	45.07
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	57	24.88	4	50	21.79	2	32	30.63
C50	女性乳房癌(1)	4	25	20.98	2	32	26.79	3	56	27.70
C22	肝和肝內膽管癌	3	54	23.57	3	56	24.41	4	50	19.69
C25	胰臟癌	8	20	8.73	6	22	9.59	5	26	14.00
C16	胃癌	5	32	13.97	5	26	11.33	6	22	13.13
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	10	9.10	9	8	7.27	7	18	9.14
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.67	11	13	5.67	8	9	8.75
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	13	6	5.04	10	8	6.70	9	8	8.39
C91-C95	白血病	12	12	5.24	13	11	4.79	10	8	8.31
	其他		122	53.26		128	55.79		125	54.70

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		410	122.97		527	168.49		501	160.39		495	158.06		473	150.37
162	肺癌	1	85	25.49	1	113	36.13	1	105	33.62	1	110	35.12	1	96	30.52
153 154	結腸直腸癌	4	45	13.50	2	77	24.62	3	64	20.49	3	58	18.52	2	66	20.98
155	肝癌	2	72	21.59	3	69	22.06	2	73	23.37	2	84	26.82	3	64	20.35
174	女性乳癌(1)	3	24	14.17	4	26	15.96	4	30	18.39	6	19	11.59	4	20	12.11
151	胃癌	5	34	10.20	6	39	12.47	5	46	14.73	4	42	13.41	5	37	11.76
185	攝護腺癌(2)	7	10	6.09	5	22	14.67	6	18	12.06	5	19	12.74	6	16	10.71
183	卵巢癌(1)	8	8	4.72	7	11	6.75	12	7	4.29	7	12	7.32	7	14	8.48
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	13	3.90	13	13	4.16	9	17	5.44	8	20	6.39	8	26	8.27
179 180	子宮頸癌(1)	6	11	6.50	8	10	6.14	8	9	5.52	10	8	4.88	9	12	7.27
156	膽囊癌	20	3	0.90	11	15	4.80	10	15	4.80	11	12	3.83	10	22	6.99
	其他		105	31.49		132	42.20		117	37.46		111	35.44		100	31.79

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		501	159.36		549	175.55		572	183.58		544	173.97		580	184.93		582	185.71
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40	1	116	37.09	1	119	38.19	1	107	34.22	1	116	36.99	1	124	39.57
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86	2	71	22.70	2	70	22.47	2	83	26.54	4	65	20.72	2	91	29.04
C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63	3	70	22.38	5	58	18.61	4	68	21.75	2	83	26.46	3	69	22.02
C50	女性乳房癌(1)	4	24	14.50	4	35	21.20	3	36	21.84	3	37	22.34	5	31	18.64	4	36	21.64
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	18	12.10	5	19	12.87	4	28	19.08	5	23	15.64	3	31	21.04	6	16	10.88
C16	胃癌	6	30	9.54	7	35	11.19	6	40	12.84	7	22	7.04	6	46	14.67	5	41	13.08
C25	胰臟癌	7	23	7.32	6	36	11.51	6	40	12.84	6	23	7.36	7	37	11.80	7	33	10.53
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45	9	18	5.76	8	32	10.27	9	18	5.76	8	19	6.06	10	17	5.42
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	12	3.82	10	15	4.80	10	14	4.49	13	9	2.88	11	14	4.46	14	9	2.87
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	11	6	3.62	12	7	4.24	14	6	3.64	11	7	4.23	9	9	5.41	8	11	6.61
	其他		126	40.08		127	40.61		129	41.40		147	47.01		129	41.13		135	43.08

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		593	189.14		565	180.29		616	197.26
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	122	38.91	1	126	40.21	1	134	42.91
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	78	24.88	4	68	21.70	2	80	25.62
C22	肝和肝內膽管癌	4	76	24.24	3	74	23.61	3	71	22.74
C50	女性乳房癌(1)	3	41	24.61	2	40	24.00	4	34	20.45
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	17	11.57	7	14	9.54	5	21	14.38
C16	胃癌	7	31	9.89	8	25	7.98	6	41	13.13
C25	胰臟癌	5	44	14.03	5	31	9.89	7	31	9.93
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	26	8.29	5	31	9.89	8	25	8.01
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	13	9	2.87	15	9	2.87	9	21	6.72
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	9	13	7.80	11	8	4.80	10	11	6.62
	其他		136	43.38		139	44.36		147	47.07

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		289	128.97		370	170.56		374	172.44		351	160.83		384	175.32
162	肺癌	1	50	22.31	1	70	32.27	1	80	36.89	1	62	28.41	1	84	38.35
155	肝癌	2	42	18.74	2	64	29.50	3	46	21.21	2	61	27.95	2	64	29.22
153 154	結腸直腸癌	4	37	16.51	4	45	20.74	2	56	25.82	3	43	19.70	3	41	18.72
151	胃癌	5	26	11.60	5	24	11.06	5	29	13.37	5	26	11.91	4	37	16.89
174	女性乳癌(1)	6	11	9.68	3	29	25.77	4	21	18.63	4	19	16.70	5	14	12.21
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	10	4.46	13	7	3.23	7	19	8.76	6	21	9.62	6	20	9.13
157	胰臟癌	11	9	4.02	6	19	8.76	9	14	6.45	7	16	7.33	7	18	8.22
150	食道癌	12	6	2.68	10	12	5.53	10	12	5.53	10	13	5.96	8	15	6.85
156	膽囊癌	12	6	2.68	10	12	5.53	12	7	3.23	12	10	4.58	9	14	6.39
185	攝護腺癌(2)	8	6	5.43	8	7	6.71	6	11	10.56	9	7	6.70	10	5	4.79
	其他		86	38.38		81	37.34		79	36.42		73	33.45		72	32.87

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		382	174.70		417	190.81		402	183.41		418	188.19		430	190.79		412	180.94
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47	1	85	38.89	1	85	38.78	1	84	37.82	1	85	37.71	1	91	39.96
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78	4	42	19.22	3	54	24.64	3	52	23.41	2	58	25.73	3	54	23.71
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35	2	62	28.37	2	63	28.74	2	68	30.61	3	54	23.96	2	59	25.91
C50	女性乳房癌(1)	5	14	12.19	3	25	21.70	4	26	22.44	4	23	19.54	4	22	18.38	4	18	14.86
C16	胃癌	4	33	15.09	6	26	11.90	6	20	9.12	7	24	10.81	7	21	9.32	6	26	11.42
C25	胰臟癌	8	14	6.40	5	30	13.73	7	14	6.39	6	25	11.26	6	22	9.76	8	19	8.34
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	10	6	5.22	8	10	8.68	9	7	6.04	12	5	4.25	12	6	5.01	10	7	5.78
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	12	5.49	9	14	6.41	12	11	5.02	8	21	9.45	8	16	7.10	7	21	9.22
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	11	5.03	11	11	5.03	10	12	5.47	10	12	5.40	9	15	6.66	9	15	6.59
C64	腎臟癌	18	4	1.83	12	9	4.12	18	3	1.37	18	4	1.80	17	5	2.22	11	9	3.95
	其他		103	47.10		103	47.13		107	48.82		100	45.02		126	55.91		93	40.84

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		427	185.96		424	183.61		486	210.12
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	78	33.97	1	84	36.38	1	101	43.67
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	60	26.13	2	69	29.88	2	68	29.40
C22	肝和肝內膽管癌	2	65	28.31	3	56	24.25	3	65	28.10
C50	女性乳房癌(1)	4	23	18.81	5	17	13.81	4	23	18.64
C16	胃癌	6	22	9.58	6	19	8.23	5	31	13.40
C25	胰臟癌	7	21	9.15	8	17	7.36	6	24	10.38
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	8	9	7.36	11	7	5.69	7	12	9.73
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	16	6.97	6	19	8.23	8	19	8.21
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	14	6.10	9	16	6.93	8	19	8.21
C64	腎臟癌	16	6	2.61	16	6	2.60	10	13	5.62
	其他		113	49.21		114	49.37		111	47.99

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		244	141.22		245	154.05		282	178.58		267	169.02		258	162.22
162	肺癌	1	48	27.78	1	53	33.32	1	53	33.56	1	57	36.08	1	64	40.24
153 154	結腸直腸癌	4	30	17.36	2	41	25.78	4	32	20.26	3	31	19.62	2	39	24.52
155	肝癌	2	41	23.73	3	34	21.38	3	34	21.53	2	41	25.95	3	32	20.12
179 180	子宮頸癌(1)	5	7	8.17	9	5	6.17	18	2	2.48	8	6	7.41	4	9	11.01
151	胃癌	3	34	19.68	4	21	13.20	5	25	15.83	5	20	12.66	5	12	7.55
200202203	非何杰金淋巴瘤	17	3	1.74	8	10	6.29	6	20	12.67	7	13	8.23	6	11	6.92
150	食道癌	11	6	3.47	12	6	3.77	10	9	5.70	12	6	3.80	6	11	6.92
157	胰臟癌	9	8	4.63	7	12	7.55	7	11	6.97	9	9	5.70	8	10	6.29
174	女性乳癌(1)	6	6	7.00	6	9	11.11	2	19	23.55	4	14	17.28	9	5	6.12
204-208	白血病	12	5	2.89	14	5	3.14	13	8	5.07	11	7	4.43	10	9	5.66
	其他		56	32.41		49	30.81		69	43.70		63	39.88		56	35.21

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		303	190.07		276	173.54		278	174.68		263	163.87		305	188.50		248	152.48
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64	1	57	35.84	1	64	40.22	1	56	34.89	1	62	38.32	1	51	31.36
C50	女性乳房癌(1)	4	16	19.48	4	15	18.27	4	14	17.01	4	15	18.04	5	11	13.10	3	19	22.46
C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70	3	31	19.49	2	41	25.76	3	32	19.94	3	45	27.81	4	30	18.44
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48	2	33	20.75	3	37	23.25	2	38	23.68	2	51	31.52	2	42	25.82
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	11.65	9	5	6.50	7	5	6.51	5	9	11.63	4	13	16.70	6	7	8.97
C16	胃癌	5	29	18.19	5	25	15.72	5	19	11.94	7	11	6.85	6	18	11.12	5	15	9.22
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	8	5.02	11	7	4.40	9	8	5.03	15	5	3.12	8	11	6.80	14	4	2.46
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	8	5.02	14	5	3.14	8	9	5.66	11	6	3.74	9	10	6.18	8	10	6.15
C25	胰臟癌	9	9	5.65	7	13	8.17	6	16	10.05	6	16	9.97	7	13	8.03	7	14	8.61
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	7	6	7.30	8	6	7.31	12	3	3.65	13	3	3.61	12	3	3.57	16	2	2.36
	其他		78	48.93		79	49.67		62	38.96		72	44.86		68	42.03		54	33.20

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		291	178.24		317	194.56		314	102.13
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	45	27.56	1	59	36.21	1	54	17.26
C50	女性乳房癌(1)	4	14	16.45	2	22	25.87	2	27	17.25
C22	肝和肝內膽管癌	2	43	26.34	4	40	24.55	3	43	14.12
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	42	25.73	3	42	25.78	4	42	12.70
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	14.07	5	11	14.12	8	10	4.13
C16	胃癌	7	21	12.86	7	19	11.66	6	16	5.38
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	8	4.90	12	7	4.30	5	15	5.66
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	10	6.13	9	8	4.91	7	15	4.89
C25	胰臟癌	5	24	14.70	6	21	12.89	9	13	4.04
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	8	8	9.40	8	8	9.41	10	5	3.49
	其他		65	39.81		80	49.10		74	45.84

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		230	168.33		205	158.94		228	178.60		273	215.19		259	204.70
162	肺癌	1	45	32.93	1	40	31.01	1	41	32.12	2	51	40.20	1	54	42.68
155	肝癌	2	39	28.54	1	40	31.01	3	34	26.63	1	57	44.93	2	40	31.61
153 154	結腸直腸癌	4	22	16.10	3	26	20.16	4	29	22.72	3	30	23.65	3	35	27.66
174	女性乳癌(1)	5	10	14.75	5	7	10.87	2	18	28.19	4	13	20.44	4	14	22.02
185	攝護腺癌(2)	12	3	4.36	13	3	4.64	10	4	6.27	7	6	9.48	5	10	15.89
179 180	子宮頸癌(1)	11	3	4.43	9	3	4.66	11	3	4.70	10	5	7.86	6	8	12.58
151	胃癌	3	30	21.96	4	15	11.63	5	14	10.97	8	12	9.46	7	14	11.06
157	胰臟癌	6	9	6.59	7	8	6.20	13	5	3.92	6	13	10.25	8	12	9.48
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	9	6.59	7	8	6.20	7	11	8.62	11	9	7.09	9	9	7.11
150	食道癌	9	8	5.86	14	3	2.33	6	14	10.97	9	11	8.67	10	8	6.32
	其他		52	38.06		52	40.32		55	43.08		66	52.02		55	43.47

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		267	212.93		255	205.60		255	205.65		244	194.24		288	225.49		282	218.07
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66	1	56	45.15	1	56	45.16	1	60	47.76	1	56	43.84	1	59	45.63
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	3	4.82	6	8	13.04	7	5	8.17	9	4	6.47	8	6	9.56	12	3	4.73
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91	3	29	23.38	3	35	28.23	3	26	20.70	2	48	37.58	3	33	25.52
C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47	2	36	29.03	2	47	37.90	2	36	28.66	3	39	30.53	2	53	40.99
C16	胃癌	5	14	11.17	5	21	16.93	6	14	11.29	5	16	12.74	5	16	12.53	5	14	10.83
C50	女性乳房癌(1)	4	16	25.32	4	11	17.55	4	9	14.33	4	12	18.81	4	11	16.93	4	9	13.65
C25	胰臟癌	15	5	3.99	8	12	9.68	9	7	5.65	7	10	7.96	6	14	10.96	5	14	10.83
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	8	6.38	7	15	12.09	9	7	5.65	6	14	11.14	6	14	10.96	7	11	8.51
C15	食道癌	6	9	7.18	11	7	5.64	5	15	12.10	12	5	3.98	9	10	7.83	8	9	6.96
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	14	3	4.75	14	2	3.19	12	3	4.78	8	5	7.84	13	3	4.62	14	3	4.55
	其他		66	52.64		58	46.76		57	45.97		56	44.58		71	55.59		74	57.22

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		236	180.99		300	229.09		270	206.90
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	57	43.71	2	48	36.65	1	66	50.57
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	6	9.41	7	8	12.50	2	17	26.67
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	37	28.37	1	51	38.95	3	33	25.29
C22	肝和肝內膽管癌	3	36	27.61	3	45	34.36	4	32	24.52
C16	胃癌	5	15	11.50	5	22	16.80	5	20	15.33
C50	女性乳房癌(1)	4	11	16.51	4	12	17.92	6	9	13.48
C25	胰臟癌	8	6	4.60	6	19	14.51	7	15	11.49
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	7	11	8.44	11	8	6.11	8	10	7.66
C15	食道癌	13	5	3.83	9	11	8.40	9	9	6.90
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮 癌(1)	12	3	4.50	12	4	5.97	10	4	5.99
	其他		49	37.58		72	54.98		55	42.15

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		270	125.11		414	208.19		431	219.79		427	219.19		458	236.48
155	肝癌	1	50	23.17	2	71	35.70	2	55	28.05	2	72	36.96	1	94	48.54
162	肺癌	2	48	22.24	1	75	37.72	1	88	44.88	1	84	43.12	2	84	43.37
153 154	結腸直腸癌	4	26	12.05	3	47	23.64	3	42	21.42	3	67	34.39	3	55	28.40
174	女性乳癌(1)	6	8	7.60	5	15	15.35	4	19	19.68	5	15	15.60	4	18	18.77
151	胃癌	3	42	19.46	4	36	18.10	5	37	18.87	4	32	16.43	5	35	18.07
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	9	4.17	12	13	6.54	13	10	5.10	11	10	5.13	6	24	12.39
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.52	8	10	9.89	7	12	12.05	6	14	14.19	7	9	9.21
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	12	5.56	7	20	10.06	6	27	13.77	8	22	11.29	8	16	8.26
150	食道癌	16	4	1.85	10	14	7.04	11	18	9.18	15	6	3.08	9	16	8.26
156	膽囊癌	10	6	2.78	15	7	3.52	9	22	11.22	17	5	2.57	10	15	7.74
	其他		60	27.80		106	53.30		101	51.51		100	51.33		92	47.50

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		394	205.83		419	221.23		446	236.27		426	224.24		448	233.65		464	240.35
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54	1	79	41.71	1	86	45.56	1	91	47.90	1	90	46.94	1	101	52.32
C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70	1	79	41.71	2	77	40.79	2	61	32.11	3	60	31.29	2	82	42.48
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08	3	57	30.10	3	50	26.49	3	52	27.37	2	64	33.38	3	59	30.56
C50	女性乳房癌(1)	7	9	9.47	6	15	15.90	4	24	25.41	4	24	25.15	5	14	14.50	4	23	23.63
C16	胃癌	4	25	13.06	4	35	18.48	5	38	20.13	5	34	17.90	4	33	17.21	5	27	13.99
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	10.37	5	16	16.83	13	4	4.24	6	16	16.92	8	10	10.50	7	13	13.58
C25	胰臟癌	5	20	10.45	8	17	8.98	8	21	11.12	7	17	8.95	7	22	11.47	8	17	8.81
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75	7	20	10.56	7	23	12.18	7	17	8.95	6	23	12.00	5	27	13.99
C15	食道癌	16	6	3.13	8	17	8.98	14	8	4.24	11	10	5.26	9	16	8.34	10	15	7.77
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	9	4.70	14	7	3.70	10	11	5.83	9	14	7.37	11	13	6.78	11	10	5.18
	其他		89	46.50		77	40.65		104	55.09		90	47.37		103	53.72		90	46.62

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		458	235.96		459	235.96		456	235.13
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	100	51.52	1	91	46.78	1	84	43.31
C22	肝和肝內膽管癌	2	65	33.49	2	65	33.41	2	63	32.48
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	60	30.91	2	65	33.41	3	57	29.39
C50	女性乳房癌(1)	4	25	25.49	4	29	29.45	4	26	26.43
C16	胃癌	6	29	14.94	6	26	13.37	5	34	17.53
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	16	16.66	5	15	15.62	6	12	12.56
C25	胰臟癌	8	20	10.30	9	17	8.74	7	23	11.86
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	28	14.43	7	21	10.80	8	20	10.31
C15	食道癌	9	15	7.73	8	19	9.77	9	15	7.73
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	14	7.21	10	14	7.20	10	13	6.70
	其他		86	44.31		97	49.86		109	56.20

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		274	121.59		406	157.81		384	148.55		411	157.96		411	157.15
162	肺癌	1	53	23.52	1	90	34.98	1	84	32.50	1	88	33.82	1	85	32.50
155	肝癌	2	51	22.63	2	63	24.49	3	43	16.63	3	45	17.30	2	53	20.26
153 154	結腸直腸癌	5	28	12.42	4	45	17.49	2	44	17.02	2	53	20.37	3	43	16.44
174	女性乳癌(1)	3	16	14.36	3	25	19.18	4	19	14.47	4	21	15.83	4	19	14.20
151	胃癌	4	29	12.87	6	24	9.33	5	36	13.93	5	34	13.07	5	33	12.62
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.39	5	12	9.45	6	14	11.01	6	16	12.55	6	13	10.18
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	8.08	9	8	6.14	10	7	5.33	12	6	4.52	7	11	8.22
157	胰臟癌	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	7	24	9.22	8	16	6.12
183	卵巢癌(1)	9	4	3.59	15	4	3.07	16	3	2.28	8	9	6.78	9	8	5.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	9	16	6.15	10	15	5.74
	其他		65	28.84		211	82.01		202	78.14		203	78.02		215	82.20

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		426	162.79		394	150.79		417	159.41		449	169.83		486	181.43		403	149.08
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83	1	82	31.38	1	95	36.32	1	104	39.34	1	96	35.84	1	69	25.52
C50	女性乳房癌(1)	3	28	20.87	4	19	14.15	3	27	20.03	4	27	19.79	4	26	18.79	6	17	12.16
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34	3	47	17.99	2	58	22.17	2	68	25.72	3	57	21.28	3	53	19.61
C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46	2	58	22.20	4	49	18.73	3	56	21.18	2	70	26.13	2	57	21.09
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	7.06	5	16	12.60	6	17	13.41	6	11	8.60	6	14	10.81	5	16	12.26
C16	胃癌	5	21	8.02	6	29	11.10	5	43	16.44	5	30	11.35	5	46	17.17	4	35	12.95
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	9	7	5.22	13	5	3.72	9	6	4.45	7	11	8.06	10	6	4.34	12	5	3.58
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	11	4.20	14	9	3.44	11	9	3.44	11	11	4.16	9	14	5.23	10	12	4.44
C25	胰臟癌	7	18	6.88	7	16	6.12	8	15	5.73	10	17	6.43	7	23	8.59	7	24	8.88
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	12	4.59	10	12	4.59	7	17	6.50	9	19	7.19	8	17	6.35	9	15	5.55
	其他		109	41.65		101	38.65		81	30.96		95	35.93		117	43.68		100	36.99

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		462	169.46		453	164.94		485	176.17
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	93	34.11	1	85	30.95	1	85	30.88
C50	女性乳房癌(1)	2	41	29.03	4	28	19.66	2	36	25.18
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	63	23.11	2	60	21.85	3	62	22.52
C22	肝和肝內膽管癌	3	69	25.31	3	56	20.39	4	50	18.16
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	7.61	5	23	17.40	5	20	15.12
C16	胃癌	5	33	12.10	6	32	11.65	6	30	10.90
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	15	4	2.83	8	12	8.42	7	15	10.49
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	17	6.24	9	18	6.55	8	27	9.81
C25	胰臟癌	7	19	6.97	10	16	5.83	8	27	9.81
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	13	4.77	12	10	3.64	10	20	7.26
	其他		100	36.68		113	41.14		113	41.05

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		139	123.11		193	170.72		186	164.58		206	182.05		195	171.83
162	肺癌	1	28	24.80	2	36	31.84	2	34	30.08	2	33	29.16	1	41	36.13
155	肝癌	2	23	20.37	1	37	32.73	1	39	34.51	1	38	33.58	2	30	26.43
153 154	結腸直腸癌	5	12	10.63	6	17	15.04	3	22	19.47	3	24	21.21	3	24	21.15
151	胃癌	3	16	14.17	4	19	16.81	6	12	10.62	4	19	16.79	4	15	13.22
174	女性乳癌(1)	4	6	10.80	3	10	17.73	4	9	15.96	5	8	14.14	5	7	12.30
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	6	5.31	15	4	3.54	9	6	5.31	7	8	7.07	6	11	9.69
185	攝護腺癌(2)	14	1	1.74	11	3	5.30	7	4	7.07	7	4	7.07	7	5	8.84
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	10	8.86	8	8	7.08	12	5	4.42	6	10	8.84	8	8	7.05
156	膽囊癌	10	4	3.54	8	8	7.08	9	6	5.31	11	5	4.42	8	8	7.05
179 180	子宮頸癌(1)	6	5	9.00	5	9	15.96	5	7	12.41	17	1	1.77	10	4	7.03
	其他		28	24.80		42	37.15		42	37.16		56	49.49		42	37.01

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		186	163.60		206	181.64		215	189.28		195	169.45		222	189.24		226	189.72
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66	1	52	45.85	1	51	44.90	1	44	38.24	1	48	40.92	1	43	36.10
C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87	3	22	19.40	2	37	32.57	2	30	26.07	2	36	30.69	2	32	26.86
C50	女性乳房癌(1)	2	14	24.46	4	8	13.97	3	15	26.05	4	10	17.09	3	18	30.12	3	13	21.38
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47	2	28	24.69	4	25	22.01	3	23	19.99	4	30	25.57	4	22	18.47
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	10	3	5.24	12	3	5.24	--	-	-	18	1	1.71	10	4	6.69	11	3	4.93
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	4	7.09	7	6	10.69	8	4	7.14	9	3	5.30	5	8	13.90	7	6	10.29
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	5	4.40	9	7	6.17	5	15	13.21	6	10	8.69	8	8	6.82	5	15	12.59
C15	食道癌	7	8	7.04	14	4	3.53	7	9	7.92	13	3	2.61	7	9	7.67	10	7	5.88
C67	膀胱癌	14	2	1.76	14	4	3.53	17	1	0.88	10	6	5.21	19	1	0.85	18	2	1.68
C91-C95	白血病	7	8	7.04	10	6	5.29	13	4	3.52	16	2	1.74	12	4	3.41	16	3	2.52
	其他		59	51.89		66	58.20		54	47.54		63	54.75		56	47.74		80	67.16

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		228	189.20		231	189.73		213	174.05
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	45	37.34	1	45	36.96	1	44	35.95
C22	肝和肝內膽管癌	2	36	29.87	2	33	27.10	2	35	28.60
C50	女性乳房癌(1)	5	10	16.23	4	10	16.05	3	15	23.97
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	24	19.92	3	30	24.64	4	29	23.70
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	7	7	11.36	21	1	1.61	5	6	9.59
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	4	10	16.98	10	3	5.05	6	4	6.69
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	7	5.81	7	8	6.57	7	6	4.90
C15	食道癌	9	7	5.81	8	7	5.75	7	6	4.90
C67	膀胱癌	21	2	1.66	18	2	1.64	7	6	4.90
C91-C95	白血病	12	5	4.15	13	5	4.11	7	6	4.90
	其他		75	62.24		87	71.46		56	45.76

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		198	88.79		314	120.54		306	117.01		357	135.62		373	140.72
162	肺癌	2	29	13.00	2	55	21.11	1	56	21.41	1	87	33.05	1	71	26.79
153 154	結腸直腸癌	4	19	8.52	3	41	15.74	3	41	15.68	4	33	12.54	2	52	19.62
155	肝癌	1	42	18.83	1	58	22.27	2	43	16.44	2	53	20.13	3	47	17.73
151	胃癌	3	25	11.21	6	19	7.29	7	24	9.18	4	33	12.54	4	33	12.45
174	女性乳癌(1)	5	8	7.20	4	13	9.80	4	15	11.22	3	19	14.08	5	16	11.74
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.79	5	12	9.39	6	12	9.39	9	7	5.46	6	15	11.65
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.79	9	13	4.99	15	5	1.91	10	10	3.80	7	16	6.04
183	卵巢癌(1)	8	3	2.70	15	4	3.01	10	6	4.49	11	5	3.70	8	8	5.87
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	6	2.69	10	11	4.22	9	12	4.59	8	16	6.08	9	15	5.66
157	胰臟癌	11	5	2.24	8	14	5.37	12	9	3.44	6	19	7.22	9	15	5.66
	其他		55	24.66		74	28.41		83	31.74		75	28.49		85	32.07

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		366	137.51		365	136.57		364	135.33		376	137.75		418	150.45		403	143.20
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55	1	74	27.69	1	77	28.63	1	85	31.14	1	71	25.55	1	89	31.62
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28	2	60	22.45	2	48	17.85	3	37	13.56	3	56	20.16	3	55	19.54
C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80	3	59	22.08	3	46	17.10	2	56	20.52	2	63	22.68	2	69	24.52
C50	女性乳房癌(1)	3	21	15.32	4	16	11.60	4	20	14.37	4	19	13.43	4	23	15.95	4	20	13.67
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	6.97	6	9	6.96	5	11	8.48	5	16	12.17	7	10	7.48	5	15	11.10
C16	胃癌	5	25	9.39	5	21	7.86	6	21	7.81	6	21	7.69	8	20	7.20	7	21	7.46
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	11	4.13	9	14	5.24	11	10	3.72	11	8	2.93	9	18	6.48	10	14	4.97
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	--	-	-	13	4	2.90	8	8	5.75	13	4	2.83	5	17	11.79	6	11	7.52
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	9	3.38	12	8	2.99	13	8	2.97	8	18	6.59	12	11	3.96	14	6	2.13
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	8	6	8	8	5.80	10	6	4.31	9	6	4.24	6	11	7.63	8	8	5.47
	其他		103	38.70		92	34.42		109	40.52		106	38.84		118	42.47		95	33.76

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		398	139.99		458	159.77		461	160.26
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	88	30.95	1	84	29.30	1	85	29.55
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	48	16.88	3	54	18.84	2	62	21.55
C22	肝和肝內膽管癌	3	46	16.18	2	63	21.98	3	61	21.21
C50	女性乳房癌(1)	4	19	12.84	4	26	17.41	4	24	16.00
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	13	9.54	7	10	7.28	5	14	10.17
C16	胃癌	5	28	9.85	5	30	10.47	6	24	8.34
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	17	5.98	8	18	6.28	6	24	8.34
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	10	6	4.05	20	2	1.34	8	12	8.00
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	16	5.63	11	16	5.58	9	21	7.30
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	10	6	4.05	13	6	4.02	10	10	6.67
	其他		111	39.04		149	51.98		124	43.11

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		322	107.80		476	164.67		456	158.15		489	169.80		533	185.31
162	肺癌	1	74	24.77	1	120	41.51	1	99	34.33	1	101	35.07	1	113	39.29
155	肝癌	2	62	20.76	2	66	22.83	2	67	23.24	2	83	28.82	2	83	28.86
174	女性乳癌(1)	5	10	6.67	4	26	17.74	6	13	8.87	3	28	19.09	3	29	19.75
153 154	結腸直腸癌	4	28	9.37	3	56	19.37	2	67	23.24	4	54	18.75	4	55	19.12
185	攝護腺癌(2)	7	7	4.70	6	15	10.53	4	18	12.69	6	15	10.62	5	16	11.36
151	胃癌	3	29	9.71	5	32	11.07	5	32	11.10	5	39	13.54	6	29	10.08
183	卵巢癌(1)	9	6	4.00	8	9	6.14	15	4	2.73	8	9	6.14	7	14	9.53
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	9	3.01	12	14	4.84	9	16	5.55	10	16	5.56	8	22	7.65
157	胰臟癌	10	11	3.68	11	15	5.19	7	22	7.63	12	15	5.21	9	21	7.30
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	6	2.01	7	24	8.30	9	16	5.55	7	19	6.60	10	19	6.61
	其他		80	26.78		99	34.25		102	35.38		110	38.20		132	45.89

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		475	165.76		482	169.15		483	169.95		546	191.04		498	172.93		600	207.38
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15	1	114	40.01	1	99	34.83	1	125	43.74	1	107	37.15	1	114	39.40
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82	2	86	30.18	2	71	24.98	2	74	25.89	2	71	24.65	3	70	24.19
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38	4	45	15.79	3	59	20.76	3	67	23.44	3	54	18.75	2	73	25.23
C50	女性乳房癌(1)	4	27	18.43	3	24	16.44	4	20	13.71	4	27	18.36	4	22	14.84	4	30	20.12
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	15	10.71	5	15	10.79	6	11	7.96	12	6	4.32	5	14	10.02	5	19	13.55
C16	胃癌	5	33	11.52	6	29	10.18	5	32	11.26	5	34	11.90	6	27	9.38	6	33	11.41
C25	胰臟癌	8	18	6.28	7	28	9.83	7	21	7.39	6	31	10.85	7	18	6.25	6	33	11.41
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	11	8	5.46	12	6	4.11	10	7	4.80	18	4	2.72	8	9	6.07	9	12	8.05
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93	8	14	4.91	9	17	5.98	7	20	7.00	12	13	4.51	8	31	10.71
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	9	6.14	9	7	4.80	10	7	4.80	11	7	4.76	17	5	3.37	12	11	7.38
	其他		112	39.08		114	40.01		139	48.91		151	52.83		158	54.86		174	60.14

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		537	185.11		509	175.17		566	194.96
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	125	43.09	1	105	36.14	1	134	46.16
C22	肝和肝內膽管癌	3	66	22.75	3	65	22.37	2	83	28.59
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	25.85	2	81	27.88	3	69	23.77
C50	女性乳房癌(1)	4	31	20.71	4	22	14.66	4	26	17.32
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	11	7.83	5	17	12.10	5	23	16.40
C16	胃癌	6	29	10.00	7	30	10.32	6	35	12.06
C25	胰臟癌	5	35	12.06	6	34	11.70	7	24	8.27
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	11	7	4.68	9	7	4.66	8	12	8.00
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	21	7.24	8	20	6.88	9	18	6.20
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	11	7	4.68	11	6	4.00	10	9	6.00
	其他		130	44.81		122	41.99		133	45.81

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		277	114.03		375	150.60		399	160.59		401	161.17		463	185.33
162	肺癌	2	52	21.41	1	81	32.53	1	78	31.39	1	92	36.98	1	106	42.43
155	肝癌	1	58	23.88	2	72	28.91	2	64	25.76	2	63	25.32	2	61	24.42
153 154	結腸直腸癌	5	18	7.41	3	42	16.87	3	52	20.93	3	46	18.49	3	59	23.62
174	女性乳癌(1)	3	19	15.73	5	13	10.30	5	16	12.67	6	12	9.47	4	19	14.89
151	胃癌	4	22	9.06	4	34	13.65	4	32	12.88	4	34	13.67	5	33	13.21
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.64	6	9	7.33	6	13	10.64	7	8	6.56	6	15	12.28
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	2.47	11	11	4.42	8	16	6.44	8	15	6.03	7	26	10.41
179 180	子宮頸癌(1)	6	8	6.62	7	8	6.34	9	8	6.34	5	13	10.25	8	9	7.05
157	胰臟癌	7	10	4.12	9	13	5.22	11	12	4.83	10	13	5.22	9	17	6.80
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.65	10	12	4.82	7	17	6.84	10	13	5.22	10	16	6.40
	其他		78	32.11		80	32.13		91	36.63		92	36.98		102	40.83

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		464	185.70		432	173.56		424	170.54		444	177.07		482	190.33		463	181.70
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82	1	84	33.75	1	97	39.01	1	92	36.69	1	97	38.30	1	95	37.28
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62	3	57	22.90	2	59	23.73	2	73	29.11	2	70	27.64	2	72	28.26
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81	2	59	23.70	5	45	18.10	4	55	21.93	3	61	24.09	3	54	21.19
C50	女性乳房癌(1)	4	20	15.62	4	28	21.92	3	28	21.90	3	29	22.46	5	17	13.03	4	24	18.27
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	11.49	5	14	11.56	4	23	19.04	7	8	6.58	6	14	11.40	5	15	12.15
C16	胃癌	6	27	10.81	6	27	10.85	6	23	9.25	5	29	11.57	4	44	17.37	7	21	8.24
C25	胰臟癌	8	19	7.60	8	17	6.83	8	17	6.84	6	17	6.78	7	21	8.29	8	18	7.06
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	12	6	4.69	12	6	4.70	12	5	3.91	12	5	3.87	10	7	5.37	11	7	5.33
C91-C95	白血病	14	9	3.60	13	10	4.02	15	6	2.41	15	7	2.79	11	12	4.74	9	16	6.28
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	19	7.60	11	13	5.22	10	14	5.63	11	10	3.99	11	12	4.74	10	15	5.89
	其他		127	50.83		117	47.01		107	43.04		119	47.46		127	50.15		126	49.45

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年		
		順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率	順位	死亡 人數	每十 萬口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		460	179.35		487	188.99		450	174.68
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	84	32.75	1	93	36.09	1	107	41.53
C22	肝和肝內膽管癌	3	58	22.61	2	68	26.39	2	62	24.07
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	65	25.34	3	64	24.84	3	54	20.96
C50	女性乳房癌(1)	4	22	16.62	4	24	18.02	4	20	15.01
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	14	11.28	6	15	12.05	5	13	10.46
C16	胃癌	6	30	11.70	7	26	10.09	6	24	9.32
C25	胰臟癌	5	32	12.48	5	32	12.42	7	21	8.15
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	10	8	6.04	12	5	3.75	8	10	7.50
C91-C95	白血病	15	7	2.73	16	6	2.33	9	15	5.82
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	13	5.07	9	14	5.43	10	14	5.43
	其他		127	49.52		140	54.33		110	42.70

伍、歷年主要癌症發生率

表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人／每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	247.37	216.08	34.38	28.83	38.69	35.97	34.08	29.37	26.82	22.51	16.02	12.04	12.32	11.68	4.68	4.05
85年	267.36	226.20	40.01	32.15	41.53	37.46	39.09	32.75	26.19	20.98	18.86	13.98	15.19	13.84	4.81	3.78
86年	266.91	220.52	37.80	29.26	44.42	39.08	36.72	30.44	26.25	20.38	21.40	15.83	12.86	11.45	5.70	4.54
87年	287.79	231.95	43.41	33.25	44.57	37.95	39.66	32.28	25.24	19.54	24.55	17.05	16.87	14.86	6.98	5.35
88年	306.62	268.49	43.38	36.36	46.89	42.54	42.84	38.20	24.29	20.45	29.10	23.72	18.40	16.97	6.95	5.66
89年	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90年	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91年	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92年	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93年	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94年	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95年	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26
96年	378.22	269.92	52.91	35.29	50.72	37.87	59.72	41.30	25.13	16.59	43.60	29.51	25.05	19.30	9.16	6.40
97年	419.14	290.36	57.04	37.19	53.42	38.00	70.42	48.07	26.67	16.95	55.16	34.93	28.80	21.56	9.99	6.85
98年	433.34	291.45	62.83	39.86	52.76	36.30	72.20	47.48	26.10	15.81	57.60	36.28	30.62	22.30	10.23	6.38
99年	456.61	303.85	61.07	38.75	54.41	37.43	80.47	53.22	26.61	15.61	58.37	36.42	28.59	20.26	9.82	6.30
100年	451.05	299.70	63.31	39.63	53.90	36.30	79.13	52.15	25.62	15.72	59.08	37.28	31.10	21.88	11.20	7.18
101年	459.72	298.65	61.77	37.67	52.36	34.50	83.56	53.18	24.66	14.53	57.65	35.21	30.89	21.68	10.97	6.89
102年	451.49	289.90	62.33	38.00	51.48	33.25	76.59	48.40	23.49	13.85	57.99	35.00	35.27	24.12	11.32	6.88
103年	450.13	284.34	61.75	37.69	49.63	31.14	82.04	51.02	23.15	13.21	52.25	31.00	32.26	21.93	11.35	6.95

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.48	6.53	5.97	6.05	9.14	8.38	9.67	7.64	2.57	2.08	5.89	5.38	2.80	2.48	4.16	3.54
85年	6.34	5.59	5.50	5.29	8.93	8.13	10.46	8.09	1.91	1.53	4.73	4.10	3.36	3.18	3.21	2.99
86年	8.55	7.30	4.47	4.32	9.24	8.22	10.09	8.20	3.31	2.49	5.24	4.64	3.46	3.16	3.39	2.88
87年	7.06	5.71	5.37	5.20	7.29	6.22	12.66	9.50	2.91	2.31	5.98	5.06	2.53	2.46	3.61	2.86
88年	9.39	8.39	5.04	4.86	8.94	8.06	13.52	11.32	2.67	2.19	3.89	3.34	3.67	3.68	4.89	4.26
89年	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90年	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91年	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92年	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93年	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94年	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95年	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69
96年	10.96	7.94	9.78	8.19	10.02	7.85	11.19	7.32	4.07	2.78	6.18	4.67	3.13	2.59	4.07	2.97
97年	12.75	9.08	9.13	7.31	8.81	7.04	13.06	8.79	3.86	2.54	7.55	5.34	3.78	3.51	4.48	3.04
98年	11.19	7.77	9.84	7.76	10.00	7.84	13.41	8.28	3.57	2.21	6.51	4.63	3.25	2.95	4.60	3.33
99年	12.59	8.33	12.83	9.34	9.82	7.59	13.15	8.02	4.75	3.15	9.43	6.48	4.59	3.50	5.54	3.49
100年	10.89	7.25	11.83	9.23	9.25	7.21	14.10	8.70	4.39	2.49	7.99	5.77	2.90	2.25	4.54	2.94
101年	12.37	8.03	11.20	8.01	9.96	7.35	12.91	7.80	4.59	2.75	10.43	7.03	3.73	3.17	3.97	2.60
102年	11.55	7.43	11.40	8.32	8.06	6.00	13.95	8.19	4.34	2.59	9.77	6.54	3.57	2.86	4.42	2.83
103年	14.20	9.03	10.65	7.25	9.34	6.89	13.20	7.60	5.71	3.24	11.65	7.80	3.16	2.49	4.17	2.70

表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	213.99	200.47	18.64	18.77	23.72	23.42	42.81	38.25	12.81	12.62	12.58	12.11	3.33	3.20	23.26	21.95
85年	249.83	225.27	19.40	18.26	28.26	27.09	47.28	40.79	15.28	14.93	14.66	13.20	3.67	3.49	26.58	24.20
86年	258.48	227.82	19.80	17.73	27.32	25.15	53.42	44.91	16.65	16.39	14.35	12.57	3.30	3.07	26.94	23.38
87年	282.48	240.29	21.06	18.80	31.62	27.55	55.26	45.34	16.12	14.77	12.39	10.47	3.34	2.97	24.48	20.76
88年	293.65	268.19	20.05	19.10	32.44	30.93	65.92	57.65	18.77	18.27	13.66	12.77	3.53	3.31	22.15	19.72
89年	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90年	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91年	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92年	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93年	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94年	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95年	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21
96年	328.84	236.19	32.11	22.18	48.16	33.66	92.48	66.76	19.53	13.51	14.06	9.49	5.62	3.78	12.06	8.53
97年	351.41	244.08	34.99	23.40	49.63	32.68	96.16	67.67	22.56	15.27	14.20	9.24	6.51	4.29	12.94	8.79
98年	396.37	269.25	43.95	28.41	54.34	35.37	109.65	76.05	21.68	13.79	15.29	9.64	8.54	5.54	14.11	9.59
99年	394.55	262.64	43.06	26.78	55.96	35.31	110.60	75.15	21.90	14.11	13.49	8.15	7.23	4.39	13.12	8.74
100年	408.04	269.40	41.47	25.97	60.89	37.26	113.70	76.63	23.13	14.31	15.06	9.29	9.89	6.18	13.53	9.05
101年	413.08	268.08	46.83	28.44	60.31	36.11	115.93	78.19	21.04	12.94	15.20	8.71	9.08	5.43	12.54	8.44
102年	418.53	266.57	46.69	27.57	58.07	33.93	121.15	80.63	21.27	12.16	13.82	8.11	9.17	5.18	10.88	6.94
103年	443.53	278.02	50.97	29.83	61.78	35.23	125.26	82.07	21.47	12.00	15.21	8.62	9.31	5.07	10.45	6.77

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎臟癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.20	6.62	2.88	3.04	1.89	1.99	4.24	4.19	4.32	4.50	2.88	2.27	2.05	2.09	3.11	3.03
85年	6.95	6.23	4.20	4.25	2.52	2.40	5.50	4.93	2.29	2.30	3.28	2.55	2.14	2.19	2.67	2.53
86年	7.60	6.52	2.53	2.68	2.30	2.04	6.60	5.96	2.46	2.17	3.61	3.02	1.84	1.92	4.22	3.86
87年	9.58	8.15	4.03	3.95	3.27	2.69	8.44	7.49	2.58	2.32	4.03	3.41	2.05	1.83	3.65	3.11
88年	9.54	8.62	3.00	3.06	2.10	2.08	6.76	6.17	2.18	2.16	3.23	2.73	2.25	2.13	5.41	5.18
89年	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90年	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91年	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92年	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93年	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94年	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95年	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67
96年	11.61	8.93	5.03	4.55	3.18	2.09	13.76	10.11	2.44	1.79	2.89	2.15	2.22	2.04	5.40	3.52
97年	12.35	9.00	5.25	4.19	3.85	2.48	16.79	11.52	3.55	2.64	3.40	2.60	2.96	2.61	5.18	3.21
98年	12.62	9.16	7.28	5.54	3.49	2.15	16.26	11.06	3.86	2.61	2.08	1.53	1.71	1.50	5.57	3.38
99年	13.79	9.96	6.19	4.66	4.20	2.58	19.76	13.57	3.83	2.44	3.02	2.13	2.51	2.17	4.65	2.88
100年	14.11	10.06	6.47	5.33	4.00	2.33	18.77	12.58	3.49	2.31	2.69	2.02	3.27	2.62	5.24	3.05
101年	11.89	8.56	7.49	5.79	3.75	2.21	19.81	13.16	3.82	2.48	2.52	1.80	2.52	1.94	4.76	2.73
102年	13.25	9.12	7.80	5.91	3.08	1.65	20.69	13.61	4.15	2.74	2.94	2.04	2.65	2.38	4.08	2.34
103年	15.21	10.91	8.67	6.37	3.55	1.90	24.38	15.79	4.27	2.71	3.34	2.37	2.27	1.70	5.19	2.79

陸、附錄

【附錄 1】105 年臺北市十大死因統計結果 慢性疾病囊括 7 項，癌症續居首席

105 年臺北市十大死因出爐，以慢性疾病囊括 7 項，每 100 人中約有 64 人死於慢性疾病，惡性腫瘤則續居首席，而十大死因排名順序與上(104)年相較，僅肺炎與腦血管疾病排名互換，高血壓性疾病退居 2 名。至於十大癌症死因仍以肺癌、大腸癌分別蟬聯首席與次席。

105 年臺北市民死亡人數為 1 萬 8,039 人，較上年增 5.1% (或增 879 人)，高於近 10 年平均年增率 2.7%；死亡率則為每十萬人口 668 人，較上年增 5.3%(或增 33.3 人)，近 10 年平均年增率 2.4%，死亡者平均年齡為 75.7 歲，較全國 72.5 歲為高。如依世界衛生組織(WHO)公布 2000 年世界標準人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 332.8 人，較上年增 2.2%(或增 7.2 人)，近 10 年則平均年降 0.9%，並低於全國標準化死亡率 439.4 人，在全國 22 縣市中僅高於連江縣，為死亡率第二低的縣市。

十大主要死因死亡人數占總死亡人數的 7 成 6，其中慢性疾病占 7 項(占 63.8%)，惡性腫瘤(占 28.9%)仍居首位，其餘依序為心臟疾病(占 14.6%)；肺炎(占 7.1%)；腦血管疾病(占 6.7%)；糖尿病(占 4.6%)；慢性下呼吸道疾病(占 3.5%)；腎炎、腎病症候群及腎病變(占 3.4%)；敗血症(占 2.9%)；事故傷害(占 2.5%)；高血壓性疾病(占 2.1%)。與 104 年相較，僅排名順序異動，其中肺炎與腦血管疾病排名互換，為第 3 名與第 4 名，敗血症與事故傷害均前進 1 名，分別是第 8 名與第 9 名，高血壓性疾病退後 2 名為第 10 名，其餘與上年相同。

105年臺北市十大主要死因標準化死亡率較上年增加者有8項，分別為肺炎(增11.5%)、敗血症(增8.0%)、心臟疾病(增7.5%)、腎炎、腎病症候群及腎病變(增5.2%)、糖尿病(增4.3%)、腦血管疾病(增3.5%)、惡性腫瘤(增2.1%)、慢性下呼吸道疾病(增1.1%)；減少者僅1項，高血壓性疾病(減15.8%)，而事故傷害持平。

依性別觀察，死亡人數、死亡率與標準化死亡率結果呈現男高於女，分別是女性的1.4倍、1.5倍與1.7倍。105年兩性死因前二名皆為惡性腫瘤及心臟疾病，而第三名男、女性則分別為肺炎、腦血管疾病，若與上年相較，僅排名順序異動，其中男性十大死因部分為腎病症候群及腎病變上升2名為第7名，而敗血症與事故傷害均退後1名，分別為第8名與第9名，其餘與上年相同；女性死因部分，則敗血症、血管及未明示之癡呆症均上升2名分別為第7、8名，骨骼肌肉系統及結締組織之疾病下滑1名為第9名，高血壓性疾病下滑3名為第10名。男、女性標準化死亡率分別較上年增2.5%及2.1%，其中增幅最顯著為男性腎炎、腎病症候群及腎病變增18.9%，女性敗血症增30.2%，而減幅最大之男、女性均為高血壓性疾病，分別減12.9%與27.5%。

依年齡層觀察，105年臺北市15-24歲青年死因前三名分別為事故傷害(占37.2%)、惡性腫瘤(占19.8%)及自殺(占15.1%)；25-44歲壯年則以惡性腫瘤(占30.9%)為首、自殺(占14.3%)及心臟疾病(占12.2%)次之；45-64歲中年仍以惡性腫瘤(占45.9%)居首、心臟疾病(占13.9%)及腦血管疾病(占4.5%)次之；65歲以上老年則以惡性腫瘤(占25.2%)、心臟疾病(占15.0%)及肺炎(占8.5%)分列前三名。

105年臺北市民因自殺死亡人數為308人，較上年減3.1%(或減10人)，其死亡人數依年齡層分以45-64歲最多占34.4%，65歲以上次之占32.8%；若依死亡方式區分，則以利用懸吊、絞勒及閉息死亡者占33.8%為大宗。105年自殺死亡率為每十萬人口11.4人，相較上年減3.0%，僅高於金門縣與連江縣為全國自殺死亡率第3低縣市，且自99年起已連續7年脫離WHO定義自殺高盛行率地區為之每十萬人口大於13人之範疇。

105 年臺北市民癌症死亡人數為 5,219 人，較上年增 194 人，平均每日死於癌症人數約有 14.3 位市民；死亡率為每十萬人口 193.3 人，死亡者平均年齡為 71.0 歲，較全國 68.6 歲高；若經標準化後之死亡率為 105.0 人，較上年增 2.1%，並低於全國標準化死亡率 126.8 人，在全國 22 縣市中僅略高於新竹縣、金門縣與連江縣，為死亡率排名第四低的縣市。

十大癌症死因仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為 2.結腸、直腸和肛門癌、3.肝和肝內膽管癌、4.女性乳房癌、5.前列腺(攝護腺)癌、6.胃癌、7.胰臟癌、8.口腔癌、9.卵巢癌、10.非何杰金氏淋巴瘤；與上年相較，卵巢癌前進 1 名為第 9 名，非何杰金氏淋巴瘤退後 1 名為第 10 名。其中十大癌症死因標準化死亡率較上年增加者有 5 項，增幅較多者為卵巢癌(增 32.4%)、口腔癌(增 11.9%)；減少者有 4 項，減幅較多者為胰臟癌(減 8.9%)、結腸、直腸和肛門癌(減 3.7%)；胃癌則持平。

依性別觀察，105 年臺北市男性十大癌症死因除前列腺(攝護腺)癌與口腔癌排名互換外，其餘死因及順位與上年相同；而男性標準化死亡率較上年增 0.6%，其中以食道癌減幅 13.6% 最顯著，增幅以口腔癌 8.5% 最多。105 年女性十大癌症死因排名變化，以女性乳房癌與結腸、直腸和肛門癌互換為第 2、3 名，胃癌和胰臟癌互換為第 5、6 名，非何杰金氏淋巴瘤、子宮頸及部位未明示子宮癌互換為第 8、9 名，而白血病前進 1 名再次回到第 10 名；而女性標準化死亡率較上年增 4.0%，其中以胰臟癌減幅 14.7% 最顯著，增幅以白血病增 80.0% 最多。

臺北市政府衛生局呼籲，癌症已分別蟬聯 35 年國人死因第 1 名與 45 年臺北市十大死因之首，平日培養「定期篩檢、正確飲食、規律運動、體重控制、戒菸及戒檳」的健康生活型態，可預防癌症的發生。臺北市政府透過「癌症防治便利網」之啟動，廣邀臺北市醫師公會、牙醫師公會及 NGO 團體等白色力量站出來，成為北市的「健康好站」，呼籲市民多加使用社區「健康好站」資源，藉由「厝邊醫生」提供綿密癌症防治網絡服務，降低癌症的發生，

讓市民「健康好讚」，相關資訊請參閱臺北市政府衛生局網頁(<https://health.gov.taipei/Default.aspx>)。

四項癌症篩檢資格一覽表

篩檢項目	篩檢資格
乳房 X 光攝影檢查	45-69 歲婦女、40-44 歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每 2 年 1 次
子宮頸抹片檢查	30 歲以上婦女，建議每 3 年進行 1 次
糞便潛血檢查	50 至未滿 75 歲民眾，每 2 年 1 次
口腔黏膜檢查	30 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每 2 年 1 次

資料來源：衛生福利部國民健康署

表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因

民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男性				女性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
1	所有死亡原因	18,039	668.0	100.0	所有死亡原因	10,369	802.3	100.0	所有死亡原因	7,670	544.8	100.0
	惡性腫瘤	5,219	193.3	28.9	惡性腫瘤	2,920	225.9	28.2	惡性腫瘤	2,299	163.3	30.0
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,631	97.4	14.6	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,580	122.2	15.2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,051	74.7	13.7
3	肺炎	1,274	47.2	7.1	肺炎	780	60.3	7.5	腦血管疾病	514	36.5	6.7
4	腦血管疾病	1,206	44.7	6.7	腦血管疾病	692	53.5	6.7	肺炎	494	35.1	6.4
5	糖尿病	829	30.7	4.6	慢性下呼吸道疾病	456	35.3	4.4	糖尿病	431	30.6	5.6
6	慢性下呼吸道疾病	626	23.2	3.5	糖尿病	398	30.8	3.8	腎炎、腎病症候群及腎病變	277	19.7	3.6
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	611	22.6	3.4	腎炎、腎病症候群及腎病變	334	25.8	3.2	敗血症	239	17.0	3.1
8	敗血症	529	19.6	2.9	事故傷害	304	23.5	2.9	血管性及未明示之癱瘓症	196	13.9	2.6
9	事故傷害	457	16.9	2.5	敗血症	290	22.4	2.8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	182	12.9	2.4
10	高血壓性疾病	386	14.3	2.1	高血壓性疾病	208	16.1	2.0	高血壓性疾病	178	12.6	2.3
	其他	4,271	158.2	23.7	其他	2,407	186.2	23.2	其他	1,809	128.5	23.6

資料來源：衛生福利部。

表2 ICD-10 臺北市10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	104年		105年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	325.6	所有死亡原因	332.8	2.2
1	惡性腫瘤	102.8	惡性腫瘤	105.0	2.1
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	42.6	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	45.8	7.5
3	腦血管疾病	20.1	肺炎	19.4	11.5
4	肺炎	17.4	腦血管疾病	20.8	3.5
5	糖尿病	13.9	糖尿病	14.5	4.3
6	慢性下呼吸道疾病	9.5	慢性下呼吸道疾病	9.6	1.1
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.2	5.2
8	高血壓性疾病	7.6	敗血症	8.1	8.0
9	敗血症	7.5	事故傷害	11.1	-
10	事故傷害	11.1	高血壓性疾病	6.4	-15.8

資料來源：衛生福利部。

表3 ICD-10 臺北市男性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	104年		105年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	414.3	所有死亡原因	424.6	2.5
1	惡性腫瘤	127.1	惡性腫瘤	127.8	0.6
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	57.0	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	63.3	11.1
3	肺炎	22.8	肺炎	26.1	14.5
4	腦血管疾病	26.1	腦血管疾病	27.2	4.2
5	慢性下呼吸道疾病	15.0	慢性下呼吸道疾病	15.3	2.0
6	糖尿病	16.9	糖尿病	15.9	-5.9
7	事故傷害	16.9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12.6	18.9
8	敗血症	10.1	事故傷害	16.4	-3.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.6	敗血症	9.6	-5.0
10	高血壓性疾病	9.3	高血壓性疾病	8.1	-12.9

資料來源：衛生福利部。

表4 ICD-10 臺北市女性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	104年		105年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	250.2	所有死亡原因	255.5	2.1
1	惡性腫瘤	82.6	惡性腫瘤	85.9	4.0
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	30.5	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	31.1	2.0
3	腦血管疾病	15.1	腦血管疾病	15.4	2.0
4	肺炎	12.6	肺炎	13.8	9.5
5	糖尿病	11.3	糖尿病	13.3	17.7
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.3	-6.7
7	高血壓性疾病	6.3	敗血症	6.9	30.2
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5.5	血管性及未明示之癡呆症	4.7	6.8
9	敗血症	5.3	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5.0	-9.1
10	血管性及未明示之癡呆症	4.4	高血壓性疾病	5.0	-27.5

資料來源：衛生福利部。

表5 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因

民國105年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計			男			女					
	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
	所有癌症死亡原因	5,219	193.3	100.0	所有癌症死亡原因	2,920	225.9	100.0	所有癌症死亡原因	2,299	163.3	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	1,070	39.6	20.5	氣管、支氣管和肺癌	626	48.4	21.4	氣管、支氣管和肺癌	444	31.5	19.3
2	結腸、直腸和肛門癌	675	25.0	12.9	肝和肝內膽管癌	430	33.3	14.7	女性乳癌	302	21.5	13.1
3	肝和肝內膽管癌	672	24.9	12.9	結腸、直腸和肛門癌	376	29.1	12.9	結腸、直腸和肛門癌	299	21.2	13.0
4	女性乳癌①	302	21.5	5.8	胃癌	197	15.2	6.7	肝和肝內膽管癌	242	17.2	10.5
5	前列腺(攝護腺)癌②	167	12.9	3.2	口腔癌	180	13.9	6.2	胃癌	114	8.1	5.0
6	胃癌	311	11.5	6.0	前列腺(攝護腺)癌	167	12.9	5.7	胰臟癌	113	8.0	4.9
7	胰臟癌	260	9.6	5.0	胰臟癌	147	11.4	5.0	卵巢癌	107	7.6	4.7
8	口腔癌	208	7.7	4.0	食道癌	108	8.4	3.7	非何杰金氏淋巴瘤	76	5.4	3.3
9	卵巢癌①	107	7.6	2.1	非何杰金氏淋巴瘤	98	7.6	3.4	子宮頸及部位未明示子宮癌	72	5.1	3.1
10	非何杰金氏淋巴瘤	174	6.4	3.3	膀胱癌	76	5.9	2.6	白血病	63	4.5	2.7
	其他	1,273	47.1	24.4	其他	515	39.8	17.6	其他	467	33.2	20.3

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表6 ICD-10 臺北市10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	104年		105年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死因	102.8	所有癌症死因	105.0	2.1
1	氣管、支氣管和肺癌	19.7	氣管、支氣管和肺癌	20.8	5.6
2	結腸、直腸和肛門癌	13.4	結腸、直腸和肛門癌	12.9	-3.7
3	肝和肝內膽管癌	14.0	肝和肝內膽管癌	13.6	-2.9
4	女性乳癌①	12.2	女性乳癌①	12.5	2.5
5	前列腺(攝護腺)癌②	6.0	前列腺(攝護腺)癌②	5.8	-3.3
6	胃癌	5.8	胃癌	5.8	0.0
7	胰臟癌	5.6	胰臟癌	5.1	-8.9
8	口腔癌	4.2	口腔癌	4.7	11.9
9	非何杰金氏淋巴瘤	3.1	卵巢癌①	4.5	32.4
10	卵巢癌①	3.4	非何杰金氏淋巴瘤	3.3	6.5

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表7 ICD-10 臺北市男性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	104年		105年		
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	127.1	所有癌症死亡原因	127.8	0.6
1	氣管、支氣管和肺癌	25.9	氣管、支氣管和肺癌	26.8	3.5
2	肝和肝內膽管癌	19.8	肝和肝內膽管癌	19.7	-0.5
3	結腸、直腸和肛門癌	15.6	結腸、直腸和肛門癌	16.0	2.6
4	胃癌	7.9	胃癌	8.0	1.3
5	前列腺(攝護腺)癌	6.0	口腔癌	8.9	8.5
6	口腔癌	8.2	前列腺(攝護腺)癌	5.8	-3.3
7	胰臟癌	6.5	胰臟癌	6.4	-1.5
8	食道癌	5.9	食道癌	5.1	-13.6
9	非何杰金氏淋巴瘤	3.9	非何杰金氏淋巴瘤	4.1	5.1
10	膀胱癌	3.1	膀胱癌	3.1	-

資料來源：衛生福利部。

表8 ICD-10 臺北市女性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	104年		105年		
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	82.6	所有癌症死亡原因	85.9	4.0
1	氣管、支氣管和肺癌	14.5	氣管、支氣管和肺癌	16.0	10.3
2	結腸、直腸和肛門癌	11.7	女性乳癌	12.5	2.5
3	女性乳癌	12.2	結腸、直腸和肛門癌	10.4	-11.1
4	肝和肝內膽管癌	8.6	肝和肝內膽管癌	8.5	-1.2
5	胰臟癌	4.8	胃癌	4.1	2.5
6	胃癌	4.0	胰臟癌	4.1	-14.6
7	卵巢癌	3.4	卵巢癌	4.5	32.4
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	2.7	非何杰金氏淋巴瘤	2.6	8.3
9	非何杰金氏淋巴瘤	2.4	子宮頸及部位未明示子宮癌	3.1	14.8
10	子宮體癌	1.8	白血病	2.7	80.0

資料來源：衛生福利部。

【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較

順位	臺北市 2016					新北市 2016					桃園市 2016				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有死亡原因	18,039	668.05	332.75	100.00	所有死亡原因	23,190	583.41	402.34	100.00	所有死亡原因	12,681	596.26	427.72	100.00
1	惡性腫瘤	5,219	193.28	105.00	28.93	惡性腫瘤	6,750	169.81	116.29	29.11	惡性腫瘤	3,231	151.92	113.54	25.48
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,631	97.44	45.78	14.59	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	3,135	78.87	52.83	13.52	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	1,548	72.79	50.66	12.21
3	肺炎	1,274	47.18	19.36	7.06	肺炎	1,610	40.50	25.79	6.94	腦血管疾病	1,024	48.15	33.10	8.08
4	腦血管疾病	1,206	44.66	20.76	6.69	腦血管疾病	1,513	38.06	25.58	6.52	肺炎	833	39.17	25.25	6.57
5	糖尿病	829	30.70	14.50	4.60	糖尿病	1,282	32.25	22.02	5.53	糖尿病	687	32.30	23.06	5.42
6	慢性下呼吸道疾病	626	23.18	9.64	3.47	慢性下呼吸道疾病	860	21.64	14.23	3.71	高血壓性 疾病	590	27.74	17.74	4.65
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	611	22.63	10.24	3.39	事故傷害	774	19.47	15.66	3.34	事故傷害	554	26.05	22.09	4.37
8	敗血症	529	19.59	8.15	2.93	腎炎、腎病症候群 及腎病變	657	16.53	11.09	2.83	慢性下呼吸 道疾病	471	22.15	14.41	3.71
9	事故傷害	457	16.92	11.14	2.53	蓄意自我傷害（自 殺）	614	15.45	12.20	2.65	慢性肝病及肝 硬化	339	15.94	11.98	2.67
10	高血壓性 疾病	386	14.29	6.37	2.14	慢性肝病及肝 硬化	566	14.24	9.91	2.44	敗血症	326	15.33	10.67	2.57
	其他	4,271	158.17	81.82	23.68	其他	5,429	136.58	96.74	23.41	其他	3,078	144.73	105.23	24.27
11	血管性及未明示之 癱瘓症	344	12.74	4.40	1.91	高血壓性 疾病	549	13.81	9.02	2.37	腎炎、腎病症候群 及腎病變	321	15.09	10.56	2.53
12	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	319	11.81	4.67	1.77	敗血症	463	11.65	7.88	2.00	蓄意自我傷害（自 殺）	303	14.25	11.85	2.39
13	蓄意自我傷害（自 殺）	308	11.41	8.38	1.71	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	357	8.98	5.68	1.54	衰老/老邁	165	7.76	4.31	1.30
14	慢性肝病及肝 硬化	279	10.33	5.97	1.55	血管性及未明示之 癱瘓症	311	7.82	4.76	1.34	血管性及未明示之 癱瘓症	111	5.22	2.99	0.88
15	帕金森病	206	7.63	3.29	1.14	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	186	4.68	3.10	0.80	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	105	4.94	3.56	0.83

資料來源：衛生福利部。

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較(續)

順位	臺中市 2016					臺南市 2016					高雄市 2016				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	16,892	612.95	434.80	100.00	所有死亡原因	15,241	808.20	461.43	100.00	所有死亡原因	21,331	767.54	478.15	100.00
1	惡性腫瘤	4,877	176.97	127.75	28.87	惡性腫瘤	4,352	230.78	137.93	28.55	惡性腫瘤	6,112	219.92	137.88	28.65
2	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	1,732	62.85	42.97	10.25	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	1,602	84.95	46.17	10.51	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	2,228	80.17	47.90	10.44
3	腦血管疾病	1,101	39.95	27.39	6.52	肺炎	1,237	65.60	31.46	8.12	肺炎	1,484	53.40	30.31	6.96
4	肺炎	1,072	38.90	25.19	6.35	腦血管疾病	1,057	56.05	30.23	6.94	腦血管疾病	1,312	47.21	28.26	6.15
5	糖尿病	1,047	37.99	26.47	6.20	糖尿病	1,035	54.88	30.06	6.79	糖尿病	1,268	45.63	27.22	5.94
6	事故傷害	802	29.10	23.59	4.75	事故傷害	749	39.72	30.29	4.91	事故傷害	891	32.06	23.94	4.18
7	慢性下呼吸道疾病	692	25.11	16.54	4.10	慢性下呼吸道疾病	537	28.48	13.63	3.52	高血壓性疾病	859	30.91	17.93	4.03
8	高血壓性疾病	668	24.24	15.94	3.95	高血壓性疾病	501	26.57	13.19	3.29	慢性下呼吸道疾病	756	27.20	15.47	3.54
9	腎炎、腎病症候群 及腎病變	535	19.41	13.38	3.17	腎炎、腎病症候群 及腎病變	487	25.82	13.91	3.20	腎炎、腎病症候群 及腎病變	612	22.02	12.89	2.87
10	慢性肝病及肝硬化	492	17.85	13.09	2.91	慢性肝病及肝硬化	401	21.26	13.13	2.63	慢性肝病及肝硬化	577	20.76	13.63	2.70
	其他	3,874	140.57	102.49	22.93	其他	3,283	174.09	101.43	21.54	其他	5,232	188.26	122.73	24.53
11	蓄意自我傷害(自 殺)	405	14.70	11.82	2.40	蓄意自我傷害(自 殺)	332	17.61	13.03	2.18	敗血症	529	19.03	10.98	2.48
12	敗血症	326	11.83	8.05	1.93	敗血症	249	13.20	6.86	1.63	蓄意自我傷害(自 殺)	452	16.26	12.42	2.12
13	衰老/老邁	172	6.24	3.61	1.02	衰老/老邁	199	10.55	4.65	1.31	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	171	6.15	3.70	0.80
14	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	149	5.41	3.88	0.88	血管性及未明示之 癡呆症	132	7.00	3.03	0.87	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	147	5.29	3.44	0.69
15	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	124	4.50	3.22	0.73	帕金森病	121	6.42	3.09	0.79	衰老/老邁	135	4.86	2.46	0.63

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較

順位	臺北市 2016					新北市 2016					桃園市 2016				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	惡性腫瘤	5,219	193.28	105.00	100.00	惡性腫瘤	6,750	169.81	116.29	100.00	惡性腫瘤	3,231	151.92	113.54	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	1,070	39.63	20.84	20.50	氣管、支氣管和肺癌	1,400	35.22	24.19	20.74	氣管、支氣管和肺癌	628	29.53	22.27	19.44
2	結腸、直腸和肛門癌	675	25.00	12.92	12.93	肝和肝內膽管癌	1,017	25.59	17.41	15.07	肝和肝內膽管癌	484	22.76	17.13	14.98
3	肝和肝內膽管癌	672	24.89	13.63	12.88	結腸、直腸和肛門癌	780	19.62	13.29	11.56	結腸、直腸和肛門癌	406	19.09	13.77	12.57
4	女性乳房癌(1)	302	21.45	12.52	5.79	女性乳房癌(1)	331	16.36	10.66	4.90	女性乳房癌(1)	164	15.41	11.20	5.08
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	167	12.92	5.76	3.20	口腔癌	391	9.84	6.46	5.79	前列腺(攝護腺)癌(2)	95	8.94	6.03	2.94
6	胃癌	311	11.52	5.83	5.96	胃癌	386	9.71	6.57	5.72	胃癌	179	8.42	5.98	5.54
7	胰臟癌	260	9.63	5.14	4.98	前列腺(攝護腺)癌(2)	181	9.27	6.73	2.68	口腔癌	166	7.81	5.75	5.14
8	口腔癌	208	7.70	4.65	3.99	胰臟癌	294	7.40	5.01	4.36	胰臟癌	128	6.02	4.50	3.96
9	卵巢癌(1)	107	7.60	4.52	2.05	卵巢癌(1)	126	6.23	4.15	1.87	食道癌	125	5.88	4.35	3.87
10	非何杰金氏淋巴瘤	174	6.44	3.29	3.33	食道癌	246	6.19	4.12	3.64	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	53	4.98	3.64	1.64
	其他	1,273	47.14	26.86	24.39	其他	1,598	40.20	28.29	23.67	其他	803	37.76	29.14	24.85
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	72	5.11	3.07	1.38	白血病	181	4.55	3.39	2.68	卵巢癌(1)	44	4.13	3.02	1.36
12	白血病	133	4.93	3.01	2.55	非何杰金氏淋巴瘤	169	4.25	2.90	2.50	非何杰金氏淋巴瘤	84	3.95	3.00	2.60
13	食道癌	123	4.56	2.68	2.36	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	79	3.90	2.56	1.17	白血病	84	3.95	3.22	2.60
14	膀胱癌	108	4.00	1.96	2.07	子宮體癌(1)	58	2.87	1.84	0.86	鼻咽癌	62	2.92	2.25	1.92
15	子宮體癌(1)	47	3.34	1.85	0.90	膀胱癌	111	2.79	1.82	1.64	膀胱癌	55	2.59	1.82	1.70

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較(續)

順位	臺中市 2016					臺南市 2016					高雄市 2016				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	惡性腫瘤	4,877	176.97	127.75	100.00	惡性腫瘤	4,352	230.78	137.93	100.00	惡性腫瘤	6,112	219.92	137.88	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	900	32.66	23.30	18.45	肝和肝內膽管癌	850	45.07	27.24	19.53	肝和肝內膽管癌	1,194	42.96	26.72	19.54
2	肝和肝內膽管癌	844	30.63	22.34	17.31	氣管、支氣管和肺癌	829	43.96	25.80	19.05	氣管、支氣管和肺癌	1,123	40.41	24.89	18.37
3	結腸、直腸和肛門癌	584	21.19	14.91	11.97	結腸、直腸和肛門癌	577	30.60	17.68	13.26	結腸、直腸和肛門癌	748	26.91	16.46	12.24
4	女性乳房癌(1)	273	19.58	13.50	5.60	女性乳房癌(1)	188	19.95	12.34	4.32	女性乳房癌(1)	294	21.01	13.09	4.81
5	口腔癌	320	11.61	8.42	6.56	前列腺(攝護腺)癌(2)	131	13.89	7.96	3.01	口腔癌	420	15.11	9.84	6.87
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	116	8.52	6.17	2.38	口腔癌	215	11.40	7.40	4.94	前列腺(攝護腺)癌(2)	178	12.90	7.91	2.91
7	胰臟癌	198	7.18	5.33	4.06	胃癌	171	9.07	5.00	3.93	胰臟癌	270	9.72	6.01	4.42
8	胃癌	193	7.00	4.89	3.96	胰臟癌	154	8.17	4.80	3.54	胃癌	263	9.46	5.74	4.30
9	食道癌	180	6.53	4.69	3.69	食道癌	152	8.06	5.14	3.49	食道癌	170	6.12	3.96	2.78
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	81	5.81	4.01	1.66	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	58	6.15	3.40	1.33	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	78	5.57	3.49	1.28
	其他	1,188	43.11	31.82	24.36	其他	1,027	54.46	33.21	23.60	其他	1,374	49.44	31.91	22.48
11	白血病	128	4.64	3.63	2.62	卵巢癌(1)	53	5.62	3.69	1.22	卵巢癌(1)	77	5.50	3.55	1.26
12	卵巢癌(1)	62	4.45	3.04	1.27	非何杰金氏淋巴瘤	106	5.62	3.25	2.44	白血病	125	4.50	3.12	2.05
13	非何杰金氏淋巴瘤	106	3.85	2.78	2.17	膀胱癌	98	5.20	2.88	2.25	非何杰金氏淋巴瘤	118	4.25	2.65	1.93
14	膀胱癌	92	3.34	2.31	1.89	白血病	83	4.40	2.87	1.91	膀胱癌	112	4.03	2.43	1.83
15	子宮體癌(1)	35	2.51	1.70	0.72	膽囊和其他膽道癌	63	3.34	1.92	1.45	鼻咽癌	92	3.31	2.24	1.51

【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

表1.臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2016				全國 2016				日本 2015(平成27年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	18,039	668.05	100.00	所有死亡原因	172,418	733.20	100.00	所有死亡原因	1,290,444	1029.72	100.00
1	惡性腫瘤	5,219	193.28	28.93	惡性腫瘤	47,760	203.10	27.70	惡性腫瘤	370,346	295.52	28.70
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,631	97.44	14.59	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	20,812	88.50	12.07	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	196,113	156.49	15.20
3	肺炎	1,274	47.18	7.06	肺炎	12,212	51.93	7.08	肺炎	120,953	96.52	9.37
4	腦血管疾病	1,206	44.66	6.69	腦血管疾病	11,846	50.37	6.87	腦血管疾病	111,973	89.35	8.68
5	糖尿病	829	30.70	4.60	糖尿病	9,960	42.35	5.78	老邁	84,810	67.68	6.57
6	慢性下呼吸道疾病	626	23.18	3.47	事故傷害	7,206	30.64	4.18	事故傷害	38,306	30.57	2.97
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	611	22.63	3.39	慢性下呼吸道疾病	6,787	28.86	3.94	腎衰竭	24,560	19.60	1.90
8	敗血症	529	19.59	2.93	高血壓性疾病	5,881	25.01	3.41	自殺	23,152	18.47	1.79
9	事故傷害	457	16.92	2.53	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,226	22.22	3.03	主動脈瘤及剝離	16,887	13.48	1.31
10	高血壓性疾病	386	14.29	2.14	慢性肝病及肝硬化	4,738	20.15	2.75	慢性阻塞性肺病	15,756	12.57	1.22
	其他	4,271	158.17	23.68	其他	39,990	170.05	23.19	其他	287,588	229.48	22.29
11	血管性及未明示之癱瘓症	344	12.74	1.91	敗血症	3,787	16.10	2.20	肝臟疾病	15,659	12.50	1.21
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	319	11.81	1.77	蓄意自我傷害（自殺）	3,765	16.01	2.18	糖尿病	13,327	10.63	1.03
13	蓄意自我傷害（自殺）	308	11.41	1.71	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,715	7.29	0.99	敗血症	11,357	9.06	0.88
14	慢性肝病及肝硬化	279	10.33	1.55	血管性及未明示之癱瘓症	1,622	6.90	0.94	原位及良性腫瘤	11,318	9.03	0.88
15	帕金森病	206	7.63	1.14	衰老/老邁	1,549	6.59	0.90	血管性及未明示之癱瘓症	11,118	8.87	0.86

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2016				全國 2016				日本 2015(平成27年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	106	381.50	100.00	所有死亡原因	811	390.66	100.00	所有死亡原因	1,916	190.52	100.00
1	源於周產期的特定病況(1)	56	201.55	52.83	先天性畸形、變形及染色體異常	166	79.96	20.47	先天性畸形變形及染色體異常	715	71.10	37.32
2	先天性畸形變形及染色體異常	25	89.98	23.58	源於周產期的呼吸性疾患	117	56.36	14.43	源於周產期的特定病況	487	48.43	25.42
3	嬰兒猝死症候群（SIDS）	4	14.40	3.77	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	56	26.97	6.91	源於周產期的呼吸和心臟血管疾患	248	24.66	12.94
4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.20	1.89	事故傷害	46	22.16	5.67	嬰兒猝死症候群（SIDS）	96	9.55	5.01
5	惡性腫瘤	2	7.20	1.89	特發於周產期的感染	42	20.23	5.18	胎兒及新生兒出血及血液疾患	83	8.25	4.33
6	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	3.60	0.94	嬰兒猝死症候群（SIDS）	32	15.41	3.95	事故傷害	81	8.05	4.23
7	事故傷害	1	3.60	0.94	胎兒及新生兒出血及血液疾患	26	12.52	3.21	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	50	4.97	2.61
8	肺炎	1	3.60	0.94	肺炎	17	8.19	2.10	妊娠期間及胎兒生長有關的疾患	39	3.88	2.04
9	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	3.60	0.94	心臟疾病（高血壓性心臟病除外）	16	7.71	1.97	特發於周產期的感染	33	3.28	1.72
10	腦膜炎	1	3.60	0.94	腦之其他疾患	13	6.26	1.60	肺炎	24	2.39	1.25
	其他	12	43.19	11.32	其他	280	134.87	34.53	其他	60	5.97	3.13

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

附註：(1)源於周產期的特定病況包含胎兒及新生兒受母體因素和妊娠、產程[臨產]及分娩併發症的影響、妊娠期長短和胎兒生長有關的疾患、生產創傷、特發於周產期的呼吸和心臟血管疾患、特發於周產期的感染(症)、胎兒及新生兒出血和血液疾患、特發於胎兒及新生兒的短暫性內分泌和(新陳)代謝(性)疾患、胎兒和新生兒消化系統疾患、侵及(侵犯、涉及)胎兒及新生兒體被[被膜、皮膚]和體溫調節的病況。

表3. 少年（1-14歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2016				全國 2016				日本 2015(平成27年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	47	13.47	100.00	所有死亡原因	443	14.94	100.00	所有死亡原因	1,698	11.44	100.00
1	惡性腫瘤	8	2.29	17.02	事故傷害	103	3.47	23.25	惡性腫瘤	275	1.85	16.20
2	肺炎	6	1.72	12.77	惡性腫瘤	77	2.60	17.38	事故傷害	270	1.82	15.90
3	事故傷害	5	1.43	10.64	先天性畸形變形及 染色體異常	32	1.08	7.22	先天性畸形變形及 染色體異常	220	1.48	12.96
4	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	4	1.15	8.51	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	19	0.64	4.29	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	94	0.63	5.54
5	流行性感冒	3	0.86	6.38	流行性感冒	19	0.64	4.29	自殺	90	0.61	5.30
6	加害（他殺）	2	0.57	4.26	加害（他殺）	16	0.54	3.61	肺炎	86	0.58	5.06
7	皮膚及皮下組織疾 病	1	0.29	2.13	肺炎	14	0.47	3.16	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	60	0.40	3.53
8	先天性畸形變形及 染色體異常	1	0.29	2.13	腦血管疾病	9	0.30	2.03	敗血症	44	0.30	2.59
9	胃及十二指腸潰瘍	1	0.29	2.13	敗血症	6	0.20	1.35	他殺	29	0.20	1.71
10	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	1	0.29	2.13	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	6	0.20	1.35	腦血管疾病	27	0.18	1.59
	其他	15	4.30	31.91	其他	142	4.79	32.06	其他	503	3.39	29.62

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2016				全國 2016				日本 2015(平成27年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	86	29.34	100.00	所有死亡原因	1,231	40.05	100.00	所有死亡原因	3,321	28.00	100.00
1	事故傷害	32	10.92	37.21	事故傷害	563	18.32	45.74	自殺	1,499	12.64	45.14
2	惡性腫瘤	17	5.80	19.77	蓄意自我傷害（自殺）	209	6.80	16.98	事故傷害	653	5.51	19.66
3	蓄意自我傷害（自殺）	13	4.43	15.12	惡性腫瘤	124	4.03	10.07	惡性腫瘤	323	2.72	9.73
4	腦血管疾病	3	1.02	3.49	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	57	1.85	4.63	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	134	1.13	4.03
5	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	2	0.68	2.33	腦血管疾病	19	0.62	1.54	腦血管疾病	41	0.35	1.23
6	先天性畸形變形及 染色體異常	2	0.68	2.33	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	17	0.55	1.38	先天性畸形變形及 染色體異常	37	0.31	1.11
7	加害（他殺）	1	0.34	1.16	加害（他殺）	15	0.49	1.22	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	35	0.30	1.05
8	帕金森病	1	0.34	1.16	先天性畸形變形及 染色體異常	13	0.42	1.06	肺炎	35	0.30	1.05
9	肺炎	1	0.34	1.16	肺炎	12	0.39	0.97	敗血症	17	0.14	0.51
10	敗血症	1	0.34	1.16	人類免疫缺乏病毒 （HIV）疾病	7	0.23	0.57	他殺	15	0.13	0.45
	其他	13	4.43	15.12	其他	195	6.35	15.84	其他	532	4.49	16.02

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2016				全國 2016				日本 2015(平成27年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	614	75.72	100.00	所有死亡原因	8,849	121.71	100.00	所有死亡原因	21,337	67.95	100.00
1	惡性腫瘤	190	23.43	30.94	惡性腫瘤	2,202	30.29	24.88	自殺	6,189	19.71	29.01
2	蓄意自我傷害（自殺）	88	10.85	14.33	事故傷害	1,317	18.11	14.88	惡性腫瘤	5,109	16.27	23.94
3	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	75	9.25	12.21	蓄意自我傷害（自殺）	1,173	16.13	13.26	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,040	6.50	9.56
4	事故傷害	56	6.91	9.12	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	791	10.88	8.94	事故傷害	1,746	5.56	8.18
5	腦血管疾病	36	4.44	5.86	慢性肝病及肝硬化	655	9.01	7.40	腦血管疾病	1,309	4.17	6.13
6	慢性肝病及肝硬化	15	1.85	2.44	腦血管疾病	344	4.73	3.89	肝臟疾病	580	1.85	2.72
7	肺炎	12	1.48	1.95	糖尿病	206	2.83	2.33	肺炎	283	0.90	1.33
8	糖尿病	11	1.36	1.79	肺炎	166	2.28	1.88	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	192	0.61	0.90
9	高血壓性 疾病	8	0.99	1.30	高血壓性 疾病	122	1.68	1.38	主動脈瘤及剝離	178	0.57	0.83
10	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	7	0.86	1.14	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	115	1.58	1.30	糖尿病	167	0.53	0.78
	其他	116	14.31	18.89	其他	1,758	24.18	19.87	其他	3,544	11.29	16.61

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2016				全國 2016				日本 2015(平成27年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	3,255	401.44	100.00	所有死亡原因	38,828	555.88	100.00	所有死亡原因	114,209	351.00	100.00
1	惡性腫瘤	1,495	184.38	45.93	惡性腫瘤	16,132	230.95	41.55	惡性腫瘤	50,731	155.91	44.42
2	心臟疾病(高血壓 性 疾病除外)	453	55.87	13.92	心臟疾病(高血壓 性 疾病除外)	4,073	58.31	10.49	心臟疾病(高血 壓 性 疾病除外)	14,129	43.42	12.37
3	腦血管疾病	145	17.88	4.45	慢性肝病及肝硬化	2,131	30.51	5.49	腦血管疾病	8,684	26.69	7.60
4	慢性肝病及肝硬化	113	13.94	3.47	事故傷害	2,105	30.14	5.42	自殺	7,602	23.36	6.66
5	糖尿病	109	13.44	3.35	腦血管疾病	2,050	29.35	5.28	事故傷害	4,483	13.78	3.93
6	事故傷害	107	13.20	3.29	糖尿病	1,833	26.24	4.72	肺炎	2,812	8.64	2.46
7	蓄意自我傷害(自 殺)	106	13.07	3.26	蓄意自我傷害(自 殺)	1,401	20.06	3.61	主動脈瘤及剝離	1,579	4.85	1.38
8	腎炎、腎病症候群 及腎病變	70	8.63	2.15	肺炎	1,006	14.40	2.59	糖尿病	1,392	4.28	1.22
9	肺炎	69	8.51	2.12	高血壓性 疾 病	867	12.41	2.23	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除 外)	939	2.89	0.82
10	高血壓性 疾 病	57	7.03	1.75	腎炎、腎病症候群 及腎病變	777	11.12	2.00	腎衰竭	917	2.82	0.80
	其他	531	65.49	16.31	其他	6,453	92.38	16.62	其他	20,941	64.36	18.34

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表7.老年人口(65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2016				全國 2016				日本 2015(平成27年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	13,931	3,404.81	100.00	所有死亡原因	122,256	4,045.07	100.00	所有死亡原因	1,147,508	3,401.60	100.00
1	惡性腫瘤	3,507	857.13	25.17	惡性腫瘤	29,220	966.80	23.90	惡性腫瘤	313,867	930.41	27.35
2	心臟疾病(高血壓 性 疾病除外)	2,096	512.27	15.05	心臟疾病(高血壓 性 疾病除外)	15,856	524.63	12.97	心臟疾病(高血 壓 性 疾病除外)	179,635	532.50	15.65
3	肺炎	1,185	289.62	8.51	肺炎	10,997	363.86	9.00	肺炎	117,707	348.92	10.26
4	腦血管疾病	1,022	249.78	7.34	腦血管疾病	9,422	311.74	7.71	腦血管疾病	101,892	302.04	8.88
5	糖尿病	709	173.28	5.09	糖尿病	7,917	261.95	6.48	老邁	84,791	251.35	7.39
6	慢性下呼吸道疾病	587	143.47	4.21	慢性下呼吸道疾病	6,300	208.45	5.15	事故傷害	31,029	91.98	2.70
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	536	131.00	3.85	高血壓性 疾 病	4,892	161.86	4.00	腎衰竭	23,572	69.88	2.05
8	敗血症	475	116.09	3.41	腎炎、腎病症候群 及腎病變	4,373	144.69	3.58	慢性阻塞性肺病	15,340	45.47	1.34
9	血管性及未明示之 癱瘓症	343	83.83	2.46	敗血症	3,129	103.53	2.56	主動脈瘤及剝離	15,117	44.81	1.32
10	高血壓性 疾 病	321	78.45	2.30	事故傷害	3,072	101.64	2.51	糖尿病	11,758	34.85	1.02
	其他	3,150	769.88	22.61	其他	27,078	895.93	22.15	其他	252,800	749.38	22.03

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標

表1.臺北市行政區別衛生統計指標—人口統計

中華民國105年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km ²	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km ²	9,918	22,430	20,327	27,418	16,901	21,086	22,894	21,863	8,735	5,609	9,112	4,649	4,529
年底人口數	總計		2,695,704	208,326	227,823	311,506	231,247	160,403	130,071	193,539	275,231	122,516	287,733	289,939	257,370
	男性	人	1,289,510	97,953	108,923	145,617	107,850	76,610	63,469	95,212	132,153	59,907	137,619	140,011	124,186
	女性		1,406,194	110,373	118,900	165,889	123,397	83,793	66,602	98,327	143,078	62,609	150,114	149,928	133,184
	性比例		91.70	88.75	91.61	87.78	87.40	91.43	95.30	96.83	92.36	95.68	91.68	93.39	93.24
人口變動	出生數	人	27,992	1,970	2,417	2,876	2,446	1,608	1,444	2,089	2,807	1,465	3,193	3,019	2,658
	死亡數	人	17,982	1,334	1,642	2,047	1,522	1,109	950	1,785	1,791	775	1,482	1,848	1,697
	粗出生率	‰	10.37	9.42	10.58	9.21	10.58	9.96	11.07	10.77	10.20	11.97	11.10	10.40	10.32
	粗死亡率	‰	6.66	6.38	7.19	6.55	6.58	6.87	7.28	9.20	6.51	6.33	5.15	6.37	6.59
	人口增加率	‰	-3.37	-6.62	-6.06	-4.96	-0.45	-12.75	-6.55	-4.12	-0.49	2.22	0.58	-2.60	-1.91
	自然增加率	‰	3.71	3.04	3.39	2.65	3.99	3.09	3.79	1.57	3.69	5.64	5.95	4.03	3.73
	社會增加率	‰	-7.08	-9.68	-9.47	-7.62	-4.44	-15.93	-10.36	-5.69	-4.18	-3.42	-5.37	-6.63	-5.64
生育率	一般生育率		41	38	42	38	41	40	44	44	39	45	42	42	40
	總生育率		1,310	1,270	1,300	1,270	1,300	1,285	1,365	1,360	1,305	1,400	1,340	1,315	1,280
	15-19歲		2	1	3	1	1	0	2	2	2	3	2	2	3
	20-24歲		12	8	10	7	15	8	17	18	14	13	13	13	12
	24-29歲	‰	56	48	55	46	57	57	61	63	54	68	56	55	60
	30-34歲		110	114	105	111	103	110	113	110	112	111	109	113	108
	35-39歲		68	69	71	74	67	70	65	66	66	69	74	66	62
	40-44歲		13	13	15	14	16	11	14	12	13	15	13	13	11
45-49歲		1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
人口組成 (年底)	14歲以下 (a)		375,128	31,333	28,658	47,306	29,214	25,951	17,659	22,469	39,480	16,840	42,345	38,064	35,809
	15-64歲 (b)	人	1,901,446	141,425	160,799	206,982	164,686	108,042	91,694	137,348	197,201	89,030	214,031	206,225	183,983
	65歲以上 (c)		419,130	35,568	38,366	57,218	37,347	26,410	20,718	33,722	38,550	16,646	31,357	45,650	37,578
人口組成結 構比(年底)	14歲以下		13.92	15.04	12.58	15.19	12.63	16.18	13.58	11.61	14.34	13.75	14.72	13.13	13.91
	15-64歲	%	70.54	67.89	70.58	66.45	71.22	67.36	70.50	70.97	71.65	72.67	74.39	71.13	71.49
	65歲以上		15.55	17.07	16.84	18.37	16.15	16.46	15.93	17.42	14.01	13.59	10.90	15.74	14.60
	扶養比(a+c)/b	%	41.77	47.30	41.68	50.50	40.42	48.46	41.85	40.91	39.57	37.61	34.44	40.59	39.89
老化指數c/a		111.73	113.52	133.88	120.95	127.84	101.77	117.32	150.08	97.64	98.85	74.05	119.93	104.94	

表2.臺北市行政區別衛生統計指標—醫療資源

中華民國105年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家	36	5	2	5	4	3	1	4	2	-	3	1	6
	診所		3,490	297	291	797	454	275	165	188	193	84	242	305	199
	護產機構		129	16	8	19	19	9	7	6	9	4	9	12	11
	精神復建機構		50	3	1	4	11	5	3	2	4	1	3	5	8
	其他醫療及醫事機構		238	22	24	38	38	18	13	12	13	7	26	17	10
	非醫事機構		1,005	70	89	86	96	94	61	78	86	50	94	107	94
	藥商		11,969	1,138	1,147	1,825	2,005	1,098	846	579	472	374	1,171	779	535
病床數	總計	床	25,076	1,862	1,626	3,475	2,201	3,689	667	635	1,009	492	2,511	1,552	5,357
	醫院病床		19,951	1,301	1,360	2,018	1,299	3,256	443	439	861	411	2,167	1,291	5,105
	一般急性病床		13,850	745	916	1,462	825	2,248	314	169	592	281	1,574	876	3,848
	一般慢性病床		619	103	133	-	20	-	-	79	-	-	-	-	284
	特殊病床		5,482	453	311	556	454	1,008	129	191	269	130	593	415	973
診所病床	5,125	561	266	1,457	902	433	224	196	148	81	344	261	252		
醫事人力 (醫療及醫事機構)	總計	人	52,287	3,825	3,370	7,272	5,437	7,950	1,406	1,495	2,663	1,103	4,734	3,831	9,201
	醫師		13,422	972	917	2,144	1,414	2,058	363	425	729	238	1,146	1,002	2,014
	西醫師		9,446	567	572	1,369	974	1,662	206	249	491	151	829	667	1,709
	中醫師		878	80	79	155	123	83	63	53	53	20	44	64	61
	牙醫師		3,098	325	266	620	317	313	94	123	185	67	273	271	244
	藥事人員		5,615	519	450	757	743	620	254	279	302	170	518	416	587
	護產人員		26,291	1,832	1,567	3,268	2,591	4,265	556	601	1,294	551	2,433	1,902	5,431
醫檢人員	3,465	232	159	517	313	684	100	61	132	71	332	181	683		
其他	3,494	270	277	586	376	323	133	129	206	73	305	330	486		
平均 每萬人 醫療資源	醫院	家	0.13	0.24	0.09	0.16	0.17	0.19	0.08	0.21	0.07	0.00	0.10	0.03	0.23
	診所	家	12.95	14.26	12.77	25.59	19.63	17.14	12.69	9.71	7.01	6.86	8.41	10.52	7.73
	病床數	床	93.02	89.38	71.37	111.55	95.18	229.98	51.28	32.81	36.66	40.16	87.27	53.53	208.14
	醫事人員數	人	193.96	183.61	147.92	233.45	235.12	495.63	108.09	77.25	96.76	90.03	164.53	132.13	357.50
	醫師	人	49.79	46.66	40.25	68.83	61.15	128.30	27.91	21.96	26.49	19.43	39.83	34.56	78.25
	西醫師	人	35.04	27.22	25.11	43.95	42.12	103.61	15.84	12.87	17.84	12.32	28.81	23.00	66.40
	中醫師	人	3.26	3.84	3.47	4.98	5.32	5.17	4.84	2.74	1.93	1.63	1.53	2.21	2.37
	牙醫師	人	11.49	15.60	11.68	19.90	13.71	19.51	7.23	6.36	6.72	5.47	9.49	9.35	9.48
	藥事人員	人	20.83	24.91	19.75	24.30	32.13	38.65	19.53	14.42	10.97	13.88	18.00	14.35	22.81
	護產人員	人	97.53	87.94	68.78	104.91	112.04	265.89	42.75	31.05	47.02	44.97	84.56	65.60	211.02
醫檢人員	人	12.85	11.14	6.98	16.60	13.54	42.64	7.69	3.15	4.80	5.80	11.54	6.24	26.54	
其他	人	12.96	12.96	12.16	18.81	16.26	20.14	10.23	6.67	7.48	5.96	10.60	11.38	18.88	

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計

中華民國105年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	肺炎		3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
	腦血管疾病		4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4
	糖尿病		5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5
	慢性下呼吸道疾病		6	7	8	7	8	6	6	7	5	6	8	6	6
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		7	8	6	6	7	7	6	6	7	8	10	7	7
	敗血症		8	6	7	8	6	8	9	9	8	7	6	9	11
	事故傷害		9	9	12	9	9	9	8	10	10	9	7	8	10
	高血壓性 疾病		10	11	9	12	11	12	10	8	9	14	11	10	9
十大死因 死亡率	所有死亡原因	人/每十 萬人口	668.05	649.22	715.48	669.27	660.19	673.94	737.93	898.74	657.10	637.36	518.34	641.02	657.96
	惡性腫瘤		193.28	198.07	213.55	197.26	210.12	194.50	206.90	235.13	176.17	174.05	160.26	194.96	174.68
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		97.44	87.55	98.02	103.43	95.12	93.53	114.94	142.83	102.80	99.69	69.53	81.29	101.70
	肺炎		47.18	51.67	54.70	40.99	51.45	41.50	52.11	70.64	48.31	44.94	28.51	42.71	49.69
	腦血管疾病		44.66	44.49	39.38	38.43	38.91	48.93	55.17	66.52	46.49	44.94	39.63	38.23	48.52
	糖尿病		30.70	26.31	31.51	28.82	29.40	33.45	32.95	49.50	26.52	28.60	23.99	31.00	32.61
	慢性下呼吸道疾病		23.18	20.57	23.63	18.89	16.86	24.78	22.99	34.03	26.88	26.97	15.30	25.83	26.78
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		22.63	17.22	26.26	24.98	18.59	22.30	22.99	35.06	24.34	20.43	13.56	23.42	23.68
	敗血症		19.59	24.88	24.94	16.01	19.46	19.82	19.92	20.11	21.43	25.33	18.43	16.53	14.36
	事故傷害		16.92	16.74	12.25	15.05	16.43	18.58	20.69	19.08	17.44	19.61	16.34	19.98	14.75
高血壓性 疾病	14.29	12.92	16.63	11.21	14.27	11.15	16.09	21.66	18.89	6.54	10.78	13.78	15.92		

表3.臺北市行政區別衛生統計指標—ICD-10死因統計(續1)

中華民國105年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世 界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	332.75	294.60	333.55	275.35	318.27	307.29	393.81	413.96	338.63	373.37	345.19	324.26	352.36
	惡性腫瘤		105.00	103.45	109.72	91.83	110.82	102.13	111.16	117.14	99.56	107.15	109.90	105.59	100.96
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)		45.78	38.28	44.76	37.90	43.09	37.73	59.19	62.50	49.25	55.93	45.98	38.26	52.30
	肺炎		19.36	17.81	21.82	12.73	21.68	14.43	25.44	27.55	20.79	22.80	16.12	18.10	21.07
	腦血管疾病		20.76	18.64	17.52	14.57	16.02	19.99	27.93	28.18	22.26	24.21	26.16	18.62	24.26
	糖尿病		14.50	9.98	13.81	11.05	12.97	14.41	16.85	21.90	13.65	16.50	16.59	14.37	16.28
	慢性下呼吸道疾病		9.64	7.57	8.83	6.29	7.03	9.15	10.29	14.30	12.17	13.81	8.75	10.76	11.38
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		10.24	6.87	11.10	8.92	8.27	8.62	10.70	15.06	12.55	11.47	9.20	10.08	11.31
	敗血症		8.15	8.71	8.98	5.12	8.72	7.48	9.16	8.49	9.22	12.11	11.05	7.13	6.44
	事故傷害		11.14	12.31	8.44	8.34	9.16	14.16	13.33	11.76	10.89	13.60	11.84	13.41	10.93
	高血壓性疾病		6.37	4.48	7.06	3.57	6.77	5.51	7.66	9.51	8.85	3.06	6.47	5.79	8.02
	十大死因 標準化 死亡率 區排名		所有死亡原因	區排名		11	7	12	9	10	2	1	6	3	5
惡性腫瘤		8	5		12	3	9	2	1	11	6	4	7	10	
心臟疾病(高血 壓性疾病除外)		9	7		11	8	12	2	1	5	3	6	10	4	
肺炎		9	4		12	5	11	2	1	7	3	10	8	6	
腦血管疾病		8	10		12	11	7	2	1	6	5	3	9	4	
糖尿病		12	8		11	10	6	2	1	9	4	3	7	5	
慢性下呼吸道疾病		10	8		12	11	7	6	1	3	2	9	5	4	
腎炎、腎病症候 群及腎病變		12	5		9	11	10	6	1	2	3	8	7	4	
敗血症		7	5		12	6	9	4	8	3	1	2	10	11	
事故傷害		5	11		12	10	1	4	7	9	2	6	3	8	
高血壓性疾病		10	5		11	6	9	4	1	2	12	7	8	3	

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續2完)

中華民國105年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	全部	人/每十 萬人口	668.05	649.22	715.48	669.27	660.19	673.94	737.93	898.74	657.10	637.36	518.34	641.02	657.96
	0歲		388.34	262.74	467.99	353.05	254.29	249.07	872.09	390.72	180.57	425.53	479.92	311.58	570.78
	1-4歲		17.17	21.74	9.84	-	9.64	13.10	-	23.09	40.62	-	22.21	47.68	-
	5-14歲		11.47	-	24.52	16.41	6.06	5.90	39.48	25.32	12.20	10.64	3.89	8.82	4.61
	15-24歲		29.34	49.78	16.76	18.49	8.73	29.60	59.52	35.79	27.61	65.94	19.80	25.11	35.11
	25-44歲		75.72	56.41	70.75	65.98	69.82	62.61	93.19	102.80	75.40	98.77	92.27	65.93	68.39
	45-64歲		401.44	339.16	408.23	337.98	388.17	362.78	483.07	568.34	417.15	477.39	365.95	382.13	402.07
	65歲以上		3,404.81	3,152.21	3,425.14	3,033.77	3,262.32	3,387.48	3,531.88	4,015.29	3,661.14	3,432.10	3,481.67	3,247.49	3,574.36
年齡別 死亡率 區排名	全部	區排名		9	3	5	6	4	2	1	8	11	12	10	7
	0歲			9	4	7	10	11	1	6	12	5	3	8	2
	1-4歲			5	7	9	8	6	9	3	2	9	4	1	9
	5-14歲			12	3	4	8	9	1	2	5	6	11	7	10
	15-24歲			3	11	10	12	6	2	4	7	1	9	8	5
	25-44歲			12	6	9	7	11	3	1	5	2	4	10	8
	45-64歲			11	5	12	7	10	2	1	4	3	9	8	6
	65歲以上			11	7	12	9	8	4	1	2	6	5	10	3

【附錄 5】主要名詞解釋與公式

本死因統計摘要係依據世界衛生組織所公告之「國際疾病與死因分類標準第十版 (ICD-10)」加註死因碼，所統計之死因為原死因 (Underlying causes of death)。

一、原 (肇始) 死因

死亡證明書上所填之死因係指所有導致死亡或與死亡相關的疾病、罹病狀況、或是造成這些傷害的意外或暴力環境等。

原死因係指(a)可引起一連串病症而導致直接死亡之疾病或傷害；(b)造成致命傷害之事故或暴力之環境。

二、孕產婦死亡

孕產婦死亡係指在懷孕期間或懷孕終止後 42 天內之婦女死亡，而不論其懷孕期長短或懷孕的位置為何；或任何與懷孕有關或因懷孕而加重之原因所導致之死亡。但不包括因事故或偶發原因所致之死亡。

孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數 * 100,000。

三、嬰兒死亡

嬰兒死亡係指嬰兒出生後未滿一歲之死亡數。

嬰兒死亡率 = 嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數 * 1,000。

四、新生兒死亡

新生兒死亡係指係指嬰兒出生後，在未滿四週（28天）內之死亡數。

新生兒死亡率 = 新生兒死亡數 / 活產嬰兒數 * 1,000。

五、年齡別死亡率

年齡別死亡率 = 年齡別死亡數 / 該年齡別年中人口數 * 100,000。

六、標準化死亡率

標準化死亡率是將兩國或兩地不同性別、年齡、城鄉、所得、職業、婚姻、種族等項組合，化成為同一的基礎，用以剔除其人口在組合上之差異，俾可受到純正而客觀的比較。本書刊所用的標準化死亡率是指去除年齡組成影響、以 WHO 2000 年世界人口結構為基準的死亡率。

標準化死亡率 = $\left[\sum (\text{年齡別死亡率} * \text{標準組年齡別人口數}) \right] / \text{標準組總人口數}$ 。