

# 目 錄

## 壹、提要分析

## 貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別.....	1
表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C·臺北市歷年各年齡組年中人口數.....	3
表D·臺北市歷年各年齡組年中人口數—男性.....	4
表E·臺北市歷年各年齡組年中人口數—女性.....	5
表F·臺北市歷年各行政區年底人口數.....	6
表G·臺北市各行政區年齡別年底人口數.....	7
表H·臺北市歷年各行政區年中人口數.....	8
表I·臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	9

## 參、98年死因統計

### 一、主要死因統計

表 1·臺北市、全國、高雄市主要死亡原因比較.....	11
表 2·ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3·ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

# 目 錄

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因.....	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因.....	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因.....	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因.....	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因.....	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因.....	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因.....	23
表14 · ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因.....	24
表15 · ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因.....	25
表16 · ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因.....	26
表17 · ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因.....	27
表18 · ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因.....	28
表19 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因.....	29
表20 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因.....	30
表21 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式.....	31
表22 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式.....	32
表23 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式.....	33
表24 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因.....	34
表25 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況.....	35
表26 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	36
表27 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	37

# 目 錄

## 二、行政區別死因統計

表28-1~28-12·ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	39
表29-1~29-12·ICD-10 臺北市十二區事故傷害死亡原因.....	51
表30-1~30-12·ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	63
表31-1~31-12·ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	75

## 肆、歷年死因統計

### 一、主要死因統計

表32·臺北市歷年主要死亡原因.....	87
表33·臺北市歷年男性主要死亡原因.....	90
表34·臺北市歷年女性主要死亡原因.....	93
表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	96
表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	97
表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因.....	98
表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因.....	100
表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因.....	102
表40·臺北市歷年自殺死亡方式.....	104
表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	106
表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	108
表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	110
表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	112
表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	114

# 目 錄


表46·臺北市歷年主要癌症死亡原因 .....	116
表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因 .....	119
表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因 .....	122
表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	125
表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	127
表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	129
<b>二、行政區別死因統計</b>	
表52-1~52-12·臺北市十二區歷年主要死亡原因 .....	131
表53-1~53-12·臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因 .....	167
<b>伍、歷年主要癌症發生率</b>	
表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	203
表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	205
<b>陸、附錄</b>	
【附錄1】平均每2小時27分鐘，臺北市就有1人死於心血管疾病.....	207
【附錄2】臺北市男性壯年人口糖尿病死亡率較十年前成長4成5.....	211
【附錄3】98年臺北市十大死因統計結果出爐，惡性腫瘤、肺癌仍分列十大死因及癌症首位.....	215
【附錄4】ICD-10 臺北市、全國、高雄市及日本主要死亡原因比較.....	221
【附錄5】98年臺北市行政區別衛生統計指標.....	228

# 98 年臺北市主要死因提要說明

## 一、標準化死亡率較上年減少 5.2%，較 89 年則減少 19.0%

98 年臺北市市民死亡人數 1 萬 4,870 人，平均每 35 分 35 秒就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 568.6 人，分別較上(97)年減少 7.1 人、1.2%；如依世界衛生組織(WHO)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 347.3 人，較上年減少 5.2%，較 89 年亦減少 19.0%。若與全國相較，98 年臺北市標準化死亡率較全國低 25.6%，並在全國 25 縣市中，僅高於金門縣、連江縣，為死亡率第三低的縣市。

依近 10 年資料觀察，剔除人口結構因素影響後臺北市市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則逐年增加，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。(詳圖 1)



## 二、臺北市市民十大死因惡性腫瘤蟬連 37 年榜首


98 年臺北市市民十大死因中惡性腫瘤仍蟬居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、敗血症、高血壓性疾病及事故傷害；十大死因之死亡人數占總死亡人數 75.8%，其中仍以惡性腫瘤占 30.7% 最多，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 11.9% 次之，腦血管疾病占 7.6% 居三。(詳表 1、圖 2)

表 1 ICD-10 98 年臺北市十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	14,870	100.0
1	惡性腫瘤	4,563	30.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,768	11.9
3	腦血管疾病	1,128	7.6
4	肺炎	840	5.6
5	糖尿病	825	5.5
6	慢性下呼吸道疾病	496	3.3
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	451	3.0
8	敗血症	441	3.0
9	高血壓性疾病	385	2.6
10	事故傷害	377	2.5
	其他	3,596	24.2

人/每十萬人口

圖2. ICD-10 98年臺北市十大死因死亡率及標準化死亡率



### 三、死亡年齡平均數較 89 年增加 4.4 歲

98 年臺北市民死亡年齡平均數為 73.0 歲，較全國高 3.4 歲，與 89 年比較則增加 4.4 歲，其中男性死亡年齡平均數為 72.1 歲，女性為 74.4 歲，男性較女性低 2.3 歲；十大死因中死亡年齡平均數以肺炎 82.2 歲最高，慢性下呼吸道疾病 81.8 歲次之，最低為事故傷害 58.3 歲。

若以死亡年齡中位數來看，98 年臺北市民死亡年齡中位數為 77 歲，較全國高 3 歲，與 89 年比較則增加 4 歲，其中男性死亡年齡中位數為 77 歲，女性為 78 歲，男性較女性低 1 歲；十大死因中死亡年齡中位數以肺炎 84 歲最高，慢性下呼吸道疾

病 83 歲次之，最低為事故傷害 60 歲。(詳表 2)

表 2 ICD-10 98 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

單位：歲

死因別	所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性除除外)	腦血管疾病	肺炎	糖尿病	慢性下呼吸道疾病	腎炎、腎病變、腎病徵候群及腎病變	敗血症	高血壓性疾病	事故傷害	
												死亡年齡平均數
死亡年齡平均數	兩性	73.0	69.5	74.5	76.6	82.2	75.0	81.8	78.2	78.1	78.7	58.3
	男性	72.1	70.3	72.1	75.6	81.1	73.1	81.2	77.9	77.4	76.4	56.1
	女性	74.4	68.4	78.5	78.0	84.2	76.9	83.8	78.6	79.0	81.4	63.1
死亡年齡中位數	兩性	77	72	78	80	84	77	83	80	81	81	60
	男性	77	73	76	79	83	76	82	81	80	79	58
	女性	78	71	82	81	86	78	86	80	83	73	72


### 四、臺北市男性十大死因與上年同，惟順位上略有變動

98 年臺北市男性死亡人數為 8,782 人，死亡率為每十萬男性人口 693.8 人，較上年減少 1.7%；標準化死亡率為每十萬男性人口 425.2 人，較上年減少 5.3%，較 89 年亦減少 16.3%。

98 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性除除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、事故傷害、腎炎、腎病徵候群及腎病變、蓄意自我傷害(自殺)、敗血症；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 76.6%，其中仍以惡性腫瘤占 30.4% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性除除外)占 12.5%。(詳表 3、圖 3)

表 3 ICD-10 98 年臺北市男性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	8,782	100.0
1	惡性腫瘤	2,671	30.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,101	12.5
3	腦血管疾病	647	7.4
4	肺炎	528	6.0
5	糖尿病	423	4.8
6	慢性下呼吸道疾病	377	4.3
7	事故傷害	260	3.0
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	249	2.8
9	蓄意自我傷害(自殺)	234	2.7
10	敗血症	233	2.7
	其他	2,059	23.4




五、臺北市女性十大死因慢性下呼吸道疾病首度進入為第 10 名

98 年臺北市女性死亡人數為 6,088 人，死亡率為每十萬女性人口 451.1 人，較上年減少 0.5%；標準化死亡率為每十萬女性人口 276.9 人，較上年減少 4.9%，較 89 年亦減少 20.4%。

98 年女性十大死因之首亦為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、敗血症、腎炎、腎病症候群及腎病變、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病，自殺則退為第 13 名外；女性十大死因死亡人數占女性總死亡人數 76.5%，其中亦以惡性腫瘤占 31.1% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 11.0%。(詳表 4、圖 4)

表 4 ICD-10 98 年臺北市女性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	6,088	100.0
1	惡性腫瘤	1,892	31.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	667	11.0
3	腦血管疾病	481	7.9
4	糖尿病	402	6.6
5	肺炎	312	5.1
6	敗血症	208	3.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	202	3.3
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	198	3.3
9	高血壓性疾病	179	2.9
10	慢性下呼吸道疾病	119	2.0
	其他	1,428	23.5



#### 六、嬰兒(未滿1歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占3成6

98年臺北市未滿1歲嬰兒死亡人數為69人，死亡率為每十萬人口355.6人，分別較上年減少26人、22.5%。男嬰死亡率為每十萬人口340.1人，較上年減少28.5%；女嬰死亡率為372.1人，亦較上年減少15.6%。嬰兒主要死因前3項分別為(1)源於周產期的特定病況25人占36.2%，(2)先天性畸形變形及染色體異常20人占29.0%，(3)嬰兒猝死症候群(SIDS)5人占7.3%，3者合占嬰兒死亡人數的72.5%。

#### 七、少年(1-14歲)惡性腫瘤居首位死因，占3成1

98年臺北市1-14歲少年死亡人數為45人，死亡率為每十萬人口11.8人，分別較上年減少19人、27.2%。少年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤14人占31.1%，(2)事故傷害5人占11.1%，(3)心臟疾病(高血壓性疾病除外)4人占8.9%，3者合占少年死亡人數的51.1%。

#### 八、青年(15-24歲)事故傷害仍居死因首位，占3成6

98年臺北市15-24歲青年死亡人數為101人，死亡率為每十萬人口31.8人，分別較上年減少5人、2.4%。青年主要死因前3項分別為(1)事故傷害36人占35.6%，(2)蓄意自我傷害(自殺)20人占19.8%，(3)惡性腫瘤14人占13.9%，3者合占青年死亡人數的69.3%。

#### 九、壯年(25-44歲)死因之前二位仍為惡性腫瘤、自殺

98年臺北市25-44歲壯年死亡人數為703人，死亡率為每十萬人口86.2人，分別較上年減少95人、10.5%。壯年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤217人占30.9%，(2)蓄意自我傷害(自殺)106人占15.1%，(3)心臟疾病(高血壓性疾病除外)72人占10.2%，3者合占壯年死亡人數的56.2%。

#### 十、中年(45-64歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占4成5

98年臺北市45-64歲中年死亡人數為2,863人，死亡率為每十萬人口378.8人，與上年比較，死亡人數雖增加11人，但

死亡率減少 1.9%。中年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,298 人占 45.3%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)321 人占 11.2%，(3)腦血管疾病 165 人占 5.8%，3 者合占中年死亡人數的 62.3%。

#### 十一、老年(65-79 歲)死亡率以惡性腫瘤為首，占 3 成 6

98 年臺北市 65-79 歲老年死亡人數為 4,529 人，占總死亡人數的 30.5%，死亡率為每十萬人口 1,897.6 人，較上年減少 3.6%。65-79 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,624 人占 35.9%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)543 人占 12.0%，(3)腦血管疾病 345 人占 7.6%，3 者合占 65-79 歲老年死亡人數的 55.5%。


#### 十二、老年(80 歲以上)死亡率亦以惡性腫瘤為首，占 2 成 1

98 年臺北市 80 歲以上老年死亡人數為 6,560 人，占總死亡人數的 44.1%，死亡率為每十萬人口 7,537.9 人，較上年增加 0.9%。80 歲以上老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,393 人占 21.2%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)822 人占 12.5%，(3)肺炎 593 人占 9.0%，3 者合占 80 歲以上老年死亡人數的 42.8%。

#### 十三、12 行政區仍以萬華區標準化死亡率最高，大同區次之

98 年臺北市 12 行政區死亡率以萬華區每十萬人口 819.4 人最高，大同區 692.6 人次之，內湖區 437.8 人最低；標準化後萬華區每十萬人口 447.3 人仍為最高，大同區 420.8 人次之，大

安區 272.1 人最低。(詳圖 5)



#### 十四、惡性腫瘤(癌症)

##### (一)肺癌、肝癌、結腸直腸癌續居主要癌症死因前三位


98 年臺北市惡性腫瘤死亡人數為 4,563 人，占總死亡人數之 30.7%，死亡率為每十萬人口 174.5 人，較上年增加 2.6%；標準化死亡率為每十萬人口 111.2 人，較上年則減少 1.4%，較 89 年亦減少 11.6%。

98 年臺北市十大癌症死因中肺癌仍居榜首，其次依序為肝癌、結腸直腸癌、女性乳癌、胃癌、攝護腺癌、胰臟癌、口腔

癌、子宮頸癌、食道癌；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數 76.8%，其中肺癌占 21.2% 最多，肝癌占 14.6% 次之，結腸直腸癌占 13.0% 居三。（詳表 5、圖 6）

表 5. ICD-10 98 年臺北市十大癌症死因

單位：人、%			
順位	癌症死因	死亡人數	死亡百分比
	所有癌症死因	4,563	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	967	21.2
2	肝和肝內膽管癌	665	14.6
3	結腸、直腸和肛門癌	592	13.0
4	女性乳房癌	236	5.2
5	胃癌	319	7.0
6	前列腺(攝護腺)癌	142	3.1
7	胰臟癌	237	5.2
8	口腔癌	148	3.2
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	69	1.5
10	食道癌	129	2.8
	其他	1,059	23.2



(二) 男性癌症標準化死亡率較上年減少 4.3%、女性則增加 2.9%，惟男性癌症標準化死亡率仍為女性的 1.5 倍

98 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性為 2,671 人，女性為 1,892 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 134.1 人、每十萬女性人口 90.1 人，男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性減少 1.0%、女性增加 7.0%，標準化死亡率男性亦減少 4.3%，女性則增加 2.9%。

98 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 69.5 歲，較全國略低 0.1 歲，與 89 年比較則增加 2.6 歲，其中男性死亡年齡平均數為 70.3 歲，女性為 68.4 歲。98 年臺北市十大癌症死因中死亡

年齡平均數以攝護腺癌 81.1 歲最高，胃癌 72.8 歲次之，最低為口腔癌 60.6 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，98 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 72 歲，較全國高 3 歲，與 89 年比較則減少 1 歲，其中男性死亡年齡平均數為 73 歲，女性為 71 歲。98 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡中位數以攝護腺癌 82 歲最高，胃癌 77 歲次之，最低為口腔癌 57 歲。（詳表 6）

表 6. ICD-10 98 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數  
單位：歲

死因別		所有癌症死因	氣管、支氣管和肺癌	肝和肝內膽管癌	結腸、直腸和肛門癌	女性乳房癌	胃癌	前列腺(攝護腺)癌	胰臟癌	口腔癌	子宮頸及部位未明示子宮癌	食道癌
死亡年齡平均數	兩性	69.5	72.0	68.0	71.7	61.4	72.8	81.1	71.6	60.6	64.8	66.7
	男性	70.3	73.6	65.8	72.0	--	74.9	81.1	71.8	59.0	--	65.1
	女性	68.4	69.5	72.5	71.4	61.4	69.2	--	71.4	78.3	64.8	75.3
死亡年齡中位數	兩性	72	75	69	74	58.5	77	82	73	57	63	67
	男性	73	77	66	75	--	78	82	74	56.5	--	65
	女性	71	72	74	73	58.5	73	--	73	79	63	76.5

表A·臺北市人口統計指標—行政區別

中華民國98年

項 目	單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積	平方公里	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度	人/平方公里	9,593	22,394	20,108	27,427	15,951	20,869	21,719	21,287	8,279	5,180	8,477	4,551	4,365
年底人口數	人	2,607,428	207,995	225,364	311,612	218,245	158,752	123,399	188,437	260,869	113,149	267,704	283,855	248,047
男性		1,260,450	98,700	108,918	146,914	103,033	76,745	60,957	94,381	126,579	55,938	129,278	138,331	120,676
女性		1,346,978	109,295	116,446	164,698	115,212	82,007	62,442	94,056	134,290	57,211	138,426	145,524	127,371
性比例		93.58	90.31	93.54	89.20	89.43	93.58	97.62	100.35	94.26	97.77	93.39	95.06	94.74
出生數	人	19,403	1,379	1,765	2,047	1,618	1,093	955	1,465	2,011	984	2,102	2,066	1,918
粗出生率	‰	7.42	6.60	7.79	6.55	7.40	6.87	7.70	7.73	7.70	8.68	7.87	7.25	7.71
死亡數	人	15,260	1,068	1,374	1,728	1,252	958	893	1,585	1,425	666	1,195	1,651	1,465
粗死亡率	‰	5.84	5.11	6.06	5.53	5.73	6.02	7.20	8.37	5.45	5.87	4.47	5.79	5.89
人口增加率	‰	-5.91	-10.00	-10.56	-7.12	-2.72	-3.67	-10.06	-10.11	-3.25	-4.60	3.36	-7.73	-6.83
自然增加率		1.58	1.49	1.73	1.02	1.67	0.85	0.50	-0.63	2.24	2.80	3.39	1.46	1.82
社會增加率		-7.49	-11.49	-12.29	-8.14	-4.40	-4.52	-10.56	-9.47	-5.49	-7.40	-0.04	-9.18	-8.65
14歲以下年底 人口數(a)	人 比重(%)	393,660 15.10	34,201 16.44	30,568 13.56	49,690 15.95	28,941 13.26	27,627 17.40	17,284 14.01	22,869 12.14	42,633 16.34	16,663 14.73	44,854 16.76	40,585 14.30	37,745 15.22
15-64歲年底 人口數(b)	人 比重(%)	1,885,352 72.31	146,570 70.47	164,547 73.01	216,384 69.44	160,949 73.75	109,154 68.76	89,178 72.27	136,741 72.57	188,035 72.08	83,752 74.02	200,020 74.72	208,447 73.43	181,575 73.20
65歲以上年底 人口數(c)	人 比重(%)	328,416 12.60	27,224 13.09	30,249 13.42	45,538 14.61	28,355 12.99	21,971 13.84	16,937 13.73	28,827 15.30	30,201 11.58	12,734 11.25	22,830 8.53	34,823 12.27	28,727 11.58
扶養比 (a+c)/b	%	38.30	41.91	36.96	44.01	35.60	45.44	38.37	37.81	38.73	35.10	33.84	36.18	36.61
扶幼比 a/b		20.88	23.33	18.58	22.96	17.98	25.31	19.38	16.72	22.67	19.90	22.42	19.47	20.79
扶老比 c/b		17.42	18.57	18.38	21.04	17.62	20.13	18.99	21.08	16.06	15.20	11.41	16.71	15.82
老化指數 c/a		83.43	79.60	98.96	91.64	97.98	79.53	97.99	126.05	70.84	76.42	50.90	85.80	76.11

附註:本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
76	73.39	71.09	76.31	76.73	74.79	79.04
77	73.32	70.99	76.21	76.89	74.71	79.51
78	73.54	71.10	76.47	76.81	74.91	79.00
79	73.79	71.33	76.75	77.11	75.23	79.75
80	74.26	71.83	77.14	77.59	75.88	80.22
81	74.26	71.78	77.19	77.85	75.95	80.54
82	74.28	71.61	77.52	78.01	75.99	80.83
83	74.50	71.81	77.76	78.20	76.18	80.94
84	74.53	71.85	77.74	78.36	76.18	81.07
85	74.95	72.38	78.05	78.74	76.62	81.24
86	75.54	72.97	78.61	79.01	77.16	81.05
87	75.76	73.12	78.93	79.56	77.39	82.11
88	75.90	73.33	78.98	79.87	77.86	82.17
89	76.46	73.83	79.56	80.12	78.07	82.44
90	76.75	74.07	79.92	80.25	78.21	82.52
91	77.19	74.58	80.24	80.70	78.74	82.82
92	77.35	74.77	80.33	80.91	78.99	82.95
93	77.48	74.68	80.75	81.36	79.03	83.85
94	77.42	74.50	80.80	81.21	78.77	83.86
95	77.90	74.86	81.41	81.79	79.40	84.32
96	78.38	75.46	81.72	82.00	79.69	84.42
<b>97</b>	<b>78.57</b>	<b>75.59</b>	<b>81.94</b>	<b>81.87</b>	<b>79.66</b>	<b>84.11</b>

資料來源：內政部。

表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數

年 別	總 計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
	人 數 (人)							
89年	2,643,893	32,020	143,268	347,754	407,015	898,031	563,238	252,566
90年	2,640,138	29,318	138,255	346,070	396,896	882,758	587,962	258,878
91年	2,637,829	25,358	130,436	345,995	385,390	871,742	612,566	266,343
92年	2,634,497	23,872	122,373	340,662	376,934	860,954	635,342	274,360
93年	2,624,805	22,098	115,610	333,386	365,398	849,821	656,319	282,174
94年	2,619,424	20,858	106,020	329,182	354,222	841,903	676,350	290,888
95年	2,624,309	20,255	97,844	322,973	344,320	839,559	698,492	300,867
96年	2,630,756	20,497	93,288	314,682	334,216	837,173	720,426	310,474
97年	2,626,096	20,251	90,589	304,529	325,271	827,928	738,785	318,745
<b>98年</b>	<b>2,615,176</b>	<b>19,295</b>	<b>88,872</b>	<b>292,745</b>	<b>317,673</b>	<b>815,122</b>	<b>755,775</b>	<b>325,696</b>
	百 分 比 (%)							
89年	100.00	1.21	5.42	13.15	15.39	33.97	21.30	9.55
90年	100.00	1.11	5.24	13.11	15.03	33.44	22.27	9.81
91年	100.00	0.96	4.94	13.12	14.61	33.05	23.22	10.10
92年	100.00	0.91	4.65	12.93	14.31	32.68	24.12	10.41
93年	100.00	0.84	4.40	12.70	13.92	32.38	25.00	10.75
94年	100.00	0.80	4.05	12.57	13.52	32.14	25.82	11.11
95年	100.00	0.77	3.73	12.31	13.12	31.99	26.62	11.46
96年	100.00	0.78	3.55	11.96	12.70	31.82	27.38	11.80
97年	100.00	0.77	3.45	11.60	12.39	31.53	28.13	12.14
<b>98年</b>	<b>100.00</b>	<b>0.74</b>	<b>3.40</b>	<b>11.19</b>	<b>12.15</b>	<b>31.17</b>	<b>28.90</b>	<b>12.45</b>

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性

年 別	男性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
	人 數 (人)							
89年	1,309,371	16,720	74,534	182,362	206,281	422,652	269,650	137,171
90年	1,304,744	15,220	71,983	181,646	201,185	414,977	281,327	138,405
91年	1,300,818	13,180	67,972	181,472	195,538	409,614	292,702	140,340
92年	1,296,600	12,442	63,700	178,713	191,624	404,398	303,168	142,554
93年	1,289,022	11,571	60,098	174,960	186,351	399,102	312,512	144,428
94年	1,282,908	11,007	55,113	172,464	181,326	395,113	321,267	146,618
95年	1,281,102	10,599	51,037	168,671	176,781	393,448	331,205	149,362
96年	1,280,124	10,599	48,784	163,958	171,984	391,825	340,865	152,110
97年	1,274,252	10,466	47,357	158,589	167,692	387,224	348,609	154,316
<b>98年</b>	<b>1,265,699</b>	<b>9,980</b>	<b>46,379</b>	<b>152,510</b>	<b>164,019</b>	<b>381,047</b>	<b>355,766</b>	<b>156,000</b>
	百 分 比 (%)							
89年	100.00	1.28	5.69	13.93	15.75	32.28	20.59	10.48
90年	100.00	1.17	5.52	13.92	15.42	31.81	21.56	10.61
91年	100.00	1.01	5.23	13.95	15.03	31.49	22.50	10.79
92年	100.00	0.96	4.91	13.78	14.78	31.19	23.38	10.99
93年	100.00	0.90	4.66	13.57	14.46	30.96	24.24	11.20
94年	100.00	0.86	4.30	13.44	14.13	30.80	25.04	11.43
95年	100.00	0.83	3.98	13.17	13.80	30.71	25.85	11.66
96年	100.00	0.83	3.81	12.81	13.43	30.61	26.63	11.88
97年	100.00	0.82	3.72	12.45	13.16	30.39	27.36	12.11
<b>98年</b>	<b>100.00</b>	<b>0.79</b>	<b>3.66</b>	<b>12.05</b>	<b>12.96</b>	<b>30.11</b>	<b>28.11</b>	<b>12.33</b>

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性

年 別	女性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
	人 數 (人)							
89年	1,334,522	15,300	68,734	165,392	200,734	475,379	293,588	115,395
90年	1,335,394	14,098	66,272	164,424	195,711	467,780	306,636	120,474
91年	1,337,010	12,178	62,463	164,524	189,852	462,128	319,864	126,003
92年	1,337,897	11,430	58,672	161,949	185,310	456,556	332,174	131,806
93年	1,335,782	10,528	55,511	158,426	179,046	450,720	343,807	137,746
94年	1,336,516	9,850	50,907	156,718	172,896	446,790	355,084	144,270
95年	1,343,207	9,656	46,807	154,302	167,539	446,111	367,287	151,505
96年	1,350,632	9,898	44,504	150,725	162,232	445,348	379,562	158,364
97年	1,351,844	9,786	43,232	145,940	157,579	440,704	390,176	164,429
<b>98年</b>	<b>1,349,477</b>	<b>9,316</b>	<b>42,493</b>	<b>140,235</b>	<b>153,654</b>	<b>434,075</b>	<b>400,009</b>	<b>169,696</b>
	百 分 比 (%)							
89年	100.00	1.15	5.15	12.39	15.04	35.62	22.00	8.65
90年	100.00	1.06	4.96	12.31	14.66	35.03	22.96	9.02
91年	100.00	0.91	4.67	12.31	14.20	34.56	23.92	9.42
92年	100.00	0.85	4.39	12.10	13.85	34.12	24.83	9.85
93年	100.00	0.79	4.16	11.86	13.40	33.74	25.74	10.31
94年	100.00	0.74	3.81	11.73	12.94	33.43	26.57	10.79
95年	100.00	0.72	3.48	11.49	12.47	33.21	27.34	11.28
96年	100.00	0.73	3.30	11.16	12.01	32.97	28.10	11.73
97年	100.00	0.72	3.20	10.80	11.66	32.60	28.86	12.16
<b>98年</b>	<b>100.00</b>	<b>0.69</b>	<b>3.15</b>	<b>10.39</b>	<b>11.39</b>	<b>32.17</b>	<b>29.64</b>	<b>12.57</b>

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F·臺北市各行政區年齡別年底人口數

中華民國98年底

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
98年底人口數	2,607,428	207,995	225,364	311,612	218,245	158,752	123,399	188,437	260,869	113,149	267,704	283,855	248,047
0歲	18,835	1,351	1,706	2,068	1,545	1,074	922	1,392	1,960	936	2,029	1,999	1,853
1-4	87,937	7,018	7,439	10,510	7,039	5,502	3,976	5,954	9,257	4,053	9,423	9,330	8,436
5-9	126,381	11,201	9,800	16,272	9,203	8,944	5,460	7,292	13,794	5,416	14,292	12,690	12,017
10-14	160,507	14,631	11,623	20,840	11,154	12,107	6,926	8,231	17,622	6,258	19,110	16,566	15,439
15-19	159,994	12,128	13,348	17,710	12,355	9,435	7,278	10,694	16,785	7,219	19,614	17,615	15,813
20-24	154,170	10,895	13,587	15,594	12,391	8,240	7,384	11,488	15,279	7,389	18,396	18,007	15,520
25-29	189,652	13,088	17,065	19,071	16,030	9,898	9,499	15,360	18,059	9,319	20,254	22,544	19,465
30-34	200,555	14,685	18,114	20,831	17,372	11,138	10,177	15,862	19,758	10,071	20,104	22,386	20,057
35-39	201,734	16,097	17,401	23,104	17,117	12,056	9,432	14,214	21,313	9,393	20,600	21,085	19,922
40-44	215,758	17,929	18,078	26,049	18,004	13,411	9,697	14,232	23,541	9,194	23,477	22,266	19,880
45-49	221,926	17,687	18,664	26,306	19,090	13,299	10,111	15,317	23,004	9,248	25,329	23,368	20,503
50-54	218,370	16,926	18,938	25,374	19,353	12,386	10,216	15,676	20,973	8,904	24,362	24,689	20,573
55-59	198,388	16,059	17,666	25,039	18,034	11,512	9,544	14,544	18,122	8,041	18,551	22,745	18,531
60-64	124,805	11,076	11,686	17,306	11,203	7,779	5,840	9,354	11,201	4,974	9,333	13,742	11,311
65-69	98,578	8,309	9,264	13,355	8,575	6,017	5,167	8,404	8,663	4,100	6,775	10,889	9,060
70-74	77,625	6,141	6,817	10,297	6,955	5,195	4,590	7,024	6,760	3,150	5,415	8,557	6,724
75-79	63,344	5,094	5,623	8,424	5,732	4,291	3,394	5,823	5,771	2,393	4,555	6,749	5,495
80-84	50,473	4,266	4,874	7,186	4,195	3,335	2,104	4,440	5,163	1,844	3,650	5,010	4,406
85-89	26,638	2,354	2,588	4,235	2,004	2,105	1,115	2,231	2,746	891	1,762	2,497	2,110
90-94	8,900	829	820	1,536	686	713	401	685	853	282	532	853	710
95-99	2,381	185	223	438	177	235	131	172	208	68	122	234	188
100歲以上	477	46	40	67	31	80	35	48	37	6	19	34	34

表G·臺北市近十年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	89年底	90年底	91年底	92年底	93年底	94年底	95年底	96年底	97年底	98年底
臺北市	2,646,474	2,633,802	2,641,856	2,627,138	2,622,472	2,616,375	2,632,242	2,629,269	2,622,923	<b>2,607,428</b>
松山區	207,303	205,031	205,289	205,593	205,962	208,101	209,422	210,986	210,097	<b>207,995</b>
信義區	240,294	237,530	237,362	234,590	232,506	230,780	231,476	228,868	227,770	<b>225,364</b>
大安區	316,977	315,818	315,714	313,011	312,554	312,166	314,171	314,924	313,848	<b>311,612</b>
中山區	215,532	216,043	217,569	216,999	216,868	216,906	219,582	218,483	218,841	<b>218,245</b>
中正區	163,090	161,635	161,808	159,599	158,486	157,335	158,604	159,486	159,337	<b>158,752</b>
大同區	132,694	131,343	131,077	129,440	128,512	126,810	126,923	126,128	124,653	<b>123,399</b>
萬華區	206,855	204,024	203,451	200,266	197,445	194,743	194,879	192,470	190,361	<b>188,437</b>
文山區	253,131	253,920	256,528	256,506	258,046	258,953	261,417	261,666	261,719	<b>260,869</b>
南港區	114,144	113,937	113,839	113,122	112,982	113,052	113,258	113,716	113,672	<b>113,149</b>
內湖區	253,584	254,521	258,611	259,789	261,201	261,837	264,624	265,518	266,808	<b>267,704</b>
士林區	294,443	292,096	291,493	289,194	288,921	287,753	288,212	287,048	286,065	<b>283,855</b>
北投區	248,427	247,904	249,115	249,029	248,989	247,939	249,674	249,976	249,752	<b>248,047</b>

表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數

中華民國98年中

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
98年中人口數	2,615,176	209,046	226,567	312,730	218,543	159,045	124,026	189,399	261,294	113,411	267,256	284,960	248,900
0歲	19,295	1,424	1,752	2,128	1,596	1,088	916	1,451	1,991	946	2,071	2,048	1,889
1-4	88,872	7,068	7,566	10,462	7,061	5,502	4,052	6,081	9,437	4,150	9,503	9,445	8,548
5-9	129,944	11,532	10,130	16,576	9,440	9,123	5,654	7,483	14,226	5,603	14,708	13,107	12,364
10-14	162,802	14,809	11,877	20,973	11,357	12,184	7,002	8,465	17,875	6,331	19,359	16,901	15,671
15-19	159,947	12,125	13,412	17,590	12,337	9,351	7,322	10,750	16,606	7,235	19,709	17,657	15,855
20-24	157,726	11,178	13,886	16,054	12,652	8,473	7,580	11,826	15,521	7,587	18,502	18,504	15,965
25-29	193,150	13,362	17,393	19,512	16,368	10,090	9,721	15,748	18,373	9,507	20,367	22,856	19,855
30-34	200,121	14,808	18,156	20,978	17,232	11,090	10,077	15,797	19,791	10,023	19,777	22,372	20,021
35-39	204,513	16,351	17,755	23,481	17,268	12,177	9,571	14,383	21,763	9,446	20,902	21,338	20,081
40-44	217,339	18,101	18,164	26,274	18,200	13,480	9,807	14,345	23,666	9,222	23,744	22,345	19,996
45-49	223,207	17,767	18,809	26,376	19,219	13,355	10,220	15,435	22,946	9,231	25,461	23,732	20,658
50-54	218,317	17,025	18,919	25,651	19,375	12,347	10,238	15,629	20,823	8,838	24,119	24,785	20,570
55-59	195,429	15,962	17,565	24,919	17,769	11,479	9,412	14,328	17,728	7,985	17,765	22,311	18,208
60-64	118,823	10,585	11,165	16,539	10,612	7,391	5,654	8,960	10,614	4,696	8,708	13,085	10,817
65-69	98,332	8,238	9,164	13,268	8,558	6,077	5,234	8,491	8,610	4,111	6,699	10,894	8,991
70-74	76,384	6,058	6,692	10,100	6,879	5,160	4,539	6,950	6,670	3,086	5,305	8,365	6,583
75-79	63,953	5,131	5,778	8,569	5,718	4,298	3,321	5,861	5,900	2,400	4,663	6,759	5,556
80-84	49,858	4,225	4,844	7,153	4,084	3,352	2,045	4,396	5,106	1,810	3,582	4,944	4,319
85-89	25,869	2,301	2,511	4,158	1,960	2,020	1,108	2,145	2,613	862	1,688	2,435	2,071
90-94	8,567	780	785	1,487	658	703	396	667	815	276	503	826	674
95-99	2,257	178	204	423	173	230	125	166	188	64	112	220	177
100歲以上	478	45	44	63	34	79	38	47	38	6	16	35	35

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I·臺北市近十年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年
臺北市	2,643,893	2,640,138	2,637,829	2,634,497	2,624,805	2,619,424	2,624,309	2,630,756	2,626,096	<b>2,615,176</b>
松山區	207,459	206,167	205,160	205,441	205,778	207,032	208,762	210,204	210,542	<b>209,046</b>
信義區	241,106	238,912	237,446	235,976	233,548	231,643	231,128	230,172	228,319	<b>226,567</b>
大安區	317,044	316,398	315,766	314,362	312,782	312,360	313,169	314,548	314,386	<b>312,730</b>
中山區	215,092	215,788	216,806	217,284	216,934	216,887	218,244	219,033	218,662	<b>218,543</b>
中正區	164,207	162,362	161,722	160,704	159,042	157,911	157,970	159,045	159,412	<b>159,045</b>
大同區	133,098	132,018	131,210	130,258	128,976	127,661	126,867	126,526	125,391	<b>124,026</b>
萬華區	207,399	205,440	203,738	201,858	198,856	196,094	194,811	193,675	191,416	<b>189,399</b>
文山區	250,866	253,526	255,224	256,517	257,276	258,500	260,185	261,542	261,693	<b>261,294</b>
南港區	113,607	114,040	113,888	113,480	113,052	113,017	113,155	113,487	113,694	<b>113,411</b>
內湖區	251,586	254,052	256,566	259,200	260,495	261,519	263,231	265,071	266,163	<b>267,256</b>
士林區	294,826	293,270	291,794	290,344	289,058	288,337	287,983	287,630	286,557	<b>284,960</b>
北投區	247,603	248,166	248,510	249,072	249,009	248,464	248,807	249,825	249,864	<b>248,900</b>

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表1·ICD-10 臺北市、全國、高雄市主要死亡原因比較  
中華民國98年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾病碼 ICD 10	死亡原因	臺北市				全國				高雄市			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比
A00-Y98	所有死亡原因		14,870	568.60	100.00		142,240	616.33	100.00		9,023	590.98	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,563	174.48	30.69	1	39,917	172.96	28.06	1	2,651	173.63	29.38
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	2	1,768	67.61	11.89	2	15,093	65.40	10.61	2	832	54.49	9.22
I60-I69	腦血管疾病	3	1,128	43.13	7.59	3	10,383	44.99	7.30	5	516	33.80	5.72
J12-J18	肺炎	4	840	32.12	5.65	4	8,358	36.22	5.88	3	607	39.76	6.73
E10-E14	糖尿病	5	825	31.55	5.55	5	8,229	35.66	5.79	4	522	34.19	5.79
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	496	18.97	3.34	7	4,955	21.47	3.48	7	320	20.96	3.55
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	451	17.25	3.03	10	3,999	17.33	2.81	9	264	17.29	2.93
A40-A41	敗血症	8	441	16.86	2.97	12	3,623	15.70	2.55	11	229	15.00	2.54
I10-I15	高血壓性疾病	9	385	14.72	2.59	11	3,721	16.12	2.62	12	228	14.93	2.53
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	377	14.42	2.54	6	7,358	31.88	5.17	6	369	24.17	4.09
	其他		3,596	137.51	24.18		36,604	158.61	25.73		2,485	162.76	27.54
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	349	13.35	2.35	8	4,918	21.31	3.46	10	248	16.24	2.75
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	12	341	13.04	2.29	9	4,063	17.61	2.86	8	287	18.80	3.18
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	13	340	13.00	2.29	13	1,314	5.69	0.92	13	53	3.47	0.59
F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	14	112	4.28	0.75	20	556	2.41	0.39	22	22	1.44	0.24
G20-G21	帕金森病	15	92	3.52	0.62	18	572	2.48	0.40	19	31	2.03	0.34

表 2. ICD-10 全國縣市別死亡概況

中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
全 國	142,240	616.3	466.7	87,074	748.6	586.6	55,166	481.9	350.5
臺北市	14,870	568.6	347.3	8,782	693.8	425.2	6,088	451.1	276.9
高雄市	9,023	591.0	480.4	5,547	733.3	593.4	3,476	451.2	374.0
基隆市	2,550	656.1	475.5	1,568	798.4	598.6	982	510.8	357.5
新竹市	2,196	537.6	433.5	1,369	672.7	555.8	827	403.5	320.6
臺中市	5,145	480.9	441.3	3,114	597.2	547.2	2,031	370.3	346.2
臺南市	4,328	562.3	466.9	2,611	684.0	588.7	1,717	442.5	354.8
嘉義市	1,714	625.9	472.3	1,011	748.2	595.1	703	506.9	361.6
臺北縣	17,773	461.2	422.7	11,126	579.4	529.6	6,647	343.8	320.7
桃園縣	9,730	494.2	444.8	6,231	626.1	542.1	3,499	359.4	346.5
新竹縣	3,179	626.9	468.6	1,926	736.1	575.5	1,253	510.6	355.9
宜蘭縣	3,307	716.9	489.1	2,004	849.9	617.0	1,303	577.9	362.2
苗栗縣	4,250	757.5	494.5	2,579	882.4	631.8	1,671	621.7	352.9
臺中縣	8,550	548.1	489.2	5,288	667.6	607.6	3,262	424.8	372.0
彰化縣	8,816	671.6	481.7	5,217	772.5	620.6	3,599	564.7	350.5
南投縣	4,205	791.5	519.3	2,595	946.2	676.6	1,610	626.4	360.5
雲林縣	6,429	888.9	553.2	3,784	999.3	716.1	2,645	767.6	390.1
嘉義縣	4,736	863.9	505.9	2,837	989.6	657.7	1,899	726.1	352.9
臺南縣	8,544	773.6	509.5	5,144	910.4	653.0	3,400	630.3	371.7
高雄縣	9,020	725.6	578.9	5,679	889.6	722.8	3,341	552.4	432.7
屏東縣	7,312	827.4	580.8	4,523	992.7	737.8	2,789	651.4	418.3
澎湖縣	761	803.1	444.5	443	907.9	565.5	318	691.9	321.5
花蓮縣	3,008	881.6	601.6	1,925	1090.1	753.5	1,083	657.9	442.6
臺東縣	2,296	988.9	661.8	1,455	1192.9	827.0	841	763.2	483.0
金門縣	457	512.4	337.8	290	623.0	471.7	167	391.7	207.7
連江縣	41	416.8	274.2	26	456.2	354.4	15	362.5	184.0

資料來源：行政院衛生署。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3·ICD-10 臺北市主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男 性 人 口 死亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女 性 人 口 死亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	14,870	568.60	100.00	所有死亡原因	8,782	693.85	100.00	所有死亡原因	6,088	451.14	100.00
1	惡性腫瘤	4,563	174.48	30.69	惡性腫瘤	2,671	211.03	30.41	惡性腫瘤	1,892	140.20	31.08
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,768	67.61	11.89	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,101	86.99	12.54	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	667	49.43	10.96
3	腦血管疾病	1,128	43.13	7.59	腦血管疾病	647	51.12	7.37	腦血管疾病	481	35.64	7.90
4	肺炎	840	32.12	5.65	肺炎	528	41.72	6.01	糖尿病	402	29.79	6.60
5	糖尿病	825	31.55	5.55	糖尿病	423	33.42	4.82	肺炎	312	23.12	5.12
6	慢性下呼吸道疾病	496	18.97	3.34	慢性下呼吸道疾病	377	29.79	4.29	敗血症	208	15.41	3.42
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	451	17.25	3.03	事故傷害	260	20.54	2.96	腎炎、腎病症候群及腎病變	202	14.97	3.32
8	敗血症	441	16.86	2.97	腎炎、腎病症候群及腎病變	249	19.67	2.84	骨骼肌肉系統及結締組織之 疾病	198	14.67	3.25
9	高血壓性疾病	385	14.72	2.59	蓄意自我傷害(自殺)	234	18.49	2.66	高血壓性疾病	179	13.26	2.94
10	事故傷害	377	14.42	2.54	敗血症	233	18.41	2.65	慢性下呼吸道疾病	119	8.82	1.95
	其他	3,596	137.51	24.18	其他	2,059	162.68	23.45	其他	1,428	105.82	23.46
11	慢性肝病及肝硬化	349	13.35	2.35	慢性肝病及肝硬化	232	18.33	2.64	事故傷害	117	8.67	1.92
12	蓄意自我傷害(自殺)	341	13.04	2.29	高血壓性疾病	206	16.28	2.35	慢性肝病及肝硬化	117	8.67	1.92
13	骨骼肌肉系統及結締組織之 疾病	340	13.00	2.29	骨骼肌肉系統及結締組織之 疾病	142	11.22	1.62	蓄意自我傷害(自殺)	107	7.93	1.76
14	血管性及未明示之癱瘓症	112	4.28	0.75	帕金森病	62	4.90	0.71	血管性及未明示之癱瘓症	68	5.04	1.12
15	帕金森病	92	3.52	0.62	主動脈瘤及剝離	54	4.27	0.61	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	33	2.45	0.54

附註：臺北市年中人口數為2,615,176人，其中男性為1,265,699人，女性為1,349,477人。

表4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況

中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	14,870	568.60	69	357.61	45	11.79	101	31.79	703	86.24	2,863	378.82	4,529	1,897.61	6,560	7,537.89
1	C00-C97	惡性腫瘤	4,563	174.48	3	15.55	14	3.67	14	4.41	217	26.62	1,298	171.74	1,624	680.44	1,393	1,600.65
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,768	67.61	3	15.55	4	1.05	3	0.94	72	8.83	321	42.47	543	227.51	822	944.53
3	I60-I69	腦血管疾病	1,128	43.13	1	5.18	1	0.26	2	0.63	26	3.19	165	21.83	345	144.55	588	675.65
4	J12-J18	肺炎	840	32.12	1	5.18	1	0.26	-	-	10	1.23	43	5.69	192	80.45	593	681.40
5	E10-E14	糖尿病	825	31.55	-	-	-	-	2	0.63	13	1.59	140	18.52	319	133.66	351	403.32
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	496	18.97	-	-	-	-	1	0.31	2	0.25	16	2.12	136	56.98	341	391.83
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	451	17.25	-	-	-	-	-	-	9	1.10	46	6.09	152	63.69	244	280.37
8	A40-A41	敗血症	441	16.86	-	-	1	0.26	-	-	6	0.74	54	7.14	128	53.63	252	289.57
9	I10-I15	高血壓性 疾病	385	14.72	-	-	-	-	-	-	5	0.61	44	5.82	120	50.28	216	248.20
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	377	14.42	3	15.55	5	1.31	36	11.33	65	7.97	91	12.04	94	39.39	83	95.37
		其他	3,596	137.51	58	300.60	19	4.98	43	13.54	278	34.11	645	85.34	876	367.04	1,677	1,926.99
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	349	13.35	-	-	-	-	-	-	34	4.17	134	17.73	106	44.41	75	86.18
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	341	13.04	-	-	-	-	20	6.30	106	13.00	126	16.67	60	25.14	29	33.32
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	340	13.00	-	-	-	-	-	-	9	1.10	19	2.51	41	17.18	271	311.40
14	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	112	4.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	7.96	93	106.86
15	G20-G21	帕金森病	92	3.52	-	-	-	-	-	-	1	0.12	4	0.53	30	12.57	57	65.50

附註：臺北市年中人口數為2,615,176人。

表5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況

中華民國98年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	8,782	693.85	34	340.70	25	12.57	70	42.68	462	121.24	1,850	520.01	2,634	2,399.41	3,707	8,019.90
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,671	211.03	2	20.04	9	4.53	8	4.88	108	28.34	734	206.32	928	845.35	882	1,908.16
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,101	86.99	1	10.02	2	1.01	3	1.83	62	16.27	255	71.68	335	305.16	443	958.41
3	I60-I69	腦血管疾病	647	51.12	-	-	1	0.50	1	0.61	19	4.99	107	30.08	199	181.28	320	692.30
4	J12-J18	肺炎	528	41.72	-	-	-	-	-	-	8	2.10	35	9.84	134	122.07	351	759.37
5	E10-E14	糖尿病	423	33.42	-	-	-	-	1	0.61	8	2.10	97	27.27	149	135.73	168	363.46
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	377	29.79	-	-	-	-	1	0.61	2	0.52	10	2.81	112	102.03	252	545.19
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	260	20.54	1	10.02	5	2.51	28	17.07	47	12.33	72	20.24	58	52.83	49	106.01
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	249	19.67	-	-	-	-	-	-	8	2.10	26	7.31	74	67.41	141	305.05
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	234	18.49	-	-	-	-	11	6.71	70	18.37	89	25.02	43	39.17	21	45.43
10	A40-A41	敗血症	233	18.41	-	-	-	-	-	-	3	0.79	30	8.43	74	67.41	126	272.59
		其他	2,059	162.68	30	300.62	8	4.02	17	10.36	127	33.33	395	111.03	528	480.98	954	2,063.93
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	232	18.33	-	-	-	-	-	-	33	8.66	110	30.92	53	48.28	36	77.88
12	I10-I15	高血壓性疾病	206	16.28	-	-	-	-	-	-	5	1.31	33	9.28	69	62.85	99	214.18
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	142	11.22	-	-	-	-	-	-	1	0.26	6	1.69	16	14.58	119	257.45
14	G20-G21	帕金森病	62	4.90	-	-	-	-	-	-	1	0.26	3	0.84	21	19.13	37	80.05
15	I71	主動脈瘤及剝離	54	4.27	-	-	-	-	-	-	2	0.52	12	3.37	22	20.04	18	38.94

附註：臺北市男性年中人口數為1,265,699人。

表6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況

中華民國98年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	6,088	451.14	35	375.72	20	10.95	31	20.18	241	55.52	1,013	253.24	1,895	1,470.23	2,853	6,991.88
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,892	140.20	1	10.73	5	2.74	6	3.90	109	25.11	564	141.00	696	539.99	511	1,252.31
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	667	49.43	2	21.47	2	1.09	-	-	10	2.30	66	16.50	208	161.38	379	928.82
3	I60-I69	腦血管疾病	481	35.64	1	10.73	-	-	1	0.65	7	1.61	58	14.50	146	113.27	268	656.79
4	E10-E14	糖尿病	402	29.79	-	-	-	-	1	0.65	5	1.15	43	10.75	170	131.89	183	448.48
5	J12-J18	肺炎	312	23.12	1	10.73	1	1	-	-	2	0.46	8	2.00	58	45.00	242	593.07
6	A40-A41	敗血症	208	15.41	-	-	1	1	-	-	3	0.69	24	6.00	54	41.90	126	308.79
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	202	14.97	-	-	-	-	-	-	1	0.23	20	5.00	78	60.52	103	252.42
8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	198	14.67	-	-	-	-	-	-	8	1.84	13	3.25	25	19.40	152	372.51
9	I10-I15	高血壓性疾病	179	13.26	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	51	39.57	117	286.73
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	119	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	24	18.62	89	218.11
		其他	1,428	105.82	30	322.04	11	6.02	23	14.97	96	22.12	200	50.00	385	298.70	683	1,673.83
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	117	8.67	2	21.47	-	-	8	5.21	18	4.15	19	4.75	36	27.93	34	83.32
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	117	8.67	-	-	-	-	-	-	1	0.23	24	6.00	53	41.12	39	95.58
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	107	7.93	-	-	-	-	9	5.86	36	8.29	37	9.25	17	13.19	8	19.61
14	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	68	5.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8.53	57	139.69
15	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺 部病況(塵肺症及肺 炎除外)	33	2.45	1	10.73	-	-	-	-	-	-	2	0.50	7	5.43	23	56.37

附註：臺北市女性年中人口數為1,349,477人。

表7·ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因

中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	69	355.62	100.00		所有死亡原因	34	340.10	100.00		所有死亡原因	35	372.10	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	25	128.85	36.23	P00-P96	源於周產期的特定病況	15	150.05	44.12	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	11	116.95	31.43
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	20	103.08	28.99	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	9	90.03	26.47	P00-P96	源於周產期的特定病況	10	106.32	28.57
3	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	5	25.77	7.25	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	3	30.01	8.82	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	21.26	5.71
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	15.46	4.35	C00-C97	惡性腫瘤	2	20.01	5.88	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	21.26	5.71
5	C00-C97	惡性腫瘤	3	15.46	4.35	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	10.00	2.94	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	21.26	5.71
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	15.46	4.35	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	10.00	2.94	J12-J18	肺炎	1	10.63	2.86
7	J12-J18	肺炎	1	5.15	1.45	G00, G03	腦膜炎	1	10.00	2.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	10.63	2.86
8	I60-I69	腦血管疾病	1	5.15	1.45						I60-I69	腦血管疾病	1	10.63	2.86
9	G00, G03	腦膜炎	1	5.15	1.45						J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	10.63	2.86
10	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	5.15	1.45							其他	4	42.53	11.43
		其他	6	30.92	8.70		其他	2	20.01	5.88		其他	4	42.53	11.43

附註：0歲出生登記數為19,403人，其中男性為9,997人，女性為9,406人。

表8·ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因

中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	69	357.61	100.00		所有死亡原因	34	340.70	100.00		所有死亡原因	35	375.72	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	25	129.57	36.23	P00-P96	源於周產期的特定病況	15	150.31	44.12	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	11	118.08	31.43
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	20	103.65	28.99	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	9	90.18	26.47	P00-P96	源於周產期的特定病況	10	107.35	28.57
3	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	5	25.91	7.25	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	3	30.06	8.82	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	21.47	5.71
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	15.55	4.35	C00-C97	惡性腫瘤	2	20.04	5.88	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	21.47	5.71
5	C00-C97	惡性腫瘤	3	15.55	4.35	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	10.02	2.94	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	21.47	5.71
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	15.55	4.35	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	10.02	2.94	J12-J18	肺炎	1	10.73	2.86
7	J12-J18	肺炎	1	5.18	1.45	G00, G03	腦膜炎	1	10.02	2.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	10.73	2.86
8	I60-I69	腦血管疾病	1	5.18	1.45						I60-I69	腦血管疾病	1	10.73	2.86
9	G00, G03	腦膜炎	1	5.18	1.45						J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	10.73	2.86
10	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	5.18	1.45							其他	4	42.94	11.43
		其他	6	31.10	8.70		其他	2	20.04	5.88		其他	4	42.94	11.43

附註：0歲年中人口數為19,295人，其中男性為9,980人，女性為9,316人。

表9·ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因

中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	45	11.79	100.00		所有死亡原因	25	12.57	100.00		所有死亡原因	20	10.95	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	14	3.67	31.11	C00-C97	惡性腫瘤	9	4.53	36.00	C00-C97	惡性腫瘤	5	2.74	25.00
2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	1.31	11.11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	2.51	20.00	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	2	1.09	10.00
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	4	1.05	8.89	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	2	1.01	8.00	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染色體異常	2	1.09	10.00
4	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染色體異常	2	0.52	4.44	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.50	4.00	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	0.55	5.00
5	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.26	2.22	I60-I69	腦血管疾病	1	0.50	4.00	J12-J18	肺炎	1	0.55	5.00
6	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	0.26	2.22						A40-A41	敗血症	1	0.55	5.00
7	J12-J18	肺炎	1	0.26	2.22						P00-P96	源於周產期的特定 病況	1	0.55	5.00
8	A40-A41	敗血症	1	0.26	2.22										
9	P00-P96	源於周產期的特定 病況	1	0.26	2.22										
10	I60-I69	腦血管疾病	1	0.26	2.22										
		其他	14	3.67	31.11		其他	7	3.52	28.00		其他	7	3.83	35.00

附註：1-14歲年中人口數為381,617人，其中男性為198,889人，女性為182,728人。

表10·ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因

中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	101	31.79	100.00		所有死亡原因	70	42.68	100.00		所有死亡原因	31	20.18	100.00
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	36	11.33	35.64	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	28	17.07	40.00	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	5.86	29.03
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	20	6.30	19.80	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	6.71	15.71	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	5.21	25.81
3	C00-C97	惡性腫瘤	14	4.41	13.86	C00-C97	惡性腫瘤	8	4.88	11.43	C00-C97	惡性腫瘤	6	3.90	19.35
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	0.94	2.97	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	1.83	4.29	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.65	3.23
5	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.63	1.98	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.61	1.43	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.65	3.23
6	I60-I69	腦血管疾病	2	0.63	1.98	D50-D64	貧血	1	0.61	1.43	I60-I69	腦血管疾病	1	0.65	3.23
7	E10-E14	糖尿病	2	0.63	1.98	I60-I69	腦血管疾病	1	0.61	1.43	E10-E14	糖尿病	1	0.65	3.23
8	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.31	0.99	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.61	1.43					
9	D50-D64	貧血	1	0.31	0.99	E10-E14	糖尿病	1	0.61	1.43					
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.31	0.99										
		其他	19	5.98	18.81		其他	15	9.15	21.43		其他	4	2.60	12.90

附註：15-24歲年中人口數為317,673人，其中男性為164,019人，女性為153,654人。

表11·ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	703	86.24	100.00		所有死亡原因	462	121.24	100.00		所有死亡原因	241	55.52	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	217	26.62	30.87	C00-C97	惡性腫瘤	108	28.34	23.38	C00-C97	惡性腫瘤	109	25.11	45.23
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	106	13.00	15.08	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	70	18.37	15.15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	36	8.29	14.94
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	72	8.83	10.24	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	62	16.27	13.42	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	18	4.15	7.47
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	65	7.97	9.25	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	47	12.33	10.17	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	10	2.30	4.15
5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	34	4.17	4.84	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	33	8.66	7.14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	8	1.84	3.32
6	I60-I69	腦血管疾病	26	3.19	3.70	I60-I69	腦血管疾病	19	4.99	4.11	I60-I69	腦血管疾病	7	1.61	2.90
7	E10-E14	糖尿病	13	1.59	1.85	J12-J18	肺炎	8	2.10	1.73	E10-E14	糖尿病	5	1.15	2.07
8	J12-J18	肺炎	10	1.23	1.42	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	8	2.10	1.73	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	3	0.69	1.24
9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	9	1.10	1.28	E10-E14	糖尿病	8	2.10	1.73	A40-A41	敗血症	3	0.69	1.24
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	9	1.10	1.28	B20-B24	人類免疫缺乏病毒 (HIV)疾病	7	1.84	1.52	J12-J18	肺炎	2	0.46	0.83
		其他	142	17.42	20.20		其他	92	24.14	19.91		其他	40	9.22	16.60
11	B20-B24	人類免疫缺乏病毒 (HIV)疾病	8	0.98	1.14	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	5	1.31	1.08	B20-B24	人類免疫缺乏病毒 (HIV)疾病	1	0.23	0.41
12	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	8	0.98	1.14	I10-I15	高血壓性疾病	5	1.31	1.08	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	0.23	0.41
13	A40-A41	敗血症	6	0.74	0.85	A40-A41	敗血症	3	0.79	0.65	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	1	0.23	0.41
14	I10-I15	高血壓性疾病	5	0.61	0.71	I71	主動脈瘤及剝離	2	0.52	0.43	A15-A19	結核病	1	0.23	0.41
15	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	3	0.37	0.43	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	2	0.52	0.43	N00-N07, N17-N19	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	1	0.23	0.41

附註：25-44歲年中人口數為815,122人，其中男性為381,047人，女性為434,075人。

表12· ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	2,863	378.82	100.00		所有死亡原因	1,850	520.01	100.00		所有死亡原因	1,013	253.24	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,298	171.74	45.34	C00-C97	惡性腫瘤	734	206.32	39.68	C00-C97	惡性腫瘤	564	141.00	55.68
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	321	42.47	11.21	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	255	71.68	13.78	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	66	16.50	6.52
3	I60-I69	腦血管疾病	165	21.83	5.76	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	110	30.92	5.95	I60-I69	腦血管疾病	58	14.50	5.73
4	E10-E14	糖尿病	140	18.52	4.89	I60-I69	腦血管疾病	107	30.08	5.78	E10-E14	糖尿病	43	10.75	4.24
5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	134	17.73	4.68	E10-E14	糖尿病	97	27.27	5.24	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	37	9.25	3.65
6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	126	16.67	4.40	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	89	25.02	4.81	A40-A41	敗血症	24	6.00	2.37
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	91	12.04	3.18	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	72	20.24	3.89	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	24	6.00	2.37
8	A40-A41	敗血症	54	7.14	1.89	J12-J18	肺炎	35	9.84	1.89	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	20	5.00	1.97
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	46	6.09	1.61	I10-I15	高血壓性疾病	33	9.28	1.78	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	19	4.75	1.88
10	I10-I15	高血壓性疾病	44	5.82	1.54	A40-A41	敗血症	30	8.43	1.62	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	13	3.25	1.28
		其他	444	58.75	15.51		其他	288	80.95	15.57		其他	145	36.25	14.31
11	J12-J18	肺炎	43	5.69	1.50	N00-N07, N17-N	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	26	7.31	1.41	I10-I15	高血壓性疾病	11	2.75	1.09
12	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	19	2.51	0.66	I71	主動脈瘤及剝離	12	3.37	0.65	J12-J18	肺炎	8	2.00	0.79
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	16	2.12	0.56	B15-B19	病毒性肝炎	12	3.37	0.65	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	1.50	0.59
14	I71	主動脈瘤及剝離	15	1.98	0.52	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	2.81	0.54	D50-D64	貧血	4	1.00	0.39
15	B15-B19	病毒性肝炎	15	1.98	0.52	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	8	2.25	0.43	I71	主動脈瘤及剝離	3	0.75	0.30

附註：45-64歲年中人口數為755,775人，其中男性為355,766人，女性為400,009人。

表13·ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因

中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	4,529	1,897.61	100.00		所有死亡原因	2,634	2,399.41	100.00		所有死亡原因	1,895	1,470.23	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,624	680.44	35.86	C00-C97	惡性腫瘤	928	845.35	35.23	C00-C97	惡性腫瘤	696	539.99	36.73
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	543	227.51	11.99	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	335	305.16	12.72	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	208	161.38	10.98
3	I60-I69	腦血管疾病	345	144.55	7.62	I60-I69	腦血管疾病	199	181.28	7.56	E10-E14	糖尿病	170	131.89	8.97
4	E10-E14	糖尿病	319	133.66	7.04	E10-E14	糖尿病	149	135.73	5.66	I60-I69	腦血管疾病	146	113.27	7.70
5	J12-J18	肺炎	192	80.45	4.24	J12-J18	肺炎	134	122.07	5.09	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	78	60.52	4.12
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	152	63.69	3.36	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	112	102.03	4.25	J12-J18	肺炎	58	45.00	3.06
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	136	56.98	3.00	A40-A41	敗血症	74	67.41	2.81	A40-A41	敗血症	54	41.90	2.85
8	A40-A41	敗血症	128	53.63	2.83	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	74	67.41	2.81	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	53	41.12	2.80
9	I10-I15	高血壓性疾病	120	50.28	2.65	I10-I15	高血壓性疾病	69	62.85	2.62	I10-I15	高血壓性疾病	51	39.57	2.69
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	106	44.41	2.34	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	58	52.83	2.20	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	36	27.93	1.90
		其他	864	362.01	19.08		其他	502	457.29	19.06		其他	345	267.67	18.21
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	94	39.39	2.08	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	53	48.28	2.01	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	19.40	1.32
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	60	25.14	1.32	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	43	39.17	1.63	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	24	18.62	1.27
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	41	17.18	0.91	I71	主動脈瘤及剝離	22	20.04	0.84	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	17	13.19	0.90
14	I71	主動脈瘤及剝離	33	13.83	0.73	G20-G21	帕金森病	21	19.13	0.80	I71	主動脈瘤及剝離	11	8.53	0.58
15	G20-G21	帕金森病	30	12.57	0.66	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	14.58	0.61	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	11	8.53	0.58

附註：65-79歲年中人口數為238,669人，其中男性為109,777人，女性為128,892人。

表14·ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
		所有死亡原因	6,560	7,537.89	100.00		所有死亡原因	3,707	8,019.90	100.00		所有死亡原因	2,853	6,991.88	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,393	1,600.65	21.23	C00-C97	惡性腫瘤	882	1,908.16	23.79	C00-C97	惡性腫瘤	511	1,252.31	17.91
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	822	944.53	12.53	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	443	958.41	11.95	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	379	928.82	13.28
3	J12-J18	肺炎	593	681.40	9.04	J12-J18	肺炎	351	759.37	9.47	I60-I69	腦血管疾病	268	656.79	9.39
4	I60-I69	腦血管疾病	588	675.65	8.96	I60-I69	腦血管疾病	320	692.30	8.63	J12-J18	肺炎	242	593.07	8.48
5	E10-E14	糖尿病	351	403.32	5.35	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	252	545.19	6.80	E10-E14	糖尿病	183	448.48	6.41
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	341	391.83	5.20	E10-E14	糖尿病	168	363.46	4.53	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	152	372.51	5.33
7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	271	311.40	4.13	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	141	305.05	3.80	A40-A41	敗血症	126	308.79	4.42
8	A40-A41	敗血症	252	289.57	3.84	A40-A41	敗血症	126	272.59	3.40	I10-I15	高血壓性疾病	117	286.73	4.10
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	244	280.37	3.72	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	119	257.45	3.21	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	103	252.42	3.61
10	I10-I15	高血壓性疾病	216	248.20	3.29	I10-I15	高血壓性疾病	99	214.18	2.67	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	89	218.11	3.12
		其他	1,489	1,710.96	22.70		其他	806	1,743.74	21.74		其他	683	1,673.83	23.94
11	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	93	106.86	1.42	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	49	106.01	1.32	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	57	139.69	2.00
12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	83	95.37	1.27	G20-G21	帕金森病	37	80.05	1.00	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	39	95.58	1.37
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	75	86.18	1.14	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	36	77.88	0.97	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	34	83.32	1.19
14	G20-G21	帕金森病	57	65.50	0.87	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	36	77.88	0.97	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺 部病況(塵肺症及肺 炎除外)	23	56.37	0.81
15	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺 部病況(塵肺症及肺 炎除外)	53	60.90	0.81	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺 部病況(塵肺症及肺 炎除外)	30	64.90	0.81	G20-G21	帕金森病	20	49.01	0.70

附註：80歲以上年中人口數為87,027人，其中男性為46,223人，女性為40,805人。

表15·ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
總計	377	14.42	165	6.31	72	2.75	17	0.65	24	0.92	7	0.27	26	0.99	66	2.52
0歲	3	15.55	-	-	-	-	-	-	3	15.55	-	-	-	-	-	-
1-14歲	5	1.31	1	0.26	-	-	-	-	1	0.26	3	0.79	-	-	-	-
15-24歲	36	11.33	30	9.44	-	-	2	0.63	-	-	-	-	2	0.63	2	0.63
25-44歲	65	7.97	35	4.29	7	0.86	2	0.25	1	0.12	-	-	12	1.47	8	0.98
45-64歲	91	12.04	37	4.90	20	2.65	11	1.46	5	0.66	1	0.13	7	0.93	10	1.32
65-79歲	94	39.39	47	19.69	21	8.80	2	0.84	4	1.68	1	0.42	4	1.68	15	6.28
80歲以上	83	95.37	15	17.24	24	27.58	-	-	10	11.49	2	2.30	1	1.15	31	35.62

附註：臺北市年中人口數為2,615,176人。

表16·ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	260	20.54	110	8.69	55	4.35	13	1.03	15	1.19	7	0.55	14	1.11	46	3.63
0歲	1	10.02	-	-	-	-	-	-	1	10.02	-	-	-	-	-	-
1-14歲	5	2.51	1	1	-	-	-	-	1	0.50	3	1.51	-	-	-	-
15-24歲	28	17.07	24	14.63	-	-	2	1.22	-	-	-	-	-	-	2	1.22
25-44歲	47	12.33	23	6.04	6	1.57	2	0.52	1	0.26	-	-	8	2.10	7	1.84
45-64歲	72	20.24	27	7.59	18	5.06	7	1.97	4	1.12	1	0.28	5	1.41	10	2.81
65-79歲	58	52.83	27	24.60	13	11.84	2	1.82	3	2.73	1	0.91	1	0.91	11	10.02
80歲以上	49	106.01	8	17.31	18	38.94	-	-	5	10.82	2	4.33	-	-	16	34.62

附註：臺北市男性年中人口數為1,265,699人。

表17·ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	117	8.67	55	4.08	17	1.26	4	0.30	9	0.67	-	-	12	0.89	20	1.48
0歲	2	21.47	-	-	-	-	-	-	2	21.47	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	8	5.21	6	3.90	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.30	-	-
25-44歲	18	4.15	12	2.76	1	0.23	-	-	-	-	-	-	4	0.92	1	0.23
45-64歲	19	4.75	10	2.50	2	0.50	4	1.00	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-
65-79歲	36	27.93	20	15.52	8	6.21	-	-	1	0.78	-	-	3	2.33	4	3
80歲以上	34	83.32	7	17.15	6	14.70	-	-	5	12.25	-	-	1	2.45	15	36.76

附註：臺北市女性年中人口數為1,349,477人。

表18·ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		其他陸路運輸事故傷害		空中運輸事故傷害		運輸事故傷害的後遺症	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V70-V79		V80-V89		V95-V97		Y85	
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
合計	165	6.31	25	0.96	8	0.31	28	1.07	8	0.31	-	-	93	3.56	-	-	3	0.11
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-
15-24歲	30	9.44	-	-	1	0.31	11	3.46	1	0.31	-	-	17	5.35	-	-	-	-
25-44歲	35	4.29	1	0.12	2	0.25	9	1.10	4	0.49	-	-	19	2.33	-	-	-	-
45-64歲	37	4.90	2	0.26	4	0.53	7	0.93	1	0.13	-	-	22	2.91	-	-	1	0.13
65-79歲	47	19.69	16	6.70	1	0.42	1	0.42	2	0.84	-	-	26	10.89	-	-	1	0.42
80歲以上	15	17.24	6	6.89	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9.19	-	-	1	1.15

附註：臺北市年中人口數為2,615,176人。

表19·ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計 V01-V99,Y85		行人在運輸意外 事故中受傷 V01-V09		腳踏車騎乘者在 運輸事故傷害中 受傷 V10-V19		摩托車騎乘者在 運輸事故傷害中 受傷 V20-V29		汽車乘員[乘客或 員工(駕駛員)]在 運輸事故傷害中 受傷 V40-V49		巴士(公共汽車)乘員 [乘客或員工(駕駛 員)]在運輸事故傷害 中受傷 V70-V79		其他陸路運輸 事故傷害 V80-V89		空中運輸 事故傷害 V95-V97		運輸事故傷害 的後遺症 Y85	
	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
合計	110	8.69	10	0.79	5	0.40	23	1.82	6	0.47	-	-	64	5.06	-	-	2	0.16
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
15-24歲	24	14.63	-	-	1	0.61	9	5.49	-	-	-	-	14	8.54	-	-	-	-
25-44歲	23	6.04	-	-	2	0.52	7	1.84	4	1.05	-	-	10	2.62	-	-	-	-
45-64歲	27	7.59	2	0.56	2	0.56	6	1.69	1	0.28	-	-	15	4.22	-	-	1	0.28
65-79歲	27	24.60	6	5.47	-	-	1	0.91	1	0.91	-	-	19	17.31	-	-	-	-
80歲以上	8	17.31	2	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10.82	-	-	1	2.16

附註：臺北市男性年中人口數為1,265,699人。

表20·ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		其他陸路運輸事故傷害		空中運輸事故傷害		運輸事故傷害的後遺症	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V70-V79		V80-V89		V95-V97		Y85	
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
合計	55	4.08	15	1.11	3	0.22	5	0.37	2	0.15	-	-	29	2.15	-	-	1	0.07
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	6	3.90	-	-	-	-	2	1.30	1	0.65	-	-	3	1.95	-	-	-	-
25-44歲	12	2.76	1	0.23	-	-	2	0.46	-	-	-	-	9	2.07	-	-	-	-
45-64歲	10	2.50	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
65-79歲	20	15.52	10	7.76	1	0.78	-	-	1	0.78	-	-	7	5.43	-	-	1	0.78
80歲以上	7	17.15	4	9.80	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.35	-	-	-	-

附註：臺北市女性年中人口數為1,349,477人。

表21·ICD-10 臺北市自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	341	13.04	-	-	-	-	20	6.30	106	13.00	126	16.67	60	25.14	29	33.32
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	0.23	-	-	-	-	1	0.31	1	0.12	4	0.53	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	-	-	-	-	1	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	99	3.79	-	-	-	-	7	2.20	41	5.03	44	5.82	7	2.93	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.26	3	1.26	1	1.15
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	0.23	-	-	-	-	-	-	2	0.25	2	0.26	-	-	2	2.30
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	109	4.17	-	-	-	-	2	0.63	34	4.17	31	4.10	27	11.31	15	17.24
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	25	0.96	-	-	-	-	2	0.63	1	0.12	8	1.06	9	3.77	5	5.75
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	5	0.19	-	-	-	-	-	-	1	0.12	4	0.53	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	4	0.15	-	-	-	-	-	-	1	0.12	1	0.13	2	0.84	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	68	2.60	-	-	-	-	6	1.89	21	2.58	25	3.31	11	4.61	5	5.75
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	3	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.40	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	1	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	6	0.23	-	-	-	-	-	-	2	0.25	2	0.26	1	0.42	1	1.15

附註：臺北市年中人口數為2,615,176人。

表22·ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	234	18.49	-	-	-	-	11	6.71	70	18.37	89	25.02	43	39.17	21	45.43
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.24	-	-	-	-	1	0.61	1	0.26	1	0.28	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	1	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	72	5.69	-	-	-	-	2	1.22	27	7.09	36	10.12	7	6.38	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.28	1	0.91	1	2.16
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.32	-	-	-	-	-	-	1	0.26	2	0.56	-	-	1	2.16
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	81	6.40	-	-	-	-	2	1.22	24	6.30	23	6.46	21	19.13	11	23.80
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	19	1.50	-	-	-	-	2	1.22	-	-	8	2.25	6	5.47	3	6.49
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	4	0.32	-	-	-	-	-	-	1	0.26	3	0.84	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	1	0.91	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.92	-	-	-	-	2	1.22	11	2.89	14	3.94	6	5.47	4	8.65
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	1	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	5	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.52	1	0.28	1	0.91	1	2.16

附註：臺北市男性年中人口數為1,265,699人。

表23·ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	107	7.93	-	-	-	-	9	5.86	36	8.29	37	9.25	17	13.19	8	19.61
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	27	2.00	-	-	-	-	5	3.25	14	3.23	8	2.00	-	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	1.55	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-	1	2.45
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	28	2.07	-	-	-	-	-	-	10	2.30	8	2.00	6	4.66	4	9.80
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	6	0.44	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	3	2.33	2	4.90
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.78	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	31	2.30	-	-	-	-	4	2.60	10	2.30	11	2.75	5	3.88	1	2.45
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	3	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

附註：臺北市女性年中人口數為1,349,477人。

表24·ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	4,563	174.48	100.00	所有癌症死亡原因	2,671	211.03	100.00	所有癌症死亡原因	1,892	140.20	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	967	36.98	21.19	氣管、支氣管和肺癌	596	47.09	22.31	氣管、支氣管和肺癌	371	27.49	19.61
2	肝和肝內膽管癌	665	25.43	14.57	肝和肝內膽管癌	449	35.47	16.81	結腸、直腸和肛門癌	281	20.82	14.85
3	結腸、直腸和肛門癌	592	22.64	12.97	結腸、直腸和肛門癌	311	24.57	11.64	女性乳房癌	236	17.49	12.47
4	女性乳房癌(1)	236	17.49	5.17	胃癌	203	16.04	7.60	肝和肝內膽管癌	216	16.01	11.42
5	胃癌	319	12.20	6.99	前列腺(攝護腺)癌	142	11.22	5.32	胃癌	116	8.60	6.13
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	142	11.22	3.11	胰臟癌	137	10.82	5.13	胰臟癌	100	7.41	5.29
7	胰臟癌	237	9.06	5.19	口腔癌	136	10.75	5.09	子宮頸及部位未明示子宮癌	69	5.11	3.65
8	口腔癌	148	5.66	3.24	食道癌	109	8.61	4.08	卵巢癌	65	4.82	3.44
9	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	69	5.11	1.51	非何杰金氏淋巴瘤	77	6.08	2.88	白血病	42	3.11	2.22
10	食道癌	129	4.93	2.83	白血病	64	5.06	2.40	非何杰金氏淋巴瘤	42	3.11	2.22
	其他	1,059	40.49	23.21	其他	447	35.32	16.74	其他	354	26.23	18.71
11	卵巢癌(1)	65	4.82	1.42	膀胱癌	56	4.42	2.10	膽囊和其他膽道癌	35	2.59	1.85
12	非何杰金氏淋巴瘤	119	4.55	2.61	鼻咽癌	49	3.87	1.83	腎臟癌	28	2.07	1.48
13	白血病	106	4.05	2.32	腎臟癌	39	3.08	1.46	膀胱癌	24	1.78	1.27
14	膀胱癌	80	3.06	1.75	膽囊和其他膽道癌	38	3.00	1.42	子宮體癌	23	1.70	1.22
15	膽囊和其他膽道癌	73	2.79	1.60	腦癌	35	2.77	1.31	鼻咽癌	21	1.56	1.11

附註：1.臺北市年中人口數為2,615,176人，其中男性1,265,699人，女性1,349,477人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表25·ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	4,563	174.48	3	15.55	14	3.67	14	4.41	217	26.62	1,298	171.74	1,624	680.44	1,393	1,600.65		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	967	36.98	-	-	-	-	-	-	27	3.31	230	30.43	369	154.61	341	391.83		
2	C22	肝和肝內膽管癌	665	25.43	-	-	-	-	1	0.31	29	3.56	222	29.37	266	111.45	147	168.91		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	592	22.64	-	-	-	-	-	-	20	2.45	146	19.32	225	94.27	201	230.96		
4	C50	女性乳房癌(1)	236	17.49	-	-	-	-	-	-	30	6.91	116	29.00	55	42.67	35	85.77		
5	C16	胃癌	319	12.20	-	-	-	-	-	-	13	1.59	69	9.13	104	43.58	133	152.83		
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	142	11.22	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.25	48	43.73	86	186.06		
7	C25	胰臟癌	237	9.06	-	-	1	0.26	-	-	5	0.61	60	7.94	95	39.80	76	87.33		
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	148	5.66	-	-	-	-	-	-	10	1.23	84	11.11	36	15.08	18	20.68		
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	69	5.11	-	-	-	-	-	-	7	1.61	29	7.25	17	13.19	16	39.21		
10	C15	食道癌	129	4.93	-	-	-	-	-	-	4	0.49	49	6.48	47	19.69	29	33.32		
		其他	1,059	40.49	3	15.55	13	3.41	13	4.09	72	8.83	285	37.71	362	151.67	311	357.36		
11	C56	卵巢癌(1)	65	4.82	-	-	-	-	1	0.65	10	2.30	34	8.50	15	11.64	5	12.25		
12	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	119	4.55	-	-	1	0.26	-	-	8	0.98	27	3.57	36	15.08	47	54.01		
13	C91-C95	白血病	106	4.05	1	5.18	3	0.79	6	1.89	8	0.98	18	2.38	38	15.92	32	36.77		
14	C67	膀胱癌	80	3.06	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.85	23	9.64	43	49.41		
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	73	2.79	-	-	-	-	-	-	2	0.25	20	2.65	28	11.73	23	26.43		

附註：1.臺北市年中人口數為2,615,176人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表26·ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國98年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,671	211.03	2	20.04	9	4.53	8	4.88	108	28.34	734	206.32	928	845.35	882	1,908.16		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	596	47.09	-	-	-	-	-	-	15	3.94	120	33.73	216	196.76	245	530.04		
2	C22	肝和肝內膽管癌	449	35.47	-	-	-	-	1	0.61	25	6.56	177	49.75	166	151.22	80	173.08		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	311	24.57	-	-	-	-	-	-	11	2.89	75	21.08	114	103.85	111	240.14		
4	C16	胃癌	203	16.04	-	-	-	-	-	-	4	1.05	35	9.84	71	64.68	93	201.20		
5	C61	前列腺(攝護腺)癌	142	11.22	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.25	48	43.73	86	186.06		
6	C25	胰臟癌	137	10.82	-	-	1	0.50	-	-	3	0.79	39	10.96	43	39.17	51	110.34		
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	136	10.75	-	-	-	-	-	-	10	2.62	84	23.61	30	27.33	12	25.96		
8	C15	食道癌	109	8.61	-	-	-	-	-	-	4	1.05	46	12.93	38	34.62	21	45.43		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	77	6.08	-	-	1	0.50	-	-	2	0.52	14	3.94	30	27.33	30	64.90		
10	C91-C95	白血病	64	5.06	1	10.02	2	1.01	4	2.44	2	0.52	11	3.09	24	21.86	20	43.27		
		其他	447	35.32	1	10.02	5	2.51	3	1.83	32	8.40	125	35.14	148	134.82	133	287.74		
11	C67	膀胱癌	56	4.42	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.81	16	14.58	30	64.90		
12	C11	鼻咽癌	49	3.87	-	-	-	-	-	-	8	2.10	24	6.75	15	13.66	2	4.33		
13	C64-C65	腎臟癌	39	3.08	-	-	-	-	-	-	2	0.52	12	3.37	17	15.49	8	17.31		
14	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	38	3.00	-	-	-	-	-	-	1	0.26	9	2.53	12	10.93	16	34.62		
15	C71	腦癌	35	2.77	1	10.02	1	0.50	1	0.61	5	1.31	10	2.81	8	7.29	9	19.47		

附註：1.臺北市男性年中人口數為1,265,699人。

表27·ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國98年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-4歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	1,892	140.20	1	10.73	-	-	6	3.90	109	25.11	564	141.00	696	539.99	511	1,252.31		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	371	27.49	-	-	-	-	-	-	12	2.76	110	27.50	153	118.70	96	235.27		
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	281	20.82	-	-	-	-	-	-	9	2.07	71	17.75	111	86.12	90	220.56		
3	C50	女性乳房癌	236	17.49	-	-	-	-	-	-	30	6.91	116	29.00	55	42.67	35	85.77		
4	C22	肝和肝內膽管癌	216	16.01	-	-	-	-	-	-	4	0.92	45	11.25	100	77.58	67	164.20		
5	C16	胃癌	116	8.60	-	-	-	-	-	-	9	2.07	34	8.50	33	25.60	40	98.03		
6	C25	胰臟癌	100	7.41	-	-	-	-	-	-	2	0.46	21	5.25	52	40.34	25	61.27		
7	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	69	5.11	-	-	-	-	-	-	7	1.61	29	7.25	17	13.19	16	39.21		
8	C56	卵巢癌	65	4.82	-	-	-	-	1	0.65	10	2.30	34	8.50	15	11.64	5	12.25		
9	C91-C95	白血病	42	3.11	-	-	-	-	2	1.30	6	1.38	7	1.75	14	10.86	12	29.41		
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	42	3.11	-	-	-	-	-	-	6	1.38	13	3.25	6	4.66	17	41.66		
		其他	354	26.23	1	10.73	-	-	3	1.95	14	3.23	84	21.00	140	108.62	108	264.68		
11	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	35	2.59	-	-	-	-	-	-	1	0.23	11	2.75	16	12.41	7	17.15		
12	C64-C65	腎臟癌	28	2.07	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	11	8.53	10	24.51		
13	C67	膀胱癌	24	1.78	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	7	5.43	13	31.86		
14	C54	子宮體癌	23	1.70	-	-	-	-	-	-	2	0.46	10	2.50	9	6.98	2	4.90		
15	C11	鼻咽癌	21	1.56	-	-	-	-	1	0.65	2	0.46	7	1.75	8	6.21	3	7.35		

附註：1.臺北市女性年中人口數為1,349,477人。

表28-1·ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	總計	1,044	499.41	100.00	所有死亡原因	583	587.72	100.00	所有死亡原因	461	419.67	100.00
1	惡性腫瘤	331	158.34	31.70	惡性腫瘤	175	176.42	30.02	惡性腫瘤	156	142.01	33.84
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	124	59.32	11.88	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	75	75.61	12.86	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	49	44.61	10.63
3	腦血管疾病	78	37.31	7.47	腦血管疾病	45	45.36	7.72	腦血管疾病	33	30.04	7.16
4	糖尿病	72	34.44	6.90	糖尿病	39	39.32	6.69	糖尿病	33	30.04	7.16
5	肺炎	48	22.96	4.60	肺炎	29	29.23	4.97	敗血症	24	21.85	5.21
6	高血壓性疾病	34	16.26	3.26	慢性下呼吸道疾病	22	22.18	3.77	肺炎	19	17.30	4.12
7	敗血症	34	16.26	3.26	高血壓性疾病	20	20.16	3.43	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	12.74	3.04
8	慢性下呼吸道疾病	33	15.79	3.16	慢性肝病及肝硬化	19	19.15	3.26	高血壓性疾病	14	12.74	3.04
9	慢性肝病及肝硬化	32	15.31	3.07	事故傷害	14	14.11	2.40	慢性肝病及肝硬化	13	11.83	2.82
10	腎炎、腎病徵候群及腎病變	21	10.05	2.01	腎炎、腎病徵候群及腎病變	13	13.11	2.23	慢性下呼吸道疾病	11	10.01	2.39
	其他	237	113.37	22.70	其他	132	133.07	22.64	其他	95	86.48	20.61
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20	9.57	1.92	敗血症	10	10.08	1.72	血管性及未明示之癡呆症	10	9.10	2.17
12	事故傷害	20	9.57	1.92	蓄意自我傷害(自殺)	10	10.08	1.72	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	7.28	1.74
13	蓄意自我傷害(自殺)	14	6.70	1.34	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	9	9.07	1.54	事故傷害	6	5.46	1.30
14	血管性及未明示之癡呆症	10	4.78	0.96	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	6.05	1.03	蓄意自我傷害(自殺)	4	3.64	0.87
15	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	9	4.31	0.86	帕金森病	4	4.03	0.69	主動脈瘤及剝離	3	2.73	0.65

表28-2·ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 性 別 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 性 別 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,357	598.94	100.00	所有死亡原因	831	757.68	100.00	所有死亡原因	526	449.99	100.00
1	惡性腫瘤	437	192.88	32.20	惡性腫瘤	262	238.88	31.53	惡性腫瘤	175	149.71	33.27
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	142	62.67	10.46	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	92	83.88	11.07	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	42.78	9.51
3	腦血管疾病	111	48.99	8.18	腦血管疾病	69	62.91	8.30	腦血管疾病	42	35.93	7.98
4	糖尿病	81	35.75	5.97	肺炎	50	45.59	6.02	糖尿病	42	35.93	7.98
5	肺炎	74	32.66	5.45	慢性下呼吸道疾病	44	40.12	5.29	肺炎	24	20.53	4.56
6	慢性下呼吸道疾病	49	21.63	3.61	糖尿病	39	35.56	4.69	高血壓性疾病	20	17.11	3.80
7	敗血症	48	21.19	3.54	敗血症	29	26.44	3.49	敗血症	19	16.25	3.61
8	高血壓性疾病	44	19.42	3.24	事故傷害	26	23.71	3.13	腎炎、腎病徵候群及腎病變	17	14.54	3.23
9	腎炎、腎病徵候群及腎病變	42	18.54	3.10	腎炎、腎病徵候群及腎病變	25	22.79	3.01	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	11.98	2.66
10	事故傷害	34	15.01	2.51	高血壓性疾病	24	21.88	2.89	慢性肝病及肝硬化	12	10.27	2.28
	其他	295	130.20	21.74	其他	171	155.91	20.58	其他	111	94.96	21.10
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	30	13.24	2.21	慢性肝病及肝硬化	18	16.41	2.17	蓄意自我傷害(自殺)	12	10.27	2.28
12	慢性肝病及肝硬化	30	13.24	2.21	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	14.59	1.93	事故傷害	8	6.84	1.52
13	蓄意自我傷害(自殺)	24	10.59	1.77	蓄意自我傷害(自殺)	12	10.94	1.44	血管性及未明示之癡呆症	7	5.99	1.33
14	血管性及未明示之癡呆症	11	4.86	0.81	結核病	7	6.38	0.84	膽結石及其他膽囊疾患	6	5.13	1.14
15	帕金森病	8	3.53	0.59	帕金森病	6	5.47	0.72	慢性下呼吸道疾病	5	4.28	0.95

表28-3 · ICD-10 臺北市大安區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,667	533.05	100.00	所有死亡原因	965	653.73	100.00	所有死亡原因	702	425.16	100.00
1	惡性腫瘤	549	175.55	32.93	惡性腫瘤	312	211.36	32.33	惡性腫瘤	237	143.54	33.76
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	200	63.95	12.00	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	119	80.62	12.33	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	81	49.06	11.54
3	腦血管疾病	115	36.77	6.90	腦血管疾病	60	40.65	6.22	腦血管疾病	55	33.31	7.83
4	肺炎	98	31.34	5.88	肺炎	59	39.97	6.11	肺炎	39	23.62	5.56
5	糖尿病	75	23.98	4.50	慢性下呼吸道疾病	42	28.45	4.35	糖尿病	36	21.80	5.13
6	慢性下呼吸道疾病	56	17.91	3.36	糖尿病	39	26.42	4.04	高血壓性疾病	26	15.75	3.70
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	49	15.67	2.94	腎炎、腎病徵候群及腎病變	32	21.68	3.32	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	12.72	2.99
8	高血壓性疾病	48	15.35	2.88	事故傷害	25	16.94	2.59	敗血症	18	10.90	2.56
9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	42	13.43	2.52	慢性肝病及肝硬化	24	16.26	2.49	腎炎、腎病徵候群及腎病變	17	10.30	2.42
10	敗血症	41	13.11	2.46	敗血症	23	15.58	2.38	慢性下呼吸道疾病	14	8.48	1.99
	其他	394	125.99	23.64	其他	230	155.81	23.83	其他	158	95.69	22.51
11	事故傷害	38	12.15	2.28	高血壓性疾病	22	14.90	2.28	事故傷害	13	7.87	1.85
12	慢性肝病及肝硬化	33	10.55	1.98	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	14.23	2.18	蓄意自我傷害(自殺)	13	7.87	1.85
13	蓄意自我傷害(自殺)	31	9.91	1.86	蓄意自我傷害(自殺)	18	12.19	1.87	慢性肝病及肝硬化	9	5.45	1.28
14	帕金森病	17	5.44	1.02	帕金森病	12	8.13	1.24	主動脈瘤及剝離	7	4.24	1.00
15	主動脈瘤及剝離	16	5.12	0.96	主動脈瘤及剝離	9	6.10	0.93	血管性及未明示之癱瘓症	5	3.03	0.71

表28-4 · ICD-10 臺北市中山區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,192	545.43	100.00	所有死亡原因	674	652.27	100.00	所有死亡原因	518	449.61	100.00
1	惡性腫瘤	417	190.81	34.98	惡性腫瘤	233	225.49	34.57	惡性腫瘤	184	159.71	35.52
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	143	65.43	12.00	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	83	80.32	12.31	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	60	52.08	11.58
3	腦血管疾病	96	43.93	8.05	肺炎	50	48.39	7.42	腦血管疾病	46	39.93	8.88
4	肺炎	76	34.78	6.38	腦血管疾病	50	48.39	7.42	肺炎	26	22.57	5.02
5	糖尿病	47	21.51	3.94	慢性肝病及肝硬化	26	25.16	3.86	糖尿病	22	19.10	4.25
6	腎炎、腎病徵候群及腎病變	39	17.85	3.27	糖尿病	25	24.19	3.71	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19	16.49	3.67
7	敗血症	36	16.47	3.02	慢性下呼吸道疾病	23	22.26	3.41	腎炎、腎病徵候群及腎病變	17	14.76	3.28
8	慢性肝病及肝硬化	33	15.10	2.77	腎炎、腎病徵候群及腎病變	22	21.29	3.26	高血壓性疾病	16	13.89	3.09
9	蓄意自我傷害(自殺)	31	14.18	2.60	敗血症	20	19.36	2.97	敗血症	16	13.89	3.09
10	慢性下呼吸道疾病	29	13.27	2.43	事故傷害	19	18.39	2.82	蓄意自我傷害(自殺)	13	11.28	2.51
	其他	245	112.11	20.55	其他	123	119.03	18.25	其他	99	85.93	19.11
11	高血壓性疾病	28	12.81	2.35	蓄意自我傷害(自殺)	18	17.42	2.67	事故傷害	9	7.81	1.74
12	事故傷害	28	12.81	2.35	高血壓性疾病	12	11.61	1.78	慢性肝病及肝硬化	7	6.08	1.35
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	11.44	2.10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	5.81	0.89	慢性下呼吸道疾病	6	5.21	1.16
14	主動脈瘤及剝離	7	3.20	0.59	血管性及未明示之癱瘓症	5	4.84	0.74	主動脈瘤及剝離	3	2.60	0.58
15	血管性及未明示之癱瘓症	7	3.20	0.59	主動脈瘤及剝離	4	3.87	0.59	血管性及未明示之癱瘓症	2	1.74	0.39

表28-5 · ICD-10 臺北市中正區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	897	563.99	100.00	所有死亡原因	522	678.48	100.00	所有死亡原因	375	456.72	100.00
1	惡性腫瘤	276	173.54	30.77	惡性腫瘤	150	194.96	28.74	惡性腫瘤	126	153.46	33.60
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	116	72.94	12.93	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	74	96.18	14.18	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	51.15	11.20
3	腦血管疾病	58	36.47	6.47	腦血管疾病	35	45.49	6.70	糖尿病	25	30.45	6.67
4	肺炎	49	30.81	5.46	肺炎	30	38.99	5.75	腦血管疾病	23	28.01	6.13
5	糖尿病	46	28.92	5.13	慢性下呼吸道疾病	23	29.89	4.41	肺炎	19	23.14	5.07
6	敗血症	31	19.49	3.46	糖尿病	21	27.30	4.02	腎炎、腎病徵候群及腎病變	19	23.14	5.07
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	31	19.49	3.46	敗血症	16	20.80	3.07	敗血症	15	18.27	4.00
8	慢性下呼吸道疾病	27	16.98	3.01	高血壓性疾病	15	19.50	2.87	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	9.74	2.13
9	事故傷害	23	14.46	2.56	事故傷害	15	19.50	2.87	事故傷害	8	9.74	2.13
10	高血壓性疾病	21	13.20	2.34	蓄意自我傷害(自殺)	15	19.50	2.87	慢性肝病及肝硬化	7	8.53	1.87
	其他	219	137.70	24.41	其他	128	166.37	24.52	其他	83	101.09	22.13
11	蓄意自我傷害(自殺)	20	12.58	2.23	腎炎、腎病徵候群及腎病變	12	15.60	2.30	血管性及未明示之癱瘓症	6	7.31	1.60
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19	11.95	2.12	慢性肝病及肝硬化	12	15.60	2.30	高血壓性疾病	6	7.31	1.60
13	慢性肝病及肝硬化	19	11.95	2.12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	14.30	2.11	蓄意自我傷害(自殺)	5	6.09	1.33
14	帕金森病	10	6.29	1.11	帕金森病	7	9.10	1.34	慢性下呼吸道疾病	4	4.87	1.07
15	血管性及未明示之癱瘓症	8	5.03	0.89	結核病	5	6.50	0.96	帕金森病	3	3.65	0.80

表28-6 · ICD-10 臺北市大同區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	859	692.60	100.00	所有死亡原因	483	787.41	100.00	所有死亡原因	376	599.81	100.00
1	惡性腫瘤	255	205.60	29.69	惡性腫瘤	149	242.91	30.85	惡性腫瘤	106	169.10	28.19
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	105	84.66	12.22	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	64	104.34	13.25	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	65.41	10.90
3	腦血管疾病	84	67.73	9.78	腦血管疾病	47	76.62	9.73	腦血管疾病	37	59.02	9.84
4	糖尿病	58	46.76	6.75	糖尿病	27	44.02	5.59	糖尿病	31	49.45	8.24
5	肺炎	41	33.06	4.77	肺炎	23	37.50	4.76	敗血症	20	31.91	5.32
6	敗血症	32	25.80	3.73	事故傷害	18	29.34	3.73	肺炎	18	28.71	4.79
7	慢性下呼吸道疾病	27	21.77	3.14	慢性下呼吸道疾病	18	29.34	3.73	腎炎、腎病徵候群及腎病變	13	20.74	3.46
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	26	20.96	3.03	腎炎、腎病徵候群及腎病變	13	21.19	2.69	高血壓性疾病	11	17.55	2.93
9	事故傷害	26	20.96	3.03	蓄意自我傷害(自殺)	13	21.19	2.69	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	15.95	2.66
10	慢性肝病及肝硬化	19	15.32	2.21	敗血症	12	19.56	2.48	慢性下呼吸道疾病	9	14.36	2.39
	其他	186	149.97	21.65	其他	99	161.40	20.50	其他	80	127.62	21.28
11	高血壓性疾病	17	13.71	1.98	慢性肝病及肝硬化	12	19.56	2.48	事故傷害	8	12.76	2.13
12	蓄意自我傷害(自殺)	16	12.90	1.86	高血壓性疾病	6	9.78	1.24	慢性肝病及肝硬化	7	11.17	1.86
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	12.09	1.75	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	8.15	1.04	血管性及未明示之癡呆症	4	6.38	1.06
14	血管性及未明示之癡呆症	8	6.45	0.93	血管性及未明示之癡呆症	4	6.52	0.83	先天性畸形變形及染色體異常	3	4.79	0.80
15	主動脈瘤及剝離	4	3.23	0.47	主動脈瘤及剝離	3	4.89	0.62	蓄意自我傷害(自殺)	3	4.79	0.80

表28-7·ICD-10 臺北市萬華區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 性 別 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 性 別 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,552	819.43	100.00	所有死亡原因	954	1,003.63	100.00	所有死亡原因	598	633.85	100.00
1	惡性腫瘤	419	221.23	27.00	惡性腫瘤	277	291.41	29.04	惡性腫瘤	142	150.51	23.75
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	175	92.40	11.28	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	110	115.72	11.53	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	65	68.90	10.87
3	腦血管疾病	118	62.30	7.60	腦血管疾病	68	71.54	7.13	糖尿病	51	54.06	8.53
4	糖尿病	105	55.44	6.77	肺炎	62	65.23	6.50	腦血管疾病	50	53.00	8.36
5	肺炎	95	50.16	6.12	糖尿病	54	56.81	5.66	肺炎	33	34.98	5.52
6	敗血症	60	31.68	3.87	敗血症	38	39.98	3.98	敗血症	22	23.32	3.68
7	蓄意自我傷害(自殺)	53	27.98	3.41	慢性下呼吸道疾病	38	39.98	3.98	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20	21.20	3.34
8	慢性下呼吸道疾病	52	27.46	3.35	蓄意自我傷害(自殺)	38	39.98	3.98	高血壓性疾病	20	21.20	3.34
9	腎炎、腎病徵候群及腎病變	47	24.82	3.03	慢性肝病及肝硬化	31	32.61	3.25	腎炎、腎病徵候群及腎病變	17	18.02	2.84
10	慢性肝病及肝硬化	45	23.76	2.90	腎炎、腎病徵候群及腎病變	30	31.56	3.14	事故傷害	15	15.90	2.51
	其他	383	202.22	24.68	其他	208	218.82	21.80	其他	163	172.77	27.26
11	高血壓性疾病	43	22.70	2.77	高血壓性疾病	23	24.20	2.41	蓄意自我傷害(自殺)	15	15.90	2.51
12	事故傷害	32	16.90	2.06	事故傷害	17	17.88	1.78	慢性下呼吸道疾病	14	14.84	2.34
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	28	14.78	1.80	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	8.42	0.84	慢性肝病及肝硬化	14	14.84	2.34
14	帕金森病	9	4.75	0.58	帕金森病	6	6.31	0.63	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	5	5.30	0.84
15	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	8	4.22	0.52	結核病	5	5.26	0.52	先天性畸形變形及染色體異常	4	4.24	0.67

表28-8 · ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,406	538.09	100.00	所有死亡原因	865	681.10	100.00	所有死亡原因	541	402.85	100.00
1	惡性腫瘤	394	150.79	28.02	惡性腫瘤	243	191.34	28.09	惡性腫瘤	151	112.44	27.91
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	166	63.53	11.81	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	112	88.19	12.95	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	54	40.21	9.98
3	腦血管疾病	105	40.18	7.47	腦血管疾病	54	42.52	6.24	腦血管疾病	51	37.98	9.43
4	糖尿病	68	26.02	4.84	慢性下呼吸道疾病	47	37.01	5.43	糖尿病	31	23.08	5.73
5	肺炎	64	24.49	4.55	肺炎	44	34.65	5.09	高血壓性疾病	24	17.87	4.44
6	慢性下呼吸道疾病	58	22.20	4.13	糖尿病	37	29.13	4.28	肺炎	20	14.89	3.70
7	高血壓性疾病	51	19.52	3.63	事故傷害	29	22.83	3.35	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20	14.89	3.70
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	43	16.46	3.06	高血壓性疾病	27	21.26	3.12	腎炎、腎病徵候群及腎病變	20	14.89	3.70
9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	41	15.69	2.92	腎炎、腎病徵候群及腎病變	23	18.11	2.66	敗血症	13	9.68	2.40
10	事故傷害	38	14.54	2.70	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	16.54	2.43	慢性肝病及肝硬化	12	8.94	2.22
	其他	378	144.66	26.88	其他	228	179.53	26.36	其他	145	107.97	26.80
11	敗血症	32	12.25	2.28	敗血症	19	14.96	2.20	慢性下呼吸道疾病	11	8.19	2.03
12	慢性肝病及肝硬化	29	11.10	2.06	慢性肝病及肝硬化	17	13.39	1.97	蓄意自我傷害(自殺)	10	7.45	1.85
13	蓄意自我傷害(自殺)	26	9.95	1.85	蓄意自我傷害(自殺)	16	12.60	1.85	事故傷害	9	6.70	1.66
14	血管性及未明示之癡呆症	11	4.21	0.78	血管性及未明示之癡呆症	7	5.51	0.81	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	6	4.47	1.11
15	結核病	11	4.21	0.78	病毒性肝炎	7	5.51	0.81	結核病	5	3.72	0.92

表28-9 · ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 性 別 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 性 別 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	667	588.13	100.00	所有死亡原因	394	701.74	100.00	所有死亡原因	273	476.74	100.00
1	惡性腫瘤	206	181.64	30.88	惡性腫瘤	130	231.54	32.99	惡性腫瘤	76	132.72	27.84
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	79	69.66	11.84	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44	78.37	11.17	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	61.12	12.82
3	腦血管疾病	48	42.32	7.20	肺炎	25	44.53	6.35	腦血管疾病	28	48.90	10.26
4	肺炎	42	37.03	6.30	腦血管疾病	20	35.62	5.08	肺炎	17	29.69	6.23
5	糖尿病	33	29.10	4.95	糖尿病	18	32.06	4.57	糖尿病	15	26.19	5.49
6	慢性肝病及肝硬化	23	20.28	3.45	慢性下呼吸道疾病	15	26.72	3.81	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	22.70	4.76
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	22	19.40	3.30	慢性肝病及肝硬化	15	26.72	3.81	事故傷害	12	20.96	4.40
8	慢性下呼吸道疾病	22	19.40	3.30	腎炎、腎病徵候群及腎病變	14	24.93	3.55	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	13.97	2.93
9	事故傷害	20	17.64	3.00	蓄意自我傷害(自殺)	14	24.93	3.55	慢性肝病及肝硬化	8	13.97	2.93
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	14.99	2.55	事故傷害	8	14.25	2.03	慢性下呼吸道疾病	7	12.22	2.56
	其他	155	136.67	23.24	其他	91	162.08	23.10	其他	54	94.30	19.78
11	蓄意自我傷害(自殺)	16	14.11	2.40	敗血症	7	12.47	1.78	高血壓性疾病	6	10.48	2.20
12	高血壓性疾病	12	10.58	1.80	高血壓性疾病	6	10.69	1.52	敗血症	5	8.73	1.83
13	敗血症	12	10.58	1.80	主動脈瘤及剝離	4	7.12	1.02	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	2	3.49	0.73
14	血管性及未明示之癱瘓症	5	4.41	0.75	血管性及未明示之癱瘓症	4	7.12	1.02	蓄意自我傷害(自殺)	2	3.49	0.73
15	主動脈瘤及剝離	4	3.53	0.60	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	7.12	1.02	皮膚及皮下組織疾病	1	1.75	0.37

表28-10·ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 性 別 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 性 別 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,170	437.78	100.00	所有死亡原因	686	530.68	100.00	所有死亡原因	484	350.75	100.00
1	惡性腫瘤	365	136.57	31.20	惡性腫瘤	204	157.81	29.74	惡性腫瘤	161	116.68	33.26
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	133	49.77	11.37	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	88	68.08	12.83	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	32.61	9.30
3	腦血管疾病	90	33.68	7.69	腦血管疾病	66	51.06	9.62	糖尿病	37	26.81	7.64
4	糖尿病	65	24.32	5.56	肺炎	34	26.30	4.96	肺炎	26	18.84	5.37
5	肺炎	60	22.45	5.13	事故傷害	30	23.21	4.37	腦血管疾病	24	17.39	4.96
6	事故傷害	41	15.34	3.50	蓄意自我傷害(自殺)	29	22.43	4.23	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	15.22	4.34
7	蓄意自我傷害(自殺)	37	13.84	3.16	糖尿病	28	21.66	4.08	腎炎、腎病徵候群及腎病變	21	15.22	4.34
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	36	13.47	3.08	高血壓性疾病	18	13.92	2.62	敗血症	19	13.77	3.93
9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	35	13.10	2.99	慢性下呼吸道疾病	18	13.92	2.62	血管性及未明示之癡呆症	12	8.70	2.48
10	敗血症	31	11.60	2.65	慢性肝病及肝硬化	17	13.15	2.48	事故傷害	11	7.97	2.27
	其他	277	103.65	23.68	其他	154	119.13	22.45	其他	107	77.54	22.11
11	慢性下呼吸道疾病	29	10.85	2.48	腎炎、腎病徵候群及腎病變	15	11.60	2.19	慢性下呼吸道疾病	11	7.97	2.27
12	高血壓性疾病	26	9.73	2.22	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	10.83	2.04	高血壓性疾病	8	5.80	1.65
13	慢性肝病及肝硬化	25	9.35	2.14	敗血症	12	9.28	1.75	慢性肝病及肝硬化	8	5.80	1.65
14	血管性及未明示之癡呆症	18	6.74	1.54	血管性及未明示之癡呆症	6	4.64	0.87	蓄意自我傷害(自殺)	8	5.80	1.65
15	主動脈瘤及剝離	7	2.62	0.60	主動脈瘤及剝離	4	3.09	0.58	主動脈瘤及剝離	3	2.17	0.62

表28-11·ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,620	568.50	100.00	所有死亡原因	958	689.23	100.00	所有死亡原因	662	453.53	100.00
1	惡性腫瘤	482	169.15	29.75	惡性腫瘤	279	200.73	29.12	惡性腫瘤	203	139.07	30.66
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	216	75.80	13.33	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	133	95.69	13.88	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	83	56.86	12.54
3	腦血管疾病	115	40.36	7.10	腦血管疾病	66	47.48	6.89	腦血管疾病	49	33.57	7.40
4	糖尿病	97	34.04	5.99	肺炎	58	41.73	6.05	糖尿病	40	27.40	6.04
5	肺炎	93	32.64	5.74	糖尿病	57	41.01	5.95	肺炎	35	23.98	5.29
6	慢性下呼吸道疾病	56	19.65	3.46	慢性下呼吸道疾病	44	31.66	4.59	腎炎、腎病徵候群及腎病變	23	15.76	3.47
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	53	18.60	3.27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	30	21.58	3.13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20	13.70	3.02
8	敗血症	42	14.74	2.59	事故傷害	30	21.58	3.13	敗血症	18	12.33	2.72
9	事故傷害	38	13.34	2.35	敗血症	24	17.27	2.51	高血壓性疾病	17	11.65	2.57
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	34	11.93	2.10	慢性肝病及肝硬化	21	15.11	2.19	慢性肝病及肝硬化	13	8.91	1.96
	其他	394	138.27	24.32	其他	216	155.40	22.55	其他	161	110.30	24.32
11	慢性肝病及肝硬化	34	11.93	2.10	蓄意自我傷害(自殺)	19	13.67	1.98	慢性下呼吸道疾病	12	8.22	1.81
12	高血壓性疾病	31	10.88	1.91	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	10.07	1.46	蓄意自我傷害(自殺)	10	6.85	1.51
13	蓄意自我傷害(自殺)	29	10.18	1.79	高血壓性疾病	14	10.07	1.46	事故傷害	8	5.48	1.21
14	主動脈瘤及剝離	11	3.86	0.68	主動脈瘤及剝離	7	5.04	0.73	血管性及未明示之癱瘓症	6	4.11	0.91
15	血管性及未明示之癱瘓症	11	3.86	0.68	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	7	5.04	0.73	主動脈瘤及剝離	4	2.74	0.60

表28-12·ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,439	578.14	100.00	所有死亡原因	867	715.71	100.00	所有死亡原因	572	447.71	100.00
1	惡性腫瘤	432	173.56	30.02	惡性腫瘤	257	212.15	29.64	惡性腫瘤	175	136.97	30.59
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	169	67.90	11.74	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	107	88.33	12.34	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	62	48.53	10.84
3	腦血管疾病	110	44.19	7.64	腦血管疾病	67	55.31	7.73	腦血管疾病	43	33.66	7.52
4	肺炎	100	40.18	6.95	肺炎	64	52.83	7.38	糖尿病	39	30.53	6.82
5	糖尿病	78	31.34	5.42	慢性下呼吸道疾病	43	35.50	4.96	肺炎	36	28.18	6.29
6	慢性下呼吸道疾病	58	23.30	4.03	糖尿病	39	32.19	4.50	腎炎、腎病徵候群及腎病變	22	17.22	3.85
7	蓄意自我傷害(自殺)	44	17.68	3.06	蓄意自我傷害(自殺)	32	26.42	3.69	敗血症	19	14.87	3.32
8	敗血症	42	16.87	2.92	事故傷害	29	23.94	3.34	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	18	14.09	3.15
9	腎炎、腎病徵候群及腎病變	42	16.87	2.92	敗血症	23	18.99	2.65	慢性下呼吸道疾病	15	11.74	2.62
10	事故傷害	39	15.67	2.71	腎炎、腎病徵候群及腎病變	20	16.51	2.31	蓄意自我傷害(自殺)	12	9.39	2.10
	其他	325	130.57	22.59	其他	186	153.54	21.45	其他	131	102.53	22.90
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	34	13.66	2.36	慢性肝病及肝硬化	20	16.51	2.31	高血壓性疾病	11	8.61	1.92
12	高血壓性疾病	30	12.05	2.08	高血壓性疾病	19	15.68	2.19	事故傷害	10	7.83	1.75
13	慢性肝病及肝硬化	27	10.85	1.88	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	13.21	1.85	血管性及未明示之癱瘓症	9	7.04	1.57
14	帕金森病	15	6.03	1.04	帕金森病	8	6.60	0.92	帕金森病	7	5.48	1.22
15	血管性及未明示之癱瘓症	11	4.42	0.76	主動脈瘤及剝離	6	4.95	0.69	慢性肝病及肝硬化	7	5.48	1.22

表29-1·ICD-10 臺北市松山區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	20	9.57	100.00	14	14.11	100.00	6	5.46	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	10	4.78	50.00	6	6.05	42.86	4	3.64	66.67
W00-W19	跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.48	5.00	1	1.01	7.14	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.44	15.00	2	2.02	14.29	1	0.91	16.67
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.48	5.00	1	1.01	7.14	-	-	-
	其他	5	2.39	25.00	4	4.03	28.57	1	0.91	16.67

表29-2·ICD-10 臺北市信義區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	34	15.01	100.00	26	23.71	100.00	8	6.84	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	16	7.06	47.06	11	10.03	42.31	5	4.28	62.50
W00-W19	跌倒(落)	8	3.53	23.53	7	6.38	26.92	1	0.86	12.50
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.44	2.94	1	0.91	3.85	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.44	2.94	1	0.91	3.85	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	8	3.53	23.53	6	5.47	23.08	2	1.71	25.00

表29-3·ICD-10 臺北市大安區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	38	12.15	100.00	25	16.94	100.00	13	7.87	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	14	4.48	36.84	10	6.77	40.00	4	2.42	30.77
W00-W19	跌倒(落)	9	2.88	23.68	5	3.39	20.00	4	2.42	30.77
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.32	2.63	1	0.68	4.00	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	0.96	7.89	2	1.35	8.00	1	0.61	7.69
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	11	3.52	28.95	7	4.74	28.00	4	2.42	30.77

表29-4·ICD-10 臺北市中山區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	28	12.81	100.00	19	18.39	100.00	9	7.81	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	11	5.03	39.29	7	6.77	36.84	4	3.47	44.44
W00-W19	跌倒(落)	8	3.66	28.57	6	5.81	31.58	2	1.74	22.22
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.92	7.14	2	1.94	10.53	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	1.83	14.29	2	1.94	10.53	2	1.74	22.22
	其他	3	1.37	10.71	2	1.94	10.53	1	0.87	11.11

表29-5·ICD-10 臺北市中正區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	23	14.46	100.00	15	19.50	100.00	8	9.74	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	8	5.03	34.78	5	6.50	33.33	3	3.65	37.50
W00-W19	跌倒(落)	6	3.77	26.09	4	5.20	26.67	2	2.44	25.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.89	13.04	2	2.60	13.33	1	1.22	12.50
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.26	8.70	1	1.30	6.67	1	1.22	12.50
	其他	4	2.52	17.39	3	3.90	20.00	1	1.22	12.50

表29-6·ICD-10 臺北市大同區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	26	20.96	100.00	18	29.34	100.00	8	12.76	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	9	7.26	34.62	6	9.78	33.33	3	4.79	37.50
W00-W19	跌倒(落)	5	4.03	19.23	5	8.15	27.78	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.81	3.85	1	1.63	5.56	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.81	3.85	-	-	-	1	1.60	12.50
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.81	3.85	1	1.63	5.56	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	4.03	19.23	3	4.89	16.67	2	3.19	25.00
	其他	4	3.23	15.38	2	3.26	11.11	2	3.19	25.00

表29-7·ICD-10 臺北市萬華區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	32	16.90	100.00	17	17.88	100.00	15	15.90	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	14	7.39	43.75	5	5.26	29.41	9	9.54	60.00
W00-W19	跌倒(落)	4	2.11	12.50	3	3.16	17.65	1	1.06	6.67
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.53	3.13	1	1.05	5.88	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.53	3.13	-	-	-	1	1.06	6.67
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	1.06	6.25	2	2.10	11.76	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	2.64	15.63	3	3.16	17.65	2	2.12	13.33
	其他	5	2.64	15.63	3	3.16	17.65	2	2.12	13.33

表29-8·ICD-10 臺北市文山區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	38	14.54	100.00	29	22.83	100.00	9	6.70	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	18	6.89	47.37	14	11.02	48.28	4	2.98	44.44
W00-W19	跌倒(落)	8	3.06	21.05	6	4.72	20.69	2	1.49	22.22
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	2.30	15.79	4	3.15	13.79	2	1.49	22.22
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	6	2.30	15.79	5	3.94	17.24	1	0.74	11.11

表29-9·ICD-10 臺北市南港區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	20	17.64	100.00	8	14.25	100.00	12	20.96	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	11	9.70	55.00	4	7.12	50.00	7	12.22	58.33
W00-W19	跌倒(落)	3	2.65	15.00	1	1.78	12.50	2	3.49	16.67
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	1.76	10.00	1	1.78	12.50	1	1.75	8.33
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	4	3.53	20.00	2	3.56	25.00	2	3.49	16.67

表29-10·ICD-10 臺北市內湖區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	41	15.34	100.00	30	23.21	100.00	11	7.97	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	17	6.36	41.46	12	9.28	40.00	5	3.62	45.45
W00-W19	跌倒(落)	8	2.99	19.51	7	5.42	23.33	1	0.72	9.09
W65-W74	意外溺死和淹沒	6	2.25	14.63	6	4.64	20.00	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.75	4.88	1	0.77	3.33	1	0.72	9.09
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.75	4.88	-	-	-	2	1.45	18.18
	其他	6	2.25	14.63	4	3.09	13.33	2	1.45	18.18

表29-11 · ICD-10 臺北市士林區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	38	13.34	100.00	30	21.58	100.00	8	5.48	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	17	5.97	44.74	14	10.07	46.67	3	2.06	37.50
W00-W19	跌倒(落)	7	2.46	18.42	5	3.60	16.67	2	1.37	25.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.35	2.63	1	0.72	3.33	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.70	5.26	2	1.44	6.67	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	1.75	13.16	3	2.16	10.00	2	1.37	25.00
	其他	6	2.11	15.79	5	3.60	16.67	1	0.69	12.50

表29-12·ICD-10 臺北市北投區事故傷害死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	39	15.67	100.00	29	23.94	100.00	10	7.83	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	20	8.04	51.28	16	13.21	55.17	4	3.13	40.00
W00-W19	跌倒(落)	6	2.41	15.38	6	4.95	20.69	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	1.61	10.26	1	0.83	3.45	3	2.35	30.00
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.80	5.13	1	0.83	3.45	1	0.78	10.00
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.40	2.56	1	0.83	3.45	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.80	5.13	1	0.83	3.45	1	0.78	10.00
	其他	4	1.61	10.26	3	2.48	10.34	1	0.78	10.00

表30-1·ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	14	6.70	100.00	10	10.08	100.00	4	3.64	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.48	7.14	1	1.01	10.00	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.48	7.14	1	1.01	10.00	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	3.35	50.00	5	5.04	50.00	2	1.82	50.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	2.39	35.71	3	3.02	30.00	2	1.82	50.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-2 · ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合 計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	24	10.59	100.00	12	10.94	100.00	12	10.27	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	4.17	-	-	-	1	0.86	8.33
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	2.21	20.83	5	4.56	41.67	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	4.17	1	0.91	8.33	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	6	2.65	25.00	4	3.65	33.33	2	1.71	16.67
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.44	4.17	1	0.91	8.33	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	10	4.41	41.67	1	0.91	8.33	9	7.70	75.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-3 · ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	31	9.91	100.00	18	12.19	100.00	13	7.87	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.32	3.23	-	-	-	1	0.61	7.69
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.96	9.68	3	2.03	16.67	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.32	3.23	1	0.68	5.56	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.64	6.45	-	-	-	2	1.21	15.38
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	9	2.88	29.03	5	3.39	27.78	4	2.42	30.77
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.64	6.45	1	0.68	5.56	1	0.61	7.69
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.32	3.23	1	0.68	5.56	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	10	3.20	32.26	6	4.06	33.33	4	2.42	30.77
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.32	3.23	-	-	-	1	0.61	7.69
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.32	3.23	1	0.68	5.56	-	-	-

表30-4 · ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	31	14.18	100.00	18	17.42	100.00	13	11.28	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	2.29	16.13	4	3.87	22.22	1	0.87	7.69
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	13	5.95	41.94	8	7.74	44.44	5	4.34	38.46
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.92	6.45	1	0.97	5.56	1	0.87	7.69
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.46	3.23	1	0.97	5.56	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.92	6.45	1	0.97	5.56	1	0.87	7.69
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	3.66	25.81	3	2.90	16.67	5	4.34	38.46
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-5 · ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	20	12.58	100.00	15	19.50	100.00	5	6.09	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.63	5.00	1	1.30	6.67	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	9	5.66	45.00	6	7.80	40.00	3	3.65	60.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.63	5.00	1	1.30	6.67	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	3.14	25.00	4	5.20	26.67	1	1.22	20.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.63	5.00	1	1.30	6.67	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	2	1.26	10.00	1	1.30	6.67	1	1.22	20.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.63	5.00	1	1.30	6.67	-	-	-

表30-6 · ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合 計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	16	12.90	100.00	13	21.19	100.00	3	4.79	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	5.64	43.75	6	9.78	46.15	1	1.60	33.33
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	4.03	31.25	4	6.52	30.77	1	1.60	33.33
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	1.61	12.50	2	3.26	15.38	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.81	6.25	-	-	-	1	1.60	33.33
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.81	6.25	1	1.63	7.69	-	-	-

表30-7 · ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	53	27.98	100.00	38	39.98	100.00	15	15.90	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.53	1.89	1	1.05	2.63	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.53	1.89	1	1.05	2.63	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.53	1.89	1	1.05	2.63	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	19	10.03	35.85	12	12.62	31.58	7	7.42	46.67
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	1.06	3.77	-	-	-	2	2.12	13.33
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.53	1.89	1	1.05	2.63	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	14	7.39	26.42	13	13.68	34.21	1	1.06	6.67
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	7	3.70	13.21	5	5.26	13.16	2	2.12	13.33
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	3.17	11.32	4	4.21	10.53	2	2.12	13.33
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.53	1.89	-	-	-	1	1.06	6.67
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-8 · ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	26	9.95	100.00	16	12.60	100.00	10	7.45	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.38	3.85	-	-	-	1	0.74	10.00
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	2.68	26.92	4	3.15	25.00	3	2.23	30.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.38	3.85	-	-	-	1	0.74	10.00
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	8	3.06	30.77	6	4.72	37.50	2	1.49	20.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.53	15.38	3	2.36	18.75	1	0.74	10.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	1.91	19.23	3	2.36	18.75	2	1.49	20.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-9 · ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	16	14.11	100.00	14	24.93	100.00	2	3.49	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.88	6.25	1	1.78	7.14	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	4.41	31.25	4	7.12	28.57	1	1.75	50.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	4.41	31.25	5	8.91	35.71	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.88	6.25	1	1.78	7.14	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	3.53	25.00	3	5.34	21.43	1	1.75	50.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-10 · ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	37	13.84	100.00	29	22.43	100.00	8	5.80	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	18	6.74	48.65	15	11.60	51.72	3	2.17	37.50
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.37	2.70	1	0.77	3.45	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	10	3.74	27.03	7	5.42	24.14	3	2.17	37.50
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	2.25	16.22	5	3.87	17.24	1	0.72	12.50
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.37	2.70	-	-	-	1	0.72	12.50
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.37	2.70	1	0.77	3.45	-	-	-

表30-11·ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合 計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	29	10.18	100.00	19	13.67	100.00	10	6.85	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	9	3.16	31.03	5	3.60	26.32	4	2.74	40.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	15	5.26	51.72	10	7.19	52.63	5	3.43	50.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.35	3.45	1	0.72	5.26	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.35	3.45	1	0.72	5.26	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.35	3.45	-	-	-	1	0.69	10.00
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	1	0.35	3.45	1	0.72	5.26	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.35	3.45	1	0.72	5.26	-	-	-

表30-12·ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合 計			男 性			女 性		
		死 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	44	17.68	100.00	32	26.42	100.00	12	9.39	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.40	2.27	1	0.83	3.13	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	11	4.42	25.00	7	5.78	21.88	4	3.13	33.33
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.40	2.27	1	0.83	3.13	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	4.82	27.27	10	8.26	31.25	2	1.57	16.67
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	5	2.01	11.36	4	3.30	12.50	1	0.78	8.33
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.40	2.27	1	0.83	3.13	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	11	4.42	25.00	7	5.78	21.88	4	3.13	33.33
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.80	4.55	1	0.83	3.13	1	0.78	8.33

表31-1 · ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	331	158.34	100.00	所有癌症死亡原因	175	176.42	100.00	所有癌症死亡原因	156	142.01	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	81	38.75	24.47	氣管、支氣管和肺癌	41	41.33	23.43	氣管、支氣管和肺癌	40	36.41	25.64
2	結腸、直腸和肛門癌	54	25.83	16.31	肝和肝內膽管癌	35	35.28	20.00	結腸、直腸和肛門癌	25	22.76	16.03
3	肝和肝內膽管癌	51	24.40	15.41	結腸、直腸和肛門癌	29	29.23	16.57	肝和肝內膽管癌	16	14.57	10.26
4	女性乳房癌(1)	15	13.66	4.53	胃癌	9	9.07	5.14	女性乳房癌	15	13.66	9.62
5	胃癌	18	8.61	5.44	前列腺(攝護腺)癌	7	7.06	4.00	胃癌	9	8.19	5.77
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	7.06	2.11	非何杰金氏淋巴瘤	6	6.05	3.43	胰臟癌	7	6.37	4.49
7	胰臟癌	12	5.74	3.63	口腔癌	5	5.04	2.86	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	5.46	3.85
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	5.46	1.81	胰臟癌	5	5.04	2.86	卵巢癌	6	5.46	3.85
9	卵巢癌(1)	6	5.46	1.81	腎臟癌	5	5.04	2.86	白血病	5	4.55	3.21
10	腎臟癌	10	4.78	3.02	白血病	3	3.02	1.71	腎臟癌	5	4.55	3.21
	其他	71	33.96	21.45	其他	30	30.24	17.14	其他	22	20.03	14.10
11	白血病	8	3.83	2.42	食道癌	3	3.02	1.71	膽囊和其他膽道癌	5	4.55	3.21
12	膽囊和其他膽道癌	8	3.83	2.42	膀胱癌	3	3.02	1.71	腦癌	2	1.82	1.28
13	非何杰金氏淋巴瘤	7	3.35	2.11	膽囊和其他膽道癌	3	3.02	1.71	膀胱癌	2	1.82	1.28
14	口腔癌	5	2.39	1.51	間皮和軟組織癌	2	2.02	1.14	主唾液腺癌	1	0.91	0.64
15	膀胱癌	5	2.39	1.51	腦癌	2	2.02	1.14	甲狀腺癌	1	0.91	0.64

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-2 · ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	437	192.88	100.00	所有癌症死亡原因	262	238.88	100.00	所有癌症死亡原因	175	149.71	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	87	38.40	19.91	氣管、支氣管和肺癌	64	58.35	24.43	結腸、直腸和肛門癌	37	31.65	21.14
2	結腸、直腸和肛門癌	67	29.57	15.33	肝和肝內膽管癌	37	33.74	14.12	女性乳房癌	25	21.39	14.29
3	肝和肝內膽管癌	54	23.83	12.36	結腸、直腸和肛門癌	30	27.35	11.45	氣管、支氣管和肺癌	23	19.68	13.14
4	女性乳房癌(1)	25	21.39	5.72	胃癌	22	20.06	8.40	胃癌	18	15.40	10.29
5	胃癌	40	17.65	9.15	胰臟癌	17	15.50	6.49	肝和肝內膽管癌	17	14.54	9.71
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	16	14.59	3.66	前列腺(攝護腺)癌	16	14.59	6.11	胰臟癌	9	7.70	5.14
7	胰臟癌	26	11.48	5.95	食道癌	11	10.03	4.20	子宮體癌	5	4.28	2.86
8	食道癌	12	5.30	2.75	非何杰金氏淋巴瘤	8	7.29	3.05	卵巢癌	5	4.28	2.86
9	非何杰金氏淋巴瘤	11	4.86	2.52	口腔癌	7	6.38	2.67	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	2.57	1.71
10	子宮體癌(1)	5	4.28	1.14	鼻咽癌	7	6.38	2.67	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.57	1.71
	其他	94	41.49	21.51	其他	43	39.21	16.41	其他	30	25.67	17.14
11	卵巢癌(1)	5	4.28	1.14	白血病	6	5.47	2.29	腎臟癌	3	2.57	1.71
12	腦癌	9	3.97	2.06	腦癌	6	5.47	2.29	腦癌	3	2.57	1.71
13	鼻咽癌	9	3.97	2.06	膀胱癌	3	2.74	1.15	膽囊和其他膽道癌	3	2.57	1.71
14	口腔癌	8	3.53	1.83	膽囊和其他膽道癌	3	2.74	1.15	小腸癌	2	1.71	1.14
15	白血病	8	3.53	1.83	喉癌	2	1.82	0.76	白血病	2	1.71	1.14

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-3 · ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	549	175.55	100.00	所有癌症死亡原因	312	211.36	100.00	所有癌症死亡原因	237	143.54	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	116	37.09	21.13	氣管、支氣管和肺癌	66	44.71	21.15	氣管、支氣管和肺癌	50	30.28	21.10
2	結腸、直腸和肛門癌	71	22.70	12.93	肝和肝內膽管癌	46	31.16	14.74	結腸、直腸和肛門癌	37	22.41	15.61
3	肝和肝內膽管癌	70	22.38	12.75	結腸、直腸和肛門癌	34	23.03	10.90	女性乳房癌	35	21.20	14.77
4	女性乳房癌(1)	35	21.20	6.38	胃癌	26	17.61	8.33	肝和肝內膽管癌	24	14.54	10.13
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	19	12.87	3.46	胰臟癌	22	14.90	7.05	胰臟癌	14	8.48	5.91
6	胰臟癌	36	11.51	6.56	前列腺(攝護腺)癌	19	12.87	6.09	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	6.06	4.22
7	胃癌	35	11.19	6.38	口腔癌	14	9.48	4.49	胃癌	9	5.45	3.80
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	10	6.06	1.82	白血病	13	8.81	4.17	非何杰金氏淋巴瘤	9	5.45	3.80
9	非何杰金氏淋巴瘤	18	5.76	3.28	非何杰金氏淋巴瘤	9	6.10	2.88	卵巢癌	7	4.24	2.95
10	口腔癌	15	4.80	2.73	膀胱癌	8	5.42	2.56	腦癌	4	2.42	1.69
	其他	124	39.65	22.59	其他	55	37.26	17.63	其他	38	23.01	16.03
11	白血病	15	4.80	2.73	腎臟癌	7	4.74	2.24	子宮體癌	3	1.82	1.27
12	卵巢癌(1)	7	4.24	1.28	食道癌	6	4.06	1.92	間皮和軟組織癌	3	1.82	1.27
13	膀胱癌	10	3.20	1.82	膽囊和其他膽道癌	5	3.39	1.60	鼻咽癌	3	1.82	1.27
14	食道癌	8	2.56	1.46	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	3	2.03	0.96	膽囊和其他膽道癌	3	1.82	1.27
15	腎臟癌	8	2.56	1.46	間皮和軟組織癌	3	2.03	0.96	白血病	2	1.21	0.84

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表31-4 · ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	417	190.81	100.00	所有癌症死亡原因	233	225.49	100.00	所有癌症死亡原因	184	159.71	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	85	38.89	20.38	氣管、支氣管和肺癌	57	55.16	24.46	氣管、支氣管和肺癌	28	24.30	15.22
2	肝和肝內膽管癌	62	28.37	14.87	肝和肝內膽管癌	36	34.84	15.45	肝和肝內膽管癌	26	22.57	14.13
3	女性乳房癌(1)	25	21.70	6.00	結腸、直腸和肛門癌	24	23.23	10.30	女性乳房癌	25	21.70	13.59
4	結腸、直腸和肛門癌	42	19.22	10.07	胃癌	18	17.42	7.73	結腸、直腸和肛門癌	18	15.62	9.78
5	胰臟癌	30	13.73	7.19	胰臟癌	16	15.48	6.87	胰臟癌	14	12.15	7.61
6	胃癌	26	11.90	6.24	口腔癌	11	10.65	4.72	卵巢癌	10	8.68	5.43
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	11	10.65	2.64	前列腺(攝護腺)癌	11	10.65	4.72	胃癌	8	6.94	4.35
8	卵巢癌(1)	10	8.68	2.40	食道癌	11	10.65	4.72	腎臟癌	6	5.21	3.26
9	口腔癌	14	6.41	3.36	非何杰金氏淋巴瘤	8	7.74	3.43	白血病	4	3.47	2.17
10	食道癌	14	6.41	3.36	白血病	5	4.84	2.15	膽囊和其他膽道癌	4	3.47	2.17
	其他	98	44.84	23.50	其他	36	34.84	15.45	其他	41	35.59	22.28
11	非何杰金氏淋巴瘤	11	5.03	2.64	腦癌	5	4.84	2.15	口腔癌	3	2.60	1.63
12	白血病	9	4.12	2.16	鼻咽癌	4	3.87	1.72	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	2.60	1.63
13	腎臟癌	9	4.12	2.16	腎臟癌	3	2.90	1.29	子宮體癌	3	2.60	1.63
14	腦癌	7	3.20	1.68	膀胱癌	3	2.90	1.29	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.60	1.63
15	鼻咽癌	6	2.75	1.44	小腸癌	2	1.94	0.86	食道癌	3	2.60	1.63

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-5 · ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	276	173.54	100.00	所有癌症死亡原因	150	194.96	100.00	所有癌症死亡原因	126	153.46	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	57	35.84	20.65	氣管、支氣管和肺癌	34	44.19	22.67	氣管、支氣管和肺癌	23	28.01	18.25
2	結腸、直腸和肛門癌	33	20.75	11.96	肝和肝內膽管癌	20	26.00	13.33	結腸、直腸和肛門癌	18	21.92	14.29
3	肝和肝內膽管癌	31	19.49	11.23	胃癌	18	23.40	12.00	女性乳房癌	15	18.27	11.90
4	女性乳房癌(1)	15	18.27	5.43	結腸、直腸和肛門癌	15	19.50	10.00	肝和肝內膽管癌	11	13.40	8.73
5	胃癌	25	15.72	9.06	食道癌	12	15.60	8.00	胃癌	7	8.53	5.56
6	食道癌	16	10.06	5.80	胰臟癌	7	9.10	4.67	卵巢癌	6	7.31	4.76
7	胰臟癌	13	8.17	4.71	口腔癌	6	7.80	4.00	胰臟癌	6	7.31	4.76
8	卵巢癌(1)	6	7.31	2.17	前列腺(攝護腺)癌	5	6.50	3.33	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	6.09	3.97
9	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	6.50	1.81	白血病	4	5.20	2.67	食道癌	4	4.87	3.17
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	5	6.09	1.81	腎臟癌	3	3.90	2.00	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.65	2.38
	其他	70	44.01	25.36	其他	26	33.79	17.33	其他	28	34.10	22.22
11	口腔癌	7	4.40	2.54	膀胱癌	3	3.90	2.00	腦癌	3	3.65	2.38
12	膀胱癌	6	3.77	2.17	鼻咽癌	3	3.90	2.00	膀胱癌	3	3.65	2.38
13	鼻咽癌	6	3.77	2.17	膽囊和其他膽道癌	3	3.90	2.00	鼻咽癌	3	3.65	2.38
14	白血病	5	3.14	1.81	非何杰金氏淋巴瘤	2	2.60	1.33	子宮體癌	2	2.44	1.59
15	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.14	1.81	骨和關節軟骨癌	2	2.60	1.33	腎臟癌	2	2.44	1.59

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表31-6 · ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	255	205.60	100.00	所有癌症死亡原因	149	242.91	100.00	所有癌症死亡原因	106	169.10	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	56	45.15	21.96	肝和肝內膽管癌	25	40.76	16.78	氣管、支氣管和肺癌	34	54.24	32.08
2	肝和肝內膽管癌	36	29.03	14.12	氣管、支氣管和肺癌	22	35.87	14.77	肝和肝內膽管癌	11	17.55	10.38
3	結腸、直腸和肛門癌	29	23.38	11.37	結腸、直腸和肛門癌	19	30.97	12.75	女性乳房癌	11	17.55	10.38
4	女性乳房癌(1)	11	17.55	4.31	口腔癌	14	22.82	9.40	結腸、直腸和肛門癌	10	15.95	9.43
5	胃癌	21	16.93	8.24	胃癌	13	21.19	8.72	胃癌	8	12.76	7.55
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	8	13.04	3.14	前列腺(攝護腺)癌	8	13.04	5.37	非何杰金氏淋巴瘤	6	9.57	5.66
7	口腔癌	15	12.09	5.88	胰臟癌	8	13.04	5.37	胰臟癌	4	6.38	3.77
8	胰臟癌	12	9.68	4.71	食道癌	7	11.41	4.70	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.19	1.89
9	非何杰金氏淋巴瘤	9	7.26	3.53	膀胱癌	7	11.41	4.70	子宮體癌	2	3.19	1.89
10	膀胱癌	9	7.26	3.53	白血病	5	8.15	3.36	卵巢癌	2	3.19	1.89
	其他	49	39.51	19.22	其他	21	34.24	14.09	其他	16	25.52	15.09
11	食道癌	7	5.64	2.75	鼻咽癌	5	8.15	3.36	膀胱癌	2	3.19	1.89
12	白血病	6	4.84	2.35	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.89	2.01	膽囊和其他膽道癌	2	3.19	1.89
13	鼻咽癌	5	4.03	1.96	腦癌	2	3.26	1.34	口腔癌	1	1.60	0.94
14	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	2	3.19	0.78	腎臟癌	1	1.63	0.67	白血病	1	1.60	0.94
15	子宮體癌(1)	2	3.19	0.78	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	1.63	0.67	胸腺癌	1	1.60	0.94

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表31-7·ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	419	221.23	100.00	所有癌症死亡原因	277	291.41	100.00	所有癌症死亡原因	142	150.51	100.00
1	肝和肝內膽管癌	79	41.71	18.85	氣管、支氣管和肺癌	55	57.86	19.86	肝和肝內膽管癌	26	27.56	18.31
2	氣管、支氣管和肺癌	79	41.71	18.85	肝和肝內膽管癌	53	55.76	19.13	氣管、支氣管和肺癌	24	25.44	16.90
3	結腸、直腸和肛門癌	57	30.10	13.60	結腸、直腸和肛門癌	34	35.77	12.27	結腸、直腸和肛門癌	23	24.38	16.20
4	胃癌	35	18.48	8.35	胃癌	21	22.09	7.58	女性乳房癌	15	15.90	10.56
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	16	16.83	3.82	口腔癌	20	21.04	7.22	胃癌	14	14.84	9.86
6	女性乳房癌(1)	15	15.90	3.58	前列腺(攝護腺)癌	16	16.83	5.78	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	7.42	4.93
7	口腔癌	20	10.56	4.77	食道癌	16	16.83	5.78	卵巢癌	5	5.30	3.52
8	食道癌	17	8.98	4.06	胰臟癌	15	15.78	5.42	白血病	3	3.18	2.11
9	胰臟癌	17	8.98	4.06	膀胱癌	6	6.31	2.17	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.18	2.11
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	7.42	1.67	鼻咽癌	6	6.31	2.17	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	3.18	2.11
	其他	77	40.65	18.38	其他	35	36.82	12.64	其他	19	20.14	13.38
11	卵巢癌(1)	5	5.30	1.19	膽囊和其他膽道癌	5	5.26	1.81	子宮體癌	2	2.12	1.41
12	膀胱癌	8	4.22	1.91	非何杰金氏淋巴瘤	4	4.21	1.44	胰臟癌	2	2.12	1.41
13	鼻咽癌	8	4.22	1.91	腎臟癌	4	4.21	1.44	膀胱癌	2	2.12	1.41
14	非何杰金氏淋巴瘤	7	3.70	1.67	白血病	3	3.16	1.08	鼻咽癌	2	2.12	1.41
15	膽囊和其他膽道癌	7	3.70	1.67	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	2.10	0.72	膽囊和其他膽道癌	2	2.12	1.41

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-8 · ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	394	150.79	100.00	所有癌症死亡原因	243	191.34	100.00	所有癌症死亡原因	151	112.44	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	82	31.38	20.81	氣管、支氣管和肺癌	52	40.94	21.40	氣管、支氣管和肺癌	30	22.34	19.87
2	肝和肝內膽管癌	58	22.20	14.72	肝和肝內膽管癌	44	34.65	18.11	結腸、直腸和肛門癌	20	14.89	13.25
3	結腸、直腸和肛門癌	47	17.99	11.93	結腸、直腸和肛門癌	27	21.26	11.11	女性乳房癌	19	14.15	12.58
4	女性乳房癌(1)	19	14.15	4.82	胃癌	19	14.96	7.82	肝和肝內膽管癌	14	10.42	9.27
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	16	12.60	4.06	前列腺(攝護腺)癌	16	12.60	6.58	胃癌	10	7.45	6.62
6	胃癌	29	11.10	7.36	非何杰金氏淋巴瘤	11	8.66	4.53	胰臟癌	8	5.96	5.30
7	胰臟癌	16	6.12	4.06	口腔癌	8	6.30	3.29	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	5.21	4.64
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	5.21	1.78	食道癌	8	6.30	3.29	白血病	6	4.47	3.97
9	白血病	13	4.98	3.30	胰臟癌	8	6.30	3.29	卵巢癌	5	3.72	3.31
10	非何杰金氏淋巴瘤	12	4.59	3.05	白血病	7	5.51	2.88	鼻咽癌	4	2.98	2.65
	其他	95	36.36	24.11	其他	43	33.86	17.70	其他	28	20.85	18.54
11	食道癌	10	3.83	2.54	鼻咽癌	6	4.72	2.47	子宮體癌	3	2.23	1.99
12	鼻咽癌	10	3.83	2.54	間皮和軟組織癌	5	3.94	2.06	食道癌	2	1.49	1.32
13	卵巢癌(1)	5	3.72	1.27	膽囊和其他膽道癌	5	3.94	2.06	口腔癌	1	0.74	0.66
14	口腔癌	9	3.44	2.28	腦癌	4	3.15	1.65	小腸癌	1	0.74	0.66
15	膽囊和其他膽道癌	6	2.30	1.52	喉癌	3	2.36	1.23	非何杰金氏淋巴瘤	1	0.74	0.66

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-9 · ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	206	181.64	100.00	所有癌症死亡原因	130	231.54	100.00	所有癌症死亡原因	76	132.72	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	52	45.85	25.24	氣管、支氣管和肺癌	34	60.56	26.15	氣管、支氣管和肺癌	18	31.43	23.68
2	結腸、直腸和肛門癌	28	24.69	13.59	肝和肝內膽管癌	19	33.84	14.62	結腸、直腸和肛門癌	10	17.46	13.16
3	肝和肝內膽管癌	22	19.40	10.68	結腸、直腸和肛門癌	18	32.06	13.85	女性乳房癌	8	13.97	10.53
4	女性乳房癌(1)	8	13.97	3.88	口腔癌	7	12.47	5.38	胰臟癌	8	13.97	10.53
5	胃癌	13	11.46	6.31	胃癌	7	12.47	5.38	胃癌	6	10.48	7.89
6	胰臟癌	13	11.46	6.31	前列腺(攝護腺)癌	6	10.69	4.62	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	6.99	5.26
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10.69	2.91	胰臟癌	5	8.91	3.85	白血病	3	5.24	3.95
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	4	6.99	1.94	非何杰金氏淋巴瘤	4	7.12	3.08	卵巢癌	3	5.24	3.95
9	口腔癌	7	6.17	3.40	食道癌	4	7.12	3.08	肝和肝內膽管癌	3	5.24	3.95
10	白血病	6	5.29	2.91	白血病	3	5.34	2.31	非何杰金氏淋巴瘤	2	3.49	2.63
	其他	47	41.44	22.82	其他	23	40.96	17.69	其他	11	19.21	14.47
11	非何杰金氏淋巴瘤	6	5.29	2.91	腦癌	3	5.34	2.31	膽囊和其他膽道癌	2	3.49	2.63
12	卵巢癌(1)	3	5.24	1.46	膀胱癌	3	5.34	2.31	子宮體癌	1	1.75	1.32
13	男性生殖器官癌(攝護腺除外)(2)	2	3.56	0.97	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	2	3.56	1.54	間皮和軟組織癌	1	1.75	1.32
14	食道癌	4	3.53	1.94	喉癌	2	3.56	1.54	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	1.75	1.32
15	膀胱癌	4	3.53	1.94	鼻咽癌	2	3.56	1.54	膀胱癌	1	1.75	1.32

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表31-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	365	136.57	100.00	所有癌症死亡原因	204	157.81	100.00	所有癌症死亡原因	161	116.68	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	74	27.69	20.27	氣管、支氣管和肺癌	46	35.59	22.55	氣管、支氣管和肺癌	28	20.29	17.39
2	結腸、直腸和肛門癌	60	22.45	16.44	肝和肝內膽管癌	36	27.85	17.65	結腸、直腸和肛門癌	28	20.29	17.39
3	肝和肝內膽管癌	59	22.08	16.16	結腸、直腸和肛門癌	32	24.75	15.69	肝和肝內膽管癌	23	16.67	14.29
4	女性乳房癌(1)	16	11.60	4.38	口腔癌	13	10.06	6.37	女性乳房癌	16	11.60	9.94
5	胃癌	21	7.86	5.75	胃癌	11	8.51	5.39	胃癌	10	7.25	6.21
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	9	6.96	2.47	前列腺(攝護腺)癌	9	6.96	4.41	胰臟癌	9	6.52	5.59
7	胰臟癌	17	6.36	4.66	食道癌	8	6.19	3.92	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	5.80	4.97
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	5.80	2.19	胰臟癌	8	6.19	3.92	白血病	7	5.07	4.35
9	口腔癌	14	5.24	3.84	膀胱癌	6	4.64	2.94	卵巢癌	4	2.90	2.48
10	白血病	10	3.74	2.74	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.09	1.96	非何杰金氏淋巴瘤	4	2.90	2.48
	其他	77	28.81	21.10	其他	31	23.98	15.20	其他	24	17.39	14.91
11	食道癌	10	3.74	2.74	鼻咽癌	4	3.09	1.96	腦癌	4	2.90	2.48
12	非何杰金氏淋巴瘤	8	2.99	2.19	白血病	3	2.32	1.47	膽囊和其他膽道癌	3	2.17	1.86
13	卵巢癌(1)	4	2.90	1.10	腎臟癌	3	2.32	1.47	食道癌	2	1.45	1.24
14	膀胱癌	7	2.62	1.92	間皮和軟組織癌	3	2.32	1.47	腎臟癌	2	1.45	1.24
15	膽囊和其他膽道癌	6	2.25	1.64	膽囊和其他膽道癌	3	2.32	1.47	間皮和軟組織癌	2	1.45	1.24

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表31-11 · ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	482	169.15	100.00	氣管、支氣管和肺癌	279	200.73	100.00	所有癌症死亡原因	203	139.07	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	114	40.01	23.65	肝和肝內膽管癌	73	52.52	26.16	氣管、支氣管和肺癌	41	28.09	20.20
2	肝和肝內膽管癌	86	30.18	17.84	胃癌	58	41.73	20.79	結腸、直腸和肛門癌	31	21.24	15.27
3	女性乳房癌(1)	24	16.44	4.98	胰臟癌	20	14.39	7.17	肝和肝內膽管癌	28	19.18	13.79
4	結腸、直腸和肛門癌	45	15.79	9.34	前列腺(攝護腺)癌	16	11.51	5.73	女性乳房癌	24	16.44	11.82
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	15	10.79	3.11	結腸、直腸和肛門癌	15	10.79	5.38	胰臟癌	12	8.22	5.91
6	胃癌	29	10.18	6.02	口腔癌	14	10.07	5.02	胃癌	9	6.17	4.43
7	胰臟癌	28	9.83	5.81	非何杰金氏淋巴瘤	13	9.35	4.66	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	4.80	3.45
8	口腔癌	14	4.91	2.90	食道癌	8	5.76	2.87	卵巢癌	6	4.11	2.96
9	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	4.80	1.45	膀胱癌	8	5.76	2.87	腎臟癌	5	3.43	2.46
10	非何杰金氏淋巴瘤	12	4.21	2.49	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.76	2.87	白血病	4	2.74	1.97
	其他	108	37.90	22.41	其他	46	33.09	16.49	其他	36	24.66	17.73
11	膀胱癌	12	4.21	2.49	白血病	6	4.32	2.15	非何杰金氏淋巴瘤	4	2.74	1.97
12	卵巢癌(1)	6	4.11	1.24	腎臟癌	5	3.60	1.79	膀胱癌	4	2.74	1.97
13	白血病	10	3.51	2.07	間皮和軟組織癌	4	2.88	1.43	膽囊和其他膽道癌	4	2.74	1.97
14	食道癌	10	3.51	2.07	腦癌	4	2.88	1.43	小腸癌	2	1.37	0.99
15	腎臟癌	10	3.51	2.07	鼻咽癌	4	2.88	1.43	主唾液腺癌	2	1.37	0.99

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-12 · ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因  
中華民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	432	173.56	100.00	所有癌症死亡原因	257	212.15	100.00	所有癌症死亡原因	175	136.97	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	84	33.75	19.44	氣管、支氣管和肺癌	52	42.93	20.23	氣管、支氣管和肺癌	32	25.05	18.29
2	結腸、直腸和肛門癌	59	23.70	13.66	肝和肝內膽管癌	40	33.02	15.56	女性乳房癌	28	21.92	16.00
3	肝和肝內膽管癌	57	22.90	13.19	結腸、直腸和肛門癌	35	28.89	13.62	結腸、直腸和肛門癌	24	18.79	13.71
4	女性乳房癌(1)	28	21.92	6.48	胃癌	19	15.68	7.39	肝和肝內膽管癌	17	13.31	9.71
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	14	11.56	3.24	口腔癌	18	14.86	7.00	胃癌	8	6.26	4.57
6	胃癌	27	10.85	6.25	食道癌	15	12.38	5.84	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	5.48	4.00
7	口腔癌	20	8.04	4.63	前列腺(攝護腺)癌	14	11.56	5.45	胰臟癌	7	5.48	4.00
8	食道癌	17	6.83	3.94	非何杰金氏淋巴瘤	10	8.26	3.89	卵巢癌	6	4.70	3.43
9	胰臟癌	17	6.83	3.94	胰臟癌	10	8.26	3.89	膽囊和其他膽道癌	5	3.91	2.86
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	5.48	1.62	白血病	6	4.95	2.33	白血病	4	3.13	2.29
	其他	102	40.98	23.61	其他	38	31.37	14.79	其他	37	28.96	21.14
11	非何杰金氏淋巴瘤	13	5.22	3.01	腎臟癌	5	4.13	1.95	間皮和軟組織癌	4	3.13	2.29
12	卵巢癌(1)	6	4.70	1.39	鼻咽癌	4	3.30	1.56	甲狀腺癌	3	2.35	1.71
13	白血病	10	4.02	2.31	膽囊和其他膽道癌	4	3.30	1.56	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.35	1.71
14	膽囊和其他膽道癌	9	3.62	2.08	腦癌	3	2.48	1.17	膀胱癌	3	2.35	1.71
15	腎臟癌	6	2.41	1.39	膀胱癌	3	2.48	1.17	口腔癌	2	1.57	1.14

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表32·臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		11,551	437.00		11,989	457.75		12,054	463.27		12,205	465.98		12,424	470.49		12,799	484.10
08-14	惡性腫瘤	1	3,180	120.31	1	3,366	128.52	1	3,504	134.67	1	3,489	133.21	1	3,564	134.97	1	3,738	141.38
25-27-28*	心臟疾病	3	1,257	47.56	2	1,384	52.84	2	1,453	55.84	2	1,331	50.82	2	1,428	54.08	3	1,252	47.35
29	腦血管疾病	2	1,306	49.41	3	1,361	51.96	3	1,326	50.96	3	1,303	49.75	3	1,209	45.78	2	1,380	52.20
181	糖尿病	5	620	23.46	5	634	24.21	4	755	29.02	5	647	24.70	4	863	32.68	4	1,004	37.97
321	肺炎	7	372	14.07	8	332	12.68	9	276	10.61	8	330	12.60	8	396	15.00	8	316	11.95
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	358	13.54	6	368	14.05	6	378	14.53	6	413	15.77	6	419	15.87	6	457	17.29
E47-E53	事故傷害	4	752	28.45	4	772	29.48	5	683	26.25	4	692	26.42	5	658	24.92	5	599	22.66
E54	自殺	10	206	7.79	10	224	8.55	10	214	8.22	10	201	7.67	10	212	8.03	9	237	8.96
347	慢性肝病及肝硬化	6	380	14.38	7	367	14.01	7	349	13.41	7	389	14.85	7	404	15.30	7	373	14.11
038	敗血症	13	96	3.63	12	132	5.04	13	129	4.96	13	116	4.43	16	70	2.65	14	85	3.21
26	高血壓性疾病	9	292	11.05	9	328	12.52	8	286	10.99	9	281	10.73	9	250	9.47	10	191	7.22
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	190	7.19	11	183	6.99	11	182	6.99	11	200	7.64	11	156	5.91	11	142	5.37
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	76	2.88	16	87	3.32	16	63	2.42	16	59	2.25	14	81	3.07	12	111	4.20
02	結核病	15	80	3.03	13	107	4.09	12	180	6.92	12	122	4.66	12	99	3.75	12	111	4.20
44	先天性畸形	12	99	3.75	14	92	3.51	14	106	4.07	15	71	2.71	13	82	3.11	15	81	3.06
	其他		2,287	86.52		2,252	85.98		2,170	83.40		2,561	97.78		2,533	95.92		2,722	102.95
註：	年中人口數		2,643,220		2,619,118		2,601,934		2,619,216		2,640,626		2,643,893						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表32·臺北市歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		13,222	500.81		13,279	503.41		13,631	517.40		13,733	523.20		14,339	547.41		13,875	528.71
08-14	惡性腫瘤	1	4,089	154.88	1	4,169	158.05	1	4,001	151.87	1	4,202	160.09	1	4,290	163.78	1	4,423	168.54
25-27-28*	心臟疾病	3	1,383	52.38	2	1,450	54.97	2	1,642	62.33	2	1,732	65.99	2	1,665	63.56	2	1,527	58.19
29	腦血管疾病	2	1,397	52.91	3	1,233	46.74	3	1,325	50.29	3	1,240	47.24	3	1,367	52.19	3	1,182	45.04
181	糖尿病	4	903	34.20	4	889	33.70	4	946	35.91	4	893	34.02	4	988	37.72	4	946	36.05
321	肺炎	7	367	13.90	7	448	16.98	5	567	21.52	7	447	17.03	5	572	21.84	5	575	21.91
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	490	18.56	6	456	17.29	6	503	19.09	5	503	19.16	6	544	20.77	6	485	18.48
E47-E53	事故傷害	5	506	19.17	5	514	19.49	7	455	17.27	6	463	17.64	8	415	15.84	8	379	14.44
E54	自殺	9	290	10.98	8	325	12.32	9	320	12.15	8	346	13.18	7	467	17.83	7	454	17.30
347	慢性肝病及肝硬化	8	365	13.83	9	305	11.56	8	367	13.93	9	333	12.69	9	323	12.33	9	317	12.08
038	敗血症	12	116	4.39	12	109	4.13	13	93	3.53	12	94	3.58	11	150	5.73	11	145	5.53
26	高血壓性疾病	10	167	6.33	10	179	6.79	10	142	5.39	10	167	6.36	10	162	6.18	10	176	6.71
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	149	5.64	11	123	4.66	11	115	4.37	11	113	4.31	12	109	4.16	12	92	3.51
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	75	2.84	16	61	2.31	14	64	2.43	14	70	2.67	13	77	2.94	13	79	3.01
02	結核病	13	89	3.37	13	82	3.11	12	98	3.72	13	74	2.82	14	60	2.29	14	68	2.59
44	先天性畸形	16	67	2.54	15	64	2.43	15	41	1.56	15	48	1.83	16	39	1.49	15	42	1.60
	其他		2,769	104.88		2,872	108.88		2,952	112.05		3,008	114.60		3,111	118.77		2,985	113.74
註：	年中人口數		2,640,138		2,637,829		2,634,497		2,624,805		2,619,424		2,624,309						

表32·臺北市歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		14,486	550.64	A00-Y98	所有死亡原因		15,119	575.72		14,870	568.60
08-14	惡性腫瘤	1	4,566	173.56	C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10	1	4,563	174.48
25-27-28*	心臟疾病	2	1,642	62.42	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,014	76.69	2	1,768	67.61
29	腦血管疾病	3	1,289	49.00	I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66	3	1,128	43.13
181	糖尿病	4	958	36.42	J12-J18	肺炎	4	950	36.18	4	840	32.12
321	肺炎	5	688	26.15	E10-E14	糖尿病	5	716	27.26	5	825	31.55
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	549	20.87	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98	6	496	18.97
E47-E53	事故傷害	7	372	14.14	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	7	491	18.70	7	451	17.25
E54	自殺	8	364	13.84	A40-A41	敗血症	6	513	19.53	8	441	16.86
347	慢性肝病及肝硬化	9	331	12.58	I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24	9	385	14.72
038	敗血症	10	188	7.15	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	389	14.81	10	377	14.42
26	高血壓性疾病	11	141	5.36	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27	11	349	13.35
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	97	3.69	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	370	14.09	12	341	13.04
341	胃及十二指腸之潰瘍	13	80	3.04	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	281	10.70	13	340	13.00
02	結核病	14	57	2.17	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	16	69	2.63	14	112	4.28
44	先天性畸形	15	48	1.82	G20-G21	帕金森病	14	93	3.54	15	92	3.52
	其他		3,116	118.45		其他		2,451	93.33		2,362	90.32

註： 年中人口數 2,630,756 2,626,096 2,615,176

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		7,172	541.89		7,451	568.85		7,351	565.92		7,546	578.81		7,593	579.35		7,841	598.84
08-14	惡性腫瘤	1	1,977	149.38	1	2,118	161.70	1	2,135	164.36	1	2,154	165.22	1	2,235	170.53	1	2,356	179.93
25-27-28*	心臟疾病	3	791	59.77	2	892	68.10	2	910	70.06	2	817	62.67	2	895	68.29	2	824	62.93
29	腦血管疾病	2	800	60.45	3	822	62.76	3	798	61.43	3	783	60.06	3	699	53.33	3	805	61.48
181	糖尿病	5	328	24.78	5	309	23.59	5	390	30.02	5	323	24.78	5	415	31.66	4	506	38.64
321	肺炎	7	245	18.51	7	226	17.25	8	189	14.55	8	231	17.72	7	269	20.52	8	192	14.66
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	185	13.98	8	194	14.81	7	224	17.24	7	232	17.80	8	213	16.25	7	242	18.48
E47-E53	事故傷害	4	535	40.42	4	560	42.75	4	491	37.80	4	494	37.89	4	437	33.34	5	426	32.53
E54	自殺	11	123	9.29	10	155	11.83	11	125	9.62	11	125	9.59	9	143	10.91	9	143	10.92
347	慢性肝病及肝硬化	6	273	20.63	6	253	19.32	6	247	19.02	6	277	21.25	6	306	23.35	6	253	19.32
038	敗血症	14	50	3.78	13	78	5.95	13	74	5.70	13	64	4.91	15	38	2.90	15	41	3.13
26	高血壓性疾病	9	167	12.62	9	190	14.51	9	158	12.16	9	159	12.20	9	143	10.91	10	117	8.94
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	131	9.90	11	110	8.40	12	119	9.16	10	133	10.20	11	94	7.17	11	99	7.56
02	胃及十二指腸之潰瘍	13	58	4.38	14	63	4.81	16	39	3.00	15	37	2.84	13	54	4.12	13	76	5.80
02	結核病	12	71	5.36	12	80	6.11	10	141	10.85	12	92	7.06	12	78	5.95	12	86	6.57
44	先天性畸形	16	48	3.63	15	54	4.12	14	60	4.62	15	37	2.84	16	37	2.82	14	47	3.59
	其他		1,390	105.02		1,347	102.84		1,251	96.31		1,588	121.81		1,537	117.27		1,628	124.33
註：	年中人口數		1,323,509		1,309,828		1,298,943		1,303,713		1,310,612		1,309,371						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		8,056	617.44		8,001	615.07		8,213	633.43		8,352	647.93		8,763	683.06		8,387	654.67
08-14	惡性腫瘤	1	2,565	196.59	1	2,520	193.72	1	2,430	187.41	1	2,594	201.24	1	2,630	205.00	1	2,695	210.37
25-27-28*	心臟疾病	2	906	69.44	2	896	68.88	2	996	76.82	2	1,107	85.88	2	1,060	82.62	2	971	75.79
29	腦血管疾病	3	820	62.85	3	734	56.43	3	818	63.09	3	725	56.24	3	822	64.07	3	680	53.08
181	糖尿病	4	450	34.49	4	464	35.67	4	463	35.71	4	440	34.13	4	521	40.61	4	473	36.92
321	肺炎	8	233	17.86	6	314	24.14	5	369	28.46	6	300	23.27	5	370	28.84	5	373	29.12
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	257	19.70	7	246	18.91	7	261	20.13	7	278	21.57	6	324	25.26	8	261	20.37
E47-E53	事故傷害	5	365	27.97	5	359	27.60	6	316	24.37	5	342	26.53	8	312	24.32	7	281	21.93
E54	自殺	9	192	14.72	8	214	16.45	9	203	15.66	8	225	17.46	7	313	24.40	6	309	24.12
347	慢性肝病及肝硬化	7	239	18.32	9	209	16.07	8	249	19.20	9	222	17.22	9	192	14.97	9	210	16.39
038	敗血症	13	59	4.52	13	53	4.07	13	61	4.70	13	54	4.19	11	73	5.69	11	73	5.70
26	高血壓性疾病	11	88	6.74	10	99	7.61	11	70	5.40	10	82	6.36	10	106	8.26	10	94	7.34
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	95	7.28	11	75	5.77	12	68	5.24	11	73	5.66	12	71	5.53	12	58	4.53
341	胃及十二指腸之潰瘍	14	50	3.83	15	35	2.69	14	42	3.24	14	43	3.34	13	52	4.05	14	43	3.36
02	結核病	12	76	5.82	12	67	5.15	10	75	5.78	12	59	4.58	14	50	3.90	13	53	4.14
44	先天性畸形	16	33	2.53	16	34	2.61	15	23	1.77	16	25	1.94	17	17	1.33	16	16	1.25
	其他		1,628	124.78		1,682	129.30		1,769	136.43		1,783	138.32		1,850	144.20		1,797	140.27
註：	年中人口數		1,304,744		1,300,818		1,296,600		1,289,022		1,282,908		1,281,102						

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		8,633	674.39	A00-Y98	所有死亡原因		8,992	705.67		8,782	693.85
08-14	惡性腫瘤	1	2,757	215.37	C00-C97	惡性腫瘤	1	2,698	211.73	1	2,671	211.03
25-27-28*	心臟疾病	2	1,026	80.15	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,278	100.29	2	1,101	86.99
29	腦血管疾病	3	768	59.99	I60-I69	腦血管疾病	3	677	53.13	3	647	51.12
181	糖尿病	4	495	38.67	J12-J18	肺炎	4	619	48.58	4	528	41.72
321	肺炎	5	446	34.84	E10-E14	糖尿病	5	352	27.62	5	423	33.42
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	272	21.25	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	337	26.45	6	377	29.79
E47-E53	事故傷害	7	265	20.70	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	269	21.11	7	260	20.54
E54	自殺	8	228	17.81	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	240	18.83	8	249	19.67
347	慢性肝病及肝硬化	9	222	17.34	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	231	18.13	9	234	18.49
038	敗血症	10	82	6.41	A40-A41	敗血症	8	263	20.64	10	233	18.41
26	高血壓性疾病	11	69	5.39	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	197	15.46	11	232	18.33
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	61	4.77	I10-I15	高血壓性疾病	11	204	16.01	12	206	16.28
341	胃及十二指腸之潰瘍	13	48	3.75	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	132	10.36	13	142	11.22
02	結核病	14	40	3.12	G20-G21	帕金森病	15	56	4.39	14	62	4.90
44	先天性畸形	15	23	1.80	I71	主動脈瘤及剝離	16	49	3.85	15	54	4.27
	其他		1,831	143.03		其他		1,390	109.08		1,363	107.69

註： 年中人口數 1,280,124 1,274,252 1,265,699

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		4,379	331.81		4,538	346.60		4,703	360.94		4,659	354.16		4,831	363.23		4,958	371.52
08-14	惡性腫瘤	1	1,203	91.16	1	1,248	95.32	1	1,369	105.07	1	1,335	101.48	1	1,329	99.92	1	1,382	103.56
25-27-28*	心臟疾病	3	466	35.31	3	492	37.58	2	543	41.67	3	514	39.07	2	533	40.07	4	428	32.07
29	腦血管疾病	2	506	38.34	2	539	41.17	3	528	40.52	2	520	39.53	3	510	38.35	2	575	43.09
181	糖尿病	4	292	22.13	4	325	24.82	4	365	28.01	4	324	24.63	4	448	33.68	3	498	37.32
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	173	13.11	6	174	13.29	6	154	11.82	6	181	13.76	6	206	15.49	5	215	16.11
321	肺炎	7	127	9.62	9	106	8.10	10	87	6.68	9	99	7.53	7	127	9.55	7	124	9.29
E54	自殺	10	83	6.29	11	69	5.27	9	89	6.83	10	76	5.78	10	69	5.19	9	94	7.04
347	慢性肝病及肝硬化	9	107	8.11	8	114	8.71	8	102	7.83	8	112	8.51	9	98	7.37	8	120	8.99
E47-E53	事故傷害	5	217	16.44	5	212	16.19	5	192	14.74	5	198	15.05	5	221	16.62	6	173	12.96
038	敗血症	13	46	3.49	12	54	4.12	12	55	4.22	12	52	3.95	14	32	2.41	11	44	3.30
26	高血壓性疾病	8	125	9.47	7	138	10.54	7	128	9.82	7	122	9.27	8	107	8.05	10	74	5.55
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	59	4.47	10	73	5.58	11	63	4.84	11	67	5.09	11	62	4.66	12	43	3.22
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	18	1.36	16	24	1.83	16	24	1.84	16	22	1.67	15	27	2.03	13	35	2.62
44	先天性畸形	12	51	3.86	13	38	2.90	13	46	3.53	13	34	2.58	12	45	3.38	14	34	2.55
200	貧血	17	10	0.76	19	6	0.46	18	9	0.69	18	7	0.53	17	6	0.45	17	17	1.27
	其他		896	67.89		926	70.73		949	72.83		996	75.71		1,011	76.01		1,102	82.58

註： 年中人口數 1,319,712 1,309,291 1,302,990 1,315,503 1,330,014 1,334,522

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		5,166	386.85		5,278	394.76		5,418	404.96		5,381	402.84		5,576	417.20		5,488	408.57
08-14	惡性腫瘤	1	1,524	114.12	1	1,649	123.33	1	1,571	117.42	1	1,608	120.38	1	1,660	124.20	1	1,728	128.65
25-27-28*	心臟疾病	3	477	35.72	2	554	41.44	2	646	48.28	2	625	46.79	2	605	45.27	2	556	41.39
29	腦血管疾病	2	577	43.21	3	499	37.32	3	507	37.90	3	515	38.55	3	545	40.78	3	502	37.37
181	糖尿病	4	453	33.92	4	425	31.79	4	483	36.10	4	453	33.91	4	467	34.94	4	473	35.21
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	233	17.45	5	210	15.71	5	242	18.09	5	225	16.84	5	220	16.46	5	224	16.68
321	肺炎	7	134	10.03	7	134	10.02	6	198	14.80	6	147	11.00	6	202	15.11	6	202	15.04
E54	自殺	9	98	7.34	8	111	8.30	9	117	8.75	7	121	9.06	7	154	11.52	7	145	10.80
347	慢性肝病及肝硬化	8	126	9.44	9	96	7.18	8	118	8.82	9	111	8.31	8	131	9.80	8	107	7.97
E47-E53	事故傷害	6	141	10.56	6	155	11.59	7	139	10.39	7	121	9.06	9	103	7.71	9	98	7.30
038	敗血症	11	57	4.27	11	56	4.19	12	32	2.39	11	40	2.99	10	77	5.76	11	72	5.36
26	高血壓性疾病	10	79	5.92	10	80	5.98	10	72	5.38	10	85	6.36	11	56	4.19	10	82	6.10
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	54	4.04	12	48	3.59	11	47	3.51	11	40	2.99	12	38	2.84	13	34	2.53
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	25	1.87	15	26	1.94	15	22	1.64	13	27	2.02	13	25	1.87	12	36	2.68
44	先天性畸形	14	34	2.55	13	30	2.24	16	18	1.35	14	23	1.72	14	22	1.65	14	26	1.94
200	貧血	16	13	0.97	17	9	0.67	17	14	1.05	16	17	1.27	16	13	0.97	15	21	1.56
	其他		1,141	85.44		1,196	89.45		1,192	89.10		1,223	91.56		1,258	94.13		1,182	88.00
註：	年中人口數		1,335,394		1,337,010		1,337,897		1,335,782		1,336,516		1,343,207						

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		5,853	433.35	A00-Y98	所有死亡原因		6,127	453.23		6,088	451.14	
08-14	惡性腫瘤	1	1,809	133.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	1,769	130.86	1	1,892	140.20	
25-27-28*	心臟疾病	2	616	45.61	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	736	54.44	2	667	49.43	
29	腦血管疾病	3	521	38.57	I60-I69	腦血管疾病	3	522	38.61	3	481	35.64	
181	糖尿病	4	463	34.28	E10-E14	糖尿病	4	364	26.93	4	402	29.79	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	277	20.51	J12-J18	肺炎	5	331	24.49	5	312	23.12	
321	肺炎	6	242	17.92	A40-A41	敗血症	7	250	18.49	6	208	15.41	
E54	自殺	7	136	10.07	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	251	18.57	7	202	14.97	
347	慢性肝病及肝硬化	8	109	8.07	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	149	11.02	8	198	14.67	
E47-E53	事故傷害	9	107	7.92	I10-I15	高血壓性疾病	8	170	12.58	9	179	13.26	
038	敗血症	10	106	7.85	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	109	8.06	10	119	8.82	
26	高血壓性疾病	11	72	5.33	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	120	8.88	11	117	8.67	
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	36	2.67	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	99	7.32	12	117	8.67	
341	胃及十二指腸之潰瘍	13	32	2.37	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	139	10.28	13	107	7.93	
44	先天性畸形	14	25	1.85	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	14	38	2.81	14	68	5.04	
200	貧血	15	20	1.48	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	15	38	2.81	15	33	2.45	
	其他		1,282	94.92		其他		1,042	77.08		986	73.07	
註：	年中人口數		1,350,632					1,351,844			1,349,477		

表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數			死亡率 (‰)	死亡人數			死亡率 (‰)	死亡 人數	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 60年	159	95	64	3.65	334	186	148	7.67	12	27.55
民國 65年	76	52	24	1.57	299	191	108	6.19	15	31.07
民國 70年	63	41	22	1.43	218	127	91	4.95	3	6.82
民國 75年	59	31	28	1.66	173	88	85	4.87	1	2.81
民國 80年	42	20	22	1.15	162	91	71	4.43	3	8.21
民國 85年	104	58	46	3.05	216	111	105	6.32	2	5.86
民國 86年	98	53	45	2.80	212	117	95	6.05	3	8.56
民國 87年	79	45	34	2.62	166	100	66	5.50	3	9.93
民國 88年	81	44	37	2.55	168	90	78	5.28	2	6.29
民國 89年	86	50	36	2.55	153	89	64	4.54	-	-
民國 90年	88	46	42	3.26	149	75	74	5.52	3	11.11
民國 91年	68	41	27	2.65	111	62	49	4.33	1	3.90
民國 92年	46	22	24	1.97	89	42	47	3.82	3	12.87
民國 93年	56	29	27	2.53	100	58	42	4.51	-	-
民國 94年	51	27	24	2.43	89	44	45	4.25	1	4.77
民國 95年	40	20	20	1.89	69	30	39	3.26	1	4.73
民國 96年	56	34	22	2.59	89	57	32	4.12	1	4.63
民國 97年	59	33	26	2.85	95	51	44	4.59	1	4.83
<b>民國 98年</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>1.65</b>	<b>69</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>3.56</b>	-	-

附註:1.新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000。

2.嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000

3.孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數/活產嬰兒數)×100,000。

4.自97年起死因統計資料配合衛生署改採國際疾病分類碼第十版(ICD-10)。

表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率

單位：人／每十萬人口

年別	總計	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
84年	437.00	682.71	32.62	18.42	27.06	60.57	77.17	65.05	90.99	113.30	160.75	261.74	386.95	681.57	1,081.85	1,676.13	2,664.91	4,267.21	7,274.45	11,039.79
85年	457.75	673.86	45.78	17.30	22.78	47.79	69.88	74.81	89.43	121.56	175.14	270.34	402.54	688.84	1,105.93	1,573.56	2,674.67	4,300.10	6,908.85	11,667.37
86年	463.27	633.97	46.94	15.83	14.87	39.99	48.43	68.09	84.34	131.22	184.72	273.57	392.13	626.42	1,050.42	1,650.66	2,469.82	4,285.18	6,565.16	11,540.95
87年	465.98	519.20	47.91	21.16	12.41	35.07	53.31	66.86	72.52	130.10	160.17	246.88	379.54	634.67	975.66	1,630.90	2,443.44	4,064.66	6,730.79	11,230.74
88年	470.49	554.05	30.48	12.65	20.64	37.55	42.38	57.00	69.13	113.03	159.35	251.56	350.49	566.77	968.13	1,472.13	2,409.57	3,959.08	6,641.81	11,953.77
89年	484.10	477.82	34.20	14.45	17.16	47.15	44.74	49.58	75.59	119.57	153.35	242.18	350.33	575.30	925.06	1,530.22	2,402.38	3,923.90	6,530.01	11,437.54
90年	500.81	508.22	31.83	15.72	15.49	35.56	44.36	46.11	67.09	118.49	168.75	242.39	391.39	564.51	938.44	1,527.54	2,418.31	3,807.86	6,329.57	11,330.28
91年	503.41	437.72	41.40	13.99	14.90	30.58	36.58	53.21	69.89	117.86	163.49	244.55	353.34	564.14	903.31	1,399.37	2,330.38	3,611.06	6,167.56	11,169.46
92年	517.40	372.82	24.52	11.92	14.46	34.85	36.65	54.73	77.59	112.50	146.43	233.45	339.14	511.37	829.43	1,415.81	2,269.54	3,555.13	6,175.39	11,670.54
93年	523.20	452.52	32.87	11.12	14.57	27.91	46.19	53.77	77.28	107.85	159.51	227.93	349.91	545.62	850.44	1,253.79	2,119.75	3,456.63	6,116.51	10,769.36
94年	547.41	426.71	21.69	15.85	13.42	41.51	38.86	53.63	86.38	104.37	164.56	240.15	350.28	464.27	850.95	1,295.29	2,034.07	3,557.58	6,002.50	11,305.33
95年	528.71	340.67	29.64	11.84	15.21	34.40	44.62	63.55	65.17	112.92	155.35	237.33	365.65	507.15	721.45	1,150.53	2,001.99	3,249.51	5,306.01	10,046.38
96年	550.64	434.21	20.37	17.43	7.01	25.78	39.69	52.14	56.09	98.39	148.71	246.28	311.48	475.52	708.13	1,171.78	2,041.12	3,320.52	5,341.79	10,629.20
97年	575.72	469.11	23.18	16.16	12.47	19.20	45.78	48.92	66.26	105.37	157.67	230.61	330.13	455.61	699.50	1,124.34	2,016.68	3,257.44	5,549.18	10,992.30
<b>98年</b>	<b>568.60</b>	<b>357.61</b>	<b>21.38</b>	<b>13.08</b>	<b>5.53</b>	<b>26.88</b>	<b>36.77</b>	<b>40.38</b>	<b>63.46</b>	<b>85.57</b>	<b>148.62</b>	<b>225.80</b>	<b>314.22</b>	<b>467.69</b>	<b>638.77</b>	<b>1,116.63</b>	<b>1,912.70</b>	<b>3,080.41</b>	<b>5,353.26</b>	<b>10,468.26</b>

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
		E47-E53	事故傷害合計	752	28.45	772	29.48	683	26.25	692	26.42	658	24.92	599	22.66	506	19.17	514	19.49
E47	運輸事故	393	14.87	391	14.93	351	13.49	335	12.79	221	8.37	225	8.51	195	7.39	249	9.44	189	7.17
E48	意外中毒	39	1.48	32	1.22	33	1.27	21	0.80	24	0.91	28	1.06	24	0.91	27	1.02	26	0.99
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	2	0.08	-	-	-	-	1	0.04	3	0.11	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-
E50	意外墜落	97	3.67	112	4.28	110	4.23	115	4.39	146	5.53	144	5.45	109	4.13	86	3.26	103	3.91
E51	火及火焰所致之事故傷 害	30	1.13	40	1.53	35	1.35	35	1.34	21	0.80	20	0.76	13	0.49	12	0.45	19	0.72
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	191	7.23	197	7.52	153	5.88	185	7.06	243	9.20	181	6.85	165	6.25	139	5.27	118	4.48
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
E47-E53	事故傷害合計	463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害合計	389	14.81	377	14.42
E47	運輸事故	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54	V01-V99	運輸事故傷害	153	5.83	165	6.31
E48	意外中毒	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91	W00-W19	跌倒(落)	91	3.47	72	2.75
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	W65-W74	意外溺死和淹沒	26	0.99	17	0.65
E50	意外墜落	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31	W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	19	0.72	24	0.92
E51	火及火焰所致之事故傷 害	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27	X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和 火焰	6	0.23	7	0.27
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	140	5.33	83	3.17	91	3.47	82	3.12	X40-X49	毒害物質(所致)的意外中 毒及暴露	25	0.95	26	0.99
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-		其他	69	2.63	66	2.52

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
E47-E53	事故傷害合計	535	40.42	560	42.75	491	37.80	494	37.89	437	33.34	426	32.53	365	27.97	359	27.60	316	24.37
E47	運輸事故	278	21.00	289	22.06	261	20.09	228	17.49	152	11.60	165	12.60	146	11.19	161	12.38	137	10.57
E48	意外中毒	32	2.42	22	1.68	25	1.92	13	1.00	17	1.30	20	1.53	14	1.07	20	1.54	19	1.47
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	69	5.21	83	6.34	74	5.70	83	6.37	88	6.71	101	7.71	74	5.67	70	5.38	67	5.17
E51	火及火焰所致之事故傷 害	21	1.59	24	1.83	23	1.77	24	1.84	11	0.84	9	0.69	8	0.61	10	0.77	13	1.00
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	134	10.12	142	10.84	108	8.31	145	11.12	168	12.82	131	10.00	123	9.43	98	7.53	80	6.17
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬			死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率			人數	死亡率	人數	死亡率
E47-E53	事故傷害合計	342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害合計	269	21.11	260	20.54
E47	運輸事故	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06	V01-V99	運輸事故傷害	104	8.16	110	8.69
E48	意外中毒	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25	W00-W19	跌倒(落)	66	5.18	55	4.35
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	W65-W74	意外溺死和淹沒	21	1.65	13	1.03
E50	意外墜落	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16	W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	13	1.02	15	1.19
E51	火及火焰所致之事故傷 害	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31	X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和 火焰	5	0.39	7	0.55
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	110	8.53	68	5.30	71	5.54	63	4.92	X40-X49	毒害物質(所致)的意外中 毒及暴露	17	1.33	14	1.11
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-		其他	43	3.37	46	3.63

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E47-E53	事故傷害合計	217	16.44	212	16.19	192	14.74	198	15.05	221	16.62	173	12.96	141	10.56	155	11.59	139	10.39
E47	運輸事故	115	8.71	102	7.79	90	6.91	107	8.13	69	5.19	60	4.50	49	3.67	88	6.58	52	3.89
E48	意外中毒	7	0.53	10	0.76	8	0.61	8	0.61	7	0.53	8	0.60	10	0.75	7	0.52	7	0.52
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.15	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-
E50	意外墜落	28	2.12	29	2.21	36	2.76	32	2.43	58	4.36	43	3.22	35	2.62	16	1.20	36	2.69
E51	火及火焰所致之事故傷 害	9	0.68	16	1.22	12	0.92	11	0.84	10	0.75	11	0.82	5	0.37	2	0.15	6	0.45
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	57	4.32	55	4.20	45	3.45	40	3.04	75	5.64	50	3.75	42	3.15	41	3.07	38	2.84
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E47-E53	事故傷害合計	121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害合計	120	8.88	117	8.67
E47	運輸事故	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15	V01-V99	運輸事故傷害	49	3.62	55	4.08
E48	意外中毒	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59	W00-W19	跌倒(落)	25	1.85	17	1.26
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	W65-W74	意外溺死和淹沒	5	0.37	4	0.30
E50	意外墜落	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55	W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	0.44	9	0.67
E51	火及火焰所致之事故傷 害	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22	X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和 火焰	1	0.07	-	-
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41	X40-X49	毒害物質(所致)的意外中 毒及暴露	8	0.59	12	0.89
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-		其他	26	1.92	20	1.48

表40·臺北市歷年自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
E54	自殺合計	206	7.79	224	8.55	214	8.22	201	7.67	212	8.03	237	8.96	290	10.98	325	12.32	320	12.15
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	30	1.15	22	0.85	26	0.99	21	0.8	17	0.64	25	0.95	27	1.02	30	1.14
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	2	0.08	2	0.08
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	5	0.19	7	0.26	25	0.95	82	3.11	56	2.13
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	109	4.12	125	4.77	141	5.42	89	3.40	103	3.9	134	5.07	122	4.62	116	4.40	113	4.29
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	18	0.68	9	0.34	7	0.27	14	0.53	12	0.45	15	0.57	26	0.98	21	0.80	22	0.84
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	3	0.11	1	0.04	2	0.08	-	-	-	-	2	0.08	1	0.04	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	14	0.53	6	0.23	5	0.19	9	0.34	5	0.19	7	0.27	6	0.23	4	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	1.51	32	1.22	28	1.08	54	2.06	47	1.78	46	1.74	60	2.27	54	2.05	78	2.96
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	9	0.34	9	0.35	10	0.38	14	0.53	12	0.45	21	0.80	16	0.61	15	0.57
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表40·臺北市歷年自殺死亡方式(續)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
E54	自殺合計	346	13.18	467	17.83	442	17.30	364	13.84	X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	370	14.09	341	13.04
E950	以固體或液體物質 自殺及自為中毒	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80	X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森 (氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中 毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	1	0.04
E951	以家用瓦斯自殺及 自為中毒	-	-	1	0.04	-	-	-	-	X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、 製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	6	0.23
E952	由其他氣體及蒸汽 自殺及自為中毒	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84	X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04
E953	吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79	X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自 為中毒及暴露	-	-	1	0.04
E954	溺水(淹水)自殺及自 傷	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25	X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴 露	124	4.72	99	3.79
E955	鎗砲及爆炸物自殺 及自傷	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08	X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	6	0.23
E956	切穿工具自殺及自 傷	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15	X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的 蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	6	0.23
E957	由高處跳下自殺及 自傷	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66	X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	109	4.17
E958	其他及未明示之方 式自殺及自傷	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27	X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	25	0.96
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍砲、火器等軍 火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-
										X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	5	0.19
										X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	4	0.15
										X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	68	2.60
										X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	3	0.11
										X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	1	0.04
										X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	6	0.23

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E54	自殺合計	123	9.29	155	11.83	125	9.62	125	9.59	143	10.91	143	10.92	192	14.72	214	16.45	203	15.66
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	11	0.83	20	1.53	11	0.85	14	1.07	15	1.14	9	0.69	15	1.15	17	1.31	17	1.31
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.15	2	0.15	1	0.08
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	-	-	5	0.38	6	0.46	18	1.38	62	4.77	43	3.32
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	71	5.36	88	6.72	84	6.47	61	4.68	80	6.1	87	6.64	82	6.28	79	6.07	76	5.86
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	8	0.60	5	0.38	6	0.46	10	0.77	7	0.53	8	0.61	17	1.30	12	0.92	11	0.85
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	2	0.15	1	0.08	2	0.15	-	-	-	-	2	0.15	1	0.08	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.15	10	0.76	5	0.38	4	0.31	8	0.61	3	0.23	6	0.46	4	0.31	3	0.23
E957	由高處跳下自殺及自傷	24	1.81	21	1.60	12	0.92	27	2.07	19	1.45	24	1.83	37	2.84	27	2.08	40	3.08
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	7	0.53	7	0.53	6	0.46	6	0.46	8	0.61	5	0.38	13	1.00	10	0.77	12	0.93
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E54	自殺合計	225	17.46	313	24.40	299	24.12	228	17.81	X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	231	18.13	234	18.49
E950	以固體或液體物質 自殺及自為中毒	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02	X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森 (氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中 毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	1	0.08
E951	以家用瓦斯自殺及 自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	-	-	X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、 製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	3	0.24
E952	由其他氣體及蒸汽 自殺及自為中毒	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78	X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08
E953	吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09	X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自 為中毒及暴露	-	-	1	0.08
E954	溺水(淹水)自殺及自 傷	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33	X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴 露	81	6.36	72	5.69
E955	鎗砲及爆炸物自殺 及自傷	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08	X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	3	0.24
E956	切穿工具自殺及自 傷	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16	X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的 蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.32
E957	由高處跳下自殺及 自傷	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89	X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	81	6.40
E958	其他及未明示之方 式自殺及自傷	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47	X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	19	1.50
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍砲、火器等軍 火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-
										X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	4	0.32
										X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	2	0.16
										X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	37	2.92
										X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-
										X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08
										X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	5	0.40

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E54	自殺合計	83	6.29	69	5.27	89	6.83	76	5.78	69	5.19	94	7.04	98	7.34	111	8.30	117	8.75
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	14	1.06	10	0.76	11	0.84	12	0.91	6	0.45	8	0.60	10	0.75	10	0.75	13	0.97
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	7	0.52	20	1.50	13	0.97
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	38	2.88	37	2.83	57	4.37	28	2.13	23	1.73	47	3.52	40	3.00	37	2.77	37	2.77
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	10	0.76	4	0.31	1	0.08	4	0.30	5	0.38	7	0.52	9	0.67	9	0.67	11	0.82
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	4	0.31	1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.15	1	0.07	2	0.15	1	0.07
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	11	0.84	16	1.23	27	2.05	28	2.11	22	1.65	23	1.72	27	2.02	38	2.84
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	2	0.15	2	0.15	3	0.23	4	0.30	6	0.45	7	0.52	8	0.60	6	0.45	3	0.22
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E54	自殺合計	121	9.06	154	11.52	143	10.80	136	10.07	X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28	107	7.93
E950	以固體或液體物質 自殺及自為中毒	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59	X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森 (氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為 中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-
E951	以家用瓦斯自殺及 自為中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、 製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	3	0.22
E952	由其他氣體及蒸汽 自殺及自為中毒	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00	X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-
										X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自 為中毒及暴露	-	-	-	-
E953	吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55	X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴 露	43	3.18	27	2.00
										X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	3	0.22
E954	溺水(淹水)自殺及自 傷	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18	X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的 蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	2	0.15
E955	鎗砲及爆炸物自殺 及自傷	-	-	-	-	-	-	1	0.07	X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	28	2.07
										X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	6	0.44
E956	切穿工具自殺及自 傷	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15	X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍 火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-
E957	由高處跳下自殺及 自傷	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44	X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07
										X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	2	0.15
E958	其他及未明示之方 式自殺及自傷	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07	X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	31	2.30
										X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	3	0.22
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-
										X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	1	0.07

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
85	457.75	474.91	128.52	130.61	52.84	55.12	51.96	53.52	24.21	25.00	12.68	13.77	14.05	14.78	29.48	29.19
86	463.27	459.89	134.67	131.73	55.84	55.60	50.96	50.27	29.02	28.60	10.61	10.84	14.53	14.27	26.25	25.33
87	465.98	445.91	133.21	125.92	50.82	48.32	49.75	47.19	24.70	23.24	12.60	12.10	15.77	15.04	26.42	25.48
88	470.49	434.03	134.97	123.57	54.08	49.01	45.78	41.26	32.68	29.91	15.00	13.84	15.87	14.72	24.92	23.86
89	484.10	428.95	141.38	125.80	47.35	41.22	52.20	45.46	37.97	32.88	11.95	10.32	17.29	15.08	22.66	21.42
90	500.81	426.61	154.88	132.24	52.38	43.72	52.91	43.95	34.20	28.60	13.90	11.26	18.56	15.45	19.17	17.72
91	503.41	410.73	158.05	129.89	54.97	43.43	46.74	37.24	33.70	26.67	16.98	12.98	17.29	13.45	19.49	17.86
92	517.40	402.53	151.87	120.46	62.33	46.71	50.29	37.85	35.91	27.21	21.52	15.83	19.09	14.36	17.27	15.35
93	523.20	392.14	160.09	122.12	65.99	46.85	47.24	33.77	34.02	24.96	17.03	11.49	19.16	13.77	17.64	15.78
94	547.41	392.62	163.78	120.21	63.56	42.87	52.19	35.74	37.72	26.19	21.84	13.82	20.77	13.94	15.84	14.03
95	528.71	364.83	168.54	118.90	58.19	38.38	45.04	29.23	36.05	23.79	21.91	13.32	18.48	12.19	14.44	12.68
96	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		慢性下呼吸道 疾病		腎炎、腎微候群 及腎性病變	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	45.66	27.26	36.18	20.14	27.26	16.89	16.98	9.27	18.70	11.20
<b>98</b>	<b>568.60</b>	<b>347.27</b>	<b>174.48</b>	<b>111.24</b>	<b>67.61</b>	<b>39.98</b>	<b>43.13</b>	<b>24.61</b>	<b>32.12</b>	<b>16.59</b>	<b>31.55</b>	<b>18.86</b>	<b>18.97</b>	<b>9.85</b>	<b>17.25</b>	<b>9.72</b>

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
85	8.55	8.14	14.01	13.91	5.04	5.31	12.52	13.16	6.99	7.33	3.32	3.52	4.09	4.18	3.51	4.84
86	8.22	7.65	13.41	12.87	4.96	4.93	10.99	10.90	6.99	6.88	2.42	2.46	6.92	6.88	4.07	5.46
87	7.67	7.20	14.85	13.92	4.43	4.39	10.73	10.24	7.64	7.07	2.25	2.18	4.66	4.42	2.71	3.58
88	8.03	7.12	15.30	14.31	2.65	2.45	9.47	8.60	5.91	5.32	3.07	2.73	3.75	3.34	3.11	4.40
89	8.96	7.94	14.11	12.45	3.21	2.76	7.22	6.23	5.37	4.62	4.20	3.55	4.20	3.61	3.06	4.20
90	10.98	9.70	13.83	11.89	4.39	3.57	6.33	5.24	5.64	4.72	2.84	2.28	3.37	2.80	2.54	3.64
91	12.32	10.72	11.56	9.55	4.13	3.22	6.79	5.21	4.66	3.66	2.31	1.80	3.11	2.33	2.43	3.59
92	12.15	10.29	13.93	11.22	3.53	2.56	5.39	3.98	4.37	3.21	2.43	1.79	3.72	2.74	1.56	2.41
93	13.18	10.93	12.69	9.96	3.58	2.52	6.36	4.43	4.31	2.92	2.67	1.89	2.82	2.01	1.83	3.32
94	17.83	14.79	12.33	9.20	5.73	3.78	6.18	4.14	4.16	2.79	2.94	2.06	2.29	1.62	1.49	2.66
95	17.30	14.12	12.08	8.86	5.53	3.48	6.71	4.30	3.51	2.26	3.01	1.89	2.59	1.63	1.60	2.92
96	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年	敗血症		高血壓性疾病		事故傷害		慢性肝病及肝硬化		蓄意自我傷害(自殺)		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		血管性及未明示之癡呆症		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	19.53	11.27	14.24	8.21	14.81	11.94	11.27	7.69	14.09	11.40	10.70	5.87	2.63	1.29	3.54	1.88
<b>98</b>	<b>16.86</b>	<b>9.44</b>	<b>14.72</b>	<b>8.17</b>	<b>14.42</b>	<b>11.20</b>	<b>13.35</b>	<b>8.79</b>	<b>13.04</b>	<b>10.39</b>	<b>13.00</b>	<b>6.39</b>	<b>4.28</b>	<b>2.06</b>	<b>3.52</b>	<b>1.89</b>

表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
85	568.85	558.35	161.70	155.99	68.10	66.65	62.76	60.47	23.59	23.04	17.25	17.64	14.81	14.80	42.75	41.78
86	565.92	534.47	164.36	153.91	70.06	65.79	61.43	57.33	30.02	27.73	14.55	13.94	17.24	15.80	37.80	35.96
87	578.81	528.10	165.22	148.86	62.67	56.32	60.06	53.70	24.78	22.12	17.72	16.10	17.80	16.00	37.89	36.44
88	579.35	510.34	170.53	149.76	68.29	58.54	53.33	45.15	31.66	27.51	20.52	17.75	16.25	14.54	33.34	31.57
89	598.84	508.07	179.93	153.80	62.93	52.48	61.48	51.02	38.64	31.91	14.66	11.83	18.48	15.35	32.53	30.28
90	617.44	506.38	196.59	160.95	69.44	56.05	62.85	49.69	34.49	27.60	17.86	13.72	19.70	15.75	27.97	25.64
91	615.07	486.19	193.72	154.72	68.88	53.03	56.43	43.79	35.67	27.07	24.14	17.44	18.91	14.60	27.60	25.21
92	633.43	478.70	187.41	144.63	76.82	55.94	63.09	46.02	35.71	26.53	28.46	19.91	20.13	14.57	24.37	21.59
93	647.93	474.26	201.24	149.63	85.88	59.64	56.24	39.19	34.13	24.46	23.27	14.96	21.57	14.97	26.53	23.74
94	683.06	480.28	205.00	148.15	82.62	54.25	64.07	43.39	40.61	27.75	28.84	17.20	25.26	16.55	24.32	21.46
95	654.67	445.74	210.37	146.09	75.79	49.62	53.08	34.17	36.92	24.11	29.12	17.22	20.37	13.06	21.93	19.32
96	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		慢性下呼吸道 疾病		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	53.13	32.56	48.58	26.32	27.62	17.36	26.45	13.76	21.11	17.19
<b>98</b>	<b>693.85</b>	<b>425.20</b>	<b>211.03</b>	<b>134.11</b>	<b>86.99</b>	<b>52.89</b>	<b>51.12</b>	<b>29.05</b>	<b>41.72</b>	<b>21.04</b>	<b>33.42</b>	<b>20.41</b>	<b>29.79</b>	<b>15.11</b>	<b>20.54</b>	<b>16.29</b>

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
85	11.83	11.21	19.32	18.61	5.95	5.88	14.51	13.75	8.40	8.04	4.81	4.78	6.11	5.87	4.12	5.30
86	9.62	8.91	19.02	17.91	5.70	5.31	12.16	11.49	9.16	8.45	3.00	2.81	10.85	10.11	4.62	6.03
87	9.59	9.06	21.25	19.75	4.91	4.58	12.20	11.07	10.20	8.76	2.84	2.69	7.06	6.37	2.84	3.57
88	10.91	9.73	23.35	21.96	2.90	4.77	10.91	9.57	7.17	5.78	4.12	3.40	5.95	4.84	2.82	3.87
89	10.92	9.42	19.32	16.79	3.13	2.44	8.94	7.24	7.56	6.10	5.80	4.57	6.57	5.39	3.59	4.74
90	14.72	13.27	18.32	15.79	4.52	3.58	6.74	5.51	7.28	5.95	3.83	2.94	5.82	4.56	2.53	3.42
91	16.45	13.99	16.07	13.27	4.07	2.97	7.61	5.58	5.77	4.35	2.69	2.07	5.15	3.60	2.61	3.72
92	15.66	13.42	19.20	15.43	4.70	3.22	5.40	4.00	5.24	3.69	3.24	2.24	5.78	4.09	1.77	2.62
93	17.46	14.81	17.22	13.87	4.19	2.83	6.36	4.29	5.66	3.64	3.34	2.25	4.58	3.14	1.94	3.25
94	24.40	20.52	14.97	11.51	5.69	3.62	8.26	5.49	5.53	3.57	4.05	2.78	3.90	2.70	1.33	2.20
95	24.12	20.00	16.39	12.38	5.70	3.34	7.34	4.78	4.53	2.83	3.36	2.06	4.14	2.46	1.25	2.40
96	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年	腎炎、腎微候群及腎性病變		蓄意自我傷害(自殺)		敗血症		慢性肝病及肝硬化		高血壓性疾病		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		帕金森病		主動脈瘤及剝離	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	18.83	11.24	18.13	15.00	20.64	11.78	15.46	10.94	16.01	9.43	10.36	5.63	4.39	2.24	3.85	2.26
<b>98</b>	<b>19.67</b>	<b>10.79</b>	<b>18.49</b>	<b>14.83</b>	<b>18.41</b>	<b>10.28</b>	<b>18.33</b>	<b>12.76</b>	<b>16.28</b>	<b>9.25</b>	<b>11.22</b>	<b>5.05</b>	<b>4.90</b>	<b>2.56</b>	<b>4.27</b>	<b>2.79</b>

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎徵候群及腎性病變		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
85	346.60	384.85	95.32	102.11	37.58	42.33	41.17	46.07	24.82	27.76	13.29	14.93	8.10	9.40	5.27	5.03
86	360.94	381.88	105.07	108.40	41.67	44.63	40.52	43.01	28.01	29.90	11.82	12.55	6.68	7.30	6.83	6.47
87	354.16	359.17	101.48	100.73	39.07	39.75	39.53	40.17	24.63	25.10	13.76	13.97	7.53	7.74	5.78	5.41
88	363.23	354.77	99.92	95.83	40.07	38.68	38.35	37.28	33.68	32.98	15.49	15.09	9.55	9.41	5.19	4.62
89	371.52	347.71	103.56	96.02	32.07	29.71	43.09	39.97	37.32	34.73	16.11	14.98	9.29	8.60	7.04	6.37
90	386.85	346.12	114.12	101.60	35.72	31.32	43.21	38.11	33.92	30.31	17.45	15.28	10.03	8.53	7.34	6.33
91	394.76	336.33	123.33	105.00	41.44	34.13	37.32	30.92	31.79	26.66	15.71	13.06	10.02	8.19	8.30	7.14
92	404.96	328.28	117.42	96.19	48.28	37.79	37.90	29.85	36.10	28.60	18.09	14.30	14.80	11.55	8.75	7.39
93	402.84	312.67	120.38	94.63	46.79	34.35	38.55	28.72	33.91	26.02	16.84	12.63	11.00	7.84	9.06	8.26
94	417.20	309.11	124.20	93.11	45.27	31.66	40.78	28.68	34.94	25.11	16.46	11.53	15.11	10.25	11.52	9.63
95	408.57	288.49	128.65	92.46	41.39	27.76	37.37	24.78	35.21	23.87	16.68	11.39	15.04	9.47	10.80	8.87
96	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		敗血症		腎炎、腎徵候群 及腎性病變	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	38.61	22.90	26.93	16.79	24.49	14.14	18.49	10.99	18.57	11.35
<b>98</b>	<b>451.14</b>	<b>276.88</b>	<b>140.20</b>	<b>90.07</b>	<b>49.43</b>	<b>28.58</b>	<b>35.64</b>	<b>20.63</b>	<b>29.79</b>	<b>17.72</b>	<b>23.12</b>	<b>12.35</b>	<b>15.41</b>	<b>8.77</b>	<b>14.97</b>	<b>8.70</b>

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
85	8.71	9.53	16.19	16.85	4.12	4.65	10.54	12.06	5.58	6.32	1.83	2.11	2.90	4.36	0.46	0.50
86	7.83	8.20	14.74	14.94	4.22	4.57	9.82	10.47	4.84	5.11	1.84	2.02	3.53	4.85	0.69	0.79
87	8.51	8.65	15.05	14.87	3.95	4.06	9.27	9.49	5.09	5.10	1.67	1.71	2.58	3.61	0.53	0.56
88	7.37	7.15	16.62	16.43	2.41	2.42	8.05	7.76	4.66	4.58	2.03	1.95	3.38	4.95	0.45	0.45
89	8.99	8.51	12.96	12.93	3.30	3.02	5.55	5.14	3.22	2.95	2.62	2.40	2.55	3.64	1.27	1.13
90	9.44	8.56	10.56	10.05	4.27	3.70	5.92	5.13	4.04	3.49	1.87	1.60	2.55	3.86	0.97	0.86
91	7.18	6.18	11.59	11.02	4.19	3.46	5.98	4.82	3.59	2.95	1.94	1.56	2.24	3.45	0.67	0.58
92	8.82	7.44	10.39	9.44	2.39	1.84	5.38	4.13	3.51	2.70	1.64	1.31	1.35	2.20	1.05	0.84
93	8.31	6.60	9.06	7.40	2.99	2.15	6.36	4.65	2.99	2.20	2.02	1.51	1.72	3.40	1.27	0.99
94	9.80	7.32	7.71	7.05	5.76	4.00	4.19	2.87	2.84	1.97	1.87	1.36	1.65	3.15	0.97	0.76
95	7.97	5.79	7.30	6.30	5.36	3.59	6.10	3.95	2.53	1.69	2.68	1.74	1.94	3.45	1.56	1.06
96	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		高血壓性疾病		慢性下呼吸道疾病		事故傷害		慢性肝病及肝硬化		蓄意自我傷害(自殺)		血管性及未明示之癡呆症		肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	11.02	6.25	12.58	7.27	8.06	4.57	8.88	6.98	7.32	4.87	10.28	8.19	2.81	1.48	2.81	1.57
<b>98</b>	<b>14.67</b>	<b>7.76</b>	<b>13.26</b>	<b>7.33</b>	<b>8.82</b>	<b>4.61</b>	<b>8.67</b>	<b>6.49</b>	<b>8.67</b>	<b>5.38</b>	<b>7.93</b>	<b>6.48</b>	<b>5.04</b>	<b>2.57</b>	<b>2.45</b>	<b>1.46</b>

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		3,180	120.31		3,366	128.52		3,504	134.67		3,489	133.21		3,564	134.97		3,738	141.38
162	肺癌	1	615	23.27	1	645	24.63	1	718	27.59	1	729	27.83	1	750	28.40	1	751	28.41
155	肝癌	2	570	21.56	2	581	22.18	2	606	23.29	2	588	22.45	2	564	21.36	2	562	21.26
153 154	結腸直腸癌	3	329	12.45	3	386	14.74	3	366	14.07	3	398	15.20	3	417	15.79	3	462	17.47
174	女性乳癌(1)	5	135	10.23	5	153	11.69	4	182	13.97	5	164	12.47	4	162	12.18	4	169	12.66
151	胃癌	4	328	12.41	4	356	13.59	5	346	13.30	4	327	12.48	5	317	12.00	5	328	12.41
185	攝護腺癌(2)	7	51	3.85	7	68	5.19	8	65	5.00	8	66	5.06	7	91	6.94	7	93	7.10
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	92	3.48	8	133	5.08	7	133	5.11	7	136	5.19	8	143	5.42	9	136	5.14
157	胰臟癌	9	97	3.67	9	111	4.24	10	109	4.19	9	112	4.28	9	122	4.62	8	138	5.22
179 180	子宮頸癌(1)	6	108	8.18	6	102	7.79	6	128	9.82	6	102	7.75	6	113	8.50	6	97	7.27
156	膽囊癌	15	64	2.42	14	81	3.09	16	71	2.73	11	93	3.55	12	94	3.56	12	104	3.93
183	卵巢癌(1)	11	44	3.33	12	44	3.36	15	36	2.76	14	42	3.19	13	41	3.08	14	42	3.15
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	78	2.95	13	88	3.36	9	113	4.34	15	79	3.02	10	98	3.71	10	113	4.27
150	食道癌	14	75	2.84	14	81	3.09	11	102	3.92	12	88	3.36	11	97	3.67	11	108	4.08
204-208	白血病	8	100	3.78	11	89	3.40	12	94	3.61	10	99	3.78	14	76	2.88	13	99	3.74
188	膀胱癌	17	57	2.16	17	55	2.10	17	56	2.15	16	66	2.52	16	66	2.50	15	83	3.14
	其他		437	16.53		393	15.01		379	14.57		400	15.27		413	15.64		453	17.13
註：	年中人口數		2,643,220		2,619,118		2,601,934		2,619,216		2,640,626		2,643,893						

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		4,089	154.88		4,169	158.05		4,001	151.87		4,202	160.09		4,290	163.78		4,423	168.54
162	肺癌	1	883	33.45	1	889	33.70	1	847	32.15	1	880	33.53	1	870	33.21	1	910	34.68
155	肝癌	2	671	25.42	2	661	25.06	2	664	25.20	2	677	25.79	2	607	23.17	2	702	26.75
153 154	結腸直腸癌	3	444	16.82	3	490	18.58	3	436	16.55	3	518	19.73	3	542	20.69	3	532	20.27
174	女性乳癌(1)	4	199	14.90	4	192	14.36	4	208	15.55	4	203	15.20	4	224	16.76	4	209	15.56
151	胃癌	5	349	13.22	5	374	14.18	5	294	11.16	5	311	11.85	5	354	13.51	5	363	13.83
185	攝護腺癌(2)	6	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	6	122	9.46	6	133	10.37	6	129	10.07
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	130	4.92	8	172	6.52	8	166	6.30	9	148	5.64	7	181	6.91	8	175	6.67
157	胰臟癌	9	124	4.70	9	157	5.95	9	146	5.54	8	164	6.25	9	168	6.41	7	178	6.78
179 180	子宮頸癌(1)	7	110	8.24	7	105	7.85	7	85	6.35	7	87	6.51	8	86	6.43	10	81	6.03
156	膽囊癌	12	106	4.01	11	119	4.51	13	101	3.83	11	125	4.76	12	120	4.58	12	116	4.42
183	卵巢癌(1)	11	56	4.19	12	53	3.96	14	49	3.66	12	58	4.34	14	50	3.74	11	73	5.43
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	113	4.28	14	92	3.49	10	125	4.74	10	138	5.26	10	146	5.57	9	166	6.33
150	食道癌	13	103	3.90	10	123	4.66	12	104	3.95	14	106	4.04	11	126	4.81	14	97	3.70
204-208	白血病	14	97	3.67	13	94	3.56	11	109	4.14	13	108	4.11	13	100	3.82	13	98	3.73
188	膀胱癌	16	76	2.88	17	60	2.27	16	56	2.13	15	92	3.51	16	66	2.52	16	82	3.12
	其他		508	19.24		482	18.27		504	19.13		465	17.72		517	19.74		512	19.51
註：	年中人口數		2,640,138		2,637,829		2,634,497		2,624,805		2,619,424		2,624,309						

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		4,566	173.56	C00-C97	所有癌症死亡原因		4,467	170.10		4,563	174.48
162	肺癌	1	987	37.52	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34	1	967	36.98
155	肝癌	2	666	25.32	C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69	2	665	25.43
153 154	結腸直腸癌	3	557	21.17	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59	3	592	22.64
174	女性乳癌(1)	4	203	15.03	C50	女性乳房癌(1)	4	228	16.87	4	236	17.49
151	胃癌	5	329	12.51	C16	胃癌	5	312	11.88	5	319	12.20
185	攝護腺癌(2)	6	136	10.62	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	124	9.73	6	142	11.22
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	7	217	8.25	C25	胰臟癌	7	192	7.31	7	237	9.06
157	胰臟癌	8	178	6.77	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	9	131	4.99	8	148	5.66
179 180	子宮頸癌(1)	9	89	6.59	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	75	5.55	9	69	5.11
156	膽囊癌	10	149	5.66	C15	食道癌	12	120	4.57	10	129	4.93
183	卵巢癌(1)	11	74	5.48	C56	卵巢癌(1)	13	58	4.29	11	65	4.82
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	134	5.09	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	131	4.99	12	119	4.55
150	食道癌	13	126	4.79	C91-C95	白血病	11	121	4.61	13	106	4.05
204-208	白血病	14	107	4.07	C67	膀胱癌	15	80	3.05	14	80	3.06
188	膀胱癌	15	91	3.46	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	16	66	2.51	15	73	2.79
	其他		523	19.88		其他		633	24.10		616	23.55

註： 年中人口數 2,630,756

2,626,096

2,615,176

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		1,977	149.38		2,118	161.70		2,135	164.36		2,154	165.22		2,235	170.53		2,356	179.93
162	肺癌	2	414	31.28	1	448	34.20	1	471	36.26	1	482	36.97	1	542	41.35	1	514	39.26
155	肝癌	1	436	32.94	2	445	33.97	2	458	35.26	2	460	35.28	2	430	32.81	2	432	32.99
153 154	結腸直腸癌	4	191	14.43	4	236	18.02	4	226	17.40	4	220	16.87	3	240	18.31	3	264	20.16
151	胃癌	3	212	16.02	3	255	19.47	3	228	17.55	3	228	17.49	4	203	15.49	4	218	16.65
185	攝護腺癌	11	51	3.85	8	68	5.19	8	65	5.00	9	66	5.06	5	91	6.94	7	93	7.10
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	66	4.99	5	80	6.11	7	79	6.08	6	74	5.68	6	86	6.56	8	91	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	73	5.52	6	77	5.88	5	101	7.78	6	74	5.68	7	82	6.26	6	94	7.18
150	食道癌	8	64	4.84	7	69	5.27	6	90	6.93	5	79	6.06	7	82	6.26	5	100	7.64
157	胰臟癌	9	63	4.76	10	63	4.81	10	58	4.47	8	72	5.52	9	73	5.57	9	84	6.42
156	膽囊癌	16	27	2.04	12	40	3.05	14	34	2.62	12	56	4.30	11	52	3.97	11	55	4.20
204-208	白血病	7	65	4.91	11	55	4.20	11	53	4.08	10	64	4.91	12	49	3.74	10	68	5.19
188	膀胱癌	12	42	3.17	12	40	3.05	12	41	3.16	13	51	3.91	13	48	3.66	12	54	4.12
147	鼻咽癌	9	63	4.76	9	67	5.12	9	64	4.93	11	57	4.37	10	54	4.12	13	51	3.89
191	腦癌	14	29	2.19	14	37	2.82	12	41	3.16	15	33	2.53	15	27	2.06	15	26	1.99
161	喉癌	15	28	2.12	16	17	1.30	17	12	0.92	16	21	1.61	16	25	1.91	16	24	1.83
	其他		153	11.56		121	9.24		114	8.78		117	8.97		151	11.52		188	14.36
註：	年中人口數		1,323,509		1,309,828		1,298,943		1,303,713		1,310,612		1,309,371						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		2,565	196.59		2,520	193.72		2,430	187.41		2,594	201.24		2,630	205.00		2,695	210.37
162	肺癌	1	619	47.44	1	588	45.20	1	572	44.12	1	599	46.47	1	562	43.81	1	608	47.46
155	肝癌	2	491	37.63	2	492	37.82	2	477	36.79	2	495	38.40	2	445	34.69	2	518	40.43
153 154	結腸直腸癌	3	261	20.00	3	285	21.91	3	246	18.97	3	306	23.74	3	306	23.85	3	316	24.67
151	胃癌	4	244	18.70	4	231	17.76	4	185	14.27	4	198	15.36	4	236	18.40	4	240	18.73
185	攝護腺癌	5	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	5	122	9.46	5	133	10.37	6	129	10.07
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	90	6.90	7	97	7.46	8	92	7.10	7	91	7.06	8	115	8.96	7	112	8.74
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	6	96	7.36	9	82	6.30	5	111	8.56	5	122	9.46	6	133	10.37	5	147	11.47
150	食道癌	7	92	7.05	5	116	8.92	7	96	7.40	7	91	7.06	7	116	9.04	9	87	6.79
157	胰臟癌	9	71	5.44	8	96	7.38	9	86	6.63	9	89	6.90	9	103	8.03	8	96	7.49
156	膽囊癌	13	52	3.99	10	61	4.69	12	52	4.01	11	65	5.04	10	70	5.46	11	60	4.68
204-208	白血病	10	62	4.75	12	48	3.69	10	66	5.09	10	68	5.28	11	59	4.60	12	54	4.22
188	膀胱癌	11	61	4.68	13	46	3.54	13	41	3.16	12	62	4.81	13	45	3.51	13	50	3.90
147	鼻咽癌	11	61	4.68	11	52	4.00	11	54	4.16	13	55	4.27	12	59	4.60	10	65	5.07
191	腦癌	16	28	2.15	15	28	2.15	16	21	1.62	15	26	2.02	14	32	2.49	14	33	2.58
161	喉癌	15	36	2.76	16	17	1.31	14	33	2.55	16	18	1.40	15	20	1.56	16	20	1.56
	其他		181	13.87		175	13.45		191	14.73		187	14.51		196	15.28		160	12.49
註：	年中人口數		1,304,744		1,300,818		1,296,600		1,289,022		1,282,908		1,281,102						

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		2,757	215.37	C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73		2,671	211.03
162	肺癌	1	635	49.60	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54	1	596	47.09
155	肝癌	2	488	38.12	C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30	2	449	35.47
153 154	結腸直腸癌	3	308	24.06	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13	3	311	24.57
151	胃癌	4	214	16.72	C16	胃癌	4	218	17.11	4	203	16.04
185	攝護腺癌	5	136	10.62	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73	5	142	11.22
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	129	10.08	C25	胰臟癌	7	114	8.95	6	137	10.82
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	117	9.14	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02	7	136	10.75
150	食道癌	8	107	8.36	C15	食道癌	8	107	8.40	8	109	8.61
157	胰臟癌	9	91	7.11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96	9	77	6.08
156	膽囊癌	10	89	6.95	C91-C95	白血病	10	76	5.96	10	64	5.06
204-208	白血病	11	68	5.31	C67	膀胱癌	12	57	4.47	12	56	4.42
188	膀胱癌	12	65	5.08	C11	鼻咽癌	11	61	4.79	12	49	3.87
147	鼻咽癌	13	63	4.92	C64-C65	腎臟癌	14	28	2.20	13	39	3.08
191	腦癌	14	26	2.03	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43	14	38	3.00
161	喉癌	15	19	1.48	C71	腦癌	15	26	2.04	15	35	2.77
	其他		202	15.78		其他		251	19.70		230	18.17
註：	年中人口數		1,280,124				1,274,252			1,265,699		

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		1,203	91.16		1,248	95.32		1,369	105.07		1,335	101.48		1,329	99.92		1,382	103.56
162	肺癌	1	201	15.23	1	197	15.05	1	247	18.96	1	247	18.78	1	208	15.64	1	237	17.76
153 154	結腸直腸癌	2	138	10.46	3	150	11.46	4	140	10.74	2	178	13.53	2	177	13.31	2	198	14.84
174	女性乳癌	3	135	10.23	2	153	11.69	2	182	13.97	3	164	12.47	3	162	12.18	3	169	12.66
155	肝癌	4	134	10.15	4	136	10.39	3	148	11.36	4	128	9.73	4	134	10.08	4	130	9.74
151	胃癌	5	116	8.79	6	101	7.71	6	118	9.06	6	99	7.53	5	114	8.57	5	110	8.24
179 180	子宮頸癌	6	108	8.18	5	102	7.79	5	128	9.82	5	102	7.75	6	113	8.50	6	97	7.27
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	11	26	1.97	7	53	4.05	7	54	4.14	7	62	4.71	7	57	4.29	9	45	3.37
157	胰臟癌	10	34	2.58	8	48	3.67	8	51	3.91	9	40	3.04	8	49	3.68	7	54	4.05
183	卵巢癌	7	44	3.33	9	44	3.36	11	36	2.76	8	42	3.19	10	41	3.08	10	42	3.15
156	膽囊癌	8	37	2.80	10	41	3.13	10	37	2.84	10	37	2.81	9	42	3.16	8	49	3.67
204-208	白血病	9	35	2.65	11	34	2.60	9	41	3.15	11	35	2.66	11	27	2.03	11	31	2.32
182	子宮體癌	19	8	0.61	18	7	0.53	-	-	-	25	1	0.08	12	20	1.50	15	17	1.27
188	膀胱癌	15	15	1.14	15	15	1.15	15	15	1.15	15	15	1.14	13	18	1.35	12	29	2.17
191	腦癌	12	23	1.74	12	23	1.76	12	31	2.38	12	27	2.05	17	12	0.90	16	15	1.12
150	食道癌	16	11	0.83	16	12	0.92	16	12	0.92	18	9	0.68	16	15	1.13	18	8	0.60
	其他		138	10.46		132	10.08		129	9.90		149	11.33		140	10.53		151	11.31
註：	年中人口數		1,319,712		1,309,291		1,302,990		1,315,503		1,330,014		1,334,522						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			
		順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		1,524	114.12		1,649	123.33		1,571	117.42		1,608	120.38		1,660	124.20		1,728	128.65	
162	肺癌	1	264	19.77	1	301	22.51	1	275	20.55	1	281	21.04	1	308	23.05	1	302	22.48	
153 154	結腸直腸癌	3	183	13.70	2	205	15.33	3	190	14.20	2	212	15.87	2	236	17.66	2	216	16.08	
174	女性乳癌	2	199	14.90	3	192	14.36	2	208	15.55	3	203	15.20	3	224	16.76	3	209	15.56	
155	肝癌	4	180	13.48	4	169	12.64	4	187	13.98	4	182	13.62	4	162	12.12	4	184	13.70	
151	胃癌	6	105	7.86	5	143	10.70	5	109	8.15	5	113	8.46	5	118	8.83	5	123	9.16	
179 180	子宮頸癌	5	110	8.24	6	105	7.85	6	85	6.35	6	87	6.51	6	86	6.43	7	81	6.03	
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	40	3.00	7	75	5.61	7	74	5.53	10	57	4.27	7	66	4.94	9	63	4.69	
157	胰臟癌	9	53	3.97	8	61	4.56	8	60	4.48	7	75	5.61	8	65	4.86	6	82	6.10	
183	卵巢癌	7	56	4.19	10	53	3.96	9	49	3.66	9	58	4.34	10	50	3.74	8	73	5.43	
156	膽囊癌	8	54	4.04	9	58	4.34	9	49	3.66	8	60	4.49	9	50	3.74	10	56	4.17	
204-208	白血病	11	35	2.62	11	46	3.44	11	43	3.21	11	40	2.99	11	41	3.07	11	44	3.28	
182	子宮體癌	16	16	1.20	13	23	1.72	15	16	1.20	14	22	1.65	13	22	1.65	13	25	1.86	
188	膀胱癌	17	15	1.12	16	14	1.05	16	15	1.12	12	30	2.25	14	21	1.57	15	32	2.38	
191	腦癌	14	22	1.65	15	18	1.35	12	23	1.72	13	24	1.80	12	25	1.87	16	22	1.64	
150	食道癌	18	11	0.82	21	7	0.52	21	8	0.60	18	15	1.12	18	10	0.75	19	10	0.74	
	其他		181	13.55		179	13.39		180	13.45		149	11.15		176	13.17		206	15.34	
註：	年中人口數		1,335,394			1,337,010			1,337,897			1,335,782			1,336,516			1,343,207		

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		1,809	133.94	C00-C97	所有癌症死亡原因		1,769	130.86		1,892	140.20
162	肺癌	1	352	26.06	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78	1	371	27.49
153 154	結腸直腸癌	2	249	18.44	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31	2	281	20.82
174	女性乳癌	3	203	15.03	C50	女性乳房癌	3	228	16.87	3	236	17.49
155	肝癌	4	178	13.18	C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76	4	216	16.01
151	胃癌	5	115	8.51	C16	胃癌	5	94	6.95	5	116	8.60
179 180	子宮頸癌	6	89	6.59	C25	胰臟癌	6	78	5.77	6	100	7.41
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	7	88	6.52	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	75	5.55	7	69	5.11
157	胰臟癌	8	87	6.44	C56	卵巢癌	8	58	4.29	8	65	4.82
183	卵巢癌	9	74	5.48	C91-C95	白血病	10	45	3.33	9	42	3.11
156	膽囊癌	10	60	4.44	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07	10	42	3.11
204-208	白血病	11	39	2.89	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	11	35	2.59	11	35	2.59
182	子宮體癌	12	26	1.93	C64-C65	腎臟癌	14	26	1.92	12	28	2.07
188	膀胱癌	13	26	1.93	C67	膀胱癌	15	23	1.70	13	24	1.78
191	腦癌	14	20	1.48	C54	子宮體癌	12	28	2.07	14	23	1.70
150	食道癌	15	19	1.41	C71	腦癌	15	23	1.70	15	21	1.56
	其他		184	13.62		其他		219	16.20		223	16.52
註：	年中人口數		1,350,632				1,351,844			1,349,477		

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
85	128.52	130.61	24.63	25.11	22.18	22.54	14.74	15.13	11.69	11.54	13.59	13.65	5.19	4.70	5.08	5.21
86	134.67	131.73	27.59	26.66	23.29	22.95	14.07	13.85	13.97	13.25	13.30	12.96	5.00	4.66	5.11	5.10
87	133.21	125.92	27.83	25.93	22.45	21.54	15.20	14.56	12.47	11.87	12.48	11.57	5.06	4.30	5.19	5.01
88	134.97	123.57	28.40	25.63	21.36	19.93	15.79	14.44	12.18	11.19	12.00	10.83	6.94	5.68	5.42	4.86
89	141.38	125.80	28.41	24.95	21.26	19.43	17.47	15.37	12.66	11.48	12.41	10.71	7.10	5.68	5.14	4.61
90	154.88	132.24	33.45	28.02	25.42	22.35	16.82	14.23	14.90	12.94	13.22	11.07	9.20	6.83	4.92	4.15
91	158.05	129.89	33.70	27.17	25.06	21.27	18.58	15.06	14.36	12.05	14.18	11.21	8.15	5.70	6.52	5.31
92	151.87	120.46	32.15	25.14	25.20	20.37	16.55	12.76	15.55	12.66	11.16	8.52	8.25	5.53	6.30	5.13
93	160.09	122.12	33.53	25.03	25.79	20.05	19.73	14.86	15.20	11.80	11.85	8.66	9.46	5.88	5.64	4.32
94	163.78	120.21	33.21	23.58	23.17	17.60	20.69	14.85	16.76	12.67	13.51	9.41	10.37	6.14	6.91	5.12
95	168.54	118.90	34.68	23.70	26.75	19.75	20.27	14.03	15.56	11.37	13.83	9.15	10.07	5.68	6.67	4.78
96	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68
年	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		女性乳房癌		胃癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	170.10	112.87	35.34	22.90	26.69	18.47	21.59	13.90	16.87	11.66	11.88	7.51	9.73	5.35	7.31	4.85
<b>98</b>	<b>174.48</b>	<b>111.24</b>	<b>36.98</b>	<b>22.87</b>	<b>25.43</b>	<b>16.63</b>	<b>22.64</b>	<b>14.01</b>	<b>17.49</b>	<b>11.55</b>	<b>12.20</b>	<b>7.31</b>	<b>11.22</b>	<b>5.88</b>	<b>9.06</b>	<b>5.74</b>

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
85	4.24	4.31	7.79	8.16	3.09	3.24	3.36	3.51	3.36	3.49	3.09	3.20	3.40	3.51	2.10	2.13
86	4.19	4.01	9.82	10.16	2.73	2.76	2.76	2.82	4.34	4.20	3.92	3.80	3.61	3.61	2.15	2.12
87	4.28	4.00	7.75	7.32	3.55	3.45	3.19	3.00	3.02	2.76	3.36	3.16	3.78	3.66	2.52	2.37
88	4.62	4.19	8.50	7.95	3.56	3.28	3.08	2.90	3.71	3.51	3.67	3.49	2.88	2.79	2.50	2.25
89	5.22	4.57	7.27	6.51	3.93	3.55	3.15	2.85	4.27	3.84	4.08	3.62	3.74	3.48	3.14	2.78
90	4.70	3.91	8.24	7.39	4.01	3.40	4.19	3.62	4.28	3.71	3.90	3.42	3.67	3.19	2.88	2.28
91	5.95	4.89	7.85	6.60	4.51	3.72	3.96	3.31	3.49	3.00	4.66	3.88	3.56	3.15	2.27	1.80
92	5.54	4.31	6.35	5.09	3.83	2.96	3.66	3.05	4.74	3.93	3.95	3.16	4.14	3.70	2.13	1.58
93	6.25	4.84	6.51	4.90	4.76	3.56	4.34	3.38	5.26	4.26	4.04	3.19	4.11	3.43	3.51	2.44
94	6.41	4.61	6.43	4.89	4.58	3.44	3.74	2.76	5.57	4.30	4.81	3.76	3.82	3.07	2.52	1.74
95	6.78	4.75	6.03	4.26	4.42	3.04	5.43	3.91	6.33	4.81	3.70	2.66	3.73	2.77	3.12	1.97
96	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年	口腔癌		子宮頸及部位未明示子宮癌		食道癌		卵巢癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		膀胱癌		膽囊和其他膽道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	4.99	3.43	5.55	3.62	4.57	3.16	4.29	2.96	4.99	3.18	4.61	3.42	3.05	1.83	2.51	1.63
<b>98</b>	<b>5.66</b>	<b>3.78</b>	<b>5.11</b>	<b>3.31</b>	<b>4.93</b>	<b>3.23</b>	<b>4.82</b>	<b>3.36</b>	<b>4.55</b>	<b>2.85</b>	<b>4.05</b>	<b>2.92</b>	<b>3.06</b>	<b>1.72</b>	<b>2.79</b>	<b>1.75</b>

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤		口腔癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
85	161.70	155.99	34.20	32.85	33.97	33.64	18.02	17.08	19.47	18.18	5.19	4.70	6.11	5.84	5.88	6.16
86	164.36	153.91	36.26	32.50	35.26	33.96	17.40	16.38	17.55	16.28	5.00	4.66	6.08	5.66	7.78	7.49
87	165.22	148.86	36.97	31.79	35.28	32.90	16.87	15.20	17.49	15.13	5.06	4.30	5.68	5.32	5.68	5.23
88	170.53	149.76	41.35	35.19	32.81	29.90	18.31	15.99	15.49	13.17	6.94	5.68	6.56	5.54	6.26	6.04
89	179.93	153.80	39.26	32.31	32.99	29.86	20.16	16.82	16.65	13.60	7.10	5.68	6.95	5.93	7.18	6.62
90	196.59	160.95	47.44	37.48	37.63	32.68	20.00	16.23	18.70	14.79	9.20	6.83	6.90	5.62	7.36	6.51
91	193.72	154.72	45.20	34.72	37.82	32.06	21.91	17.15	17.76	13.19	8.15	5.70	7.46	5.76	6.30	5.62
92	187.41	144.63	44.12	33.18	36.79	29.57	18.97	14.09	14.27	10.49	8.25	5.53	7.10	5.52	8.56	7.37
93	201.24	149.63	46.47	33.20	38.40	30.08	23.74	17.23	15.36	10.60	9.46	5.88	7.06	5.28	9.46	7.95
94	205.00	148.15	43.81	30.08	34.69	26.89	23.85	16.86	18.40	12.46	10.37	6.14	8.96	6.51	10.37	8.18
95	210.37	146.09	47.46	31.25	40.43	30.73	24.67	17.02	18.73	11.98	10.07	5.68	8.74	6.09	11.47	9.00
96	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		胃癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌		口腔癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	17.11	10.69	9.73	5.35	8.95	6.11	9.02	6.44
<b>98</b>	<b>211.03</b>	<b>134.11</b>	<b>47.09</b>	<b>28.32</b>	<b>35.47</b>	<b>24.25</b>	<b>24.57</b>	<b>15.19</b>	<b>16.04</b>	<b>9.38</b>	<b>11.22</b>	<b>5.88</b>	<b>10.82</b>	<b>6.77</b>	<b>10.75</b>	<b>7.48</b>

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
85	5.27	5.11	4.81	4.51	3.05	3.09	4.20	4.09	3.05	2.94	5.12	4.97	2.82	2.58	1.30	1.19
86	6.93	6.52	4.47	3.94	2.62	2.49	4.08	3.97	3.16	2.95	4.93	4.81	3.16	3.31	0.92	0.86
87	6.06	5.53	5.52	4.87	4.30	4.04	4.91	4.67	3.91	3.40	4.37	4.25	2.53	2.44	1.61	1.43
88	6.26	5.88	5.57	4.66	3.97	3.50	3.74	3.61	3.66	3.12	4.12	3.78	2.06	1.89	1.91	1.78
89	7.64	6.64	6.42	5.28	4.20	3.54	5.19	4.62	4.12	3.52	3.89	3.66	1.99	1.82	1.83	1.60
90	7.05	6.06	5.44	4.27	3.99	3.21	4.75	4.16	4.68	4.03	4.68	3.42	2.15	1.80	2.76	2.35
91	8.92	7.40	7.38	6.10	4.69	3.73	3.69	3.21	3.54	2.61	4.00	3.50	2.15	1.84	1.31	1.05
92	7.40	5.96	6.63	5.08	4.01	2.99	5.09	4.35	3.16	2.26	4.16	3.52	1.62	1.34	2.55	2.01
93	7.06	5.68	6.90	5.20	5.04	3.74	5.28	4.16	4.81	3.12	4.27	3.39	2.02	1.75	1.40	1.00
94	9.04	7.40	8.03	5.72	5.46	4.02	4.60	3.50	3.51	2.20	4.60	3.67	2.49	2.11	1.56	1.04
95	6.79	4.87	7.49	5.21	4.68	3.22	4.22	2.91	3.90	2.30	5.07	4.16	2.58	2.02	1.56	0.99
96	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99

年	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腎臟癌		膽囊和其他膽道癌		腦癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	8.40	5.90	5.96	3.65	5.96	4.28	4.47	2.62	4.79	3.61	2.20	1.45	2.43	1.62	2.04	1.86
<b>98</b>	<b>8.61</b>	<b>5.89</b>	<b>6.08</b>	<b>3.83</b>	<b>5.06</b>	<b>3.61</b>	<b>4.42</b>	<b>2.44</b>	<b>3.87</b>	<b>2.83</b>	<b>3.08</b>	<b>2.12</b>	<b>3.00</b>	<b>1.81</b>	<b>2.77</b>	<b>2.07</b>

表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
85	95.32	102.11	15.05	16.32	11.46	12.60	11.69	11.54	10.39	11.19	7.71	8.31	7.79	8.16	4.05	4.52
86	105.07	108.40	18.96	19.84	10.74	11.24	13.97	13.25	11.36	11.98	9.06	9.12	9.82	10.16	4.14	4.58
87	101.48	100.73	18.78	18.93	13.53	13.74	12.47	11.87	9.73	9.98	7.53	7.45	7.75	7.32	4.71	4.70
88	99.92	95.83	15.64	15.01	13.31	12.87	12.18	11.19	10.08	9.99	8.57	8.16	8.50	7.95	4.29	4.14
89	103.56	96.02	17.76	16.76	14.84	13.81	12.66	11.48	9.74	9.23	8.24	7.39	7.27	6.51	3.37	3.15
90	114.12	101.60	19.77	17.50	13.70	12.12	14.90	12.94	13.48	12.35	7.86	6.94	8.24	7.39	3.00	2.70
91	123.33	105.00	22.51	19.16	15.33	12.92	14.36	12.05	12.64	11.00	10.70	8.90	7.85	6.60	5.61	4.83
92	117.42	96.19	20.55	16.75	14.20	11.38	15.55	12.66	13.98	11.62	8.15	6.45	6.35	5.09	5.53	4.79
93	120.38	94.63	21.04	16.41	15.87	12.42	15.20	11.80	13.62	10.67	8.46	6.55	6.51	4.90	4.27	3.40
94	124.20	93.11	23.05	16.99	17.66	12.94	16.76	12.67	12.12	9.11	8.83	6.35	6.43	4.89	4.94	3.79
95	128.65	92.46	22.48	15.97	16.08	11.23	15.56	11.37	13.70	9.88	9.16	6.31	6.03	4.26	4.69	3.44
96	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63
年	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		結腸、直腸和肛門癌		女性乳房癌		肝和肝內膽管癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸及部位未明示子宮癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	130.86	87.54	24.78	16.27	17.31	11.20	16.87	11.66	15.76	10.79	6.95	4.47	5.77	3.76	5.55	3.62
<b>98</b>	<b>140.20</b>	<b>90.07</b>	<b>27.49</b>	<b>17.54</b>	<b>20.82</b>	<b>12.92</b>	<b>17.49</b>	<b>11.55</b>	<b>16.01</b>	<b>9.98</b>	<b>8.60</b>	<b>5.30</b>	<b>7.41</b>	<b>4.75</b>	<b>5.11</b>	<b>3.31</b>

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
85	3.67	4.07	3.36	3.51	3.13	3.47	2.60	2.82	0.53	0.59	1.15	1.26	1.76	1.84	0.92	1.04
86	3.91	4.15	2.76	2.82	2.84	3.08	3.15	3.26	0.00	0.00	1.15	1.22	2.38	2.48	0.92	0.91
87	3.04	3.07	3.19	3.00	2.81	2.90	2.66	2.63	0.08	0.07	1.14	1.20	2.05	2.08	0.68	0.70
88	3.68	3.64	3.08	2.90	3.16	3.12	2.03	1.96	1.50	1.46	1.35	1.25	0.90	0.86	1.13	1.09
89	4.05	3.77	3.15	2.85	3.67	3.51	2.32	2.26	1.27	1.21	2.17	2.03	1.12	1.06	0.60	0.55
90	3.97	3.50	4.19	3.62	4.04	3.59	2.62	2.46	1.20	1.12	1.12	0.98	1.65	1.63	0.82	0.73
91	4.56	3.82	3.96	3.31	4.34	3.80	3.44	3.11	1.72	1.46	1.05	0.91	1.35	1.21	0.52	0.44
92	4.48	3.58	3.66	3.05	3.66	2.97	3.21	3.00	1.20	0.99	1.12	0.88	1.72	1.44	0.60	0.48
93	5.61	4.50	4.34	3.38	4.49	3.43	2.99	2.65	1.65	1.34	2.25	1.66	1.80	1.70	1.12	0.86
94	4.86	3.55	3.74	2.76	3.74	2.88	3.07	2.58	1.65	1.33	1.57	1.20	1.87	1.63	0.75	0.52
95	6.10	4.35	5.43	3.91	4.17	2.93	3.28	2.52	1.86	1.41	2.38	1.62	1.64	1.30	0.74	0.56
96	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94

年	卵巢癌		白血病		非何杰金氏淋巴瘤		膽囊和其他膽道癌		腎臟癌		膀胱癌		子宮體癌		腦癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	4.29	2.96	3.33	2.61	4.07	2.73	2.59	1.68	1.92	1.24	1.70	1.05	2.07	1.42	1.70	1.32
<b>98</b>	<b>4.82</b>	<b>3.36</b>	<b>3.11</b>	<b>2.22</b>	<b>3.11</b>	<b>1.96</b>	<b>2.59</b>	<b>1.67</b>	<b>2.07</b>	<b>1.27</b>	<b>1.78</b>	<b>1.03</b>	<b>1.70</b>	<b>1.15</b>	<b>1.56</b>	<b>1.21</b>

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		797	375.45		837	397.63		832	400.24		838	404.81		894	430.00		901	434.30
08-14	惡性腫瘤	1	224	105.52	1	254	120.67	1	256	123.15	1	261	126.08	1	249	119.77	1	309	148.95
25-27-28*	心臟疾病	3	91	42.87	2	104	49.41	2	85	40.89	2	93	44.93	2	91	43.77	3	75	36.15
29	腦血管疾病	2	103	48.52	3	99	47.03	3	83	39.93	3	92	44.44	4	82	39.44	2	104	50.13
181	糖尿病	4	42	19.79	5	41	19.48	4	57	27.42	4	47	22.70	4	82	39.44	4	64	30.85
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.25	8	19	9.03	7	22	10.58	7	23	11.11	7	25	12.02	6	31	14.94
321	肺炎	6	27	12.72	6	32	15.20	8	20	9.62	7	23	11.11	6	29	13.95	9	16	7.71
E54	自殺	10	17	8.01	11	15	7.13	10	13	6.25	6	24	11.59	10	12	5.77	10	14	6.75
E47-E53	事故傷害	5	30	14.13	4	50	23.75	5	47	22.61	4	47	22.70	3	89	42.81	5	39	18.80
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	9.89	8	19	9.03	9	19	9.14	10	17	8.21	8	23	11.06	7	23	11.09
038	敗血症	12	7	3.30	13	7	3.33	13	9	4.33	14	5	2.42	14	4	1.92	13	5	2.41
	其他		209	98.45		197	93.59		221	106.31		206	99.51		208	100.05		221	106.53
註：	年中人口數		212,280		210,498		207,878		207,010		207,906		207,459						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		913	442.84		938	457.20		936	455.61		960	466.52		1,024	494.61		963	461.29
08-14	惡性腫瘤	1	299	145.03	1	280	136.48	1	307	149.43	1	304	147.73	1	313	151.18	1	345	165.26
25-27-28*	心臟疾病	3	89	43.17	2	121	58.98	2	92	44.78	2	101	49.08	2	134	64.72	2	104	49.82
29	腦血管疾病	2	96	46.56	3	88	42.89	4	66	32.13	3	81	39.36	3	91	43.95	3	73	34.97
181	糖尿病	4	56	27.16	4	63	30.71	3	79	38.45	4	62	30.13	4	67	32.36	4	65	31.14
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.61	5	37	18.03	7	29	14.12	7	27	13.12	7	33	15.94	8	26	12.45
321	肺炎	5	39	18.92	6	34	16.57	6	31	15.09	5	42	20.41	5	41	19.80	7	28	13.41
E54	自殺	9	20	9.70	7	24	11.70	9	19	9.25	9	18	8.75	9	20	9.66	6	30	14.37
E47-E53	事故傷害	6	34	16.49	8	23	11.21	5	41	19.96	6	38	18.47	6	35	16.91	5	34	16.29
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	10.19	10	13	6.34	8	23	11.20	8	20	9.72	8	22	10.63	8	26	12.45
038	敗血症	12	7	3.40	11	9	4.39	11	10	4.87	12	9	4.37	11	10	4.83	15	3	1.44
	其他		226	109.62		246	119.91		239	116.34		258	125.38		258	124.62		229	109.69
註：	年中人口數		206,167		205,160		205,441		205,778		207,032		208,762						

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,011	480.96	A00-Y98	所有死亡原因		1,057	502.04		1,044	499.41
08-14	惡性腫瘤	1	332	157.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34	1	331	158.34
25-27-28*	心臟疾病	2	108	51.38	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	140	66.50	2	124	59.32
29	腦血管疾病	3	86	40.91	I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32	3	78	37.31
181	糖尿病	4	79	37.58	E10-E14	糖尿病	5	49	23.27	4	72	34.44
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	41	19.50	J12-J18	肺炎	4	63	29.92	5	48	22.96
321	肺炎	6	37	17.60	I10-I15	高血壓性疾病	7	37	17.57	6	34	16.26
E54	自殺	7	29	13.80	A40-A41	敗血症	6	46	21.85	6	34	16.26
E47-E53	事故傷害	8	26	12.37	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	27	12.82	8	33	15.79
347	慢性肝病及肝硬化	9	17	8.09	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	14	6.65	9	32	15.31
038	敗血症	10	14	6.66	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	31	14.72	10	21	10.05
	其他		242	115.13		其他		257	122.07		237	113.37

註：年中人口數 210,204 210,542 209,046

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,176	479.31		1,172	484.31		1,208	503.23		1,305	541.06		1,230	507.83		1,239	513.88
08-14	惡性腫瘤	1	303	123.50	1	306	126.45	1	327	136.22	1	371	153.82	1	343	141.61	1	351	145.58
25-27-28*	心臟疾病	2	121	49.32	2	135	55.79	2	159	66.24	2	141	58.46	2	145	59.87	2	132	54.75
29	腦血管疾病	3	120	48.91	3	128	52.89	3	134	55.82	3	134	55.56	3	108	44.59	3	124	51.43
181	糖尿病	5	59	24.05	4	71	29.34	4	93	38.74	4	67	27.78	4	89	36.75	4	92	38.16
321	肺炎	6	48	19.56	6	47	19.42	8	30	12.50	8	38	15.75	5	63	26.01	8	30	12.44
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	33	13.45	7	45	18.60	6	33	13.75	7	46	19.07	7	45	18.58	7	36	14.93
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.67	9	31	12.81	7	31	12.91	6	51	21.14	8	36	14.86	6	39	16.18
E54	自殺	11	16	6.52	10	30	12.40	12	16	6.67	9	26	10.78	10	26	10.73	9	21	8.71
E47-E53	事故傷害	4	81	33.01	5	63	26.03	5	57	23.75	5	56	23.22	6	58	23.95	5	54	22.40
26	高血壓性疾病	8	34	13.86	8	34	14.05	9	29	12.08	10	25	10.37	9	29	11.97	10	17	7.05
	其他		325	132.46		282	116.53		299	124.56		350	145.11		288	118.91		343	142.26

註：年中人口數 245,352 241,996 240,050 241,194 242,208 241,106

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,355	567.15		1,308	550.86		1,353	573.36		1,331	569.90		1,366	589.70		1,271	549.91
08-14	惡性腫瘤	1	410	171.61	1	383	161.30	1	367	155.52	1	373	159.71	1	430	185.63	1	401	173.50
25-27-28*	心臟疾病	2	151	63.20	2	161	67.80	2	166	70.35	2	178	76.22	3	159	68.64	2	134	57.98
29	腦血管疾病	3	141	59.02	3	111	46.75	3	128	54.24	3	115	49.24	2	163	70.37	3	105	45.43
181	糖尿病	4	90	37.67	5	52	21.90	4	106	44.92	4	74	31.69	4	80	34.54	3	105	45.43
321	肺炎	6	41	17.16	4	73	30.74	5	52	22.04	6	52	22.27	5	51	22.02	5	61	26.39
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	35	14.65	7	43	18.11	6	50	21.19	5	59	25.26	6	50	21.58	6	45	19.47
347	慢性肝病及肝硬化	8	34	14.23	9	25	10.53	9	32	13.56	9	32	13.70	8	31	13.38	9	23	9.95
E54	自殺	9	31	12.98	8	36	15.16	7	39	16.53	8	35	14.99	7	45	19.43	7	40	17.31
E47-E53	事故傷害	5	49	20.51	6	44	18.53	8	37	15.68	7	39	16.70	9	27	11.66	8	28	12.11
26	高血壓性疾病	12	12	5.02	10	20	8.42	10	15	6.36	10	21	8.99	10	18	7.77	10	17	7.36
	其他		361	151.10		360	151.61		361	152.98		353	151.15		312	134.69		312	134.99
註：	年中人口數		238,912		237,446		235,976		233,548		231,643		231,128						

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,363	592.17	A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77		1,357	598.94
08-14	惡性腫瘤	1	427	185.51	C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88	1	437	192.88
25-27-28*	心臟疾病	2	167	72.55	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	181	79.28	2	142	62.67
29	腦血管疾病	3	133	57.78	I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37	3	111	48.99
181	糖尿病	4	76	33.02	E10-E14	糖尿病	5	51	22.34	4	81	35.75
321	肺炎	5	65	28.24	J12-J18	肺炎	4	87	38.10	5	74	32.66
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	40	17.38	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	45	19.71	6	49	21.63
347	慢性肝病及肝硬化	7	29	12.60	A40-A41	敗血症	6	47	20.59	7	48	21.19
E54	自殺	8	27	11.73	I10-I15	高血壓性疾病	9	41	17.96	8	44	19.42
E47-E53	事故傷害	9	24	10.43	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	7	47	20.59	9	42	18.54
26	高血壓性疾病	10	15	6.52	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	34	14.89	10	34	15.01
	其他		360	156.40		其他		297	130.08		295	130.20
註：	年中人口數		230,172				228,319			226,567		

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,416	424.70		1,431	442.54		1,435	454.53		1,414	446.61		1,471	462.50		1,448	456.72
08-14	惡性腫瘤	1	410	122.97	1	455	140.71	1	444	140.64	1	410	129.50	1	438	137.71	1	409	129.00
25-27-28*	心臟疾病	2	184	55.19	2	154	47.63	2	176	55.75	2	181	57.17	2	177	55.65	3	151	47.63
29	腦血管疾病	3	169	50.69	3	148	45.77	3	143	45.29	3	140	44.22	3	151	47.48	2	157	49.52
181	糖尿病	5	74	22.19	5	74	22.88	4	85	26.92	5	65	20.53	4	102	32.07	4	112	35.33
321	肺炎	6	49	14.70	6	43	13.30	9	35	11.09	8	42	13.27	7	43	13.52	8	35	11.04
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	45	13.50	8	41	12.68	7	49	15.52	6	54	17.06	6	49	15.41	6	54	17.03
E47-E53	事故傷害	4	80	23.99	4	79	24.43	5	57	18.05	4	70	22.11	5	66	20.75	5	62	19.56
E54	自殺	9	24	7.20	13	10	3.09	10	28	8.87	13	13	4.11	11	13	4.09	10	21	6.62
038	敗血症	12	10	3.00	11	16	4.95	12	15	4.75	11	15	4.74	16	5	1.57	14	9	2.84
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.60	9	37	11.44	8	37	11.72	9	29	9.16	8	39	12.26	7	38	11.99
	其他		349	104.68		374	115.66		366	115.93		395	124.76		388	121.99		400	126.17
註：	年中人口數		333,412		323,358		315,709		316,610		318,056		317,044						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
01-56	所有死亡原因		1,507	476.30		1,509	477.89		1,570	499.42		1,584	506.42		1,638	524.39		1,546	493.66
08-14	惡性腫瘤	1	481	152.02	1	514	162.78	1	488	155.23	1	527	168.49	1	501	160.39	1	495	158.06
25-27-28*	心臟疾病	2	179	56.57	2	158	50.04	2	198	62.98	2	210	67.14	2	225	72.03	2	174	55.56
29	腦血管疾病	3	151	47.72	3	122	38.64	3	139	44.22	3	126	40.28	3	142	45.46	3	121	38.64
181	糖尿病	4	89	28.13	4	111	35.15	4	114	36.26	4	107	34.21	4	106	33.94	4	105	33.53
321	肺炎	6	45	14.22	7	57	18.05	5	76	24.18	6	51	16.31	5	89	28.49	6	46	14.69
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	54	17.07	5	60	19.00	7	54	17.18	5	63	20.14	6	78	24.97	5	58	18.52
E47-E53	事故傷害	7	44	13.91	6	58	18.37	6	62	19.72	7	43	13.75	7	44	14.09	8	37	11.81
E54	自殺	9	24	7.59	8	37	11.72	10	23	7.32	8	35	11.19	8	40	12.81	7	40	12.77
038	敗血症	12	14	4.42	12	10	3.17	12	9	2.86	12	11	3.52	14	6	1.92	11	22	7.02
347	慢性肝病及肝硬化	8	35	11.06	9	30	9.50	8	37	11.77	9	25	7.99	9	30	9.60	8	37	11.81
	其他		391	123.58		382	120.98		370	117.70		386	123.41		377	120.69		411	131.24
註：	年中人口數		316,398			315,766			314,362			312,782			312,360			313,169	

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,598	508.03	A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51		1,667	533.05
08-14	惡性腫瘤	1	473	150.37	C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36	1	549	175.55
25-27-28*	心臟疾病	2	194	61.68	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	237	75.39	2	200	63.95
29	腦血管疾病	3	145	46.10	I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67	3	115	36.77
181	糖尿病	4	118	37.51	J12-J18	肺炎	4	92	29.26	4	98	31.34
321	肺炎	5	78	24.80	E10-E14	糖尿病	5	74	23.54	5	75	23.98
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	61	19.39	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	63	20.04	6	56	17.91
E47-E53	事故傷害	7	37	11.76	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	7	55	17.49	7	49	15.67
E54	自殺	8	36	11.45	I10-I15	高血壓性疾病	9	45	14.31	8	48	15.35
038	敗血症	9	25	7.95	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	34	10.81	9	42	13.43
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.99	A40-A41	敗血症	8	54	17.18	10	41	13.11
	其他		409	130.03		其他		429	136.46		394	125.99
註：	年中人口數		314,548					314,386			312,730	

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		987	440.48		972	444.28		1,037	484.33		989	462.79		949	441.58		1,017	472.82
08-14	惡性腫瘤	1	289	128.97	1	281	128.44	1	323	150.86	1	302	141.32	1	293	136.34	1	325	151.10
25-27-28*	心臟疾病	2	124	55.34	3	120	54.85	3	106	49.51	3	96	44.92	2	99	46.07	3	88	40.91
29	腦血管疾病	3	106	47.31	2	129	58.96	2	111	51.84	2	105	49.13	3	91	42.34	2	99	46.03
181	糖尿病	5	47	20.98	5	46	21.03	5	64	29.89	4	56	26.20	4	59	27.45	3	88	40.91
321	肺炎	7	32	14.28	9	17	7.77	8	30	14.01	8	26	12.17	8	29	13.49	9	17	7.90
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	25	11.16	6	29	13.26	6	37	17.28	7	34	15.91	7	33	15.36	5	52	24.18
E47-E53	事故傷害	4	64	28.56	4	63	28.80	4	75	35.03	5	49	22.93	5	49	22.80	6	46	21.39
E54	自殺	10	20	8.93	9	17	7.77	10	17	7.94	11	17	7.95	9	22	10.24	8	25	11.62
347	慢性肝病及肝硬化	6	37	16.51	8	22	10.06	7	32	14.95	6	39	18.25	6	38	17.68	7	28	13.02
038	敗血症	15	4	1.79	11	13	5.94	13	13	6.07	13	8	3.74	15	5	2.33	13	10	4.65
	其他		239	106.66		235	107.41		229	106.95		257	120.26		231	107.49		239	111.12
註：	年中人口數		224,076		218,782		214,109		213,703		214,910		215,092						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,074	497.71		1,045	482.00		1,114	512.69		1,123	517.67		1,178	543.14		1,106	506.77
08-14	惡性腫瘤	1	349	161.73	1	359	165.59	1	354	162.92	1	370	170.56	1	374	172.44	1	351	160.83
25-27-28*	心臟疾病	2	110	50.98	2	114	52.58	2	120	55.23	2	154	70.99	2	146	67.32	2	138	63.23
29	腦血管疾病	3	104	48.20	3	87	40.13	3	104	47.86	3	83	38.26	3	102	47.03	3	105	48.11
181	糖尿病	4	100	46.34	4	82	37.82	4	58	26.69	4	71	32.73	4	91	41.96	4	71	32.53
321	肺炎	7	25	11.59	8	26	11.99	7	35	16.11	5	35	16.13	5	49	22.59	6	48	21.99
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	52	24.10	6	31	14.30	5	57	26.23	7	31	14.29	7	36	16.60	7	27	12.37
E47-E53	事故傷害	6	38	17.61	5	41	18.91	6	36	16.57	9	27	12.45	8	33	15.22	8	23	10.54
E54	自殺	7	25	11.59	7	27	12.45	9	27	12.43	5	35	16.13	6	44	20.29	5	49	22.45
347	慢性肝病及肝硬化	9	23	10.66	9	23	10.61	8	30	13.81	8	30	13.83	9	27	12.45	9	22	10.08
038	敗血症	12	8	3.71	12	6	2.77	13	7	3.22	12	5	2.30	10	15	6.92	11	11	5.04
	其他		240	111.22		249	114.85		286	131.62		282	129.99		261	120.34		261	119.59
註：	年中人口數		215,788			216,806			217,284			216,934			216,887			218,244	

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,230	561.56	A00-Y98	所有死亡原因		1,264	578.06		1,192	545.43
08-14	惡性腫瘤	1	384	175.32	C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70	1	417	190.81
25-27-28*	心臟疾病	2	147	67.11	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	167	76.37	2	143	65.43
29	腦血管疾病	3	109	49.76	I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22	3	96	43.93
181	糖尿病	4	86	39.26	J12-J18	肺炎	4	70	32.01	4	76	34.78
321	肺炎	5	67	30.59	E10-E14	糖尿病	5	69	31.56	5	47	21.51
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	44	20.09	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	36	16.46	6	39	17.85
E47-E53	事故傷害	7	31	14.15	A40-A41	敗血症	7	37	16.92	7	36	16.47
E54	自殺	8	29	13.24	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	6	40	18.29	8	33	15.10
347	慢性肝病及肝硬化	9	23	10.50	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	32	14.63	9	31	14.18
038	敗血症	10	21	9.59	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	30	13.72	10	29	13.27
	其他		289	131.94		其他		289	132.17		245	112.11
註：	年中人口數		219,033					218,662			218,543	

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		786	454.91		821	486.17		778	468.89		802	483.88		840	506.24		917	558.44
08-14	惡性腫瘤	1	244	141.22	1	210	124.35	1	242	145.85	1	227	136.96	1	247	148.86	1	275	167.47
25-27-28*	心臟疾病	3	77	44.57	2	100	59.22	2	103	62.08	2	101	60.94	2	111	66.90	2	97	59.07
29	腦血管疾病	2	86	49.77	3	97	57.44	3	69	41.59	3	80	48.27	3	66	39.78	3	88	53.59
181	糖尿病	4	39	22.57	4	49	29.02	4	47	28.33	5	38	22.93	4	44	26.52	4	66	40.19
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	20	11.58	6	30	17.76	6	24	14.46	7	27	16.29	6	31	18.68	6	30	18.27
321	肺炎	7	27	15.63	8	27	15.99	9	18	10.85	8	25	15.08	7	28	16.87	8	24	14.62
E47-E53	事故傷害	5	32	18.52	5	45	26.65	5	40	24.11	4	46	27.75	5	37	22.30	5	38	23.14
E54	自殺	11	8	4.63	10	13	7.70	15	5	3.01	12	5	3.02	11	11	6.63	11	10	6.09
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	15.63	9	25	14.80	7	21	12.66	6	33	19.91	7	28	16.87	7	27	16.44
26	高血壓性疾病	6	30	17.36	7	28	16.58	8	19	11.45	9	14	8.45	9	19	11.45	9	20	12.18
	其他		196	113.44		197	116.66		190	114.51		206	124.29		218	131.38		242	147.37

註：年中人口數 172,780 168,872 165,924 165,744 165,928 164,207

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		864	532.14		905	559.60		870	541.37		858	539.48		892	564.88		843	533.65
08-14	惡性腫瘤	1	267	164.45	1	288	178.08	1	245	152.45	1	245	154.05	1	282	178.58	1	267	169.02
25-27-28*	心臟疾病	2	111	68.37	2	101	62.45	2	111	69.07	2	113	71.05	2	102	64.59	2	80	50.64
29	腦血管疾病	3	94	57.90	3	88	54.41	3	73	45.43	3	89	55.96	3	88	55.73	3	62	39.25
181	糖尿病	4	58	35.72	4	62	38.34	4	64	39.82	4	59	37.10	4	58	36.73	4	53	33.55
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	32	19.71	7	25	15.46	6	32	19.91	5	34	21.38	7	23	14.57	6	31	19.62
321	肺炎	6	26	16.01	5	34	21.02	5	56	34.85	6	24	15.09	5	30	19.00	5	51	32.28
E47-E53	事故傷害	7	22	13.55	6	29	17.93	8	16	9.96	8	21	13.20	6	24	15.20	8	25	15.83
E54	自殺	9	12	7.39	8	20	12.37	7	18	11.20	7	22	13.83	8	19	12.03	9	24	15.19
347	慢性肝病及肝硬化	8	19	11.70	10	12	7.42	9	15	9.33	8	21	13.20	9	18	11.40	7	26	16.46
26	高血壓性疾病	10	10	6.16	9	17	10.51	10	14	8.71	10	11	6.92	10	10	6.33	10	14	8.86
	其他		213	131.19		229	141.60		226	140.63		219	137.70		238	150.72		210	132.94
註：	年中人口數		162,362		161,722		160,704		159,042		157,911		157,970						

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		874	549.53	A00-Y98	所有死亡原因		957	600.33		897	563.99
08-14	惡性腫瘤	1	258	162.22	C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07	1	276	173.54
25-27-28*	心臟疾病	2	86	54.07	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	127	79.67	2	116	72.94
29	腦血管疾病	3	75	47.16	I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54	3	58	36.47
181	糖尿病	4	58	36.47	J12-J18	肺炎	4	70	43.91	4	49	30.81
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	52	32.70	E10-E14	糖尿病	7	30	18.82	5	46	28.92
321	肺炎	6	38	23.89	A40-A41	敗血症	5	41	25.72	6	31	19.49
E47-E53	事故傷害	7	25	15.72	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	35	21.96	6	31	19.49
E54	自殺	8	22	13.83	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	22	13.80	8	27	16.98
347	慢性肝病及肝硬化	9	17	10.69	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	13.17	9	23	14.46
26	高血壓性疾病	10	10	6.29	I10-I15	高血壓性疾病	10	19	11.92	10	21	13.20
	其他		233	146.50		其他		218	136.75		219	137.70
註：	年中人口數		159,045					159,412			159,045	

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		733	536.47		711	528.07		756	564.51		778	580.11		775	578.22		747	561.24
08-14	惡性腫瘤	1	230	168.33	1	194	144.09	1	232	173.24	1	204	152.11	1	223	166.38	1	201	151.02
25-27-28*	心臟疾病	2	73	53.43	2	88	65.36	2	111	82.88	2	96	71.58	2	91	67.89	4	68	51.09
29	腦血管疾病	3	72	52.70	3	84	62.39	3	89	66.46	3	94	70.09	3	87	64.91	2	101	75.88
181	糖尿病	4	48	35.13	5	43	31.94	5	39	29.12	4	54	40.26	4	48	35.81	3	69	51.84
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	30	21.96	6	30	22.28	7	26	19.41	6	31	23.12	8	23	17.16	6	26	19.53
321	肺炎	8	22	16.10	9	15	11.14	8	17	12.69	8	17	12.68	7	24	17.91	8	24	18.03
E47-E53	事故傷害	5	47	34.40	4	46	34.17	4	42	31.36	5	53	39.52	5	33	24.62	5	37	27.80
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.30	7	21	15.60	6	28	20.91	7	19	14.17	6	30	22.38	7	25	18.78
E54	自殺	11	10	7.32	12	7	5.20	13	7	5.23	10	11	8.20	14	6	4.48	9	13	9.77
038	敗血症	10	12	8.78	11	9	6.68	13	7	5.23	9	13	9.69	16	2	1.49	12	4	3.01
	其他		164	120.03		174	129.23		158	117.98		186	138.69		208	155.19		179	134.49
註：	年中人口數		136,634			134,640			133,922			134,112			134,033			133,098	

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		749	567.34		811	618.09		812	623.38		766	593.91		867	679.14		802	632.16
08-14	惡性腫瘤	1	223	168.92	1	250	190.53	1	242	185.78	1	205	158.94	1	228	178.60	1	273	215.19
25-27-28*	心臟疾病	3	73	55.30	2	93	70.88	2	97	74.47	2	89	69.01	2	95	74.42	2	96	75.67
29	腦血管疾病	2	88	66.66	3	69	52.59	3	80	61.42	3	73	56.60	3	89	69.72	4	55	43.35
181	糖尿病	4	51	38.63	4	62	47.25	4	56	42.99	4	60	46.52	4	63	49.35	3	56	44.14
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	36	27.27	5	29	22.10	5	42	32.24	5	33	25.59	5	42	32.90	6	25	19.71
321	肺炎	9	15	11.36	6	27	20.58	6	26	19.96	6	32	24.81	7	25	19.58	5	29	22.86
E47-E53	事故傷害	6	29	21.97	8	19	14.48	7	24	18.42	8	20	15.51	8	24	18.80	8	20	15.76
347	慢性肝病及肝硬化	7	24	18.18	7	21	16.00	8	22	16.89	7	21	16.28	9	22	17.23	10	10	7.88
E54	自殺	8	17	12.88	8	19	14.48	9	15	11.52	9	19	14.73	6	30	23.50	7	22	17.34
038	敗血症	11	11	8.33	12	6	4.57	12	5	3.84	12	6	4.65	10	18	14.10	9	11	8.67
	其他		182	137.86		216	164.62		203	155.84		208	161.27		231	180.95		205	161.59
註：	年中人口數		132,018		131,210		130,258		128,976		127,661		126,867						

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		810	640.19	A00-Y98	所有死亡原因		893	712.18		859	692.60	
08-14	惡性腫瘤	1	259	204.70	C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93	1	255	205.60	
25-27-28*	心臟疾病	2	94	74.29	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	118	94.11	2	105	84.66	
29	腦血管疾病	3	68	53.74	I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84	3	84	67.73	
181	糖尿病	4	50	39.52	E10-E14	糖尿病	5	55	43.86	4	58	46.76	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	35	27.66	J12-J18	肺炎	4	61	48.65	5	41	33.06	
321	肺炎	6	29	22.92	A40-A41	敗血症	6	32	25.52	6	32	25.80	
E47-E53	事故傷害	7	24	18.97	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	26	20.74	7	27	21.77	
347	慢性肝病及肝硬化	7	24	18.97	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	23	18.34	8	26	20.96	
E54	自殺	9	18	14.23	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	16.75	8	26	20.96	
038	敗血症	10	13	10.27	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	16	12.76	10	19	15.32	
	其他		196	154.91		其他		209	166.68		186	149.97	
註：	年中人口數		126,526					125,391			124,026		

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,094	506.93		1,218	573.08		1,227	584.91		1,186	567.13		1,283	614.28		1,269	611.86
08-14	惡性腫瘤	1	270	125.11	1	317	149.15	1	322	153.50	1	301	143.94	1	366	175.24	1	332	160.08
25-27-28*	心臟疾病	2	136	63.02	2	151	71.05	2	167	79.61	2	128	61.21	2	145	69.42	3	123	59.31
29	腦血管疾病	3	127	58.85	3	132	62.11	3	131	62.45	3	123	58.82	3	127	60.81	2	129	62.20
181	糖尿病	5	57	26.41	5	63	29.64	4	83	39.57	4	72	34.43	4	100	47.88	4	106	51.11
321	肺炎	8	30	13.90	10	23	10.82	10	24	11.44	9	25	11.95	8	29	13.88	9	26	12.54
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	35	16.22	7	35	16.47	7	33	15.73	6	46	22.00	7	45	21.55	6	49	23.63
347	慢性肝病及肝硬化	6	43	19.93	6	54	25.41	6	47	22.40	7	45	21.52	6	49	23.46	7	34	16.39
E54	自殺	11	19	8.80	9	27	12.70	8	27	12.87	11	20	9.56	11	16	7.66	8	29	13.98
E47-E53	事故傷害	4	73	33.83	4	89	41.88	5	71	33.85	5	67	32.04	5	65	31.12	5	64	30.86
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	9	24	11.12	11	19	8.94	11	23	10.96	9	25	11.95	10	22	10.53	13	14	6.75
	其他		280	129.74		308	144.92		299	142.53		334	159.72		319	152.73		363	175.02

註：年中人口數 215,808 212,537 209,778 209,122 208,862 207,399

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,344	654.21		1,335	655.25		1,389	688.11		1,391	699.50		1,454	741.48		1,428	733.02
08-14	惡性腫瘤	1	377	183.51	1	386	189.46	1	388	192.21	1	414	208.19	1	431	219.79	1	427	219.19
25-27-28*	心臟疾病	3	149	72.53	2	153	75.10	2	147	72.82	2	160	80.46	2	142	72.41	2	149	76.48
29	腦血管疾病	2	152	73.99	3	133	65.28	3	134	66.38	3	125	62.86	3	139	70.88	3	138	70.84
181	糖尿病	4	100	48.68	4	88	43.19	4	108	53.50	4	92	46.26	4	113	57.63	4	119	61.08
321	肺炎	8	34	16.55	5	55	27.00	5	73	36.16	8	43	21.62	5	60	30.60	6	49	25.15
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	55	26.77	7	46	22.58	7	54	26.75	6	54	27.16	7	45	22.95	5	58	29.77
347	慢性肝病及肝硬化	7	43	20.93	8	43	21.11	8	53	26.26	7	53	26.65	9	28	14.28	8	35	17.97
E54	自殺	9	32	15.58	9	28	13.74	9	30	14.86	9	33	16.59	6	58	29.58	6	49	25.15
E47-E53	事故傷害	6	50	24.34	6	52	25.52	6	57	28.24	5	60	30.17	8	37	18.87	9	32	16.43
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	22	10.71	12	12	5.89	10	13	6.44	13	11	5.53	11	16	8.16	13	7	3.59
	其他		330	160.63		339	166.39		332	164.47		346	174.00		385	196.33		365	187.36
註：	年中人口數		205,440		203,738		201,858		198,856		196,094		194,811						

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,493	770.88	A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68		1,552	819.43
08-14	惡性腫瘤	1	458	236.48	C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83	1	419	221.23
25-27-28*	心臟疾病	2	160	82.61	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	203	106.05	2	175	92.40
29	腦血管疾病	3	126	65.06	I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29	3	118	62.30
181	糖尿病	4	109	56.28	E10-E14	糖尿病	5	88	45.97	4	105	55.44
321	肺炎	5	87	44.92	J12-J18	肺炎	3	111	57.99	5	95	50.16
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	63	32.53	A40-A41	敗血症	9	46	24.03	6	60	31.68
347	慢性肝病及肝硬化	7	42	21.69	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	8	47	24.55	7	53	27.98
E54	自殺	8	37	19.10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	50	26.12	8	52	27.46
E47-E53	事故傷害	9	34	17.56	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	61	31.87	9	47	24.82
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	14	7.23	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	33	17.24	10	45	23.76
	其他		363	187.43		其他		367	191.73		383	202.22
註：	年中人口數		193,675					191,416			189,399	

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,041	461.94		1,086	474.55		1,057	454.28		1,125	469.43		1,130	458.85		1,174	467.98
08-14	惡性腫瘤	1	274	121.59	1	282	123.23	1	279	119.91	1	305	127.27	1	312	126.69	1	336	133.94
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.16	3	108	47.19	2	132	56.73	3	112	46.73	2	124	50.35	3	101	40.26
29	腦血管疾病	2	121	53.69	2	129	56.37	3	113	48.57	2	118	49.24	3	123	49.95	2	122	48.63
181	糖尿病	5	70	31.06	5	60	26.22	4	62	26.65	5	61	25.45	4	79	32.08	4	81	32.29
321	肺炎	8	30	13.31	7	28	12.24	8	31	13.32	8	29	12.10	7	35	14.21	8	34	13.55
E54	自殺	12	11	4.88	11	19	8.30	10	20	8.60	11	14	5.84	10	21	8.53	9	22	8.77
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	43	19.08	6	37	16.17	6	40	17.19	6	43	17.94	6	42	17.05	6	43	17.14
E47-E53	事故傷害	4	88	39.05	4	84	36.71	5	58	24.93	4	63	26.29	5	61	24.77	5	70	27.90
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	12.87	8	27	11.80	7	33	14.18	7	37	15.44	8	33	13.40	7	36	14.35
038	敗血症	14	9	3.99	12	15	6.55	13	13	5.59	12	13	5.42	19	2	0.81	12	11	4.38
	其他		271	120.25		297	129.78		276	118.62		330	137.70		298	121.01		318	126.76
註：	年中人口數		225,355		228,850		232,676		239,650		246,270		250,866						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,180	465.44		1,227	480.75		1,143	445.58		1,277	496.35		1,297	501.74		1,301	500.03
08-14	惡性腫瘤	1	365	143.97	1	373	146.15	1	307	119.68	1	406	157.81	1	384	148.55	1	411	157.96
25-27-28*	心臟疾病	3	122	48.12	2	145	56.81	2	159	61.98	2	165	64.13	2	148	57.25	2	133	51.12
29	腦血管疾病	2	129	50.88	3	119	46.63	3	122	47.56	3	133	51.70	3	113	43.71	3	119	45.74
181	糖尿病	4	67	26.43	4	87	34.09	4	69	26.90	4	79	30.71	4	79	30.56	4	71	27.29
321	肺炎	8	33	13.02	7	39	15.28	5	45	17.54	6	41	15.94	5	57	22.05	5	59	22.68
E54	自殺	9	29	11.44	9	22	8.62	7	31	12.08	7	35	13.60	7	44	17.02	7	42	16.14
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.20	5	43	16.85	9	22	8.58	5	42	16.32	6	51	19.73	6	49	18.83
E47-E53	事故傷害	5	49	19.33	6	41	16.06	6	38	14.81	9	27	10.49	8	42	16.25	8	33	12.68
347	慢性肝病及肝硬化	6	44	17.36	8	23	9.01	7	31	12.08	8	30	11.66	9	29	11.22	9	27	10.38
038	敗血症	15	6	2.37	13	9	3.53	13	8	3.12	13	7	2.72	11	15	5.80	11	17	6.53
	其他		300	118.33		326	127.73		311	121.24		312	121.27		335	129.59		340	130.68
註：	年中人口數		253,526		255,224		256,517		257,276		258,500		260,185						

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,402	536.05	A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39		1,406	538.09
08-14	惡性腫瘤	1	411	157.15	C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79	1	394	150.79
25-27-28*	心臟疾病	2	168	64.23	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	188	71.84	2	166	63.53
29	腦血管疾病	3	116	44.35	I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98	3	105	40.18
181	糖尿病	4	84	32.12	E10-E14	糖尿病	5	60	22.93	4	68	26.02
321	肺炎	5	74	28.29	J12-J18	肺炎	4	86	32.86	5	64	24.49
E54	自殺	6	51	19.50	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	38	14.52	6	58	22.20
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	47	17.97	I10-I15	高血壓性疾病	10	35	13.37	7	51	19.52
E47-E53	事故傷害	8	35	13.38	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	46	17.58	8	43	16.46
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	11.09	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	25	9.55	9	41	15.69
038	敗血症	10	20	7.65	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	41	15.67	10	38	14.54
	其他		367	140.32		其他		341	130.31		378	144.66
註：	年中人口數		261,542					261,693			261,294	

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		469	415.37		521	464.88		529	475.05		489	437.23		528	467.73		568	499.97
08-14	惡性腫瘤	1	139	123.11	1	139	124.03	1	149	133.80	1	137	122.50	1	146	129.34	1	166	146.12
25-27-28*	心臟疾病	3	43	38.08	3	51	45.51	3	51	45.80	3	54	48.28	3	47	41.64	3	57	50.17
29	腦血管疾病	2	49	43.40	2	55	49.08	2	56	50.29	2	55	49.18	2	57	50.49	2	64	56.33
181	糖尿病	5	27	23.91	5	26	23.20	5	32	28.74	6	19	16.99	4	29	25.69	4	41	36.09
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	8	7.09	8	15	13.38	6	16	14.37	9	12	10.73	7	20	17.72	6	21	18.48
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	20.37	6	23	20.52	7	14	12.57	5	21	18.78	6	21	18.60	6	21	18.48
E47-E53	事故傷害	4	32	28.34	3	51	45.51	4	49	44.00	4	28	25.04	5	28	24.80	5	29	25.53
E54	自殺	8	11	9.74	11	8	7.14	7	14	12.57	12	6	5.36	9	12	10.63	9	11	9.68
321	肺炎	13	7	6.20	9	13	11.60	9	13	11.67	7	18	16.09	8	17	15.06	8	14	12.32
038	敗血症	14	5	4.43	13	5	4.46	12	7	6.29	13	4	3.58	13	4	3.54	16	2	1.76
	其他		125	110.71		135	120.46		128	114.94		135	120.71		147	130.22		142	124.99
註：	年中人口數		112,912		112,072		111,358		111,840		112,884		113,607						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年								
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率				
01-56	所有死亡原因		568	498.07		568	498.74		570	502.29		567	501.54		587	519.39		649	573.55	
08-14	惡性腫瘤	1	202	177.13	1	177	155.42	1	176	155.09	1	193	170.72	1	186	164.58	1	206	182.05	
25-27-28*	心臟疾病	2	47	41.21	3	56	49.17	2	82	72.26	2	78	68.99	2	66	58.40	2	68	60.09	
29	腦血管疾病	3	38	33.32	2	65	57.07	3	66	58.16	3	48	42.46	3	55	48.67	3	61	53.91	
181	糖尿病	5	31	27.18	4	40	35.12	4	32	28.20	4	34	30.07	4	44	38.93	4	41	36.23	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	16	14.03	7	16	14.05	8	16	14.10	6	22	19.46	7	23	20.35	8	17	15.02	
347	慢性肝病及肝硬化	6	25	21.92	7	16	14.05	5	21	18.51	7	17	15.04	9	10	8.85	9	15	13.26	
E47-E53	事故傷害	4	35	30.69	5	24	21.07	7	18	15.86	5	30	26.54	5	25	22.12	5	30	26.51	
E54	自殺	9	14	12.28	6	19	16.68	9	15	13.22	8	13	11.50	6	24	21.24	5	30	26.51	
321	肺炎	7	24	21.05	9	15	13.17	6	19	16.74	9	10	8.85	8	11	9.73	7	28	24.74	
038	敗血症	13	4	3.51	10	8	7.02	10	8	7.02	11	3	2.65	12	5	4.42	11	7	6.19	
	其他		132	115.75		132	115.90		117	103.10		119	105.26		138	122.11		146	129.03	
註：	年中人口數		114,040		113,888		113,480		113,052		113,017		113,155							

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		596	525.17	A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24		667	588.13
08-14	惡性腫瘤	1	195	171.83	C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60	1	206	181.64
25-27-28*	心臟疾病	2	64	56.39	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	75	65.97	2	79	69.66
29	腦血管疾病	3	60	52.87	I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74	3	48	42.32
181	糖尿病	4	27	23.79	J12-J18	肺炎	3	58	51.01	4	42	37.03
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	25	22.03	E10-E14	糖尿病	5	31	27.27	5	33	29.10
347	慢性肝病及肝硬化	6	22	19.39	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	15	13.19	6	23	20.28
E47-E53	事故傷害	7	19	16.74	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	10	19	16.71	7	22	19.40
E54	自殺	8	14	12.34	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	20	17.59	7	22	19.40
321	肺炎	8	14	12.34	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	24	21.11	9	20	17.64
038	敗血症	10	10	8.81	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	9	7.92	10	17	14.99
	其他		146	128.65		其他		140	123.14		155	136.67
註：	年中人口數		113,487					113,694			113,411	

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		782	350.67		828	361.55		867	369.47		906	375.94		845	341.95		969	385.16
08-14	惡性腫瘤	1	198	88.79	1	229	99.99	1	235	100.14	1	256	106.23	1	232	93.88	1	269	106.92
25-27-28*	心臟疾病	2	84	37.67	2	84	36.68	3	91	38.78	2	99	41.08	2	102	41.28	3	112	44.52
29	腦血管疾病	3	71	31.84	3	83	36.24	2	108	46.02	3	87	36.10	3	87	35.21	2	114	45.31
181	糖尿病	5	41	18.39	5	43	18.78	4	58	24.72	5	42	17.43	4	69	27.92	4	78	31.00
321	肺炎	8	24	10.76	9	22	9.61	10	13	5.54	9	25	10.37	11	13	5.26	7	29	11.53
E54	自殺	7	26	11.66	7	24	10.48	9	15	6.39	8	29	12.03	8	18	7.28	9	19	7.55
E47-E53	事故傷害	4	56	25.11	4	58	25.33	5	46	19.60	4	68	28.22	5	47	19.02	5	56	22.26
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	20	8.97	10	18	7.86	8	23	9.80	7	31	12.86	7	27	10.93	8	25	9.94
347	慢性肝病及肝硬化	6	30	13.45	6	28	12.23	6	31	13.21	6	32	13.28	6	33	13.35	6	31	12.32
26	高血壓性疾病	11	16	7.17	8	23	10.04	7	24	10.23	10	19	7.88	9	16	6.47	12	7	2.78
	其他		216	96.86		216	94.32		223	95.03		218	90.46		201	81.34		229	91.02
註：	年中人口數		223,003		229,014		234,660		240,996		247,115		251,586						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		976	384.17		976	380.41		1,010	389.66		1,097	421.12		1,048	400.74		1,044	396.61
08-14	惡性腫瘤	1	293	115.33	1	342	133.30	1	302	116.51	1	314	120.54	1	306	117.01	1	357	135.62
25-27-28*	心臟疾病	2	90	35.43	2	90	35.08	2	121	46.68	2	160	61.42	2	115	43.97	2	105	39.89
29	腦血管疾病	3	88	34.64	2	90	35.08	3	91	35.11	3	90	34.55	3	107	40.91	3	104	39.51
181	糖尿病	4	71	27.95	4	57	22.22	4	60	23.15	4	65	24.95	4	74	28.30	4	60	22.79
321	肺炎	8	29	11.41	9	15	5.85	9	26	10.03	8	31	11.90	9	35	13.38	7	37	14.06
E54	自殺	9	23	9.05	6	32	12.47	7	36	13.89	6	39	14.97	6	39	14.91	5	43	16.34
E47-E53	事故傷害	5	50	19.68	5	48	18.71	5	47	18.13	5	52	19.96	8	36	13.77	8	35	13.30
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.17	7	31	12.08	6	40	15.43	7	33	12.67	7	39	14.91	6	42	15.96
347	慢性肝病及肝硬化	6	38	14.96	8	30	11.69	8	31	11.96	9	28	10.75	5	41	15.68	9	34	12.92
26	高血壓性疾病	10	17	6.69	10	11	4.29	14	5	1.93	11	11	4.22	10	23	8.79	10	14	5.32
	其他		241	94.86		230	89.65		251	96.84		274	105.18		233	89.09		213	80.92
註：	年中人口數		254,052		256,566		259,200		260,495		261,519		263,231						

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,107	417.62	A00-Y98	所有死亡原因		1,183	444.46		1,170	437.78
08-14	惡性腫瘤	1	373	140.72	C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51	1	365	136.57
25-27-28*	心臟疾病	2	134	50.55	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	153	57.48	2	133	49.77
29	腦血管疾病	3	96	36.22	I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95	3	90	33.68
181	糖尿病	4	73	27.54	E10-E14	糖尿病	4	68	25.55	4	65	24.32
321	肺炎	5	51	19.24	J12-J18	肺炎	5	63	23.67	5	60	22.45
E54	自殺	6	34	12.83	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	33	12.40	6	41	15.34
E47-E53	事故傷害	6	34	12.83	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	38	14.28	7	37	13.84
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	33	12.45	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	33	12.40	8	36	13.47
347	慢性肝病及肝硬化	9	30	11.32	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	20	7.51	9	35	13.10
26	高血壓性疾病	10	15	5.66	A40-A41	敗血症	6	42	15.78	10	31	11.60
	其他		234	88.28		其他		266	99.94		277	103.65

註： 年中人口數 265,071 266,163 267,256

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,192	399.07		1,271	428.91		1,246	423.71		1,241	420.29		1,288	435.12		1,363	462.31
08-14	惡性腫瘤	1	322	107.80	1	383	129.25	1	388	131.94	1	389	131.74	1	371	125.33	1	408	138.39
25-27-28*	心臟疾病	3	129	43.19	2	157	52.98	2	152	51.69	2	143	48.43	2	160	54.05	3	131	44.43
29	腦血管疾病	2	163	54.57	3	150	50.62	2	152	51.69	3	134	45.38	3	127	42.90	2	161	54.61
181	糖尿病	5	65	21.76	5	51	17.21	5	59	20.06	5	70	23.71	4	83	28.04	4	114	38.67
321	肺炎	7	40	13.39	10	25	8.44	10	22	7.48	6	34	11.51	8	40	13.51	7	40	13.57
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	37	12.39	9	27	9.11	6	35	11.90	6	34	11.51	7	41	13.85	5	48	16.28
E47-E53	事故傷害	4	85	28.46	4	71	23.96	4	77	26.18	4	72	24.38	5	50	16.89	5	48	16.28
E54	自殺	9	26	8.70	7	40	13.50	8	27	9.18	9	19	6.43	9	31	10.47	9	27	9.16
347	慢性肝病及肝硬化	6	41	13.73	6	44	14.85	7	31	10.54	8	30	10.16	6	45	15.20	7	40	13.57
038	敗血症	13	8	2.68	13	13	4.39	11	18	6.12	14	9	3.05	14	10	3.38	15	7	2.37
	其他		276	92.40		310	104.61		285	96.92		307	103.97		330	111.48		339	114.98
註：	年中人口數		298,691		296,330		294,068		295,270		296,010		294,826						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,406	479.42		1,371	469.85		1,519	523.17		1,462	505.78		1,588	550.74		1,527	530.24
08-14	惡性腫瘤	1	424	144.58	1	461	157.99	1	433	149.13	1	476	164.67	1	456	158.15	1	489	169.80
25-27-28*	心臟疾病	3	139	47.40	2	132	45.24	2	187	64.41	2	161	55.70	2	171	59.31	2	171	59.38
29	腦血管疾病	2	162	55.24	3	130	44.55	3	168	57.86	3	150	51.89	3	135	46.82	3	107	37.16
181	糖尿病	4	104	35.46	4	93	31.87	4	108	37.20	4	107	37.02	4	105	36.42	4	105	36.46
321	肺炎	9	29	9.89	7	39	13.37	5	63	21.70	7	42	14.53	5	77	26.70	5	71	24.65
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	50	17.05	6	44	15.08	7	55	18.94	6	44	15.22	6	61	21.16	6	53	18.40
E47-E53	事故傷害	5	61	20.80	5	46	15.76	6	56	19.29	5	63	21.79	8	43	14.91	7	45	15.63
E54	自殺	7	43	14.66	9	32	10.97	9	35	12.05	8	30	10.38	7	49	16.99	8	43	14.93
347	慢性肝病及肝硬化	8	39	13.30	8	34	11.65	8	40	13.78	9	24	8.30	9	36	12.49	9	30	10.42
038	敗血症	11	12	4.09	12	12	4.11	12	12	4.13	10	13	4.50	10	19	6.59	11	18	6.25
	其他		343	116.96		348	119.26		362	124.68		352	121.77		436	151.21		395	137.16
註：	年中人口數		293,270			291,794			290,344			289,058			288,337			287,983	

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,569	545.49	A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50		1,620	568.50
08-14	惡性腫瘤	1	533	185.31	C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76	1	482	169.15
25-27-28*	心臟疾病	2	162	56.32	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	231	80.61	2	216	75.80
29	腦血管疾病	3	137	47.63	I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02	3	115	40.36
181	糖尿病	4	107	37.20	E10-E14	糖尿病	5	75	26.17	4	97	34.04
321	肺炎	5	76	26.42	J12-J18	肺炎	4	97	33.85	5	93	32.64
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	60	20.86	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	46	16.05	6	56	19.65
E47-E53	事故傷害	7	43	14.95	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	7	53	18.50	7	53	18.60
E54	自殺	8	38	13.21	A40-A41	敗血症	6	59	20.59	8	42	14.74
347	慢性肝病及肝硬化	9	31	10.78	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	49	17.10	9	38	13.34
038	敗血症	10	19	6.61	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	27	9.42	10	34	11.93
	其他		363	126.20		其他		411	143.43		394	138.27

註：年中人口數

287,630

286,557

284,960

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,078	443.77		1,121	462.90		1,082	447.47		1,132	464.00		1,191	483.28		1,187	479.40
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.03	1	316	130.49	1	307	126.96	1	326	133.63	1	344	139.59	1	357	144.18
25-27-28*	心臟疾病	3	100	41.17	2	132	54.51	3	120	49.63	3	87	35.66	2	136	55.19	2	117	47.25
29	腦血管疾病	2	119	48.99	3	127	52.44	2	137	56.66	2	141	57.80	3	103	41.79	2	117	47.25
181	糖尿病	5	51	20.99	5	67	27.67	4	76	31.43	5	56	22.95	4	79	32.06	4	93	37.56
321	肺炎	7	36	14.82	7	40	16.52	10	23	9.51	8	28	11.48	6	46	18.67	8	27	10.90
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.82	6	42	17.34	6	40	16.54	7	32	13.12	7	38	15.42	6	42	16.96
347	慢性肝病及肝硬化	6	46	18.94	8	36	14.87	8	25	10.34	6	36	14.76	8	29	11.77	7	31	12.52
E47-E53	事故傷害	4	84	34.58	4	73	30.14	5	64	26.47	4	73	29.92	5	75	30.43	5	56	22.62
E54	自殺	10	18	7.41	11	14	5.78	8	25	10.34	12	17	6.97	9	24	9.74	9	25	10.10
038	敗血症	14	12	4.94	11	14	5.78	14	9	3.72	13	13	5.33	12	14	5.68	14	8	3.23
	其他		299	123.09		260	107.36		256	105.87		323	132.40		303	122.95		314	126.82
註：	年中人口數		242,918		242,168		241,802		243,964		246,442		247,603						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,286	518.20		1,286	517.49		1,345	540.00		1,317	528.90		1,400	563.46		1,395	560.68
08-14	惡性腫瘤	1	399	160.78	1	356	143.25	1	392	157.38	1	375	150.60	1	399	160.59	1	401	161.17
25-27-28*	心臟疾病	3	123	49.56	3	126	50.70	2	162	65.04	2	163	65.46	2	168	67.62	2	175	70.34
29	腦血管疾病	2	154	62.06	2	131	52.71	3	154	61.83	3	127	51.00	3	137	55.14	3	132	53.05
181	糖尿病	4	86	34.65	4	92	37.02	4	92	36.94	4	83	33.33	4	108	43.47	4	95	38.18
321	肺炎	7	32	12.89	7	45	18.11	5	55	22.08	6	48	19.28	7	47	18.92	5	68	27.33
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	49	19.74	6	54	21.73	6	50	20.07	7	46	18.47	5	63	25.36	6	54	21.70
347	慢性肝病及肝硬化	8	20	8.06	8	35	14.08	8	32	12.85	8	32	12.85	9	29	11.67	9	32	12.86
E47-E53	事故傷害	5	53	21.36	5	75	30.18	7	35	14.05	5	54	21.69	8	45	18.11	8	37	14.87
E54	自殺	8	20	8.06	9	29	11.67	8	32	12.85	8	32	12.85	6	55	22.14	7	42	16.88
038	敗血症	10	18	7.25	11	16	6.44	13	8	3.21	12	9	3.61	10	15	6.04	10	18	7.23
	其他		332	133.78		327	131.58		333	133.70		348	139.75		334	134.43		341	137.24
註：	年中人口數		248,166		248,510		249,072		249,009		248,464		248,464						

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,433	573.60	A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13		1,439	578.14
08-14	惡性腫瘤	1	463	185.33	C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70	1	432	173.56
25-27-28*	心臟疾病	2	158	63.24	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	194	77.64	2	169	67.90
29	腦血管疾病	3	138	55.24	I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83	3	110	44.19
181	糖尿病	4	91	36.43	J12-J18	肺炎	4	92	36.82	4	100	40.18
321	肺炎	5	72	28.82	E10-E14	糖尿病	5	66	26.41	5	78	31.34
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	48	19.21	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	51	20.41	6	58	23.30
347	慢性肝病及肝硬化	7	45	18.01	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	43	17.21	7	44	17.68
E47-E53	事故傷害	8	40	16.01	A40-A41	敗血症	8	45	18.01	8	42	16.87
E54	自殺	9	29	11.61	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	52	20.81	8	42	16.87
038	敗血症	10	18	7.21	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	36	14.41	10	39	15.67
	其他		331	132.49		其他		362	144.88		325	130.57
註：	年中人口數		249,825					249,864			248,900	

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		224	105.52		254	120.67		256	123.15		261	126.08		249	119.77		309	148.95
162	肺癌	1	38	17.90	2	33	15.68	1	55	26.46	1	55	26.57	1	49	23.57	1	59	28.44
155	肝癌	2	34	16.02	1	41	19.48	2	44	21.17	2	45	21.74	2	41	19.72	2	51	24.58
153 154	結腸直腸癌	2	34	16.02	3	31	14.73	4	25	12.03	3	28	13.53	3	32	15.39	3	36	17.35
174	女性乳癌(1)	4	9	8.30	4	15	13.92	5	11	10.32	4	14	13.17	5	10	9.35	6	10	9.35
185	攝護腺癌(2)	11	3	2.89	6	7	6.81	17	1	0.99	6	9	8.94	6	9	8.92	4	16	15.91
179 180	子宮頸癌(1)	7	6	5.53	10	5	4.64	16	2	1.88	7	6	5.64	8	7	6.54	7	8	7.48
151	胃癌	5	16	7.54	5	27	12.83	3	36	17.32	5	22	10.63	4	26	12.51	5	29	13.98
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	7	3.30	7	11	5.23	7	13	6.25	9	11	5.31	7	14	6.73	10	8	3.86
157	胰臟癌	9	8	3.77	7	11	5.23	6	15	7.22	10	10	4.83	9	8	3.85	10	8	3.86
204-208	白血病	14	5	2.36	12	9	4.28	8	7	3.37	14	5	2.42	10	7	3.37	10	8	3.86
	其他		64	30.15		64	17.84		47	22.61		56	27.05		46	22.13		76	36.63

註： 年中人口數 212,280 210,498 207,878 207,010 207,906 207,459

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		299	145.03		280	136.48		307	149.43		304	147.73		313	151.18		345	165.26	
162	肺癌	1	71	34.44	1	74	36.07	1	66	32.13	1	76	36.93	1	66	31.88	1	61	29.22	
155	肝癌	2	40	19.40	2	41	19.98	3	45	21.90	4	37	17.98	2	51	24.63	2	50	23.95	
153 154	結腸直腸癌	4	33	16.01	3	32	15.60	4	38	18.50	3	40	19.44	3	42	20.29	3	43	20.60	
174	女性乳癌(1)	3	19	17.85	4	16	15.08	2	27	25.37	2	21	19.65	4	17	15.77	4	20	18.34	
185	攝護腺癌(2)	6	9	9.03	6	7	7.07	6	11	11.11	7	8	8.09	5	10	10.08	6	14	14.04	
179 180	子宮頸癌(1)	8	8	7.52	8	5	4.71	9	5	4.70	22	1	0.94	15	3	2.78	14	4	3.67	
151	胃癌	5	28	13.58	5	25	12.19	5	23	11.20	5	19	9.23	7	15	7.25	5	34	16.29	
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	12	5.82	9	9	4.39	7	11	5.35	5	19	9.23	6	15	7.25	8	17	8.14	
157	胰臟癌	7	16	7.76	7	10	4.87	7	11	5.35	9	10	4.86	8	12	5.80	8	17	8.14	
204-208	白血病	11	7	3.40	12	6	2.92	13	7	3.41	13	6	2.92	18	2	0.97	12	9	4.31	
	其他		56	10.23		55	26.81		63	30.67		67	32.56		80	38.64		76	36.41	
註：	年中人口數		206,167			205,160			205,441			205,778			207,032			208,762		

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		332	157.94	C00-C97	所有癌症死亡原因		306	145.34		331	158.34
162	肺癌	1	86	40.91	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92	1	81	38.75
155	肝癌	2	44	20.93	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10	2	54	25.83
153 154	結腸直腸癌	3	40	19.03	C22	肝和肝內膽管癌	2	44	20.90	3	51	24.40
174	女性乳癌(1)	4	18	16.34	C50	女性乳房癌(1)	4	16	14.47	4	15	13.66
185	攝護腺癌(2)	5	11	11.00	C16	胃癌	6	22	10.45	5	18	8.61
179 180	子宮頸癌(1)	6	12	10.89	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	14.00	6	7	7.06
151	胃癌	7	21	9.99	C25	胰臟癌	7	20	9.50	7	12	5.74
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	20	9.51	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	6	5.43	8	6	5.46
157	胰臟癌	9	16	7.61	C56	卵巢癌(1)	13	4	3.62	8	6	5.46
204-208	白血病	10	12	5.71	C64-C65	腎臟癌	17	3	1.42	10	10	4.78
	其他		52	24.74		其他		78	37.05		71	33.96
註：	年中人口數		210,204					210,542			209,046	

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		303	123.50		306	126.45		327	136.22		371	153.82		343	141.61		351	145.58
162	肺癌	1	65	26.49	1	62	25.62	1	60	24.99	1	86	35.66	1	83	34.27	1	85	35.25
155	肝癌	2	56	22.82	2	49	20.25	2	51	21.25	2	53	21.97	2	55	22.71	3	44	18.25
153 154	結腸直腸癌	3	30	12.23	3	38	15.70	4	38	15.83	4	38	15.75	3	39	16.10	2	54	22.40
174	女性乳癌(1)	6	8	6.62	5	11	9.20	3	20	16.83	6	10	8.35	4	18	14.90	5	12	9.95
185	攝護腺癌(2)	15	3	2.41	6	8	6.53	7	8	6.60	13	6	4.94	7	10	8.23	6	7	5.81
151	胃癌	4	25	10.19	4	24	9.92	5	34	14.16	3	39	16.17	5	29	11.97	4	33	13.69
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	10	4.08	10	10	4.13	10	10	4.17	8	13	5.39	10	10	4.13	7	13	5.39
156	膽囊癌	9	9	3.67	13	8	3.31	15	6	2.50	11	12	4.98	10	10	4.13	10	10	4.15
157	胰臟癌	7	10	4.08	17	5	2.07	15	6	2.50	8	13	5.39	8	14	5.78	8	12	4.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	8	3.26	9	11	4.55	8	13	5.42	16	5	2.07	9	11	4.54	11	9	3.73
	其他		79	32.20		80	33.06		81	33.74		96	39.80		64	26.42		72	29.86

註： 年中人口數 245,352 241,996 240,050 241,194 242,208 241,106

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		410	171.61		383	161.30		367	155.52		373	159.71		430	185.63		401	173.50
162	肺癌	1	78	32.65	1	86	36.22	1	78	33.05	1	71	30.40	1	81	34.97	1	84	36.34
155	肝癌	2	71	29.72	2	58	24.43	2	52	22.04	2	66	28.26	2	63	27.20	2	55	23.80
153 154	結腸直腸癌	3	45	18.84	3	45	18.95	4	38	16.10	3	41	17.56	5	51	22.02	3	50	21.63
174	女性乳癌(1)	5	20	16.70	4	19	15.92	3	23	19.33	7	9	7.62	3	28	23.80	4	21	17.81
185	攝護腺癌(2)	6	14	11.75	6	17	14.40	7	9	7.69	5	12	10.40	6	12	10.53	6	11	9.71
151	胃癌	4	40	16.74	5	37	15.58	5	30	12.71	4	29	12.42	4	52	22.45	5	38	16.44
200202203	非何杰金淋巴瘤	13	9	3.77	13	8	3.37	9	15	6.36	6	19	8.14	7	24	10.36	10	14	6.06
156	膽囊癌	9	13	5.44	13	8	3.37	13	9	3.81	12	10	4.28	15	7	3.02	9	15	6.49
157	胰臟癌	10	12	5.02	9	11	4.63	6	19	8.05	9	15	6.42	8	17	7.34	7	18	7.79
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	10	4.19	17	5	2.11	12	11	4.66	10	12	5.14	9	14	6.04	7	18	7.79
	其他		98	41.02		89	37.48		83	35.17		89	38.11		81	34.97		77	33.31
註：	年中人口數		238,912		237,446		235,976		233,548		231,643		231,128						

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		427	185.51	C00-C97	所有癌症死亡原因		397	173.88		437	192.88
162	肺癌	1	103	44.75	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60	1	87	38.40
155	肝癌	2	54	23.46	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02	2	67	29.57
153 154	結腸直腸癌	3	48	20.85	C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15	3	54	23.83
174	女性乳癌(1)	4	24	20.35	C50	女性乳房癌(1)	4	23	19.59	4	25	21.39
185	攝護腺癌(2)	5	17	15.14	C16	胃癌	5	27	11.83	5	40	17.65
151	胃癌	6	30	13.03	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	9.92	6	16	14.59
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	21	9.12	C25	胰臟癌	7	22	9.64	7	26	11.48
156	膽囊癌	8	18	7.82	C15	食道癌	13	9	3.94	8	12	5.30
157	胰臟癌	9	16	6.95	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	10	4.38	9	11	4.86
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	12	5.21	C54	子宮體癌(1)	12	5	4.26	10	5	4.28
	其他		84	36.49		其他		101	44.24		94	41.49

註：年中人口數

230,172

228,319

226,567

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		410	122.97		455	140.71		444	140.64		410	129.50		438	137.71		409	129.00
162	肺癌	1	85	25.49	1	95	29.38	1	91	28.82	1	80	25.27	1	95	29.87	1	78	24.60
153 154	結腸直腸癌	4	45	13.50	3	55	17.01	3	53	16.79	2	62	19.58	3	52	16.35	2	63	19.87
155	肝癌	2	72	21.59	2	66	20.41	2	70	22.17	3	51	16.11	2	62	19.49	3	61	19.24
174	女性乳癌(1)	3	24	14.17	4	25	15.20	4	26	16.15	4	23	14.19	4	24	14.67	4	21	12.83
151	胃癌	5	34	10.20	5	47	14.53	5	42	13.30	5	40	12.63	5	45	14.15	5	29	9.15
185	攝護腺癌(2)	7	10	6.09	8	10	6.29	7	15	9.70	7	12	7.77	7	12	7.77	7	12	7.82
183	卵巢癌(1)	8	8	4.72	13	5	3.04	9	7	4.35	17	2	1.23	11	5	3.06	9	7	4.28
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	13	3.90	7	25	7.73	8	22	6.97	8	17	5.37	8	22	6.92	8	19	5.99
179 180	子宮頸癌(1)	6	11	6.50	6	18	10.95	6	20	12.42	6	14	8.63	6	14	8.56	9	7	4.28
156	膽囊癌	20	3	0.90	10	12	3.71	13	7	2.22	10	12	3.79	17	6	1.89	12	12	3.78
	其他		105	31.49		97	30.00		91	28.82		97	30.64		101	31.76		100	31.61

註： 年中人口數 333,412 323,358 315,709 316,610 318,056 316,398

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		481	152.02		514	162.78		488	155.23		527	168.49		501	160.39		495	158.06
162	肺癌	1	116	36.66	1	107	33.89	1	97	30.86	1	113	36.13	1	105	33.62	1	110	35.12
153 154	結腸直腸癌	3	51	16.12	4	54	17.10	4	55	17.50	2	77	24.62	3	64	20.49	3	58	18.52
155	肝癌	2	65	20.54	2	90	28.50	2	71	22.59	3	69	22.06	2	73	23.37	2	84	26.82
174	女性乳癌(1)	4	25	15.27	3	30	18.32	3	33	20.20	4	26	15.96	4	30	18.39	6	19	11.59
151	胃癌	6	34	10.75	5	39	12.35	6	32	10.18	6	39	12.47	5	46	14.73	4	42	13.41
185	攝護腺癌(2)	5	22	14.41	6	17	11.18	5	17	11.26	5	22	14.67	6	18	12.06	5	19	12.74
183	卵巢癌(1)	12	6	3.67	12	6	3.66	10	8	4.90	7	11	6.75	12	7	4.29	7	12	7.32
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	19	6.01	7	29	9.18	7	31	9.86	13	13	4.16	9	17	5.44	8	20	6.39
179 180	子宮頸癌(1)	10	8	4.89	9	11	6.72	8	15	9.18	8	10	6.14	8	9	5.52	10	8	4.88
156	膽囊癌	11	14	4.42	11	14	4.43	13	11	3.50	11	15	4.80	10	15	4.80	11	12	3.83
	其他		121	38.17		117	37.05		118	37.54		132	42.20		117	37.46		111	35.44
註：	年中人口數		317,044			315,766			314,362			312,782			312,360			313,169	

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		473	150.37	C00-C97	所有癌症死亡原因		501	159.36		549	175.55
162	肺癌	1	96	30.52	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40	1	116	37.09
153 154	結腸直腸癌	2	66	20.98	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86	2	71	22.70
155	肝癌	3	64	20.35	C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63	3	70	22.38
174	女性乳癌(1)	4	20	12.11	C50	女性乳房癌(1)	4	24	14.50	4	35	21.20
151	胃癌	5	37	11.76	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	18	12.10	5	19	12.87
185	攝護腺癌(2)	6	16	10.71	C25	胰臟癌	7	23	7.32	6	36	11.51
183	卵巢癌(1)	7	14	8.48	C16	胃癌	6	30	9.54	7	35	11.19
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	26	8.27	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	11	6	3.62	8	10	6.06
179 180	子宮頸癌(1)	9	12	7.27	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45	9	18	5.76
156	膽囊癌	10	22	6.99	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	12	3.82	10	15	4.80
	其他		100	31.79		其他		126	40.08		124	39.65

註：年中人口數

314,548

314,386

312,730

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		289	128.97		281	128.44		323	150.86		302	141.32		293	136.34		325	151.10
162	肺癌	1	50	22.31	1	53	24.22	2	54	25.22	2	51	23.86	1	66	30.71	1	50	23.25
155	肝癌	2	42	18.74	1	53	24.22	1	60	28.02	1	54	25.27	2	41	19.08	3	45	20.92
153 154	結腸直腸癌	4	37	16.51	4	24	10.97	3	39	18.22	3	34	15.91	3	36	16.75	2	48	22.32
151	胃癌	5	26	11.60	3	35	16.00	6	25	11.68	5	26	12.17	5	21	9.77	5	27	12.55
174	女性乳癌(1)	6	11	9.68	5	11	9.91	4	19	17.45	4	15	13.74	4	11	9.99	4	20	18.09
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	10	4.46	11	8	3.66	7	16	7.47	7	19	8.89	9	9	4.19	9	10	4.65
157	胰臟癌	11	9	4.02	7	11	5.03	11	10	4.67	16	5	2.34	6	16	7.44	16	5	2.32
150	食道癌	12	6	2.68	15	6	2.74	9	12	5.60	15	6	2.81	11	7	3.26	13	8	3.72
156	膽囊癌	12	6	2.68	11	8	3.66	13	9	4.20	9	10	4.68	11	7	3.26	9	10	4.65
185	攝護腺癌(2)	8	6	5.43	10	4	3.71	14	3	2.85	8	6	5.74	8	7	6.68	6	9	8.61
	其他		86	38.38		68	31.08		76	35.50		76	35.56		72	33.50		93	43.24
註：	年中人口數		224,076		218,782		214,109		213,703		214,910		215,092						

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		349	161.73		359	165.59		354	162.92		370	170.56		374	172.44		351	160.83
162	肺癌	1	77	35.68	2	77	35.52	1	76	34.98	1	70	32.27	1	80	36.89	1	62	28.41
155	肝癌	2	65	30.12	1	80	36.90	2	73	33.60	2	64	29.50	3	46	21.21	2	61	27.95
153 154	結腸直腸癌	3	42	19.46	4	32	14.76	3	33	15.19	4	45	20.74	2	56	25.82	3	43	19.70
151	胃癌	7	19	8.80	5	30	13.84	5	29	13.35	5	24	11.06	5	29	13.37	5	26	11.91
174	女性乳癌(1)	4	14	12.58	3	17	15.16	4	16	14.21	3	29	25.77	4	21	18.63	4	19	16.70
200202203	非何杰金淋巴瘤	12	9	4.17	7	12	5.53	11	11	5.06	13	7	3.23	7	19	8.76	6	21	9.62
157	胰臟癌	11	10	4.63	7	12	5.53	12	8	3.68	6	19	8.76	9	14	6.45	7	16	7.33
150	食道癌	8	12	5.56	12	7	3.23	16	5	2.30	10	12	5.53	10	12	5.53	10	13	5.96
156	膽囊癌	8	12	5.56	10	11	5.07	13	7	3.22	10	12	5.53	12	7	3.23	12	10	4.58
185	攝護腺癌(2)	5	11	10.53	14	3	2.87	6	12	11.46	8	7	6.71	6	11	10.56	9	7	6.70
	其他		78	36.15		78	35.98		84	38.66		81	37.34		79	36.42		73	33.45
註：	年中人口數		215,788			216,806			217,284			216,934			216,887			218,244	

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		384	175.32	C00-C97	所有癌症死亡原因		382	174.70		417	190.81
162	肺癌	1	84	38.35	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47	1	85	38.89
155	肝癌	2	64	29.22	C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35	2	62	28.37
153 154	結腸直腸癌	3	41	18.72	C50	女性乳房癌(1)	5	14	12.19	3	25	21.70
151	胃癌	4	37	16.89	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78	4	42	19.22
174	女性乳癌(1)	5	14	12.21	C25	胰臟癌	8	14	6.40	5	30	13.73
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	20	9.13	C16	胃癌	4	33	15.09	6	26	11.90
157	胰臟癌	7	18	8.22	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	8	7.71	7	11	10.65
150	食道癌	8	15	6.85	C56	卵巢癌(1)	10	6	5.22	8	10	8.68
156	膽囊癌	9	14	6.39	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	12	5.49	9	14	6.41
185	攝護腺癌(2)	10	5	4.79	C15	食道癌	11	11	5.03	9	14	6.41
	其他		72	32.87		其他		99	45.28		98	44.84

註：年中人口數

219,033

218,662

218,543

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		244	141.22		210	124.35		242	145.85		227	136.96		247	148.86		275	167.47
162	肺癌	1	48	27.78	1	38	22.50	1	56	33.75	1	61	36.80	1	47	28.33	1	57	34.71
153 154	結腸直腸癌	4	30	17.36	4	30	17.76	4	24	14.46	4	23	13.88	3	32	19.29	3	32	19.49
155	肝癌	2	41	23.73	2	32	18.95	2	42	25.31	2	39	23.53	2	38	22.90	2	46	28.01
179 180	子宮頸癌(1)	5	7	8.17	5	10	11.93	5	11	13.32	6	6	7.24	6	6	7.20	5	9	10.89
151	胃癌	3	34	19.68	3	31	18.36	6	17	10.25	5	17	10.26	4	27	16.27	4	24	14.62
200202203	非何杰金淋巴瘤	17	3	1.74	7	10	5.92	8	10	6.03	11	5	3.02	11	8	4.82	14	5	3.04
150	食道癌	11	6	3.47	16	2	1.18	14	5	3.01	9	6	3.62	15	5	3.01	9	10	6.09
157	胰臟癌	9	8	4.63	14	4	2.37	10	8	4.82	7	8	4.83	8	9	5.42	12	7	4.26
174	女性乳癌(1)	6	6	7.00	6	8	9.54	3	15	18.16	3	13	15.68	5	8	9.60	5	9	10.89
204-208	白血病	12	5	2.89	11	5	2.96	11	7	4.22	9	6	3.62	11	8	4.82	10	8	4.87
	其他		56	32.41		40	23.69		47	28.33		43	25.94		59	35.56		68	41.41
註：	年中人口數		172,780		168,872		165,924		165,744		165,928		164,207						

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		267	164.45		288	178.08		245	152.45		245	154.05		282	178.58		267	169.02	
162	肺癌	1	60	36.95	1	47	29.06	1	59	36.71	1	53	33.32	1	53	33.56	1	57	36.08	
153 154	結腸直腸癌	3	28	17.25	3	37	22.88	3	29	18.05	2	41	25.78	4	32	20.26	3	31	19.62	
155	肝癌	2	37	22.79	2	38	23.50	2	32	19.91	3	34	21.38	3	34	21.53	2	41	25.95	
179 180	子宮頸癌(1)	9	5	6.10	6	11	13.43	11	4	4.90	9	5	6.17	18	2	2.48	8	6	7.41	
151	胃癌	3	28	17.25	4	29	17.93	5	20	12.45	4	21	13.20	5	25	15.83	5	20	12.66	
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	12	7.39	9	12	7.42	7	9	5.60	8	10	6.29	6	20	12.67	7	13	8.23	
150	食道癌	11	7	4.31	12	8	4.95	7	9	5.60	12	6	3.77	10	9	5.70	12	6	3.80	
157	胰臟癌	8	11	6.77	7	16	9.89	9	8	4.98	7	12	7.55	7	11	6.97	9	9	5.70	
174	女性乳癌(1)	5	13	15.87	8	8	9.77	4	14	17.15	6	9	11.11	2	19	23.55	4	14	17.28	
204-208	白血病	11	7	4.31	10	9	5.57	9	8	4.98	14	5	3.14	13	8	5.07	11	7	4.43	
	其他		59	36.34		73	45.14		53	32.98		49	30.81		69	43.70		63	39.88	
註：	年中人口數		162,362			161,722			160,704			159,042			157,911			157,970		

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		258	162.22	C00-C97	所有癌症死亡原因		303	190.07		276	173.54
162	肺癌	1	64	40.24	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64	1	57	35.84
153 154	結腸直腸癌	2	39	24.52	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48	2	33	20.75
155	肝癌	3	32	20.12	C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70	3	31	19.49
179 180	子宮頸癌(1)	4	9	11.01	C50	女性乳房癌(1)	4	16	19.48	4	15	18.27
151	胃癌	5	12	7.55	C16	胃癌	5	29	18.19	5	25	15.72
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	11	6.92	C15	食道癌	10	8	5.02	6	16	10.06
150	食道癌	6	11	6.92	C25	胰臟癌	9	9	5.65	7	13	8.17
157	胰臟癌	8	10	6.29	C56	卵巢癌(1)	7	6	7.30	8	6	7.31
174	女性乳癌(1)	9	5	6.12	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	11.65	9	5	6.50
204-208	白血病	10	9	5.66	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	13	4	4.87	10	5	6.09
	其他		56	35.21		其他		82	51.44		70	44.01

註： 年中人口數 159,045 159,412 159,045

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		230	168.33		194	144.09		232	173.24		204	152.11		223	166.38		201	151.02
162	肺癌	1	45	32.93	2	28	20.80	1	46	34.35	2	31	23.12	3	29	21.64	1	39	29.30
155	肝癌	2	39	28.54	1	47	34.91	2	41	30.61	1	42	31.32	1	49	36.56	2	27	20.29
153 154	結腸直腸癌	4	22	16.10	3	22	16.34	3	29	21.65	3	22	16.40	2	30	22.38	3	20	15.03
174	女性乳癌(1)	5	10	14.75	6	6	9.00	6	7	10.56	4	9	13.55	4	11	16.56	5	7	10.59
185	攝護腺癌(2)	12	3	4.36	12	3	4.41	17	1	1.48	-	-	-	11	3	4.44	13	3	4.48
179 180	子宮頸癌(1)	11	3	4.43	4	7	10.50	5	11	16.60	8	4	6.02	6	7	10.54	5	7	10.59
151	胃癌	3	30	21.96	5	14	10.40	4	27	20.16	5	17	12.68	5	18	13.43	4	19	14.28
157	胰臟癌	6	9	6.59	16	2	1.49	10	6	4.48	10	7	5.22	16	4	2.98	7	12	9.02
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	9	6.59	10	6	4.46	9	9	6.72	10	7	5.22	12	5	3.73	11	6	4.51
150	食道癌	9	8	5.86	8	9	6.68	8	10	7.47	7	9	6.71	7	10	7.46	10	7	5.26
	其他		52	38.06		50	37.14		45	33.60		56	41.76		57	42.53		54	40.57

註：年中人口數 136,634 134,640 133,922 134,112 134,033 133,098

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		223	168.92		250	190.53		242	185.78		205	158.94		228	178.60		273	215.19	
162	肺癌	1	41	31.06	1	60	45.73	1	52	39.92	1	40	31.01	1	41	32.12	2	51	40.20	
155	肝癌	2	39	29.54	2	38	28.96	2	41	31.48	1	40	31.01	3	34	26.63	1	57	44.93	
153 154	結腸直腸癌	5	20	15.15	3	33	25.15	3	31	23.80	3	26	20.16	4	29	22.72	3	30	23.65	
174	女性乳癌(1)	3	13	19.80	4	12	18.39	5	9	13.87	5	7	10.87	2	18	28.19	4	13	20.44	
185	攝護腺癌(2)	14	3	4.52	9	5	7.58	6	6	9.18	13	3	4.64	10	4	6.27	7	6	9.48	
179 180	子宮頸癌(1)	6	7	10.66	6	5	7.66	7	5	7.71	9	3	4.66	11	3	4.70	10	5	7.86	
151	胃癌	4	21	15.91	5	19	14.48	4	20	15.35	4	15	11.63	5	14	10.97	8	12	9.46	
157	胰臟癌	11	6	4.54	10	8	6.10	14	5	3.84	7	8	6.20	13	5	3.92	6	13	10.25	
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	4.54	10	8	6.10	8	10	7.68	7	8	6.20	7	11	8.62	11	9	7.09	
150	食道癌	9	7	5.30	8	10	7.62	9	9	6.91	14	3	2.33	6	14	10.97	9	11	8.67	
	其他		60	45.45		52	39.63		54	41.46		52	40.32		55	43.08		66	52.02	
註：	年中人口數		132,018			131,210			130,258			128,976			127,661			126,867		

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		259	204.70	C00-C97	所有癌症死亡原因		267	212.93		255	205.60
162	肺癌	1	54	42.68	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66	1	56	45.15
155	肝癌	2	40	31.61	C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47	2	36	29.03
153 154	結腸直腸癌	3	35	27.66	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91	3	29	23.38
174	女性乳癌(1)	4	14	22.02	C50	女性乳房癌(1)	4	16	25.32	4	11	17.55
185	攝護腺癌(2)	5	10	15.89	C16	胃癌	5	14	11.17	5	21	16.93
179 180	子宮頸癌(1)	6	8	12.58	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	3	4.82	6	8	13.04
151	胃癌	7	14	11.06	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	8	6.38	7	15	12.09
157	胰臟癌	8	12	9.48	C25	胰臟癌	15	5	3.99	8	12	9.68
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	9	7.11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	7	5.58	9	9	7.26
150	食道癌	10	8	6.32	C67	膀胱癌	10	7	5.58	9	9	7.26
	其他		55	43.47		其他		64	51.04		49	39.51

註： 年中人口數 126,526 125,391 124,026

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		270	125.11		317	149.15		322	153.50		301	143.94		366	175.24		332	160.08
155	肝癌	1	50	23.17	2	53	24.94	2	57	27.17	2	62	29.65	2	61	29.21	2	48	23.14
162	肺癌	2	48	22.24	1	67	31.52	1	68	32.42	1	67	32.04	1	73	34.95	1	71	34.23
153 154	結腸直腸癌	4	26	12.05	4	38	17.88	3	32	15.25	5	26	12.43	3	44	21.07	3	41	19.77
174	女性乳癌(1)	6	8	7.60	6	10	9.66	6	7	6.85	3	16	15.68	4	20	19.58	5	10	9.85
151	胃癌	3	42	19.46	3	39	18.35	4	31	14.78	4	30	14.35	5	29	13.88	4	31	14.95
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	9	4.17	9	10	4.71	11	11	5.24	10	10	4.78	7	19	9.10	8	13	6.27
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.52	7	7	6.42	10	6	5.58	17	2	1.87	12	5	4.69	7	7	6.61
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	12	5.56	16	3	1.41	7	14	6.67	7	12	5.74	13	9	4.31	10	10	4.82
150	食道癌	16	4	1.85	11	8	3.76	8	12	5.72	8	11	5.26	8	14	6.70	10	10	4.82
156	膽囊癌	10	6	2.78	14	4	1.88	13	9	4.29	10	10	4.78	9	12	5.75	12	9	4.34
	其他		60	27.80		78	36.70		75	35.75		55	26.30		80	38.30		82	39.54

註： 年中人口數 215,808 212,537 209,778 209,122 208,862 207,399

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		377	183.51		386	189.46		388	192.21		414	208.19		431	219.79		427	219.19	
155	肝癌	2	65	31.64	2	69	33.87	1	79	39.14	2	71	35.70	2	55	28.05	2	72	36.96	
162	肺癌	1	86	41.86	1	72	35.34	2	68	33.69	1	75	37.72	1	88	44.88	1	84	43.12	
153 154	結腸直腸癌	3	47	22.88	3	48	23.56	3	37	18.33	3	47	23.64	3	42	21.42	3	67	34.39	
174	女性乳癌(1)	5	14	13.91	5	15	15.01	4	16	16.14	5	15	15.35	4	19	19.68	5	15	15.60	
151	胃癌	4	37	18.01	4	44	21.60	6	24	11.89	4	36	18.10	5	37	18.87	4	32	16.43	
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	12	5.84	6	18	8.83	10	15	7.43	12	13	6.54	13	10	5.10	11	10	5.13	
185	攝護腺癌(2)	8	7	6.68	11	6	5.78	9	9	8.76	8	10	9.89	7	12	12.05	6	14	14.19	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	18	8.76	9	14	6.87	8	19	9.41	7	20	10.06	6	27	13.77	8	22	11.29	
150	食道癌	11	9	4.38	10	12	5.89	13	9	4.46	10	14	7.04	11	18	9.18	15	6	3.08	
156	膽囊癌	11	9	4.38	12	11	5.40	11	14	6.94	15	7	3.52	9	22	11.22	17	5	2.57	
	其他		73	35.53		77	37.79		98	48.55		106	53.30		101	51.51		100	51.33	
註：	年中人口數		205,440			203,738			201,858			198,856			196,094			194,811		

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		458	236.48	C00-C97	所有癌症死亡原因		394	205.83		419	221.23
155	肝癌	1	94	48.54	C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70	1	79	41.71
162	肺癌	2	84	43.37	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54	1	79	41.71
153 154	結腸直腸癌	3	55	28.40	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08	3	57	30.10
174	女性乳癌(1)	4	18	18.77	C16	胃癌	4	25	13.06	4	35	18.48
151	胃癌	5	35	18.07	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	10.37	5	16	16.83
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	24	12.39	C50	女性乳房癌(1)	7	9	9.47	6	15	15.90
185	攝護腺癌(2)	7	9	9.21	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75	7	20	10.56
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	16	8.26	C15	食道癌	16	6	3.13	8	17	8.98
150	食道癌	9	16	8.26	C25	胰臟癌	5	20	10.45	8	17	8.98
156	膽囊癌	10	15	7.74	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	9	9.47	10	7	7.42
	其他		92	47.50		其他		89	46.50		77	40.65
註：	年中人口數		193,675					191,416			189,399	

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		274	121.59		282	123.23		279	119.91		305	127.27		312	126.69		336	133.94
162	肺癌	1	53	23.52	1	51	22.29	2	45	19.34	1	70	29.21	1	70	28.42	1	63	25.11
155	肝癌	2	51	22.63	2	48	20.97	1	55	23.64	2	46	19.19	2	46	18.68	2	57	22.72
153 154	結腸直腸癌	5	28	12.42	3	38	16.60	4	26	11.17	3	38	15.86	3	34	13.81	3	37	14.75
174	女性乳癌(1)	3	16	14.36	5	12	10.57	3	16	13.81	5	10	8.35	5	12	9.72	4	15	11.90
151	胃癌	4	29	12.87	4	27	11.80	5	25	10.74	4	26	10.85	6	23	9.34	5	22	8.77
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.39	7	7	6.07	7	6	5.14	7	8	6.67	4	13	10.58	6	9	7.21
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	8.08	13	3	2.64	6	11	9.49	5	10	8.35	7	11	8.91	14	5	3.97
157	胰臟癌	10	7	3.11	8	11	4.81	10	10	4.30	15	6	2.50	9	13	5.28	12	10	3.99
183	卵巢癌(1)	9	4	3.59	17	2	1.76	18	1	0.86	18	2	1.67	11	6	4.86	7	9	7.14
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	7	3.11	10	10	4.37	8	11	4.73	11	7	2.92	12	9	3.65	12	10	3.99
	其他		65	28.84		73	31.90		73	31.37		82	34.22		75	30.45		99	39.46

註： 年中人口數 225,355 228,850 232,676 239,650 246,270 250,866

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		365	143.97		373	146.15		307	119.68		406	157.81		384	148.55		411	157.96
162	肺癌	1	82	32.34	1	72	28.21	1	74	28.85	1	90	34.98	1	84	32.50	1	88	33.82
155	肝癌	2	59	23.27	3	50	19.59	3	38	14.81	2	63	24.49	3	43	16.63	3	45	17.30
153 154	結腸直腸癌	4	30	11.83	2	57	22.33	2	40	15.59	4	45	17.49	2	44	17.02	2	53	20.37
174	女性乳癌(1)	3	16	12.53	4	20	15.53	4	12	9.25	3	25	19.18	4	19	14.47	4	21	15.83
151	胃癌	5	28	11.04	5	34	13.32	6	17	6.63	6	24	9.33	5	36	13.93	5	34	13.07
185	攝護腺癌(2)	6	12	9.53	7	9	7.12	5	9	7.10	5	12	9.45	6	14	11.01	6	16	12.55
179 180	子宮頸癌(1)	7	12	9.40	6	10	7.77	7	8	6.17	9	8	6.14	10	7	5.33	12	6	4.52
157	胰臟癌	11	10	3.94	9	14	5.49	10	11	4.29	10	14	5.44	7	16	6.19	7	24	9.22
183	卵巢癌(1)	13	5	3.92	10	7	5.44	13	4	3.08	15	4	3.07	16	3	2.28	8	9	6.78
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	9	3.55	13	6	2.35	14	6	2.34	10	14	5.44	7	16	6.19	9	16	6.15
	其他		102	40.23		94	36.83		168	65.49		211	82.01		202	78.14		203	78.02
註：	年中人口數		253,526		255,224		256,517		257,276		258,500		260,185						

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		411	157.15	C00-C97	所有癌症死亡原因		426	162.79		394	150.79
162	肺癌	1	85	32.50	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83	1	82	31.38
155	肝癌	2	53	20.26	C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46	2	58	22.20
153 154	結腸直腸癌	3	43	16.44	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34	3	47	17.99
174	女性乳癌(1)	4	19	14.20	C50	女性乳房癌(1)	3	28	20.87	4	19	14.15
151	胃癌	5	33	12.62	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	7.06	5	16	12.60
185	攝護腺癌(2)	6	13	10.18	C16	胃癌	5	21	8.02	6	29	11.10
179 180	子宮頸癌(1)	7	11	8.22	C25	胰臟癌	7	18	6.88	7	16	6.12
157	胰臟癌	8	16	6.12	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	12	6	4.47	8	7	5.21
183	卵巢癌(1)	9	8	5.98	C91-C95	白血病	13	11	4.20	9	13	4.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	15	5.74	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	12	4.59	10	12	4.59
	其他		215	82.20		其他		110	42.03		95	36.36
註：	年中人口數		261,542					261,693			261,294	

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		139	123.11		139	124.03		149	133.80		137	122.50		146	129.34		166	146.12
162	肺癌	1	28	24.80	1	31	27.66	1	33	29.63	1	34	30.40	1	30	26.58	1	31	27.29
155	肝癌	2	23	20.37	2	23	20.52	3	16	14.37	2	22	19.67	2	25	22.15	5	17	14.96
153 154	結腸直腸癌	5	12	10.63	5	11	9.82	5	14	12.57	4	13	11.62	6	13	11.52	4	19	16.72
151	胃癌	3	16	14.17	3	22	19.63	3	16	14.37	5	11	9.84	4	18	15.95	2	23	20.25
174	女性乳癌(1)	4	6	10.80	4	6	10.88	2	13	23.70	8	3	5.44	3	10	17.94	3	10	17.81
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	6	5.31	8	6	5.35	10	5	4.49	9	5	4.47	8	7	6.20	11	5	4.40
185	攝護腺癌(2)	14	1	1.74	-	-	-	7	4	7.08	6	4	7.06	5	7	12.25	7	5	8.70
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	10	8.86	10	4	3.57	9	6	5.39	7	7	6.26	9	5	4.43	11	5	4.40
156	膽囊癌	10	4	3.54	14	2	1.78	17	1	0.90	13	3	2.68	18	1	0.89	14	3	2.64
179 180	子宮頸癌(1)	6	5	9.00	7	3	5.44	6	6	10.94	3	8	14.50	7	5	8.97	6	7	12.47
	其他		28	24.80		31	27.66		35	31.43		27	24.14		25	22.15		41	36.09

註： 年中人口數 112,912 112,072 111,358 111,840 112,884 113,607

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		202	177.13		177	155.42		176	155.09		193	170.72		186	164.58		206	182.05	
162	肺癌	2	40	35.08	1	44	38.63	2	33	29.08	2	36	31.84	2	34	30.08	2	33	29.16	
155	肝癌	1	43	37.71	2	23	20.20	1	47	41.42	1	37	32.73	1	39	34.51	1	38	33.58	
153 154	結腸直腸癌	3	21	18.41	3	18	15.81	3	13	11.46	6	17	15.04	3	22	19.47	3	24	21.21	
151	胃癌	6	16	14.03	4	16	14.05	5	12	10.57	4	19	16.81	6	12	10.62	4	19	16.79	
174	女性乳癌(1)	4	9	15.93	7	4	7.06	4	6	10.60	3	10	17.73	4	9	15.96	5	8	14.14	
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	8	7.02	9	7	6.15	7	7	6.17	15	4	3.54	9	6	5.31	7	8	7.07	
185	攝護腺癌(2)	8	4	6.95	17	1	1.75	-	-	-	11	3	5.30	7	4	7.07	7	4	7.07	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	9	6	5.26	9	7	6.15	7	7	6.17	8	8	7.08	12	5	4.42	6	10	8.84	
156	膽囊癌	10	5	4.38	9	7	6.15	13	4	3.52	8	8	7.08	9	6	5.31	11	5	4.42	
179 180	子宮頸癌(1)	5	8	14.16	5	5	8.83	6	4	7.07	5	9	15.96	5	7	12.41	17	1	1.77	
	其他		42	36.83		45	39.51		43	37.89		42	37.15		42	37.16		56	49.49	
註：	年中人口數		114,040			113,888			113,480			113,052			113,017			113,155		

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		195	171.83	C00-C97	所有癌症死亡原因		186	163.60		206	181.64
162	肺癌	1	41	36.13	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66	1	52	45.85
155	肝癌	2	30	26.43	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47	2	28	24.69
153 154	結腸直腸癌	3	24	21.15	C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87	3	22	19.40
151	胃癌	4	15	13.22	C50	女性乳房癌(1)	2	14	24.46	4	8	13.97
174	女性乳癌(1)	5	7	12.30	C16	胃癌	4	26	22.87	5	13	11.46
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	11	9.69	C25	胰臟癌	9	8	7.04	5	13	11.46
185	攝護腺癌(2)	7	5	8.84	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	4	7.09	7	6	10.69
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	8	7.05	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	19	1	1.75	8	4	6.99
156	膽囊癌	8	8	7.05	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	5	4.40	9	7	6.17
179 180	子宮頸癌(1)	10	4	7.03	C91-C95	白血病	7	8	7.04	10	6	5.29
	其他		42	37.01		其他		37	32.54		47	41.44

註：年中人口數

113,487

113,694

113,411

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		198	88.79		229	99.99		235	100.14		256	106.23		232	93.88		269	106.92
162	肺癌	2	29	13.00	3	37	16.16	1	50	21.31	1	53	21.99	1	49	19.83	1	50	19.87
153 154	結腸直腸癌	4	19	8.52	4	25	10.92	5	18	7.67	3	32	13.28	3	24	9.71	4	26	10.33
155	肝癌	1	42	18.83	1	44	19.21	2	42	17.90	2	50	20.75	2	36	14.57	2	44	17.49
151	胃癌	3	25	11.21	5	16	6.99	4	23	9.80	5	27	11.20	6	17	6.88	3	27	10.73
174	女性乳癌(1)	5	8	7.20	2	20	17.46	3	14	11.88	4	15	12.37	5	11	8.83	5	12	9.44
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.79	-	-	-	11	3	2.57	14	2	1.67	14	2	1.63	6	8	6.43
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.79	8	9	3.93	13	4	1.70	17	1	0.41	9	8	3.24	12	6	2.38
183	卵巢癌(1)	8	3	2.70	16	2	1.75	17	2	1.70	12	4	3.30	7	6	4.82	17	2	1.57
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	6	2.69	7	12	5.24	8	8	3.41	6	13	5.39	8	10	4.05	9	9	3.58
157	胰臟癌	11	5	2.24	10	6	2.62	6	13	5.54	9	9	3.73	15	4	1.62	8	13	5.17
	其他		55	24.66		58	25.33		58	24.72		50	20.75		65	26.30		72	28.62

註： 年中人口數 223,003 229,014 234,660 240,996 247,115 251,586

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		293	115.33		342	133.30		302	116.51		314	120.54		306	117.01		357	135.62	
162	肺癌	1	58	22.83	1	81	31.57	1	61	23.53	2	55	21.11	1	56	21.41	1	87	33.05	
153 154	結腸直腸癌	3	39	15.35	3	34	13.25	4	27	10.42	3	41	15.74	3	41	15.68	4	33	12.54	
155	肝癌	2	45	17.71	2	56	21.83	2	49	18.90	1	58	22.27	2	43	16.44	2	53	20.13	
151	胃癌	5	21	8.27	4	30	11.69	5	26	10.03	6	19	7.29	7	24	9.18	4	33	12.54	
174	女性乳癌(1)	4	18	14.00	5	12	9.23	3	19	14.43	4	13	9.80	4	15	11.22	3	19	14.08	
185	攝護腺癌(2)	7	8	6.38	9	6	4.74	17	2	1.57	5	12	9.39	6	12	9.39	9	7	5.46	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	18	5	1.97	6	14	5.46	10	8	3.09	9	13	4.99	15	5	1.91	10	10	3.80	
183	卵巢癌(1)	16	3	2.33	15	3	2.31	12	4	3.04	15	4	3.01	10	6	4.49	11	5	3.70	
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	11	4.33	13	7	2.73	6	19	7.33	10	11	4.22	9	12	4.59	8	16	6.08	
157	胰臟癌	12	7	2.76	6	14	5.46	7	11	4.24	8	14	5.37	12	9	3.44	6	19	7.22	
	其他		78	30.70		85	33.13		76	29.32		74	28.41		83	31.74		75	28.49	
註：	年中人口數		254,052			256,566			259,200			260,495			261,519			263,231		

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		373	140.72	C00-C97	所有癌症死亡原因		366	137.51		365	136.57
162	肺癌	1	71	26.79	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55	1	74	27.69
153 154	結腸直腸癌	2	52	19.62	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28	2	60	22.45
155	肝癌	3	47	17.73	C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80	3	59	22.08
151	胃癌	4	33	12.45	C50	女性乳房癌(1)	3	21	15.32	4	16	11.60
174	女性乳癌(1)	5	16	11.74	C16	胃癌	5	25	9.39	5	21	7.86
185	攝護腺癌(2)	6	15	11.65	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	6.97	6	9	6.96
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	16	6.04	C25	胰臟癌	7	16	6.01	7	17	6.36
183	卵巢癌(1)	8	8	5.87	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	8	5.83	8	8	5.80
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	15	5.66	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	11	4.13	9	14	5.24
157	胰臟癌	9	15	5.66	C91-C95	白血病	15	6	2.25	10	10	3.74
	其他		85	32.07		其他		90	33.81		77	28.81

註：年中人口數

265,071

266,163

267,256

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		322	107.80		383	129.25		388	131.94		389	131.74		371	125.33		408	138.39
162	肺癌	1	74	24.77	1	76	25.65	1	88	29.93	1	75	25.40	1	82	27.70	1	92	31.20
155	肝癌	2	62	20.76	2	68	22.95	2	66	22.44	2	64	21.68	2	55	18.58	2	66	22.39
174	女性乳癌(1)	5	10	6.67	5	15	10.09	3	24	16.27	3	25	16.85	6	11	7.38	3	26	17.48
153 154	結腸直腸癌	4	28	9.37	3	50	16.87	4	38	12.92	4	42	14.22	3	42	14.19	4	43	14.58
185	攝護腺癌(2)	7	7	4.70	7	9	6.09	13	4	2.73	7	7	4.77	5	11	7.49	11	6	4.11
151	胃癌	3	29	9.71	4	40	13.50	5	34	11.56	5	41	13.89	3	42	14.19	5	32	10.85
183	卵巢癌(1)	9	6	4.00	12	5	3.36	7	7	4.75	8	6	4.04	17	2	1.34	18	2	1.34
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	9	3.01	8	15	5.06	9	12	4.08	11	10	3.39	10	12	4.05	7	15	5.09
157	胰臟癌	10	11	3.68	9	12	4.05	14	8	2.72	11	10	3.39	8	15	5.07	7	15	5.09
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	6	2.01	10	11	3.71	14	8	2.72	14	9	3.05	10	12	4.05	15	8	2.71
	其他		80	26.78		82	27.67		99	33.67		100	33.87		87	29.39		103	34.94

註：年中人口數 298,691 296,330 294,068 295,270 296,010 294,826

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		424	144.58		461	157.99		433	149.13		476	164.67		456	158.15		489	169.80
162	肺癌	1	86	29.32	1	85	29.13	1	97	33.41	1	120	41.51	1	99	34.33	1	101	35.07
155	肝癌	2	72	24.55	2	66	22.62	2	77	26.52	2	66	22.83	2	67	23.24	2	83	28.82
174	女性乳癌(1)	4	21	14.18	3	30	20.33	4	18	12.24	4	26	17.74	6	13	8.87	3	28	19.09
153 154	結腸直腸癌	3	51	17.39	4	58	19.88	3	50	17.22	3	56	19.37	2	67	23.24	4	54	18.75
185	攝護腺癌(2)	7	12	8.27	8	13	9.02	6	13	9.07	6	15	10.53	4	18	12.69	6	15	10.62
151	胃癌	5	34	11.59	5	44	15.08	5	31	10.68	5	32	11.07	5	32	11.10	5	39	13.54
183	卵巢癌(1)	8	8	5.40	10	6	4.07	17	2	1.36	8	9	6.14	15	4	2.73	8	9	6.14
200202203	非何杰金淋巴瘤	13	10	3.41	7	27	9.25	12	11	3.79	12	14	4.84	9	16	5.55	10	16	5.56
157	胰臟癌	14	9	3.07	11	11	3.77	8	16	5.51	11	15	5.19	7	22	7.63	12	15	5.21
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	12	4.09	11	11	3.77	7	18	6.20	7	24	8.30	9	16	5.55	7	19	6.60
	其他		109	37.17		110	37.70		100	34.44		99	34.25		102	35.38		110	38.20
註：	年中人口數		293,270			291,794			290,344			289,058			288,337			287,983	

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		533	185.31	C00-C97	所有癌症死亡原因		475	165.76		482	169.15
162	肺癌	1	113	39.29	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15	1	114	40.01
155	肝癌	2	83	28.86	C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82	2	86	30.18
174	女性乳癌(1)	3	29	19.75	C50	女性乳房癌(1)	4	27	18.43	3	24	16.44
153 154	結腸直腸癌	4	55	19.12	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38	4	45	15.79
185	攝護腺癌(2)	5	16	11.36	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	15	10.71	5	15	10.79
151	胃癌	6	29	10.08	C16	胃癌	5	33	11.52	6	29	10.18
183	卵巢癌(1)	7	14	9.53	C25	胰臟癌	8	18	6.28	7	28	9.83
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	22	7.65	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93	8	14	4.91
157	胰臟癌	9	21	7.30	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	9	6.14	9	7	4.80
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	19	6.61	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	15	5.23	10	12	4.21
	其他		132	45.89		其他		105	36.64		108	37.90

註： 年中人口數 287,630 286,557 284,960

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		277	114.03		316	130.49		307	126.96		326	133.63		344	139.59		357	144.18
162	肺癌	2	52	21.41	1	74	30.56	1	72	29.78	1	66	27.05	1	77	31.24	1	76	30.69
155	肝癌	1	58	23.88	2	57	23.54	2	62	25.64	2	60	24.59	2	55	22.32	2	56	22.62
153 154	結腸直腸癌	5	18	7.41	5	24	9.91	4	30	12.41	3	40	16.40	3	39	15.83	3	43	17.37
174	女性乳癌(1)	3	19	15.73	4	14	11.61	5	10	8.29	5	11	9.01	4	16	12.93	4	17	13.65
151	胃癌	4	22	9.06	3	34	14.04	3	36	14.89	4	31	12.71	6	22	8.93	5	32	12.92
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.64	7	8	6.58	8	7	5.78	7	7	5.74	7	7	5.70	14	3	2.44
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	2.47	10	9	3.72	12	6	2.48	8	13	5.33	8	14	5.68	7	19	7.67
179 180	子宮頸癌(1)	6	8	6.62	6	10	8.29	5	10	8.29	9	6	4.91	5	12	9.70	6	12	9.64
157	胰臟癌	7	10	4.12	8	14	5.78	9	10	4.14	6	16	6.56	8	14	5.68	9	12	4.85
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.65	11	7	2.89	9	10	4.14	17	5	2.05	10	11	4.46	8	14	5.65
	其他		78	32.11		65	26.84		54	22.33		71	29.10		77	31.24		73	29.48

註：年中人口數 242,918 242,168 241,802 243,964 246,442 247,603

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-98年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		399	160.78		356	143.25		392	157.38		375	150.60		399	160.59		401	161.17	
162	肺癌	1	88	35.46	1	84	33.80	1	86	34.53	1	81	32.53	1	78	31.39	1	92	36.98	
155	肝癌	2	70	28.21	2	52	20.92	2	60	24.09	2	72	28.91	2	64	25.76	2	63	25.32	
153 154	結腸直腸癌	4	37	14.91	3	42	16.90	3	45	18.07	3	42	16.87	3	52	20.93	3	46	18.49	
174	女性乳癌(1)	5	17	13.59	8	9	7.17	5	15	11.90	5	13	10.30	5	16	12.67	6	12	9.47	
151	胃癌	3	43	17.33	4	27	10.86	4	30	12.04	4	34	13.65	4	32	12.88	4	34	13.67	
185	攝護腺癌(2)	7	8	6.50	6	10	8.13	6	10	8.13	6	9	7.33	6	13	10.64	7	8	6.56	
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	13	5.24	7	19	7.65	8	13	5.22	11	11	4.42	8	16	6.44	8	15	6.03	
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	7.19	5	12	9.56	16	4	3.17	7	8	6.34	9	8	6.34	5	13	10.25	
157	胰臟癌	13	8	3.22	11	10	4.02	7	15	6.02	9	13	5.22	11	12	4.83	10	13	5.22	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	15	6.04	13	8	3.22	9	12	4.82	10	12	4.82	7	17	6.84	10	13	5.22	
	其他		91	36.67		83	33.40		102	40.95		80	32.13		91	36.63		92	36.98	
註：	年中人口數		248,166			248,510			249,072			249,009			248,464			248,807		

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		463	185.33	C00-C97	所有癌症死亡原因		464	185.70		432	173.56
162	肺癌	1	106	42.43	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82	1	84	33.75
155	肝癌	2	61	24.42	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81	2	59	23.70
153 154	結腸直腸癌	3	59	23.62	C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62	3	57	22.90
174	女性乳癌(1)	4	19	14.89	C50	女性乳房癌(1)	4	20	15.62	4	28	21.92
151	胃癌	5	33	13.21	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	11.49	5	14	11.56
185	攝護腺癌(2)	6	15	12.28	C16	胃癌	6	27	10.81	6	27	10.85
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	26	10.41	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.20	7	20	8.04
179 180	子宮頸癌(1)	8	9	7.05	C15	食道癌	10	13	5.20	8	17	6.83
157	胰臟癌	9	17	6.80	C25	胰臟癌	9	19	7.60	8	17	6.83
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	16	6.40	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	10	7.81	10	7	5.48
	其他		102	40.83		其他		125	50.03		102	40.98
註：	年中人口數		249,825				249,864			248,900		

表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人／每十萬男性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	247.37	216.08	34.38	28.83	38.69	35.97	34.08	29.37	26.82	22.51	16.02	12.04	12.32	11.68	4.68	4.05
85	267.36	226.20	40.01	32.15	41.53	37.46	39.09	32.75	26.19	20.98	18.86	13.98	15.19	13.84	4.81	3.78
86	266.91	220.52	37.80	29.26	44.42	39.08	36.72	30.44	26.25	20.38	21.40	15.83	12.86	11.45	5.70	4.54
87	287.79	231.95	43.41	33.25	44.57	37.95	39.66	32.28	25.24	19.54	24.55	17.05	16.87	14.86	6.98	5.35
88	306.62	268.49	43.38	36.36	46.89	42.54	42.84	38.20	24.29	20.45	29.10	23.72	18.40	16.97	6.95	5.66
89	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26
<b>96</b>	<b>378.22</b>	<b>269.92</b>	<b>52.91</b>	<b>35.29</b>	<b>50.72</b>	<b>37.87</b>	<b>59.72</b>	<b>41.30</b>	<b>25.13</b>	<b>16.59</b>	<b>43.60</b>	<b>29.51</b>	<b>25.05</b>	<b>19.30</b>	<b>9.16</b>	<b>6.40</b>

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88-96年係採2000年世界標準人口為基準計算。

表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人／每十萬男性人口

年	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	7.48	6.53	5.97	6.05	9.14	8.38	9.67	7.64	2.57	2.08	5.89	5.38	2.80	2.48	4.16	3.54
85	6.34	5.59	5.50	5.29	8.93	8.13	10.46	8.09	1.91	1.53	4.73	4.10	3.36	3.18	3.21	2.99
86	8.55	7.30	4.47	4.32	9.24	8.22	10.09	8.20	3.31	2.49	5.24	4.64	3.46	3.16	3.39	2.88
87	7.06	5.71	5.37	5.20	7.29	6.22	12.66	9.50	2.91	2.31	5.98	5.06	2.53	2.46	3.61	2.86
88	9.39	8.39	5.04	4.86	8.94	8.06	13.52	11.32	2.67	2.19	3.89	3.34	3.67	3.68	4.89	4.26
89	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69
<b>96</b>	<b>10.96</b>	<b>7.94</b>	<b>9.78</b>	<b>8.19</b>	<b>10.02</b>	<b>7.85</b>	<b>11.19</b>	<b>7.32</b>	<b>4.07</b>	<b>2.78</b>	<b>6.18</b>	<b>4.67</b>	<b>3.13</b>	<b>2.59</b>	<b>4.07</b>	<b>2.97</b>

表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人／每十萬女性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	213.99	200.47	18.64	18.77	23.72	23.42	42.81	38.25	12.81	12.62	12.58	12.11	3.33	3.20	23.26	21.95
85	249.83	225.27	19.40	18.26	28.26	27.09	47.28	40.79	15.28	14.93	14.66	13.20	3.67	3.49	26.58	24.20
86	258.48	227.82	19.80	17.73	27.32	25.15	53.42	44.91	16.65	16.39	14.35	12.57	3.30	3.07	26.94	23.38
87	282.48	240.29	21.06	18.80	31.62	27.55	55.26	45.34	16.12	14.77	12.39	10.47	3.34	2.97	24.48	20.76
88	293.65	268.19	20.05	19.10	32.44	30.93	65.92	57.65	18.77	18.27	13.66	12.77	3.53	3.31	22.15	19.72
89	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21
<b>96</b>	<b>328.84</b>	<b>236.19</b>	<b>32.11</b>	<b>22.18</b>	<b>48.16</b>	<b>33.66</b>	<b>92.48</b>	<b>66.76</b>	<b>19.53</b>	<b>13.51</b>	<b>14.06</b>	<b>9.49</b>	<b>5.62</b>	<b>3.78</b>	<b>12.06</b>	<b>8.53</b>

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88-96年係採2000年世界標準人口為基準計算。

表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人／每十萬女性人口

年	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	7.20	6.62	2.88	3.04	1.89	1.99	4.24	4.19	4.32	4.50	2.88	2.27	2.05	2.09	3.11	3.03
85	6.95	6.23	4.20	4.25	2.52	2.40	5.50	4.93	2.29	2.30	3.28	2.55	2.14	2.19	2.67	2.53
86	7.60	6.52	2.53	2.68	2.30	2.04	6.60	5.96	2.46	2.17	3.61	3.02	1.84	1.92	4.22	3.86
87	9.58	8.15	4.03	3.95	3.27	2.69	8.44	7.49	2.58	2.32	4.03	3.41	2.05	1.83	3.65	3.11
88	9.54	8.62	3.00	3.06	2.10	2.08	6.76	6.17	2.18	2.16	3.23	2.73	2.25	2.13	5.41	5.18
89	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67
<b>96</b>	<b>11.61</b>	<b>8.93</b>	<b>5.03</b>	<b>4.55</b>	<b>3.18</b>	<b>2.09</b>	<b>13.76</b>	<b>10.11</b>	<b>2.44</b>	<b>1.79</b>	<b>2.89</b>	<b>2.15</b>	<b>2.22</b>	<b>2.04</b>	<b>5.40</b>	<b>3.52</b>

## 【附錄 1】平均每 2 小時 27 分鐘，臺北市就有 1 人死於心血管疾病

去年準內政部長廖風德在入閣前夕因心臟病猝死，由於生活型態改變與飲食西化，心血管疾病已為國人十大死因中最主要之慢性疾病。臺北市 88 年平均每 3 小時 2 分鐘就有 1 人死於心血管疾病，至 97 年已升高至平均每 2 小時 27 分鐘就有 1 人死亡。

近十年來臺北市心血管疾病死亡人數，占當年死亡人數的比率皆約為 22% 左右，在十大死因中僅次於惡性腫瘤；97 年心血管疾病粗死亡率為每十萬人口 136.6 人，較 88 年增加 24.9%；剔除人口結構老化影響後，標準化死亡率為 81.6 人，較 88 年減少 17.5%；由近十年資料觀之，臺北市心血管疾病粗死亡率逐年增加，標準化死亡率卻持續減少，與人口老化有密切的關係。

依心血管疾病型態觀察，臺北市 97 年心臟疾病粗死亡率為每十萬人口 76.7 人最高，腦血管疾病 45.7 人次之，與十年前比較，心臟及高血壓性疾病分別增加 41.8%、50.4%，惟腦血管疾病較 88 年略減 0.3%；剔除人口結構老化影響後，心臟、腦血管及高血壓性疾病標準化死亡率皆較 88 年分別減少 5.9%、33.9%及 4.6%。

依年齡別分析，近十年臺北市心血管疾病死亡率隨著年齡增加而增高，但是各年齡層中僅 24 歲以下、25-44 歲者死亡率較十年前增加，其中又以 24 歲以下增幅達 90.8% 為最大，心血管疾病對青壯年的威脅愈來愈大；各年齡層中，24 歲以下、25-44 歲壯年人口及 45-64 歲中年人口皆以心臟疾病死亡率最高，且為十年來心血管疾病中唯一正成長者，其增幅分別為 218.0%、76.4%及 4.6%；65 歲以上老年人口雖亦以心臟疾病死亡率較高，但其增幅卻遠低於高血壓性疾病的 26.4%。

依性別來分析，臺北市近十年心血管疾病死亡人數中男性平均占 6 成 1，女性僅占 3 成 9；其中男性以心臟疾病

死亡率最高，腦血管疾病次之，但與十年前比較，心臟及高血壓性疾病分別增加 46.9%、46.7%，腦血管疾病反降低了 0.4%；至於女性亦以心臟疾病死亡率較高，腦血管疾病次之，與十年前比較，則以高血壓性疾病增加 56.3% 最高，心臟疾病增加 35.9% 次之，腦血管疾病則略升了 0.7%。

臺北市 97 年心臟、腦血管及高血壓性疾病之標準化死亡率皆低於全國、高雄市；若與亞洲及歐美主要國家比較，臺北市心臟疾病標準化死亡率僅高於南韓，低於日本、新加坡、英國、美國及德國；腦血管疾病臺北市則較低；高血壓性疾病臺北市僅高於日本及英國。整體而言，歐美國家因飲食及肥胖問題，致心血管疾病較亞洲國家嚴重。

心血管疾病除與年齡、肥胖有密切關聯，三高(高血壓、高血糖、高血脂)病患、吸菸者更是心血管疾病的高危險族群，因此臺北市政府衛生局除定期針對 40 歲以上市民辦理免費三高篩檢外，亦開設戒菸班及戒菸門診，並為提升心血管疾病的預防與照護品質，更建構「臺北市心血管疾病防治網」，整合臺北市心血管疾病醫療照護資源，促進市民健康；同時並對市民宣導三少一多(少鹽、少油、少菸酒、多運動)、天天五蔬果(3 碟蔬菜及 2 份水果)及男性腰圍應控制在九十公分以內、女性在八十公分以內的概念，期能降低臺北市民心血管疾病的發生與死亡，讓市民活得更健康。

表1 臺北市心血管疾病死亡人數及死亡率-按型態別分

單位：人、人/每十萬人口

年	心血管疾病合計			心臟疾病死亡率			腦血管疾病死亡率			高血壓性疾病死亡率		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
88年	2,887	109.3	98.9	1,428	54.1	49.0	1,209	45.8	41.3	250	9.5	8.6
89年	2,823	106.8	92.9	1,252	47.4	41.2	1,380	52.2	45.5	191	7.2	6.2
90年	2,947	111.6	92.9	1,383	52.4	43.7	1,397	52.9	43.9	167	6.3	5.2
91年	2,862	108.5	85.9	1,450	55.0	43.4	1,233	46.7	37.2	179	6.8	5.2
92年	3,109	118.0	88.5	1,642	62.3	46.7	1,325	50.3	37.9	142	5.4	4.0
93年	3,139	119.6	85.0	1,732	66.0	46.8	1,240	47.2	33.8	167	6.4	4.4
94年	3,194	121.9	82.8	1,665	63.6	42.9	1,367	52.2	35.7	162	6.2	4.1
95年	2,885	109.9	71.9	1,527	58.2	38.4	1,182	45.0	29.2	176	6.7	4.3
96年	3,072	116.8	72.9	1,642	62.4	39.4	1,289	49.0	30.3	141	5.4	3.2
97年	3,587	136.6	81.6	2,014	76.7	46.1	1,199	45.7	27.3	374	14.2	8.2
97較88增減比較(%)	24.2	24.9	-17.5	41.0	41.8	-5.9	-0.8	-0.3	-33.9	49.6	50.4	-4.6

資料來源：行政院衛生署。

附註：標準化死亡率係以2000年WHO世界標準人口為基準計算。

表2 臺北市心血管疾病死亡率—按年齡別分

單位：人，人/每十萬人口

年	合計		24歲以下		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
88年	2,887	109.3	12	1.3	115	12.6	472	87.5	2,288	928.8
89年	2,823	106.8	12	1.3	99	11.0	464	82.4	2,248	890.1
90年	2,947	111.6	14	1.5	112	12.7	475	80.8	2,346	906.2
91年	2,862	108.5	14	1.6	98	11.2	484	79.0	2,266	850.8
92年	3,109	118.0	10	1.2	108	12.5	459	72.2	2,532	922.9
93年	3,139	119.6	13	1.6	90	10.6	503	76.6	2,533	897.7
94年	3,194	121.9	9	1.1	98	11.6	489	72.3	2,598	893.1
95年	2,885	109.9	16	2.0	98	11.7	462	66.1	2,309	767.4
96年	3,072	116.8	8	1.0	109	13.0	483	67.0	2,472	796.2
97年	3,587	136.6	18	2.4	123	14.9	550	74.4	2,896	908.6
97年較88年增減比較(%)	24.2	24.9	50.0	90.8	7.0	17.9	16.5	-14.9	26.6	-2.2

資料來源：行政院衛生署。

表3 臺北市心血管疾病死亡率-按型態及性別分

單位：人/每十萬人口

年	心臟疾病		腦血管疾病		高血壓性疾病	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
88年	68.3	40.1	53.3	38.3	10.9	8.0
89年	62.9	32.1	61.5	43.1	8.9	5.5
90年	69.4	35.7	62.8	43.2	6.7	5.9
91年	68.9	41.4	56.4	37.3	7.6	6.0
92年	76.8	48.3	63.1	37.9	5.4	5.4
93年	85.9	46.8	56.2	38.6	6.4	6.4
94年	82.6	45.3	64.1	40.8	8.3	4.2
95年	75.8	41.4	53.1	37.4	7.3	6.1
96年	80.1	45.6	60.0	38.6	5.4	5.3
97年	100.3	54.4	53.1	38.6	16.0	12.6
97年較 88年增 減比較 (%)	46.9	35.9	-0.4	0.7	46.7	56.3

資料來源：行政院衛生署。

表4 國際心血管疾病標準化死亡率比較


單位：人/每十萬人口

地區別	年	標準化死亡率		
		心臟疾病	腦血管疾病	高血壓性疾病
中華民國	2008	51.7	35.0	11.2
臺北市	2008	46.1	27.3	8.2
高雄市	2008	47.3	31.0	9.9
日本	2006	53.6	38.6	1.6
新加坡	2006	81.4	35.9	10.7
南韓	2006	39.2	57.5	9.0
英國	2006	97.2	40.6	3.5
美國	2005	125.9	28.2	11.9
德國	2006	123.2	32.3	13.6

資料來源：WHO、行政院衛生署。

附註：標準化死亡率係以2000年WHO世界標準人口為基準計算。

圖1 臺北市心血管疾病死亡率—按年齡別分



## 【附錄 2】臺北市男性壯年人口糖尿病死亡率較十年前成長 4 成 5

糖尿病是一種慢性代謝性疾病，現代人由於飲食西化、運動缺乏，糖尿病已不是老年人的疾病，臺北市男性 25-44 歲壯年人口糖尿病死亡率與十年前比較，增幅近 4 成 5，且是各年齡層中唯一增加者。

近十年來臺北市糖尿病死亡人數，占當年死亡人數的比率平均為 6.7%；97 年糖尿病粗死亡率為每十萬人口 27.3 人，在全國 25 縣市中排名 21 位，高於桃園縣、臺中市、新竹市及連江縣，較 88 年減少 16.6%；剔除人口結構老化影響後，標準化死亡率為 16.9 人則排名 23 位，僅高於新竹市及連江縣，較 88 年減少 43.5%。

依年齡別分析，近十年臺北市糖尿病死亡者，以 65 歲以上老年人口占 8 成 2 最多，45-64 歲中年人口占 1 成 6 次之；死亡率隨著年齡增加而增高，但是各年齡層中僅 25-44 歲壯年人口死亡率較十年前成長 2.9%，45-64 歲中年人口、65 歲以上老年人口則較十年前分別減少 44.2% 及 35.0%；若再依性別來看，男性糖尿病死亡率亦以 65 歲以上最高，25-44 歲則為各年齡組中唯一較十年前成長者，且增幅達 44.6%，糖尿病對男性壯年人口的威脅不容小覷；女性糖尿病死亡率亦仍以 65 歲以上最高，但與十年前比較，各年齡組均為下降趨勢，且以 25-44 歲減少 78.1% 為最多。

臺北市近十年糖尿病死亡人數中男性及女性約各占一半；粗死亡率方面，近十年男性大致皆高於女性，與十年前比較，男性及女性粗死亡率分別減少 12.8%、20.1%；至標準化死亡率，在 93 年以前女性死亡率大於男性，94 年以後男性死亡率則高於女性，與十年前比較，男性及女性標準化死亡率分別減少 36.9%、49.1%。

依近十年臺北市各行政區糖尿病標準化死亡率分析，12 個行政區中大安區歷年死亡率均低於本市死亡率，中正區僅 91 年高於本市死亡率；大同區、萬華區及北投區則近十年皆高於本市死亡率，士林區僅 88 年低於本市死亡率，

其餘 6 個行政區均呈增減互見之勢；與十年前比較，12 個行政區糖尿病標準化死亡率皆呈現下降趨勢。

臺北市 97 年糖尿病標準化死亡率皆低於全國 26.9 人、高雄市 30.1 人；若與亞洲及歐美主要國家比較，臺北市僅低於南韓 21.8 人，高於日本 4.5 人、新加坡 13.4 人、英國 5.3 人、美國 16.6 人及德國 11.5 人。

臺北市政府衛生局持續於社區辦理市民三高(高血壓、高血糖、高血脂)篩檢，幫助民眾能早期診斷早期治療；另配合衛生署國民健康局於 91 年成立「糖尿病共同照護網」，透過醫事人員在職教育訓練及認證機制，強化醫事人員專業知能，以提供糖尿病患更優質及完整性的照護。預防重於治療，建議市民平日只要注意飲食均衡、適度的運動、正常作息及維持理想的體重，糖尿病就不會輕易的找上你！

表1 臺北市糖尿病死亡人數及死亡率

單位：人、人/每十萬人口

年	死亡人數			粗死亡率			標準化死亡率		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
88年	863	415	448	32.7	31.7	33.7	29.9	27.5	33.0
89年	1,004	506	498	38.0	38.6	37.3	32.9	31.9	34.7
90年	903	450	453	34.2	34.5	33.9	28.6	27.6	30.3
91年	889	464	425	33.7	35.7	31.8	26.7	27.1	26.7
92年	946	463	483	35.9	35.7	36.1	27.2	26.5	28.6
93年	893	440	453	34.0	34.1	33.9	25.0	24.5	26.0
94年	988	521	467	37.7	40.6	34.9	26.2	27.7	25.1
95年	946	473	473	36.0	36.9	35.2	23.8	24.1	23.9
96年	958	495	463	36.4	38.7	34.3	23.3	25.1	22.1
97年	716	352	364	27.3	27.6	26.9	16.9	17.4	16.8
97年較88年增減比較(%)	-17.0	-15.2	-18.8	-16.6	-12.8	-20.1	-43.5	-36.9	-49.1

資料來源：行政院衛生署。

附註：標準化死亡率係以2000年WHO世界標準人口為基準計算。

表2 臺北市糖尿病死亡率—按性別及年齡別統計

單位：人/每十萬人口

	總計					男性					女性				
	合計	24歲以下	25-44歲	45-64歲	65歲以上	合計	24歲以下	25-44歲	45-64歲	65歲以上	合計	24歲以下	25-44歲	45-64歲	65歲以上
88年	32.7	0.1	1.6	26.0	287.0	31.7	0.2	2.3	27.9	244.9	33.7	-	1.0	24.2	338.5
89年	38.0	-	2.4	28.4	325.5	38.6	-	3.5	33.4	292.3	37.3	-	1.5	23.8	364.8
90年	34.2	0.1	2.6	26.2	280.1	34.5	-	4.3	34.5	242.0	33.9	0.2	1.1	18.6	323.7
91年	33.7	-	1.6	23.8	273.7	35.7	-	2.4	30.4	260.1	31.8	-	0.9	17.8	288.9
92年	35.9	0.2	1.4	21.4	290.1	35.7	0.2	2.2	27.0	260.3	36.1	0.2	0.7	16.3	322.4
93年	34.0	-	1.8	25.1	252.7	34.1	-	2.3	33.6	225.7	33.9	-	1.3	17.5	281.0
94年	37.7	0.2	2.1	23.1	279.1	40.6	0.5	4.0	31.4	274.2	34.9	-	0.4	15.5	284.2
95年	36.0	0.1	0.6	22.9	259.3	36.9	0.2	1.0	30.2	246.4	35.2	-	0.2	16.3	271.9
96年	36.4	0.1	1.9	19.2	258.6	38.7	-	3.3	26.7	257.1	34.3	0.3	0.7	12.4	260.2
97年	27.3	-	1.7	14.5	186.7	27.6	-	3.4	20.9	172.4	26.9	-	0.2	8.7	200.1
97年較88年增減比較(%)	-16.6	-	2.9	-44.2	-35.0	-12.8	-	44.6	-24.8	-29.6	-20.1	-	-78.1	-64.0	-40.9

資料來源：行政院衛生署。

表3 臺北市糖尿病標準化死亡率—按行政區別分

單位：人/每十萬人口

年	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
88年	29.9	36.0	29.9	23.5	25.4	19.2	31.0	39.0	30.9	29.7	37.8	29.3	32.0
89年	32.9	26.1	29.8	25.0	34.8	29.4	43.7	39.7	29.4	37.2	39.9	37.5	35.5
90年	28.6	21.4	29.0	18.6	38.0	24.0	31.8	36.4	22.6	27.4	33.3	32.7	32.4
91年	26.7	22.6	15.0	22.7	30.0	26.9	36.6	30.7	28.7	34.0	26.8	27.8	31.4
92年	27.2	28.7	31.6	21.3	20.1	24.4	31.8	34.7	22.5	25.5	26.8	30.9	30.4
93年	25.0	20.8	21.3	20.7	23.4	23.3	33.7	30.2	22.8	26.6	27.9	28.9	27.3
94年	26.2	21.6	21.7	18.9	28.4	21.5	34.5	36.1	23.6	32.9	27.9	26.7	32.6
95年	23.8	18.9	28.7	17.4	21.3	18.9	29.4	36.7	19.8	28.6	21.5	25.8	26.5
96年	23.3	22.5	19.7	20.0	24.7	6.6	24.8	31.6	20.8	17.4	25.7	25.1	26.7
97年	16.9	13.5	12.7	12.3	19.5	10.3	28.0	24.1	14.5	20.0	22.2	17.0	17.2
97年較88年增減比較(%)	-43.5	-62.4	-57.3	-47.7	-23.4	-46.7	-9.7	-38.2	-53.1	-32.5	-41.2	-41.8	-46.4

資料來源：行政院衛生署。

表4 國際糖尿病標準化死亡率比較

地區別	年	每十萬人口死亡率
中華民國	2008	26.9
臺北市	2008	16.9
高雄市	2008	30.1
日本	2006	4.5
新加坡	2006	13.4
南韓	2006	21.8
英國	2006	5.3
美國	2005	16.6
德國	2006	11.5

資料來源：WHO、行政院衛生署。

附註：標準化死亡率係以2000年WHO世界標準人口為基準計算。

### 【附錄 3】98 年臺北市十大死因統計結果出爐，惡性腫瘤、肺癌仍分列十大死因及癌症首位

98 年臺北市民十大死因與 97 年同，其中惡性腫瘤仍居榜首，慢性下呼吸道疾病上升至第 6 名，自殺則連續退出 10 名以外。十大癌症死因肺癌亦續居首位，食道癌擠入第 10 名，非何杰金淋巴瘤則退出。

98 年臺北市民死亡人數為 1 萬 4,870 人，較 97 年減少 249 人、1.6%；粗死亡率為每十萬人口 568.6 人，亦較 97 年減少 7.1 人、1.2%；如依 WHO 編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 347.3 人，較 97 年減少 18.9 人、5.2%，並較全國標準化死亡率 466.7 人低 25.6%，在全國 25 縣市中，仍僅高於金門縣、連江縣，為死亡率第三低的縣市；死亡者平均年齡為 73.0 歲，較全國高 3.4 歲。

十大死因死亡人數占總死亡人數的 7 成 6，惡性腫瘤仍居首位，其餘依序為 2.心臟疾病 3.腦血管疾病 4. 肺炎 5. 糖尿病 6. 慢性下呼吸道疾病 7. 腎炎、腎病症候群及腎病變 8. 敗血症 9. 高血壓性疾病 10.事故傷害；與 97 比較，前 5 名死因順序同，其餘慢性下呼吸道疾病上升至第 6 名，敗血症後退為第 8 名，高血壓性疾病前進 1 名為第 9 名，事故傷害退為第 10 名。

98 年臺北市十大死因標準化死亡率較 97 年減少者有 8 項，分別為肺炎(減 17.6%)、敗血症(減 16.2%)、心臟疾病(減 13.4%)、腎炎、腎病症候群及腎病變(減 13.2%)、腦血管疾病(減 9.7%)、事故傷害(減 6.2%)、惡性腫瘤(減 1.4%)、高血壓性疾病(減 0.4%)；增加者有 2 項，分別為糖尿病(增 11.6%)、慢性下呼吸道疾病(增 6.2%)。

依性別觀察，惡性腫瘤、心臟疾病及腦血管疾病皆占 98 年臺北市男女十大死因第 1 至第 3 名，男性十大死因與

97年同，惟順位上略有變動；標準化死亡率與97年比較，除糖尿病及慢性下呼吸道疾病增加17.6%、9.8%外，餘均較上年減少，減幅最多為肺炎20.0%，心臟疾病12.9%次之。女性十大死因除慢性下呼吸道疾病首度擠入第10名，自殺退為第13名外，其餘死因與97年同，惟順位上亦略有變動；標準化死亡率較97年減幅最多為腎炎、腎病症候群及腎病變23.4%，敗血症20.2%次之，增幅最多為骨骼肌肉系統及結締組織之疾病24.2%。

依年齡層觀察，98年臺北市各年齡層前3項主要死因皆與97年同，其中15-24歲青年主要死因為事故傷害占35.6%、自殺占19.8%及惡性腫瘤占13.9%；奪去壯年25-44歲生命之主要死因為惡性腫瘤占30.9%、自殺占15.1%及心臟疾病占10.2%；45-64歲中年則為惡性腫瘤占45.3%、心臟疾病占11.2%及腦血管疾病占5.8%；65歲以上老年主要死因仍以惡性腫瘤占27.2%居首，依序為心臟疾病占12.3%及腦血管疾病占8.4%。

98年臺北市民癌症死亡人數為4,563人，占總死亡人數的3成1，平均每1小時55分鐘就有1位市民因癌症死亡；粗死亡率為每十萬人口174.5人，標準化後為111.2人，較97年減少1.6人、1.4%，並較全國標準化死亡率132.5人低16.0%；癌症死亡者平均年齡為69.5歲，較全國略低0.1歲。十大癌症死因依序為肺癌、肝癌、結腸直腸癌、女性乳癌、胃癌、攝護腺癌、胰臟癌、口腔癌、子宮頸癌、食道癌；與97年比較，前7名癌症死因順序相同，口腔癌前進1名，子宮頸癌後退1名，食道癌擠入第10名，非何杰金淋巴瘤則退為第12名。

98年臺北市十大癌症死因標準化死亡率較97年減少者有5項，減幅較多者為肝癌(減9.9%)、子宮頸癌(減8.6%)；增加者有5項，增幅較多者為胰臟癌(增18.5%)、口腔癌(增10.3%)、攝護腺癌(增9.9%)。

若依性別觀察，98年臺北市男性十大癌症死因除胰臟癌前進1名、口腔癌後退1名外，其餘死因及順位皆與97年同；男性標準化死亡率較97年減少最多為白血病15.6%，增加最多為口腔癌16.0%。女性十大癌症死因除白血病前進1名、非何杰金淋巴瘤後退1名外，其餘死因及順位亦與97年同；女性標準化死亡率較97年減少最多為非何杰金淋巴瘤24.7%，增加最多為胰臟癌26.2%。

臺北市政府衛生局為降低市民死亡率，辦理了多種疾病篩檢與服務，對於惡性腫瘤推出口腔癌、乳癌等 5 項好發癌症篩檢；為預防腦血管疾病、糖尿病與高血壓疾病等，則有三高篩檢；希望藉由前述之服務，能讓市民及早發現治療。在自殺防治方面，臺北市政府更於 98 年 4 月 15 日正式成立府級的「臺北市自殺防治中心」，結合衛生局、社會局、勞工局等 12 個局處，提供包括社區心理衛生及醫療資源、福利救助、職業訓練、就業諮商等各項服務，期望透過學術上的研究和實務上的執行，幫助民眾度過生命低潮。

表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因  
民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計				男性				女性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
	所有死亡原因	14,870	568.6	100.0	所有死亡原因	8,782	693.8	100.0	所有死亡原因	6,088	451.1	100.0
1	惡性腫瘤	4,563	174.5	30.7	惡性腫瘤	2,671	211.0	30.4	惡性腫瘤	1,892	140.2	31.1
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,768	67.6	11.9	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,101	87.0	12.5	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	667	49.4	11.0
3	腦血管疾病	1,128	43.1	7.6	腦血管疾病	647	51.1	7.4	腦血管疾病	481	35.6	7.9
4	肺炎	840	32.1	5.6	肺炎	528	41.7	6.0	糖尿病	402	29.8	6.6
5	糖尿病	825	31.5	5.5	糖尿病	423	33.4	4.8	肺炎	312	23.1	5.1
6	慢性下呼吸道疾病	496	19.0	3.3	慢性下呼吸道疾病	377	29.8	4.3	敗血症	208	15.4	3.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	451	17.2	3.0	事故傷害	260	20.5	3.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	202	15.0	3.3
8	敗血症	441	16.9	3.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	249	19.7	2.8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	198	14.7	3.3
9	高血壓性疾病	385	14.7	2.6	蓄意自我傷害（自殺）	234	18.5	2.7	高血壓性疾病	179	13.3	2.9
10	事故傷害	377	14.4	2.5	敗血症	233	18.4	2.7	慢性下呼吸道疾病	119	8.8	2.0
	其他	3,596	137.5	24.2	其他	2,059	162.7	23.4	其他	1,428	105.8	23.5

資料來源：行政院衛生署。

表2 ICD-10 臺北市10大主要死因標準化死亡率比較  
民國98年

單位：人/每十萬人口

順位	死亡原因	粗死亡率		標準化死亡率	
		較上年增減率(%)	較上年增減率(%)	較上年增減率(%)	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	568.6	-1.2	347.3	-5.2
1	惡性腫瘤	174.5	2.6	111.2	-1.4
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	67.6	-11.8	40.0	-13.4
3	腦血管疾病	43.1	-5.5	24.6	-9.7
4	肺炎	32.1	-11.2	16.6	-17.6
5	糖尿病	31.5	15.7	18.9	11.6
6	慢性下呼吸道疾病	19.0	11.7	9.8	6.2
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	17.2	-7.8	9.7	-13.2
8	敗血症	16.9	-13.7	9.4	-16.2
9	高血壓性疾病	14.7	3.4	8.2	-0.4
10	事故傷害	14.4	-2.7	11.2	-6.2

資料來源：行政院衛生署。

表3 ICD-10 臺北市男性、女性10大主要死因標準化死亡率比較  
民國98年

單位：人/每十萬人口

順位	男 性			女 性		
	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
1	所有死亡原因	425.2	-5.3	所有死亡原因	276.9	-4.9
2	惡性腫瘤	134.1	-4.3	惡性腫瘤	90.1	2.9
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	52.9	-12.9	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28.6	-12.7
4	腦血管疾病	29.1	-10.8	腦血管疾病	20.6	-9.9
5	肺炎	21.0	-20.0	糖尿病	17.7	5.5
6	糖尿病	20.4	17.6	肺炎	12.4	-12.6
7	慢性下呼吸道疾病	15.1	9.8	敗血症	8.8	-20.2
8	事故傷害	16.3	-5.2	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.7	-23.4
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.8	-4.0	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7.8	24.2
10	蓄意自我傷害(自殺)	14.8	-1.1	高血壓性疾病	7.3	0.9
	敗血症	10.3	-12.8	慢性下呼吸道疾病	4.6	0.9

資料來源：行政院衛生署。

表4 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因  
民國98年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
1	所有癌症死亡原因	4,563	174.5	100.0	所有癌症死亡原因	2,671	211.0	100.0	所有癌症死亡原因	1,892	140.2	100.0
2	氣管、支氣管和肺癌	967	37.0	21.2	氣管、支氣管和肺癌	596	47.1	22.3	氣管、支氣管和肺癌	371	27.5	19.6
3	肝和肝內膽管癌	665	25.4	14.6	肝和肝內膽管癌	449	35.5	16.8	結腸、直腸和肛門癌	281	20.8	14.9
4	結腸、直腸和肛門癌	592	22.6	13.0	結腸、直腸和肛門癌	311	24.6	11.6	女性乳房癌	236	17.5	12.5
5	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	236	17.5	5.2	胃癌	203	16.0	7.6	肝和肝內膽管癌	216	16.0	11.4
6	胃癌	319	12.2	7.0	前列腺(攝護腺)癌	142	11.2	5.3	胃癌	116	8.6	6.1
7	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	142	11.2	3.1	胰臟癌	137	10.8	5.1	胰臟癌	100	7.4	5.3
8	胰臟癌	237	9.1	5.2	口腔癌	136	10.7	5.1	子宮頸及部位未明示子宮癌	69	5.1	3.6
9	口腔癌	148	5.7	3.2	食道癌	109	8.6	4.1	卵巢癌	65	4.8	3.4
10	子宮頸及部位未明示子宮癌 <sup>(1)</sup>	69	5.1	1.5	非何杰金氏淋巴瘤	77	6.1	2.9	白血病	42	3.1	2.2
	食道癌	129	4.9	2.8	白血病	64	5.1	2.4	非何杰金氏淋巴瘤	42	3.1	2.2
	其他	1,059	40.5	23.2	其他	447	35.3	16.7	其他	354	26.2	18.7

資料來源：行政院衛生署。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表5 ICD-10 臺北市10大主要癌症死因標準化死亡率比較  
民國98年

單位：人/每十萬人口

順位	死亡原因	粗死亡率		標準化死亡率	
			較上年增減率(%)		較上年增減率(%)
	所有癌症死因	174.5	2.6	111.2	-1.4
1	氣管、支氣管和肺癌	37.0	4.6	22.9	-0.1
2	肝和肝內膽管癌	25.4	-4.7	16.6	-9.9
3	結腸、直腸和肛門癌	22.6	4.8	14.0	0.8
4	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	17.5	3.7	11.5	-1.0
5	胃癌	12.2	2.7	7.3	-2.7
6	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	11.2	15.3	5.9	9.9
7	胰臟癌	9.1	24.0	5.7	18.5
8	口腔癌	5.7	13.4	3.8	10.3
9	子宮頸及部位未明示子宮癌 <sup>(1)</sup>	5.1	-7.8	3.3	-8.6
10	食道癌	4.9	7.9	3.2	2.4

資料來源：臺北市政府衛生局。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表6 ICD-10 臺北市男性、女性10大主要癌症死因標準化死亡率比較  
民國98年

單位：人/每十萬人口

順位	男 性			女 性		
	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	134.1	-4.3	所有癌症死亡原因	90.1	2.9
1	氣管、支氣管和肺癌	28.3	-5.5	氣管、支氣管和肺癌	17.5	7.8
2	肝和肝內膽管癌	24.2	-10.5	結腸、直腸和肛門癌	12.9	15.4
3	結腸、直腸和肛門癌	15.2	-9.9	女性乳房癌	11.5	-1.0
4	胃癌	9.4	-12.3	肝和肝內膽管癌	10.0	-7.6
5	前列腺(攝護腺)癌	5.9	9.9	胃癌	5.3	18.7
6	胰臟癌	6.8	10.8	胰臟癌	4.7	26.2
7	口腔癌	7.5	16.0	子宮頸及部位未明示子宮癌	3.3	-8.6
8	食道癌	5.9	-0.1	卵巢癌	3.4	13.7
9	非何杰金氏淋巴瘤	3.8	4.9	白血病	2.2	-18.6
10	白血病	3.6	-15.6	非何杰金氏淋巴瘤	2.0	-24.7

資料來源：行政院衛生署。

## 【附錄4】ICD-10 臺北市、全國、高雄市及日本主要死亡原因比較

### 表1.臺北市、全國、高雄市及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2009				全國 2009				高雄市 2009				日本 2008(平成20年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	14,870	568.60	100.00	所有死亡原因	142,240	616.33	100.00	所有死亡原因	9,023	590.98	100.00	所有死亡原因	1,142,407	907.1	100.00
1	惡性腫瘤	4,563	174.48	30.69	惡性腫瘤	39,917	172.96	28.06	惡性腫瘤	2,651	173.63	29.38	惡性腫瘤	342,963	272.3	30.02
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,768	67.61	11.89	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15,093	65.40	10.61	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	832	54.49	9.22	心臟疾病	181,928	144.4	15.92
3	腦血管疾病	1,128	43.13	7.59	腦血管疾病	10,383	44.99	7.30	肺炎	607	39.76	6.73	腦血管疾病	127,023	100.9	11.12
4	肺炎	840	32.12	5.65	肺炎	8,358	36.22	5.88	糖尿病	522	34.19	5.79	肺炎	115,317	91.6	10.09
5	糖尿病	825	31.55	5.55	糖尿病	8,229	35.66	5.79	腦血管疾病	516	33.80	5.72	事故傷害	38,153	30.3	3.34
6	慢性下呼吸道疾病	496	18.97	3.34	事故傷害	7,358	31.88	5.17	事故傷害	369	24.17	4.09	老邁	35,975	28.6	3.15
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	451	17.25	3.03	慢性下呼吸道疾病	4,955	21.47	3.48	慢性下呼吸道疾病	320	20.96	3.55	自殺	30,229	24.0	2.65
8	敗血症	441	16.86	2.97	慢性肝病及肝硬化	4,918	21.31	3.46	蓄意自我傷害(自殺)	287	18.80	3.18	腎衰竭	22,517	17.9	1.97
9	高血壓性疾病	385	14.72	2.59	蓄意自我傷害(自殺)	4,063	17.61	2.86	腎炎、腎病症候群及腎病變	264	17.29	2.93	肝臟疾病	16,268	12.9	1.42
10	事故傷害	377	14.42	2.54	腎炎、腎病症候群及腎病變	3,999	17.33	2.81	慢性肝病及肝硬化	248	16.24	2.75	慢性阻塞性肺病	15,520	12.3	1.36
	其他	3,596	137.51	24.18	其他	34,967	151.51	24.58	其他	2,407	157.65	26.68	其他	216,514	171.9	18.95
11	慢性肝病及肝硬化	349	13.35	2.35	高血壓性疾病	3,721	16.12	2.62	敗血症	229	15.00	2.54				
12	蓄意自我傷害(自殺)	341	13.04	2.29	敗血症	3,623	15.70	2.55	高血壓性疾病	228	14.93	2.53				
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	340	13.00	2.29	衰老/老邁	1,480	6.41	1.04	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	53	3.47	0.59				
14	血管性及未明示之癱瘓症	112	4.28	0.75	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,314	5.69	0.92	衰老/老邁	49	3.21	0.54				
15	帕金森病	92	3.52	0.62	結核病	748	3.24	0.53	結核病	40	2.62	0.44				
年中人口數		2,615,176			23,078,402			1,526,778			125,947,146					

附註：斜體字列示參考，與順位無關。

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2009				全國 2009				高雄市 2009				日本 2008(平成20年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比
	所有死亡原因	69	355.62	100.00	所有死亡原因	778	406.67	100.00	所有死亡原因	50	449.80	100.00	所有死亡原因	2,798	256.4	100.00
1	源於周產期的特定病況	25	128.85	36.23	先天性畸形、變形及染色體異常	193	100.88	24.81	源於周產期的特定病況	25	224.90	50.00	先天性畸形	999	91.6	35.70
2	先天性畸形變形及染色體異常	20	103.08	28.99	源於周產期的呼吸性疾患	115	60.11	14.78	先天性畸形變形及染色體異常	13	116.95	26.00	特發於周產期的呼吸和心臟血管疾患	379	34.7	13.55
3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	5	25.77	7.25	事故傷害	49	25.61	6.30	貧血	2	17.99	4.00	嬰兒猝死症候群	153	14.0	5.47
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	15.46	4.35	特發於周產期的感染	47	24.57	6.04	肺炎	1	9.00	2.00	事故傷害	144	13.2	5.15
5	惡性腫瘤	3	15.46	4.35	嬰兒猝死症候群(SIDS)	46	24.04	5.91	敗血症	1	9.00	2.00	胎兒及新生兒出血和血液疾患	128	11.7	4.57
6	事故傷害	3	15.46	4.35	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	34	17.77	4.37	事故傷害	1	9.00	2.00	心臟疾病	72	6.6	2.57
7	肺炎	1	5.15	1.45	胎兒及新生兒出血及血液疾患	18	9.41	2.31					肺炎	60	5.5	2.14
8	腦血管疾病	1	5.15	1.45	肺炎	13	6.80	1.67								
9	腦膜炎	1	5.15	1.45	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	6.27	1.54								
10	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除)	1	5.15	1.45	敗血症	10	5.23	1.29								
	其他	6	30.92	8.70	其他	241	125.97	30.98	其他	7	62.97	14.00	其他	863	79.1	30.84
出生數		19,403			191,310				11,116				1,091,156			

表3. 少年(1-14歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2009				全國 2009				高雄市 2009				日本 2008(平成20年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	45	11.79	100.00	所有死亡原因	744	20.35	100.00	所有死因	35	15.03	100.00	所有死亡原因	2,022	12.69	100.00
1	惡性腫瘤	14	3.67	31.11	事故傷害	256	7.00	34.41	惡性腫瘤	7	3.01	20.00	事故傷害	405	2.54	20.03
2	事故傷害	5	1.31	11.11	惡性腫瘤	117	3.20	15.73	事故傷害	7	3.01	20.00	惡性腫瘤	310	1.95	15.33
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	4	1.05	8.89	先天性畸形變形及染色體異常	47	1.29	6.32	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	0.86	5.71	心臟疾病	113	0.71	5.59
4	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.52	4.44	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	0.93	4.57	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.43	2.86	白血病	112	0.70	5.54
5	加害(他殺)	1	0.26	2.22	肺炎	16	0.44	2.15	肺炎	1	0.43	2.86	肺炎	99	0.62	4.90
6	疝氣及腸阻塞	1	0.26	2.22	敗血症	12	0.33	1.61	流行性感冒	1	0.43	2.86	自殺	59	0.37	2.92
7	肺炎	1	0.26	2.22	腦血管疾病	10	0.27	1.34	貧血	1	0.43	2.86	腦血管疾病	37	0.23	1.83
8	敗血症	1	0.26	2.22	加害(他殺)	10	0.27	1.34	腸道感染症	1	0.43	2.86				
9	源於周產期的特定病況	1	0.26	2.22	蓄意自我傷害(自殺)	6	0.16	0.81	腦血管疾病	1	0.43	2.86				
10	腦血管疾病	1	0.26	2.22	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	4	0.11	0.54								
	其他	14	3.67	31.11	其他	232	6.34	31.18	其他	13	5.58	37.14	其他	887	5.57	43.87
年中人口數		381,617			3,656,527				232,818				15,930,108			

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2009				全國 2009				高雄市 2009				日本 2008(平成20年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	101	31.79	100.00	所有死亡原因	1,459	45.19	100.00	所有死亡原因	92	45.22	100.00	所有死亡原因	4,598	35.52	100.00
1	事故傷害	36	11.33	35.64	事故傷害	685	21.22	46.95	事故傷害	37	18.19	40.22	自殺	1,995	15.41	43.39
2	蓄意自我傷害(自殺)	20	6.30	19.80	蓄意自我傷害(自殺)	203	6.29	13.91	蓄意自我傷害(自殺)	17	8.36	18.48	事故傷害	1,056	8.16	22.97
3	惡性腫瘤	14	4.41	13.86	惡性腫瘤	143	4.43	9.80	惡性腫瘤	6	2.95	6.52	惡性腫瘤	388	3.00	8.44
4	心臟疾病(高血壓性除除外)	3	0.94	2.97	心臟疾病(高血壓性除除外)	30	0.93	2.06	加害(他殺)	2	0.98	2.17	心臟疾病	208	1.61	4.52
5	加害(他殺)	2	0.63	1.98	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	23	0.71	1.58	腎炎、腎病徵候群及腎病變	2	0.98	2.17	白血病	104	0.80	2.26
6	腦血管疾病	2	0.63	1.98	加害(他殺)	22	0.68	1.51	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	1	0.49	1.09	腦血管疾病	75	0.58	1.63
7	糖尿病	2	0.63	1.98	先天性畸形變形及染色體異常	19	0.59	1.30	心臟疾病(高血壓性除除外)	1	0.49	1.09	肺炎	57	0.44	1.24
8	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.31	0.99	腦血管疾病	10	0.31	0.69	慢性下呼吸道疾病	1	0.49	1.09				
9	貧血	1	0.31	0.99	敗血症	9	0.28	0.62								
10	慢性下呼吸道疾病	1	0.31	0.99	肺炎	9	0.28	0.62								
	其他	19	5.98	18.81	其他	306	9.48	20.97	其他	25	12.29	27.17	其他	715	5.52	15.55
年中人口數		317,673			3,228,255				203,449				12,943,849			

表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2009				全國 2009				高雄市 2009				日本 2008(平成20年)				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	
	所有死亡原因	703	86.24	100.00	所有死亡原因	10,668	140.19	100.00	所有死亡原因	696	134.49	100.00	所有死亡原因	26,628	78.70	100.00	
1	惡性腫瘤	217	26.62	30.87	惡性腫瘤	2,623	34.47	24.59	惡性腫瘤	178	34.40	25.57	自殺	8,506	25.14	31.94	
2	蓄意自我傷害(自殺)	106	13.00	15.08	事故傷害	1,779	23.38	16.68	蓄意自我傷害(自殺)	100	19.32	14.37	惡性腫瘤	5,645	16.68	21.20	
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	72	8.83	10.24	蓄意自我傷害(自殺)	1,541	20.25	14.45	事故傷害	92	17.78	13.22	心臟疾病	2,698	7.97	10.13	
4	事故傷害	65	7.97	9.25	慢性肝病及肝硬化	901	11.84	8.45	慢性肝病及肝硬化	42	8.12	6.03	事故傷害	2,626	7.76	9.86	
5	慢性肝病及肝硬化	34	4.17	4.84	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	694	9.12	6.51	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	6.57	4.89	腦血管疾病	1,655	4.89	6.22	
6	腦血管疾病	26	3.19	3.70	腦血管疾病	389	5.11	3.65	腦血管疾病	28	5.41	4.02					
7	糖尿病	13	1.59	1.85	糖尿病	161	2.12	1.51	肺炎	11	2.13	1.58					
8	肺炎	10	1.23	1.42	肺炎	138	1.81	1.29	敗血症	9	1.74	1.29					
9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	1.10	1.28	敗血症	127	1.67	1.19	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	1.16	0.86					
10	腎炎、腎病徵候群及腎病變	9	1.10	1.28	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	110	1.45	1.03	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	1.16	0.86					
	其他	142	17.42	20.20	其他	2,205	28.98	20.67	其他	190	36.71	27.30	其他	5,498	16.25	20.65	
年中人口數		815,122				7,609,691				517,513				33,833,430			

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2009				全國 2009				高雄市 2009				日本 2008(平成20年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	2,863	378.82	100.00	所有死亡原因	32,165	538.88	100.00	所有死亡原因	2,313	559.72	100.00	所有死亡原因	144,908	425.50	100.00
1	惡性腫瘤	1,298	171.74	45.34	惡性腫瘤	13,015	218.05	40.46	惡性腫瘤	994	240.54	42.97	惡性腫瘤	65,165	191.35	44.97
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	321	42.47	11.21	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,812	47.11	8.74	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	161	38.96	6.96	心臟疾病	17,757	52.14	12.25
3	腦血管疾病	165	21.83	5.76	事故傷害	2,100	35.18	6.53	蓄意自我傷害(自殺)	114	27.59	4.93	腦血管疾病	12,444	36.54	8.59
4	糖尿病	140	18.52	4.89	慢性肝病及肝硬化	2,051	34.36	6.38	事故傷害	112	27.10	4.84	自殺	11,351	33.33	7.83
5	慢性肝病及肝硬化	134	17.73	4.68	腦血管疾病	1,933	32.38	6.01	慢性肝病及肝硬化	106	25.65	4.58	事故傷害	6,217	18.26	4.29
6	蓄意自我傷害(自殺)	126	16.67	4.40	糖尿病	1,681	28.16	5.23	腦血管疾病	103	24.92	4.45	肝臟疾病	5,323	15.63	3.67
7	事故傷害	91	12.04	3.18	蓄意自我傷害(自殺)	1,490	24.96	4.63	糖尿病	100	24.20	4.32	肺炎	3,532	10.37	2.44
8	敗血症	54	7.14	1.89	肺炎	681	11.41	2.12	肺炎	66	15.97	2.85				
9	腎炎、腎病徵候群及腎病變	46	6.09	1.61	腎炎、腎病徵候群及腎病變	587	9.83	1.82	腎炎、腎病徵候群及腎病變	54	13.07	2.33				
10	高血壓性疾病	44	5.82	1.54	敗血症	539	9.03	1.68	敗血症	40	9.68	1.73				
	其他	444	58.75	15.51	其他	5,276	88.39	16.40	其他	463	112.04	20.02	其他	23,119	67.89	15.95
年中人口數		755,775			5,968,911				413,244				34,056,010			

表7.老年人口(65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2009				全國 2009				高雄市 2009				日本 2008(平成20年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百 分 比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百 分 比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百 分 比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	11,089	3,404.71	100.00	所有死亡原因	96,426	3,968.26	100.00	所有死亡原因	5,837	3,920.98	100.00	所有死亡原因	960,917	3,420.17	100.00
1	惡性腫瘤	3,017	926.33	27.21	惡性腫瘤	24,010	988.09	24.90	惡性腫瘤	1,466	984.78	25.12	惡性腫瘤	271,414	966.04	28.25
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,365	419.10	12.31	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	11,511	473.72	11.94	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	634	425.89	10.86	心臟疾病	161,052	573.23	16.76
3	腦血管疾病	933	286.46	8.41	腦血管疾病	8,031	330.50	8.33	肺炎	528	354.68	9.05	腦血管疾病	112,791	401.45	11.74
4	肺炎	785	241.02	7.08	肺炎	7,501	308.69	7.78	糖尿病	416	279.45	7.13	肺炎	111,224	395.88	11.57
5	糖尿病	670	205.71	6.04	糖尿病	6,379	262.52	6.62	腦血管疾病	384	257.95	6.58	老邁	35,970	128.03	3.74
6	慢性下呼吸道疾病	477	146.46	4.30	慢性下呼吸道疾病	4,583	188.61	4.75	慢性下呼吸道疾病	276	185.40	4.73	事故傷害	27,664	98.46	2.88
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	396	121.59	3.57	腎炎、腎病徵候群及腎病變	3,309	136.18	3.43	高血壓性疾病	207	139.05	3.55	腎衰竭	21,274	75.72	2.21
8	敗血症	380	116.67	3.43	高血壓性疾病	3,130	128.81	3.25	腎炎、腎病徵候群及腎病變	202	135.69	3.46	慢性阻塞性肺病	15,106	53.77	1.57
9	高血壓性疾病	336	103.16	3.03	敗血症	2,926	120.41	3.03	敗血症	179	120.24	3.07	肝臟疾病	10,196	36.29	1.06
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	312	95.79	2.81	事故傷害	2,489	102.43	2.58	事故傷害	120	80.61	2.06	自殺	8,155	29.03	0.85
	其他	2,418	742.41	21.81	其他	22,557	928.30	23.39	其他	1,425	957.24	24.41	其他	186,071	662.28	19.36
年中人口數		325,696			2,429,934			148,866			28,095,592					

# 【附錄5】98年臺北市行政區別衛生統計指標

## 一、臺北市行政區別衛生統計指標 — 人口統計

中華民國98年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km <sup>2</sup>	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km <sup>2</sup>	9,593	22,394	20,108	27,427	15,951	20,869	21,719	21,287	8,279	5,180	8,477	4,551	4,365
年底人口數	合計		2,607,428	207,995	225,364	311,612	218,245	158,752	123,399	188,437	260,869	113,149	267,704	283,855	248,047
	男性	人	1,260,450	98,700	108,918	146,914	103,033	76,745	60,957	94,381	126,579	55,938	129,278	138,331	120,676
	女性		1,346,978	109,295	116,446	164,698	115,212	82,007	62,442	94,056	134,290	57,211	138,426	145,524	127,371
	性比例		93.58	90.31	93.54	89.20	89.43	93.58	97.62	100.35	94.26	97.77	93.39	95.06	94.74
人口變動	出生數	人	19,403	1,379	1,765	2,047	1,618	1,093	955	1,465	2,011	984	2,102	2,066	1,918
	死亡數	人	15,260	1,068	1,374	1,728	1,252	958	893	1,585	1,425	666	1,195	1,651	1,465
	粗出生率	‰	7.42	6.60	7.79	6.55	7.40	6.87	7.70	7.73	7.70	8.68	7.87	7.25	7.71
	粗死亡率	‰	5.84	5.11	6.06	5.53	5.73	6.02	7.20	8.37	5.45	5.87	4.47	5.79	5.89
	人口增加率	‰	-5.91	-10.00	-10.56	-7.12	-2.72	-3.67	-10.06	-10.11	-3.25	-4.60	3.36	-7.73	-6.83
	自然增加率	‰	1.58	1.49	1.73	1.02	1.67	0.85	0.50	-0.63	2.24	2.80	3.39	1.46	1.82
社會增加率	‰	-7.49	-11.49	-12.29	-8.14	-4.40	-4.52	-10.56	-9.47	-5.49	-7.40	-0.04	-9.18	-8.65	
生育率	一般生育率		28	25	29	26	28	27	30	31	28	32	27	26	28
	總生育率		940	855	960	875	915	925	970	1,000	980	1,030	985	860	945
	15-19歲	‰	2	1	4	0	2	1	1	2	1	3	2	1	2
	20-24歲		11	8	14	5	9	7	11	24	12	15	11	10	11
	24-29歲		49	36	47	40	49	46	51	56	49	57	55	46	55
	30-34歲		83	83	83	84	79	87	89	78	88	89	86	78	83
	35-39歲		37	38	38	40	37	40	36	34	39	36	38	32	33
	40-44歲		6	5	6	6	7	4	6	5	7	6	5	5	5
45-49歲	0		0	0	0	0	0	0	1	-	0	0	0	0	
人口組成 (年底)	14歲以下 (a)	人	393,660	34,201	30,568	49,690	28,941	27,627	17,284	22,869	42,633	16,663	44,854	40,585	37,745
	15-64歲 (b)		1,885,352	146,570	164,547	216,384	160,949	109,154	89,178	136,741	188,035	83,752	200,020	208,447	181,575
	65歲以上 (c)		328,416	27,224	30,249	45,538	28,355	21,971	16,937	28,827	30,201	12,734	22,830	34,823	28,727
人口組成結 構比(年底)	14歲以下	%	15.10	16.44	13.56	15.95	13.26	17.40	14.01	12.14	16.34	14.73	16.76	14.30	15.22
	15-64歲		72.31	70.47	73.01	69.44	73.75	68.76	72.27	72.57	72.08	74.02	74.72	73.43	73.20
	65歲以上		12.60	13.09	13.42	14.61	12.99	13.84	13.73	15.30	11.58	11.25	8.53	12.27	11.58
	扶養比(a+c)/b	%	38.30	41.91	36.96	44.01	35.60	45.44	38.37	37.81	38.73	35.10	33.84	36.18	36.61
老化指數c/a	83.43		79.60	98.96	91.64	97.98	79.53	97.99	126.05	70.84	76.42	50.90	85.80	76.11	

## 二、臺北市行政區別衛生統計指標 — 醫療資源

中華民國98年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家	39	6	2	5	4	3	2	5	2	1	3	1	5
	診所		3,006	259	251	630	385	222	159	179	179	65	204	302	171
	護產機構		84	9	5	11	13	9	6	3	5	2	4	10	7
	精神復建機構		49	2	1	3	9	3	2	5	5	2	3	5	9
	其他醫療及醫事機構		110	11	10	23	14	10	9	9	5	-	7	8	4
	非醫事機構		569	24	35	60	49	44	25	29	77	25	46	75	80
	藥商		10,377	1,086	903	1,601	1,686	1,043	755	527	480	276	806	711	503
病床數	合計	床	23,781	1,804	887	1,897	1,843	3,187	3,913	619	958	51	2,351	1,199	5,072
	醫院病床		21,210	1,446	794	1,436	1,380	2,981	3,770	495	848	35	2,184	921	4,920
	一般急性病床		15,046	824	545	1,061	853	2,287	2,600	267	589	30	1,616	586	3,788
	一般慢性病床		742	141	-	-	20	-	175	98	-	-	-	-	308
	特殊病床		5,422	481	249	375	507	694	995	130	259	5	568	335	824
	診所病床		2,571	358	93	461	463	206	143	124	110	16	167	278	152
醫事人力 (醫療及醫事機構)	合計	人	43,883	3,122	2,258	5,032	4,173	5,898	4,675	1,300	2,279	349	3,557	2,943	8,297
	醫師		11,284	846	660	1,520	1,041	1,589	1,047	370	595	97	958	838	1,723
	西醫師		7,993	459	384	892	697	1,293	843	218	393	42	716	557	1,499
	中醫師		773	88	66	117	69	64	103	45	52	10	40	65	54
	牙醫師		2,518	299	210	511	275	232	101	107	150	45	202	216	170
	藥事人員		5,078	491	377	671	666	534	431	235	262	100	419	350	542
	護產人員		22,725	1,452	1,036	2,191	2,055	3,135	2,658	568	1,176	129	1,777	1,463	5,085
	醫檢人員		2,878	181	99	342	257	480	343	60	117	5	258	138	598
	其他		1,918	152	86	308	154	160	196	67	129	18	145	154	349
平均 每萬人 醫療資源	醫院	家	0.15	0.29	0.09	0.16	0.18	0.19	0.16	0.27	0.08	0.09	0.11	0.04	0.20
	診所	家	11.53	12.45	11.14	20.22	17.64	13.98	12.89	9.50	6.86	5.74	7.62	10.64	6.89
	病床數	床	91.20	86.73	39.36	60.88	84.45	200.75	317.10	32.85	36.72	4.51	87.82	42.24	204.48
	醫事人員數	人	168.30	150.10	100.19	161.48	191.21	371.52	378.85	68.99	87.36	30.84	132.87	103.68	334.49
	醫師	人	43.28	40.67	29.29	48.78	47.70	100.09	84.85	19.64	22.81	8.57	35.79	29.52	69.46
	西醫師	人	30.65	22.07	17.04	28.63	31.94	81.45	68.31	11.57	15.07	3.71	26.75	19.62	60.43
	中醫師	人	2.96	4.23	2.93	3.75	3.16	4.03	8.35	2.39	1.99	0.88	1.49	2.29	2.18
	牙醫師	人	9.66	14.38	9.32	16.40	12.60	14.61	8.18	5.68	5.75	3.98	7.55	7.61	6.85
	藥事人員	人	19.48	23.61	16.73	21.53	30.52	33.64	34.93	12.47	10.04	8.84	15.65	12.33	21.85
	護產人員	人	87.15	69.81	45.97	70.31	94.16	197.48	215.40	30.14	45.08	11.40	66.38	51.54	205.00
醫檢人員	人	11.04	8.70	4.39	10.98	11.78	30.24	27.80	3.18	4.49	0.44	9.64	4.86	24.11	
其他	人	7.36	7.31	3.82	9.88	7.06	10.08	15.88	3.56	4.95	1.59	5.42	5.43	14.07	

### 三、臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計

中華民國98年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	腦血管疾病		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	肺炎		4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4
	糖尿病		5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5
	慢性下呼吸道疾病		6	8	6	6	10	8	7	8	6	7	11	6	6
	腎炎、腎病症候群及腎病變		7	10	9	7	6	6	8	9	8	7	8	7	8
	敗血症		8	6	7	10	7	6	6	6	11	12	10	8	8
	高血壓性疾病		9	6	8	8	11	10	11	11	7	12	12	12	12
	事故傷害		10	11	10	11	11	9	8	12	10	9	6	9	10
十大死因 死亡率	所有死因	人/每十 萬人口	568.60	499.41	598.94	533.05	545.43	563.99	692.60	819.43	538.09	588.13	437.78	568.50	578.14
	惡性腫瘤		174.48	158.34	192.88	175.55	190.81	173.54	205.60	221.23	150.79	181.64	136.57	169.15	173.56
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		67.61	59.32	62.67	63.95	65.43	72.94	84.66	92.40	63.53	69.66	49.77	75.80	67.90
	腦血管疾病		43.13	37.31	48.99	36.77	43.93	36.47	67.73	62.30	40.18	42.32	33.68	40.36	44.19
	肺炎		32.12	22.96	32.66	31.34	34.78	30.81	33.06	50.16	24.49	37.03	22.45	32.64	40.18
	糖尿病		31.55	34.44	35.75	23.98	21.51	28.92	46.76	55.44	26.02	29.10	24.32	34.04	31.34
	慢性下呼吸道疾病		18.97	15.79	21.63	17.91	13.27	16.98	21.77	27.46	22.20	19.40	10.85	19.65	23.30
	腎炎、腎病症候群及腎病變		17.25	10.05	18.54	15.67	17.85	19.49	20.96	24.82	16.46	19.40	13.47	18.60	16.87
	敗血症		16.86	16.26	21.19	13.11	16.47	19.49	25.80	31.68	12.25	10.58	11.60	14.74	16.87
	高血壓性疾病		14.72	16.26	19.42	15.35	12.81	13.20	13.71	22.70	19.52	10.58	9.73	10.88	12.05
事故傷害	14.42	9.57	15.01	12.15	12.81	14.46	20.96	16.90	14.54	17.64	15.34	13.34	15.67		

### 三、臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續1)

中華民國98年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世 界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	347.27	286.26	343.00	272.15	326.95	308.67	420.80	447.32	344.02	413.85	357.42	365.70	390.92
	惡性腫瘤		111.24	96.34	114.86	98.92	117.29	103.34	128.29	125.53	101.78	130.59	114.55	110.67	118.85
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)		39.98	32.78	34.96	30.96	37.90	37.95	48.81	47.78	39.82	50.43	38.51	48.77	42.82
	腦血管疾病		24.61	20.09	26.33	17.01	24.46	18.09	38.53	32.66	22.36	28.34	26.75	24.69	28.96
	肺炎		16.59	10.76	15.76	12.51	18.90	12.60	17.33	21.34	13.41	23.28	16.75	18.37	24.19
	糖尿病		18.86	18.81	18.51	12.25	13.09	15.90	27.53	29.81	16.29	21.39	19.61	21.28	21.46
	慢性下呼吸道疾 病		9.85	7.50	9.94	7.37	6.90	8.26	11.66	11.92	12.08	12.13	8.32	11.29	13.44
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		9.72	4.82	9.61	6.88	9.90	9.09	11.57	12.32	10.46	13.09	11.24	11.07	11.14
	敗血症		9.44	8.68	11.55	5.46	9.18	9.13	15.01	16.88	6.97	6.22	9.48	8.28	10.45
	高血壓性疾病		8.17	8.68	10.20	6.96	7.34	6.16	8.05	10.84	11.14	7.15	7.26	6.20	7.83
	事故傷害		11.20	7.50	10.39	7.15	10.11	11.63	14.30	11.97	11.88	14.89	14.16	10.51	13.96
十大死因 標準化 死亡率 區排名	所有死亡原因	區排名		11	8	12	9	10	2	1	7	3	6	5	4
	惡性腫瘤			12	6	11	5	9	2	3	10	1	7	8	4
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)			11	10	12	9	8	2	4	6	1	7	3	5
	腦血管疾病			10	6	12	8	11	1	2	9	4	5	7	3
	肺炎			12	8	11	4	10	6	3	9	2	7	5	1
	糖尿病			7	8	12	11	10	2	1	9	4	6	5	3
	慢性下呼吸道疾 病			10	7	11	12	9	4	5	3	2	8	5	1
	腎炎、腎病症候 群及腎病變			12	9	11	8	10	3	2	7	1	4	6	5
	敗血症			8	3	12	6	7	2	1	10	11	5	9	4
	高血壓性疾病			4	3	10	7	12	5	2	1	9	8	11	6
	事故傷害			11	9	12	10	7	2	5	6	1	3	8	4

### 三、臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續完)

中華民國98年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	合計	人/每十 萬人口	568.60	499.41	598.94	533.05	545.43	563.99	692.60	819.43	538.09	588.13	437.78	568.50	578.14
	0歲		357.61	281.00	513.85	281.95	62.68	367.82	327.69	413.65	452.15	317.12	193.19	439.56	582.47
	1-4歲		21.38	-	39.65	9.56	28.33	-	-	32.89	21.19	24.10	21.05	21.18	46.80
	5-14歲		8.88	3.80	4.54	7.99	4.81	9.39	15.80	18.81	12.46	8.38	2.94	10.00	14.27
	15-24歲		31.79	21.46	32.97	20.81	28.01	22.44	13.42	48.72	46.69	26.99	39.26	19.36	47.14
	25-44歲		86.24	68.67	67.16	74.24	101.35	64.05	97.00	112.82	78.96	94.25	96.71	89.98	93.81
	45-64歲		378.82	296.72	388.22	302.72	344.91	374.68	579.91	581.41	338.37	484.57	295.85	405.18	372.94
	65歲以上		3404.71	3001.52	3427.60	2874.87	3135.97	3148.03	3618.40	3990.18	3560.69	3749.80	3727.01	3419.62	3760.03
年齡別 死亡率 區排名	合計	區排名		11	3	10	8	7	2	1	9	4	12	6	5
	0歲			10	2	9	12	6	7	5	3	8	11	4	1
	1-4歲			10	2	9	4	10	10	3	6	5	8	7	1
	5-14歲			11	10	8	9	6	2	1	4	7	12	5	3
	15-24歲			9	5	10	6	8	12	1	3	7	4	11	2
	25-44歲			10	11	9	2	12	3	1	8	5	4	7	6
	45-64歲			11	5	10	8	6	2	1	9	3	12	4	7
	65歲以上			11	7	12	10	9	5	1	6	3	4	8	2