

中華民國 99 年
臺北市死因統計年報

臺北市政府衛生局

中華民國 100 年 8 月編印

目 錄

壹、提要分析

貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別.....	1
表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C·臺北市歷年各年齡組年中人口數.....	3
表D·臺北市歷年各年齡組年中人口數—男性.....	4
表E·臺北市歷年各年齡組年中人口數—女性.....	5
表F·臺北市歷年各行政區年底人口數.....	6
表G·臺北市各行政區年齡別年底人口數.....	7
表H·臺北市歷年各行政區年中人口數.....	8
表I·臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	9

參、99年死因統計

一、主要死因統計

表 1·臺北市、全國、高雄市主要死亡原因比較.....	11
表 2·ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3·ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

目 錄

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因	23
表14 · ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因	24
表15 · ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因	25
表16 · ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因	26
表17 · ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因	27
表18 · ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因	28
表19 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因	29
表20 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因	30
表21 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式	31
表22 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式	32
表23 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式	33
表24 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因	34
表25 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況	35
表26 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況	36
表27 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況	37

目 錄

二、行政區別死因統計

表28-1~28-12·ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	39
表29-1~29-12·ICD-10 臺北市十二區事故傷害死亡原因.....	51
表30-1~30-12·ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	63
表31-1~31-12·ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	75

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表32·臺北市歷年主要死亡原因.....	87
表33·臺北市歷年男性主要死亡原因.....	90
表34·臺北市歷年女性主要死亡原因.....	93
表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	96
表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	97
表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因.....	98
表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因.....	100
表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因.....	102
表40·臺北市歷年自殺死亡方式.....	104
表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	106
表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	108
表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	110
表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	112
表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	114

目 錄

表46·臺北市歷年主要癌症死亡原因	116
表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因	119
表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因	122
表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	125
表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	127
表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	129
二、行政區別死因統計	
表52-1~52-12·臺北市十二區歷年主要死亡原因	131
表53-1~53-12·臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因	167
伍、歷年主要癌症發生率	
表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	203
表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	205
陸、附錄	
【附錄1】99年臺北市死因統計惡性腫瘤、肺癌蟬聯十大主要死因及癌症榜首.....	207
【附錄2】臺北市嬰兒出生率逐年下降，衝擊未來人口成長.....	214
【附錄3】ICD-10 新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較.....	219
【附錄4】ICD-10 臺北市、全國、高雄市及日本主要死亡原因比較.....	221
【附錄5】99年臺北市行政區別衛生統計指標.....	228


壹、提要分析

99 年臺北市主要死因提要說明

一、標準化死亡率較上年減少 2.4%，較 90 年則減少 20.6%

99 年臺北市市民死亡人數 1 萬 5,047 人，平均每 34 分 56 秒就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 575.8 人，分別較 98 年增加 7.2 人、1.3%；如依世界衛生組織(WHO)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 338.8 人，較上年減少 2.4%，較 90 年亦減少 20.6%。若與全國相較，99 年臺北市標準化死亡率較全國低 25.6%，並在全國 22 縣市中，僅高於金門縣、連江縣，為死亡率第三低的縣市。

依近 10 年資料觀察，剔除人口結構因素影響後臺北市市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則逐年增加，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。(詳圖 1)




二、臺北市市民十大死因惡性腫瘤蟬連 38 年榜首

99 年臺北市市民十大死因中惡性腫瘤仍蟬居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、敗血症、高血壓性疾病、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病；十大死因之死亡人數占總死亡人數 74.8%，其中仍以惡性腫瘤占 30.8% 最多，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 11.5% 次之，腦血管疾病占 7.0% 居三。(詳表 1、圖 2)

表 1 ICD-10 99 年臺北市十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	15,047	100.0
1	惡性腫瘤	4,632	30.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,723	11.5
3	腦血管疾病	1,047	7.0
4	肺炎	899	6.0
5	糖尿病	769	5.1
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	474	3.2
7	慢性下呼吸道疾病	465	3.1
8	敗血症	449	3.0
9	高血壓性疾病	422	2.8
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	380	2.5
	其他	3,787	25.2



三、死亡年齡平均數較 90 年增加 4.6 歲

99 年臺北市民死亡年齡平均數為 73.7 歲，較全國高 3.4 歲，與 90 年比較則增加 4.6 歲，其中男性死亡年齡平均數為 72.5 歲，女性為 75.3 歲，男性較女性低 2.8 歲；十大死因中死亡年齡平均數以骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 84.5 歲最高，肺炎 82.9 歲次之，最低為惡性腫瘤 69.9 歲。

若以死亡年齡中位數來看，99 年臺北市民死亡年齡中位數為 78 歲，較全國高 3 歲，與 90 年比較則增加 4 歲，其中男性死亡年齡中位數為 77 歲，女性為 79 歲，男性較女性低 2 歲；十大死因中死亡年齡中位數以骨骼肌肉系統及結締組織之疾病

88 歲最高，肺炎 85 歲次之，最低為惡性腫瘤 72 歲。(詳表 2)

表 2 ICD-10 99 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

單位：歲

死因別	所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性除外)	腦血管疾病	肺炎	糖尿病	腎炎、腎病變、腎病候群及腎病變	慢性下呼吸道疾病	敗血症	高血壓性疾病	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	
												死亡年齡平均數
死亡年齡平均數	兩性	73.7	69.9	75.7	77.5	82.9	75.9	76.8	81.8	78.8	79.2	84.5
	男性	72.5	70.5	73.4	75.5	81.7	74.1	75.8	81.5	78.7	77.8	84.0
	女性	75.3	69.0	79.2	80.2	84.9	77.8	77.7	82.5	78.9	80.9	85.0
死亡年齡中位數	兩性	78	72	80	80	85	78	80	84	81	83	88
	男性	77	73	78	79	83	77	79	83	81	82	86.5
	女性	79	71	82	82	86	79	81	84	82	83	88


四、臺北市男性十大死因與上年比較，自殺跌出十大

99 年臺北市男性死亡人數為 8,882 人，死亡率為每十萬男性人口 704.1 人，較上年增加 1.5%；標準化死亡率為每十萬男性人口 421.3 人，較上年減少 0.9%，較 90 年亦減少 16.8%。

99 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、事故傷害、腎炎、腎病候群及腎病變、高血壓性疾病、敗血症；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 74.7%，其中仍以惡性腫瘤占 31.2% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 11.7%。(詳表 3、圖 3)

表 3 ICD-10 99 年臺北市男性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	8,882	100.0
1	惡性腫瘤	2,771	31.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,039	11.7
3	腦血管疾病	602	6.8
4	肺炎	548	6.2
5	糖尿病	384	4.3
6	慢性下呼吸道疾病	335	3.8
7	事故傷害	258	2.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	234	2.6
9	高血壓性疾病	231	2.6
10	敗血症	230	2.6
	其他	2,250	25.3




五、臺北市女性十大死因與上年同，惟順位略有變動

99 年臺北市女性死亡人數為 6,165 人，死亡率為每十萬女性人口 456.1 人，較上年增加 1.1%；標準化死亡率為每十萬女性人口 265.6 人，較上年減少 4.1%，較 90 年亦減少 23.3%。

99 年女性十大死因之首亦為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、腎炎、腎病症候群及腎病變、敗血症、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病；女性十大死因死亡人數占女性總死亡人數 76.5%，其中亦以惡性腫瘤占 30.2%最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 11.1%。(詳表 4、圖 4)

表 4 ICD-10 99 年臺北市女性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	6,165	100.0
1	惡性腫瘤	1,861	30.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	684	11.1
3	腦血管疾病	445	7.2
4	糖尿病	385	6.2
5	肺炎	351	5.7
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	240	3.9
7	敗血症	219	3.6
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	210	3.4
9	高血壓性疾病	191	3.1
10	慢性下呼吸道疾病	130	2.1
	其他	1,449	23.5



六、嬰兒(未滿1歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占5成8

99年臺北市未滿1歲嬰兒死亡人數為71人，死亡率為每十萬人口383.2人，分別較上年增加2人、7.8%。男嬰死亡率為每十萬人口426.4人，較上年增加25.4%；女嬰死亡率為336.5人，亦較上年減少9.6%。嬰兒主要死因前3項分別為(1)源於周產期的特定病況41人占57.8%，(2)先天性畸形變形及染色體異常14人占19.7%，(3)事故傷害4人占5.6%，3者合占嬰兒死亡人數的83.1%。

七、少年(1-14歲)惡性腫瘤居首位死因，占2成9

99年臺北市1-14歲少年死亡人數為45人，死亡率為每十萬人口12.2人，與上年人數無增減、但死亡率增加3.1%。少年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤13人占28.9%，(2)事故傷害8人占17.8%，(3)心臟疾病(高血壓性除)4人占8.9%，3者合占少年死亡人數的55.6%。

八、青年(15-24歲)事故傷害仍居死因首位，占3成4

99年臺北市15-24歲青年死亡人數為82人，死亡率為每十萬人口26.2人，分別較上年減少19人、17.6%。青年主要死因前3項分別為(1)事故傷害28人占34.1%，(2)惡性腫瘤18人占22.0%，(3)蓄意自我傷害(自殺)15人占18.3%，3者合占青年死亡人數的74.4%。

九、壯年(25-44歲)死因之前二位仍為惡性腫瘤、自殺

99年臺北市25-44歲壯年死亡人數為682人，死亡率為每十萬人口84.4人，分別較上年減少21人、2.2%。壯年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤221人占32.4%，(2)蓄意自我傷害(自殺)100人占14.7%，(3)事故傷害68人占10.0%，3者合占壯年死亡人數的57.0%。

十、中年(45-64歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占4成7

99年臺北市45-64歲中年死亡人數為2,874人，死亡率為每十萬人口371.9人，與上年比較，死亡人數雖增加11人，但

死亡率減少 1.8%。中年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,342 人占 46.7%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)291 人占 10.1%，(3)腦血管疾病 154 人占 5.4%，3 者合占中年死亡人數的 62.2%。

十一、老年(65-79 歲)死亡率以惡性腫瘤為首，占 3 成 6

99 年臺北市 65-79 歲老年死亡人數為 4,371 人，占總死亡人數的 29.0%，死亡率為每十萬人口 1,826.4 人，較上年減少 3.8%。65-79 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,587 人占 36.3%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)455 人占 10.4%，(3)腦血管疾病 317 人占 7.3%，3 者合占 65-79 歲老年死亡人數的 54.0%。


十二、老年(80 歲以上)死亡率亦以惡性腫瘤為首，占 2 成 1

99 年臺北市 80 歲以上老年死亡人數為 6,922 人，占總死亡人數的 46.0%，死亡率為每十萬人口 7,620.2 人，較上年增加 1.1%。80 歲以上老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,451 人占 21.0%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)904 人占 13.1%，(3)肺炎 640 人占 9.2%，3 者合占 80 歲以上老年死亡人數的 43.3%。

十三、12 行政區仍以萬華區標準化死亡率最高，大同區次之

99 年臺北市 12 行政區死亡率以萬華區每十萬人口 807.9 人最高，大同區 650.0 人次之，內湖區 439.8 人最低；標準化後萬華區每十萬人口 433.8 人仍為最高，南港區 424.6 人次之，大

安區 277.6 人最低。(詳圖 5)



十四、惡性腫瘤(癌症)

(一)氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌續居主要癌症死因前三位

99 年臺北市惡性腫瘤死亡人數為 4,632 人，占總死亡人數之 30.8%，死亡率為每十萬人口 177.3 人，較上年增加 1.6%；標準化死亡率為每十萬人口 110.1 人，較上年則減少 1.0%，較 90 年亦減少 16.7%。


99 年臺北市十大癌症死因中氣管、支氣管和肺癌仍居榜首，其次依序為肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性

乳房癌、胃癌、前列腺(攝護腺)癌、胰臟癌、非何杰金氏淋巴瘤、口腔癌、子宮頸及部位未明示子宮癌；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數 75.7%，其中氣管、支氣管和肺癌占 21.4%最多，肝和肝內膽管癌占 13.9%次之，結腸、直腸和肛門癌占 12.3%居三。(詳表 5、圖 6)

表 5. ICD-10 99 年臺北市十大癌症死因

單位：人、%

順位	癌症死因	死亡人數	死亡百分比
	所有癌症死因	4,632	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	990	21.4
2	肝和肝內膽管癌	644	13.9
3	結腸、直腸和肛門癌	570	12.3
4	女性乳房癌	266	5.7
5	胃癌	307	6.6
6	前列腺(攝護腺)癌	144	3.1
7	胰臟癌	211	4.6
8	非何杰金氏淋巴瘤	152	3.3
9	口腔癌	151	3.3
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	71	1.5
	其他	1,126	24.3



(二) 男性癌症標準化死亡率較上年增加 2.4%、女性則減少 4.9%，惟男性癌症標準化死亡率仍為女性的 1.6 倍

99 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性為 2,771 人，女性為 1,861 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 137.3 人、每十萬女性人口 85.6 人，男性標準化死亡率為女性之 1.6 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性增加 3.7%、女性減少 1.6%，標準化死亡率男性亦增加 2.4%，女性則減少 4.9%。

99 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 69.9 歲，較全國高 2.6 歲，與 90 年比較則增加 2.7 歲，其中男性死亡年齡平均數為 70.5 歲，女性為 69.0 歲。99 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平均

數以前列腺(攝護腺)癌 80.8 歲最高，胃癌 74.3 歲次之，最低為口腔癌 59.3 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，99 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 72 歲，較全國高 3 歲，與 90 年比較則增加 2 歲，其中男性死亡年齡平均數為 73 歲，女性為 71 歲。99 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡中位數以前列腺(攝護腺)癌 81 歲最高，胃癌 79 歲次之，最低為口腔癌 57 歲。(詳表 6)

表 6. ICD-10 99 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數
單位：歲

死因別		所有癌症死因	氣管、支氣管和肺癌	肝和肝內膽管癌	結腸、直腸和肛門癌	女性乳房癌	胃癌	前列腺(攝護腺)癌	胰臟癌	非何杰金氏淋巴瘤	口腔癌	子宮頸及部位未明示 子宮癌
死亡年齡平均數	兩性	69.9	72.9	68.5	71.6	60.9	74.3	80.8	71.2	73.6	59.3	64.1
	男性	70.5	73.4	66.8	71.8	--	74.9	80.8	71.1	74.6	58.9	--
	女性	69.0	71.9	72.2	71.3	60.9	73.4	--	71.2	71.7	63.9	64.1
死亡年齡中位數	兩性	72	75	70	75	59	79	81	72	78	57	63
	男性	73	76	68	75	--	79	81	73	78.5	57	--
	女性	71	75	73	74	59	77.5	--	71	75.5	63.5	63

貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別

中華民國99年

項 目	單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積	平方公里	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度	人/平方公里	9,635	22,442	20,084	27,423	16,089	20,972	21,931	21,362	8,325	5,220	8,558	4,562	4,386
年底人口數	人	2,618,772	208,434	225,092	311,565	220,126	159,536	124,600	189,099	262,307	114,023	270,245	284,539	249,206
男性		1,262,554	98,868	108,402	146,662	103,598	76,957	61,398	94,226	127,002	56,063	130,289	138,216	120,873
女性		1,356,218	109,566	116,690	164,903	116,528	82,579	63,202	94,873	135,305	57,960	139,956	146,323	128,333
性比例		93.09	90.24	92.90	88.94	88.90	93.19	97.15	99.32	93.86	96.73	93.09	94.46	94.19
出生數	人	18,530	1,414	1,653	2,147	1,568	1,024	956	1,336	1,834	911	1,981	1,937	1,769
粗出生率	‰	7.09	6.79	7.34	6.89	7.15	6.43	7.71	7.08	7.01	8.02	7.37	6.82	7.12
死亡數	人	15,398	1,119	1,369	1,845	1,277	926	819	1,596	1,489	707	1,183	1,615	1,453
粗死亡率	‰	5.89	5.37	6.08	5.92	5.83	5.82	6.60	8.45	5.69	6.22	4.40	5.68	5.84
人口增加率	‰	4.35	2.11	-1.21	-0.15	8.62	4.94	9.73	3.51	5.51	7.72	9.49	2.41	4.67
自然增加率		1.20	1.42	1.26	0.97	1.33	0.62	1.10	-1.38	1.32	1.80	2.97	1.13	1.27
社會增加率		3.14	0.69	-2.47	-1.12	7.25	4.31	8.58	4.88	4.18	5.90	6.48	1.27	3.39
14歲以下年底人口數(a)	人 比重(%)	383,774 14.65	33,503 16.07	29,545 13.13	48,750 15.65	28,382 12.89	27,061 16.96	17,110 13.73	22,182 11.73	41,273 15.73	16,311 14.31	43,500 16.10	39,410 13.85	36,747 14.75
15-64歲年底人口數(b)	人 比重(%)	1,903,092 72.67	147,157 70.60	165,134 73.36	216,953 69.63	163,165 74.12	110,370 69.18	90,392 72.55	138,069 73.01	190,511 72.63	84,852 74.42	203,498 75.30	209,735 73.71	183,256 73.54
65歲以上年底人口數(c)	人 比重(%)	331,906 12.67	27,774 13.33	30,413 13.51	45,862 14.72	28,579 12.98	22,105 13.86	17,098 13.72	28,848 15.26	30,523 11.64	12,860 11.28	23,247 8.60	35,394 12.44	29,203 11.72
扶養比 (a+c)/b	%	37.61	41.64	36.31	43.61	34.91	44.55	37.84	36.96	37.69	34.38	32.80	35.67	35.99
扶幼比 a/b		20.17	22.77	17.89	22.47	17.39	24.52	18.93	16.07	21.66	19.22	21.38	18.79	20.05
扶老比 c/b		17.44	18.87	18.42	21.14	17.52	20.03	18.92	20.89	16.02	15.16	11.42	16.88	15.94
老化指數 c/a		86.48	82.90	102.94	94.08	100.69	81.69	99.93	130.05	73.95	78.84	53.44	89.81	79.47

附註：本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
76	73.39	71.09	76.31	76.73	74.79	79.04
77	73.32	70.99	76.21	76.89	74.71	79.51
78	73.54	71.10	76.47	76.81	74.91	79.00
79	73.79	71.33	76.75	77.11	75.23	79.75
80	74.26	71.83	77.14	77.59	75.88	80.22
81	74.26	71.78	77.19	77.85	75.95	80.54
82	74.28	71.61	77.52	78.01	75.99	80.83
83	74.50	71.81	77.76	78.20	76.18	80.94
84	74.53	71.85	77.74	78.36	76.18	81.07
85	74.95	72.38	78.05	78.74	76.62	81.24
86	75.54	72.97	78.61	79.01	77.16	81.05
87	75.76	73.12	78.93	79.56	77.39	82.11
88	75.90	73.33	78.98	79.87	77.86	82.17
89	76.46	73.83	79.56	80.12	78.07	82.44
90	76.75	74.07	79.92	80.25	78.21	82.52
91	77.19	74.58	80.24	80.70	78.74	82.82
92	77.35	74.77	80.33	80.91	78.99	82.95
93	77.48	74.68	80.75	81.36	79.03	83.85
94	77.42	74.50	80.80	81.21	78.77	83.86
95	77.90	74.86	81.41	81.79	79.40	84.32
96	78.38	75.46	81.72	82.00	79.69	84.42
97	78.57	75.59	81.94	81.87	79.66	84.11
98	79.01	76.03	82.34	82.50	80.19	84.84

資料來源：內政部。

表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數

年 別	總 計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
	人 數 (人)							
90年	2,640,138	29,318	138,255	346,070	396,896	882,758	587,962	258,878
91年	2,637,829	25,358	130,436	345,995	385,390	871,742	612,566	266,343
92年	2,634,497	23,872	122,373	340,662	376,934	860,954	635,342	274,360
93年	2,624,805	22,098	115,610	333,386	365,398	849,821	656,319	282,174
94年	2,619,424	20,858	106,020	329,182	354,222	841,903	676,350	290,888
95年	2,624,309	20,255	97,844	322,973	344,320	839,559	698,492	300,867
96年	2,630,756	20,497	93,288	314,682	334,216	837,173	720,426	310,474
97年	2,626,096	20,251	90,589	304,529	325,271	827,928	738,785	318,745
98年	2,615,176	19,295	88,872	292,745	317,673	815,122	755,775	325,696
99年	2,613,100	18,733	89,279	280,706	313,173	808,277	772,772	330,161
	百 分 比 (%)							
90年	100.00	1.11	5.24	13.11	15.03	33.44	22.27	9.81
91年	100.00	0.96	4.94	13.12	14.61	33.05	23.22	10.10
92年	100.00	0.91	4.65	12.93	14.31	32.68	24.12	10.41
93年	100.00	0.84	4.40	12.70	13.92	32.38	25.00	10.75
94年	100.00	0.80	4.05	12.57	13.52	32.14	25.82	11.11
95年	100.00	0.77	3.73	12.31	13.12	31.99	26.62	11.46
96年	100.00	0.78	3.55	11.96	12.70	31.82	27.38	11.80
97年	100.00	0.77	3.45	11.60	12.39	31.53	28.13	12.14
98年	100.00	0.74	3.40	11.19	12.15	31.17	28.90	12.45
99年	100.00	0.72	3.42	10.74	11.98	30.93	29.57	12.63

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性

年 別	男性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
90年	1,304,744	15,220	71,983	181,646	201,185	414,977	281,327	138,405	
91年	1,300,818	13,180	67,972	181,472	195,538	409,614	292,702	140,340	
92年	1,296,600	12,442	63,700	178,713	191,624	404,398	303,168	142,554	
93年	1,289,022	11,571	60,098	174,960	186,351	399,102	312,512	144,428	
94年	1,282,908	11,007	55,113	172,464	181,326	395,113	321,267	146,618	
95年	1,281,102	10,599	51,037	168,671	176,781	393,448	331,205	149,362	
96年	1,280,124	10,599	48,784	163,958	171,984	391,825	340,865	152,110	
97年	1,274,252	10,466	47,357	158,589	167,692	387,224	348,609	154,316	
98年	1,265,699	9,980	46,379	152,510	164,019	381,047	355,766	156,000	
99年	1,261,502	9,708	46,394	146,399	161,906	377,421	363,045	156,630	
				百 分 比 (%)					
90年	100.00	1.17	5.52	13.92	15.42	31.81	21.56	10.61	
91年	100.00	1.01	5.23	13.95	15.03	31.49	22.50	10.79	
92年	100.00	0.96	4.91	13.78	14.78	31.19	23.38	10.99	
93年	100.00	0.90	4.66	13.57	14.46	30.96	24.24	11.20	
94年	100.00	0.86	4.30	13.44	14.13	30.80	25.04	11.43	
95年	100.00	0.83	3.98	13.17	13.80	30.71	25.85	11.66	
96年	100.00	0.83	3.81	12.81	13.43	30.61	26.63	11.88	
97年	100.00	0.82	3.72	12.45	13.16	30.39	27.36	12.11	
98年	100.00	0.79	3.66	12.05	12.96	30.11	28.11	12.33	
99年	100.00	0.77	3.68	11.61	12.83	29.92	28.78	12.42	

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性

年 別	女性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
				人 數 (人)				
90年	1,335,394	14,098	66,272	164,424	195,711	467,780	306,636	120,474
91年	1,337,010	12,178	62,463	164,524	189,852	462,128	319,864	126,003
92年	1,337,897	11,430	58,672	161,949	185,310	456,556	332,174	131,806
93年	1,335,782	10,528	55,511	158,426	179,046	450,720	343,807	137,746
94年	1,336,516	9,850	50,907	156,718	172,896	446,790	355,084	144,270
95年	1,343,207	9,656	46,807	154,302	167,539	446,111	367,287	151,505
96年	1,350,632	9,898	44,504	150,725	162,232	445,348	379,562	158,364
97年	1,351,844	9,786	43,232	145,940	157,579	440,704	390,176	164,429
98年	1,349,477	9,316	42,493	140,235	153,654	434,075	400,009	169,696
99年	1,351,598	9,025	42,885	134,307	151,268	430,856	409,727	173,531
				百 分 比 (%)				
90年	100.00	1.06	4.96	12.31	14.66	35.03	22.96	9.02
91年	100.00	0.91	4.67	12.31	14.20	34.56	23.92	9.42
92年	100.00	0.85	4.39	12.10	13.85	34.12	24.83	9.85
93年	100.00	0.79	4.16	11.86	13.40	33.74	25.74	10.31
94年	100.00	0.74	3.81	11.73	12.94	33.43	26.57	10.79
95年	100.00	0.72	3.48	11.49	12.47	33.21	27.34	11.28
96年	100.00	0.73	3.30	11.16	12.01	32.97	28.10	11.73
97年	100.00	0.72	3.20	10.80	11.66	32.60	28.86	12.16
98年	100.00	0.69	3.15	10.39	11.39	32.17	29.64	12.57
99年	100.00	0.67	3.17	9.94	11.19	31.88	30.31	12.84

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F·臺北市各行政區年齡別年底人口數

中華民國99年底

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
99年底人口數	2,618,772	208,434	225,092	311,565	220,126	159,536	124,600	189,099	262,307	114,023	270,245	284,539	249,206
0歲	18,631	1,437	1,656	2,203	1,528	1,033	966	1,345	1,847	906	1,967	1,949	1,794
1-4	90,620	7,160	7,523	10,817	7,332	5,749	4,220	6,168	9,502	4,213	9,749	9,527	8,660
5-9	117,435	10,387	9,023	15,190	8,596	8,398	5,054	6,706	12,745	5,062	13,141	11,870	11,263
10-14	157,088	14,519	11,343	20,540	10,926	11,881	6,870	7,963	17,179	6,130	18,643	16,064	15,030
15-19	159,227	12,143	13,116	17,770	12,230	9,612	7,155	10,530	17,007	7,153	19,448	17,414	15,649
20-24	152,955	10,839	13,433	15,432	12,284	8,183	7,322	11,271	15,302	7,374	18,463	17,718	15,334
25-29	184,961	12,719	16,489	18,430	15,623	9,641	9,235	14,810	17,802	8,952	20,341	21,912	19,007
30-34	209,349	15,027	18,690	21,469	18,325	11,632	10,802	16,842	20,325	10,616	21,246	23,388	20,987
35-39	199,682	15,806	17,143	22,594	17,030	11,935	9,416	14,137	20,867	9,460	20,571	20,935	19,788
40-44	214,863	17,822	17,929	25,722	17,974	13,356	9,789	14,333	23,568	9,277	22,963	22,242	19,888
45-49	219,681	17,535	18,502	26,020	19,021	13,143	10,018	15,023	23,021	9,138	25,108	22,890	20,262
50-54	216,782	16,699	18,652	25,125	19,080	12,492	10,127	15,597	21,148	8,992	24,404	24,167	20,299
55-59	204,419	16,202	18,089	25,013	18,706	11,653	9,839	15,032	18,872	8,325	20,031	23,458	19,199
60-64	141,173	12,365	13,091	19,378	12,892	8,723	6,689	10,494	12,599	5,565	10,923	15,611	12,843
65-69	95,816	8,128	8,985	13,063	8,304	5,835	4,929	7,899	8,534	4,006	6,694	10,602	8,837
70-74	80,642	6,534	7,107	10,649	7,049	5,282	4,726	7,256	7,048	3,295	5,576	8,954	7,166
75-79	62,642	5,072	5,478	8,273	5,783	4,277	3,523	5,762	5,494	2,358	4,488	6,737	5,397
80-84	51,249	4,317	4,890	7,218	4,254	3,363	2,182	4,543	5,229	1,883	3,803	5,094	4,473
85-89	28,708	2,538	2,745	4,452	2,233	2,233	1,124	2,408	2,968	934	1,972	2,785	2,316
90-94	9,802	938	929	1,662	723	792	454	739	987	309	571	920	778
95-99	2,544	195	234	469	200	240	126	203	223	71	127	256	200
100歲以上	503	52	45	76	33	83	34	38	40	4	16	46	36

表G·臺北市近十年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	90年底	91年底	92年底	93年底	94年底	95年底	96年底	97年底	98年底	99年底
臺北市	2,633,802	2,641,856	2,627,138	2,622,472	2,616,375	2,632,242	2,629,269	2,622,923	2,607,428	2,618,772
松山區	205,031	205,289	205,593	205,962	208,101	209,422	210,986	210,097	207,995	208,434
信義區	237,530	237,362	234,590	232,506	230,780	231,476	228,868	227,770	225,364	225,092
大安區	315,818	315,714	313,011	312,554	312,166	314,171	314,924	313,848	311,612	311,565
中山區	216,043	217,569	216,999	216,868	216,906	219,582	218,483	218,841	218,245	220,126
中正區	161,635	161,808	159,599	158,486	157,335	158,604	159,486	159,337	158,752	159,536
大同區	131,343	131,077	129,440	128,512	126,810	126,923	126,128	124,653	123,399	124,600
萬華區	204,024	203,451	200,266	197,445	194,743	194,879	192,470	190,361	188,437	189,099
文山區	253,920	256,528	256,506	258,046	258,953	261,417	261,666	261,719	260,869	262,307
南港區	113,937	113,839	113,122	112,982	113,052	113,258	113,716	113,672	113,149	114,023
內湖區	254,521	258,611	259,789	261,201	261,837	264,624	265,518	266,808	267,704	270,245
士林區	292,096	291,493	289,194	288,921	287,753	288,212	287,048	286,065	283,855	284,539
北投區	247,904	249,115	249,029	248,989	247,939	249,674	249,976	249,752	248,047	249,206

表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數

中華民國99年中

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
99年中人口數	2,613,100	208,215	225,228	311,589	219,186	159,144	124,000	188,768	261,588	113,586	268,975	284,197	248,627
0歲	18,733	1,394	1,681	2,136	1,537	1,054	944	1,369	1,904	921	1,998	1,974	1,824
1-4	89,279	7,089	7,481	10,664	7,186	5,626	4,098	6,061	9,380	4,133	9,586	9,429	8,548
5-9	121,908	10,794	9,412	15,731	8,900	8,671	5,257	6,999	13,270	5,239	13,717	12,280	11,640
10-14	158,798	14,575	11,483	20,690	11,040	11,994	6,898	8,097	17,401	6,194	18,877	16,315	15,235
15-19	159,611	12,136	13,232	17,740	12,293	9,524	7,217	10,612	16,896	7,186	19,531	17,515	15,731
20-24	153,563	10,867	13,510	15,513	12,338	8,212	7,353	11,380	15,291	7,382	18,430	17,863	15,427
25-29	187,307	12,904	16,777	18,751	15,827	9,770	9,367	15,085	17,931	9,136	20,298	22,228	19,236
30-34	204,952	14,856	18,402	21,150	17,849	11,385	10,490	16,352	20,042	10,344	20,675	22,887	20,522
35-39	200,708	15,952	17,272	22,849	17,074	11,996	9,424	14,176	21,090	9,427	20,586	21,010	19,855
40-44	215,311	17,876	18,004	25,886	17,989	13,384	9,743	14,283	23,555	9,236	23,220	22,254	19,884
45-49	220,804	17,611	18,583	26,163	19,056	13,221	10,065	15,170	23,013	9,193	25,219	23,129	20,383
50-54	217,576	16,813	18,795	25,250	19,217	12,439	10,172	15,637	21,061	8,948	24,383	24,428	20,436
55-59	201,404	16,131	17,878	25,026	18,370	11,583	9,692	14,788	18,497	8,183	19,291	23,102	18,865
60-64	132,989	11,721	12,389	18,342	12,048	8,251	6,265	9,924	11,900	5,270	10,128	14,677	12,077
65-69	97,197	8,219	9,125	13,209	8,440	5,926	5,048	8,152	8,599	4,053	6,735	10,746	8,949
70-74	79,134	6,338	6,962	10,473	7,002	5,239	4,658	7,140	6,904	3,223	5,496	8,756	6,945
75-79	62,993	5,083	5,551	8,349	5,758	4,284	3,459	5,793	5,633	2,376	4,522	6,743	5,446
80-84	50,861	4,292	4,882	7,202	4,225	3,349	2,143	4,492	5,196	1,864	3,727	5,052	4,440
85-89	27,673	2,446	2,667	4,344	2,119	2,169	1,120	2,320	2,857	913	1,867	2,641	2,213
90-94	9,351	884	875	1,599	705	753	428	712	920	296	552	887	744
95-99	2,463	190	229	454	189	238	129	188	216	70	125	245	194
100歲以上	490	49	43	72	32	82	35	43	39	5	18	40	35

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I·臺北市近十年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年
臺北市	2,640,138	2,637,829	2,634,497	2,624,805	2,619,424	2,624,309	2,630,756	2,626,096	2,615,176	2,613,100
松山區	206,167	205,160	205,441	205,778	207,032	208,762	210,204	210,542	209,046	208,215
信義區	238,912	237,446	235,976	233,548	231,643	231,128	230,172	228,319	226,567	225,228
大安區	316,398	315,766	314,362	312,782	312,360	313,169	314,548	314,386	312,730	311,589
中山區	215,788	216,806	217,284	216,934	216,887	218,244	219,033	218,662	218,543	219,186
中正區	162,362	161,722	160,704	159,042	157,911	157,970	159,045	159,412	159,045	159,144
大同區	132,018	131,210	130,258	128,976	127,661	126,867	126,526	125,391	124,026	124,000
萬華區	205,440	203,738	201,858	198,856	196,094	194,811	193,675	191,416	189,399	188,768
文山區	253,526	255,224	256,517	257,276	258,500	260,185	261,542	261,693	261,294	261,588
南港區	114,040	113,888	113,480	113,052	113,017	113,155	113,487	113,694	113,411	113,586
內湖區	254,052	256,566	259,200	260,495	261,519	263,231	265,071	266,163	267,256	268,975
士林區	293,270	291,794	290,344	289,058	288,337	287,983	287,630	286,557	284,960	284,197
北投區	248,166	248,510	249,072	249,009	248,464	248,807	249,825	249,864	248,900	248,627

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

參、99 年死因統計

一、主要死因統計

表1·ICD-10 臺北市、全國主要死亡原因比較

中華民國99年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾病碼 ICD 10	死亡原因	臺北市				全國			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比
A00-Y98	所有死亡原因		15,047	575.83	100.00		144,709	625.34	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,632	177.26	30.78	1	41,046	177.37	28.36
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1,723	65.94	11.45	2	15,675	67.74	10.83
I60-I69	腦血管疾病	3	1,047	40.07	6.96	3	10,134	43.79	7.00
J12-J18	肺炎	4	899	34.40	5.97	4	8,909	38.50	6.16
E10-E14	糖尿病	5	769	29.43	5.11	5	8,211	35.48	5.67
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	474	18.14	3.15	10	4,105	17.74	2.84
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	465	17.79	3.09	7	5,197	22.46	3.59
A40-A41	敗血症	8	449	17.18	2.98	12	3,784	16.35	2.61
I10-I15	高血壓性疾病	9	422	16.15	2.80	9	4,174	18.04	2.88
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	380	14.54	2.53	13	1,534	6.63	1.06
	其他		3,787	144.92	25.17		41,940	181.24	28.98
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	359	13.74	2.39	6	6,669	28.82	4.61
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	12	329	12.59	2.19	11	3,889	16.81	2.69
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	318	12.17	2.11	8	4,912	21.23	3.39
D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	14	120	4.59	0.80	15	968	4.18	0.67
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	15	116	4.44	0.77	19	590	2.55	0.41

表2. ICD-10 全國縣市別死亡概況

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
全 國	144,709	625.3	455.6	88,374	759.5	576.2	56,335	489.7	339.9
新北市	18,311	471.3	413.3	11,465	593.5	524.4	6,846	350.4	308.4
臺北市	15,047	575.8	338.8	8,882	704.1	421.3	6,165	456.1	265.6
臺中市	14,220	538.2	466.4	8,703	660.7	582.5	5,517	416.4	356.2
臺南市	13,164	702.2	484.3	7,788	824.1	610.2	5,376	578.4	365.4
高雄市	17,883	645.1	496.2	11,072	795.4	620.3	6,811	493.5	376.4
宜蘭縣	3,328	721.8	467.8	2,029	862.7	601.2	1,299	575.1	337.8
桃園縣	10,135	509.2	440.0	6,565	653.8	545.7	3,570	362.0	332.7
新竹縣	3,385	661.2	488.3	2,072	785.8	609.5	1,313	528.9	361.8
苗栗縣	4,270	760.7	479.8	2,553	875.2	605.2	1,717	636.7	349.2
彰化縣	8,866	676.9	463.7	5,340	793.8	615.0	3,526	553.4	320.6
南投縣	4,247	803.4	508.1	2,571	944.1	650.7	1,676	653.8	362.9
雲林縣	6,228	864.7	516.7	3,735	992.5	687.5	2,493	724.9	349.5
嘉義縣	4,959	909.1	511.1	2,978	1046.2	670.9	1,981	759.5	352.2
屏東縣	7,374	839.8	571.5	4,481	991.7	714.0	2,893	678.7	425.6
臺東縣	2,268	979.3	647.3	1,423	1172.9	806.9	845	766.4	480.8
花蓮縣	3,101	912.4	601.8	1,977	1127.3	762.1	1,124	683.2	441.0
澎湖縣	848	878.2	485.8	512	1031.6	629.5	336	716.0	347.5
基隆市	2,639	683.3	484.1	1,595	819.0	605.4	1,044	545.2	370.1
新竹市	2,167	524.1	406.1	1,314	639.6	505.6	853	410.0	314.0
嘉義市	1,746	639.3	468.6	1,012	752.4	587.2	734	529.5	360.0
金門縣	475	496.9	316.2	279	567.4	400.7	196	422.3	229.8
連江縣	48	483.3	317.8	28	487.3	392.1	20	477.9	241.3

資料來源：行政院衛生署。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3·ICD-10 臺北市主要死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分 比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人 口 死亡率	死 亡 百分 比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人 口 死亡率	死 亡 百分 比
	所有死亡原因	15,047	575.83	100.00	所有死亡原因	8,882	704.08	100.00	所有死亡原因	6,165	456.13	100.00
1	惡性腫瘤	4,632	177.26	30.78	惡性腫瘤	2,771	219.66	31.20	惡性腫瘤	1,861	137.69	30.19
2	心臟疾病(高血壓性疾病除 外)	1,723	65.94	11.45	心臟疾病(高血壓性疾病除 外)	1,039	82.36	11.70	心臟疾病(高血壓性疾病除 外)	684	50.61	11.09
3	腦血管疾病	1,047	40.07	6.96	腦血管疾病	602	47.72	6.78	腦血管疾病	445	32.92	7.22
4	肺炎	899	34.40	5.97	肺炎	548	43.44	6.17	糖尿病	385	28.48	6.24
5	糖尿病	769	29.43	5.11	糖尿病	384	30.44	4.32	肺炎	351	25.97	5.69
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	474	18.14	3.15	慢性下呼吸道疾病	335	26.56	3.77	腎炎、腎病徵候群及腎病變	240	17.76	3.89
7	慢性下呼吸道疾病	465	17.79	3.09	事故傷害	258	20.45	2.90	敗血症	219	16.20	3.55
8	敗血症	449	17.18	2.98	腎炎、腎病徵候群及腎病變	234	18.55	2.63	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	210	15.54	3.41
9	高血壓性疾病	422	16.15	2.80	高血壓性疾病	231	18.31	2.60	高血壓性疾病	191	14.13	3.10
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	380	14.54	2.53	敗血症	230	18.23	2.59	慢性下呼吸道疾病	130	9.62	2.11
	其他	3,787	144.92	25.17	其他	2,250	178.36	25.33	其他	1,449	107.21	23.50
11	事故傷害	359	13.74	2.39	蓄意自我傷害(自殺)	212	16.81	2.39	慢性肝病及肝硬化	120	8.88	1.95
12	蓄意自我傷害(自殺)	329	12.59	2.19	慢性肝病及肝硬化	198	15.70	2.23	蓄意自我傷害(自殺)	117	8.66	1.90
13	慢性肝病及肝硬化	318	12.17	2.11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	170	13.48	1.91	事故傷害	101	7.47	1.64
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤 除外)	120	4.59	0.80	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤 除外)	75	5.95	0.84	血管性及未明示之癱瘓症	61	4.51	0.99
15	血管性及未明示之癱瘓症	116	4.44	0.77	主動脈瘤及剝離	70	5.55	0.79	帕金森病	47	3.48	0.76

附註：臺北市年中人口數為2,613,100人，其中男性為1,261,502人，女性為1,351,598人。

表4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	15,047	575.83	71	379.01	45	12.16	82	26.18	682	84.38	2,874	371.91	4,371	1,826.40	6,922	7,620.20
1	C00-C97	惡性腫瘤	4,632	177.26	-	-	13	3.51	18	5.75	221	27.34	1,342	173.66	1,587	663.12	1,451	1,597.36
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,723	65.94	1	5.34	4	1.08	3	0.96	65	8.04	291	37.66	455	190.12	904	995.18
3	I60-I69	腦血管疾病	1,047	40.07	-	-	1	0.27	2	0.64	12	1.48	154	19.93	317	132.46	561	617.59
4	J12-J18	肺炎	899	34.40	-	-	1	0.27	-	-	3	0.37	44	5.69	211	88.17	640	704.55
5	E10-E14	糖尿病	769	29.43	-	-	-	-	1	0.32	7	0.87	121	15.66	296	123.68	344	378.70
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	474	18.14	-	-	-	-	-	-	7	0.87	69	8.93	156	65.18	242	266.41
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	465	17.79	-	-	-	-	-	-	5	0.62	26	3.36	109	45.55	325	357.78
8	A40-A41	敗血症	449	17.18	-	-	1	0.27	1	0	6	0.74	50	6.47	128	53.48	263	289.53
9	I10-I15	高血壓性 疾病	422	16.15	-	-	-	-	-	-	8	0.99	50	6.47	110	45.96	254	279.62
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	380	14.54	-	-	-	-	1	0.32	8	0.99	23	2.98	46	19.22	302	332.46
		其他	3,787	144.92	70	373.67	25	6.76	56	17.88	340	42.06	704	91.10	956	399.46	1,636	1,801.02
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	359	13.74	4	21.35	8	2.16	28	8.94	68	8.41	97	12.55	78	32.59	76	83.67
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	329	12.59	-	-	1	0.27	15	4.79	100	12.37	116	15.01	65	27.16	32	35.23
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	318	12.17	-	-	-	-	-	-	37	4.58	108	13.98	102	42.62	71	78.16
14	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	120	4.59	1	5.34	-	-	-	-	5	0.62	15	1.94	35	14.62	64	70.46
15	J66, J68-J69	血管性及未明示之癡 呆症	116	4.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	7.94	97	106.78

附註：臺北市年中人口數為2,613,100人。

表5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況

中華民國99年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	8,882	704.08	41	422.33	24	12.45	61	37.68	436	115.52	1,870	515.09	2,609	2,400.10	3,841	8,014.44
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,771	219.66	-	-	5	2.59	14	8.65	107	28.35	780	214.85	965	887.73	900	1,877.90
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,039	82.36	1	10.30	3	1.56	3	1.85	51	13.51	214	58.95	291	267.70	476	993.20
3	I60-I69	腦血管疾病	602	47.72	-	-	-	-	2	1.24	10	2.65	111	30.57	193	177.55	286	596.75
4	J12-J18	肺炎	548	43.44	-	-	1	0.52	-	-	3	0.79	34	9.37	128	117.75	382	797.06
5	E10-E14	糖尿病	384	30.44	-	-	-	-	-	-	3	0.79	89	24.51	131	120.51	161	335.93
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	335	26.56	-	-	-	-	-	-	3	0.79	19	5.23	82	75.43	231	481.99
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	258	20.45	2	20.60	4	2.07	24	14.82	53	14.04	79	21.76	50	46.00	46	95.98
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	234	18.55	-	-	-	-	-	-	4	1.06	37	10.19	81	74.51	112	233.69
9	X60-X84, Y87.0	高血壓性 疾病	231	18.31	-	-	-	-	-	-	5	1.32	36	9.92	58	53.36	132	275.42
10	A40-A41	敗血症	230	18.23	-	-	-	-	-	-	3	0.79	26	7.16	71	65.31	130	271.25
		其他	2,250	178.36	38	391.43	11	5.71	18	11.12	194	51.40	445	122.57	559	514.24	985	2,055.25
11	K70, K73-K74	蓄意自我傷害(自殺)	212	16.81	-	-	1	0.52	8	4.94	62	16.43	73	20.11	43	39.56	25	52.16
12	I10-I15	慢性肝病及肝硬化	198	15.70	-	-	-	-	-	-	31	8.21	89	24.51	50	46.00	28	58.42
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	170	13.48	-	-	-	-	-	-	2	0.53	12	3.31	25	23.00	131	273.34
14	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	75	5.95	1	10.30	-	-	-	-	3	0.79	10	2.75	25	23.00	36	75.12
15	G20-G21	主動脈瘤及剝離	70	5.55	-	-	-	-	-	-	3	0.79	16	4.41	27	24.84	24	50.08

附註：臺北市男性年中人口數為1,261,502人。

表6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況
中華民國99年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
	A00-Y98	所有死亡原因	6,165	456.13	30	332.41	21	11.85	21	13.88	246	57.10	1,004	245.04	1,762	1,348.96	3,081	7,179.89
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,861	137.69	-	-	8	4.51	4	2.64	114	26.46	562	137.16	622	476.19	551	1,284.04
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	684	50.61	-	-	1	0.56	-	-	14	3.25	77	18.79	164	125.56	428	997.40
3	I60-I69	腦血管疾病	445	32.92	-	-	1	0.56	-	-	2	0.46	43	10.49	124	94.93	275	640.85
4	E10-E14	糖尿病	385	28.48	-	-	-	-	1	0.66	4	0.93	32	7.81	165	126.32	183	426.46
5	J12-J18	肺炎	351	25.97	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.44	83	63.54	258	601.24
6	A40-A41	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	240	17.76	-	-	-	-	-	-	3	0.70	32	7.81	75	57.42	130	302.95
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	敗血症	219	16.20	-	-	1	0.56	1	0.66	3	0.70	24	5.86	57	43.64	133	309.94
8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	210	15.54	-	-	-	-	1	0.66	6	1.39	11	2.68	21	16.08	171	398.49
9	I10-I15	高血壓性 疾病	191	14.13	-	-	-	-	-	-	3	0.70	14	3.42	52	39.81	122	284.31
10	J40-J47	慢性下 呼吸道 疾病	130	9.62	-	-	-	-	-	-	2	0.46	7	1.71	27	20.67	94	219.06
		其他	1,449	107.21	30	332.41	10	5.64	14	9.26	95	22.05	192	46.86	372	284.80	736	1,715.16
11	V01-X59, Y85-Y86	慢性肝病及肝硬化	120	8.88	-	-	-	-	-	-	6	1.39	19	4.64	52	39.81	43	100.21
12	K70, K73-K74	蓄意自我傷害(自殺)	117	8.66	-	-	-	-	7	4.63	38	8.82	43	10.49	22	16.84	7	16.31
13	X60-X84, Y87.0	事故傷害	101	7.47	2	22.16	4	2.26	4	2.64	15	3.48	18	4.39	28	21.44	30	69.91
14	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	61	4.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5.36	54	125.84
15	J66, J68-J69	帕金森病	47	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.98	13	9.95	30	69.91

附註：臺北市女性年中人口數為1,351,598人。

表7·ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	71	383.16	100.00		所有死亡原因	41	426.42	100.00		所有死亡原因	30	336.51	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	41	221.26	57.75	P00-P96	源於周產期的特定病況	23	239.21	56.10	P00-P96	源於周產期的特定病況	18	201.91	60.00
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	14	75.55	19.72	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	10	104.00	24.39	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	4	44.87	13.33
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	21.59	5.63	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	20.80	4.88	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	22.43	6.67
4	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	5.40	1.41	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	10.40	2.44	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	11.22	3.33
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	5.40	1.41	G00, G03	腦膜炎	1	10.40	2.44	D50-D64	貧血	1	11.22	3.33
6	D50-D64	貧血	1	5.40	1.41	X85-Y09, Y87	加害(他殺)	1	10.40	2.44					
7	G00, G03	腦膜炎	1	5.40	1.41	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	10.40	2.44					
8	X85-Y09, Y87	加害(他殺)	1	5.40	1.41										
9	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.40	1.41										
		其他	6	32.38	8.45		其他	2	20.80	4.88		其他	4	44.87	13.33

附註：0歲出生登記數為18,530人，其中男性為9,615人，女性為8,915人。

表8·ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	71	379.01	100.00		所有死亡原因	41	422.33	100.00		所有死亡原因	30	332.41	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	41	218.87	57.75	P00-P96	源於周產期的特定病況	23	236.92	56.10	P00-P96	源於周產期的特定病況	18	199.45	60.00
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	14	74.73	19.72	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	10	103.01	24.39	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	4	44.32	13.33
3	V01-X59, Y85	事故傷害	4	21.35	5.63	V01-X59, Y85	事故傷害	2	20.60	4.88	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	22.16	6.67
4	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	5.34	1.41	I01-I02.0, I05-	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1	10.30	2.44	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	11.08	3.33
5	I01-I02.0, I05-	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1	5.34	1.41	G00, G03	腦膜炎	1	10.30	2.44	D50-D64	貧血	1	11.08	3.33
6	D50-D64	貧血	1	5.34	1.41	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	10.30	2.44					
7	G00, G03	腦膜炎	1	5.34	1.41	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	10.30	2.44					
8	X85-Y09, Y87	加害(他殺)	1	5.34	1.41										
9	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	5.34	1.41										
		其他	6	32.03	8.45		其他	2	20.60	4.88		其他	4	44.32	13.33

附註：0歲年中人口數為18,733人，其中男性為9,708人，女性為9,025人。

表9·ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	45	12.16	100.00		所有死亡原因	24	12.45	100.00		所有死亡原因	21	11.85	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	13	3.51	28.89	C00-C97	惡性腫瘤	5	2.59	20.83	C00-C97	惡性腫瘤	8	4.51	38.10
2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	2.16	17.78	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	2.07	16.67	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	2.26	19.05
3	I01-I02.0, I05-I09, I20- I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	4	1.08	8.89	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	3	1.56	12.50	I01-I02.0, I05-I09, I20- I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	1	0.56	4.76
4	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	3	0.81	6.67	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染色體異常	2	1.04	8.33	I60-I69	腦血管疾病	1	0.56	4.76
5	I60-I69	腦血管疾病	1	0.27	2.22	J12-J18	肺炎	1	0.52	4.17	A40-A41	敗血症	1	0.56	4.76
6	J12-J18	肺炎	1	0.27	2.22	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.52	4.17	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染色體異常	1	0.56	4.76
7	A40-A41	敗血症	1	0.27	2.22										
8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.27	2.22										
		其他	13	3.51	28.89		其他	8	4.15	33.33		其他	5	2.82	23.81

附註：1-14歲年中人口數為369,984人，其中男性為192,793人，女性為177,192人。

表10·ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	82	26.18	100.00		所有死亡原因	61	37.68	100.00		所有死亡原因	21	13.88	100.00
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	28	8.94	34.15	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	14.82	39.34	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	4.63	33.33
2	C00-C97	惡性腫瘤	18	5.75	21.95	C00-C97	惡性腫瘤	14	8.65	22.95	C00-C97	惡性腫瘤	4	2.64	19.05
3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	15	4.79	18.29	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	8	4.94	13.11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	2.64	19.05
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	0.96	3.66	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	1.85	4.92	E10-E14	糖尿病	1	0.66	4.76
5	I60-I69	腦血管疾病	2	0.64	2.44	I60-I69	腦血管疾病	2	1.24	3.28	A40-A41	敗血症	1	0.66	4.76
6	E10-E14	糖尿病	1	0.32	1.22	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.62	1.64	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.66	4.76
7	A40-A41	敗血症	1	0.32	1.22										
8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.32	1.22										
9	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.32	1.22										
		其他	12	3.83	14.63		其他	9	5.56	14.75		其他	3	1.98	14.29

附註：15-24歲年中人口數為313,173人，其中男性為161,906人，女性為151,268人。

表11·ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	682	84.38	100.00		所有死亡原因	436	115.52	100.00		所有死亡原因	246	57.10	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	221	27.34	32.40	C00-C97	惡性腫瘤	107	28.35	24.54	C00-C97	惡性腫瘤	114	26.46	46.34
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	100	12.37	14.66	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	62	16.43	14.22	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	38	8.82	15.45
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	68	8.41	9.97	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	53	14.04	12.16	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	15	3.48	6.10
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	65	8.04	9.53	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	51	13.51	11.70	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	14	3.25	5.69
5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	37	4.58	5.43	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	31	8.21	7.11	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	6	1.39	2.44
6	I60-I69	腦血管疾病	12	1.48	1.76	I60-I69	腦血管疾病	10	2.65	2.29	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	6	1.39	2.44
7	B20-B24	人類免疫缺乏病毒 (HIV)疾病	9	1.11	1.32	B20-B24	人類免疫缺乏病毒 (HIV)疾病	8	2.12	1.83	E10-E14	糖尿病	4	0.93	1.63
8	I10-I15	高血壓性疾病	8	0.99	1.17	I10-I15	高血壓性疾病	5	1.32	1.15	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	3	0.70	1.22
9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	8	0.99	1.17	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	4	1.06	0.92	A40-A41	敗血症	3	0.70	1.22
10	E10-E14	糖尿病	7	0.87	1.03	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	4	1.06	0.92	I10-I15	高血壓性疾病	3	0.70	1.22
		其他	147	18.19	21.55		其他	101	26.76	23.17		其他	40	9.28	16.26

附註：25-44歲年中人口數為808,277人，其中男性為377,421人，女性為430,856人。

表12·ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
		總計	2,874	371.91	100.00		總計	1,870	515.09	100.00		總計	1,004	245.04	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,342	173.66	46.69	C00-C97	惡性腫瘤	780	214.85	41.71	C00-C97	惡性腫瘤	562	137.16	55.98
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	291	37.66	10.13	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	214	58.95	11.44	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	77	18.79	7.67
3	I60-I69	腦血管疾病	154	19.93	5.36	I60-I69	腦血管疾病	111	30.57	5.94	I60-I69	腦血管疾病	43	10.49	4.28
4	E10-E14	糖尿病	121	15.66	4.21	E10-E14	糖尿病	89	24.51	4.76	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	43	10.49	4.28
5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	116	15.01	4.04	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	89	24.51	4.76	E10-E14	糖尿病	32	7.81	3.19
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	108	13.98	3.76	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	79	21.76	4.22	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	32	7.81	3.19
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	97	12.55	3.38	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	73	20.11	3.90	A40-A41	敗血症	24	5.86	2.39
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	69	8.93	2.40	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	37	10.19	1.98	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	19	4.64	1.89
9	A40-A41	敗血症	50	6.47	1.74	I10-I15	高血壓性疾病	36	9.92	1.93	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	18	4.39	1.79
10	I10-I15	高血壓性疾病	50	6.47	1.74	J12-J18	肺炎	34	9.37	1.82	I10-I15	高血壓性疾病	14	3.42	1.39
		其他	476	61.60	16.56		其他	328	90.35	17.54		其他	140	34.17	13.94

附註：45-64歲年中人口數為772,772人，其中男性為363,045人，女性為409,727人。

表13·ICD-10 臺北市老年(65-79歲)主要死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	4,371	1,826.40	100.00		所有死亡原因	2,609	2,400.10	100.00		所有死亡原因	1,762	1,348.96	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,587	663.12	36.31	C00-C97	惡性腫瘤	965	887.73	36.99	C00-C97	惡性腫瘤	622	476.19	35.30
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	455	190.12	10.41	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	291	267.70	11.15	E10-E14	糖尿病	165	126.32	9.36
3	I60-I69	腦血管疾病	317	132.46	7.25	I60-I69	腦血管疾病	193	177.55	7.40	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	164	125.56	9.31
4	E10-E14	糖尿病	296	123.68	6.77	E10-E14	糖尿病	131	120.51	5.02	I60-I69	腦血管疾病	124	94.93	7.04
5	J12-J18	肺炎	211	88.17	4.83	J12-J18	肺炎	128	117.75	4.91	J12-J18	肺炎	83	63.54	4.71
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	156	65.18	3.57	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	82	75.43	3.14	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	75	57.42	4.26
7	A40-A41	敗血症	128	53.48	2.93	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	81	74.51	3.10	A40-A41	敗血症	57	43.64	3.23
8	I10-I15	高血壓性疾病	110	45.96	2.52	A40-A41	敗血症	71	65.31	2.72	I10-I15	高血壓性疾病	52	39.81	2.95
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	109	45.55	2.49	I10-I15	高血壓性疾病	58	53.36	2.22	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	52	39.81	2.95
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	102	42.62	2.33	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	50	46.00	1.92	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	28	21.44	1.59
		其他	900	376.06	20.59		其他	559	514.24	21.43		其他	340	260.30	19.30
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	78	32.59	1.78	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	50	46.00	1.92	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	27	20.67	1.53
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	65	27.16	1.49	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	43	39.56	1.65	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	22	16.84	1.25
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	46	19.22	1.05	I71	主動脈瘤及剝離	27	24.84	1.03	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	16.08	1.19
14	I71	主動脈瘤及剝離	35	14.62	0.80	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	23.00	0.96	G20-G21	帕金森病	13	9.95	0.74
15	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	35	14.62	0.80	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	25	23.00	0.96	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	11	8.42	0.62

附註：65-79歲年中人口數為239,324人，其中男性為108,704人，女性為130,620人。

表14·ICD-10 臺北市老年(80歲以上)主要死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	6,922	7,620.20	100.00		所有死亡原因	3,841	8,014.44	100.00		所有死亡原因	3,081	7,179.89	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,451	1,597.36	20.96	C00-C97	惡性腫瘤	900	1,877.90	23.43	C00-C97	惡性腫瘤	551	1,284.04	17.88
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	904	995.18	13.06	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	476	993.20	12.39	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	428	997.40	13.89
3	J12-J18	肺炎	640	704.55	9.25	J12-J18	肺炎	382	797.06	9.95	I60-I69	腦血管疾病	275	640.85	8.93
4	I60-I69	腦血管疾病	561	617.59	8.10	I60-I69	腦血管疾病	286	596.75	7.45	J12-J18	肺炎	258	601.24	8.37
5	E10-E14	糖尿病	344	378.70	4.97	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	231	481.99	6.01	E10-E14	糖尿病	183	426.46	5.94
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	325	357.78	4.70	E10-E14	糖尿病	161	335.93	4.19	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	171	398.49	5.55
7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	302	332.46	4.36	I10-I15	高血壓性疾病	132	275.42	3.44	A40-A41	敗血症	133	309.94	4.32
8	A40-A41	敗血症	263	289.53	3.80	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	131	273.34	3.41	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	130	302.95	4.22
9	I10-I15	高血壓性疾病	254	279.62	3.67	A40-A41	敗血症	130	271.25	3.38	I10-I15	高血壓性疾病	122	284.31	3.96
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	242	266.41	3.50	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	112	233.69	2.92	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	94	219.06	3.05
		其他	1,636	1,801.02	23.63		其他	900	1,877.90	23.43		其他	736	1,715.16	23.89
11	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	97	106.78	1.40	G20-G21	帕金森病	52	108.50	1.35	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	54	125.84	1.75
12	G20-G21	帕金森病	82	90.27	1.18	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	46	95.98	1.20	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	43	100.21	1.40
13	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	76	83.67	1.10	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	43	89.72	1.12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	30	69.91	0.97
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	71	78.16	1.03	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	37	77.20	0.96	G20-G21	帕金森病	30	69.91	0.97
15	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	67	73.76	0.97	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	36	75.12	0.94	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	30	69.91	0.97

附註：80歲以上年中人口數為90,838人，其中男性為47,926人，女性為42,912人。

表15·ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
總計	359	13.74	154	5.89	83	3.18	16	0.61	26	0.99	6	0.23	20	0.77	54	2.07
0歲	4	21.35	-	-	1	5.34	-	-	2	10.68	1	5.34	-	-	-	-
1-14歲	8	2.16	3	0.81	-	-	1	0.27	1	0.27	1	0.27	1	0.27	1	0.27
15-24歲	28	8.94	22	7.02	-	-	2	0.64	2	0.64	1	0.32	1	0.32	-	-
25-44歲	68	8.41	33	4.08	8	0.99	6	0.74	5	0.62	1	0.12	9	1.11	6	0.74
45-64歲	97	12.55	41	5.31	23	2.98	3	0.39	4	0.52	1	0.13	8	1.04	17	2.20
65-79歲	78	32.59	36	15.04	28	11.70	2	0.84	4	1.67	-	-	1	0.42	7	2.92
80歲以上	76	83.67	19	20.92	23	25.32	2	2.20	8	8.81	1	1.10	-	-	23	25.32

附註：臺北市年中人口數為2,613,100人。

表16·ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	258	20.45	113	8.96	64	5.07	11	0.87	18	1.43	3	0.24	14	1.11	35	2.77
0歲	2	20.60	-	-	1	10	-	-	1	10.30	-	-	-	-	-	-
1-14歲	4	2.07	2	1.04	-	-	-	-	-	-	1	0.52	-	-	1	1
15-24歲	24	14.82	21	12.97	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-
25-44歲	53	14.04	25	6.62	8	2.12	4	1.06	5	1.32	-	-	5	1.32	6	1.59
45-64歲	79	21.76	33	9.09	20	5.51	3	0.83	1	0.28	1	0.28	7	1.93	14	3.86
65-79歲	50	46.00	22	20.24	18	16.56	2	1.84	3	2.76	-	-	1	0.92	4	3.68
80歲以上	46	95.98	10	20.87	17	35.47	2	4	6	12.52	1	2.09	-	-	10	20.87

附註：臺北市男性年中人口數為1,261,502人。

表17· ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	101	7.47	41	3.03	19	1.41	5	0.37	8	0.59	3	0.22	6	0.44	19	1.41
0歲	2	22.16	-	-	-	-	-	-	1	11.08	1	11.08	-	-	-	-
1-14歲	4	2.26	1	0.56	-	-	1	0.56	1	0.56	-	-	1	0.56	-	-
15-24歲	4	2.64	1	0.66	-	-	2	1.32	-	-	1	0.66	-	-	-	-
25-44歲	15	3.48	8	1.86	-	-	2	0.46	-	-	1	0.23	4	0.93	-	-
45-64歲	18	4.39	8	1.95	3	0.73	-	-	3	0.73	-	-	1	0.24	3	0.73
65-79歲	28	21.44	14	10.72	10	7.66	-	-	1	0.77	-	-	-	-	3	2.30
80歲以上	30	69.91	9	20.97	6	13.98	-	-	2	4.66	-	-	-	-	13	30.29

附註：臺北市女性年中人口數為1,351,598人。

表18·ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		運輸事故傷害的後遺症	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V60-V69		V80-V89		Y85	
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
合計	154	5.89	18	0.69	10	0.38	25	0.96	1	0.04	1	0.04	1	0.04	97	3.71	1	0.04
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	3	0.81	1	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.54	-	-
15-24歲	22	7.02	-	-	-	-	9	2.87	-	-	-	-	1	0.32	12	3.83	-	-
25-44歲	33	4.08	2	0.25	1	0.12	7	0.87	-	-	-	-	-	-	23	2.85	-	-
45-64歲	41	5.31	-	-	5	0.65	7	0.91	1	0.13	1	0.13	-	-	27	3.49	-	-
65-79歲	36	15.04	10	4.18	2	0.84	2	0.84	-	-	-	-	-	-	21	8.77	1	0.42
80歲以上	19	20.92	5	5.50	2	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13.21	-	-

附註：臺北市年中人口數為2,613,100人。

表19·ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		運輸事故傷害的後遺症	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V60-V69		V80-V89		Y85	
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
合計	113	8.96	12	0.95	9	0.71	21	1.66	-	-	1	0.08	1	0.08	68	5.39	1	0.08
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	2	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.04	-	-
15-24歲	21	12.97	-	-	-	-	9	5.56	-	-	-	-	1	0.62	11	6.79	-	-
25-44歲	25	6.62	2	0.53	1	0.26	4	1.06	-	-	-	-	-	-	18	4.77	-	-
45-64歲	33	9.09	-	-	4	1.10	6	1.65	-	-	1	0.28	-	-	22	6.06	-	-
65-79歲	22	20.24	7	6.44	2	1.84	2	1.84	-	-	-	-	-	-	10	9.20	1	0.92
80歲以上	10	20.87	3	6.26	2	4.17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10.43	-	-

附註：臺北市男性年中人口數為1,261,502人。

表20·ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		運輸事故傷害的後遺症	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V60-V69		V80-V89		Y85	
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
合計	41	3.03	6	0.44	1	0.07	4	0.30	1	0.07	-	-	-	-	29	2.15	-	-
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	1	0.56	1	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	1	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.66	-	-
25-44歲	8	1.86	-	-	-	-	3	0.70	-	-	-	-	-	-	5	1.16	-	-
45-64歲	8	1.95	-	-	1	0.24	1	0.24	1	0.24	-	-	-	-	5	1.22	-	-
65-79歲	14	10.72	3	2.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8.42	-	-
80歲以上	9	20.97	2	4.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16.31	-	-

附註：臺北市女性年中人口數為1,351,598人。

表21·ICD-10 臺北市自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	329	12.59	-	-	1	0.27	15	4.79	100	12.37	116	15.01	65	27.16	32	35.23		
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	0.19	-	-	-	-	-	-	2	0.25	1	0.13	1	0.42	1	1.10		
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.10	
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	100	3.83	-	-	-	-	7	2.24	52	6.43	33	4.27	8	3.34	-	-		
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	9	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.39	5	2.09	1	1.10		
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	1	0.42	-	-		
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	113	4.32	-	-	1	0.27	4	1.28	22	2.72	40	5.18	25	10.45	21	23.12		
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	24	0.92	-	-	-	-	1	0.32	3	0.37	10	1.29	8	3.34	2	2.20		
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	4	0.15	-	-	-	-	-	-	2	0.25	2	0.26	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	-	-	-	-	-	-	2	0.25	5	0.65	2	0.84	1	1.10		
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	55	2.10	-	-	-	-	3	0.96	15	1.86	19	2.46	13	5.43	5	5.50		
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	4	0.15	-	-	-	-	-	-	1	0.12	2	0.26	1	0.42	-	-		
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.42	-	-		

附註：臺北市年中人口數為2,613,100人。

表22· ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	212	16.81	-	-	1	0.52	8	4.94	62	16.43	73	20.11	43	39.56	25	52.16		
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.16	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-	1	2.09		
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	70	5.55	-	-	-	-	4	2.47	34	9.01	24	6.61	8	7.36	-	-		
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.55	4	3.68	1	2.09		
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.28	-	-	-	-		
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	80	6.34	-	-	1	0.52	2	1.24	17	4.50	26	7.16	16	14.72	18	37.56		
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	1.03	-	-	-	-	-	-	2	0.53	6	1.65	4	3.68	1	2.09		
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	7	0.55	-	-	-	-	-	-	1	0.26	4	1.10	1	0.92	1	2.09		
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	26	2.06	-	-	-	-	2	1.24	5	1.32	8	2.20	8	7.36	3	6.26		
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	3	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.55	1	0.92	-	-		
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.92	-	-		

附註：臺北市男性年中人口數為1,261,502人。

表23·ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	117	8.66	-	-	-	-	7	4.63	38	8.82	43	10.49	22	16.84	7	16.31		
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	-	-	-	-	-	-	1	0.23	1	0.24	1	0.77	-	-		
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.33		
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	30	2.22	-	-	-	-	3	1.98	18	4.18	9	2.20	-	-	-	-		
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.24	1	0.77	-	-		
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.77	-	-		
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	33	2.44	-	-	-	-	2	1.32	5	1.16	14	3.42	9	6.89	3	6.99		
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	11	0.81	-	-	-	-	1	0.66	1	0.23	4	0.98	4	3.06	1	2.33		
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	3	0.22	-	-	-	-	-	-	1	0.23	2	0.49	-	-	-	-		
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	3	0.22	-	-	-	-	-	-	1	0.23	1	0.24	1	0.77	-	-		
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	29	2.15	-	-	-	-	1	0.66	10	2.32	11	2.68	5	3.83	2	4.66		
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-	-	-		
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

附註：臺北市女性年中人口數為1,351,598人。

表24·ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	4,632	177.26	100.00	所有癌症死亡原因	2,771	219.66	100.00	所有癌症死亡原因	1,861	137.69	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	990	37.89	21.37	氣管、支氣管和肺癌	617	48.91	22.27	氣管、支氣管和肺癌	373	27.60	20.04
2	肝和肝內膽管癌	644	24.65	13.90	肝和肝內膽管癌	443	35.12	15.99	女性乳房癌	266	19.68	14.29
3	結腸、直腸和肛門癌	570	21.81	12.31	結腸、直腸和肛門癌	331	26.24	11.95	結腸、直腸和肛門癌	239	17.68	12.84
4	女性乳房癌(1)	266	19.68	5.74	胃癌	197	15.62	7.11	肝和肝內膽管癌	201	14.87	10.80
5	胃癌	307	11.75	6.63	前列腺(攝護腺)癌	144	11.41	5.20	胃癌	110	8.14	5.91
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	144	11.41	3.11	口腔癌	139	11.02	5.02	胰臟癌	85	6.29	4.57
7	胰臟癌	211	8.07	4.56	胰臟癌	126	9.99	4.55	子宮頸及部位未明示子宮癌	71	5.25	3.82
8	非何杰金氏淋巴瘤	152	5.82	3.28	食道癌	115	9.12	4.15	卵巢癌	66	4.88	3.55
9	口腔癌	151	5.78	3.26	非何杰金氏淋巴瘤	102	8.09	3.68	非何杰金氏淋巴瘤	50	3.70	2.69
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	71	5.25	1.53	白血病	65	5.15	2.35	白血病	42	3.11	2.26
	其他	1,126	43.09	24.31	其他	492	39.00	17.76	其他	358	26.49	19.24
11	食道癌	137	5.24	2.96	膀胱癌	63	4.99	2.27	膀胱癌	32	2.37	1.72
12	卵巢癌(1)	66	4.88	1.42	鼻咽癌	56	4.44	2.02	子宮體癌	29	2.15	1.56
13	白血病	107	4.09	2.31	腦癌	41	3.25	1.48	腦癌	28	2.07	1.50
14	膀胱癌	95	3.64	2.05	腎臟癌	39	3.09	1.41	腎臟癌	25	1.85	1.34
15	腦癌	69	2.64	1.49	膽囊和其他膽道癌	30	2.38	1.08	膽囊和其他膽道癌	22	1.63	1.18
									食道癌	22	1.63	1.18

附註：1.臺北市年中人口數為2,613,100人，其中男性1,261,502人，女性1,351,598人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表25·ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	4,632	177.26	-	-	13	3.51	18	5.75	221	27.34	1,342	173.66	1,587	663.12	1,451	1,597.36
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	990	37.89	-	-	-	-	-	-	24	2.97	238	30.80	366	152.93	362	398.51
2	C22	肝和肝內膽管癌	644	24.65	-	-	-	-	-	-	27	3.34	200	25.88	272	113.65	145	159.63
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	570	21.81	-	-	-	-	2	0.64	20	2.47	156	20.19	193	80.64	199	219.07
4	C50	女性乳房癌(1)	266	19.68	-	-	-	-	-	-	35	8.12	134	32.70	61	46.70	36	83.89
5	C16	胃癌	307	11.75	-	-	-	-	-	-	11	1.36	71	9.19	79	33.01	146	160.73
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	144	11.41	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.10	52	47.84	88	183.62
7	C25	胰臟癌	211	8.07	-	-	-	-	-	-	3	0.37	55	7.12	89	37.19	64	70.46
8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	152	5.82	-	-	-	-	-	-	6	0.74	32	4.14	50	20.89	64	70.46
9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	151	5.78	-	-	-	-	-	-	21	2.60	83	10.74	28	11.70	19	20.92
10	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	71	5.25	-	-	-	-	-	-	6	1.39	32	7.81	22	16.84	11	25.63
		其他	1,126	43.09	-	-	13	3.51	16	5.11	68	8.41	337	43.61	375	156.69	317	348.97
11	C15	食道癌	137	5.24	-	-	-	-	-	-	7	0.87	68	8.80	42	17.55	20	22.02
12	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	66	4.88	-	-	-	-	-	-	6	1.39	37	9.03	13	9.95	10	23.30
13	C91-C95	白血病	107	4.09	-	-	3	0.81	4	1.28	6	0.74	23	2.98	34	14.21	37	40.73
14	C67	膀胱癌	95	3.64	-	-	-	-	1	0.32	2	0.25	11	1.42	28	11.70	53	58.35
15	C71	腦癌	69	2.64	-	-	4	1.08	7	2.24	7	0.87	21	2.72	14	5.85	16	17.61

附註：1.臺北市年中人口數為2,613,100人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表26·ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國99年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,771	219.66	-	-	5	2.59	14	8.65	107	28.35	780	214.85	965	887.73	900	1,877.90		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	617	48.91	-	-	-	-	-	-	10	2.65	139	38.29	246	226.30	222	463.21		
2	C22	肝和肝內膽管癌	443	35.12	-	-	-	-	-	-	19	5.03	167	46.00	169	155.47	88	183.62		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	331	26.24	-	-	-	-	1	0.62	9	2.38	88	24.24	121	111.31	112	233.69		
4	C16	胃癌	197	15.62	-	-	-	-	-	-	5	1.32	41	11.29	57	52.44	94	196.14		
5	C61	前列腺(攝護腺)癌	144	11.41	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.10	52	47.84	88	183.62		
6	C00-C06, C09-C10.	口腔癌	139	11.02	-	-	-	-	-	-	19	5.03	79	21.76	26	23.92	15	31.30		
7	C25	胰臟癌	126	9.99	-	-	-	-	-	-	3	0.79	31	8.54	52	47.84	40	83.46		
8	C15	食道癌	115	9.12	-	-	-	-	-	-	6	1.59	60	16.53	33	30.36	16	33.38		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	102	8.09	-	-	-	-	-	-	3	0.79	23	6.34	29	26.68	47	98.07		
10	C91-C95	白血病	65	5.15	-	-	1	0.52	4	2.47	3	0.79	14	3.86	18	16.56	25	52.16		
		其他	492	39.00	-	-	4	2.07	9	5.56	30	7.95	134	36.91	162	149.03	153	319.24		
11	C67	膀胱癌	63	4.99	-	-	-	-	1	0.62	2	0.53	7	1.93	16	14.72	37	77.20		
12	C11	鼻咽癌	56	4.44	-	-	-	-	-	-	4	1.06	34	9.37	10	9.20	8	16.69		
13	C71	腦癌	41	3.25	-	-	1	0.52	5	3.09	4	1.06	10	2.75	7	6.44	14	29.21		
14	C64	腎臟癌	39	3.09	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4.68	12	11.04	10	20.87		
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	30	2.38	-	-	-	-	-	-	1	0.26	6	1.65	17	15.64	6	12.52		

附註：臺北市男性年中人口數為1,261,502人。

表27·ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國99年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	1,861	137.69	-	-	8	4.51	4	2.64	114	26.46	562	137.16	622	476.19	551	1,284.04		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	373	27.60	-	-	-	-	-	-	14	3.25	99	24.16	120	91.87	140	326.25		
2	C50	女性乳房癌	266	19.68	-	-	-	-	-	-	35	8.12	134	32.70	61	46.70	36	83.89		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	239	17.68	-	-	-	-	1	0.66	11	2.55	68	16.60	72	55.12	87	202.74		
4	C22	肝和肝內膽管癌	201	14.87	-	-	-	-	-	-	8	1.86	33	8.05	103	78.85	57	132.83		
5	C16	胃癌	110	8.14	-	-	-	-	-	-	6	1.39	30	7.32	22	16.84	52	121.18		
6	C25	胰臟癌	85	6.29	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5.86	37	28.33	24	55.93		
7	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	71	5.25	-	-	-	-	-	-	6	1.39	32	7.81	22	16.84	11	25.63		
8	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	66	4.88	-	-	-	-	-	-	6	1.39	37	9.03	13	9.95	10	23.30		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	50	3.70	-	-	-	-	-	-	3	0.70	9	2.20	21	16.08	17	39.62		
10	C91-C95	白血病	42	3.11	-	-	2	1.13	-	-	3	0.70	9	2.20	16	12.25	12	27.96		
		其他	358	26.49	-	-	6	3.39	3	1.98	22	5.11	87	21.23	135	103.35	105	244.69		
11	C67	膀胱癌	32	2.37	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.98	12	9.19	16	37.29		
12	C54	子宮體癌	29	2.15	-	-	-	-	-	-	4	1	13	3.17	10	7.66	2	4.66		
13	C71	腦癌	28	2.07	-	-	3	1.69	2	1.32	3	0.70	11	2.68	7	5.36	2	4.66		
14	C64	腎臟癌	25	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.22	10	7.66	10	23.30		
15	C23-24	膽囊和其他膽道癌	22	1.63	-	-	-	-	-	-	1	0.23	5	1.22	11	8.42	5	11.65		
	C15	食道癌	22	1.63	-	-	-	-	-	-	1	0.23	8	1.95	9	6.89	4	9.32		

附註：臺北市女性年中人口數為1,351,598人。

參、99 年死因統計

二、行政區別死因統計

表28-1 · ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	總計	1,085	521.10	100.00	所有死亡原因	620	627.63	100.00	所有死亡原因	465	424.93	100.00
1	惡性腫瘤	352	169.06	32.44	惡性腫瘤	188	190.31	30.32	惡性腫瘤	164	149.87	35.27
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	145	69.64	13.36	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	89	90.10	14.35	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	56	51.17	12.04
3	腦血管疾病	70	33.62	6.45	腦血管疾病	40	40.49	6.45	糖尿病	33	30.16	7.10
4	糖尿病	59	28.34	5.44	肺炎	30	30.37	4.84	腦血管疾病	30	27.41	6.45
5	肺炎	56	26.90	5.16	糖尿病	26	26.32	4.19	肺炎	26	23.76	5.59
6	慢性下呼吸道疾病	32	15.37	2.95	慢性下呼吸道疾病	26	26.32	4.19	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	12.79	3.01
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	30	14.41	2.76	事故傷害	19	19.23	3.06	蓄意自我傷害(自殺)	12	10.97	2.58
8	敗血症	28	13.45	2.58	腎炎、腎病徵候群及腎病變	19	19.23	3.06	腎炎、腎病徵候群及腎病變	11	10.05	2.37
9	高血壓性疾病	28	13.45	2.58	敗血症	18	18.22	2.90	高血壓性疾病	11	10.05	2.37
10	蓄意自我傷害(自殺)	25	12.01	2.30	高血壓性疾病	17	17.21	2.74	敗血症	10	9.14	2.15
	其他	260	124.87	23.96	其他	148	149.82	23.87	其他	98	89.55	21.08
11	事故傷害	24	11.53	2.21	蓄意自我傷害(自殺)	13	13.16	2.10	慢性肝病及肝硬化	6	5.48	1.29
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	24	11.53	2.21	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	10.12	1.61	血管性及未明示之癡呆症	6	5.48	1.29
13	慢性肝病及肝硬化	12	5.76	1.11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	7.09	1.13	慢性下呼吸道疾病	6	5.48	1.29
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	4.80	0.92	主動脈瘤及剝離	6	6.07	0.97	事故傷害	5	4.57	1.08
15	血管性及未明示之癡呆症	8	3.84	0.74	慢性肝病及肝硬化	6	6.07	0.97	帕金森病	4	3.66	0.86

表28-2 · ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,336	593.18	100.00	所有死亡原因	811	746.36	100.00	所有死亡原因	525	450.38	100.00
1	惡性腫瘤	424	188.25	31.74	惡性腫瘤	265	243.88	32.68	惡性腫瘤	159	136.40	30.29
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	143	63.49	10.70	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	85	78.23	10.48	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	58	49.76	11.05
3	肺炎	93	41.29	6.96	肺炎	65	59.82	8.01	腦血管疾病	37	31.74	7.05
4	腦血管疾病	82	36.41	6.14	腦血管疾病	45	41.41	5.55	糖尿病	28	24.02	5.33
5	糖尿病	56	24.86	4.19	糖尿病	28	25.77	3.45	肺炎	28	24.02	5.33
6	腎炎、腎病徵候群及腎病變	45	19.98	3.37	慢性下呼吸道疾病	27	24.85	3.33	腎炎、腎病徵候群及腎病變	19	16.30	3.62
7	慢性下呼吸道疾病	42	18.65	3.14	腎炎、腎病徵候群及腎病變	26	23.93	3.21	敗血症	19	16.30	3.62
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	38	16.87	2.84	事故傷害	24	22.09	2.96	慢性肝病及肝硬化	18	15.44	3.43
9	敗血症	36	15.98	2.69	高血壓性疾病	24	22.09	2.96	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	13.73	3.05
10	事故傷害	35	15.54	2.62	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	22	20.25	2.71	慢性下呼吸道疾病	15	12.87	2.86
	其他	342	151.85	25.60	其他	200	184.06	24.66	其他	128	109.81	24.38
11	慢性肝病及肝硬化	33	14.65	2.47	蓄意自我傷害(自殺)	17	15.65	2.10	事故傷害	11	9.44	2.10
12	高血壓性疾病	32	14.21	2.40	敗血症	17	15.65	2.10	高血壓性疾病	8	6.86	1.52
13	蓄意自我傷害(自殺)	23	10.21	1.72	慢性肝病及肝硬化	15	13.80	1.85	蓄意自我傷害(自殺)	6	5.15	1.14
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	15	6.66	1.12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	13	11.96	1.60	帕金森病	6	5.15	1.14
15	帕金森病	13	5.77	0.97	主動脈瘤及剝離	9	8.28	1.11	血管性及未明示之癱瘓症	6	5.15	1.14

表28-3 · ICD-10 臺北市大安區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,779	570.95	100.00	所有死亡原因	978	666.27	100.00	所有死亡原因	801	486.04	100.00
1	惡性腫瘤	572	183.58	32.15	惡性腫瘤	314	213.91	32.11	惡性腫瘤	258	156.55	32.21
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	213	68.36	11.97	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	128	87.20	13.09	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	85	51.58	10.61
3	腦血管疾病	129	41.40	7.25	腦血管疾病	65	44.28	6.65	腦血管疾病	64	38.83	7.99
4	肺炎	108	34.66	6.07	肺炎	60	40.88	6.13	肺炎	48	29.13	5.99
5	糖尿病	78	25.03	4.38	糖尿病	39	26.57	3.99	糖尿病	39	23.66	4.87
6	敗血症	57	18.29	3.20	慢性下呼吸道疾病	30	20.44	3.07	敗血症	30	18.20	3.75
7	慢性下呼吸道疾病	48	15.40	2.70	事故傷害	27	18.39	2.76	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	26	15.78	3.25
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	46	14.76	2.59	敗血症	27	18.39	2.76	腎炎、腎病徵候群及腎病變	24	14.56	3.00
9	腎炎、腎病徵候群及腎病變	45	14.44	2.53	高血壓性疾病	23	15.67	2.35	高血壓性疾病	22	13.35	2.75
10	高血壓性疾病	45	14.44	2.53	腎炎、腎病徵候群及腎病變	21	14.31	2.15	蓄意自我傷害(自殺)	18	10.92	2.25
	其他	438	140.57	24.62	其他	244	166.23	24.95	其他	187	113.47	23.35
11	事故傷害	43	13.80	2.42	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20	13.63	2.04	慢性下呼吸道疾病	18	10.92	2.25
12	蓄意自我傷害(自殺)	37	11.87	2.08	蓄意自我傷害(自殺)	19	12.94	1.94	事故傷害	16	9.71	2.00
13	慢性肝病及肝硬化	31	9.95	1.74	慢性肝病及肝硬化	18	12.26	1.84	慢性肝病及肝硬化	13	7.89	1.62
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)(1)	13	4.17	0.73	帕金森病	9	6.13	0.92	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	3.03	0.62
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)(1)	13	4.17	0.73	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)(2)	8	5.45	0.82	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	5	3.03	0.62

附註：(1)合計：帕金森病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為13人、4.17。

(2)男性：肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、5.45。

表28-4·ICD-10 臺北市中山區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,261	575.31	100.00	所有死亡原因	741	717.22	100.00	所有死亡原因	520	448.78	100.00
1	惡性腫瘤	402	183.41	31.88	惡性腫瘤	240	232.30	32.39	惡性腫瘤	162	139.81	31.15
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	145	66.15	11.50	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	91	88.08	12.28	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	54	46.60	10.38
3	腦血管疾病	89	40.60	7.06	腦血管疾病	59	57.11	7.96	糖尿病	34	29.34	6.54
4	肺炎	73	33.31	5.79	肺炎	42	40.65	5.67	肺炎	31	26.75	5.96
5	糖尿病	63	28.74	5.00	糖尿病	29	28.07	3.91	腦血管疾病	30	25.89	5.77
6	腎炎、腎病徵候群及腎病變	46	20.99	3.65	蓄意自我傷害(自殺)	23	22.26	3.10	腎炎、腎病徵候群及腎病變	24	20.71	4.62
7	敗血症	42	19.16	3.33	腎炎、腎病徵候群及腎病變	22	21.29	2.97	敗血症	23	19.85	4.42
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	36	16.42	2.85	慢性下呼吸道疾病	22	21.29	2.97	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	14.67	3.27
9	蓄意自我傷害(自殺)	34	15.51	2.70	事故傷害	21	20.33	2.83	事故傷害	13	11.22	2.50
10	事故傷害	34	15.51	2.70	敗血症	19	18.39	2.56	高血壓性疾病	13	11.22	2.50
	其他	297	135.50	23.55	其他	173	167.45	23.35	其他	119	102.70	22.88
11	慢性下呼吸道疾病	31	14.14	2.46	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19	18.39	2.56	蓄意自我傷害(自殺)	11	9.49	2.12
12	高血壓性疾病	30	13.69	2.38	高血壓性疾病	17	16.45	2.29	慢性肝病及肝硬化	11	9.49	2.12
13	慢性肝病及肝硬化	23	10.49	1.82	慢性肝病及肝硬化	12	11.61	1.62	慢性下呼吸道疾病	9	7.77	1.73
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	14	6.39	1.11	主動脈瘤及剝離	11	10.65	1.48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	5.18	1.15
15	主動脈瘤及剝離	13	5.93	1.03	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	7.74	1.08	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	6	5.18	1.15

表28-5·ICD-10 臺北市中正區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	885	556.10	100.00	所有死亡原因	533	693.55	100.00	所有死亡原因	352	427.74	100.00
1	惡性腫瘤	278	174.68	31.41	惡性腫瘤	165	214.70	30.96	惡性腫瘤	113	137.31	32.10
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	103	64.72	11.64	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	62	80.68	11.63	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	49.82	11.65
3	腦血管疾病	56	35.19	6.33	腦血管疾病	37	48.15	6.94	高血壓性疾病	20	24.30	5.68
4	肺炎	51	32.05	5.76	肺炎	33	42.94	6.19	腦血管疾病	19	23.09	5.40
5	高血壓性疾病	41	25.76	4.63	敗血症	23	29.93	4.32	肺炎	18	21.87	5.11
6	敗血症	36	22.62	4.07	高血壓性疾病	21	27.33	3.94	敗血症	13	15.80	3.69
7	糖尿病	32	20.11	3.62	糖尿病	19	24.72	3.56	糖尿病	13	15.80	3.69
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	15.71	2.82	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	20.82	3.00	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	10.94	2.56
9	慢性下呼吸道疾病	21	13.20	2.37	慢性下呼吸道疾病	16	20.82	3.00	蓄意自我傷害(自殺)	8	9.72	2.27
10	腎炎、腎病徵候群及腎病變	18	11.31	2.03	慢性肝病及肝硬化	12	15.61	2.25	腎炎、腎病徵候群及腎病變	7	8.51	1.99
	其他	224	140.75	25.31	其他	129	167.86	24.20	其他	91	110.58	25.85
11	蓄意自我傷害(自殺)	16	10.05	1.81	腎炎、腎病徵候群及腎病變	11	14.31	2.06	事故傷害	6	7.29	1.70
12	慢性肝病及肝硬化	16	10.05	1.81	事故傷害	9	11.71	1.69	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	6.08	1.42
13	事故傷害	15	9.43	1.69	蓄意自我傷害(自殺)	8	10.41	1.50	慢性下呼吸道疾病	5	6.08	1.42
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	12	7.54	1.36	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	9.11	1.31	慢性肝病及肝硬化	4	4.86	1.14
15	帕金森病	9	5.66	1.02	帕金森病	6	7.81	1.13	血管性及未明示之癱瘓症	4	4.86	1.14

表28-6·ICD-10 臺北市大同區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	806	650.00	100.00	所有死亡原因	476	778.06	100.00	所有死亡原因	330	525.29	100.00
1	惡性腫瘤	255	205.65	31.64	惡性腫瘤	165	269.71	34.66	惡性腫瘤	90	143.26	27.27
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	83	66.94	10.30	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	51	83.36	10.71	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	50.94	9.70
3	腦血管疾病	58	46.77	7.20	腦血管疾病	31	50.67	6.51	腦血管疾病	27	42.98	8.18
4	肺炎	49	39.52	6.08	肺炎	28	45.77	5.88	糖尿病	22	35.02	6.67
5	糖尿病	43	34.68	5.33	糖尿病	21	34.33	4.41	肺炎	21	33.43	6.36
6	敗血症	32	25.81	3.97	敗血症	17	27.79	3.57	腎炎、腎病徵候群及腎病變	16	25.47	4.85
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	28	22.58	3.47	慢性下呼吸道疾病	17	27.79	3.57	敗血症	15	23.88	4.55
8	慢性下呼吸道疾病	23	18.55	2.85	蓄意自我傷害(自殺)	15	24.52	3.15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	17.51	3.33
9	蓄意自我傷害(自殺)	20	16.13	2.48	事故傷害	14	22.88	2.94	慢性肝病及肝硬化	8	12.73	2.42
10	事故傷害	17	13.71	2.11	腎炎、腎病徵候群及腎病變	12	19.62	2.52	高血壓性疾病	8	12.73	2.42
	其他	198	159.68	24.57	其他	105	171.63	22.06	其他	80	127.34	24.24
11	慢性肝病及肝硬化	16	12.90	1.99	慢性肝病及肝硬化	8	13.08	1.68	慢性下呼吸道疾病	6	9.55	1.82
12	高血壓性疾病	15	12.10	1.86	高血壓性疾病	7	11.44	1.47	蓄意自我傷害(自殺)	5	7.96	1.52
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	12.10	1.86	主動脈瘤及剝離	4	6.54	0.84	主動脈瘤及剝離	4	6.37	1.21
14	主動脈瘤及剝離	8	6.45	0.99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	6.54	0.84	帕金森病	4	6.37	1.21
15	帕金森病	8	6.45	0.99	帕金森病	4	6.54	0.84	事故傷害(1)	3	4.78	0.91

附註：(1)女性：衰老／老邁之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、4.78。

表28-7·ICD-10 臺北市萬華區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,525	807.87	100.00	所有死亡原因	947	1,004.20	100.00	所有死亡原因	578	611.87	100.00
1	惡性腫瘤	446	236.27	29.25	惡性腫瘤	276	292.67	29.14	惡性腫瘤	170	179.96	29.41
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	167	88.47	10.95	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	101	107.10	10.67	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	66	69.87	11.42
3	腦血管疾病	114	60.39	7.48	腦血管疾病	65	68.93	6.86	腦血管疾病	49	51.87	8.48
4	肺炎	107	56.68	7.02	肺炎	64	67.87	6.76	肺炎	43	45.52	7.44
5	糖尿病	86	45.56	5.64	糖尿病	46	48.78	4.86	糖尿病	40	42.34	6.92
6	敗血症	60	31.79	3.93	敗血症	37	39.24	3.91	敗血症	23	24.35	3.98
7	高血壓性疾病	49	25.96	3.21	慢性下呼吸道疾病	33	34.99	3.48	腎炎、腎病徵候群及腎病變	22	23.29	3.81
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	48	25.43	3.15	慢性肝病及肝硬化	32	33.93	3.38	高血壓性疾病	21	22.23	3.63
9	慢性肝病及肝硬化	43	22.78	2.82	高血壓性疾病	28	29.69	2.96	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	14.82	2.42
10	慢性下呼吸道疾病	39	20.66	2.56	事故傷害	27	28.63	2.85	慢性肝病及肝硬化	11	11.64	1.90
	其他	366	193.89	24.00	其他	238	252.38	25.13	其他	119	125.97	20.59
11	事故傷害	33	17.48	2.16	腎炎、腎病徵候群及腎病變	26	27.57	2.75	蓄意自我傷害(自殺)	8	8.47	1.38
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	33	17.48	2.16	蓄意自我傷害(自殺)	22	23.33	2.32	衰老/老邁	8	8.47	1.38
13	蓄意自我傷害(自殺)	30	15.89	1.97	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19	20.15	2.01	事故傷害	6	6.35	1.04
14	衰老/老邁	13	6.89	0.85	血管性及未明示之癡呆症	6	6.36	0.63	慢性下呼吸道疾病	6	6.35	1.04
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)(1)	10	5.30	0.66	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)(2)	5	5.30	0.53	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	5.29	0.87

附註：(1)合計：血管性及未明示之癡呆症之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為10人、5.30。

(2)男性：衰老/老邁、結核病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、5.30。

表28-8 · ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,454	555.84	100.00	所有死亡原因	839	661.72	100.00	所有死亡原因	615	456.24	100.00
1	惡性腫瘤	417	159.41	28.68	惡性腫瘤	234	184.56	27.89	惡性腫瘤	183	135.76	29.76
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	150	57.34	10.32	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	79	62.31	9.42	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	71	52.67	11.54
3	腦血管疾病	103	39.37	7.08	腦血管疾病	57	44.96	6.79	腦血管疾病	46	34.13	7.48
4	肺炎	86	32.88	5.91	肺炎	49	38.65	5.84	糖尿病	45	33.38	7.32
5	糖尿病	80	30.58	5.50	慢性下呼吸道疾病	48	37.86	5.72	肺炎	37	27.45	6.02
6	高血壓性疾病	63	24.08	4.33	高血壓性疾病	37	29.18	4.41	高血壓性疾病	26	19.29	4.23
7	慢性下呼吸道疾病	63	24.08	4.33	糖尿病	35	27.60	4.17	腎炎、腎病徵候群及腎病變	22	16.32	3.58
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	53	20.26	3.65	腎炎、腎病徵候群及腎病變	31	24.45	3.69	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	15.58	3.41
9	敗血症	41	15.67	2.82	事故傷害	26	20.51	3.10	敗血症	19	14.10	3.09
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	40	15.29	2.75	敗血症	22	17.35	2.62	慢性下呼吸道疾病	15	11.13	2.44
	其他	358	136.86	24.62	其他	221	174.30	26.34	其他	130	96.44	21.14
11	事故傷害	32	12.23	2.20	蓄意自我傷害(自殺)	19	14.99	2.26	蓄意自我傷害(自殺)	10	7.42	1.63
12	蓄意自我傷害(自殺)	29	11.09	1.99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19	14.99	2.26	慢性肝病及肝硬化	10	7.42	1.63
13	慢性肝病及肝硬化	26	9.94	1.79	慢性肝病及肝硬化	16	12.62	1.91	血管性及未明示之癱瘓症	7	5.19	1.14
14	血管性及未明示之癱瘓症	17	6.50	1.17	血管性及未明示之癱瘓症	10	7.89	1.19	事故傷害	6	4.45	0.98
15	帕金森病	13	4.97	0.89	帕金森病(1)	7	5.52	0.83	帕金森病	6	4.45	0.98

附註：(1)男性：肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、5.52。

表28-9 · ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	704	619.79	100.00	所有死亡原因	437	780.35	100.00	所有死亡原因	267	463.66	100.00
1	惡性腫瘤	215	189.28	30.54	惡性腫瘤	136	242.85	31.12	惡性腫瘤	79	137.19	29.59
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	74	65.15	10.51	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	49	87.50	11.21	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	43.41	9.36
3	腦血管疾病	54	47.54	7.67	肺炎	32	57.14	7.32	腦血管疾病	25	43.41	9.36
4	肺炎	44	38.74	6.25	腦血管疾病	29	51.79	6.64	腎炎、腎病徵候群及腎病變	17	29.52	6.37
5	慢性下呼吸道疾病	37	32.57	5.26	慢性下呼吸道疾病	29	51.79	6.64	糖尿病	14	24.31	5.24
6	糖尿病	33	29.05	4.69	糖尿病	19	33.93	4.35	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	22.58	4.87
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	25	22.01	3.55	慢性肝病及肝硬化	17	30.36	3.89	肺炎	12	20.84	4.49
8	事故傷害	21	18.49	2.98	事故傷害	16	28.57	3.66	敗血症	11	19.10	4.12
9	慢性肝病及肝硬化	19	16.73	2.70	蓄意自我傷害(自殺)	9	16.07	2.06	高血壓性疾病	8	13.89	3.00
10	敗血症	18	15.85	2.56	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	14.29	1.83	慢性下呼吸道疾病	8	13.89	3.00
	其他	164	144.38	23.30	其他	93	166.07	21.28	其他	55	95.51	20.60
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	14.09	2.27	敗血症	7	12.50	1.60	帕金森病	6	10.42	2.25
12	蓄意自我傷害(自殺)	13	11.45	1.85	塵肺症	5	8.93	1.14	事故傷害	5	8.68	1.87
13	高血壓性疾病	13	11.45	1.85	高血壓性疾病	5	8.93	1.14	蓄意自我傷害(自殺)	4	6.95	1.50
14	帕金森病	9	7.92	1.28	結核病	4	7.14	0.92	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	5.21	1.12
15	塵肺症(1)	5	4.40	0.71	主動脈瘤及剝離(2)	3	5.36	0.69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)(3)	2	3.47	0.75

附註：(1)合計：原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)、血管性及未明示之癱瘓症之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.40。

(2)男性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病、帕金森病、血管性及未明示之癱瘓症之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、5.36。

(3)女性：慢性肝病及肝硬化、血管性及未明示之癱瘓症之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.47。

表28-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,183	439.82	100.00	所有死亡原因	716	551.69	100.00	所有死亡原因	467	335.51	100.00
1	惡性腫瘤	364	135.33	30.77	惡性腫瘤	228	175.68	31.84	惡性腫瘤	136	97.71	29.12
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	133	49.45	11.24	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	80	61.64	11.17	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	53	38.08	11.35
3	腦血管疾病	87	32.35	7.35	腦血管疾病	48	36.98	6.70	腦血管疾病	39	28.02	8.35
4	糖尿病	62	23.05	5.24	糖尿病	38	29.28	5.31	糖尿病	24	17.24	5.14
5	肺炎	54	20.08	4.56	肺炎	32	24.66	4.47	腎炎、腎病徵候群及腎病變	24	17.24	5.14
6	事故傷害	42	15.61	3.55	事故傷害	31	23.89	4.33	肺炎	22	15.81	4.71
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	40	14.87	3.38	慢性下呼吸道疾病	26	20.03	3.63	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	22	15.81	4.71
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	36	13.38	3.04	蓄意自我傷害(自殺)	24	18.49	3.35	敗血症	15	10.78	3.21
9	慢性肝病及肝硬化	35	13.01	2.96	慢性肝病及肝硬化	22	16.95	3.07	高血壓性疾病	14	10.06	3.00
10	慢性下呼吸道疾病	35	13.01	2.96	腎炎、腎病徵候群及腎病變	16	12.33	2.23	慢性肝病及肝硬化	13	9.34	2.78
	其他	295	109.68	24.94	其他	171	131.76	23.88	其他	105	75.44	22.48
11	蓄意自我傷害(自殺)	31	11.53	2.62	高血壓性疾病	16	12.33	2.23	事故傷害	11	7.90	2.36
12	高血壓性疾病	30	11.15	2.54	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	10.79	1.96	慢性下呼吸道疾病	9	6.47	1.93
13	敗血症	24	8.92	2.03	主動脈瘤及剝離	10	7.71	1.40	血管性及未明示之癡呆症	8	5.75	1.71
14	血管性及未明示之癡呆症	16	5.95	1.35	敗血症	9	6.93	1.26	蓄意自我傷害(自殺)	7	5.03	1.50
15	主動脈瘤及剝離	10	3.72	0.85	血管性及未明示之癡呆症	8	6.16	1.12	帕金森病(1)	3	2.16	0.64

附註：(1)女性：衰老／老邁之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.16。

表28-11·ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,595	561.23	100.00	所有死亡原因	943	681.98	100.00	所有死亡原因	652	446.81	100.00
1	惡性腫瘤	483	169.95	30.28	惡性腫瘤	299	216.24	31.71	惡性腫瘤	184	126.09	28.22
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	186	65.45	11.66	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	114	82.45	12.09	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	72	49.34	11.04
3	腦血管疾病	116	40.82	7.27	腦血管疾病	71	51.35	7.53	糖尿病	45	30.84	6.90
4	糖尿病	91	32.02	5.71	肺炎	57	41.22	6.04	腦血管疾病	45	30.84	6.90
5	肺炎	91	32.02	5.71	糖尿病	46	33.27	4.88	肺炎	34	23.30	5.21
6	腎炎、腎病徵候群及腎病變	53	18.65	3.32	慢性下呼吸道疾病	34	24.59	3.61	腎炎、腎病徵候群及腎病變	31	21.24	4.75
7	慢性下呼吸道疾病	50	17.59	3.13	腎炎、腎病徵候群及腎病變	22	15.91	2.33	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	17.13	3.83
8	敗血症	44	15.48	2.76	蓄意自我傷害(自殺)	21	15.19	2.23	高血壓性疾病	24	16.45	3.68
9	高血壓性疾病	40	14.07	2.51	敗血症	21	15.19	2.23	敗血症	23	15.76	3.53
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	36	12.67	2.26	慢性肝病及肝硬化	19	13.74	2.01	慢性下呼吸道疾病	16	10.96	2.45
	其他	405	142.51	25.39	其他	239	172.85	25.34	其他	153	104.85	23.47
11	蓄意自我傷害(自殺)	33	11.61	2.07	事故傷害	17	12.29	1.80	蓄意自我傷害(自殺)	12	8.22	1.84
12	慢性肝病及肝硬化	29	10.20	1.82	高血壓性疾病	16	11.57	1.70	事故傷害	11	7.54	1.69
13	事故傷害	28	9.85	1.76	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	7.96	1.17	慢性肝病及肝硬化	10	6.85	1.53
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	12	4.22	0.75	帕金森病	8	5.79	0.85	血管性及未明示之癡呆症	10	6.85	1.53
15	血管性及未明示之癡呆症	12	4.22	0.75	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)(1)	7	5.06	0.74	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	3.43	0.77

附註：(1)男性：肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、5.06。

表28-12 · ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,434	576.77	100.00	所有死亡原因	841	696.34	100.00	所有死亡原因	593	463.82	100.00
1	惡性腫瘤	424	170.54	29.57	惡性腫瘤	261	216.11	31.03	惡性腫瘤	163	127.49	27.49
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	181	72.80	12.62	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	110	91.08	13.08	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	71	55.53	11.97
3	腦血管疾病	89	35.80	6.21	肺炎	56	46.37	6.66	糖尿病	48	37.54	8.09
4	肺炎	87	34.99	6.07	腦血管疾病	55	45.54	6.54	腦血管疾病	34	26.59	5.73
5	糖尿病	86	34.59	6.00	糖尿病	38	31.46	4.52	肺炎	31	24.25	5.23
6	慢性下呼吸道疾病	44	17.70	3.07	事故傷害	27	22.36	3.21	腎炎、腎病徵候群及腎病變	23	17.99	3.88
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	43	17.30	3.00	慢性下呼吸道疾病	27	22.36	3.21	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	22	17.21	3.71
8	蓄意自我傷害(自殺)	38	15.28	2.65	蓄意自我傷害(自殺)	22	18.22	2.62	敗血症	18	14.08	3.04
9	高血壓性疾病	36	14.48	2.51	慢性肝病及肝硬化	21	17.39	2.50	慢性下呼吸道疾病	17	13.30	2.87
10	事故傷害	35	14.08	2.44	腎炎、腎病徵候群及腎病變	20	16.56	2.38	蓄意自我傷害(自殺)	16	12.51	2.70
	其他	371	149.22	25.87	其他	204	168.91	24.26	其他	150	117.32	25.30
11	慢性肝病及肝硬化	35	14.08	2.44	高血壓性疾病	20	16.56	2.38	高血壓性疾病	16	12.51	2.70
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	35	14.08	2.44	敗血症	13	10.76	1.55	慢性肝病及肝硬化	14	10.95	2.36
13	敗血症	31	12.47	2.16	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	10.76	1.55	事故傷害	8	6.26	1.35
14	血管性及未明示之癱瘓症	13	5.23	0.91	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	6.62	0.95	血管性及未明示之癱瘓症	6	4.69	1.01
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	12	4.83	0.84	血管性及未明示之癱瘓症	7	5.80	0.83	帕金森病(1)	5	3.91	0.84

附註：(1)女性：肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、3.91。

表29-1 · ICD-10 臺北市松山區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	24	11.53	100.00	19	19.23	100.00	5	4.57	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	9	4.32	37.50	7	7.09	36.84	2	1.83	40.00
W00-W19	跌倒(落)	7	3.36	29.17	4	4.05	21.05	3	2.74	60.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.44	12.50	3	3.04	15.79	-	-	-
	其他	5	2.40	20.83	5	5.06	26.32	-	-	-

表29-2 · ICD-10 臺北市信義區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	35	15.54	100.00	24	22.09	100.00	11	9.44	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	10	4.44	28.57	8	7.36	33.33	2	1.72	18.18
W00-W19	跌倒(落)	10	4.44	28.57	7	6.44	29.17	3	2.57	27.27
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.89	5.71	-	-	-	2	1.72	18.18
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.44	2.86	1	0.92	4.17	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.44	2.86	1	0.92	4.17	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.33	8.57	1	0.92	4.17	2	1.72	18.18
	其他	8	3.55	22.86	6	5.52	25.00	2	1.72	18.18

表29-3 · ICD-10 臺北市大安區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	43	13.80	100.00	27	18.39	100.00	16	9.71	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	18	5.78	41.86	12	8.18	44.44	6	3.64	37.50
W00-W19	跌倒(落)	11	3.53	25.58	10	6.81	37.04	1	0.61	6.25
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	0.96	6.98	2	1.36	7.41	1	0.61	6.25
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.64	4.65	1	0.68	3.70	1	0.61	6.25
	其他	9	2.89	20.93	2	1.36	7.41	7	4.25	43.75

表29-4 · ICD-10 臺北市中山區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	34	15.51	100.00	21	20.33	100.00	13	11.22	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	17	7.76	50.00	12	11.61	57.14	5	4.32	38.46
W00-W19	跌倒(落)	7	3.19	20.59	4	3.87	19.05	3	2.59	23.08
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.91	5.88	2	1.94	9.52	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.91	5.88	-	-	-	2	1.73	15.38
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.37	8.82	1	0.97	4.76	2	1.73	15.38
	其他	3	1.37	8.82	2	1.94	9.52	1	0.86	7.69

表29-5 · ICD-10 臺北市中正區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	15	9.43	100.00	9	11.71	100.00	6	7.29	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	4	2.51	26.67	2	2.60	22.22	2	2.43	33.33
W00-W19	跌倒(落)	3	1.89	20.00	3	3.90	33.33	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.63	6.67	-	-	-	1	1.22	16.67
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	7	4.40	46.67	4	5.20	44.44	3	3.65	50.00

表29-6 · ICD-10 臺北市大同區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	17	13.71	100.00	14	22.88	100.00	3	4.78	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	8	6.45	47.06	7	11.44	50.00	1	1.59	33.33
W00-W19	跌倒(落)	2	1.61	11.76	1	1.63	7.14	1	1.59	33.33
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.81	5.88	1	1.63	7.14	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	2.42	17.65	2	3.27	14.29	1	1.59	33.33
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	3	2.42	17.65	3	4.90	21.43	-	-	-

表29-7·ICD-10 臺北市萬華區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	33	17.48	100.00	27	28.63	100.00	6	6.35	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	12	6.36	36.36	9	9.54	33.33	3	3.18	50.00
W00-W19	跌倒(落)	9	4.77	27.27	8	8.48	29.63	1	1.06	16.67
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	2.12	12.12	4	4.24	14.81	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.53	3.03	1	1.06	3.70	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	1.06	6.06	1	1.06	3.70	1	1.06	16.67
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	2.12	12.12	4	4.24	14.81	-	-	-
	其他	1	0.53	3.03	-	-	-	1	1.06	16.67

表29-8 · ICD-10 臺北市文山區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	32	12.23	100.00	26	20.51	100.00	6	4.45	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	10	3.82	31.25	9	7.10	34.62	1	0.74	16.67
W00-W19	跌倒(落)	11	4.21	34.38	8	6.31	30.77	3	2.23	50.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.76	6.25	2	1.58	7.69	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	5	1.91	15.63	3	2.37	11.54	2	1.48	33.33
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.38	3.13	1	0.79	3.85	-	-	-
	其他	3	1.15	9.38	3	2.37	11.54	-	-	-

表29-9 · ICD-10 臺北市南港區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	21	18.49	100.00	16	28.57	100.00	5	8.68	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	10	8.80	47.62	9	16.07	56.25	1	1.74	20.00
W00-W19	跌倒(落)	4	3.52	19.05	3	5.36	18.75	1	1.74	20.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	2.64	14.29	1	1.79	6.25	2	3.47	40.00
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.88	4.76	-	-	-	1	1.74	20.00
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.88	4.76	1	1.79	6.25	-	-	-
	其他	2	1.76	9.52	2	3.57	12.50	-	-	-

表29-10 · ICD-10 臺北市內湖區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	42	15.61	100.00	31	23.89	100.00	11	7.90	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	25	9.29	59.52	18	13.87	58.06	7	5.03	63.64
W00-W19	跌倒(落)	5	1.86	11.90	5	3.85	16.13	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.37	2.38	1	0.77	3.23	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	5	1.86	11.90	3	2.31	9.68	2	1.44	18.18
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.37	2.38	1	0.77	3.23	-	-	-
	其他	5	1.86	11.90	3	2.31	9.68	2	1.44	18.18

表29-11 · ICD-10 臺北市士林區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	28	9.85	100.00	17	12.29	100.00	11	7.54	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	18	6.33	64.29	10	7.23	58.82	8	5.48	72.73
W00-W19	跌倒(落)	4	1.41	14.29	4	2.89	23.53	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.35	3.57	1	0.72	5.88	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.35	3.57	-	-	-	1	0.69	9.09
	其他	4	1.41	14.29	2	1.45	11.76	2	1.37	18.18

表29-12 · ICD-10 臺北市北投區事故傷害死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害合計	35	14.08	100.00	27	22.36	100.00	8	6.26	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	13	5.23	37.14	10	8.28	37.04	3	2.35	37.50
W00-W19	跌倒(落)	10	4.02	28.57	7	5.80	25.93	3	2.35	37.50
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.80	5.71	2	1.66	7.41	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.61	11.43	3	2.48	11.11	1	0.78	12.50
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.40	2.86	1	0.83	3.70	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.40	2.86	1	0.83	3.70	-	-	-
	其他	4	1.61	11.43	3	2.48	11.11	1	0.78	12.50

表30-1·ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男性			女性		
		死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡
		人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	25	12.01	100.00	13	13.16	100.00	12	10.97	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.96	8.00	1	1.01	7.69	1	0.91	8.33
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	3.36	28.00	5	5.06	38.46	2	1.83	16.67
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.48	4.00	1	1.01	7.69	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	2	0.96	8.00	1	1.01	7.69	1	0.91	8.33
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.96	8.00	2	2.02	15.38	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.48	4.00	-	-	-	1	0.91	8.33
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	9	4.32	36.00	3	3.04	23.08	6	5.48	50.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.48	4.00	-	-	-	1	0.91	8.33
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-2 · ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男性			女性		
		死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡
		人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	23	10.21	100.00	17	15.65	100.00	6	5.15	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.89	8.70	1	0.92	5.88	1	0.86	16.67
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	2.66	26.09	5	4.60	29.41	1	0.86	16.67
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	9	4.00	39.13	7	6.44	41.18	2	1.72	33.33
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.44	4.35	1	0.92	5.88	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.44	4.35	-	-	-	1	0.86	16.67
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	1.33	13.04	2	1.84	11.76	1	0.86	16.67
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.44	4.35	1	0.92	5.88	-	-	-

表30-3 · ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男性			女性		
		死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡
		人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	37	11.87	100.00	19	12.94	100.00	18	10.92	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	2.57	21.62	5	3.41	26.32	3	1.82	16.67
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.32	2.70	-	-	-	1	0.61	5.56
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	15	4.81	40.54	8	5.45	42.11	7	4.25	38.89
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.32	2.70	-	-	-	1	0.61	5.56
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	3	0.96	8.11	3	2.04	15.79	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	9	2.89	24.32	3	2.04	15.79	6	3.64	33.33
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-4 · ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男性			女性		
		死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡
		人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	34	15.51	100.00	23	22.26	100.00	11	9.49	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	18	8.21	52.94	14	13.55	60.87	4	3.45	36.36
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	8	3.65	23.53	5	4.84	21.74	3	2.59	27.27
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.46	2.94	-	-	-	1	0.86	9.09
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	3.19	20.59	4	3.87	17.39	3	2.59	27.27
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-5 · ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	16	10.05	100.00	8	10.41	100.00	8	9.72	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	1.89	18.75	2	2.60	25.00	1	1.22	12.50
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	9	5.66	56.25	6	7.81	75.00	3	3.65	37.50
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.63	6.25	-	-	-	1	1.22	12.50
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.63	6.25	-	-	-	1	1.22	12.50
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	2	1.26	12.50	-	-	-	2	2.43	25.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-6·ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男性			女性		
		死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡
		人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	20	16.13	100.00	15	24.52	100.00	5	7.96	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	4.03	25.00	5	8.17	33.33	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.81	5.00	1	1.63	6.67	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.81	5.00	1	1.63	6.67	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	8	6.45	40.00	6	9.81	40.00	2	3.18	40.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	2.42	15.00	2	3.27	13.33	1	1.59	20.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	2	1.61	10.00	-	-	-	2	3.18	40.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-7·ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	30	15.89	100.00	22	23.33	100.00	8	8.47	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.53	3.33	-	-	-	1	1.06	12.50
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	11	5.83	36.67	7	7.42	31.82	4	4.23	50.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	11	5.83	36.67	8	8.48	36.36	3	3.18	37.50
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	1.06	6.67	2	2.12	9.09	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	1	0.53	3.33	1	1.06	4.55	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	1.06	6.67	2	2.12	9.09	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	1	0.53	3.33	1	1.06	4.55	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.53	3.33	1	1.06	4.55	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-8 · ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	29	11.09	100.00	19	14.99	100.00	10	7.42	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	3.06	27.59	4	3.15	21.05	4	2.97	40.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.38	3.45	1	0.79	5.26	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	11	4.21	37.93	9	7.10	47.37	2	1.48	20.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.15	10.34	2	1.58	10.53	1	0.74	10.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	2.29	20.69	3	2.37	15.79	3	2.23	30.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-9 · ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男性			女性		
		死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡
		人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	13	11.45	100.00	9	16.07	100.00	4	6.95	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	6.16	53.85	5	8.93	55.56	2	3.47	50.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	3	2.64	23.08	1	1.79	11.11	2	3.47	50.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	1.76	15.38	2	3.57	22.22	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	1	0.88	7.69	1	1.79	11.11	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-10 · ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男性			女性		
		死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡	死亡	每十萬	死亡
		人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比	人數	死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	31	11.53	100.00	24	18.49	100.00	7	5.03	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	9	3.35	29.03	6	4.62	25.00	3	2.16	42.86
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.74	6.45	2	1.54	8.33	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	13	4.83	41.94	11	8.48	45.83	2	1.44	28.57
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.74	6.45	1	0.77	4.17	1	0.72	14.29
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.37	3.23	1	0.77	4.17	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	1.12	9.68	2	1.54	8.33	1	0.72	14.29
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.37	3.23	1	0.77	4.17	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-11·ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	33	11.61	100.00	21	15.19	100.00	12	8.22	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.35	3.03	-	-	-	1	0.69	8.33
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	2.46	21.21	3	2.17	14.29	4	2.74	33.33
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.70	6.06	1	0.72	4.76	1	0.69	8.33
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	4.22	36.36	10	7.23	47.62	2	1.37	16.67
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.41	12.12	1	0.72	4.76	3	2.06	25.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.70	6.06	2	1.45	9.52	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	1.76	15.15	4	2.89	19.05	1	0.69	8.33
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-12 · ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	合計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	死 亡 率	百 分 比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	38	15.28	100.00	22	18.22	100.00	16	12.51	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	11	4.42	28.95	9	7.45	40.91	2	1.56	12.50
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.80	5.26	1	0.83	4.55	1	0.78	6.25
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	4.83	31.58	8	6.62	36.36	4	3.13	25.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.80	5.26	-	-	-	2	1.56	12.50
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.80	5.26	-	-	-	2	1.56	12.50
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.40	2.63	-	-	-	1	0.78	6.25
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	2.82	18.42	3	2.48	13.64	4	3.13	25.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.40	2.63	1	0.83	4.55	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表31-1 · ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	352	169.06	100.00	所有癌症死亡原因	188	190.31	100.00	所有癌症死亡原因	164	149.87	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	77	36.98	21.88	氣管、支氣管和肺癌	43	43.53	22.87	氣管、支氣管和肺癌	34	31.07	20.73
2	女性乳房癌(1)	25	22.85	7.10	結腸、直腸和肛門癌	27	27.33	14.36	女性乳房癌	25	22.85	15.24
3	結腸、直腸和肛門癌	46	22.09	13.07	肝和肝內膽管癌	21	21.26	11.17	結腸、直腸和肛門癌	19	17.36	11.59
4	肝和肝內膽管癌	35	16.81	9.94	胃癌	13	13.16	6.91	肝和肝內膽管癌	14	12.79	8.54
5	胃癌	21	10.09	5.97	非何杰金氏淋巴瘤	10	10.12	5.32	卵巢癌	11	10.05	6.71
6	卵巢癌(1)	11	10.05	3.13	口腔癌	9	9.11	4.79	胃癌	8	7.31	4.88
7	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	7.31	2.27	白血病	9	9.11	4.79	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	7.31	4.88
8	非何杰金氏淋巴瘤	15	7.20	4.26	食道癌	7	7.09	3.72	白血病	6	5.48	3.66
9	白血病	15	7.20	4.26	胰臟癌	7	7.09	3.72	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.57	3.05
10	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	7.09	1.99	前列腺(攝護腺)癌	7	7.09	3.72	膀胱癌	5	4.57	3.05
	其他	92	44.19	26.14	其他	35	35.43	18.62	其他	29	26.50	17.68
11	膀胱癌	12	5.76	3.41	膀胱癌	7	7.09	3.72	胰臟癌	4	3.66	2.44
12	胰臟癌	11	5.28	3.13	鼻咽癌	4	4.05	2.13	腦癌	3	2.74	1.83
13	食道癌	10	4.80	2.84	腦癌	3	3.04	1.60	食道癌	3	2.74	1.83
14	口腔癌	10	4.80	2.84	喉癌	2	2.02	1.06	甲狀腺癌(3)	2	1.83	1.22
15	腦癌	6	2.88	1.70	甲狀腺癌	2	2.02	1.06	子宮體癌(3)	2	1.83	1.22

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.83。

表31-2 · ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	424	188.25	100.00	所有癌症死亡原因	265	243.88	100.00	所有癌症死亡原因	159	136.40	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	84	37.30	19.81	氣管、支氣管和肺癌	52	47.86	19.62	氣管、支氣管和肺癌	32	27.45	20.13
2	肝和肝內膽管癌	61	27.08	14.39	肝和肝內膽管癌	49	45.09	18.49	女性乳房癌	22	18.87	13.84
3	結腸、直腸和肛門癌	43	19.09	10.14	結腸、直腸和肛門癌	26	23.93	9.81	結腸、直腸和肛門癌	17	14.58	10.69
4	女性乳房癌(1)	22	18.87	5.19	胃癌	16	14.72	6.04	胰臟癌	14	12.01	8.81
5	胰臟癌	30	13.32	7.08	胰臟癌	16	14.72	6.04	肝和肝內膽管癌	12	10.29	7.55
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	12	11.04	2.83	口腔癌	12	11.04	4.53	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	6.01	4.40
7	胃癌	23	10.21	5.42	前列腺(攝護腺)癌	12	11.04	4.53	胃癌	7	6.01	4.40
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	6.01	1.65	白血病	8	7.36	3.02	卵巢癌	4	3.43	2.52
9	口腔癌	12	5.33	2.83	食道癌	8	7.36	3.02	腎臟癌	3	2.57	1.89
10	白血病	11	4.88	2.59	鼻咽癌	8	7.36	3.02	膽囊和其他膽道癌	3	2.57	1.89
	其他	119	52.84	28.07	其他	58	53.38	21.89	其他	38	32.60	23.90
11	食道癌	11	4.88	2.59	非何杰金氏淋巴瘤	8	7.36	3.02	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	2.57	1.89
12	非何杰金氏淋巴瘤	11	4.88	2.59	膀胱癌	7	6.44	2.64	白血病	3	2.57	1.89
13	鼻咽癌	10	4.44	2.36	腎臟癌	6	5.52	2.26	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.57	1.89
14	膀胱癌	10	4.44	2.36	喉癌	5	4.60	1.89	食道癌	3	2.57	1.89
15	腎臟癌	9	4.00	2.12	腦癌	4	3.68	1.51	膀胱癌	3	2.57	1.89

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-3 · ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	572	183.58	100.00	所有癌症死亡原因	314	213.91	100.00	所有癌症死亡原因	258	156.55	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	119	38.19	20.80	氣管、支氣管和肺癌	70	47.69	22.29	氣管、支氣管和肺癌	49	29.73	18.99
2	結腸、直腸和肛門癌	70	22.47	12.24	結腸、直腸和肛門癌	40	27.25	12.74	女性乳房癌	36	21.84	13.95
3	女性乳房癌(1)	36	21.84	6.29	肝和肝內膽管癌	37	25.21	11.78	結腸、直腸和肛門癌	30	18.20	11.63
4	前列腺(攝護腺)癌(2)	28	19.08	4.90	前列腺(攝護腺)癌	28	19.08	8.92	肝和肝內膽管癌	21	12.74	8.14
5	肝和肝內膽管癌	58	18.61	10.14	胰臟癌	23	15.67	7.32	胃癌	18	10.92	6.98
6	胰臟癌	40	12.84	6.99	胃癌	22	14.99	7.01	胰臟癌	17	10.32	6.59
7	胃癌	40	12.84	6.99	非何杰金氏淋巴瘤	21	14.31	6.69	非何杰金氏淋巴瘤	11	6.67	4.26
8	非何杰金氏淋巴瘤	32	10.27	5.59	口腔癌	13	8.86	4.14	白血病	8	4.85	3.10
9	白血病	16	5.13	2.80	食道癌	8	5.45	2.55	膀胱癌	7	4.25	2.71
10	口腔癌	14	4.49	2.45	腦癌	8	5.45	2.55	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	3.64	2.33
	其他	119	38.19	20.80	其他	44	29.98	14.01	其他	55	33.37	21.32
11	膀胱癌	14	4.49	2.45	白血病	8	5.45	2.55	卵巢癌	6	3.64	2.33
12	腦癌	13	4.17	2.27	膀胱癌	7	4.77	2.23	膽囊和其他膽道癌	6	3.64	2.33
13	食道癌	12	3.85	2.10	間皮和軟組織癌	4	2.73	1.27	腎臟癌	6	3.64	2.33
14	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	3.64	1.05	腎臟癌	2	1.36	0.64	腦癌	5	3.03	1.94
15	卵巢癌(1)	6	3.64	1.05	鼻咽癌(3)	1	0.68	0.32	子宮體癌	5	3.03	1.94

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：小腸癌、喉癌、甲狀腺癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、0.68。

表31-4 · ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	402	183.41	100.00	所有癌症死亡原因	240	232.30	100.00	所有癌症死亡原因	162	139.81	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	85	38.78	21.14	氣管、支氣管和肺癌	54	52.27	22.50	氣管、支氣管和肺癌	31	26.75	19.14
2	肝和肝內膽管癌	63	28.74	15.67	肝和肝內膽管癌	41	39.68	17.08	結腸、直腸和肛門癌	26	22.44	16.05
3	結腸、直腸和肛門癌	54	24.64	13.43	結腸、直腸和肛門癌	28	27.10	11.67	女性乳房癌	26	22.44	16.05
4	女性乳房癌(1)	26	22.44	6.47	前列腺(攝護腺)癌	17	16.45	7.08	肝和肝內膽管癌	22	18.99	13.58
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	17	16.45	4.23	胃癌	16	15.49	6.67	卵巢癌	7	6.04	4.32
6	胃癌	20	9.12	4.98	食道癌	13	12.58	5.42	白血病	6	5.18	3.70
7	食道癌	14	6.39	3.48	胰臟癌	11	10.65	4.58	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.32	3.09
8	胰臟癌	14	6.39	3.48	口腔癌	10	9.68	4.17	膀胱癌	5	4.32	3.09
9	卵巢癌(1)	7	6.04	1.74	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.78	2.92	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	3.45	2.47
10	白血病	12	5.47	2.99	鼻咽癌	6	5.81	2.50	胃癌	4	3.45	2.47
	其他	90	41.06	22.39	其他	37	35.81	15.42	其他	26	22.44	16.05
11	非何杰金氏淋巴瘤	12	5.47	2.99	白血病	6	5.81	2.50	腦癌	3	2.59	1.85
12	口腔癌	11	5.02	2.74	膀胱癌	6	5.81	2.50	胰臟癌	3	2.59	1.85
13	膀胱癌	11	5.02	2.74	腦癌	2	1.94	0.83	子宮體癌	2	1.73	1.23
14	鼻咽癌	8	3.65	1.99	膽囊和其他膽道癌	2	1.94	0.83	鼻咽癌	2	1.73	1.23
15	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	4	3.45	1.00	腎臟癌	2	1.94	0.83	間皮和軟組織癌	2	1.73	1.23

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表31-5 · ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	278	174.68	100.00	所有癌症死亡原因	165	214.70	100.00	所有癌症死亡原因	113	137.31	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	64	40.22	23.02	氣管、支氣管和肺癌	36	46.84	21.82	氣管、支氣管和肺癌	28	34.02	24.78
2	肝和肝內膽管癌	41	25.76	14.75	肝和肝內膽管癌	27	35.13	16.36	結腸、直腸和肛門癌	15	18.23	13.27
3	結腸、直腸和肛門癌	37	23.25	13.31	結腸、直腸和肛門癌	22	28.63	13.33	女性乳房癌	14	17.01	12.39
4	女性乳房癌(1)	14	17.01	5.04	胰臟癌	11	14.31	6.67	肝和肝內膽管癌	14	17.01	12.39
5	胃癌	19	11.94	6.83	胃癌	10	13.01	6.06	胃癌	9	10.94	7.96
6	胰臟癌	16	10.05	5.76	口腔癌	7	9.11	4.24	胰臟癌	5	6.08	4.42
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	6.51	1.80	食道癌	7	9.11	4.24	卵巢癌	3	3.65	2.65
8	非何杰金氏淋巴瘤	9	5.66	3.24	非何杰金氏淋巴瘤	7	9.11	4.24	白血病	3	3.65	2.65
9	口腔癌	8	5.03	2.88	白血病	5	6.51	3.03	鼻咽癌	2	2.43	1.77
10	白血病	8	5.03	2.88	前列腺(攝護腺)癌	5	6.51	3.03	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	2.43	1.77
	其他	57	35.82	20.50	其他	28	36.43	16.97	其他	18	21.87	15.93
11	食道癌	7	4.40	2.52	腦癌	4	5.20	2.42	非何杰金氏淋巴瘤	2	2.43	1.77
12	卵巢癌(1)	3	3.65	1.08	膀胱癌	4	5.20	2.42	間皮和軟組織癌	2	2.43	1.77
13	膀胱癌	5	3.14	1.80	腎臟癌	3	3.90	1.82	腎臟癌(5)	1	1.22	0.88
14	鼻咽癌(3)	4	2.51	1.44	膽囊和其他膽道癌(4)	2	2.60	1.21	小腸癌(5)	1	1.22	0.88
15	腦癌(3)	4	2.51	1.44	黑色素瘤和其他皮膚癌(4)	2	2.60	1.21	口腔癌(5)	1	1.22	0.88

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)合計：腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、2.51。(4)男性：鼻咽癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、2.60。

(5)女性：子宮體癌、甲狀腺癌、膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.22。

表31-6·ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	255	205.65	100.00	所有癌症死亡原因	165	269.71	100.00	所有癌症死亡原因	90	143.26	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	56	45.16	21.96	氣管、支氣管和肺癌	42	68.65	25.45	氣管、支氣管和肺癌	14	22.29	15.56
2	肝和肝內膽管癌	47	37.90	18.43	肝和肝內膽管癌	33	53.94	20.00	肝和肝內膽管癌	14	22.29	15.56
3	結腸、直腸和肛門癌	35	28.23	13.73	結腸、直腸和肛門癌	22	35.96	13.33	結腸、直腸和肛門癌	13	20.69	14.44
4	女性乳房癌(1)	9	14.33	3.53	食道癌	10	16.35	6.06	女性乳房癌	9	14.33	10.00
5	食道癌	15	12.10	5.88	胃癌	9	14.71	5.45	食道癌	5	7.96	5.56
6	胃癌	14	11.29	5.49	口腔癌	6	9.81	3.64	胃癌	5	7.96	5.56
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	8.17	1.96	前列腺(攝護腺)癌	5	8.17	3.03	卵巢癌	4	6.37	4.44
8	卵巢癌(1)	4	6.37	1.57	白血病	4	6.54	2.42	胰臟癌	4	6.37	4.44
9	口腔癌	7	5.65	2.75	腎臟癌	4	6.54	2.42	膽囊和其他膽道癌	3	4.78	3.33
10	白血病	7	5.65	2.75	非何杰金氏淋巴瘤	4	6.54	2.42	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.78	3.33
	其他	56	45.16	21.96	其他	26	42.50	15.76	其他	16	25.47	17.78
11	胰臟癌	7	5.65	2.75	膀胱癌	3	4.90	1.82	白血病	3	4.78	3.33
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	4.78	1.18	鼻咽癌	3	4.90	1.82	鼻咽癌	2	3.18	2.22
13	鼻咽癌	5	4.03	1.96	胰臟癌	3	4.90	1.82	腎臟癌(4)	1	1.59	1.11
14	腎臟癌	5	4.03	1.96	間皮和軟組織癌	2	3.27	1.21	非何杰金氏淋巴瘤(4)	1	1.59	1.11
15	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.03	1.96	膽囊和其他膽道癌(3)	1	1.63	0.61	膀胱癌(4)	1	1.59	1.11

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：骨和關節軟骨癌、小腸癌、腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.63。

(4)女性：間皮和軟組織癌、口腔癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.59。

表31-7·ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	446	236.27	100.00	所有癌症死亡原因	276	292.67	100.00	所有癌症死亡原因	170	179.96	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	86	45.56	19.28	氣管、支氣管和肺癌	56	59.38	20.29	氣管、支氣管和肺癌	30	31.76	17.65
2	肝和肝內膽管癌	77	40.79	17.26	肝和肝內膽管癌	55	58.32	19.93	女性乳房癌	24	25.41	14.12
3	結腸、直腸和肛門癌	50	26.49	11.21	結腸、直腸和肛門癌	35	37.11	12.68	肝和肝內膽管癌	22	23.29	12.94
4	女性乳房癌(1)	24	25.41	5.38	胃癌	27	28.63	9.78	結腸、直腸和肛門癌	15	15.88	8.82
5	胃癌	38	20.13	8.52	口腔癌	21	22.27	7.61	子宮頸及部位未明示子宮癌	12	12.70	7.06
6	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	12	12.70	2.69	胰臟癌	12	12.72	4.35	胃癌	11	11.64	6.47
7	口腔癌	23	12.18	5.16	食道癌	7	7.42	2.54	胰臟癌	9	9.53	5.29
8	胰臟癌	21	11.12	4.71	非何杰金氏淋巴瘤	7	7.42	2.54	子宮體癌	6	6.35	3.53
9	子宮體癌(1)	6	6.35	1.35	膀胱癌	7	7.42	2.54	卵巢癌	5	5.29	2.94
10	非何杰金氏淋巴瘤	11	5.83	2.47	鼻咽癌	5	5.30	1.81	非何杰金氏淋巴瘤	4	4.23	2.35
	其他	98	51.92	21.97	其他	44	46.66	15.94	其他	32	33.88	18.82
11	卵巢癌(1)	5	5.29	1.12	腎臟癌	4	4.24	1.45	腦癌	3	3.18	1.76
12	膀胱癌	9	4.77	2.02	膽囊和其他膽道癌	4	4.24	1.45	口腔癌(4)	2	2.12	1.18
13	前列腺(攝護腺)癌	4	4.24	0.90	前列腺(攝護腺)癌	4	4.24	1.45	白血病(4)	2	2.12	1.18
14	食道癌	8	4.24	1.79	間皮和軟組織癌(3)	3	3.18	1.09	腎臟癌(4)	2	2.12	1.18
15	腎臟癌	6	3.18	1.35	小腸癌(3)	3	3.18	1.09	小腸癌(4)	2	2.12	1.18

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：白血病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、3.18。

(4)女性：膀胱癌、黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、2.12。

表31-8·ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	417	159.41	100.00	所有癌症死亡原因	234	184.56	100.00	所有癌症死亡原因	183	135.76	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	95	36.32	22.78	氣管、支氣管和肺癌	54	42.59	23.08	氣管、支氣管和肺癌	41	30.42	22.40
2	結腸、直腸和肛門癌	58	22.17	13.91	肝和肝內膽管癌	32	25.24	13.68	女性乳房癌	27	20.03	14.75
3	女性乳房癌(1)	27	20.03	6.47	結腸、直腸和肛門癌	31	24.45	13.25	結腸、直腸和肛門癌	27	20.03	14.75
4	肝和肝內膽管癌	49	18.73	11.75	胃癌	26	20.51	11.11	肝和肝內膽管癌	17	12.61	9.29
5	胃癌	43	16.44	10.31	前列腺(攝護腺)癌	17	13.41	7.26	胃癌	17	12.61	9.29
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	17	13.41	4.08	胰臟癌	10	7.89	4.27	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.93	4.37
7	非何杰金氏淋巴瘤	17	6.50	4.08	鼻咽癌	9	7.10	3.85	卵巢癌	6	4.45	3.28
8	胰臟癌	15	5.73	3.60	非何杰金氏淋巴瘤	9	7.10	3.85	胰臟癌	5	3.71	2.73
9	卵巢癌(1)	6	4.45	1.44	口腔癌	7	5.52	2.99	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	3.71	2.73
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	5	3.71	1.20	白血病	6	4.73	2.56	子宮體癌	4	2.97	2.19
	其他	85	32.49	20.38	其他	33	26.03	14.10	其他	26	19.29	14.21
11	口腔癌	9	3.44	2.16	腦癌	4	3.15	1.71	腎臟癌	3	2.23	1.64
12	鼻咽癌	9	3.44	2.16	食道癌	3	2.37	1.28	口腔癌	2	1.48	1.09
13	子宮體癌(1)	4	2.97	0.96	膀胱癌	3	2.37	1.28	膀胱癌	2	1.48	1.09
14	白血病	7	2.68	1.68	膽囊和其他膽道癌	2	1.58	0.85	白血病(4)	1	0.74	0.55
15	腦癌(3)	5	1.91	1.20	間皮和軟組織癌	2	1.58	0.85	鼻腔、中耳和副鼻竇癌(4)	1	0.74	0.55

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)合計：膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、1.91。

(4)女性：小腸癌、黑色素瘤和其他皮膚癌、膽囊和其他膽道癌、胸腺癌、骨和關節軟骨癌、腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、0.74。

表31-9 · ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因
中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	215	189.28	100.00	所有癌症死亡原因	136	242.85	100.00	所有癌症死亡原因	79	137.19	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	51	44.90	23.72	氣管、支氣管和肺癌	37	66.07	27.21	肝和肝內膽管癌	15	26.05	18.99
2	肝和肝內膽管癌	37	32.57	17.21	肝和肝內膽管癌	22	39.29	16.18	女性乳房癌	15	26.05	18.99
3	女性乳房癌(1)	15	26.05	6.98	結腸、直腸和肛門癌	16	28.57	11.76	氣管、支氣管和肺癌	14	24.31	17.72
4	結腸、直腸和肛門癌	25	22.01	11.63	口腔癌	14	25.00	10.29	結腸、直腸和肛門癌	9	15.63	11.39
5	口腔癌	15	13.21	6.98	胃癌	9	16.07	6.62	白血病	4	6.95	5.06
6	胃癌	13	11.45	6.05	食道癌	8	14.29	5.88	胃癌	4	6.95	5.06
7	食道癌	9	7.92	4.19	胰臟癌	6	10.71	4.41	腦癌	3	5.21	3.80
8	前列腺(攝護腺)癌(2)	4	7.14	1.86	非何杰金氏淋巴瘤	4	7.14	2.94	腎臟癌	3	5.21	3.80
9	胰臟癌	7	6.16	3.26	腎臟癌	4	7.14	2.94	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.47	2.53
10	腎臟癌	7	6.16	3.26	前列腺(攝護腺)癌	4	7.14	2.94	間皮和軟組織癌(4)	1	1.74	1.27
	其他	32	28.17	14.88	其他	12	21.43	8.82	其他	9	15.63	11.39
11	腦癌	5	4.40	2.33	腦癌	2	3.57	1.47	胰臟癌(4)	1	1.74	1.27
12	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.40	2.33	間皮和軟組織癌	2	3.57	1.47	食道癌(4)	1	1.74	1.27
13	白血病	4	3.52	1.86	膀胱癌(3)	1	1.79	0.74	骨和關節軟骨癌(4)	1	1.74	1.27
14	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	2	3.47	0.93	鼻咽癌(3)	1	1.79	0.74	心臟、縱隔及胸(肋)膜(4)	1	1.74	1.27
15	間皮和軟組織癌	3	2.64	1.40	喉癌(3)	1	1.79	0.74	子宮體癌(4)	1	1.74	1.27

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.79。

(4)女性：口腔癌、非何杰金氏淋巴瘤之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.74。

表31-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	364	135.33	100.00	所有癌症死亡原因	228	175.68	100.00	所有癌症死亡原因	136	97.71	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	77	28.63	21.15	氣管、支氣管和肺癌	51	39.30	22.37	氣管、支氣管和肺癌	26	18.68	19.12
2	結腸、直腸和肛門癌	48	17.85	13.19	肝和肝內膽管癌	35	26.97	15.35	女性乳房癌	20	14.37	14.71
3	肝和肝內膽管癌	46	17.10	12.64	結腸、直腸和肛門癌	29	22.34	12.72	結腸、直腸和肛門癌	19	13.65	13.97
4	女性乳房癌(1)	20	14.37	5.49	食道癌	15	11.56	6.58	肝和肝內膽管癌	11	7.90	8.09
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	11	8.48	3.02	胃癌	14	10.79	6.14	卵巢癌	8	5.75	5.88
6	胃癌	21	7.81	5.77	前列腺(攝護腺)癌	11	8.48	4.82	胃癌	7	5.03	5.15
7	食道癌	16	5.95	4.40	口腔癌	9	6.93	3.95	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	4.31	4.41
8	卵巢癌(1)	8	5.75	2.20	胰臟癌	8	6.16	3.51	胰臟癌	4	2.87	2.94
9	胰臟癌	12	4.46	3.30	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.62	2.63	膀胱癌	4	2.87	2.94
10	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	4.31	1.65	膀胱癌	5	3.85	2.19	腦癌	3	2.16	2.21
	其他	99	36.81	27.20	其他	45	34.67	19.74	其他	28	20.12	20.59
11	口腔癌	10	3.72	2.75	鼻咽癌	5	3.85	2.19	膽囊和其他膽道癌	3	2.16	2.21
12	膀胱癌	9	3.35	2.47	腦癌	4	3.08	1.75	白血病	2	1.44	1.47
13	非何杰金氏淋巴瘤	8	2.97	2.20	白血病	4	3.08	1.75	非何杰金氏淋巴瘤	2	1.44	1.47
14	腦癌	7	2.60	1.92	腎臟癌	3	2.31	1.32	子宮體癌	2	1.44	1.47
15	白血病	6	2.23	1.65	小腸癌(3)	2	1.54	0.88	腎臟癌	2	1.44	1.47

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：胸腺癌、骨和關節軟骨癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.54。

表31-11 · ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	483	169.95	100.00	氣管、支氣管和肺癌	299	216.24	100.00	所有癌症死亡原因	184	126.09	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	99	34.83	20.50	氣管、支氣管和肺癌	57	41.22	19.06	氣管、支氣管和肺癌	42	28.78	22.83
2	肝和肝內膽管癌	71	24.98	14.70	肝和肝內膽管癌	53	38.33	17.73	結腸、直腸和肛門癌	29	19.87	15.76
3	結腸、直腸和肛門癌	59	20.76	12.22	結腸、直腸和肛門癌	30	21.70	10.03	女性乳房癌	20	13.71	10.87
4	女性乳房癌(1)	20	13.71	4.14	食道癌	19	13.74	6.35	肝和肝內膽管癌	18	12.34	9.78
5	胃癌	32	11.26	6.63	胃癌	18	13.02	6.02	胃癌	14	9.59	7.61
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	11	7.96	2.28	口腔癌	17	12.29	5.69	胰臟癌	12	8.22	6.52
7	胰臟癌	21	7.39	4.35	前列腺(攝護腺)癌	11	7.96	3.68	卵巢癌	7	4.80	3.80
8	食道癌	20	7.04	4.14	非何杰金氏淋巴瘤	10	7.23	3.34	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	4.80	3.80
9	口腔癌	17	5.98	3.52	胰臟癌	9	6.51	3.01	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.06	1.63
10	卵巢癌(1)	7	4.80	1.45	腎臟癌	8	5.79	2.68	子宮體癌	2	1.37	1.09
	其他	126	44.34	26.09	其他	67	48.45	22.41	其他	30	20.56	16.30
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	4.80	1.45	膽囊和其他膽道癌	8	5.79	2.68	白血病	2	1.37	1.09
12	非何杰金氏淋巴瘤	13	4.57	2.69	白血病	8	5.79	2.68	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	1.37	1.09
13	膽囊和其他膽道癌	10	3.52	2.07	腦癌	6	4.34	2.01	膽囊和其他膽道癌	2	1.37	1.09
14	白血病	10	3.52	2.07	膀胱癌	6	4.34	2.01	骨和關節軟骨癌(3)	1	0.69	0.54
15	腎臟癌	9	3.17	1.86	鼻咽癌	5	3.62	1.67	胸腺癌(3)	1	0.69	0.54

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：食道癌、間皮和軟組織癌、膀胱癌、鼻咽癌、鼻腔、中耳和副鼻竇癌、腦癌、小腸癌、腎臟癌、腦膜及中樞神經系統其他部分癌(腦除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、0.69。

表31-12 · ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因

中華民國99年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	424	170.54	100.00	所有癌症死亡原因	261	216.11	100.00	所有癌症死亡原因	163	127.49	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	97	39.01	22.88	氣管、支氣管和肺癌	65	53.82	24.90	氣管、支氣管和肺癌	32	25.03	19.63
2	肝和肝內膽管癌	59	23.73	13.92	肝和肝內膽管癌	38	31.46	14.56	女性乳房癌	28	21.90	17.18
3	女性乳房癌(1)	28	21.90	6.60	結腸、直腸和肛門癌	25	20.70	9.58	肝和肝內膽管癌	21	16.43	12.88
4	前列腺(攝護腺)癌(2)	23	19.04	5.42	前列腺(攝護腺)癌	23	19.04	8.81	結腸、直腸和肛門癌	20	15.64	12.27
5	結腸、直腸和肛門癌	45	18.10	10.61	胃癌	17	14.08	6.51	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	7.04	5.52
6	胃癌	23	9.25	5.42	口腔癌	14	11.59	5.36	胰臟癌	7	5.48	4.29
7	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	7.04	2.12	胰臟癌	10	8.28	3.83	胃癌	6	4.69	3.68
8	胰臟癌	17	6.84	4.01	食道癌	10	8.28	3.83	卵巢癌	5	3.91	3.07
9	口腔癌	15	6.03	3.54	非何杰金氏淋巴瘤	9	7.45	3.45	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.91	3.07
10	非何杰金氏淋巴瘤	14	5.63	3.30	鼻咽癌	7	5.80	2.68	腦癌	4	3.13	2.45
	其他	94	37.81	22.17	其他	43	35.60	16.48	其他	26	20.34	15.95
11	食道癌	12	4.83	2.83	膀胱癌	7	5.80	2.68	白血病	2	1.56	1.23
12	卵巢癌(1)	5	3.91	1.18	膽囊和其他膽道癌	5	4.14	1.92	子宮體癌	2	1.56	1.23
13	膀胱癌	8	3.22	1.89	白血病	4	3.31	1.53	食道癌	2	1.56	1.23
14	鼻咽癌	7	2.82	1.65	骨和關節軟骨癌	3	2.48	1.15	主唾液腺癌(4)	1	0.78	0.61
15	腦癌(3)	6	2.41	1.42	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	2.48	1.15	骨和關節軟骨癌(4)	1	0.78	0.61

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)合計：白血病、膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、2.41。(4)女性：腎臟癌、甲狀腺癌、黑色素瘤和其他皮膚癌、口腔癌、膽囊和其他膽道癌、膀胱癌、小腸癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、0.78。

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表32·臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		11,551	437.00		11,989	457.75		12,054	463.27		12,205	465.98		12,424	470.49		12,799	484.10
08-14	惡性腫瘤	1	3,180	120.31	1	3,366	128.52	1	3,504	134.67	1	3,489	133.21	1	3,564	134.97	1	3,738	141.38
25-27-28*	心臟疾病	3	1,257	47.56	2	1,384	52.84	2	1,453	55.84	2	1,331	50.82	2	1,428	54.08	3	1,252	47.35
29	腦血管疾病	2	1,306	49.41	3	1,361	51.96	3	1,326	50.96	3	1,303	49.75	3	1,209	45.78	2	1,380	52.20
181	糖尿病	5	620	23.46	5	634	24.21	4	755	29.02	5	647	24.70	4	863	32.68	4	1,004	37.97
321	肺炎	7	372	14.07	8	332	12.68	9	276	10.61	8	330	12.60	8	396	15.00	8	316	11.95
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	358	13.54	6	368	14.05	6	378	14.53	6	413	15.77	6	419	15.87	6	457	17.29
E47-E53	事故傷害	4	752	28.45	4	772	29.48	5	683	26.25	4	692	26.42	5	658	24.92	5	599	22.66
E54	自殺	10	206	7.79	10	224	8.55	10	214	8.22	10	201	7.67	10	212	8.03	9	237	8.96
347	慢性肝病及肝硬化	6	380	14.38	7	367	14.01	7	349	13.41	7	389	14.85	7	404	15.30	7	373	14.11
038	敗血症	13	96	3.63	12	132	5.04	13	129	4.96	13	116	4.43	16	70	2.65	14	85	3.21
26	高血壓性疾病	9	292	11.05	9	328	12.52	8	286	10.99	9	281	10.73	9	250	9.47	10	191	7.22
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	190	7.19	11	183	6.99	11	182	6.99	11	200	7.64	11	156	5.91	11	142	5.37
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	76	2.88	16	87	3.32	16	63	2.42	16	59	2.25	14	81	3.07	12	111	4.20
02	結核病	15	80	3.03	13	107	4.09	12	180	6.92	12	122	4.66	12	99	3.75	12	111	4.20
44	先天性畸形	12	99	3.75	14	92	3.51	14	106	4.07	15	71	2.71	13	82	3.11	15	81	3.06
	其他		2,287	86.52		2,252	85.98		2,170	83.40		2,561	97.78		2,533	95.92		2,722	102.95

註：年中人口數 2,643,220 2,619,118 2,601,934 2,619,216 2,640,626 2,643,893

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表32·臺北市歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
01-56	所有死亡原因		13,222	500.81		13,279	503.41		13,631	517.40		13,733	523.20		14,339	547.41		13,875	528.71
08-14	惡性腫瘤	1	4,089	154.88	1	4,169	158.05	1	4,001	151.87	1	4,202	160.09	1	4,290	163.78	1	4,423	168.54
25-27-28*	心臟疾病	3	1,383	52.38	2	1,450	54.97	2	1,642	62.33	2	1,732	65.99	2	1,665	63.56	2	1,527	58.19
29	腦血管疾病	2	1,397	52.91	3	1,233	46.74	3	1,325	50.29	3	1,240	47.24	3	1,367	52.19	3	1,182	45.04
181	糖尿病	4	903	34.20	4	889	33.70	4	946	35.91	4	893	34.02	4	988	37.72	4	946	36.05
321	肺炎	7	367	13.90	7	448	16.98	5	567	21.52	7	447	17.03	5	572	21.84	5	575	21.91
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	490	18.56	6	456	17.29	6	503	19.09	5	503	19.16	6	544	20.77	6	485	18.48
E47-E53	事故傷害	5	506	19.17	5	514	19.49	7	455	17.27	6	463	17.64	8	415	15.84	8	379	14.44
E54	自殺	9	290	10.98	8	325	12.32	9	320	12.15	8	346	13.18	7	467	17.83	7	454	17.30
347	慢性肝病及肝硬化	8	365	13.83	9	305	11.56	8	367	13.93	9	333	12.69	9	323	12.33	9	317	12.08
038	敗血症	12	116	4.39	12	109	4.13	13	93	3.53	12	94	3.58	11	150	5.73	11	145	5.53
26	高血壓性疾病	10	167	6.33	10	179	6.79	10	142	5.39	10	167	6.36	10	162	6.18	10	176	6.71
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	149	5.64	11	123	4.66	11	115	4.37	11	113	4.31	12	109	4.16	12	92	3.51
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	75	2.84	16	61	2.31	14	64	2.43	14	70	2.67	13	77	2.94	13	79	3.01
02	結核病	13	89	3.37	13	82	3.11	12	98	3.72	13	74	2.82	14	60	2.29	14	68	2.59
44	先天性畸形	16	67	2.54	15	64	2.43	15	41	1.56	15	48	1.83	16	39	1.49	15	42	1.60
	其他		2,769	104.88		2,872	108.88		2,952	112.05		3,008	114.60		3,111	118.77		2,985	113.74
註：	年中人口數		2,640,138		2,637,829		2,634,497		2,624,805		2,619,424		2,624,309						

表32·臺北市歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年		死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年					
		順位	死亡 人數			每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		14,486	550.64	A00-Y98	所有死亡原因	15,119	575.72	14,870	568.60	15,047	575.83			
08-14	惡性腫瘤	1	4,566	173.56	C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10	1	4,563	174.48	1	4,632	177.26
25-27-28*	心臟疾病	2	1,642	62.42	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病 除外)	2	2,014	76.69	2	1,768	67.61	2	1,723	65.94
29	腦血管疾病	3	1,289	49.00	I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66	3	1,128	43.13	3	1,047	40.07
181	糖尿病	4	958	36.42	J12-J18	肺炎	4	950	36.18	4	840	32.12	4	899	34.40
321	肺炎	5	688	26.15	E10-E14	糖尿病	5	716	27.26	5	825	31.55	5	769	29.43
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	549	20.87	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	491	18.70	7	451	17.25	6	474	18.14
E47-E53	事故傷害	7	372	14.14	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98	6	496	18.97	7	465	17.79
E54	自殺	8	364	13.84	A40-A41	敗血症	6	513	19.53	8	441	16.86	8	449	17.18
347	慢性肝病及肝硬化	9	331	12.58	I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24	9	385	14.72	9	422	16.15
038	敗血症	10	188	7.15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	281	10.70	13	340	13.00	10	380	14.54
26	高血壓性疾病	11	141	5.36	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	389	14.81	10	377	14.42	11	359	13.74
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	97	3.69	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	370	14.09	12	341	13.04	12	329	12.59
341	胃及十二指腸之潰瘍	13	80	3.04	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27	11	349	13.35	13	318	12.17
02	結核病	14	57	2.17	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	14	171	6.51	14	127	4.86	14	120	4.59
44	先天性畸形	15	48	1.82	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	17	69	2.63	15	112	4.28	15	116	4.44
	其他		3,116	118.45		其他		2,373	90.36		2,327	88.98		2,545	97.39

註： 年中人口數 2,630,756 2,626,096 2,615,176 2,613,100

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		7,172	541.89		7,451	568.85		7,351	565.92		7,546	578.81		7,593	579.35		7,841	598.84
08-14	惡性腫瘤	1	1,977	149.38	1	2,118	161.70	1	2,135	164.36	1	2,154	165.22	1	2,235	170.53	1	2,356	179.93
25-27-28*	心臟疾病	3	791	59.77	2	892	68.10	2	910	70.06	2	817	62.67	2	895	68.29	2	824	62.93
29	腦血管疾病	2	800	60.45	3	822	62.76	3	798	61.43	3	783	60.06	3	699	53.33	3	805	61.48
181	糖尿病	5	328	24.78	5	309	23.59	5	390	30.02	5	323	24.78	5	415	31.66	4	506	38.64
321	肺炎	7	245	18.51	7	226	17.25	8	189	14.55	8	231	17.72	7	269	20.52	8	192	14.66
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	185	13.98	8	194	14.81	7	224	17.24	7	232	17.80	8	213	16.25	7	242	18.48
E47-E53	事故傷害	4	535	40.42	4	560	42.75	4	491	37.80	4	494	37.89	4	437	33.34	5	426	32.53
E54	自殺	11	123	9.29	10	155	11.83	11	125	9.62	11	125	9.59	9	143	10.91	9	143	10.92
347	慢性肝病及肝硬化	6	273	20.63	6	253	19.32	6	247	19.02	6	277	21.25	6	306	23.35	6	253	19.32
038	敗血症	14	50	3.78	13	78	5.95	13	74	5.70	13	64	4.91	15	38	2.90	15	41	3.13
26	高血壓性疾病	9	167	12.62	9	190	14.51	9	158	12.16	9	159	12.20	9	143	10.91	10	117	8.94
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	131	9.90	11	110	8.40	12	119	9.16	10	133	10.20	11	94	7.17	11	99	7.56
02	胃及十二指腸之潰瘍	13	58	4.38	14	63	4.81	16	39	3.00	15	37	2.84	13	54	4.12	13	76	5.80
02	結核病	12	71	5.36	12	80	6.11	10	141	10.85	12	92	7.06	12	78	5.95	12	86	6.57
44	先天性畸形	16	48	3.63	15	54	4.12	14	60	4.62	15	37	2.84	16	37	2.82	14	47	3.59
	其他		1,390	105.02		1,347	102.84		1,251	96.31		1,588	121.81		1,537	117.27		1,628	124.33
註：	年中人口數		1,323,509		1,309,828		1,298,943		1,303,713		1,310,612		1,309,371						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率						
01-56	所有死亡原因		8,056	617.44		8,001	615.07		8,213	633.43		8,352	647.93		8,763	683.06		8,387	654.67
08-14	惡性腫瘤	1	2,565	196.59	1	2,520	193.72	1	2,430	187.41	1	2,594	201.24	1	2,630	205.00	1	2,695	210.37
25-27-28*	心臟疾病	2	906	69.44	2	896	68.88	2	996	76.82	2	1,107	85.88	2	1,060	82.62	2	971	75.79
29	腦血管疾病	3	820	62.85	3	734	56.43	3	818	63.09	3	725	56.24	3	822	64.07	3	680	53.08
181	糖尿病	4	450	34.49	4	464	35.67	4	463	35.71	4	440	34.13	4	521	40.61	4	473	36.92
321	肺炎	8	233	17.86	6	314	24.14	5	369	28.46	6	300	23.27	5	370	28.84	5	373	29.12
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	257	19.70	7	246	18.91	7	261	20.13	7	278	21.57	6	324	25.26	8	261	20.37
E47-E53	事故傷害	5	365	27.97	5	359	27.60	6	316	24.37	5	342	26.53	8	312	24.32	7	281	21.93
E54	自殺	9	192	14.72	8	214	16.45	9	203	15.66	8	225	17.46	7	313	24.40	6	309	24.12
347	慢性肝病及肝硬化	7	239	18.32	9	209	16.07	8	249	19.20	9	222	17.22	9	192	14.97	9	210	16.39
038	敗血症	13	59	4.52	13	53	4.07	13	61	4.70	13	54	4.19	11	73	5.69	11	73	5.70
26	高血壓性疾病	11	88	6.74	10	99	7.61	11	70	5.40	10	82	6.36	10	106	8.26	10	94	7.34
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	95	7.28	11	75	5.77	12	68	5.24	11	73	5.66	12	71	5.53	12	58	4.53
341	胃及十二指腸之潰瘍	14	50	3.83	15	35	2.69	14	42	3.24	14	43	3.34	13	52	4.05	14	43	3.36
02	結核病	12	76	5.82	12	67	5.15	10	75	5.78	12	59	4.58	14	50	3.90	13	53	4.14
44	先天性畸形	16	33	2.53	16	34	2.61	15	23	1.77	16	25	1.94	17	17	1.33	16	16	1.25
	其他		1,628	124.78		1,682	129.30		1,769	136.43		1,783	138.32		1,850	144.20		1,797	140.27
註：	年中人口數		1,304,744		1,300,818		1,296,600		1,289,022		1,282,908		1,281,102						

表33·臺北市歷年男性主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		8,633	674.39	A00-Y98	所有死亡原因		8,992	705.67	8,782	693.85	8,882	704.08		
08-14	惡性腫瘤	1	2,757	215.37	C00-C97	惡性腫瘤	1	2,698	211.73	1	2,671	211.03	1	2,771	219.66
25-27-28*	心臟疾病	2	1,026	80.15	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	2	1,278	100.29	2	1,101	86.99	2	1,039	82.36
29	腦血管疾病	3	768	59.99	I60-I69	腦血管疾病	3	677	53.13	3	647	51.12	3	602	47.72
181	糖尿病	4	495	38.67	J12-J18	肺炎	4	619	48.58	4	528	41.72	4	548	43.44
321	肺炎	5	446	34.84	E10-E14	糖尿病	5	352	27.62	5	423	33.42	5	384	30.44
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	272	21.25	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	337	26.45	6	377	29.79	6	335	26.56
E47-E53	事故傷害	7	265	20.70	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	269	21.11	7	260	20.54	7	258	20.45
E54	自殺	8	228	17.81	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	240	18.83	8	249	19.67	8	234	18.55
347	慢性肝病及肝硬化	9	222	17.34	I10-I15	高血壓性疾病	11	204	16.01	12	206	16.28	9	231	18.31
038	敗血症	10	82	6.41	A40-A41	敗血症	8	263	20.64	10	233	18.41	10	230	18.23
26	高血壓性疾病	11	69	5.39	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	231	18.13	9	234	18.49	11	212	16.81
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	61	4.77	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	197	15.46	11	232	18.33	12	198	15.70
341	胃及十二指腸之潰瘍	13	48	3.75	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	132	10.36	13	142	11.22	13	170	13.48
02	結核病	14	40	3.12	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	14	101	7.93	14	73	5.77	14	75	5.95
44	先天性畸形	15	23	1.80	I71	主動脈瘤及剝離	17	49	3.85	16	54	4.27	15	70	5.55
	其他		1,831	143.03		其他		1,345	105.55		1,352	106.82		1,525	120.89
註：	年中人口數		1,280,124				1,274,252			1,265,699			1,261,502		

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		4,379	331.81		4,538	346.60		4,703	360.94		4,659	354.16		4,831	363.23		4,958	371.52
08-14	惡性腫瘤	1	1,203	91.16	1	1,248	95.32	1	1,369	105.07	1	1,335	101.48	1	1,329	99.92	1	1,382	103.56
25-27-28*	心臟疾病	3	466	35.31	3	492	37.58	2	543	41.67	3	514	39.07	2	533	40.07	4	428	32.07
29	腦血管疾病	2	506	38.34	2	539	41.17	3	528	40.52	2	520	39.53	3	510	38.35	2	575	43.09
181	糖尿病	4	292	22.13	4	325	24.82	4	365	28.01	4	324	24.63	4	448	33.68	3	498	37.32
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	173	13.11	6	174	13.29	6	154	11.82	6	181	13.76	6	206	15.49	5	215	16.11
321	肺炎	7	127	9.62	9	106	8.10	10	87	6.68	9	99	7.53	7	127	9.55	7	124	9.29
E54	自殺	10	83	6.29	11	69	5.27	9	89	6.83	10	76	5.78	10	69	5.19	9	94	7.04
347	慢性肝病及肝硬化	9	107	8.11	8	114	8.71	8	102	7.83	8	112	8.51	9	98	7.37	8	120	8.99
E47-E53	事故傷害	5	217	16.44	5	212	16.19	5	192	14.74	5	198	15.05	5	221	16.62	6	173	12.96
038	敗血症	13	46	3.49	12	54	4.12	12	55	4.22	12	52	3.95	14	32	2.41	11	44	3.30
26	高血壓性疾病	8	125	9.47	7	138	10.54	7	128	9.82	7	122	9.27	8	107	8.05	10	74	5.55
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	59	4.47	10	73	5.58	11	63	4.84	11	67	5.09	11	62	4.66	12	43	3.22
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	18	1.36	16	24	1.83	16	24	1.84	16	22	1.67	15	27	2.03	13	35	2.62
44	先天性畸形	12	51	3.86	13	38	2.90	13	46	3.53	13	34	2.58	12	45	3.38	14	34	2.55
200	貧血	17	10	0.76	19	6	0.46	18	9	0.69	18	7	0.53	17	6	0.45	17	17	1.27
	其他		896	67.89		926	70.73		949	72.83		996	75.71		1,011	76.01		1,102	82.58

註：年人口數 1,319,712 1,309,291 1,302,990 1,315,503 1,330,014 1,334,522

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年			91年			92年			93年			94年			95年			
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		5,166	386.85		5,278	394.76		5,418	404.96		5,381	402.84		5,576	417.20		5,488	408.57	
08-14	惡性腫瘤	1	1,524	114.12	1	1,649	123.33	1	1,571	117.42	1	1,608	120.38	1	1,660	124.20	1	1,728	128.65	
25-27-28*	心臟疾病	3	477	35.72	2	554	41.44	2	646	48.28	2	625	46.79	2	605	45.27	2	556	41.39	
29	腦血管疾病	2	577	43.21	3	499	37.32	3	507	37.90	3	515	38.55	3	545	40.78	3	502	37.37	
181	糖尿病	4	453	33.92	4	425	31.79	4	483	36.10	4	453	33.91	4	467	34.94	4	473	35.21	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	233	17.45	5	210	15.71	5	242	18.09	5	225	16.84	5	220	16.46	5	224	16.68	
321	肺炎	7	134	10.03	7	134	10.02	6	198	14.80	6	147	11.00	6	202	15.11	6	202	15.04	
E54	自殺	9	98	7.34	8	111	8.30	9	117	8.75	7	121	9.06	7	154	11.52	7	145	10.80	
347	慢性肝病及肝硬化	8	126	9.44	9	96	7.18	8	118	8.82	9	111	8.31	8	131	9.80	8	107	7.97	
E47-E53	事故傷害	6	141	10.56	6	155	11.59	7	139	10.39	7	121	9.06	9	103	7.71	9	98	7.30	
038	敗血症	11	57	4.27	11	56	4.19	12	32	2.39	11	40	2.99	10	77	5.76	11	72	5.36	
26	高血壓性疾病	10	79	5.92	10	80	5.98	10	72	5.38	10	85	6.36	11	56	4.19	10	82	6.10	
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	54	4.04	12	48	3.59	11	47	3.51	11	40	2.99	12	38	2.84	13	34	2.53	
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	25	1.87	15	26	1.94	15	22	1.64	13	27	2.02	13	25	1.87	12	36	2.68	
44	先天性畸形	14	34	2.55	13	30	2.24	16	18	1.35	14	23	1.72	14	22	1.65	14	26	1.94	
200	貧血	16	13	0.97	17	9	0.67	17	14	1.05	16	17	1.27	16	13	0.97	15	21	1.56	
	其他		1,141	85.44		1,196	89.45		1,192	89.10		1,223	91.56		1,258	94.13		1,182	88.00	
註：	年中人口數		1,335,394			1,337,010			1,337,897			1,335,782			1,336,516			1,343,207		

表34·臺北市歷年女性主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		5,853	433.35	A00-Y98	所有死亡原因		6,127	453.23		6,088	451.14		6,165	456.13
08-14	惡性腫瘤	1	1,809	133.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	1,769	130.86	1	1,892	140.20	1	1,861	137.69
25-27-28*	心臟疾病	2	616	45.61	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	2	736	54.44	2	667	49.43	2	684	50.61
29	腦血管疾病	3	521	38.57	I60-I69	腦血管疾病	3	522	38.61	3	481	35.64	3	445	32.92
181	糖尿病	4	463	34.28	E10-E14	糖尿病	4	364	26.93	4	402	29.79	4	385	28.48
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	277	20.51	J12-J18	肺炎	5	331	24.49	5	312	23.12	5	351	25.97
321	肺炎	6	242	17.92	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	251	18.57	7	202	14.97	6	240	17.76
E54	自殺	7	136	10.07	A40-A41	敗血症	7	250	18.49	6	208	15.41	7	219	16.20
347	慢性肝病及肝硬化	8	109	8.07	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	149	11.02	8	198	14.67	8	210	15.54
E47-E53	事故傷害	9	107	7.92	I10-I15	高血壓性疾病	8	170	12.58	9	179	13.26	9	191	14.13
038	敗血症	10	106	7.85	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	109	8.06	10	119	8.82	10	130	9.62
26	高血壓性疾病	11	72	5.33	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	99	7.32	12	117	8.67	11	120	8.88
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	36	2.67	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	139	10.28	13	107	7.93	12	117	8.66
341	胃及十二指腸之潰瘍	13	32	2.37	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	120	8.88	11	117	8.67	13	101	7.47
44	先天性畸形	14	25	1.85	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	15	38	2.81	14	68	5.04	14	61	4.51
200	貧血	15	20	1.48	G20-G21	帕金森病	17	37	2.74	17	30	2.22	15	47	3.48
	其他		1,282	94.92		其他		1,043	77.15		989	73.29		1,003	74.21

註： 年中人口數 1,350,632 1,351,844 1,349,477 1,351,598

表35·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數			死亡率 (‰)	死亡人數			死亡率 (‰)	死亡 人數	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 60年	159	95	64	3.65	334	186	148	7.67	12	27.55
民國 65年	76	52	24	1.57	299	191	108	6.19	15	31.07
民國 70年	63	41	22	1.43	218	127	91	4.95	3	6.82
民國 75年	59	31	28	1.66	173	88	85	4.87	1	2.81
民國 80年	42	20	22	1.15	162	91	71	4.43	3	8.21
民國 85年	104	58	46	3.05	216	111	105	6.32	2	5.86
民國 86年	98	53	45	2.80	212	117	95	6.05	3	8.56
民國 87年	79	45	34	2.62	166	100	66	5.50	3	9.93
民國 88年	81	44	37	2.55	168	90	78	5.28	2	6.29
民國 89年	86	50	36	2.55	153	89	64	4.54	-	-
民國 90年	88	46	42	3.26	149	75	74	5.52	3	11.11
民國 91年	68	41	27	2.65	111	62	49	4.33	1	3.90
民國 92年	46	22	24	1.97	89	42	47	3.82	3	12.87
民國 93年	56	29	27	2.53	100	58	42	4.51	-	-
民國 94年	51	27	24	2.43	89	44	45	4.25	1	4.77
民國 95年	40	20	20	1.89	69	30	39	3.26	1	4.73
民國 96年	56	34	22	2.59	89	57	32	4.12	1	4.63
民國 97年	59	33	26	2.85	95	51	44	4.59	1	4.83
民國 98年	32	18	14	1.65	69	34	35	3.56	-	-
民國 99年	52	30	22	2.81	71	41	30	3.83	1	5.40

附註:1.新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000。

2.嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000

3.孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數/活產嬰兒數)×100,000。

4.自97年起死因統計資料配合衛生署改採國際疾病分類碼第十版(ICD-10)。

表36·臺北市歷年年齡結構別死亡率

單位：人/每十萬人口

年別	總計	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
84年	437.00	682.71	32.62	18.42	27.06	60.57	77.17	65.05	90.99	113.30	160.75	261.74	386.95	681.57	1,081.85	1,676.13	2,664.91	4,267.21	7,274.45	11,039.79
85年	457.75	673.86	45.78	17.30	22.78	47.79	69.88	74.81	89.43	121.56	175.14	270.34	402.54	688.84	1,105.93	1,573.56	2,674.67	4,300.10	6,908.85	11,667.37
86年	463.27	633.97	46.94	15.83	14.87	39.99	48.43	68.09	84.34	131.22	184.72	273.57	392.13	626.42	1,050.42	1,650.66	2,469.82	4,285.18	6,565.16	11,540.95
87年	465.98	519.20	47.91	21.16	12.41	35.07	53.31	66.86	72.52	130.10	160.17	246.88	379.54	634.67	975.66	1,630.90	2,443.44	4,064.66	6,730.79	11,230.74
88年	470.49	554.05	30.48	12.65	20.64	37.55	42.38	57.00	69.13	113.03	159.35	251.56	350.49	566.77	968.13	1,472.13	2,409.57	3,959.08	6,641.81	11,953.77
89年	484.10	477.82	34.20	14.45	17.16	47.15	44.74	49.58	75.59	119.57	153.35	242.18	350.33	575.30	925.06	1,530.22	2,402.38	3,923.90	6,530.01	11,437.54
90年	500.81	508.22	31.83	15.72	15.49	35.56	44.36	46.11	67.09	118.49	168.75	242.39	391.39	564.51	938.44	1,527.54	2,418.31	3,807.86	6,329.57	11,330.28
91年	503.41	437.72	41.40	13.99	14.90	30.58	36.58	53.21	69.89	117.86	163.49	244.55	353.34	564.14	903.31	1,399.37	2,330.38	3,611.06	6,167.56	11,169.46
92年	517.40	372.82	24.52	11.92	14.46	34.85	36.65	54.73	77.59	112.50	146.43	233.45	339.14	511.37	829.43	1,415.81	2,269.54	3,555.13	6,175.39	11,670.54
93年	523.20	452.52	32.87	11.12	14.57	27.91	46.19	53.77	77.28	107.85	159.51	227.93	349.91	545.62	850.44	1,253.79	2,119.75	3,456.63	6,116.51	10,769.36
94年	547.41	426.71	21.69	15.85	13.42	41.51	38.86	53.63	86.38	104.37	164.56	240.15	350.28	464.27	850.95	1,295.29	2,034.07	3,557.58	6,002.50	11,305.33
95年	528.71	340.67	29.64	11.84	15.21	34.40	44.62	63.55	65.17	112.92	155.35	237.33	365.65	507.15	721.45	1,150.53	2,001.99	3,249.51	5,306.01	10,046.38
96年	550.64	434.21	20.37	17.43	7.01	25.78	39.69	52.14	56.09	98.39	148.71	246.28	311.48	475.52	708.13	1,171.78	2,041.12	3,320.52	5,341.79	10,629.20
97年	575.72	469.11	23.18	16.16	12.47	19.20	45.78	48.92	66.26	105.37	157.67	230.61	330.13	455.61	699.50	1,124.34	2,016.68	3,257.44	5,549.18	10,992.30
98年	568.60	357.61	21.38	13.08	5.53	26.88	36.77	40.38	63.46	85.57	148.62	225.80	314.22	467.69	638.77	1,116.63	1,912.70	3,080.41	5,353.26	10,468.26
99年	575.83	379.01	17.92	10.66	10.08	23.18	29.30	45.38	63.43	87.69	135.15	207.88	295.07	466.23	627.12	1,073.08	1,722.41	3,119.39	5,172.92	10,733.81

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
		E47-E53	事故傷害合計	752	28.45	772	29.48	683	26.25	692	26.42	658	24.92	599	22.66	506	19.17	514	19.49
E47	運輸事故	393	14.87	391	14.93	351	13.49	335	12.79	221	8.37	225	8.51	195	7.39	249	9.44	189	7.17
E48	意外中毒	39	1.48	32	1.22	33	1.27	21	0.80	24	0.91	28	1.06	24	0.91	27	1.02	26	0.99
E49	內科醫療之事故傷害， 異常反應及後期併發症	2	0.08	-	-	-	-	1	0.04	3	0.11	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-
E50	意外墜落	97	3.67	112	4.28	110	4.23	115	4.39	146	5.53	144	5.45	109	4.13	86	3.26	103	3.91
E51	火及火焰所致之事故傷 害	30	1.13	40	1.53	35	1.35	35	1.34	21	0.80	20	0.76	13	0.49	12	0.45	19	0.72
E52	其他事故傷害，包括後 期影響	191	7.23	197	7.52	153	5.88	185	7.06	243	9.20	181	6.85	165	6.25	139	5.27	118	4.48
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表37·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
E47-E53	事故傷害合計	463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害合計	389	14.81	377	14.42	359	13.74
E47	運輸事故	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54	V01-V99	運輸事故傷害	153	5.83	165	6.31	154	5.89
E48	意外中毒	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91	W00-W19	跌倒(落)	91	3.47	72	2.75	83	3.18
E49	內科醫療之事故傷害 ，異常反應及後期併 發症	-	-	-	-	-	-	-	-	W65-W74	意外溺死和淹沒	26	0.99	17	0.65	16	0.61
E50	意外墜落	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31	W75-W84	對呼吸的其他意外威 脅	19	0.72	24	0.92	26	0.99
E51	火及火焰所致之事故 傷害	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27	X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災 和火焰	6	0.23	7	0.27	6	0.23
E52	其他事故傷害，包括 後期影響	140	5.33	83	3.17	91	3.47	82	3.12	X40-X49	毒害物質(所致)的意外 中毒及暴露	25	0.95	26	0.99	20	0.77
E53	治療用之藥品，藥物 所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-		其他	69	2.63	66	2.52	54	2.07

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E47-E53	事故傷害合計	535	40.42	560	42.75	491	37.80	494	37.89	437	33.34	426	32.53	365	27.97	359	27.60	316	24.37
E47	運輸事故	278	21.00	289	22.06	261	20.09	228	17.49	152	11.60	165	12.60	146	11.19	161	12.38	137	10.57
E48	意外中毒	32	2.42	22	1.68	25	1.92	13	1.00	17	1.30	20	1.53	14	1.07	20	1.54	19	1.47
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	69	5.21	83	6.34	74	5.70	83	6.37	88	6.71	101	7.71	74	5.67	70	5.38	67	5.17
E51	火及火焰所致之事故傷害	21	1.59	24	1.83	23	1.77	24	1.84	11	0.84	9	0.69	8	0.61	10	0.77	13	1.00
E52	其他事故傷害，包括後期影響	134	10.12	142	10.84	108	8.31	145	11.12	168	12.82	131	10.00	123	9.43	98	7.53	80	6.17
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表38·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E47-E53	事故傷害合計	342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害合計	269	21.11	260	20.54	258	20.45
E47	運輸事故	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06	V01-V99	運輸事故傷害	104	8.16	110	8.69	113	8.96
E48	意外中毒	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25	W00-W19	跌倒(落)	66	5.18	55	4.35	64	5.07
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	W65-W74	意外溺死和淹沒	21	1.65	13	1.03	11	0.87
E50	意外墜落	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16	W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	13	1.02	15	1.19	18	1.43
E51	火及火焰所致之事故傷害	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31	X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	5	0.39	7	0.55	3	0.24
E52	其他事故傷害，包括後期影響	110	8.53	68	5.30	71	5.54	63	4.92	X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	17	1.33	14	1.11	14	1.11
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-		其他	43	3.37	46	3.63	35	2.77

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E47-E53	事故傷害合計	217	16.44	212	16.19	192	14.74	198	15.05	221	16.62	173	12.96	141	10.56	155	11.59	139	10.39
E47	運輸事故	115	8.71	102	7.79	90	6.91	107	8.13	69	5.19	60	4.50	49	3.67	88	6.58	52	3.89
E48	意外中毒	7	0.53	10	0.76	8	0.61	8	0.61	7	0.53	8	0.60	10	0.75	7	0.52	7	0.52
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.15	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-
E50	意外墜落	28	2.12	29	2.21	36	2.76	32	2.43	58	4.36	43	3.22	35	2.62	16	1.20	36	2.69
E51	火及火焰所致之事故傷害	9	0.68	16	1.22	12	0.92	11	0.84	10	0.75	11	0.82	5	0.37	2	0.15	6	0.45
E52	其他事故傷害，包括後期影響	57	4.32	55	4.20	45	3.45	40	3.04	75	5.64	50	3.75	42	3.15	41	3.07	38	2.84
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表39·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E47-E53	事故傷害合計	121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害合計	120	8.88	117	8.67	101	7.47
E47	運輸事故	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15	V01-V99	運輸事故傷害	49	3.62	55	4.08	41	3.03
E48	意外中毒	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59	W00-W19	跌倒(落)	25	1.85	17	1.26	19	1.41
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	W65-W74	意外溺死和淹沒	5	0.37	4	0.30	5	0.37
E50	意外墜落	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55	W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	0.44	9	0.67	8	0.59
E51	火及火焰所致之事故傷害	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22	X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.07	-	-	3	0.22
E52	其他事故傷害，包括後期影響	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41	X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	8	0.59	12	0.89	6	0.44
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-		其他	26	1.92	20	1.48	19	1.41

表40·臺北市歷年自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
		E54	自殺合計	206	7.79	224	8.55	214	8.22	201	7.67	212	8.03	237	8.96	290	10.98	325	12.32
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	30	1.15	22	0.85	26	0.99	21	0.8	17	0.64	25	0.95	27	1.02	30	1.14
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	2	0.08	2	0.08
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	5	0.19	7	0.26	25	0.95	82	3.11	56	2.13
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	109	4.12	125	4.77	141	5.42	89	3.40	103	3.9	134	5.07	122	4.62	116	4.40	113	4.29
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	18	0.68	9	0.34	7	0.27	14	0.53	12	0.45	15	0.57	26	0.98	21	0.80	22	0.84
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	3	0.11	1	0.04	2	0.08	-	-	-	-	2	0.08	1	0.04	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	14	0.53	6	0.23	5	0.19	9	0.34	5	0.19	7	0.27	6	0.23	4	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	1.51	32	1.22	28	1.08	54	2.06	47	1.78	46	1.74	60	2.27	54	2.05	78	2.96
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	9	0.34	9	0.35	10	0.38	14	0.53	12	0.45	21	0.80	16	0.61	15	0.57
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表40·臺北市歷年自殺死亡方式(續)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
E54	自殺合計	346	13.18	467	17.83	442	17.30	364	13.84	X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	370	14.09	341	13.04	329	12.59
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80	X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	1	0.04	-	-
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	1	0.04	-	-	-	-	X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	6	0.23	5	0.19
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84	X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	-	-
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79	X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	1	0.04
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25	X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	124	4.72	99	3.79	100	3.83
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08	X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	6	0.23	9	0.34
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15	X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	6	0.23	2	0.08
E957	由高處跳下自殺及自傷	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66	X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	109	4.17	113	4.32
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27	X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	25	0.96	24	0.92
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍砲、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-
										X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.04
										X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	5	0.19	4	0.15
										X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	4	0.15	10	0.38
										X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	68	2.60	55	2.10
										X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	3	0.11	4	0.15
										X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	1	0.04	-	-
										X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	6	0.23	1	0.04

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E54	自殺合計	123	9.29	155	11.83	125	9.62	125	9.59	143	10.91	143	10.92	192	14.72	214	16.45	203	15.66
E950	以固體或液體物質自殺及 自為中毒	11	0.83	20	1.53	11	0.85	14	1.07	15	1.14	9	0.69	15	1.15	17	1.31	17	1.31
E951	以家用瓦斯自殺及自為中 毒	-	-	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.15	2	0.15	1	0.08
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及 自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	-	-	5	0.38	6	0.46	18	1.38	62	4.77	43	3.32
E953	吊死、勒死及窒息之自殺 及自傷	71	5.36	88	6.72	84	6.47	61	4.68	80	6.1	87	6.64	82	6.28	79	6.07	76	5.86
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	8	0.60	5	0.38	6	0.46	10	0.77	7	0.53	8	0.61	17	1.30	12	0.92	11	0.85
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	2	0.15	1	0.08	2	0.15	-	-	-	-	2	0.15	1	0.08	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.15	10	0.76	5	0.38	4	0.31	8	0.61	3	0.23	6	0.46	4	0.31	3	0.23
E957	由高處跳下自殺及自傷	24	1.81	21	1.60	12	0.92	27	2.07	19	1.45	24	1.83	37	2.84	27	2.08	40	3.08
E958	其他及未明示之方式自殺 及自傷	7	0.53	7	0.53	6	0.46	6	0.46	8	0.61	5	0.38	13	1.00	10	0.77	12	0.93
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表41·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E54	自殺合計	225	17.46	313	24.40	299	24.12	228	17.81	X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	231	18.13	234	18.49	212	16.81
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02	X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	1	0.08	-	-
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	-	-	X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	3	0.24	2	0.16
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78	X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09	X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33	X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	6.36	72	5.69	70	5.55
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08	X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	3	0.24	7	0.55
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16	X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.32	1	0.08
E957	由高處跳下自殺及自傷	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89	X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	81	6.40	80	6.34
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47	X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	19	1.50	13	1.03
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍砲、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-
										X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.08
										X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	4	0.32	1	0.08
										X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	2	0.16	7	0.55
										X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	37	2.92	26	2.06
										X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	3	0.24
										X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	-	-
										X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	5	0.40	1	0.08

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼	死亡方式	84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年		92年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E54	自殺合計	83	6.29	69	5.27	89	6.83	76	5.78	69	5.19	94	7.04	98	7.34	111	8.30	117	8.75
E950	以固體或液體物質自殺及 自為中毒	14	1.06	10	0.76	11	0.84	12	0.91	6	0.45	8	0.60	10	0.75	10	0.75	13	0.97
E951	以家用瓦斯自殺及自為中 毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及 自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	7	0.52	20	1.50	13	0.97
E953	吊死、勒死及窒息之自殺 及自傷	38	2.88	37	2.83	57	4.37	28	2.13	23	1.73	47	3.52	40	3.00	37	2.77	37	2.77
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	10	0.76	4	0.31	1	0.08	4	0.30	5	0.38	7	0.52	9	0.67	9	0.67	11	0.82
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	4	0.31	1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.15	1	0.07	2	0.15	1	0.07
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	11	0.84	16	1.23	27	2.05	28	2.11	22	1.65	23	1.72	27	2.02	38	2.84
E958	其他及未明示之方式自殺 及自傷	2	0.15	2	0.15	3	0.23	4	0.30	6	0.45	7	0.52	8	0.60	6	0.45	3	0.22
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表42·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E54	自殺合計	121	9.06	154	11.52	143	10.80	136	10.07	X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28	107	7.93	117	8.66
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59	X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	3	0.22	3	0.22
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00	X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55	X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.07
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18	X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	43	3.18	27	2.00	30	2.22
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	-	-	1	0.07	X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	3	0.22	2	0.15
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15	X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	2	0.15	1	0.07
E957	由高處跳下自殺及自傷	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44	X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	28	2.07	33	2.44
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07	X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	6	0.44	11	0.81
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-
										X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-
										X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	3	0.22
										X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	2	0.15	3	0.22
										X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	31	2.30	29	2.15
										X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	3	0.22	1	0.07
										X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-
										X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	1	0.07	-	-

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
85	457.75	474.91	128.52	130.61	52.84	55.12	51.96	53.52	24.21	25.00	12.68	13.77	14.05	14.78	29.48	29.19
86	463.27	459.89	134.67	131.73	55.84	55.60	50.96	50.27	29.02	28.60	10.61	10.84	14.53	14.27	26.25	25.33
87	465.98	445.91	133.21	125.92	50.82	48.32	49.75	47.19	24.70	23.24	12.60	12.10	15.77	15.04	26.42	25.48
88	470.49	434.03	134.97	123.57	54.08	49.01	45.78	41.26	32.68	29.91	15.00	13.84	15.87	14.72	24.92	23.86
89	484.10	428.95	141.38	125.80	47.35	41.22	52.20	45.46	37.97	32.88	11.95	10.32	17.29	15.08	22.66	21.42
90	500.81	426.61	154.88	132.24	52.38	43.72	52.91	43.95	34.20	28.60	13.90	11.26	18.56	15.45	19.17	17.72
91	503.41	410.73	158.05	129.89	54.97	43.43	46.74	37.24	33.70	26.67	16.98	12.98	17.29	13.45	19.49	17.86
92	517.40	402.53	151.87	120.46	62.33	46.71	50.29	37.85	35.91	27.21	21.52	15.83	19.09	14.36	17.27	15.35
93	523.20	392.14	160.09	122.12	65.99	46.85	47.24	33.77	34.02	24.96	17.03	11.49	19.16	13.77	17.64	15.78
94	547.41	392.62	163.78	120.21	63.56	42.87	52.19	35.74	37.72	26.19	21.84	13.82	20.77	13.94	15.84	14.03
95	528.71	364.83	168.54	118.90	58.19	38.38	45.04	29.23	36.05	23.79	21.91	13.32	18.48	12.19	14.44	12.68
96	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		腎炎、腎微候群及腎性病變		慢性下呼吸道疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	45.66	27.26	36.18	20.14	27.26	16.89	18.70	11.20	16.98	9.27
98	568.60	347.27	174.48	111.24	67.61	39.98	43.13	24.61	32.12	16.59	31.55	18.86	17.25	9.72	18.97	9.85
99	575.83	338.78	177.26	110.14	65.94	36.69	40.07	21.91	34.40	16.89	29.43	16.78	18.14	10.07	17.79	8.87

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表43·臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
85	8.55	8.14	14.01	13.91	5.04	5.31	12.52	13.16	6.99	7.33	3.32	3.52	4.09	4.18	3.51	4.84
86	8.22	7.65	13.41	12.87	4.96	4.93	10.99	10.90	6.99	6.88	2.42	2.46	6.92	6.88	4.07	5.46
87	7.67	7.20	14.85	13.92	4.43	4.39	10.73	10.24	7.64	7.07	2.25	2.18	4.66	4.42	2.71	3.58
88	8.03	7.12	15.30	14.31	2.65	2.45	9.47	8.60	5.91	5.32	3.07	2.73	3.75	3.34	3.11	4.40
89	8.96	7.94	14.11	12.45	3.21	2.76	7.22	6.23	5.37	4.62	4.20	3.55	4.20	3.61	3.06	4.20
90	10.98	9.70	13.83	11.89	4.39	3.57	6.33	5.24	5.64	4.72	2.84	2.28	3.37	2.80	2.54	3.64
91	12.32	10.72	11.56	9.55	4.13	3.22	6.79	5.21	4.66	3.66	2.31	1.80	3.11	2.33	2.43	3.59
92	12.15	10.29	13.93	11.22	3.53	2.56	5.39	3.98	4.37	3.21	2.43	1.79	3.72	2.74	1.56	2.41
93	13.18	10.93	12.69	9.96	3.58	2.52	6.36	4.43	4.31	2.92	2.67	1.89	2.82	2.01	1.83	3.32
94	17.83	14.79	12.33	9.20	5.73	3.78	6.18	4.14	4.16	2.79	2.94	2.06	2.29	1.62	1.49	2.66
95	17.30	14.12	12.08	8.86	5.53	3.48	6.71	4.30	3.51	2.26	3.01	1.89	2.59	1.63	1.60	2.92
96	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年	敗血症		高血壓性疾病		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		事故傷害		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)		血管性及未明示之癡呆症	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	19.53	11.27	14.24	8.21	10.70	5.87	14.81	11.94	14.09	11.40	11.27	7.69	6.51	4.05	2.63	1.29
98	16.86	9.44	14.72	8.17	13.00	6.39	14.42	11.20	13.04	10.39	13.35	8.79	4.86	2.91	4.28	2.06
99	17.18	9.25	16.15	8.49	14.54	6.79	13.74	10.71	12.59	9.67	12.17	7.90	4.59	2.60	4.44	2.00

表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
85	568.85	558.35	161.70	155.99	68.10	66.65	62.76	60.47	23.59	23.04	17.25	17.64	14.81	14.80	42.75	41.78
86	565.92	534.47	164.36	153.91	70.06	65.79	61.43	57.33	30.02	27.73	14.55	13.94	17.24	15.80	37.80	35.96
87	578.81	528.10	165.22	148.86	62.67	56.32	60.06	53.70	24.78	22.12	17.72	16.10	17.80	16.00	37.89	36.44
88	579.35	510.34	170.53	149.76	68.29	58.54	53.33	45.15	31.66	27.51	20.52	17.75	16.25	14.54	33.34	31.57
89	598.84	508.07	179.93	153.80	62.93	52.48	61.48	51.02	38.64	31.91	14.66	11.83	18.48	15.35	32.53	30.28
90	617.44	506.38	196.59	160.95	69.44	56.05	62.85	49.69	34.49	27.60	17.86	13.72	19.70	15.75	27.97	25.64
91	615.07	486.19	193.72	154.72	68.88	53.03	56.43	43.79	35.67	27.07	24.14	17.44	18.91	14.60	27.60	25.21
92	633.43	478.70	187.41	144.63	76.82	55.94	63.09	46.02	35.71	26.53	28.46	19.91	20.13	14.57	24.37	21.59
93	647.93	474.26	201.24	149.63	85.88	59.64	56.24	39.19	34.13	24.46	23.27	14.96	21.57	14.97	26.53	23.74
94	683.06	480.28	205.00	148.15	82.62	54.25	64.07	43.39	40.61	27.75	28.84	17.20	25.26	16.55	24.32	21.46
95	654.67	445.74	210.37	146.09	75.79	49.62	53.08	34.17	36.92	24.11	29.12	17.22	20.37	13.06	21.93	19.32
96	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		慢性下呼吸道疾病		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	53.13	32.56	48.58	26.32	27.62	17.36	26.45	13.76	21.11	17.19
98	693.85	425.20	211.03	134.11	86.99	52.89	51.12	29.05	41.72	21.04	33.42	20.41	29.79	15.11	20.54	16.29
99	704.08	421.30	219.66	137.29	82.36	47.58	47.72	26.99	43.44	21.00	30.44	17.70	26.56	12.91	20.45	16.18

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表44·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
85	11.83	11.21	19.32	18.61	5.95	5.88	14.51	13.75	8.40	8.04	4.81	4.78	6.11	5.87	4.12	5.30
86	9.62	8.91	19.02	17.91	5.70	5.31	12.16	11.49	9.16	8.45	3.00	2.81	10.85	10.11	4.62	6.03
87	9.59	9.06	21.25	19.75	4.91	4.58	12.20	11.07	10.20	8.76	2.84	2.69	7.06	6.37	2.84	3.57
88	10.91	9.73	23.35	21.96	2.90	4.77	10.91	9.57	7.17	5.78	4.12	3.40	5.95	4.84	2.82	3.87
89	10.92	9.42	19.32	16.79	3.13	2.44	8.94	7.24	7.56	6.10	5.80	4.57	6.57	5.39	3.59	4.74
90	14.72	13.27	18.32	15.79	4.52	3.58	6.74	5.51	7.28	5.95	3.83	2.94	5.82	4.56	2.53	3.42
91	16.45	13.99	16.07	13.27	4.07	2.97	7.61	5.58	5.77	4.35	2.69	2.07	5.15	3.60	2.61	3.72
92	15.66	13.42	19.20	15.43	4.70	3.22	5.40	4.00	5.24	3.69	3.24	2.24	5.78	4.09	1.77	2.62
93	17.46	14.81	17.22	13.87	4.19	2.83	6.36	4.29	5.66	3.64	3.34	2.25	4.58	3.14	1.94	3.25
94	24.40	20.52	14.97	11.51	5.69	3.62	8.26	5.49	5.53	3.57	4.05	2.78	3.90	2.70	1.33	2.20
95	24.12	20.00	16.39	12.38	5.70	3.34	7.34	4.78	4.53	2.83	3.36	2.06	4.14	2.46	1.25	2.40
96	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年	腎炎、腎徵候群及腎性病變		高血壓性疾病		敗血症		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)		主動脈瘤及剝離	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	18.83	11.24	16.01	9.43	20.64	11.78	18.13	15.00	15.46	10.94	10.36	5.63	7.93	4.79	3.85	2.26
98	19.67	10.79	16.28	9.25	18.41	10.28	18.49	14.83	18.33	12.76	11.22	5.05	5.77	3.39	4.27	2.79
99	18.55	10.57	18.31	9.74	18.23	9.72	16.81	13.01	15.70	10.91	13.48	6.09	5.95	3.48	5.55	3.40

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎徵候群及腎性病變		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
85	346.60	384.85	95.32	102.11	37.58	42.33	41.17	46.07	24.82	27.76	13.29	14.93	8.10	9.40	5.27	5.03
86	360.94	381.88	105.07	108.40	41.67	44.63	40.52	43.01	28.01	29.90	11.82	12.55	6.68	7.30	6.83	6.47
87	354.16	359.17	101.48	100.73	39.07	39.75	39.53	40.17	24.63	25.10	13.76	13.97	7.53	7.74	5.78	5.41
88	363.23	354.77	99.92	95.83	40.07	38.68	38.35	37.28	33.68	32.98	15.49	15.09	9.55	9.41	5.19	4.62
89	371.52	347.71	103.56	96.02	32.07	29.71	43.09	39.97	37.32	34.73	16.11	14.98	9.29	8.60	7.04	6.37
90	386.85	346.12	114.12	101.60	35.72	31.32	43.21	38.11	33.92	30.31	17.45	15.28	10.03	8.53	7.34	6.33
91	394.76	336.33	123.33	105.00	41.44	34.13	37.32	30.92	31.79	26.66	15.71	13.06	10.02	8.19	8.30	7.14
92	404.96	328.28	117.42	96.19	48.28	37.79	37.90	29.85	36.10	28.60	18.09	14.30	14.80	11.55	8.75	7.39
93	402.84	312.67	120.38	94.63	46.79	34.35	38.55	28.72	33.91	26.02	16.84	12.63	11.00	7.84	9.06	8.26
94	417.20	309.11	124.20	93.11	45.27	31.66	40.78	28.68	34.94	25.11	16.46	11.53	15.11	10.25	11.52	9.63
95	408.57	288.49	128.65	92.46	41.39	27.76	37.37	24.78	35.21	23.87	16.68	11.39	15.04	9.47	10.80	8.87
96	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎徵候群 及腎性病變		敗血症	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	38.61	22.90	26.93	16.79	24.49	14.14	18.57	11.35	18.49	10.99
98	451.14	276.88	140.20	90.07	49.43	28.58	35.64	20.63	29.79	17.72	23.12	12.35	14.97	8.70	15.41	8.77
99	456.13	265.58	137.69	85.62	50.61	27.23	32.92	17.61	28.48	16.12	25.97	12.95	17.76	9.80	16.20	8.98

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表45·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
85	8.71	9.53	16.19	16.85	4.12	4.65	10.54	12.06	5.58	6.32	1.83	2.11	2.90	4.36	0.46	0.50
86	7.83	8.20	14.74	14.94	4.22	4.57	9.82	10.47	4.84	5.11	1.84	2.02	3.53	4.85	0.69	0.79
87	8.51	8.65	15.05	14.87	3.95	4.06	9.27	9.49	5.09	5.10	1.67	1.71	2.58	3.61	0.53	0.56
88	7.37	7.15	16.62	16.43	2.41	2.42	8.05	7.76	4.66	4.58	2.03	1.95	3.38	4.95	0.45	0.45
89	8.99	8.51	12.96	12.93	3.30	3.02	5.55	5.14	3.22	2.95	2.62	2.40	2.55	3.64	1.27	1.13
90	9.44	8.56	10.56	10.05	4.27	3.70	5.92	5.13	4.04	3.49	1.87	1.60	2.55	3.86	0.97	0.86
91	7.18	6.18	11.59	11.02	4.19	3.46	5.98	4.82	3.59	2.95	1.94	1.56	2.24	3.45	0.67	0.58
92	8.82	7.44	10.39	9.44	2.39	1.84	5.38	4.13	3.51	2.70	1.64	1.31	1.35	2.20	1.05	0.84
93	8.31	6.60	9.06	7.40	2.99	2.15	6.36	4.65	2.99	2.20	2.02	1.51	1.72	3.40	1.27	0.99
94	9.80	7.32	7.71	7.05	5.76	4.00	4.19	2.87	2.84	1.97	1.87	1.36	1.65	3.15	0.97	0.76
95	7.97	5.79	7.30	6.30	5.36	3.59	6.10	3.95	2.53	1.69	2.68	1.74	1.94	3.45	1.56	1.06
96	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		高血壓性疾病		慢性下呼吸道疾病		慢性肝病及肝硬化		蓄意自我傷害(自殺)		事故傷害		血管性及未明示之癡呆症		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	11.02	6.25	12.58	7.27	8.06	4.57	7.32	4.87	10.28	8.19	8.88	6.98	2.81	1.48	2.74	1.52
98	14.67	7.76	13.26	7.33	8.82	4.61	8.67	5.38	7.93	6.48	8.67	6.49	5.04	2.57	2.22	1.23
99	15.54	7.61	14.13	7.43	9.62	4.94	8.88	5.36	8.66	6.70	7.47	5.74	4.51	2.11	3.48	1.90

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		3,180	120.31		3,366	128.52		3,504	134.67		3,489	133.21		3,564	134.97		3,738	141.38
162	肺癌	1	615	23.27	1	645	24.63	1	718	27.59	1	729	27.83	1	750	28.40	1	751	28.41
155	肝癌	2	570	21.56	2	581	22.18	2	606	23.29	2	588	22.45	2	564	21.36	2	562	21.26
153 154	結腸直腸癌	3	329	12.45	3	386	14.74	3	366	14.07	3	398	15.20	3	417	15.79	3	462	17.47
174	女性乳癌(1)	5	135	10.23	5	153	11.69	4	182	13.97	5	164	12.47	4	162	12.18	4	169	12.66
151	胃癌	4	328	12.41	4	356	13.59	5	346	13.30	4	327	12.48	5	317	12.00	5	328	12.41
185	攝護腺癌(2)	7	51	3.85	7	68	5.19	8	65	5.00	8	66	5.06	7	91	6.94	7	93	7.10
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	92	3.48	8	133	5.08	7	133	5.11	7	136	5.19	8	143	5.42	9	136	5.14
157	胰臟癌	9	97	3.67	9	111	4.24	10	109	4.19	9	112	4.28	9	122	4.62	8	138	5.22
179 180	子宮頸癌(1)	6	108	8.18	6	102	7.79	6	128	9.82	6	102	7.75	6	113	8.50	6	97	7.27
156	膽囊癌	15	64	2.42	14	81	3.09	16	71	2.73	11	93	3.55	12	94	3.56	12	104	3.93
183	卵巢癌(1)	11	44	3.33	12	44	3.36	15	36	2.76	14	42	3.19	13	41	3.08	14	42	3.15
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	78	2.95	13	88	3.36	9	113	4.34	15	79	3.02	10	98	3.71	10	113	4.27
150	食道癌	14	75	2.84	14	81	3.09	11	102	3.92	12	88	3.36	11	97	3.67	11	108	4.08
204-208	白血病	8	100	3.78	11	89	3.40	12	94	3.61	10	99	3.78	14	76	2.88	13	99	3.74
188	膀胱癌	17	57	2.16	17	55	2.10	17	56	2.15	16	66	2.52	16	66	2.50	15	83	3.14
	其他		437	16.53		393	15.01		379	14.57		400	15.27		413	15.64		453	17.13
註：	年中人口數		2,643,220		2,619,118		2,601,934		2,619,216		2,640,626		2,643,893						

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		4,089	154.88		4,169	158.05		4,001	151.87		4,202	160.09		4,290	163.78		4,423	168.54
162	肺癌	1	883	33.45	1	889	33.70	1	847	32.15	1	880	33.53	1	870	33.21	1	910	34.68
155	肝癌	2	671	25.42	2	661	25.06	2	664	25.20	2	677	25.79	2	607	23.17	2	702	26.75
153 154	結腸直腸癌	3	444	16.82	3	490	18.58	3	436	16.55	3	518	19.73	3	542	20.69	3	532	20.27
174	女性乳癌(1)	4	199	14.90	4	192	14.36	4	208	15.55	4	203	15.20	4	224	16.76	4	209	15.56
151	胃癌	5	349	13.22	5	374	14.18	5	294	11.16	5	311	11.85	5	354	13.51	5	363	13.83
185	攝護腺癌(2)	6	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	6	122	9.46	6	133	10.37	6	129	10.07
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	130	4.92	8	172	6.52	8	166	6.30	9	148	5.64	7	181	6.91	8	175	6.67
157	胰臟癌	9	124	4.70	9	157	5.95	9	146	5.54	8	164	6.25	9	168	6.41	7	178	6.78
179 180	子宮頸癌(1)	7	110	8.24	7	105	7.85	7	85	6.35	7	87	6.51	8	86	6.43	10	81	6.03
156	膽囊癌	12	106	4.01	11	119	4.51	13	101	3.83	11	125	4.76	12	120	4.58	12	116	4.42
183	卵巢癌(1)	11	56	4.19	12	53	3.96	14	49	3.66	12	58	4.34	14	50	3.74	11	73	5.43
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	113	4.28	14	92	3.49	10	125	4.74	10	138	5.26	10	146	5.57	9	166	6.33
150	食道癌	13	103	3.90	10	123	4.66	12	104	3.95	14	106	4.04	11	126	4.81	14	97	3.70
204-208	白血病	14	97	3.67	13	94	3.56	11	109	4.14	13	108	4.11	13	100	3.82	13	98	3.73
188	膀胱癌	16	76	2.88	17	60	2.27	16	56	2.13	15	92	3.51	16	66	2.52	16	82	3.12
	其他		508	19.24		482	18.27		504	19.13		465	17.72		517	19.74		512	19.51
註：	年中人口數		2,640,138		2,637,829		2,634,497		2,624,805		2,619,424		2,624,309						

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表46· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		4,566	173.56	C00-C97	所有癌症死亡原因		4,467	170.10		4,563	174.48		4,632	177.26
162	肺癌	1	987	37.52	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34	1	967	36.98	1	990	37.89
155	肝癌	2	666	25.32	C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69	2	665	25.43	2	644	24.65
153 154	結腸直腸癌	3	557	21.17	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59	3	592	22.64	3	570	21.81
174	女性乳癌(1)	4	203	15.03	C50	女性乳房癌(1)	4	228	16.87	4	236	17.49	4	266	19.68
151	胃癌	5	329	12.51	C16	胃癌	5	312	11.88	5	319	12.20	5	307	11.75
185	攝護腺癌(2)	6	136	10.62	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	124	9.73	6	142	11.22	6	144	11.41
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	7	217	8.25	C25	胰臟癌	7	192	7.31	7	237	9.06	7	211	8.07
157	胰臟癌	8	178	6.77	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	131	4.99	12	119	4.55	8	152	5.82
179 180	子宮頸癌(1)	9	89	6.59	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	131	4.99	8	148	5.66	9	151	5.78
156	膽囊癌	10	149	5.66	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	75	5.55	9	69	5.11	10	71	5.25
183	卵巢癌(1)	11	74	5.48	C15	食道癌	12	120	4.57	10	129	4.93	11	137	5.24
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	134	5.09	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	13	58	4.29	11	65	4.82	12	66	4.88
150	食道癌	13	126	4.79	C91-C95	白血病	11	121	4.61	13	106	4.05	13	107	4.09
204-208	白血病	14	107	4.07	C67	膀胱癌	15	80	3.05	14	80	3.06	14	95	3.64
188	膀胱癌	15	91	3.46	C71	腦癌	20	49	1.87	18	56	2.14	15	69	2.64
	其他		523	19.88		其他		650	24.75		633	24.20		652	24.95

註： 年中人口數 2,630,756 2,626,096 2,615,176 2,613,100

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		1,977	149.38		2,118	161.70		2,135	164.36		2,154	165.22		2,235	170.53		2,356	179.93
162	肺癌	2	414	31.28	1	448	34.20	1	471	36.26	1	482	36.97	1	542	41.35	1	514	39.26
155	肝癌	1	436	32.94	2	445	33.97	2	458	35.26	2	460	35.28	2	430	32.81	2	432	32.99
153 154	結腸直腸癌	4	191	14.43	4	236	18.02	4	226	17.40	4	220	16.87	3	240	18.31	3	264	20.16
151	胃癌	3	212	16.02	3	255	19.47	3	228	17.55	3	228	17.49	4	203	15.49	4	218	16.65
185	攝護腺癌	11	51	3.85	8	68	5.19	8	65	5.00	9	66	5.06	5	91	6.94	7	93	7.10
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	66	4.99	5	80	6.11	7	79	6.08	6	74	5.68	6	86	6.56	8	91	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	73	5.52	6	77	5.88	5	101	7.78	6	74	5.68	7	82	6.26	6	94	7.18
150	食道癌	8	64	4.84	7	69	5.27	6	90	6.93	5	79	6.06	7	82	6.26	5	100	7.64
157	胰臟癌	9	63	4.76	10	63	4.81	10	58	4.47	8	72	5.52	9	73	5.57	9	84	6.42
156	膽囊癌	16	27	2.04	12	40	3.05	14	34	2.62	12	56	4.30	11	52	3.97	11	55	4.20
204-208	白血病	7	65	4.91	11	55	4.20	11	53	4.08	10	64	4.91	12	49	3.74	10	68	5.19
188	膀胱癌	12	42	3.17	12	40	3.05	12	41	3.16	13	51	3.91	13	48	3.66	12	54	4.12
147	鼻咽癌	9	63	4.76	9	67	5.12	9	64	4.93	11	57	4.37	10	54	4.12	13	51	3.89
191	腦癌	14	29	2.19	14	37	2.82	12	41	3.16	15	33	2.53	15	27	2.06	15	26	1.99
161	喉癌	15	28	2.12	16	17	1.30	17	12	0.92	16	21	1.61	16	25	1.91	16	24	1.83
	其他		153	11.56		121	9.24		114	8.78		117	8.97		151	11.52		188	14.36

註： 年中人口數 1,323,509 1,309,828 1,298,943 1,303,713 1,310,612 1,309,371

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		2,565	196.59		2,520	193.72		2,430	187.41		2,594	201.24		2,630	205.00		2,695	210.37
162	肺癌	1	619	47.44	1	588	45.20	1	572	44.12	1	599	46.47	1	562	43.81	1	608	47.46
155	肝癌	2	491	37.63	2	492	37.82	2	477	36.79	2	495	38.40	2	445	34.69	2	518	40.43
153 154	結腸直腸癌	3	261	20.00	3	285	21.91	3	246	18.97	3	306	23.74	3	306	23.85	3	316	24.67
151	胃癌	4	244	18.70	4	231	17.76	4	185	14.27	4	198	15.36	4	236	18.40	4	240	18.73
185	攝護腺癌	5	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	5	122	9.46	5	133	10.37	6	129	10.07
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	90	6.90	7	97	7.46	8	92	7.10	7	91	7.06	8	115	8.96	7	112	8.74
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	6	96	7.36	9	82	6.30	5	111	8.56	5	122	9.46	6	133	10.37	5	147	11.47
150	食道癌	7	92	7.05	5	116	8.92	7	96	7.40	7	91	7.06	7	116	9.04	9	87	6.79
157	胰臟癌	9	71	5.44	8	96	7.38	9	86	6.63	9	89	6.90	9	103	8.03	8	96	7.49
156	膽囊癌	13	52	3.99	10	61	4.69	12	52	4.01	11	65	5.04	10	70	5.46	11	60	4.68
204-208	白血病	10	62	4.75	12	48	3.69	10	66	5.09	10	68	5.28	11	59	4.60	12	54	4.22
188	膀胱癌	11	61	4.68	13	46	3.54	13	41	3.16	12	62	4.81	13	45	3.51	13	50	3.90
147	鼻咽癌	11	61	4.68	11	52	4.00	11	54	4.16	13	55	4.27	12	59	4.60	10	65	5.07
191	腦癌	16	28	2.15	15	28	2.15	16	21	1.62	15	26	2.02	14	32	2.49	14	33	2.58
161	喉癌	15	36	2.76	16	17	1.31	14	33	2.55	16	18	1.40	15	20	1.56	16	20	1.56
	其他		181	13.87		175	13.45		191	14.73		187	14.51		196	15.28		160	12.49
註：	年中人口數		1,304,744		1,300,818		1,296,600		1,289,022		1,282,908		1,281,102						

表47·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		2,757	215.37	C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73		2,671	211.03		2,771	219.66
162	肺癌	1	635	49.60	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54	1	596	47.09	1	617	48.91
155	肝癌	2	488	38.12	C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30	2	449	35.47	2	443	35.12
153 154	結腸直腸癌	3	308	24.06	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13	3	311	24.57	3	331	26.24
151	胃癌	4	214	16.72	C16	胃癌	4	218	17.11	4	203	16.04	4	197	15.62
185	攝護腺癌	5	136	10.62	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73	5	142	11.22	5	144	11.41
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	129	10.08	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02	7	136	10.75	6	139	11.02
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	117	9.14	C25	胰臟癌	7	114	8.95	6	137	10.82	7	126	9.99
150	食道癌	8	107	8.36	C15	食道癌	8	107	8.40	8	109	8.61	8	115	9.12
157	胰臟癌	9	91	7.11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96	9	77	6.08	9	102	8.09
156	膽囊癌	10	89	6.95	C91-C95	白血病	9	76	5.96	10	64	5.06	10	65	5.15
204-208	白血病	11	68	5.31	C67	膀胱癌	12	57	4.47	11	56	4.42	11	63	4.99
188	膀胱癌	12	65	5.08	C11	鼻咽癌	11	61	4.79	12	49	3.87	12	56	4.44
147	鼻咽癌	13	63	4.92	C71	腦癌	15	26	2.04	15	35	2.77	13	41	3.25
191	腦癌	14	26	2.03	C64	腎臟癌	14	26	2.04	13	38	3.00	14	39	3.09
161	喉癌	15	19	1.48	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43	14	38	3.00	15	30	2.38
	其他		202	15.78		其他		253	19.85		231	18.25		263	20.85
註：	年中人口數		1,280,124					1,274,252			1,265,699			1,261,502	

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		1,203	91.16		1,248	95.32		1,369	105.07		1,335	101.48		1,329	99.92		1,382	103.56
162	肺癌	1	201	15.23	1	197	15.05	1	247	18.96	1	247	18.78	1	208	15.64	1	237	17.76
153 154	結腸直腸癌	2	138	10.46	3	150	11.46	4	140	10.74	2	178	13.53	2	177	13.31	2	198	14.84
174	女性乳癌	3	135	10.23	2	153	11.69	2	182	13.97	3	164	12.47	3	162	12.18	3	169	12.66
155	肝癌	4	134	10.15	4	136	10.39	3	148	11.36	4	128	9.73	4	134	10.08	4	130	9.74
151	胃癌	5	116	8.79	6	101	7.71	6	118	9.06	6	99	7.53	5	114	8.57	5	110	8.24
179 180	子宮頸癌	6	108	8.18	5	102	7.79	5	128	9.82	5	102	7.75	6	113	8.50	6	97	7.27
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	11	26	1.97	7	53	4.05	7	54	4.14	7	62	4.71	7	57	4.29	9	45	3.37
157	胰臟癌	10	34	2.58	8	48	3.67	8	51	3.91	9	40	3.04	8	49	3.68	7	54	4.05
183	卵巢癌	7	44	3.33	9	44	3.36	11	36	2.76	8	42	3.19	10	41	3.08	10	42	3.15
156	膽囊癌	8	37	2.80	10	41	3.13	10	37	2.84	10	37	2.81	9	42	3.16	8	49	3.67
204-208	白血病	9	35	2.65	11	34	2.60	9	41	3.15	11	35	2.66	11	27	2.03	11	31	2.32
182	子宮體癌	19	8	0.61	18	7	0.53	-	-	-	25	1	0.08	12	20	1.50	15	17	1.27
188	膀胱癌	15	15	1.14	15	15	1.15	15	15	1.15	15	15	1.14	13	18	1.35	12	29	2.17
191	腦癌	12	23	1.74	12	23	1.76	12	31	2.38	12	27	2.05	17	12	0.90	16	15	1.12
150	食道癌	16	11	0.83	16	12	0.92	16	12	0.92	18	9	0.68	16	15	1.13	18	8	0.60
	其他		138	10.46		132	10.08		129	9.90		149	11.33		140	10.53		151	11.31

註： 年中人口數 1,319,712 1,309,291 1,302,990 1,315,503 1,330,014 1,334,522

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年				
		順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	順位	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		1,524	114.12	1,649	123.33	1,571	117.42	1,608	120.38	1,660	124.20	1,728	128.65		
162	肺癌	1	264	19.77	1	301	22.51	1	275	20.55	1	308	23.05	1	302	22.48
153 154	結腸直腸癌	3	183	13.70	2	205	15.33	3	190	14.20	2	212	15.87	2	236	17.66
174	女性乳癌	2	199	14.90	3	192	14.36	2	208	15.55	3	203	15.20	3	224	16.76
155	肝癌	4	180	13.48	4	169	12.64	4	187	13.98	4	182	13.62	4	162	12.12
151	胃癌	6	105	7.86	5	143	10.70	5	109	8.15	5	113	8.46	5	118	8.83
179 180	子宮頸癌	5	110	8.24	6	105	7.85	6	85	6.35	6	87	6.51	6	86	6.43
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	40	3.00	7	75	5.61	7	74	5.53	10	57	4.27	7	66	4.94
157	胰臟癌	9	53	3.97	8	61	4.56	8	60	4.48	7	75	5.61	8	65	4.86
183	卵巢癌	7	56	4.19	10	53	3.96	9	49	3.66	9	58	4.34	10	50	3.74
156	膽囊癌	8	54	4.04	9	58	4.34	9	49	3.66	8	60	4.49	9	50	3.74
204-208	白血病	11	35	2.62	11	46	3.44	11	43	3.21	11	40	2.99	11	41	3.07
182	子宮體癌	16	16	1.20	13	23	1.72	15	16	1.20	14	22	1.65	13	22	1.65
188	膀胱癌	17	15	1.12	16	14	1.05	16	15	1.12	12	30	2.25	14	21	1.57
191	腦癌	14	22	1.65	15	18	1.35	12	23	1.72	13	24	1.80	12	25	1.87
150	食道癌	18	11	0.82	21	7	0.52	21	8	0.60	18	15	1.12	18	10	0.75
	其他		181	13.55		179	13.39		180	13.45		149	11.15		176	13.17
註：	年中人口數		1,335,394		1,337,010		1,337,897		1,335,782		1,336,516		1,343,207			

表48·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	96年			死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		1,809	133.94	C00-C97	所有癌症死亡原因		1,769	130.86		1,892	140.20		1,861	137.69	
162	肺癌	1	352	26.06	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78	1	371	27.49	1	373	27.60	
153 154	結腸直腸癌	2	249	18.44	C50	女性乳房癌	3	228	16.87	3	236	17.49	2	266	19.68	
174	女性乳癌	3	203	15.03	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31	2	281	20.82	3	239	17.68	
155	肝癌	4	178	13.18	C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76	4	216	16.01	4	201	14.87	
151	胃癌	5	115	8.51	C16	胃癌	5	94	6.95	5	116	8.60	5	110	8.14	
179 180	子宮頸癌	6	89	6.59	C25	胰臟癌	6	78	5.77	6	100	7.41	6	85	6.29	
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	7	88	6.52	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	75	5.55	7	69	5.11	7	71	5.25	
157	胰臟癌	8	87	6.44	C56,C57.0-C57.4	卵巢癌	8	58	4.29	8	65	4.82	8	66	4.88	
183	卵巢癌	9	74	5.48	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07	10	42	3.11	9	50	3.70	
156	膽囊癌	10	60	4.44	C91-C95	白血病	10	45	3.33	9	42	3.11	10	42	3.11	
204-208	白血病	11	39	2.89	C67	膀胱癌	15	23	1.70	13	24	1.78	11	32	2.37	
182	子宮體癌	12	26	1.93	C54	子宮體癌	12	28	2.07	14	23	1.70	12	29	2.15	
188	膀胱癌	13	26	1.93	C71	腦癌	15	23	1.70	15	21	1.56	13	28	2.07	
191	腦癌	14	20	1.48	C64	腎臟癌	17	22	1.63	12	25	1.85	14	25	1.85	
150	食道癌	15	19	1.41	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	11	35	2.59	11	35	2.59	15	22	1.63	
	其他		184	13.62		其他		223	16.50		226	16.75		222	16.43	
註：	年中人口數		1,350,632				1,351,844				1,349,477			1,351,598		

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
85	128.52	130.61	24.63	25.11	22.18	22.54	14.74	15.13	11.69	11.54	13.59	13.65	5.19	4.70	5.08	5.21
86	134.67	131.73	27.59	26.66	23.29	22.95	14.07	13.85	13.97	13.25	13.30	12.96	5.00	4.66	5.11	5.10
87	133.21	125.92	27.83	25.93	22.45	21.54	15.20	14.56	12.47	11.87	12.48	11.57	5.06	4.30	5.19	5.01
88	134.97	123.57	28.40	25.63	21.36	19.93	15.79	14.44	12.18	11.19	12.00	10.83	6.94	5.68	5.42	4.86
89	141.38	125.80	28.41	24.95	21.26	19.43	17.47	15.37	12.66	11.48	12.41	10.71	7.10	5.68	5.14	4.61
90	154.88	132.24	33.45	28.02	25.42	22.35	16.82	14.23	14.90	12.94	13.22	11.07	9.20	6.83	4.92	4.15
91	158.05	129.89	33.70	27.17	25.06	21.27	18.58	15.06	14.36	12.05	14.18	11.21	8.15	5.70	6.52	5.31
92	151.87	120.46	32.15	25.14	25.20	20.37	16.55	12.76	15.55	12.66	11.16	8.52	8.25	5.53	6.30	5.13
93	160.09	122.12	33.53	25.03	25.79	20.05	19.73	14.86	15.20	11.80	11.85	8.66	9.46	5.88	5.64	4.32
94	163.78	120.21	33.21	23.58	23.17	17.60	20.69	14.85	16.76	12.67	13.51	9.41	10.37	6.14	6.91	5.12
95	168.54	118.90	34.68	23.70	26.75	19.75	20.27	14.03	15.56	11.37	13.83	9.15	10.07	5.68	6.67	4.78
96	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68

年	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		女性乳房癌		胃癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	170.10	112.87	35.34	22.90	26.69	18.47	21.59	13.90	16.87	11.66	11.88	7.51	9.73	5.35	7.31	4.85
98	174.48	111.24	36.98	22.87	25.43	16.63	22.64	14.01	17.49	11.55	12.20	7.31	11.22	5.88	9.06	5.74
99	177.26	110.14	37.89	22.60	24.65	15.83	21.81	13.10	19.68	12.87	11.75	6.67	11.41	5.86	8.07	5.06

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表49·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
85	4.24	4.31	7.79	8.16	3.09	3.24	3.36	3.51	3.36	3.49	3.09	3.20	3.40	3.51	2.10	2.13
86	4.19	4.01	9.82	10.16	2.73	2.76	2.76	2.82	4.34	4.20	3.92	3.80	3.61	3.61	2.15	2.12
87	4.28	4.00	7.75	7.32	3.55	3.45	3.19	3.00	3.02	2.76	3.36	3.16	3.78	3.66	2.52	2.37
88	4.62	4.19	8.50	7.95	3.56	3.28	3.08	2.90	3.71	3.51	3.67	3.49	2.88	2.79	2.50	2.25
89	5.22	4.57	7.27	6.51	3.93	3.55	3.15	2.85	4.27	3.84	4.08	3.62	3.74	3.48	3.14	2.78
90	4.70	3.91	8.24	7.39	4.01	3.40	4.19	3.62	4.28	3.71	3.90	3.42	3.67	3.19	2.88	2.28
91	5.95	4.89	7.85	6.60	4.51	3.72	3.96	3.31	3.49	3.00	4.66	3.88	3.56	3.15	2.27	1.80
92	5.54	4.31	6.35	5.09	3.83	2.96	3.66	3.05	4.74	3.93	3.95	3.16	4.14	3.70	2.13	1.58
93	6.25	4.84	6.51	4.90	4.76	3.56	4.34	3.38	5.26	4.26	4.04	3.19	4.11	3.43	3.51	2.44
94	6.41	4.61	6.43	4.89	4.58	3.44	3.74	2.76	5.57	4.30	4.81	3.76	3.82	3.07	2.52	1.74
95	6.78	4.75	6.03	4.26	4.42	3.04	5.43	3.91	6.33	4.81	3.70	2.66	3.73	2.77	3.12	1.97
96	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年	非何杰金氏淋巴瘤		口腔癌		子宮頸及部位未明 示子宮癌		食道癌		卵巢癌		白血病		膀胱癌		腦癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	4.99	3.18	4.99	3.43	5.55	3.62	4.57	3.16	4.29	2.96	4.61	3.42	3.05	1.83	1.87	1.58
98	4.55	2.85	5.66	3.78	5.11	3.31	4.93	3.23	4.82	3.36	4.05	2.92	3.06	1.72	2.14	1.63
99	5.82	3.39	5.78	3.90	5.25	3.39	5.24	3.43	4.88	3.21	4.09	2.78	3.64	1.97	2.64	2.08

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤		口腔癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
85	161.70	155.99	34.20	32.85	33.97	33.64	18.02	17.08	19.47	18.18	5.19	4.70	6.11	5.84	5.88	6.16
86	164.36	153.91	36.26	32.50	35.26	33.96	17.40	16.38	17.55	16.28	5.00	4.66	6.08	5.66	7.78	7.49
87	165.22	148.86	36.97	31.79	35.28	32.90	16.87	15.20	17.49	15.13	5.06	4.30	5.68	5.32	5.68	5.23
88	170.53	149.76	41.35	35.19	32.81	29.90	18.31	15.99	15.49	13.17	6.94	5.68	6.56	5.54	6.26	6.04
89	179.93	153.80	39.26	32.31	32.99	29.86	20.16	16.82	16.65	13.60	7.10	5.68	6.95	5.93	7.18	6.62
90	196.59	160.95	47.44	37.48	37.63	32.68	20.00	16.23	18.70	14.79	9.20	6.83	6.90	5.62	7.36	6.51
91	193.72	154.72	45.20	34.72	37.82	32.06	21.91	17.15	17.76	13.19	8.15	5.70	7.46	5.76	6.30	5.62
92	187.41	144.63	44.12	33.18	36.79	29.57	18.97	14.09	14.27	10.49	8.25	5.53	7.10	5.52	8.56	7.37
93	201.24	149.63	46.47	33.20	38.40	30.08	23.74	17.23	15.36	10.60	9.46	5.88	7.06	5.28	9.46	7.95
94	205.00	148.15	43.81	30.08	34.69	26.89	23.85	16.86	18.40	12.46	10.37	6.14	8.96	6.51	10.37	8.18
95	210.37	146.09	47.46	31.25	40.43	30.73	24.67	17.02	18.73	11.98	10.07	5.68	8.74	6.09	11.47	9.00
96	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		胃癌		前列腺(攝護腺)癌		口腔癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	17.11	10.69	9.73	5.35	9.02	6.44	8.95	6.11
98	211.03	134.11	47.09	28.32	35.47	24.25	24.57	15.19	16.04	9.38	11.22	5.88	10.75	7.48	10.82	6.77
99	219.66	137.29	48.91	29.60	35.12	23.28	26.24	15.97	15.62	8.91	11.41	5.86	11.02	7.70	9.99	6.41

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表50·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
85	5.27	5.11	4.81	4.51	3.05	3.09	4.20	4.09	3.05	2.94	5.12	4.97	2.82	2.58	1.30	1.19
86	6.93	6.52	4.47	3.94	2.62	2.49	4.08	3.97	3.16	2.95	4.93	4.81	3.16	3.31	0.92	0.86
87	6.06	5.53	5.52	4.87	4.30	4.04	4.91	4.67	3.91	3.40	4.37	4.25	2.53	2.44	1.61	1.43
88	6.26	5.88	5.57	4.66	3.97	3.50	3.74	3.61	3.66	3.12	4.12	3.78	2.06	1.89	1.91	1.78
89	7.64	6.64	6.42	5.28	4.20	3.54	5.19	4.62	4.12	3.52	3.89	3.66	1.99	1.82	1.83	1.60
90	7.05	6.06	5.44	4.27	3.99	3.21	4.75	4.16	4.68	4.03	4.68	3.42	2.15	1.80	2.76	2.35
91	8.92	7.40	7.38	6.10	4.69	3.73	3.69	3.21	3.54	2.61	4.00	3.50	2.15	1.84	1.31	1.05
92	7.40	5.96	6.63	5.08	4.01	2.99	5.09	4.35	3.16	2.26	4.16	3.52	1.62	1.34	2.55	2.01
93	7.06	5.68	6.90	5.20	5.04	3.74	5.28	4.16	4.81	3.12	4.27	3.39	2.02	1.75	1.40	1.00
94	9.04	7.40	8.03	5.72	5.46	4.02	4.60	3.50	3.51	2.20	4.60	3.67	2.49	2.11	1.56	1.04
95	6.79	4.87	7.49	5.21	4.68	3.22	4.22	2.91	3.90	2.30	5.07	4.16	2.58	2.02	1.56	0.99
96	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99
年	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		腎臟癌		膽囊和其他膽道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	8.40	5.90	5.96	3.65	5.96	4.28	4.47	2.62	4.79	3.61	2.04	1.86	2.04	1.37	2.43	1.62
98	8.61	5.89	6.08	3.83	5.06	3.61	4.42	2.44	3.87	2.83	2.77	2.07	3.00	2.05	3.00	1.81
99	9.12	6.19	8.09	4.61	5.15	3.38	4.99	2.63	4.44	2.99	3.25	2.40	3.09	1.93	2.38	1.64

表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
85	95.32	102.11	15.05	16.32	11.46	12.60	11.69	11.54	10.39	11.19	7.71	8.31	7.79	8.16	4.05	4.52
86	105.07	108.40	18.96	19.84	10.74	11.24	13.97	13.25	11.36	11.98	9.06	9.12	9.82	10.16	4.14	4.58
87	101.48	100.73	18.78	18.93	13.53	13.74	12.47	11.87	9.73	9.98	7.53	7.45	7.75	7.32	4.71	4.70
88	99.92	95.83	15.64	15.01	13.31	12.87	12.18	11.19	10.08	9.99	8.57	8.16	8.50	7.95	4.29	4.14
89	103.56	96.02	17.76	16.76	14.84	13.81	12.66	11.48	9.74	9.23	8.24	7.39	7.27	6.51	3.37	3.15
90	114.12	101.60	19.77	17.50	13.70	12.12	14.90	12.94	13.48	12.35	7.86	6.94	8.24	7.39	3.00	2.70
91	123.33	105.00	22.51	19.16	15.33	12.92	14.36	12.05	12.64	11.00	10.70	8.90	7.85	6.60	5.61	4.83
92	117.42	96.19	20.55	16.75	14.20	11.38	15.55	12.66	13.98	11.62	8.15	6.45	6.35	5.09	5.53	4.79
93	120.38	94.63	21.04	16.41	15.87	12.42	15.20	11.80	13.62	10.67	8.46	6.55	6.51	4.90	4.27	3.40
94	124.20	93.11	23.05	16.99	17.66	12.94	16.76	12.67	12.12	9.11	8.83	6.35	6.43	4.89	4.94	3.79
95	128.65	92.46	22.48	15.97	16.08	11.23	15.56	11.37	13.70	9.88	9.16	6.31	6.03	4.26	4.69	3.44
96	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63

年	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		女性乳房癌		結腸、直腸和肛門癌		肝和肝內膽管癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸及部位未明示子宮癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	130.86	87.54	24.78	16.27	16.87	11.66	17.31	11.20	15.76	10.79	6.95	4.47	5.77	3.76	5.55	3.62
98	140.20	90.07	27.49	17.54	17.49	11.55	20.82	12.92	16.01	9.98	8.60	5.30	7.41	4.75	5.11	3.31
99	137.69	85.62	27.60	16.36	19.68	12.87	17.68	10.57	14.87	9.27	8.14	4.62	6.29	3.86	5.25	3.39

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
85	3.67	4.07	3.36	3.51	3.13	3.47	2.60	2.82	0.53	0.59	1.15	1.26	1.76	1.84	0.92	1.04
86	3.91	4.15	2.76	2.82	2.84	3.08	3.15	3.26	0.00	0.00	1.15	1.22	2.38	2.48	0.92	0.91
87	3.04	3.07	3.19	3.00	2.81	2.90	2.66	2.63	0.08	0.07	1.14	1.20	2.05	2.08	0.68	0.70
88	3.68	3.64	3.08	2.90	3.16	3.12	2.03	1.96	1.50	1.46	1.35	1.25	0.90	0.86	1.13	1.09
89	4.05	3.77	3.15	2.85	3.67	3.51	2.32	2.26	1.27	1.21	2.17	2.03	1.12	1.06	0.60	0.55
90	3.97	3.50	4.19	3.62	4.04	3.59	2.62	2.46	1.20	1.12	1.12	0.98	1.65	1.63	0.82	0.73
91	4.56	3.82	3.96	3.31	4.34	3.80	3.44	3.11	1.72	1.46	1.05	0.91	1.35	1.21	0.52	0.44
92	4.48	3.58	3.66	3.05	3.66	2.97	3.21	3.00	1.20	0.99	1.12	0.88	1.72	1.44	0.60	0.48
93	5.61	4.50	4.34	3.38	4.49	3.43	2.99	2.65	1.65	1.34	2.25	1.66	1.80	1.70	1.12	0.86
94	4.86	3.55	3.74	2.76	3.74	2.88	3.07	2.58	1.65	1.33	1.57	1.20	1.87	1.63	0.75	0.52
95	6.10	4.35	5.43	3.91	4.17	2.93	3.28	2.52	1.86	1.41	2.38	1.62	1.64	1.30	0.74	0.56
96	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94

年	卵巢癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		膀胱癌		子宮體癌		腦癌		腎臟癌		膽囊和其他膽道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	4.29	2.96	4.07	2.73	3.33	2.61	1.70	1.05	2.07	1.42	1.70	1.32	1.63	1.05	2.59	1.68
98	4.82	3.36	3.11	1.96	3.11	2.22	1.78	1.03	1.70	1.15	1.56	1.21	1.85	1.14	2.59	1.67
99	4.88	3.21	3.70	2.25	3.11	2.19	2.37	1.32	2.15	1.46	2.07	1.75	1.85	1.12	1.63	1.02

肆、歷年死因統計

二、行政區別死因統計

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		797	375.45		837	397.63		832	400.24		838	404.81		894	430.00		901	434.30
08-14	惡性腫瘤	1	224	105.52	1	254	120.67	1	256	123.15	1	261	126.08	1	249	119.77	1	309	148.95
25-27-28*	心臟疾病	3	91	42.87	2	104	49.41	2	85	40.89	2	93	44.93	2	91	43.77	3	75	36.15
29	腦血管疾病	2	103	48.52	3	99	47.03	3	83	39.93	3	92	44.44	4	82	39.44	2	104	50.13
181	糖尿病	4	42	19.79	5	41	19.48	4	57	27.42	4	47	22.70	4	82	39.44	4	64	30.85
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.25	8	19	9.03	7	22	10.58	7	23	11.11	7	25	12.02	6	31	14.94
321	肺炎	6	27	12.72	6	32	15.20	8	20	9.62	7	23	11.11	6	29	13.95	9	16	7.71
E54	自殺	10	17	8.01	11	15	7.13	10	13	6.25	6	24	11.59	10	12	5.77	10	14	6.75
E47-E53	事故傷害	5	30	14.13	4	50	23.75	5	47	22.61	4	47	22.70	3	89	42.81	5	39	18.80
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	9.89	8	19	9.03	9	19	9.14	10	17	8.21	8	23	11.06	7	23	11.09
038	敗血症	12	7	3.30	13	7	3.33	13	9	4.33	14	5	2.42	14	4	1.92	13	5	2.41
	其他		209	98.45		197	93.59		221	106.31		206	99.51		208	100.05		221	106.53

註：年中人口數 212,280 210,498 207,878 207,010 207,906 207,459

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		913	442.84		938	457.20		936	455.61		960	466.52		1,024	494.61		963	461.29
08-14	惡性腫瘤	1	299	145.03	1	280	136.48	1	307	149.43	1	304	147.73	1	313	151.18	1	345	165.26
25-27-28*	心臟疾病	3	89	43.17	2	121	58.98	2	92	44.78	2	101	49.08	2	134	64.72	2	104	49.82
29	腦血管疾病	2	96	46.56	3	88	42.89	4	66	32.13	3	81	39.36	3	91	43.95	3	73	34.97
181	糖尿病	4	56	27.16	4	63	30.71	3	79	38.45	4	62	30.13	4	67	32.36	4	65	31.14
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.61	5	37	18.03	7	29	14.12	7	27	13.12	7	33	15.94	8	26	12.45
321	肺炎	5	39	18.92	6	34	16.57	6	31	15.09	5	42	20.41	5	41	19.80	7	28	13.41
E54	自殺	9	20	9.70	7	24	11.70	9	19	9.25	9	18	8.75	9	20	9.66	6	30	14.37
E47-E53	事故傷害	6	34	16.49	8	23	11.21	5	41	19.96	6	38	18.47	6	35	16.91	5	34	16.29
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	10.19	10	13	6.34	8	23	11.20	8	20	9.72	8	22	10.63	8	26	12.45
038	敗血症	12	7	3.40	11	9	4.39	11	10	4.87	12	9	4.37	11	10	4.83	15	3	1.44
	其他		226	109.62		246	119.91		239	116.34		258	125.38		258	124.62		229	109.69
註：	年中人口數		206,167			205,160			205,441			205,778			207,032			208,762	

表52-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,011	480.96	A00-Y98	所有死亡原因		1,057	502.04		1,044	499.41		1,085	521.10
08-14	惡性腫瘤	1	332	157.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34	1	331	158.34	1	352	169.06
25-27-28*	心臟疾病	2	108	51.38	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	140	66.50	2	124	59.32	2	145	69.64
29	腦血管疾病	3	86	40.91	I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32	3	78	37.31	3	70	33.62
181	糖尿病	4	79	37.58	E10-E14	糖尿病	5	49	23.27	4	72	34.44	4	59	28.34
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	5	41	19.50	J12-J18	肺炎	4	63	29.92	5	48	22.96	5	56	26.90
321	肺炎	6	37	17.60	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	27	12.82	8	33	15.79	6	32	15.37
E54	自殺	7	29	13.80	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	8	31	14.72	10	21	10.05	7	30	14.41
E47-E53	事故傷害	8	26	12.37	A40-A41	敗血症	6	46	21.85	6	34	16.26	8	28	13.45
347	慢性肝病及肝硬化	9	17	8.09	I10-I15	高血壓性疾	7	37	17.57	6	34	16.26	8	28	13.45
038	敗血症	10	14	6.66	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	12	20	9.50	13	14	6.70	10	25	12.01
	其他		242	115.13		其他		251	119.22		255	121.98		260	124.87
註：	年中人口數		210,204				210,542			209,046			208,215		

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,176	479.31		1,172	484.31		1,208	503.23		1,305	541.06		1,230	507.83		1,239	513.88
08-14	惡性腫瘤	1	303	123.50	1	306	126.45	1	327	136.22	1	371	153.82	1	343	141.61	1	351	145.58
25-27-28*	心臟疾病	2	121	49.32	2	135	55.79	2	159	66.24	2	141	58.46	2	145	59.87	2	132	54.75
29	腦血管疾病	3	120	48.91	3	128	52.89	3	134	55.82	3	134	55.56	3	108	44.59	3	124	51.43
181	糖尿病	5	59	24.05	4	71	29.34	4	93	38.74	4	67	27.78	4	89	36.75	4	92	38.16
321	肺炎	6	48	19.56	6	47	19.42	8	30	12.50	8	38	15.75	5	63	26.01	8	30	12.44
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	9	33	13.45	7	45	18.60	6	33	13.75	7	46	19.07	7	45	18.58	7	36	14.93
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.67	9	31	12.81	7	31	12.91	6	51	21.14	8	36	14.86	6	39	16.18
E54	自殺	11	16	6.52	10	30	12.40	12	16	6.67	9	26	10.78	10	26	10.73	9	21	8.71
E47-E53	事故傷害	4	81	33.01	5	63	26.03	5	57	23.75	5	56	23.22	6	58	23.95	5	54	22.40
26	高血壓性疾病	8	34	13.86	8	34	14.05	9	29	12.08	10	25	10.37	9	29	11.97	10	17	7.05
	其他		325	132.46		282	116.53		299	124.56		350	145.11		288	118.91		343	142.26

註：年中人口數 245,352 241,996 240,050 241,194 242,208 241,106

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,355	567.15		1,308	550.86		1,353	573.36		1,331	569.90		1,366	589.70		1,271	549.91
08-14	惡性腫瘤	1	410	171.61	1	383	161.30	1	367	155.52	1	373	159.71	1	430	185.63	1	401	173.50
25-27-28*	心臟疾病	2	151	63.20	2	161	67.80	2	166	70.35	2	178	76.22	3	159	68.64	2	134	57.98
29	腦血管疾病	3	141	59.02	3	111	46.75	3	128	54.24	3	115	49.24	2	163	70.37	3	105	45.43
181	糖尿病	4	90	37.67	5	52	21.90	4	106	44.92	4	74	31.69	4	80	34.54	3	105	45.43
321	肺炎	6	41	17.16	4	73	30.74	5	52	22.04	6	52	22.27	5	51	22.02	5	61	26.39
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	35	14.65	7	43	18.11	6	50	21.19	5	59	25.26	6	50	21.58	6	45	19.47
347	慢性肝病及肝硬化	8	34	14.23	9	25	10.53	9	32	13.56	9	32	13.70	8	31	13.38	9	23	9.95
E54	自殺	9	31	12.98	8	36	15.16	7	39	16.53	8	35	14.99	7	45	19.43	7	40	17.31
E47-E53	事故傷害	5	49	20.51	6	44	18.53	8	37	15.68	7	39	16.70	9	27	11.66	8	28	12.11
26	高血壓性疾病	12	12	5.02	10	20	8.42	10	15	6.36	10	21	8.99	10	18	7.77	10	17	7.36
	其他		361	151.10		360	151.61		361	152.98		353	151.15		312	134.69		312	134.99
註：	年中人口數		238,912		237,446		235,976		233,548		231,643		231,128						

表52-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,363	592.17	A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77		1,357	598.94		1,336	593.18
08-14	惡性腫瘤	1	427	185.51	C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88	1	437	192.88	1	424	188.25
25-27-28*	心臟疾病	2	167	72.55	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	181	79.28	2	142	62.67	2	143	63.49
29	腦血管疾病	3	133	57.78	J12-J18	肺炎	4	87	38.10	5	74	32.66	3	93	41.29
181	糖尿病	4	76	33.02	I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37	3	111	48.99	4	82	36.41
321	肺炎	5	65	28.24	E10-E14	糖尿病	5	51	22.34	4	81	35.75	5	56	24.86
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	6	40	17.38	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	7	47	20.59	9	42	18.54	6	45	19.98
347	慢性肝病及肝硬化	7	29	12.60	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	45	19.71	6	49	21.63	7	42	18.65
E54	自殺	8	27	11.73	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	12	32	14.02	11	30	13.24	8	38	16.87
E47-E53	事故傷害	9	24	10.43	A40-A41	敗血症	6	47	20.59	7	48	21.19	9	36	15.98
26	高血壓性疾病	10	15	6.52	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	34	14.89	10	34	15.01	10	35	15.54
	其他		360	156.40		其他		306	134.02		309	136.38		342	151.85
註：	年中人口數		230,172				228,319			226,567			225,228		

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,416	424.70		1,431	442.54		1,435	454.53		1,414	446.61		1,471	462.50		1,448	456.72
08-14	惡性腫瘤	1	410	122.97	1	455	140.71	1	444	140.64	1	410	129.50	1	438	137.71	1	409	129.00
25-27-28*	心臟疾病	2	184	55.19	2	154	47.63	2	176	55.75	2	181	57.17	2	177	55.65	3	151	47.63
29	腦血管疾病	3	169	50.69	3	148	45.77	3	143	45.29	3	140	44.22	3	151	47.48	2	157	49.52
181	糖尿病	5	74	22.19	5	74	22.88	4	85	26.92	5	65	20.53	4	102	32.07	4	112	35.33
321	肺炎	6	49	14.70	6	43	13.30	9	35	11.09	8	42	13.27	7	43	13.52	8	35	11.04
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	45	13.50	8	41	12.68	7	49	15.52	6	54	17.06	6	49	15.41	6	54	17.03
E47-E53	事故傷害	4	80	23.99	4	79	24.43	5	57	18.05	4	70	22.11	5	66	20.75	5	62	19.56
E54	自殺	9	24	7.20	13	10	3.09	10	28	8.87	13	13	4.11	11	13	4.09	10	21	6.62
038	敗血症	12	10	3.00	11	16	4.95	12	15	4.75	11	15	4.74	16	5	1.57	14	9	2.84
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.60	9	37	11.44	8	37	11.72	9	29	9.16	8	39	12.26	7	38	11.99
	其他		349	104.68		374	115.66		366	115.93		395	124.76		388	121.99		400	126.17

註：年人口數 333,412 323,358 315,709 316,610 318,056 317,044

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,507	476.30		1,509	477.89		1,570	499.42		1,584	506.42		1,638	524.39		1,546	493.66
08-14	惡性腫瘤	1	481	152.02	1	514	162.78	1	488	155.23	1	527	168.49	1	501	160.39	1	495	158.06
25-27-28*	心臟疾病	2	179	56.57	2	158	50.04	2	198	62.98	2	210	67.14	2	225	72.03	2	174	55.56
29	腦血管疾病	3	151	47.72	3	122	38.64	3	139	44.22	3	126	40.28	3	142	45.46	3	121	38.64
181	糖尿病	4	89	28.13	4	111	35.15	4	114	36.26	4	107	34.21	4	106	33.94	4	105	33.53
321	肺炎	6	45	14.22	7	57	18.05	5	76	24.18	6	51	16.31	5	89	28.49	6	46	14.69
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	54	17.07	5	60	19.00	7	54	17.18	5	63	20.14	6	78	24.97	5	58	18.52
E47-E53	事故傷害	7	44	13.91	6	58	18.37	6	62	19.72	7	43	13.75	7	44	14.09	8	37	11.81
E54	自殺	9	24	7.59	8	37	11.72	10	23	7.32	8	35	11.19	8	40	12.81	7	40	12.77
038	敗血症	12	14	4.42	12	10	3.17	12	9	2.86	12	11	3.52	14	6	1.92	11	22	7.02
347	慢性肝病及肝硬化	8	35	11.06	9	30	9.50	8	37	11.77	9	25	7.99	9	30	9.60	8	37	11.81
	其他		391	123.58		382	120.98		370	117.70		386	123.41		377	120.69		411	131.24
註：	年中人口數		316,398			315,766			314,362			312,782			312,360			313,169	

表52-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,598	508.03	A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51		1,667	533.05		1,779	570.95
08-14	惡性腫瘤	1	473	150.37	C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36	1	549	175.55	1	572	183.58
25-27-28*	心臟疾病	2	194	61.68	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	237	75.39	2	200	63.95	2	213	68.36
29	腦血管疾病	3	145	46.10	I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67	3	115	36.77	3	129	41.40
181	糖尿病	4	118	37.51	J12-J18	肺炎	4	92	29.26	4	98	31.34	4	108	34.66
321	肺炎	5	78	24.80	E10-E14	糖尿病	5	74	23.54	5	75	23.98	5	78	25.03
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	6	61	19.39	A40-A41	敗血症	8	54	17.18	10	41	13.11	6	57	18.29
E47-E53	事故傷害	7	37	11.76	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	63	20.04	6	56	17.91	7	48	15.40
E54	自殺	8	36	11.45	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	11	34	10.81	9	42	13.43	8	46	14.76
038	敗血症	9	25	7.95	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	7	55	17.49	7	49	15.67	9	45	14.44
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.99	I10-I15	高血壓性疾病	9	45	14.31	8	48	15.35	9	45	14.44
	其他		409	130.03		其他		429	136.46		394	125.99		438	140.57
註：	年中人口數		314,548					314,386			312,730			311,589	

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		987	440.48		972	444.28		1,037	484.33		989	462.79		949	441.58		1,017	472.82
08-14	惡性腫瘤	1	289	128.97	1	281	128.44	1	323	150.86	1	302	141.32	1	293	136.34	1	325	151.10
25-27-28*	心臟疾病	2	124	55.34	3	120	54.85	3	106	49.51	3	96	44.92	2	99	46.07	3	88	40.91
29	腦血管疾病	3	106	47.31	2	129	58.96	2	111	51.84	2	105	49.13	3	91	42.34	2	99	46.03
181	糖尿病	5	47	20.98	5	46	21.03	5	64	29.89	4	56	26.20	4	59	27.45	3	88	40.91
321	肺炎	7	32	14.28	9	17	7.77	8	30	14.01	8	26	12.17	8	29	13.49	9	17	7.90
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	25	11.16	6	29	13.26	6	37	17.28	7	34	15.91	7	33	15.36	5	52	24.18
E47-E53	事故傷害	4	64	28.56	4	63	28.80	4	75	35.03	5	49	22.93	5	49	22.80	6	46	21.39
E54	自殺	10	20	8.93	9	17	7.77	10	17	7.94	11	17	7.95	9	22	10.24	8	25	11.62
347	慢性肝病及肝硬化	6	37	16.51	8	22	10.06	7	32	14.95	6	39	18.25	6	38	17.68	7	28	13.02
038	敗血症	15	4	1.79	11	13	5.94	13	13	6.07	13	8	3.74	15	5	2.33	13	10	4.65
	其他		239	106.66		235	107.41		229	106.95		257	120.26		231	107.49		239	111.12

註：年人口數 224,076 218,782 214,109 213,703 214,910 215,092

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,074	497.71		1,045	482.00		1,114	512.69		1,123	517.67		1,178	543.14		1,106	506.77
08-14	惡性腫瘤	1	349	161.73	1	359	165.59	1	354	162.92	1	370	170.56	1	374	172.44	1	351	160.83
25-27-28*	心臟疾病	2	110	50.98	2	114	52.58	2	120	55.23	2	154	70.99	2	146	67.32	2	138	63.23
29	腦血管疾病	3	104	48.20	3	87	40.13	3	104	47.86	3	83	38.26	3	102	47.03	3	105	48.11
181	糖尿病	4	100	46.34	4	82	37.82	4	58	26.69	4	71	32.73	4	91	41.96	4	71	32.53
321	肺炎	7	25	11.59	8	26	11.99	7	35	16.11	5	35	16.13	5	49	22.59	6	48	21.99
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	52	24.10	6	31	14.30	5	57	26.23	7	31	14.29	7	36	16.60	7	27	12.37
E47-E53	事故傷害	6	38	17.61	5	41	18.91	6	36	16.57	9	27	12.45	8	33	15.22	8	23	10.54
E54	自殺	7	25	11.59	7	27	12.45	9	27	12.43	5	35	16.13	6	44	20.29	5	49	22.45
347	慢性肝病及肝硬化	9	23	10.66	9	23	10.61	8	30	13.81	8	30	13.83	9	27	12.45	9	22	10.08
038	敗血症	12	8	3.71	12	6	2.77	13	7	3.22	12	5	2.30	10	15	6.92	11	11	5.04
	其他		240	111.22		249	114.85		286	131.62		282	129.99		261	120.34		261	119.59
註：	年中人口數		215,788			216,806			217,284			216,934			216,887			218,244	

表52-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,230	561.56	A00-Y98	所有死亡原因		1,264	578.06		1,192	545.43		1,261	575.31
08-14	惡性腫瘤	1	384	175.32	C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70	1	417	190.81	1	402	183.41
25-27-28*	心臟疾病	2	147	67.11	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	167	76.37	2	143	65.43	2	145	66.15
29	腦血管疾病	3	109	49.76	I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22	3	96	43.93	3	89	40.60
181	糖尿病	4	86	39.26	J12-J18	肺炎	4	70	32.01	4	76	34.78	4	73	33.31
321	肺炎	5	67	30.59	E10-E14	糖尿病	5	69	31.56	5	47	21.51	5	63	28.74
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	6	44	20.09	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	8	36	16.46	6	39	17.85	6	46	20.99
E47-E53	事故傷害	7	31	14.15	A40-A41	敗血症	7	37	16.92	7	36	16.47	7	42	19.16
E54	自殺	8	29	13.24	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	12	24	10.98	13	25	11.44	8	36	16.42
347	慢性肝病及肝硬化	9	23	10.50	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	32	14.63	9	31	14.18	9	34	15.51
038	敗血症	10	21	9.59	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	18	8.23	11	28	12.81	9	34	15.51
	其他		289	131.94		其他		317	144.97		254	116.22		297	135.50

註：年中人口數 219,033 218,662 218,543 219,186

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		786	454.91		821	486.17		778	468.89		802	483.88		840	506.24		917	558.44
08-14	惡性腫瘤	1	244	141.22	1	210	124.35	1	242	145.85	1	227	136.96	1	247	148.86	1	275	167.47
25-27-28*	心臟疾病	3	77	44.57	2	100	59.22	2	103	62.08	2	101	60.94	2	111	66.90	2	97	59.07
29	腦血管疾病	2	86	49.77	3	97	57.44	3	69	41.59	3	80	48.27	3	66	39.78	3	88	53.59
181	糖尿病	4	39	22.57	4	49	29.02	4	47	28.33	5	38	22.93	4	44	26.52	4	66	40.19
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	20	11.58	6	30	17.76	6	24	14.46	7	27	16.29	6	31	18.68	6	30	18.27
321	肺炎	7	27	15.63	8	27	15.99	9	18	10.85	8	25	15.08	7	28	16.87	8	24	14.62
E47-E53	事故傷害	5	32	18.52	5	45	26.65	5	40	24.11	4	46	27.75	5	37	22.30	5	38	23.14
E54	自殺	11	8	4.63	10	13	7.70	15	5	3.01	12	5	3.02	11	11	6.63	11	10	6.09
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	15.63	9	25	14.80	7	21	12.66	6	33	19.91	7	28	16.87	7	27	16.44
26	高血壓性疾病	6	30	17.36	7	28	16.58	8	19	11.45	9	14	8.45	9	19	11.45	9	20	12.18
	其他		196	113.44		197	116.66		190	114.51		206	124.29		218	131.38		242	147.37

註：年人口數 172,780 168,872 165,924 165,744 165,928 164,207

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		864	532.14		905	559.60		870	541.37		858	539.48		892	564.88		843	533.65
08-14	惡性腫瘤	1	267	164.45	1	288	178.08	1	245	152.45	1	245	154.05	1	282	178.58	1	267	169.02
25-27-28*	心臟疾病	2	111	68.37	2	101	62.45	2	111	69.07	2	113	71.05	2	102	64.59	2	80	50.64
29	腦血管疾病	3	94	57.90	3	88	54.41	3	73	45.43	3	89	55.96	3	88	55.73	3	62	39.25
181	糖尿病	4	58	35.72	4	62	38.34	4	64	39.82	4	59	37.10	4	58	36.73	4	53	33.55
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	32	19.71	7	25	15.46	6	32	19.91	5	34	21.38	7	23	14.57	6	31	19.62
321	肺炎	6	26	16.01	5	34	21.02	5	56	34.85	6	24	15.09	5	30	19.00	5	51	32.28
E47-E53	事故傷害	7	22	13.55	6	29	17.93	8	16	9.96	8	21	13.20	6	24	15.20	8	25	15.83
E54	自殺	9	12	7.39	8	20	12.37	7	18	11.20	7	22	13.83	8	19	12.03	9	24	15.19
347	慢性肝病及肝硬化	8	19	11.70	10	12	7.42	9	15	9.33	8	21	13.20	9	18	11.40	7	26	16.46
26	高血壓性疾病	10	10	6.16	9	17	10.51	10	14	8.71	10	11	6.92	10	10	6.33	10	14	8.86
	其他		213	131.19		229	141.60		226	140.63		219	137.70		238	150.72		210	132.94
註：	年中人口數		162,362		161,722		160,704		159,042		157,911		157,970						

表52-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		874	549.53	A00-Y98	所有死亡原因		957	600.33		897	563.99		885	556.10
08-14	惡性腫瘤	1	258	162.22	C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07	1	276	173.54	1	278	174.68
25-27-28*	心臟疾病	2	86	54.07	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	127	79.67	2	116	72.94	2	103	64.72
29	腦血管疾病	3	75	47.16	I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54	3	58	36.47	3	56	35.19
181	糖尿病	4	58	36.47	J12-J18	肺炎	4	70	43.91	4	49	30.81	4	51	32.05
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	5	52	32.70	I10-I15	高血壓性疾病	10	19	11.92	10	21	13.20	5	41	25.76
321	肺炎	6	38	23.89	A40-A41	敗血症	5	41	25.72	6	31	19.49	6	36	22.62
E47-E53	事故傷害	7	25	15.72	E10-E14	糖尿病	7	30	18.82	5	46	28.92	7	32	20.11
E54	自殺	8	22	13.83	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	10	19	11.92	12	19	11.95	8	25	15.71
347	慢性肝病及肝硬化	9	17	10.69	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	22	13.80	8	27	16.98	9	21	13.20
26	高血壓性疾病	10	10	6.29	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	6	35	21.96	6	31	19.49	10	18	11.31
	其他		233	146.50		其他		220	138.01		223	140.21		224	140.75
註：	年中人口數		159,045				159,412			159,045		159,144			

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		733	536.47		711	528.07		756	564.51		778	580.11		775	578.22		747	561.24
08-14	惡性腫瘤	1	230	168.33	1	194	144.09	1	232	173.24	1	204	152.11	1	223	166.38	1	201	151.02
25-27-28*	心臟疾病	2	73	53.43	2	88	65.36	2	111	82.88	2	96	71.58	2	91	67.89	4	68	51.09
29	腦血管疾病	3	72	52.70	3	84	62.39	3	89	66.46	3	94	70.09	3	87	64.91	2	101	75.88
181	糖尿病	4	48	35.13	5	43	31.94	5	39	29.12	4	54	40.26	4	48	35.81	3	69	51.84
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	30	21.96	6	30	22.28	7	26	19.41	6	31	23.12	8	23	17.16	6	26	19.53
321	肺炎	8	22	16.10	9	15	11.14	8	17	12.69	8	17	12.68	7	24	17.91	8	24	18.03
E47-E53	事故傷害	5	47	34.40	4	46	34.17	4	42	31.36	5	53	39.52	5	33	24.62	5	37	27.80
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.30	7	21	15.60	6	28	20.91	7	19	14.17	6	30	22.38	7	25	18.78
E54	自殺	11	10	7.32	12	7	5.20	13	7	5.23	10	11	8.20	14	6	4.48	9	13	9.77
038	敗血症	10	12	8.78	11	9	6.68	13	7	5.23	9	13	9.69	16	2	1.49	12	4	3.01
	其他		164	120.03		174	129.23		158	117.98		186	138.69		208	155.19		179	134.49

註： 年中人口數 136,634 134,640 133,922 134,112 134,033 133,098

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		749	567.34		811	618.09		812	623.38		766	593.91		867	679.14		802	632.16
08-14	惡性腫瘤	1	223	168.92	1	250	190.53	1	242	185.78	1	205	158.94	1	228	178.60	1	273	215.19
25-27-28*	心臟疾病	3	73	55.30	2	93	70.88	2	97	74.47	2	89	69.01	2	95	74.42	2	96	75.67
29	腦血管疾病	2	88	66.66	3	69	52.59	3	80	61.42	3	73	56.60	3	89	69.72	4	55	43.35
181	糖尿病	4	51	38.63	4	62	47.25	4	56	42.99	4	60	46.52	4	63	49.35	3	56	44.14
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	36	27.27	5	29	22.10	5	42	32.24	5	33	25.59	5	42	32.90	6	25	19.71
321	肺炎	9	15	11.36	6	27	20.58	6	26	19.96	6	32	24.81	7	25	19.58	5	29	22.86
E47-E53	事故傷害	6	29	21.97	8	19	14.48	7	24	18.42	8	20	15.51	8	24	18.80	8	20	15.76
347	慢性肝病及肝硬化	7	24	18.18	7	21	16.00	8	22	16.89	7	21	16.28	9	22	17.23	10	10	7.88
E54	自殺	8	17	12.88	8	19	14.48	9	15	11.52	9	19	14.73	6	30	23.50	7	22	17.34
038	敗血症	11	11	8.33	12	6	4.57	12	5	3.84	12	6	4.65	10	18	14.10	9	11	8.67
	其他		182	137.86		216	164.62		203	155.84		208	161.27		231	180.95		205	161.59
註：	年中人口數		132,018		131,210		130,258		128,976		127,661		126,867						

表52-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		810	640.19	A00-Y98	所有死亡原因		893	712.18		859	692.60		806	650.00	
08-14	惡性腫瘤	1	259	204.70	C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93	1	255	205.60	1	255	205.65	
25-27-28*	心臟疾病	2	94	74.29	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	118	94.11	2	105	84.66	2	83	66.94	
29	腦血管疾病	3	68	53.74	I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84	3	84	67.73	3	58	46.77	
181	糖尿病	4	50	39.52	J12-J18	肺炎	4	61	48.65	5	41	33.06	4	49	39.52	
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	5	35	27.66	E10-E14	糖尿病	5	55	43.86	4	58	46.76	5	43	34.68	
321	肺炎	6	29	22.92	A40-A41	敗血症	6	32	25.52	6	32	25.80	6	32	25.81	
E47-E53	事故傷害	7	24	18.97	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	8	23	18.34	8	26	20.96	7	28	22.58	
347	慢性肝病及肝硬化	7	24	18.97	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	26	20.74	7	27	21.77	8	23	18.55	
E54	自殺	9	18	14.23	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	12	16	12.76	12	16	12.90	9	20	16.13	
038	敗血症	10	13	10.27	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	16.75	8	26	20.96	10	17	13.71	
	其他		196	154.91		其他		209	166.68		189	152.39		198	159.68	
註：	年中人口數		126,526					125,391			124,026			124,000		

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,094	506.93		1,218	573.08		1,227	584.91		1,186	567.13		1,283	614.28		1,269	611.86
08-14	惡性腫瘤	1	270	125.11	1	317	149.15	1	322	153.50	1	301	143.94	1	366	175.24	1	332	160.08
25-27-28*	心臟疾病	2	136	63.02	2	151	71.05	2	167	79.61	2	128	61.21	2	145	69.42	3	123	59.31
29	腦血管疾病	3	127	58.85	3	132	62.11	3	131	62.45	3	123	58.82	3	127	60.81	2	129	62.20
181	糖尿病	5	57	26.41	5	63	29.64	4	83	39.57	4	72	34.43	4	100	47.88	4	106	51.11
321	肺炎	8	30	13.90	10	23	10.82	10	24	11.44	9	25	11.95	8	29	13.88	9	26	12.54
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	35	16.22	7	35	16.47	7	33	15.73	6	46	22.00	7	45	21.55	6	49	23.63
347	慢性肝病及肝硬化	6	43	19.93	6	54	25.41	6	47	22.40	7	45	21.52	6	49	23.46	7	34	16.39
E54	自殺	11	19	8.80	9	27	12.70	8	27	12.87	11	20	9.56	11	16	7.66	8	29	13.98
E47-E53	事故傷害	4	73	33.83	4	89	41.88	5	71	33.85	5	67	32.04	5	65	31.12	5	64	30.86
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	9	24	11.12	11	19	8.94	11	23	10.96	9	25	11.95	10	22	10.53	13	14	6.75
	其他		280	129.74		308	144.92		299	142.53		334	159.72		319	152.73		363	175.02

註：年中人口數 215,808 212,537 209,778 209,122 208,862 207,399

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,344	654.21		1,335	655.25		1,389	688.11		1,391	699.50		1,454	741.48		1,428	733.02
08-14	惡性腫瘤	1	377	183.51	1	386	189.46	1	388	192.21	1	414	208.19	1	431	219.79	1	427	219.19
25-27-28*	心臟疾病	3	149	72.53	2	153	75.10	2	147	72.82	2	160	80.46	2	142	72.41	2	149	76.48
29	腦血管疾病	2	152	73.99	3	133	65.28	3	134	66.38	3	125	62.86	3	139	70.88	3	138	70.84
181	糖尿病	4	100	48.68	4	88	43.19	4	108	53.50	4	92	46.26	4	113	57.63	4	119	61.08
321	肺炎	8	34	16.55	5	55	27.00	5	73	36.16	8	43	21.62	5	60	30.60	6	49	25.15
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	55	26.77	7	46	22.58	7	54	26.75	6	54	27.16	7	45	22.95	5	58	29.77
347	慢性肝病及肝硬化	7	43	20.93	8	43	21.11	8	53	26.26	7	53	26.65	9	28	14.28	8	35	17.97
E54	自殺	9	32	15.58	9	28	13.74	9	30	14.86	9	33	16.59	6	58	29.58	6	49	25.15
E47-E53	事故傷害	6	50	24.34	6	52	25.52	6	57	28.24	5	60	30.17	8	37	18.87	9	32	16.43
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	22	10.71	12	12	5.89	10	13	6.44	13	11	5.53	11	16	8.16	13	7	3.59
	其他		330	160.63		339	166.39		332	164.47		346	174.00		385	196.33		365	187.36
註：	年中人口數		205,440		203,738		201,858		198,856		196,094		194,811						

表52-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,493	770.88	A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68		1,552	819.43		1,525	807.87
08-14	惡性腫瘤	1	458	236.48	C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83	1	419	221.23	1	446	236.27
25-27-28*	心臟疾病	2	160	82.61	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	203	106.05	2	175	92.40	2	167	88.47
29	腦血管疾病	3	126	65.06	I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29	3	118	62.30	3	114	60.39
181	糖尿病	4	109	56.28	J12-J18	肺炎	3	111	57.99	5	95	50.16	4	107	56.68
321	肺炎	5	87	44.92	E10-E14	糖尿病	5	88	45.97	4	105	55.44	5	86	45.56
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	6	63	32.53	A40-A41	敗血症	9	46	24.03	6	60	31.68	6	60	31.79
347	慢性肝病及肝硬化	7	42	21.69	I10-I15	高血壓性疾病	11	39	20.37	11	43	22.70	7	49	25.96
E54	自殺	8	37	19.10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	6	61	31.87	9	47	24.82	8	48	25.43
E47-E53	事故傷害	9	34	17.56	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	33	17.24	10	45	23.76	9	43	22.78
323	支氣管炎、肺氣腫及氣	10	14	7.23	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	50	26.12	8	52	27.46	10	39	20.66
	其他		363	187.43		其他		375	195.91		393	207.50		366	193.89
註：	年中人口數		193,675					191,416			189,399			188,768	

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		1,041	461.94		1,086	474.55		1,057	454.28		1,125	469.43		1,130	458.85		1,174	467.98	
08-14	惡性腫瘤	1	274	121.59	1	282	123.23	1	279	119.91	1	305	127.27	1	312	126.69	1	336	133.94	
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.16	3	108	47.19	2	132	56.73	3	112	46.73	2	124	50.35	3	101	40.26	
29	腦血管疾病	2	121	53.69	2	129	56.37	3	113	48.57	2	118	49.24	3	123	49.95	2	122	48.63	
181	糖尿病	5	70	31.06	5	60	26.22	4	62	26.65	5	61	25.45	4	79	32.08	4	81	32.29	
321	肺炎	8	30	13.31	7	28	12.24	8	31	13.32	8	29	12.10	7	35	14.21	8	34	13.55	
E54	自殺	12	11	4.88	11	19	8.30	10	20	8.60	11	14	5.84	10	21	8.53	9	22	8.77	
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	43	19.08	6	37	16.17	6	40	17.19	6	43	17.94	6	42	17.05	6	43	17.14	
E47-E53	事故傷害	4	88	39.05	4	84	36.71	5	58	24.93	4	63	26.29	5	61	24.77	5	70	27.90	
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	12.87	8	27	11.80	7	33	14.18	7	37	15.44	8	33	13.40	7	36	14.35	
038	敗血症	14	9	3.99	12	15	6.55	13	13	5.59	12	13	5.42	19	2	0.81	12	11	4.38	
	其他		271	120.25		297	129.78		276	118.62		330	137.70		298	121.01		318	126.76	
註：	年中人口數		225,355			228,850			232,676			239,650			246,270			250,866		

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,180	465.44		1,227	480.75		1,143	445.58		1,277	496.35		1,297	501.74		1,301	500.03
08-14	惡性腫瘤	1	365	143.97	1	373	146.15	1	307	119.68	1	406	157.81	1	384	148.55	1	411	157.96
25-27-28*	心臟疾病	3	122	48.12	2	145	56.81	2	159	61.98	2	165	64.13	2	148	57.25	2	133	51.12
29	腦血管疾病	2	129	50.88	3	119	46.63	3	122	47.56	3	133	51.70	3	113	43.71	3	119	45.74
181	糖尿病	4	67	26.43	4	87	34.09	4	69	26.90	4	79	30.71	4	79	30.56	4	71	27.29
321	肺炎	8	33	13.02	7	39	15.28	5	45	17.54	6	41	15.94	5	57	22.05	5	59	22.68
E54	自殺	9	29	11.44	9	22	8.62	7	31	12.08	7	35	13.60	7	44	17.02	7	42	16.14
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.20	5	43	16.85	9	22	8.58	5	42	16.32	6	51	19.73	6	49	18.83
E47-E53	事故傷害	5	49	19.33	6	41	16.06	6	38	14.81	9	27	10.49	8	42	16.25	8	33	12.68
347	慢性肝病及肝硬化	6	44	17.36	8	23	9.01	7	31	12.08	8	30	11.66	9	29	11.22	9	27	10.38
038	敗血症	15	6	2.37	13	9	3.53	13	8	3.12	13	7	2.72	11	15	5.80	11	17	6.53
	其他		300	118.33		326	127.73		311	121.24		312	121.27		335	129.59		340	130.68
註：	年中人口數		253,526		255,224		256,517		257,276		258,500		260,185						

表52-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		1,402	536.05	A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39		1,406	538.09		1,454	555.84	
08-14	惡性腫瘤	1	411	157.15	C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79	1	394	150.79	1	417	159.41	
25-27-28*	心臟疾病	2	168	64.23	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	188	71.84	2	166	63.53	2	150	57.34	
29	腦血管疾病	3	116	44.35	I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98	3	105	40.18	3	103	39.37	
181	糖尿病	4	84	32.12	J12-J18	肺炎	4	86	32.86	5	64	24.49	4	86	32.88	
321	肺炎	5	74	28.29	E10-E14	糖尿病	5	60	22.93	4	68	26.02	5	80	30.58	
E54	自殺	6	51	19.50	I10-I15	高血壓性疾病	10	35	13.37	7	51	19.52	6	63	24.08	
350	腎炎、腎徵候群及腎性	7	47	17.97	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	38	14.52	6	58	22.20	6	63	24.08	
E47-E53	事故傷害	8	35	13.38	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	6	46	17.58	8	43	16.46	8	53	20.26	
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	11.09	A40-A41	敗血症	7	45	17.20	11	32	12.25	9	41	15.67	
038	敗血症	10	20	7.65	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	12	25	9.55	9	41	15.69	10	40	15.29	
	其他		367	140.32		其他		337	128.78		384	146.96		358	136.86	
註：	年中人口數		261,542					261,693			261,294			261,588		

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		469	415.37		521	464.88		529	475.05		489	437.23		528	467.73		568	499.97
08-14	惡性腫瘤	1	139	123.11	1	139	124.03	1	149	133.80	1	137	122.50	1	146	129.34	1	166	146.12
25-27-28*	心臟疾病	3	43	38.08	3	51	45.51	3	51	45.80	3	54	48.28	3	47	41.64	3	57	50.17
29	腦血管疾病	2	49	43.40	2	55	49.08	2	56	50.29	2	55	49.18	2	57	50.49	2	64	56.33
181	糖尿病	5	27	23.91	5	26	23.20	5	32	28.74	6	19	16.99	4	29	25.69	4	41	36.09
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	8	7.09	8	15	13.38	6	16	14.37	9	12	10.73	7	20	17.72	6	21	18.48
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	20.37	6	23	20.52	7	14	12.57	5	21	18.78	6	21	18.60	6	21	18.48
E47-E53	事故傷害	4	32	28.34	3	51	45.51	4	49	44.00	4	28	25.04	5	28	24.80	5	29	25.53
E54	自殺	8	11	9.74	11	8	7.14	7	14	12.57	12	6	5.36	9	12	10.63	9	11	9.68
321	肺炎	13	7	6.20	9	13	11.60	9	13	11.67	7	18	16.09	8	17	15.06	8	14	12.32
038	敗血症	14	5	4.43	13	5	4.46	12	7	6.29	13	4	3.58	13	4	3.54	16	2	1.76
	其他		125	110.71		135	120.46		128	114.94		135	120.71		147	130.22		142	124.99

註： 年中人口數 112,912 112,072 111,358 111,840 112,884 113,607

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		568	498.07		568	498.74		570	502.29		567	501.54		587	519.39		649	573.55
08-14	惡性腫瘤	1	202	177.13	1	177	155.42	1	176	155.09	1	193	170.72	1	186	164.58	1	206	182.05
25-27-28*	心臟疾病	2	47	41.21	3	56	49.17	2	82	72.26	2	78	68.99	2	66	58.40	2	68	60.09
29	腦血管疾病	3	38	33.32	2	65	57.07	3	66	58.16	3	48	42.46	3	55	48.67	3	61	53.91
181	糖尿病	5	31	27.18	4	40	35.12	4	32	28.20	4	34	30.07	4	44	38.93	4	41	36.23
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	16	14.03	7	16	14.05	8	16	14.10	6	22	19.46	7	23	20.35	8	17	15.02
347	慢性肝病及肝硬化	6	25	21.92	7	16	14.05	5	21	18.51	7	17	15.04	9	10	8.85	9	15	13.26
E47-E53	事故傷害	4	35	30.69	5	24	21.07	7	18	15.86	5	30	26.54	5	25	22.12	5	30	26.51
E54	自殺	9	14	12.28	6	19	16.68	9	15	13.22	8	13	11.50	6	24	21.24	5	30	26.51
321	肺炎	7	24	21.05	9	15	13.17	6	19	16.74	9	10	8.85	8	11	9.73	7	28	24.74
038	敗血症	13	4	3.51	10	8	7.02	10	8	7.02	11	3	2.65	12	5	4.42	11	7	6.19
	其他		132	115.75		132	115.90		117	103.10		119	105.26		138	122.11		146	129.03
註：	年中人口數		114,040			113,888			113,480			113,052			113,017			113,155	

表52-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		596	525.17	A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24		667	588.13		704	619.79	
08-14	惡性腫瘤	1	195	171.83	C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60	1	206	181.64	1	215	189.28	
25-27-28*	心臟疾病	2	64	56.39	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	75	65.97	2	79	69.66	2	74	65.15	
29	腦血管疾病	3	60	52.87	I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74	3	48	42.32	3	54	47.54	
181	糖尿病	4	27	23.79	J12-J18	肺炎	3	58	51.01	4	42	37.03	4	44	38.74	
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	5	25	22.03	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	20	17.59	7	22	19.40	5	37	32.57	
347	慢性肝病及肝硬化	6	22	19.39	E10-E14	糖尿病	5	31	27.27	5	33	29.10	6	33	29.05	
E47-E53	事故傷害	7	19	16.74	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	9	19	16.71	7	22	19.40	7	25	22.01	
E54	自殺	8	14	12.34	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	24	21.11	9	20	17.64	8	21	18.49	
321	肺炎	8	14	12.34	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	15	13.19	6	23	20.28	9	19	16.73	
038	敗血症	10	10	8.81	A40-A41	敗血症	9	19	16.71	12	12	10.58	10	18	15.85	
	其他		146	128.65		其他		130	114.34		160	141.08		164	144.38	
註：	年中人口數		113,487					113,694			113,411			113,586		

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		782	350.67		828	361.55		867	369.47		906	375.94		845	341.95		969	385.16
08-14	惡性腫瘤	1	198	88.79	1	229	99.99	1	235	100.14	1	256	106.23	1	232	93.88	1	269	106.92
25-27-28*	心臟疾病	2	84	37.67	2	84	36.68	3	91	38.78	2	99	41.08	2	102	41.28	3	112	44.52
29	腦血管疾病	3	71	31.84	3	83	36.24	2	108	46.02	3	87	36.10	3	87	35.21	2	114	45.31
181	糖尿病	5	41	18.39	5	43	18.78	4	58	24.72	5	42	17.43	4	69	27.92	4	78	31.00
321	肺炎	8	24	10.76	9	22	9.61	10	13	5.54	9	25	10.37	11	13	5.26	7	29	11.53
E54	自殺	7	26	11.66	7	24	10.48	9	15	6.39	8	29	12.03	8	18	7.28	9	19	7.55
E47-E53	事故傷害	4	56	25.11	4	58	25.33	5	46	19.60	4	68	28.22	5	47	19.02	5	56	22.26
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	20	8.97	10	18	7.86	8	23	9.80	7	31	12.86	7	27	10.93	8	25	9.94
347	慢性肝病及肝硬化	6	30	13.45	6	28	12.23	6	31	13.21	6	32	13.28	6	33	13.35	6	31	12.32
26	高血壓性疾病	11	16	7.17	8	23	10.04	7	24	10.23	10	19	7.88	9	16	6.47	12	7	2.78
	其他		216	96.86		216	94.32		223	95.03		218	90.46		201	81.34		229	91.02
註：	年中人口數		223,003		229,014		234,660		240,996		247,115		251,586						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		976	384.17		976	380.41		1,010	389.66		1,097	421.12		1,048	400.74		1,044	396.61
08-14	惡性腫瘤	1	293	115.33	1	342	133.30	1	302	116.51	1	314	120.54	1	306	117.01	1	357	135.62
25-27-28*	心臟疾病	2	90	35.43	2	90	35.08	2	121	46.68	2	160	61.42	2	115	43.97	2	105	39.89
29	腦血管疾病	3	88	34.64	2	90	35.08	3	91	35.11	3	90	34.55	3	107	40.91	3	104	39.51
181	糖尿病	4	71	27.95	4	57	22.22	4	60	23.15	4	65	24.95	4	74	28.30	4	60	22.79
321	肺炎	8	29	11.41	9	15	5.85	9	26	10.03	8	31	11.90	9	35	13.38	7	37	14.06
E54	自殺	9	23	9.05	6	32	12.47	7	36	13.89	6	39	14.97	6	39	14.91	5	43	16.34
E47-E53	事故傷害	5	50	19.68	5	48	18.71	5	47	18.13	5	52	19.96	8	36	13.77	8	35	13.30
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.17	7	31	12.08	6	40	15.43	7	33	12.67	7	39	14.91	6	42	15.96
347	慢性肝病及肝硬化	6	38	14.96	8	30	11.69	8	31	11.96	9	28	10.75	5	41	15.68	9	34	12.92
26	高血壓性疾病	10	17	6.69	10	11	4.29	14	5	1.93	11	11	4.22	10	23	8.79	10	14	5.32
	其他		241	94.86		230	89.65		251	96.84		274	105.18		233	89.09		213	80.92
註：	年中人口數		254,052		256,566		259,200		260,495		261,519		263,231						

表52-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,107	417.62	A00-Y98	所有死亡原因		1,183	444.46		1,170	437.78		1,183	439.82
08-14	惡性腫瘤	1	373	140.72	C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51	1	365	136.57	1	364	135.33
25-27-28*	心臟疾病	2	134	50.55	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	153	57.48	2	133	49.77	2	133	49.45
29	腦血管疾病	3	96	36.22	I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95	3	90	33.68	3	87	32.35
181	糖尿病	4	73	27.54	E10-E14	糖尿病	4	68	25.55	4	65	24.32	4	62	23.05
321	肺炎	5	51	19.24	J12-J18	肺炎	5	63	23.67	5	60	22.45	5	54	20.08
E54	自殺	6	34	12.83	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	33	12.40	6	41	15.34	6	42	15.61
E47-E53	事故傷害	6	34	12.83	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	8	33	12.40	8	36	13.47	7	40	14.87
350	腎炎、腎徵候群及腎性	8	33	12.45	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	13	20	7.51	9	35	13.10	8	36	13.38
347	慢性肝病及肝硬化	9	30	11.32	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	25	9.39	13	25	9.35	9	35	13.01
26	高血壓性疾病	10	15	5.66	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	28	10.52	11	29	10.85	9	35	13.01
	其他		234	88.28		其他		293	110.08		291	108.88		295	109.68

註： 年中人口數 265,071 266,163 267,256 268,975

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
01-56	所有死亡原因		1,192	399.07		1,271	428.91		1,246	423.71		1,241	420.29		1,288	435.12		1,363	462.31	
08-14	惡性腫瘤	1	322	107.80	1	383	129.25	1	388	131.94	1	389	131.74	1	371	125.33	1	408	138.39	
25-27-28*	心臟疾病	3	129	43.19	2	157	52.98	2	152	51.69	2	143	48.43	2	160	54.05	3	131	44.43	
29	腦血管疾病	2	163	54.57	3	150	50.62	2	152	51.69	3	134	45.38	3	127	42.90	2	161	54.61	
181	糖尿病	5	65	21.76	5	51	17.21	5	59	20.06	5	70	23.71	4	83	28.04	4	114	38.67	
321	肺炎	7	40	13.39	10	25	8.44	10	22	7.48	6	34	11.51	8	40	13.51	7	40	13.57	
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	37	12.39	9	27	9.11	6	35	11.90	6	34	11.51	7	41	13.85	5	48	16.28	
E47-E53	事故傷害	4	85	28.46	4	71	23.96	4	77	26.18	4	72	24.38	5	50	16.89	5	48	16.28	
E54	自殺	9	26	8.70	7	40	13.50	8	27	9.18	9	19	6.43	9	31	10.47	9	27	9.16	
347	慢性肝病及肝硬化	6	41	13.73	6	44	14.85	7	31	10.54	8	30	10.16	6	45	15.20	7	40	13.57	
038	敗血症	13	8	2.68	13	13	4.39	11	18	6.12	14	9	3.05	14	10	3.38	15	7	2.37	
	其他		276	92.40		310	104.61		285	96.92		307	103.97		330	111.48		339	114.98	
註：	年中人口數		298,691			296,330			294,068			295,270			296,010			294,826		

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,406	479.42		1,371	469.85		1,519	523.17		1,462	505.78		1,588	550.74		1,527	530.24
08-14	惡性腫瘤	1	424	144.58	1	461	157.99	1	433	149.13	1	476	164.67	1	456	158.15	1	489	169.80
25-27-28*	心臟疾病	3	139	47.40	2	132	45.24	2	187	64.41	2	161	55.70	2	171	59.31	2	171	59.38
29	腦血管疾病	2	162	55.24	3	130	44.55	3	168	57.86	3	150	51.89	3	135	46.82	3	107	37.16
181	糖尿病	4	104	35.46	4	93	31.87	4	108	37.20	4	107	37.02	4	105	36.42	4	105	36.46
321	肺炎	9	29	9.89	7	39	13.37	5	63	21.70	7	42	14.53	5	77	26.70	5	71	24.65
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	50	17.05	6	44	15.08	7	55	18.94	6	44	15.22	6	61	21.16	6	53	18.40
E47-E53	事故傷害	5	61	20.80	5	46	15.76	6	56	19.29	5	63	21.79	8	43	14.91	7	45	15.63
E54	自殺	7	43	14.66	9	32	10.97	9	35	12.05	8	30	10.38	7	49	16.99	8	43	14.93
347	慢性肝病及肝硬化	8	39	13.30	8	34	11.65	8	40	13.78	9	24	8.30	9	36	12.49	9	30	10.42
038	敗血症	11	12	4.09	12	12	4.11	12	12	4.13	10	13	4.50	10	19	6.59	11	18	6.25
	其他		343	116.96		348	119.26		362	124.68		352	121.77		436	151.21		395	137.16
註：	年中人口數		293,270			291,794			290,344			289,058			288,337			287,983	

表52-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,569	545.49	A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50		1,620	568.50		1,595	561.23
08-14	惡性腫瘤	1	533	185.31	C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76	1	482	169.15	1	483	169.95
25-27-28*	心臟疾病	2	162	56.32	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	231	80.61	2	216	75.80	2	186	65.45
29	腦血管疾病	3	137	47.63	I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02	3	115	40.36	3	116	40.82
181	糖尿病	4	107	37.20	E10-E14	糖尿病	5	75	26.17	4	97	34.04	4	91	32.02
321	肺炎	5	76	26.42	J12-J18	肺炎	4	97	33.85	5	93	32.64	4	91	32.02
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	6	60	20.86	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及 腎病變	7	53	18.50	7	53	18.60	6	53	18.65
E47-E53	事故傷害	7	43	14.95	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	46	16.05	6	56	19.65	7	50	17.59
E54	自殺	8	38	13.21	A40-A41	敗血症	6	59	20.59	8	42	14.74	8	44	15.48
347	慢性肝病及肝硬化	9	31	10.78	I10-I15	高血壓性疾	12	31	10.82	12	31	10.88	9	40	14.07
038	敗血症	10	19	6.61	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	13	27	9.42	10	34	11.93	10	36	12.67
	其他		363	126.20		其他		429	149.71		401	140.72		405	142.51

註：年中人口數 287,630 286,557 284,960 284,197

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,078	443.77		1,121	462.90		1,082	447.47		1,132	464.00		1,191	483.28		1,187	479.40
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.03	1	316	130.49	1	307	126.96	1	326	133.63	1	344	139.59	1	357	144.18
25-27-28*	心臟疾病	3	100	41.17	2	132	54.51	3	120	49.63	3	87	35.66	2	136	55.19	2	117	47.25
29	腦血管疾病	2	119	48.99	3	127	52.44	2	137	56.66	2	141	57.80	3	103	41.79	2	117	47.25
181	糖尿病	5	51	20.99	5	67	27.67	4	76	31.43	5	56	22.95	4	79	32.06	4	93	37.56
321	肺炎	7	36	14.82	7	40	16.52	10	23	9.51	8	28	11.48	6	46	18.67	8	27	10.90
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	36	14.82	6	42	17.34	6	40	16.54	7	32	13.12	7	38	15.42	6	42	16.96
347	慢性肝病及肝硬化	6	46	18.94	8	36	14.87	8	25	10.34	6	36	14.76	8	29	11.77	7	31	12.52
E47-E53	事故傷害	4	84	34.58	4	73	30.14	5	64	26.47	4	73	29.92	5	75	30.43	5	56	22.62
E54	自殺	10	18	7.41	11	14	5.78	8	25	10.34	12	17	6.97	9	24	9.74	9	25	10.10
038	敗血症	14	12	4.94	11	14	5.78	14	9	3.72	13	13	5.33	12	14	5.68	14	8	3.23
	其他		299	123.09		260	107.36		256	105.87		323	132.40		303	122.95		314	126.82
註：	年中人口數		242,918		242,168		241,802		243,964		246,442		247,603						

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
01-56	所有死亡原因		1,286	518.20		1,286	517.49		1,345	540.00		1,317	528.90		1,400	563.46		1,395	560.68
08-14	惡性腫瘤	1	399	160.78	1	356	143.25	1	392	157.38	1	375	150.60	1	399	160.59	1	401	161.17
25-27-28*	心臟疾病	3	123	49.56	3	126	50.70	2	162	65.04	2	163	65.46	2	168	67.62	2	175	70.34
29	腦血管疾病	2	154	62.06	2	131	52.71	3	154	61.83	3	127	51.00	3	137	55.14	3	132	53.05
181	糖尿病	4	86	34.65	4	92	37.02	4	92	36.94	4	83	33.33	4	108	43.47	4	95	38.18
321	肺炎	7	32	12.89	7	45	18.11	5	55	22.08	6	48	19.28	7	47	18.92	5	68	27.33
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	49	19.74	6	54	21.73	6	50	20.07	7	46	18.47	5	63	25.36	6	54	21.70
347	慢性肝病及肝硬化	8	20	8.06	8	35	14.08	8	32	12.85	8	32	12.85	9	29	11.67	9	32	12.86
E47-E53	事故傷害	5	53	21.36	5	75	30.18	7	35	14.05	5	54	21.69	8	45	18.11	8	37	14.87
E54	自殺	8	20	8.06	9	29	11.67	8	32	12.85	8	32	12.85	6	55	22.14	7	42	16.88
038	敗血症	10	18	7.25	11	16	6.44	13	8	3.21	12	9	3.61	10	15	6.04	10	18	7.23
	其他		332	133.78		327	131.58		333	133.70		348	139.75		334	134.43		341	137.24
註：	年中人口數		248,166		248,510		249,072		249,009		248,464		248,464						

表52-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,433	573.60	A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13		1,439	578.14		1,434	576.77
08-14	惡性腫瘤	1	463	185.33	C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70	1	432	173.56	1	424	170.54
25-27-28*	心臟疾病	2	158	63.24	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	194	77.64	2	169	67.90	2	181	72.80
29	腦血管疾病	3	138	55.24	I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83	3	110	44.19	3	89	35.80
181	糖尿病	4	91	36.43	J12-J18	肺炎	4	92	36.82	4	100	40.18	4	87	34.99
321	肺炎	5	72	28.82	E10-E14	糖尿病	5	66	26.41	5	78	31.34	5	86	34.59
350	腎炎、腎徵候群及腎 性病變	6	48	19.21	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	51	20.41	6	58	23.30	6	44	17.70
347	慢性肝病及肝硬化	7	45	18.01	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎	6	52	20.81	8	42	16.87	7	43	17.30
E47-E53	事故傷害	8	40	16.01	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	43	17.21	7	44	17.68	8	38	15.28
E54	自殺	9	29	11.61	I10-I15	高血壓性疾	10	38	15.21	12	30	12.05	9	36	14.48
038	敗血症	10	18	7.21	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	36	14.41	10	39	15.67	10	35	14.08
	其他		331	132.49		其他		369	147.68		337	135.40		371	149.22
註：	年中人口數		249,825					249,864			248,900			248,627	

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		224	105.52		254	120.67		256	123.15		261	126.08		249	119.77		309	148.95	
162	肺癌	1	38	17.90	2	33	15.68	1	55	26.46	1	55	26.57	1	49	23.57	1	59	28.44	
155	肝癌	2	34	16.02	1	41	19.48	2	44	21.17	2	45	21.74	2	41	19.72	2	51	24.58	
153 154	結腸直腸癌	2	34	16.02	3	31	14.73	4	25	12.03	3	28	13.53	3	32	15.39	3	36	17.35	
174	女性乳癌(1)	4	9	8.30	4	15	13.92	5	11	10.32	4	14	13.17	5	10	9.35	6	10	9.35	
185	攝護腺癌(2)	11	3	2.89	6	7	6.81	17	1	0.99	6	9	8.94	6	9	8.92	4	16	15.91	
179 180	子宮頸癌(1)	7	6	5.53	10	5	4.64	16	2	1.88	7	6	5.64	8	7	6.54	7	8	7.48	
151	胃癌	5	16	7.54	5	27	12.83	3	36	17.32	5	22	10.63	4	26	12.51	5	29	13.98	
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	7	3.30	7	11	5.23	7	13	6.25	9	11	5.31	7	14	6.73	10	8	3.86	
157	胰臟癌	9	8	3.77	7	11	5.23	6	15	7.22	10	10	4.83	9	8	3.85	10	8	3.86	
204-208	白血病	14	5	2.36	12	9	4.28	8	7	3.37	14	5	2.42	10	7	3.37	10	8	3.86	
	其他		64	30.15		64	17.84		47	22.61		56	27.05		46	22.13		76	36.63	
註：	年中人口數		212,280			210,498			207,878			207,010			207,906			207,459		

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		299	145.03		280	136.48		307	149.43		304	147.73		313	151.18		345	165.26
162	肺癌	1	71	34.44	1	74	36.07	1	66	32.13	1	76	36.93	1	66	31.88	1	61	29.22
155	肝癌	2	40	19.40	2	41	19.98	3	45	21.90	4	37	17.98	2	51	24.63	2	50	23.95
153 154	結腸直腸癌	4	33	16.01	3	32	15.60	4	38	18.50	3	40	19.44	3	42	20.29	3	43	20.60
174	女性乳癌(1)	3	19	17.85	4	16	15.08	2	27	25.37	2	21	19.65	4	17	15.77	4	20	18.34
185	攝護腺癌(2)	6	9	9.03	6	7	7.07	6	11	11.11	7	8	8.09	5	10	10.08	6	14	14.04
179 180	子宮頸癌(1)	8	8	7.52	8	5	4.71	9	5	4.70	22	1	0.94	15	3	2.78	14	4	3.67
151	胃癌	5	28	13.58	5	25	12.19	5	23	11.20	5	19	9.23	7	15	7.25	5	34	16.29
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	12	5.82	9	9	4.39	7	11	5.35	5	19	9.23	6	15	7.25	8	17	8.14
157	胰臟癌	7	16	7.76	7	10	4.87	7	11	5.35	9	10	4.86	8	12	5.80	8	17	8.14
204-208	白血病	11	7	3.40	12	6	2.92	13	7	3.41	13	6	2.92	18	2	0.97	12	9	4.31
	其他		56	10.23		55	26.81		63	30.67		67	32.56		80	38.64		76	36.41
註：	年中人口數		206,167			205,160			205,441			205,778			207,032			208,762	

表53-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		332	157.94	C00-C97	所有癌症死亡原因		306	145.34		331	158.34		352	169.06
162	肺癌	1	86	40.91	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92	1	81	38.75	1	77	36.98
155	肝癌	2	44	20.93	C50	女性乳房癌(1)	4	16	14.47	4	15	13.66	2	25	22.85
153 154	結腸直腸癌	3	40	19.03	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10	2	54	25.83	3	46	22.09
174	女性乳癌(1)	4	18	16.34	C22	肝和肝內膽管癌	2	44	20.90	3	51	24.40	4	35	16.81
185	攝護腺癌(2)	5	11	11.00	C16	胃癌	6	22	10.45	5	18	8.61	5	21	10.09
179 180	子宮頸癌(1)	6	12	10.89	C56,C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	13	4	3.62	8	6	5.46	6	11	10.05
151	胃癌	7	21	9.99	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	9	6	5.43	8	6	5.46	7	8	7.31
200202203	非何杰金氏淋巴瘤	8	20	9.51	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	12	5.70	13	7	3.35	8	15	7.20
157	胰臟癌	9	16	7.61	C91-C95	白血病	10	9	4.27	11	8	3.83	8	15	7.20
204-208	白血病	10	12	5.71	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	14.00	6	7	7.06	10	7	7.09
	其他		52	24.74		其他		80	38.00		78	37.31		92	44.19

註：年中人口數 210,204 210,542 209,046 208,215

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		303	123.50		306	126.45		327	136.22		371	153.82		343	141.61		351	145.58
162	肺癌	1	65	26.49	1	62	25.62	1	60	24.99	1	86	35.66	1	83	34.27	1	85	35.25
155	肝癌	2	56	22.82	2	49	20.25	2	51	21.25	2	53	21.97	2	55	22.71	3	44	18.25
153 154	結腸直腸癌	3	30	12.23	3	38	15.70	4	38	15.83	4	38	15.75	3	39	16.10	2	54	22.40
174	女性乳癌(1)	6	8	6.62	5	11	9.20	3	20	16.83	6	10	8.35	4	18	14.90	5	12	9.95
185	攝護腺癌(2)	15	3	2.41	6	8	6.53	7	8	6.60	13	6	4.94	7	10	8.23	6	7	5.81
151	胃癌	4	25	10.19	4	24	9.92	5	34	14.16	3	39	16.17	5	29	11.97	4	33	13.69
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	10	4.08	10	10	4.13	10	10	4.17	8	13	5.39	10	10	4.13	7	13	5.39
156	膽囊癌	9	9	3.67	13	8	3.31	15	6	2.50	11	12	4.98	10	10	4.13	10	10	4.15
157	胰臟癌	7	10	4.08	17	5	2.07	15	6	2.50	8	13	5.39	8	14	5.78	8	12	4.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	8	3.26	9	11	4.55	8	13	5.42	16	5	2.07	9	11	4.54	11	9	3.73
	其他		79	32.20		80	33.06		81	33.74		96	39.80		64	26.42		72	29.86

註： 年中人口數 245,352 241,996 240,050 241,194 242,208 241,106

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		410	171.61		383	161.30		367	155.52		373	159.71		430	185.63		401	173.50
162	肺癌	1	78	32.65	1	86	36.22	1	78	33.05	1	71	30.40	1	81	34.97	1	84	36.34
155	肝癌	2	71	29.72	2	58	24.43	2	52	22.04	2	66	28.26	2	63	27.20	2	55	23.80
153 154	結腸直腸癌	3	45	18.84	3	45	18.95	4	38	16.10	3	41	17.56	5	51	22.02	3	50	21.63
174	女性乳癌(1)	5	20	16.70	4	19	15.92	3	23	19.33	7	9	7.62	3	28	23.80	4	21	17.81
185	攝護腺癌(2)	6	14	11.75	6	17	14.40	7	9	7.69	5	12	10.40	6	12	10.53	6	11	9.71
151	胃癌	4	40	16.74	5	37	15.58	5	30	12.71	4	29	12.42	4	52	22.45	5	38	16.44
200202203	非何杰金淋巴瘤	13	9	3.77	13	8	3.37	9	15	6.36	6	19	8.14	7	24	10.36	10	14	6.06
156	膽囊癌	9	13	5.44	13	8	3.37	13	9	3.81	12	10	4.28	15	7	3.02	9	15	6.49
157	胰臟癌	10	12	5.02	9	11	4.63	6	19	8.05	9	15	6.42	8	17	7.34	7	18	7.79
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	10	4.19	17	5	2.11	12	11	4.66	10	12	5.14	9	14	6.04	7	18	7.79
	其他		98	41.02		89	37.48		83	35.17		89	38.11		81	34.97		77	33.31
註：	年中人口數		238,912			237,446			235,976			233,548			231,643			231,128	

表53-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年					
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		427	185.51	C00-C97	所有癌症死亡原因		397	173.88		437	192.88		424	188.25			
162	肺癌	1	103	44.75	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60	1	87	38.40	1	84	37.30			
155	肝癌	2	54	23.46	C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15	3	54	23.83	2	61	27.08			
153 154	結腸直腸癌	3	48	20.85	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02	2	67	29.57	3	43	19.09			
174	女性乳癌(1)	4	24	20.35	C50	女性乳房癌(1)	4	23	19.59	4	25	21.39	4	22	18.87			
185	攝護腺癌(2)	5	17	15.14	C25	胰臟癌	7	22	9.64	7	26	11.48	5	30	13.32			
151	胃癌	6	30	13.03	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	9.92	6	16	14.59	6	12	11.04			
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	21	9.12	C16	胃癌	5	27	11.83	5	40	17.65	7	23	10.21			
156	膽囊癌	8	18	7.82	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	8	10	8.52	17	3	2.57	8	7	6.01			
157	胰臟癌	9	16	6.95	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	15	6.57	14	8	3.53	9	12	5.33			
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	12	5.21	C91-C95	白血病	10	11	4.82	14	8	3.53	10	11	4.88			
	其他		84	36.49		其他		89	38.98		103	45.46		119	52.84			
註：	年中人口數		230,172					228,319				226,567				225,228		

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		85年		86年		87年		88年		89年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		410	122.97		455	140.71		444	140.64		410	129.50		438	137.71		409	129.00
162	肺癌	1	85	25.49	1	95	29.38	1	91	28.82	1	80	25.27	1	95	29.87	1	78	24.60
153 154	結腸直腸癌	4	45	13.50	3	55	17.01	3	53	16.79	2	62	19.58	3	52	16.35	2	63	19.87
155	肝癌	2	72	21.59	2	66	20.41	2	70	22.17	3	51	16.11	2	62	19.49	3	61	19.24
174	女性乳癌(1)	3	24	14.17	4	25	15.20	4	26	16.15	4	23	14.19	4	24	14.67	4	21	12.83
151	胃癌	5	34	10.20	5	47	14.53	5	42	13.30	5	40	12.63	5	45	14.15	5	29	9.15
185	攝護腺癌(2)	7	10	6.09	8	10	6.29	7	15	9.70	7	12	7.77	7	12	7.77	7	12	7.82
183	卵巢癌(1)	8	8	4.72	13	5	3.04	9	7	4.35	17	2	1.23	11	5	3.06	9	7	4.28
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	13	3.90	7	25	7.73	8	22	6.97	8	17	5.37	8	22	6.92	8	19	5.99
179 180	子宮頸癌(1)	6	11	6.50	6	18	10.95	6	20	12.42	6	14	8.63	6	14	8.56	9	7	4.28
156	膽囊癌	20	3	0.90	10	12	3.71	13	7	2.22	10	12	3.79	17	6	1.89	12	12	3.78
	其他		105	31.49		97	30.00		91	28.82		97	30.64		101	31.76		100	31.61

註： 年中人口數 333,412 323,358 315,709 316,610 318,056 316,398

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		481	152.02		514	162.78		488	155.23		527	168.49		501	160.39		495	158.06
162	肺癌	1	116	36.66	1	107	33.89	1	97	30.86	1	113	36.13	1	105	33.62	1	110	35.12
153 154	結腸直腸癌	3	51	16.12	4	54	17.10	4	55	17.50	2	77	24.62	3	64	20.49	3	58	18.52
155	肝癌	2	65	20.54	2	90	28.50	2	71	22.59	3	69	22.06	2	73	23.37	2	84	26.82
174	女性乳癌(1)	4	25	15.27	3	30	18.32	3	33	20.20	4	26	15.96	4	30	18.39	6	19	11.59
151	胃癌	6	34	10.75	5	39	12.35	6	32	10.18	6	39	12.47	5	46	14.73	4	42	13.41
185	攝護腺癌(2)	5	22	14.41	6	17	11.18	5	17	11.26	5	22	14.67	6	18	12.06	5	19	12.74
183	卵巢癌(1)	12	6	3.67	12	6	3.66	10	8	4.90	7	11	6.75	12	7	4.29	7	12	7.32
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	19	6.01	7	29	9.18	7	31	9.86	13	13	4.16	9	17	5.44	8	20	6.39
179 180	子宮頸癌(1)	10	8	4.89	9	11	6.72	8	15	9.18	8	10	6.14	8	9	5.52	10	8	4.88
156	膽囊癌	11	14	4.42	11	14	4.43	13	11	3.50	11	15	4.80	10	15	4.80	11	12	3.83
	其他		121	38.17		117	37.05		118	37.54		132	42.20		117	37.46		111	35.44
註：	年中人口數		317,044			315,766			314,362			312,782			312,360			313,169	

表53-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年					
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		473	150.37	C00-C97	所有癌症死亡原因		501	159.36		549	175.55		572	183.58			
162	肺癌	1	96	30.52	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40	1	116	37.09	1	119	38.19			
153 154	結腸直腸癌	2	66	20.98	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86	2	71	22.70	2	70	22.47			
155	肝癌	3	64	20.35	C50	女性乳房癌(1)	4	24	14.50	4	35	21.20	3	36	21.84			
174	女性乳癌(1)	4	20	12.11	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	18	12.10	5	19	12.87	4	28	19.08			
151	胃癌	5	37	11.76	C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63	3	70	22.38	5	58	18.61			
185	攝護腺癌(2)	6	16	10.71	C25	胰臟癌	7	23	7.32	6	36	11.51	6	40	12.84			
183	卵巢癌(1)	7	14	8.48	C16	胃癌	6	30	9.54	7	35	11.19	6	40	12.84			
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	26	8.27	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45	9	18	5.76	8	32	10.27			
179 180	子宮頸癌(1)	9	12	7.27	C91-C95	白血病	13	10	3.18	10	15	4.80	9	16	5.13			
156	膽囊癌	10	22	6.99	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	12	3.82	10	15	4.80	10	14	4.49			
	其他		100	31.79		其他		122	38.81		119	38.05		119	38.19			
註：	年中人口數		314,548					314,386				312,730				311,589		

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		289	128.97		281	128.44		323	150.86		302	141.32		293	136.34		325	151.10
162	肺癌	1	50	22.31	1	53	24.22	2	54	25.22	2	51	23.86	1	66	30.71	1	50	23.25
155	肝癌	2	42	18.74	1	53	24.22	1	60	28.02	1	54	25.27	2	41	19.08	3	45	20.92
153 154	結腸直腸癌	4	37	16.51	4	24	10.97	3	39	18.22	3	34	15.91	3	36	16.75	2	48	22.32
151	胃癌	5	26	11.60	3	35	16.00	6	25	11.68	5	26	12.17	5	21	9.77	5	27	12.55
174	女性乳癌(1)	6	11	9.68	5	11	9.91	4	19	17.45	4	15	13.74	4	11	9.99	4	20	18.09
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	10	4.46	11	8	3.66	7	16	7.47	7	19	8.89	9	9	4.19	9	10	4.65
157	胰臟癌	11	9	4.02	7	11	5.03	11	10	4.67	16	5	2.34	6	16	7.44	16	5	2.32
150	食道癌	12	6	2.68	15	6	2.74	9	12	5.60	15	6	2.81	11	7	3.26	13	8	3.72
156	膽囊癌	12	6	2.68	11	8	3.66	13	9	4.20	9	10	4.68	11	7	3.26	9	10	4.65
185	攝護腺癌(2)	8	6	5.43	10	4	3.71	14	3	2.85	8	6	5.74	8	7	6.68	6	9	8.61
	其他		86	38.38		68	31.08		76	35.50		76	35.56		72	33.50		93	43.24

註： 年中人口數 224,076 218,782 214,109 213,703 214,910 215,092

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		349	161.73		359	165.59		354	162.92		370	170.56		374	172.44		351	160.83
162	肺癌	1	77	35.68	2	77	35.52	1	76	34.98	1	70	32.27	1	80	36.89	1	62	28.41
155	肝癌	2	65	30.12	1	80	36.90	2	73	33.60	2	64	29.50	3	46	21.21	2	61	27.95
153 154	結腸直腸癌	3	42	19.46	4	32	14.76	3	33	15.19	4	45	20.74	2	56	25.82	3	43	19.70
151	胃癌	7	19	8.80	5	30	13.84	5	29	13.35	5	24	11.06	5	29	13.37	5	26	11.91
174	女性乳癌(1)	4	14	12.58	3	17	15.16	4	16	14.21	3	29	25.77	4	21	18.63	4	19	16.70
200202203	非何杰金淋巴瘤	12	9	4.17	7	12	5.53	11	11	5.06	13	7	3.23	7	19	8.76	6	21	9.62
157	胰臟癌	11	10	4.63	7	12	5.53	12	8	3.68	6	19	8.76	9	14	6.45	7	16	7.33
150	食道癌	8	12	5.56	12	7	3.23	16	5	2.30	10	12	5.53	10	12	5.53	10	13	5.96
156	膽囊癌	8	12	5.56	10	11	5.07	13	7	3.22	10	12	5.53	12	7	3.23	12	10	4.58
185	攝護腺癌(2)	5	11	10.53	14	3	2.87	6	12	11.46	8	7	6.71	6	11	10.56	9	7	6.70
	其他		78	36.15		78	35.98		84	38.66		81	37.34		79	36.42		73	33.45
註：	年中人口數		215,788			216,806			217,284			216,934			216,887			218,244	

表53-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病 碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病 碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		384	175.32	C00-C97	所有癌症死亡原因		382	174.70		417	190.81		402	183.41
162	肺癌	1	84	38.35	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47	1	85	38.89	1	85	38.78
155	肝癌	2	64	29.22	C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35	2	62	28.37	2	63	28.74
153 154	結腸直腸癌	3	41	18.72	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78	4	42	19.22	3	54	24.64
151	胃癌	4	37	16.89	C50	女性乳房癌(1)	5	14	12.19	3	25	21.70	4	26	22.44
174	女性乳癌(1)	5	14	12.21	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	8	7.71	7	11	10.65	5	17	16.45
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	20	9.13	C16	胃癌	4	33	15.09	6	26	11.90	6	20	9.12
157	胰臟癌	7	18	8.22	C15	食道癌	11	11	5.03	9	14	6.41	7	14	6.39
150	食道癌	8	15	6.85	C25	胰臟癌	8	14	6.40	5	30	13.73	7	14	6.39
156	膽囊癌	9	14	6.39	C56,C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	10	6	5.22	8	10	8.68	9	7	6.04
185	攝護腺癌(2)	10	5	4.79	C91-C95	白血病	6	17	7.77	12	9	4.12	10	12	5.47
	其他		72	32.87		其他		94	42.99		103	47.13		90	41.06
註：	年中人口數		219,033				218,662			218,543			219,186		

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		244	141.22		210	124.35		242	145.85		227	136.96		247	148.86		275	167.47
162	肺癌	1	48	27.78	1	38	22.50	1	56	33.75	1	61	36.80	1	47	28.33	1	57	34.71
153 154	結腸直腸癌	4	30	17.36	4	30	17.76	4	24	14.46	4	23	13.88	3	32	19.29	3	32	19.49
155	肝癌	2	41	23.73	2	32	18.95	2	42	25.31	2	39	23.53	2	38	22.90	2	46	28.01
179 180	子宮頸癌(1)	5	7	8.17	5	10	11.93	5	11	13.32	6	6	7.24	6	6	7.20	5	9	10.89
151	胃癌	3	34	19.68	3	31	18.36	6	17	10.25	5	17	10.26	4	27	16.27	4	24	14.62
200202203	非何杰金淋巴瘤	17	3	1.74	7	10	5.92	8	10	6.03	11	5	3.02	11	8	4.82	14	5	3.04
150	食道癌	11	6	3.47	16	2	1.18	14	5	3.01	9	6	3.62	15	5	3.01	9	10	6.09
157	胰臟癌	9	8	4.63	14	4	2.37	10	8	4.82	7	8	4.83	8	9	5.42	12	7	4.26
174	女性乳癌(1)	6	6	7.00	6	8	9.54	3	15	18.16	3	13	15.68	5	8	9.60	5	9	10.89
204-208	白血病	12	5	2.89	11	5	2.96	11	7	4.22	9	6	3.62	11	8	4.82	10	8	4.87
	其他		56	32.41		40	23.69		47	28.33		43	25.94		59	35.56		68	41.41

註： 年中人口數 172,780 168,872 165,924 165,744 165,928 164,207

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		267	164.45		288	178.08		245	152.45		245	154.05		282	178.58		267	169.02
162	肺癌	1	60	36.95	1	47	29.06	1	59	36.71	1	53	33.32	1	53	33.56	1	57	36.08
153 154	結腸直腸癌	3	28	17.25	3	37	22.88	3	29	18.05	2	41	25.78	4	32	20.26	3	31	19.62
155	肝癌	2	37	22.79	2	38	23.50	2	32	19.91	3	34	21.38	3	34	21.53	2	41	25.95
179 180	子宮頸癌(1)	9	5	6.10	6	11	13.43	11	4	4.90	9	5	6.17	18	2	2.48	8	6	7.41
151	胃癌	3	28	17.25	4	29	17.93	5	20	12.45	4	21	13.20	5	25	15.83	5	20	12.66
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	12	7.39	9	12	7.42	7	9	5.60	8	10	6.29	6	20	12.67	7	13	8.23
150	食道癌	11	7	4.31	12	8	4.95	7	9	5.60	12	6	3.77	10	9	5.70	12	6	3.80
157	胰臟癌	8	11	6.77	7	16	9.89	9	8	4.98	7	12	7.55	7	11	6.97	9	9	5.70
174	女性乳癌(1)	5	13	15.87	8	8	9.77	4	14	17.15	6	9	11.11	2	19	23.55	4	14	17.28
204-208	白血病	11	7	4.31	10	9	5.57	9	8	4.98	14	5	3.14	13	8	5.07	11	7	4.43
	其他		59	36.34		73	45.14		53	32.98		49	30.81		69	43.70		63	39.88
註：	年中人口數		162,362		161,722		160,704		159,042		157,911		157,970						

表53-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年				
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率		
08-14	所有癌症死亡原因		258	162.22	C00-C97	所有癌症死亡原因		303	190.07		276	173.54		278	174.68		
162	肺癌	1	64	40.24	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64	1	57	35.84	1	64	40.22		
153 154	結腸直腸癌	2	39	24.52	C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70	3	31	19.49	2	41	25.76		
155	肝癌	3	32	20.12	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48	2	33	20.75	3	37	23.25		
179 180	子宮頸癌(1)	4	9	11.01	C50	女性乳房癌(1)	4	16	19.48	4	15	18.27	4	14	17.01		
151	胃癌	5	12	7.55	C16	胃癌	5	29	18.19	5	25	15.72	5	19	11.94		
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	11	6.92	C25	胰臟癌	9	9	5.65	7	13	8.17	6	16	10.05		
150	食道癌	6	11	6.92	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	11.65	9	5	6.50	7	5	6.51		
157	胰臟癌	8	10	6.29	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	8	5.02	14	5	3.14	8	9	5.66		
174	女性乳癌(1)	9	5	6.12	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	8	5.02	11	7	4.40	9	8	5.03		
204-208	白血病	10	9	5.66	C91-C95	白血病	8	11	6.90	14	5	3.14	9	8	5.03		
	其他		56	35.21		其他		73	45.79		80	50.30		57	35.82		
註：	年中人口數		159,045					159,412				159,045			159,144		

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		230	168.33		194	144.09		232	173.24		204	152.11		223	166.38		201	151.02
162	肺癌	1	45	32.93	2	28	20.80	1	46	34.35	2	31	23.12	3	29	21.64	1	39	29.30
155	肝癌	2	39	28.54	1	47	34.91	2	41	30.61	1	42	31.32	1	49	36.56	2	27	20.29
153 154	結腸直腸癌	4	22	16.10	3	22	16.34	3	29	21.65	3	22	16.40	2	30	22.38	3	20	15.03
174	女性乳癌(1)	5	10	14.75	6	6	9.00	6	7	10.56	4	9	13.55	4	11	16.56	5	7	10.59
185	攝護腺癌(2)	12	3	4.36	12	3	4.41	17	1	1.48	-	-	-	11	3	4.44	13	3	4.48
179 180	子宮頸癌(1)	11	3	4.43	4	7	10.50	5	11	16.60	8	4	6.02	6	7	10.54	5	7	10.59
151	胃癌	3	30	21.96	5	14	10.40	4	27	20.16	5	17	12.68	5	18	13.43	4	19	14.28
157	胰臟癌	6	9	6.59	16	2	1.49	10	6	4.48	10	7	5.22	16	4	2.98	7	12	9.02
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	9	6.59	10	6	4.46	9	9	6.72	10	7	5.22	12	5	3.73	11	6	4.51
150	食道癌	9	8	5.86	8	9	6.68	8	10	7.47	7	9	6.71	7	10	7.46	10	7	5.26
	其他		52	38.06		50	37.14		45	33.60		56	41.76		57	42.53		54	40.57

註： 年中人口數 136,634 134,640 133,922 134,112 134,033 133,098

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		223	168.92		250	190.53		242	185.78		205	158.94		228	178.60		273	215.19
162	肺癌	1	41	31.06	1	60	45.73	1	52	39.92	1	40	31.01	1	41	32.12	2	51	40.20
155	肝癌	2	39	29.54	2	38	28.96	2	41	31.48	1	40	31.01	3	34	26.63	1	57	44.93
153 154	結腸直腸癌	5	20	15.15	3	33	25.15	3	31	23.80	3	26	20.16	4	29	22.72	3	30	23.65
174	女性乳癌(1)	3	13	19.80	4	12	18.39	5	9	13.87	5	7	10.87	2	18	28.19	4	13	20.44
185	攝護腺癌(2)	14	3	4.52	9	5	7.58	6	6	9.18	13	3	4.64	10	4	6.27	7	6	9.48
179 180	子宮頸癌(1)	6	7	10.66	6	5	7.66	7	5	7.71	9	3	4.66	11	3	4.70	10	5	7.86
151	胃癌	4	21	15.91	5	19	14.48	4	20	15.35	4	15	11.63	5	14	10.97	8	12	9.46
157	胰臟癌	11	6	4.54	10	8	6.10	14	5	3.84	7	8	6.20	13	5	3.92	6	13	10.25
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	4.54	10	8	6.10	8	10	7.68	7	8	6.20	7	11	8.62	11	9	7.09
150	食道癌	9	7	5.30	8	10	7.62	9	9	6.91	14	3	2.33	6	14	10.97	9	11	8.67
	其他		60	45.45		52	39.63		54	41.46		52	40.32		55	43.08		66	52.02
註：	年中人口數		132,018		131,210		130,258		128,976		127,661		126,867						

表53-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		259	204.70	C00-C97	所有癌症死亡原因		267	212.93		255	205.60		255	205.65
162	肺癌	1	54	42.68	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66	1	56	45.15	1	56	45.16
155	肝癌	2	40	31.61	C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47	2	36	29.03	2	47	37.90
153 154	結腸直腸癌	3	35	27.66	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91	3	29	23.38	3	35	28.23
174	女性乳癌(1)	4	14	22.02	C50	女性乳房癌(1)	4	16	25.32	4	11	17.55	4	9	14.33
185	攝護腺癌(2)	5	10	15.89	C15	食道癌	6	9	7.18	11	7	5.64	5	15	12.10
179 180	子宮頸癌(1)	6	8	12.58	C16	胃癌	5	14	11.17	5	21	16.93	6	14	11.29
151	胃癌	7	14	11.06	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	3	4.82	6	8	13.04	7	5	8.17
157	胰臟癌	8	12	9.48	C56,C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	9	4	6.33	14	2	3.19	8	4	6.37
200 202 20	非何杰金淋巴瘤	9	9	7.11	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	8	6.38	7	15	12.09	9	7	5.65
150	食道癌	10	8	6.32	C91-C95	白血病	6	9	7.18	12	6	4.84	9	7	5.65
	其他		55	43.47		其他		61	48.65		64	51.60		56	45.16
註：	年中人口數		126,526				125,391			124,026			124,000		

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		270	125.11		317	149.15		322	153.50		301	143.94		366	175.24		332	160.08
155	肝癌	1	50	23.17	2	53	24.94	2	57	27.17	2	62	29.65	2	61	29.21	2	48	23.14
162	肺癌	2	48	22.24	1	67	31.52	1	68	32.42	1	67	32.04	1	73	34.95	1	71	34.23
153 154	結腸直腸癌	4	26	12.05	4	38	17.88	3	32	15.25	5	26	12.43	3	44	21.07	3	41	19.77
174	女性乳癌(1)	6	8	7.60	6	10	9.66	6	7	6.85	3	16	15.68	4	20	19.58	5	10	9.85
151	胃癌	3	42	19.46	3	39	18.35	4	31	14.78	4	30	14.35	5	29	13.88	4	31	14.95
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	9	4.17	9	10	4.71	11	11	5.24	10	10	4.78	7	19	9.10	8	13	6.27
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.52	7	7	6.42	10	6	5.58	17	2	1.87	12	5	4.69	7	7	6.61
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	12	5.56	16	3	1.41	7	14	6.67	7	12	5.74	13	9	4.31	10	10	4.82
150	食道癌	16	4	1.85	11	8	3.76	8	12	5.72	8	11	5.26	8	14	6.70	10	10	4.82
156	膽囊癌	10	6	2.78	14	4	1.88	13	9	4.29	10	10	4.78	9	12	5.75	12	9	4.34
	其他		60	27.80		78	36.70		75	35.75		55	26.30		80	38.30		82	39.54

註： 年中人口數 215,808 212,537 209,778 209,122 208,862 207,399

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		377	183.51		386	189.46		388	192.21		414	208.19		431	219.79		427	219.19
155	肝癌	2	65	31.64	2	69	33.87	1	79	39.14	2	71	35.70	2	55	28.05	2	72	36.96
162	肺癌	1	86	41.86	1	72	35.34	2	68	33.69	1	75	37.72	1	88	44.88	1	84	43.12
153 154	結腸直腸癌	3	47	22.88	3	48	23.56	3	37	18.33	3	47	23.64	3	42	21.42	3	67	34.39
174	女性乳癌(1)	5	14	13.91	5	15	15.01	4	16	16.14	5	15	15.35	4	19	19.68	5	15	15.60
151	胃癌	4	37	18.01	4	44	21.60	6	24	11.89	4	36	18.10	5	37	18.87	4	32	16.43
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	12	5.84	6	18	8.83	10	15	7.43	12	13	6.54	13	10	5.10	11	10	5.13
185	攝護腺癌(2)	8	7	6.68	11	6	5.78	9	9	8.76	8	10	9.89	7	12	12.05	6	14	14.19
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	18	8.76	9	14	6.87	8	19	9.41	7	20	10.06	6	27	13.77	8	22	11.29
150	食道癌	11	9	4.38	10	12	5.89	13	9	4.46	10	14	7.04	11	18	9.18	15	6	3.08
156	膽囊癌	11	9	4.38	12	11	5.40	11	14	6.94	15	7	3.52	9	22	11.22	17	5	2.57
	其他		73	35.53		77	37.79		98	48.55		106	53.30		101	51.51		100	51.33
註：	年中人口數		205,440			203,738			201,858			198,856			196,094			194,811	

表53-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	
08-14	所有癌症死亡原因		458	236.48	C00-C97	所有癌症死亡原因		394	205.83		419	221.23		446	236.27	
155	肝癌	1	94	48.54	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54	1	79	41.71	1	86	45.56	
162	肺癌	2	84	43.37	C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70	1	79	41.71	2	77	40.79	
153 154	結腸直腸癌	3	55	28.40	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08	3	57	30.10	3	50	26.49	
174	女性乳癌(1)	4	18	18.77	C50	女性乳房癌(1)	7	9	9.47	6	15	15.90	4	24	25.41	
151	胃癌	5	35	18.07	C16	胃癌	4	25	13.06	4	35	18.48	5	38	20.13	
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	24	12.39	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	7	9	9.47	10	7	7.42	6	12	12.70	
185	攝護腺癌(2)	7	9	9.21	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75	7	20	10.56	7	23	12.18	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	16	8.26	C25	胰臟癌	5	20	10.45	8	17	8.98	8	21	11.12	
150	食道癌	9	16	8.26	C54	子宮體癌(1)	-	-	-	19	2	2.12	9	6	6.35	
156	膽囊癌	10	15	7.74	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	9	4.70	14	7	3.70	10	11	5.83	
	其他		92	47.50		其他		96	50.15		101	53.33		98	51.92	
註：	年中人口數		193,675					191,416			189,399			188,768		

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		274	121.59		282	123.23		279	119.91		305	127.27		312	126.69		336	133.94
162	肺癌	1	53	23.52	1	51	22.29	2	45	19.34	1	70	29.21	1	70	28.42	1	63	25.11
155	肝癌	2	51	22.63	2	48	20.97	1	55	23.64	2	46	19.19	2	46	18.68	2	57	22.72
153 154	結腸直腸癌	5	28	12.42	3	38	16.60	4	26	11.17	3	38	15.86	3	34	13.81	3	37	14.75
174	女性乳癌(1)	3	16	14.36	5	12	10.57	3	16	13.81	5	10	8.35	5	12	9.72	4	15	11.90
151	胃癌	4	29	12.87	4	27	11.80	5	25	10.74	4	26	10.85	6	23	9.34	5	22	8.77
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.39	7	7	6.07	7	6	5.14	7	8	6.67	4	13	10.58	6	9	7.21
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	8.08	13	3	2.64	6	11	9.49	5	10	8.35	7	11	8.91	14	5	3.97
157	胰臟癌	10	7	3.11	8	11	4.81	10	10	4.30	15	6	2.50	9	13	5.28	12	10	3.99
183	卵巢癌(1)	9	4	3.59	17	2	1.76	18	1	0.86	18	2	1.67	11	6	4.86	7	9	7.14
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	7	3.11	10	10	4.37	8	11	4.73	11	7	2.92	12	9	3.65	12	10	3.99
	其他		65	28.84		73	31.90		73	31.37		82	34.22		75	30.45		99	39.46

註： 年中人口數 225,355 228,850 232,676 239,650 246,270 250,866

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		365	143.97		373	146.15		307	119.68		406	157.81		384	148.55		411	157.96
162	肺癌	1	82	32.34	1	72	28.21	1	74	28.85	1	90	34.98	1	84	32.50	1	88	33.82
155	肝癌	2	59	23.27	3	50	19.59	3	38	14.81	2	63	24.49	3	43	16.63	3	45	17.30
153 154	結腸直腸癌	4	30	11.83	2	57	22.33	2	40	15.59	4	45	17.49	2	44	17.02	2	53	20.37
174	女性乳癌(1)	3	16	12.53	4	20	15.53	4	12	9.25	3	25	19.18	4	19	14.47	4	21	15.83
151	胃癌	5	28	11.04	5	34	13.32	6	17	6.63	6	24	9.33	5	36	13.93	5	34	13.07
185	攝護腺癌(2)	6	12	9.53	7	9	7.12	5	9	7.10	5	12	9.45	6	14	11.01	6	16	12.55
179 180	子宮頸癌(1)	7	12	9.40	6	10	7.77	7	8	6.17	9	8	6.14	10	7	5.33	12	6	4.52
157	胰臟癌	11	10	3.94	9	14	5.49	10	11	4.29	10	14	5.44	7	16	6.19	7	24	9.22
183	卵巢癌(1)	13	5	3.92	10	7	5.44	13	4	3.08	15	4	3.07	16	3	2.28	8	9	6.78
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	9	3.55	13	6	2.35	14	6	2.34	10	14	5.44	7	16	6.19	9	16	6.15
	其他		102	40.23		94	36.83		168	65.49		211	82.01		202	78.14		203	78.02
註：	年中人口數		253,526		255,224		256,517		257,276		258,500		260,185						

表53-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年					
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		411	157.15	C00-C97	所有癌症死亡原因		426	162.79		394	150.79		417	159.41			
162	肺癌	1	85	32.50	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83	1	82	31.38	1	95	36.32			
155	肝癌	2	53	20.26	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34	3	47	17.99	2	58	22.17			
153 154	結腸直腸癌	3	43	16.44	C50	女性乳房癌(1)	3	28	20.87	4	19	14.15	3	27	20.03			
174	女性乳癌(1)	4	19	14.20	C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46	2	58	22.20	4	49	18.73			
151	胃癌	5	33	12.62	C16	胃癌	5	21	8.02	6	29	11.10	5	43	16.44			
185	攝護腺癌(2)	6	13	10.18	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	7.06	5	16	12.60	6	17	13.41			
179 180	子宮頸癌(1)	7	11	8.22	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	12	4.59	10	12	4.59	7	17	6.50			
157	胰臟癌	8	16	6.12	C25	胰臟癌	7	18	6.88	7	16	6.12	8	15	5.73			
183	卵巢癌(1)	9	8	5.98	C56,C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	9	7	5.22	13	5	3.72	9	6	4.45			
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	15	5.74	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	12	6	4.47	8	7	5.21	10	5	3.71			
	其他		215	82.20		其他		114	43.56		103	39.42		85	32.49			
註：	年中人口數		261,542					261,693				261,294				261,588		

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		139	123.11		139	124.03		149	133.80		137	122.50		146	129.34		166	146.12
162	肺癌	1	28	24.80	1	31	27.66	1	33	29.63	1	34	30.40	1	30	26.58	1	31	27.29
155	肝癌	2	23	20.37	2	23	20.52	3	16	14.37	2	22	19.67	2	25	22.15	5	17	14.96
153 154	結腸直腸癌	5	12	10.63	5	11	9.82	5	14	12.57	4	13	11.62	6	13	11.52	4	19	16.72
151	胃癌	3	16	14.17	3	22	19.63	3	16	14.37	5	11	9.84	4	18	15.95	2	23	20.25
174	女性乳癌(1)	4	6	10.80	4	6	10.88	2	13	23.70	8	3	5.44	3	10	17.94	3	10	17.81
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	6	5.31	8	6	5.35	10	5	4.49	9	5	4.47	8	7	6.20	11	5	4.40
185	攝護腺癌(2)	14	1	1.74	-	-	-	7	4	7.08	6	4	7.06	5	7	12.25	7	5	8.70
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	10	8.86	10	4	3.57	9	6	5.39	7	7	6.26	9	5	4.43	11	5	4.40
156	膽囊癌	10	4	3.54	14	2	1.78	17	1	0.90	13	3	2.68	18	1	0.89	14	3	2.64
179 180	子宮頸癌(1)	6	5	9.00	7	3	5.44	6	6	10.94	3	8	14.50	7	5	8.97	6	7	12.47
	其他		28	24.80		31	27.66		35	31.43		27	24.14		25	22.15		41	36.09

註： 年中人口數 112,912 112,072 111,358 111,840 112,884 113,607

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		202	177.13		177	155.42		176	155.09		193	170.72		186	164.58		206	182.05
162	肺癌	2	40	35.08	1	44	38.63	2	33	29.08	2	36	31.84	2	34	30.08	2	33	29.16
155	肝癌	1	43	37.71	2	23	20.20	1	47	41.42	1	37	32.73	1	39	34.51	1	38	33.58
153 154	結腸直腸癌	3	21	18.41	3	18	15.81	3	13	11.46	6	17	15.04	3	22	19.47	3	24	21.21
151	胃癌	6	16	14.03	4	16	14.05	5	12	10.57	4	19	16.81	6	12	10.62	4	19	16.79
174	女性乳癌(1)	4	9	15.93	7	4	7.06	4	6	10.60	3	10	17.73	4	9	15.96	5	8	14.14
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	8	7.02	9	7	6.15	7	7	6.17	15	4	3.54	9	6	5.31	7	8	7.07
185	攝護腺癌(2)	8	4	6.95	17	1	1.75	-	-	-	11	3	5.30	7	4	7.07	7	4	7.07
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	9	6	5.26	9	7	6.15	7	7	6.17	8	8	7.08	12	5	4.42	6	10	8.84
156	膽囊癌	10	5	4.38	9	7	6.15	13	4	3.52	8	8	7.08	9	6	5.31	11	5	4.42
179 180	子宮頸癌(1)	5	8	14.16	5	5	8.83	6	4	7.07	5	9	15.96	5	7	12.41	17	1	1.77
	其他		42	36.83		45	39.51		43	37.89		42	37.15		42	37.16		56	49.49
註：	年中人口數		114,040			113,888			113,480			113,052			113,017			113,155	

表53-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病 碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病 碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年					
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			
08-14	所有癌症死亡原因		195	171.83	C00-C97	所有癌症死亡原因		186	163.60		206	181.64		215	189.28			
162	肺癌	1	41	36.13	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66	1	52	45.85	1	51	44.90			
155	肝癌	2	30	26.43	C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87	3	22	19.40	2	37	32.57			
153 154	結腸直腸癌	3	24	21.15	C50	女性乳房癌(1)	2	14	24.46	4	8	13.97	3	15	26.05			
151	胃癌	4	15	13.22	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47	2	28	24.69	4	25	22.01			
174	女性乳癌(1)	5	7	12.30	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	5	4.40	9	7	6.17	5	15	13.21			
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	11	9.69	C16	胃癌	3	26	22.87	5	13	11.46	6	13	11.45			
185	攝護腺癌(2)	7	5	8.84	C15	食道癌	7	8	7.04	14	4	3.53	7	9	7.92			
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	8	7.05	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	4	7.09	7	6	10.69	8	4	7.14			
156	膽囊癌	8	8	7.05	C25	胰臟癌	7	8	7.04	5	13	11.46	9	7	6.16			
179 180	子宮頸癌(1)	10	4	7.03	C64	腎臟癌	14	2	1.76	-	-	-	9	7	6.16			
	其他		42	37.01		其他		36	31.66		53	46.73		32	28.17			
註：	年中人口數		113,487					113,694				113,411				113,586		

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		198	88.79		229	99.99		235	100.14		256	106.23		232	93.88		269	106.92
162	肺癌	2	29	13.00	3	37	16.16	1	50	21.31	1	53	21.99	1	49	19.83	1	50	19.87
153 154	結腸直腸癌	4	19	8.52	4	25	10.92	5	18	7.67	3	32	13.28	3	24	9.71	4	26	10.33
155	肝癌	1	42	18.83	1	44	19.21	2	42	17.90	2	50	20.75	2	36	14.57	2	44	17.49
151	胃癌	3	25	11.21	5	16	6.99	4	23	9.80	5	27	11.20	6	17	6.88	3	27	10.73
174	女性乳癌(1)	5	8	7.20	2	20	17.46	3	14	11.88	4	15	12.37	5	11	8.83	5	12	9.44
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.79	-	-	-	11	3	2.57	14	2	1.67	14	2	1.63	6	8	6.43
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.79	8	9	3.93	13	4	1.70	17	1	0.41	9	8	3.24	12	6	2.38
183	卵巢癌(1)	8	3	2.70	16	2	1.75	17	2	1.70	12	4	3.30	7	6	4.82	17	2	1.57
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	6	2.69	7	12	5.24	8	8	3.41	6	13	5.39	8	10	4.05	9	9	3.58
157	胰臟癌	11	5	2.24	10	6	2.62	6	13	5.54	9	9	3.73	15	4	1.62	8	13	5.17
	其他		55	24.66		58	25.33		58	24.72		50	20.75		65	26.30		72	28.62

註： 年中人口數 223,003 229,014 234,660 240,996 247,115 251,586

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		293	115.33		342	133.30		302	116.51		314	120.54		306	117.01		357	135.62
162	肺癌	1	58	22.83	1	81	31.57	1	61	23.53	2	55	21.11	1	56	21.41	1	87	33.05
153 154	結腸直腸癌	3	39	15.35	3	34	13.25	4	27	10.42	3	41	15.74	3	41	15.68	4	33	12.54
155	肝癌	2	45	17.71	2	56	21.83	2	49	18.90	1	58	22.27	2	43	16.44	2	53	20.13
151	胃癌	5	21	8.27	4	30	11.69	5	26	10.03	6	19	7.29	7	24	9.18	4	33	12.54
174	女性乳癌(1)	4	18	14.00	5	12	9.23	3	19	14.43	4	13	9.80	4	15	11.22	3	19	14.08
185	攝護腺癌(2)	7	8	6.38	9	6	4.74	17	2	1.57	5	12	9.39	6	12	9.39	9	7	5.46
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	18	5	1.97	6	14	5.46	10	8	3.09	9	13	4.99	15	5	1.91	10	10	3.80
183	卵巢癌(1)	16	3	2.33	15	3	2.31	12	4	3.04	15	4	3.01	10	6	4.49	11	5	3.70
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	11	4.33	13	7	2.73	6	19	7.33	10	11	4.22	9	12	4.59	8	16	6.08
157	胰臟癌	12	7	2.76	6	14	5.46	7	11	4.24	8	14	5.37	12	9	3.44	6	19	7.22
	其他		78	30.70		85	33.13		76	29.32		74	28.41		83	31.74		75	28.49
註：	年中人口數		254,052		256,566		259,200		260,495		261,519		263,231						

表53-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病 碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病 碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年					
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		373	140.72	C00-C97	所有癌症死亡原因		366	137.51		365	136.57		364	135.33			
162	肺癌	1	71	26.79	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55	1	74	27.69	1	77	28.63			
153 154	結腸直腸癌	2	52	19.62	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28	2	60	22.45	2	48	17.85			
155	肝癌	3	47	17.73	C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80	3	59	22.08	3	46	17.10			
151	胃癌	4	33	12.45	C50	女性乳房癌(1)	3	21	15.32	4	16	11.60	4	20	14.37			
174	女性乳癌(1)	5	16	11.74	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	6.97	6	9	6.96	5	11	8.48			
185	攝護腺癌(2)	6	15	11.65	C16	胃癌	5	25	9.39	5	21	7.86	6	21	7.81			
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	16	6.04	C15	食道癌	9	12	4.51	10	10	3.74	7	16	5.95			
183	卵巢癌(1)	8	8	5.87	C56,C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	-	-	-	13	4	2.90	8	8	5.75			
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	15	5.66	C25	胰臟癌	7	16	6.01	7	17	6.36	9	12	4.46			
157	胰臟癌	9	15	5.66	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	8	8	5.83	8	8	5.80	10	6	4.31			
	其他		85	32.07		其他		95	35.69		87	32.55		99	36.81			
註：	年中人口數		265,071					266,163				267,256				268,975		

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		322	107.80		383	129.25		388	131.94		389	131.74		371	125.33		408	138.39
162	肺癌	1	74	24.77	1	76	25.65	1	88	29.93	1	75	25.40	1	82	27.70	1	92	31.20
155	肝癌	2	62	20.76	2	68	22.95	2	66	22.44	2	64	21.68	2	55	18.58	2	66	22.39
174	女性乳癌(1)	5	10	6.67	5	15	10.09	3	24	16.27	3	25	16.85	6	11	7.38	3	26	17.48
153 154	結腸直腸癌	4	28	9.37	3	50	16.87	4	38	12.92	4	42	14.22	3	42	14.19	4	43	14.58
185	攝護腺癌(2)	7	7	4.70	7	9	6.09	13	4	2.73	7	7	4.77	5	11	7.49	11	6	4.11
151	胃癌	3	29	9.71	4	40	13.50	5	34	11.56	5	41	13.89	3	42	14.19	5	32	10.85
183	卵巢癌(1)	9	6	4.00	12	5	3.36	7	7	4.75	8	6	4.04	17	2	1.34	18	2	1.34
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	9	3.01	8	15	5.06	9	12	4.08	11	10	3.39	10	12	4.05	7	15	5.09
157	胰臟癌	10	11	3.68	9	12	4.05	14	8	2.72	11	10	3.39	8	15	5.07	7	15	5.09
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	6	2.01	10	11	3.71	14	8	2.72	14	9	3.05	10	12	4.05	15	8	2.71
	其他		80	26.78		82	27.67		99	33.67		100	33.87		87	29.39		103	34.94

註： 年中人口數 298,691 296,330 294,068 295,270 296,010 294,826

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		424	144.58		461	157.99		433	149.13		476	164.67		456	158.15		489	169.80
162	肺癌	1	86	29.32	1	85	29.13	1	97	33.41	1	120	41.51	1	99	34.33	1	101	35.07
155	肝癌	2	72	24.55	2	66	22.62	2	77	26.52	2	66	22.83	2	67	23.24	2	83	28.82
174	女性乳癌(1)	4	21	14.18	3	30	20.33	4	18	12.24	4	26	17.74	6	13	8.87	3	28	19.09
153 154	結腸直腸癌	3	51	17.39	4	58	19.88	3	50	17.22	3	56	19.37	2	67	23.24	4	54	18.75
185	攝護腺癌(2)	7	12	8.27	8	13	9.02	6	13	9.07	6	15	10.53	4	18	12.69	6	15	10.62
151	胃癌	5	34	11.59	5	44	15.08	5	31	10.68	5	32	11.07	5	32	11.10	5	39	13.54
183	卵巢癌(1)	8	8	5.40	10	6	4.07	17	2	1.36	8	9	6.14	15	4	2.73	8	9	6.14
200202203	非何杰金淋巴瘤	13	10	3.41	7	27	9.25	12	11	3.79	12	14	4.84	9	16	5.55	10	16	5.56
157	胰臟癌	14	9	3.07	11	11	3.77	8	16	5.51	11	15	5.19	7	22	7.63	12	15	5.21
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	12	4.09	11	11	3.77	7	18	6.20	7	24	8.30	9	16	5.55	7	19	6.60
	其他		109	37.17		110	37.70		100	34.44		99	34.25		102	35.38		110	38.20
註：	年中人口數		293,270			291,794			290,344			289,058			288,337			287,983	

表53-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		533	185.31	C00-C97	所有癌症死亡原因		475	165.76		482	169.15		483	169.95
162	肺癌	1	113	39.29	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15	1	114	40.01	1	99	34.83
155	肝癌	2	83	28.86	C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82	2	86	30.18	2	71	24.98
174	女性乳癌(1)	3	29	19.75	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38	4	45	15.79	3	59	20.76
153 154	結腸直腸癌	4	55	19.12	C50	女性乳房癌(1)	4	27	18.43	3	24	16.44	4	20	13.71
185	攝護腺癌(2)	5	16	11.36	C16	胃癌	5	33	11.52	6	29	10.18	5	32	11.26
151	胃癌	6	29	10.08	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	15	10.71	5	15	10.79	6	11	7.96
183	卵巢癌(1)	7	14	9.53	C25	胰臟癌	8	18	6.28	7	28	9.83	7	21	7.39
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	22	7.65	C15	食道癌	7	19	6.63	13	10	3.51	8	20	7.04
157	胰臟癌	9	21	7.30	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93	8	14	4.91	9	17	5.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	19	6.61	C56,C57. 0-C57.4	卵巢癌(1)	11	8	5.46	12	6	4.11	10	7	4.80
	其他		132	45.89		其他		102	35.60		111	38.95		126	44.34
註：	年中人口數		287,630				286,557			284,960		284,197			

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			85年			86年			87年			88年			89年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		277	114.03		316	130.49		307	126.96		326	133.63		344	139.59		357	144.18
162	肺癌	2	52	21.41	1	74	30.56	1	72	29.78	1	66	27.05	1	77	31.24	1	76	30.69
155	肝癌	1	58	23.88	2	57	23.54	2	62	25.64	2	60	24.59	2	55	22.32	2	56	22.62
153 154	結腸直腸癌	5	18	7.41	5	24	9.91	4	30	12.41	3	40	16.40	3	39	15.83	3	43	17.37
174	女性乳癌(1)	3	19	15.73	4	14	11.61	5	10	8.29	5	11	9.01	4	16	12.93	4	17	13.65
151	胃癌	4	22	9.06	3	34	14.04	3	36	14.89	4	31	12.71	6	22	8.93	5	32	12.92
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.64	7	8	6.58	8	7	5.78	7	7	5.74	7	7	5.70	14	3	2.44
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	2.47	10	9	3.72	12	6	2.48	8	13	5.33	8	14	5.68	7	19	7.67
179 180	子宮頸癌(1)	6	8	6.62	6	10	8.29	5	10	8.29	9	6	4.91	5	12	9.70	6	12	9.64
157	胰臟癌	7	10	4.12	8	14	5.78	9	10	4.14	6	16	6.56	8	14	5.68	9	12	4.85
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.65	11	7	2.89	9	10	4.14	17	5	2.05	10	11	4.46	8	14	5.65
	其他		78	32.11		65	26.84		54	22.33		71	29.10		77	31.24		73	29.48

註： 年中人口數 242,918 242,168 241,802 243,964 246,442 247,603

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97-99年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	90年		91年		92年		93年		94年		95年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		399	160.78		356	143.25		392	157.38		375	150.60		399	160.59		401	161.17
162	肺癌	1	88	35.46	1	84	33.80	1	86	34.53	1	81	32.53	1	78	31.39	1	92	36.98
155	肝癌	2	70	28.21	2	52	20.92	2	60	24.09	2	72	28.91	2	64	25.76	2	63	25.32
153 154	結腸直腸癌	4	37	14.91	3	42	16.90	3	45	18.07	3	42	16.87	3	52	20.93	3	46	18.49
174	女性乳癌(1)	5	17	13.59	8	9	7.17	5	15	11.90	5	13	10.30	5	16	12.67	6	12	9.47
151	胃癌	3	43	17.33	4	27	10.86	4	30	12.04	4	34	13.65	4	32	12.88	4	34	13.67
185	攝護腺癌(2)	7	8	6.50	6	10	8.13	6	10	8.13	6	9	7.33	6	13	10.64	7	8	6.56
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	13	5.24	7	19	7.65	8	13	5.22	11	11	4.42	8	16	6.44	8	15	6.03
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	7.19	5	12	9.56	16	4	3.17	7	8	6.34	9	8	6.34	5	13	10.25
157	胰臟癌	13	8	3.22	11	10	4.02	7	15	6.02	9	13	5.22	11	12	4.83	10	13	5.22
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	15	6.04	13	8	3.22	9	12	4.82	10	12	4.82	7	17	6.84	10	13	5.22
	其他		91	36.67		83	33.40		102	40.95		80	32.13		91	36.63		92	36.98
註：	年中人口數		248,166			248,510			249,072			249,009			248,464			248,807	

表53-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年					
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		463	185.33	C00-C97	所有癌症死亡原因		464	185.70		432	173.56		424	170.54			
162	肺癌	1	106	42.43	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82	1	84	33.75	1	97	39.01			
155	肝癌	2	61	24.42	C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62	3	57	22.90	2	59	23.73			
153 154	結腸直腸癌	3	59	23.62	C50	女性乳房癌(1)	4	20	15.62	4	28	21.92	3	28	21.90			
174	女性乳癌(1)	4	19	14.89	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	11.49	5	14	11.56	4	23	19.04			
151	胃癌	5	33	13.21	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81	2	59	23.70	5	45	18.10			
185	攝護腺癌(2)	6	15	12.28	C16	胃癌	6	27	10.81	6	27	10.85	6	23	9.25			
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	26	10.41	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	7	10	7.81	10	7	5.48	7	9	7.04			
179 180	子宮頸癌(1)	8	9	7.05	C25	胰臟癌	8	19	7.60	8	17	6.83	8	17	6.84			
157	胰臟癌	9	17	6.80	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.20	7	20	8.04	9	15	6.03			
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	16	6.40	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	19	7.60	11	13	5.22	10	14	5.63			
	其他		102	40.83		其他		119	47.63		106	42.59		94	37.81			
註：	年中人口數		249,825					249,864				248,900				248,627		

伍、歷年主要癌症發生率

表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人／每十萬男性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	247.37	216.08	34.38	28.83	38.69	35.97	34.08	29.37	26.82	22.51	16.02	12.04	12.32	11.68	4.68	4.05
85	267.36	226.20	40.01	32.15	41.53	37.46	39.09	32.75	26.19	20.98	18.86	13.98	15.19	13.84	4.81	3.78
86	266.91	220.52	37.80	29.26	44.42	39.08	36.72	30.44	26.25	20.38	21.40	15.83	12.86	11.45	5.70	4.54
87	287.79	231.95	43.41	33.25	44.57	37.95	39.66	32.28	25.24	19.54	24.55	17.05	16.87	14.86	6.98	5.35
88	306.62	268.49	43.38	36.36	46.89	42.54	42.84	38.20	24.29	20.45	29.10	23.72	18.40	16.97	6.95	5.66
89	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26
96	378.22	269.92	52.91	35.29	50.72	37.87	59.72	41.30	25.13	16.59	43.60	29.51	25.05	19.30	9.16	6.40
97	419.14	290.36	57.04	37.19	53.42	38.00	70.42	48.07	26.67	16.95	55.16	34.93	28.80	21.56	9.99	6.85

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88-97年係採2000年世界標準人口為基準計算。

表54·臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人／每十萬男性人口

年	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	7.48	6.53	5.97	6.05	9.14	8.38	9.67	7.64	2.57	2.08	5.89	5.38	2.80	2.48	4.16	3.54
85	6.34	5.59	5.50	5.29	8.93	8.13	10.46	8.09	1.91	1.53	4.73	4.10	3.36	3.18	3.21	2.99
86	8.55	7.30	4.47	4.32	9.24	8.22	10.09	8.20	3.31	2.49	5.24	4.64	3.46	3.16	3.39	2.88
87	7.06	5.71	5.37	5.20	7.29	6.22	12.66	9.50	2.91	2.31	5.98	5.06	2.53	2.46	3.61	2.86
88	9.39	8.39	5.04	4.86	8.94	8.06	13.52	11.32	2.67	2.19	3.89	3.34	3.67	3.68	4.89	4.26
89	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69
96	10.96	7.94	9.78	8.19	10.02	7.85	11.19	7.32	4.07	2.78	6.18	4.67	3.13	2.59	4.07	2.97
97	12.75	9.08	9.13	7.31	8.81	7.04	13.06	8.79	3.86	2.54	7.55	5.34	3.78	3.51	4.48	3.04

表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人/每十萬女性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	213.99	200.47	18.64	18.77	23.72	23.42	42.81	38.25	12.81	12.62	12.58	12.11	3.33	3.20	23.26	21.95
85	249.83	225.27	19.40	18.26	28.26	27.09	47.28	40.79	15.28	14.93	14.66	13.20	3.67	3.49	26.58	24.20
86	258.48	227.82	19.80	17.73	27.32	25.15	53.42	44.91	16.65	16.39	14.35	12.57	3.30	3.07	26.94	23.38
87	282.48	240.29	21.06	18.80	31.62	27.55	55.26	45.34	16.12	14.77	12.39	10.47	3.34	2.97	24.48	20.76
88	293.65	268.19	20.05	19.10	32.44	30.93	65.92	57.65	18.77	18.27	13.66	12.77	3.53	3.31	22.15	19.72
89	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21
96	328.84	236.19	32.11	22.18	48.16	33.66	92.48	66.76	19.53	13.51	14.06	9.49	5.62	3.78	12.06	8.53
97	351.41	244.08	34.99	23.40	49.63	32.68	96.16	67.67	22.56	15.27	14.20	9.24	6.51	4.29	12.94	8.79

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88-97年係採2000年世界標準人口為基準計算。

表55·臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人/每十萬女性人口

年	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	7.20	6.62	2.88	3.04	1.89	1.99	4.24	4.19	4.32	4.50	2.88	2.27	2.05	2.09	3.11	3.03
85	6.95	6.23	4.20	4.25	2.52	2.40	5.50	4.93	2.29	2.30	3.28	2.55	2.14	2.19	2.67	2.53
86	7.60	6.52	2.53	2.68	2.30	2.04	6.60	5.96	2.46	2.17	3.61	3.02	1.84	1.92	4.22	3.86
87	9.58	8.15	4.03	3.95	3.27	2.69	8.44	7.49	2.58	2.32	4.03	3.41	2.05	1.83	3.65	3.11
88	9.54	8.62	3.00	3.06	2.10	2.08	6.76	6.17	2.18	2.16	3.23	2.73	2.25	2.13	5.41	5.18
89	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67
96	11.61	8.93	5.03	4.55	3.18	2.09	13.76	10.11	2.44	1.79	2.89	2.15	2.22	2.04	5.40	3.52
97	12.35	9.00	5.25	4.19	3.85	2.48	16.79	11.52	3.55	2.64	3.40	2.60	2.96	2.61	5.18	3.21

陸、附錄

【附錄 1】99 年臺北市死因統計惡性腫瘤、肺癌蟬聯十大主要死因及癌症榜首

99 年臺北市民十大主要死因惡性腫瘤仍居榜首，骨骼肌肉系統及結締組織之疾病擠入第 10 名，事故傷害則退出。十大主要癌症死因肺癌續居首位，非何杰金氏淋巴瘤擠進第 8 名，食道癌則退出。

99 年臺北市民死亡人數為 1 萬 5,047 人，較 98 年增加 177 人(1.2%)；粗死亡率為每十萬人口 575.8 人，亦較 98 年增加 7.2 人(1.3%)，死亡者平均年齡為 73.7 歲，較全國 70.3 歲為高。如依 WHO 編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 338.8 人，較 98 年下降 8.5 人(2.4%)，並較全國標準化死亡率 455.6 人低，在全國 22 縣市中，僅高於金門縣、連江縣，為死亡率第三低的縣市。

十大主要死因死亡人數占總死亡人數的 7 成 5，惡性腫瘤仍居首位，其餘依序為 2.心臟疾病 3.腦血管疾病 4. 肺炎 5. 糖尿病 6.腎炎、腎病症候群及腎病變 7.慢性下呼吸道疾病 8. 敗血症 9. 高血壓性疾病 10.骨骼肌肉系統及結締組織之疾病；與 98 比較，除 6、7 名死因順序互換為腎炎、腎病症候群及腎病變第 6 名，慢性下呼吸道疾病第 7 名，以及骨骼肌肉系統及結締組織之疾病擠進第 10 名、事故傷害退至第 11 名以外，其餘名次不變。

99 年臺北市十大主要死因標準化死亡率較 98 年減少者有 6 項，分別為糖尿病(減 11.0%)、腦血管疾病(減 11.0%)、慢性下呼吸道疾病(減 9.9%)、心臟疾病(減 8.2%)、敗血病(減 2.0%)、惡性腫瘤(減 1.0%)；增加者有 4 項，分別為骨骼肌肉系統及結締組織之疾病(增 6.1%)、高血壓性疾病(增 3.8%)、腎炎、腎病症候群及腎病變(增 3.6%)、肺炎(增 1.8%)。

依性別觀察，男女十大主要死因第 1 至第 3 名順序皆為惡性腫瘤、心臟疾病及腦血管疾病。男性十大主要死因除高血壓性疾病擠進第 9 名，自殺退至 11 名外，其餘死因與 98 年相同；標準化死亡率與 98 年比較，除高血壓性疾病及惡性腫瘤增加 5.3%、2.4%外，餘均較上年減少，減幅最多為慢性下呼吸道疾病 14.5%，糖尿病 13.3%次之。女性十大死因與 98 年同，惟順位上亦略有變動；標準化死亡率較 98 年減幅最多為腦血管疾病 14.6%，糖尿病 9.0%次之，增幅最多為腎炎、腎病症候群及腎病變 12.7%。

依年齡層觀察，99 年臺北市 15-24 歲青年主要死因前 3 項為事故傷害占 34.1%、惡性腫瘤占 22.0%及自殺占 18.3%；奪去壯年 25-44 歲生命之主要死因為惡性腫瘤占 32.4%、自殺占 14.7%及事故傷害占 10.0%；45-64 歲中年則為惡性腫瘤占 46.7%、心臟疾病占 10.1%及腦血管疾病占 5.4%；65 歲以上老年主要死因仍以惡性腫瘤占 26.9%居首，依序為心臟疾病占 12.0%及腦血管疾病占 7.8%。

99 年臺北市民癌症死亡人數為 4,632 人，占總死亡人數約 3 成 1，平均約每 1 小時 53 分鐘就有 1 位市民因癌症死亡；粗死亡率為每十萬人口 177.3 人，死亡者平均年齡為 69.9 歲，較全國 67.3 歲高；死亡率若經標準化後為 110.1 人，較 98 年減少 1.1 人、1.0%，並較全國標準化死亡率 131.6 人低。十大癌症死因依序為 1.肺癌、2.肝癌、3.結腸直腸癌、4.女性乳癌、5.胃癌、6.攝護腺癌、7.胰臟癌、8.非何杰金氏淋巴瘤、9.口腔癌、10.子宮頸癌；與 98 年比較，前 7 名癌症死因順序相同，口腔癌及子宮頸癌各後退 1 名，非何杰金氏淋巴瘤擠入第 8 名，食道癌則退為第 11 名。

99 年臺北市十大癌症死因標準化死亡率較 98 年減少者有 6 項，減幅較多者為胰臟癌(減 11.8%)、胃癌(減 8.7%)；增加者有 4 項，增幅較多者為非何杰金氏淋巴瘤(增 19.1%)、女性乳癌(增 11.4%)。

若依性別觀察，99 年臺北市男性十大癌症死因除口腔癌前進 1 名、胰臟癌後退 1 名外，其餘死因及順位皆與 98 年同；男性標準化死亡率較 98 年增加，其中以非何杰金氏淋巴瘤增加 20.3% 最多。女性十大癌症死因除女性乳癌及非何杰金氏淋巴瘤各前進 1 名、結腸直腸癌及白血病後退 1 名外，其餘死因及順位亦與 98 年同；女性標準化死亡率較 98 年減少，其中以胰臟癌減少 18.7% 最多，結腸直腸癌減少 18.2% 次之。

臺北市政府衛生局為降低市民死亡率，辦理了多種疾病篩檢與服務，對於惡性腫瘤推出肝癌、直腸癌、乳癌、口腔癌及子宮頸癌等 5 項好發癌症篩檢；為預防腦血管疾病、糖尿病與高血壓疾病等，則有三高篩檢；在自殺防治方面，臺北市政府更於 98 年 4 月 15 日正式成立府級的「臺北市自殺防治中心」，結合衛生局、社會局、勞工局等 12 個局處，提供包括社區心理衛生及醫療資源、福利救助、職業訓練、就業諮商等各項服務。衛生局希望藉由前述之服務及措施，除能早期發現早期治療，並將健康管理的概念傳達給市民，締造一個更健康的社會。

表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因
民國99年

單位：人/每十萬人口，%

順位	合計				男				女			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
	所有死亡原因	15,047	575.8	100.0	所有死亡原因	8,882	704.1	100.0	所有死亡原因	6,165	456.1	100.0
1	惡性腫瘤	4,632	177.3	30.8	惡性腫瘤	2,771	219.7	31.2	惡性腫瘤	1,861	137.7	30.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,723	65.9	11.5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,039	82.4	11.7	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	684	50.6	11.1
3	腦血管疾病	1,047	40.1	7.0	腦血管疾病	602	47.7	6.8	腦血管疾病	445	32.9	7.2
4	肺炎	899	34.4	6.0	肺炎	548	43.4	6.2	糖尿病	385	28.5	6.2
5	糖尿病	769	29.4	5.1	糖尿病	384	30.4	4.3	肺炎	351	26.0	5.7
6	腎炎、腎病徵候群及腎病變	474	18.1	3.2	慢性下呼吸道疾病	335	26.6	3.8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	240	17.8	3.9
7	慢性下呼吸道疾病	465	17.8	3.1	事故傷害	258	20.5	2.9	敗血症	219	16.2	3.6
8	敗血症	449	17.2	3.0	腎炎、腎病徵候群及腎病變	234	18.5	2.6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	210	15.5	3.4
9	高血壓性疾病	422	16.1	2.8	高血壓性疾病	231	18.3	2.6	高血壓性疾病	191	14.1	3.1
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	380	14.5	2.5	敗血症	230	18.2	2.6	慢性下呼吸道疾病	130	9.6	2.1
	其他	3,787	144.9	25.2	其他	2,250	178.4	25.3	其他	1,449	107.2	23.5

資料來源：行政院衛生署。

表2 ICD-10 臺北市10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	98年		99年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	347.3	所有死亡原因	338.8	-2.4
1	惡性腫瘤	111.2	惡性腫瘤	110.1	-1.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40.0	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36.7	-8.2
3	腦血管疾病	24.6	腦血管疾病	21.9	-11.0
4	肺炎	16.6	肺炎	16.9	1.8
5	糖尿病	18.9	糖尿病	16.8	-11.0
6	慢性下呼吸道疾病	9.8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	10.1	3.6
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	9.7	慢性下呼吸道疾病	8.9	-9.9
8	敗血症	9.4	敗血症	9.2	-2.0
9	高血壓性疾病	8.2	高血壓性疾病	8.5	3.8
10	事故傷害	11.2	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6.8	6.1

資料來源：行政院衛生署。

表3 ICD-10 臺北市男性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	98年		99年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	425.2	所有死亡原因	421.3	-0.9
1	惡性腫瘤	134.1	惡性腫瘤	137.3	2.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	52.9	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47.6	-10.1
3	腦血管疾病	29.1	腦血管疾病	27.0	-7.1
4	肺炎	21.0	肺炎	21.0	-0.2
5	糖尿病	20.4	糖尿病	17.7	-13.3
6	慢性下呼吸道疾病	15.1	慢性下呼吸道疾病	12.9	-14.5
7	事故傷害	16.3	事故傷害	16.2	-0.7
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.8	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.6	-2.0
9	蓄意自我傷害(自殺)	14.8	高血壓性疾病	9.7	5.3
10	敗血症	10.3	敗血症	9.7	-5.5

資料來源：行政院衛生署。

表4 ICD-10 臺北市女性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	98年		99年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	276.9	所有死亡原因	265.6	-4.1
1	惡性腫瘤	90.1	惡性腫瘤	85.6	-4.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28.6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27.2	-4.7
3	腦血管疾病	20.6	腦血管疾病	17.6	-14.6
4	糖尿病	17.7	糖尿病	16.1	-9.0
5	肺炎	12.4	肺炎	13.0	4.9
6	敗血症	8.8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.8	12.7
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.7	敗血症	9.0	2.4
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7.8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7.6	-2.0
9	高血壓性疾病	7.3	高血壓性疾病	7.4	1.3
10	慢性下呼吸道疾病	4.6	慢性下呼吸道疾病	4.9	7.1

資料來源：行政院衛生署。

表5 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因
民國99年

單位：人·人/每十萬人口·%

順位	合計				男性				女性			
	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	癌症死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
	所有癌症死亡原因	4,632	177.3	100.0	所有癌症死亡原因	2,771	219.7	100.0	所有癌症死亡原因	1,861	137.7	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	990	37.9	21.4	氣管、支氣管和肺癌	617	48.9	22.3	氣管、支氣管和肺癌	373	27.6	20.0
2	肝和肝內膽管癌	644	24.6	13.9	肝和肝內膽管癌	443	35.1	16.0	女性乳房癌	266	19.7	14.3
3	結腸、直腸和肛門癌	570	21.8	12.3	結腸、直腸和肛門癌	331	26.2	11.9	結腸、直腸和肛門癌	239	17.7	12.8
4	女性乳房癌①	266	19.7	5.7	胃癌	197	15.6	7.1	肝和肝內膽管癌	201	14.9	10.8
5	胃癌	307	11.7	6.6	前列腺(攝護腺)癌	144	11.4	5.2	胃癌	110	8.1	5.9
6	前列腺(攝護腺)癌②	144	11.4	3.1	口腔癌	139	11.0	5.0	胰臟癌	85	6.3	4.6
7	胰臟癌	211	8.1	4.6	胰臟癌	126	10.0	4.5	子宮頸及部位未明示子宮癌	71	5.3	3.8
8	非何杰金氏淋巴瘤	152	5.8	3.3	食道癌	115	9.1	4.2	卵巢癌	66	4.9	3.5
9	口腔癌	151	5.8	3.3	非何杰金氏淋巴瘤	102	8.1	3.7	非何杰金氏淋巴瘤	50	3.7	2.7
10	子宮頸及部位未明示子宮癌①	71	5.3	1.5	白血病	65	5.2	2.3	白血病	42	3.1	2.3
	其他	1,126	43.1	24.3	其他	492	39.0	17.8	其他	358	26.5	19.2

資料來源：行政院衛生署。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表6 ICD-10 臺北市10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	98年		99年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死因	111.2	所有癌症死因	110.1	-1.0
1	氣管、支氣管和肺癌	22.9	氣管、支氣管和肺癌	22.6	-1.2
2	肝和肝內膽管癌	16.6	肝和肝內膽管癌	15.8	-4.8
3	結腸、直腸和肛門癌	14.0	結腸、直腸和肛門癌	13.1	-6.5
4	女性乳房癌①	11.5	女性乳房癌①	12.9	11.4
5	胃癌	7.3	胃癌	6.7	-8.7
6	前列腺(攝護腺)癌②	5.9	前列腺(攝護腺)癌②	5.9	-0.3
7	胰臟癌	5.7	胰臟癌	5.1	-11.8
8	口腔癌	3.8	非何杰金氏淋巴瘤	3.4	19.1
9	子宮頸及部位未明示子宮癌①	3.3	口腔癌	3.9	3.1
10	食道癌	3.2	子宮頸及部位未明示子宮癌①	3.4	2.4

資料來源：行政院衛生署。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表7 ICD-10 臺北市男性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	98年		99年		
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	134.1	所有癌症死亡原因	137.3	2.4
1	氣管、支氣管和肺癌	28.3	氣管、支氣管和肺癌	29.6	4.5
2	肝和肝內膽管癌	24.2	肝和肝內膽管癌	23.3	-4.0
3	結腸、直腸和肛門癌	15.2	結腸、直腸和肛門癌	16.0	5.1
4	胃癌	9.4	胃癌	8.9	-5.0
5	前列腺(攝護腺)癌	5.9	前列腺(攝護腺)癌	5.9	-0.3
6	胰臟癌	6.8	口腔癌	7.7	3.0
7	口腔癌	7.5	胰臟癌	6.4	-5.3
8	食道癌	5.9	食道癌	6.2	5.1
9	非何杰金氏淋巴瘤	3.8	非何杰金氏淋巴瘤	4.6	20.3
10	白血病	3.6	白血病	3.4	-6.3

資料來源：行政院衛生署。

表8 ICD-10 臺北市女性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口

順位	98年		99年		
	癌症死亡原因	標準化死亡率	癌症死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	90.1	所有癌症死亡原因	85.6	-4.9
1	氣管、支氣管和肺癌	17.5	氣管、支氣管和肺癌	16.4	-6.7
2	結腸、直腸和肛門癌	12.9	女性乳房癌	12.9	11.4
3	女性乳房癌	11.5	結腸、直腸和肛門癌	10.6	-18.2
4	肝和肝內膽管癌	10.0	肝和肝內膽管癌	9.3	-7.0
5	胃癌	5.3	胃癌	4.6	-12.9
6	胰臟癌	4.7	胰臟癌	3.9	-18.7
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	3.3	子宮頸及部位未明示子宮癌	3.4	2.4
8	卵巢癌	3.4	卵巢癌	3.2	-4.5
9	白血病	2.2	非何杰金氏淋巴瘤	2.3	14.7
10	非何杰金氏淋巴瘤	2.0	白血病	2.2	-1.5

資料來源：行政院衛生署。

【附錄 2】臺北市嬰兒出生率逐年下降，衝擊未來人口成長

近 10 年臺北市嬰兒出生人數由 90 年 26,998 人，降至 99 年 18,530 人，而出生率則由 10.2 ‰下降至 7.1 ‰，減少 3.1 個千分點；嬰兒死亡人數由 90 年 149 人，降至 99 年 71 人，另外，死亡率則由 5.5 ‰下降至 3.8 ‰，減少 1.7 個千分點。由數據顯示，新一代人口增加的速度已趨緩慢。

由於社會經濟的變遷造成生育率逐年下降，99 年全國育齡婦女總生育率（平均生育子女數）0.9 人，名列「超低生育率」國家，而臺北市 99 年總生育率亦僅為 0.9 人。近十年臺北市嬰兒出生率除 95、96 年略為回升外，餘呈逐年下降趨勢，影響所致臺北市 14 歲以下人口由 90 年 51 萬人，逐年遞減至 99 年 38 萬人，十年來減幅達 24.4%；而 65 歲以上之老年人口，則由 90 年 26 萬人，增至 99 年 33 萬人，增幅高達 26.8%，「少子高齡化」現象產生，對於社會結構、經濟發展等都將有重大影響。

若依臺北市近 10 年來嬰兒主要死因分析，3 大主要死因分別為源於周產期之病態、先天性畸形變形及染色體異常及事故傷害，其死亡人數分別為 469 人、236 人及 42 人，3 者合計占近 10 年嬰兒死亡人數 931 人之 80.2%。

若以臺北市各行政區資料觀之，近 10 年嬰兒出生率皆為下降之勢，其中以文山區降幅最大，由 90 年 11.3 ‰降至 99 年 7.0 ‰，減少 4.3 個千分點；嬰兒死亡率方面，12 個行政區中除信義區、中山區、中正區較 90 年增加外，餘均呈減少之勢，其中以南港區降低 6.0 個千分點最多。

與國內主要城市相較，99 年臺北市嬰兒出生率 7.1 ‰，與新北市相同，低於全國 7.2 ‰、臺中市 7.4 ‰，高於臺南市 6.2 ‰、高雄市 6.7 ‰。嬰兒死亡率方面，99 年臺北市為 3.8 ‰，低於全國 4.2 ‰、臺中市 8.0 ‰、臺南市 8.8 ‰、高雄市 8.8 ‰，高於新北市 3.6 ‰。

人口為國家基本要素之一，其數量、素質及分布，均關係國家之發展與社會之福祉。臺北市衛生局除對設籍臺北市孕婦提供孕婦母血唐氏症篩檢補助外，並針對符合相關規定之市民，辦理優生保健遺傳性疾病檢查補助及婚後育前健康檢查，同時於市立聯合醫院婦幼院區建立婦女兒童健康營造中心，自胎兒至更老年期規劃執行一系列醫療保健工作，期照護婦女及國家未來主人翁。

表1 臺北市近10年嬰兒出生率與死亡率

單位：人,0/00

年別	嬰兒出生人數	嬰兒出生率	嬰兒死亡人數	嬰兒死亡率
90年	26,998	10.2	149	5.5
91年	25,647	9.7	111	4.3
92年	23,311	8.9	89	3.8
93年	22,154	8.4	100	4.5
94年	20,962	8.0	89	4.2
95年	21,151	8.1	69	3.3
96年	21,620	8.2	89	4.1
97年	20,691	7.9	95	4.6
98年	19,403	7.4	69	3.6
99年	18,530	7.1	71	3.8
99年較90年增減 人(千分點)	-8468	-3.1	-78	-1.7

附註：(1) 嬰兒出生率=(活產嬰兒數/年中人口數) x1,000
 (2) 嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數/活產嬰兒數) x1,000
 資料來源：本府民政局、行政院衛生署

表2 臺北市近10年育齡婦女總生育率

單位：‰

年別	臺北市	全國
90年	1,205	1,400
91年	1,170	1,340
92年	1,085	1,235
93年	1,040	1,180
94年	985	1,115
95年	1,015	1,115
96年	1,020	1,100
97年	975	1,050
98年	940	1,030
99年	895	895
99年較90年增減 (千分點)	-310	-505

附註：育齡婦女總生育率=5 x ∑年齡別生育率。
 資料來源：內政部

表3 臺北市近10年人口結構

單位：人,%

年底別	合計	14歲以下		15-64歲		65歲以上	
		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
90年底	2,633,802	507,614	19.3	1,864,350	70.8	261,838	9.9
91年底	2,641,856	495,964	18.8	1,875,044	71.0	270,848	10.3
92年底	2,627,138	477,850	18.2	1,871,415	71.2	277,873	10.6
93年底	2,622,472	464,338	17.7	1,871,660	71.4	286,474	10.9
94年底	2,616,375	447,782	17.1	1,873,292	71.6	295,301	11.3
95年底	2,632,242	434,361	16.5	1,891,448	71.9	306,433	11.6
96年底	2,629,269	422,573	16.1	1,892,181	72.0	314,515	12.0
97年底	2,622,923	408,163	15.6	1,891,785	72.1	322,975	12.3
98年底	2,607,428	393,660	15.1	1,885,352	72.3	328,416	12.6
99年底	2,618,772	383,774	14.7	1,903,092	72.7	331,906	12.7
99年較90年增減(%)	-0.6	-24.4	-4.6	2.1	1.9	26.8	2.8

資料來源：本府民政局

表4 臺北市近10年嬰兒主要死亡原因

單位：人,%

排名	死因	總計		90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	排名	死因	總計		97年	98年	99年	
		人數	百分比										人數	百分比				
	總計	696	100	149	111	89	100	89	69	89		總計	235	100	95	69	71	
1	源於周產期之病態	355	51	78	70	41	47	47	34	38	1	源於周產期的特定病況	114	49	48	25	41	
2	先天性畸形	186	27	38	27	19	31	21	21	29	2	先天性畸形變形及染色體異常	50	21	16	20	14	
3	事故傷害	32	5	5	4	5	8	3	2	5	3	事故傷害	10	4	3	3	4	
4	肺炎	4	1			1	1				2	嬰兒猝死症候群(SIDS)	7	3	1	5	1	
5	惡性腫瘤	7	1	2		4				1	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	6	3	2	3	1	
6	腦膜炎	4	1	1		1				1	1	肺炎	6	3	5	1		
7	他殺	2	0		1		1				7	惡性腫瘤	3	1		3		
8	流行性感冒	1	0							1	8	敗血症	2	1	2			
												8	貧血	2	1	1	1	
												8	腦膜炎	2	1		1	1
	其他	105	15	25	9	18	12	18	9	14		其他	33	14	17	8	8	

資料來源：行政院衛生署

表5 臺北市各行政區嬰兒出生率及死亡率

單位：0/00

區別	90年		99年		99年較90年增減千分點	
	嬰兒出生率	嬰兒死亡率	嬰兒出生率	嬰兒死亡率	嬰兒出生率	嬰兒死亡率
松山區	8.8	4.4	6.8	2.8	-2.0	-1.6
信義區	10.8	5.0	7.3	5.4	-3.5	0.4
大安區	8.8	6.8	6.9	4.2	-1.9	-2.6
中山區	10.1	3.2	7.2	5.1	-2.9	1.9
中正區	9.2	2.7	6.4	3.9	-2.7	1.2
大同區	10.1	4.5	7.7	3.1	-2.4	-1.4
萬華區	10.9	6.7	7.1	3.7	-3.9	-2.9
文山區	11.3	5.6	7.0	4.4	-4.3	-1.2
南港區	11.8	8.2	8.0	2.2	-3.8	-6.0
內湖區	11.5	5.8	7.4	3.0	-4.1	-2.8
士林區	9.8	6.6	6.8	3.6	-3.0	-3.0
北投區	10.3	5.5	7.1	3.4	-3.2	-2.1

資料來源：本府民政局、行政院衛生署

表6 全國及五都嬰兒出生率及死亡率

單位：0/00

地區別	年	嬰兒出生率	嬰兒死亡率
全國	2010	7.2	4.2
臺北市	2010	7.1	3.8
新北市	2010	7.1	3.6
臺中市	2010	7.4	8.0
臺南市	2010	6.2	8.8
高雄市	2010	6.7	8.8

資料來源：內政部

【附錄3】ICD-10 新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較

表1.新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較

順位	新北市 2010				臺中市 2010				臺南市 2010				高雄市 2010				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	
	所有死亡原因	18,311	471.26	100.00	所有死亡原因	14,220	538.2	100.0	所有死亡原因	13,164	702.2	100.00	所有死亡原因	17,883	645.1	100.0	
1	惡性腫瘤	5,476	140.93	29.91	惡性腫瘤	4,089	154.8	28.8	惡性腫瘤	3,741	199.6	28.42	惡性腫瘤	5,118	184.6	28.6	
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,787	45.99	9.76	心臟疾病（高血壓 疾病除外）	1,387	52.5	9.8	心臟疾病（高血壓 疾病除外）	1,232	65.7	9.36	心臟疾病（高血壓 疾病除外）	1,679	60.6	9.4	
3	腦血管疾病	1,286	33.10	7.02	腦血管疾病	983	37.2	6.9	腦血管疾病	975	52.0	7.41	肺炎	1,326	47.8	7.4	
4	糖尿病	1,152	29.65	6.29	糖尿病	863	32.7	6.1	肺炎	947	50.5	7.19	腦血管疾病	1,083	39.1	6.1	
5	肺炎	998	25.69	5.45	事故傷害	727	27.5	5.1	糖尿病	800	42.7	6.08	糖尿病	979	35.3	5.5	
6	事故傷害	699	17.99	3.82	肺炎	688	26.0	4.8	事故傷害	617	32.9	4.69	事故傷害	777	28.0	4.3	
7	蓄意自我傷害（自殺）	668	17.19	3.65	慢性下呼吸道疾病	557	21.1	3.9	慢性下呼吸道疾病	480	25.6	3.65	慢性肝病及肝硬化	617	22.3	3.5	
8	慢性肝病及肝硬化	566	14.57	3.09	慢性肝病及肝硬化	510	19.3	3.6	衰老/老邁	422	22.5	3.21	慢性下呼吸道疾病	577	20.8	3.2	
9	高血壓性 疾病	562	14.46	3.07	腎炎、腎病症候群 及腎病變	462	17.5	3.2	慢性肝病及肝硬化	390	20.8	2.96	蓄意自我傷害（自殺）	508	18.3	2.8	
10	慢性下 呼吸道 疾病	559	14.39	3.05	高血壓性 疾病	395	15.0	2.8	腎炎、腎病症候群 及腎病變	384	20.5	2.92	腎炎、腎病症候群 及腎病變	503	18.1	2.8	
	其他	4,558	117.31	24.89	其他	3,559	134.7	25.0	其他	3,176	169.4	24.13	其他	4,716	170.1	26.4	
11	腎炎、腎病症候群 及腎病變	497	12.79	2.71	敗血症	379	14.3	2.7	高血壓性 疾病	376	20.06	2.86	高血壓性 疾病	451	16.3	2.5	
12	敗血症	482	12.41	2.63	蓄意自我傷害（自殺）	379	14.3	2.7	敗血症	337	17.98	2.56	敗血症	435	15.7	2.4	
13	骨骼肌肉系統及結 締組織之 疾病	328	8.44	1.79	衰老/老邁	184	7.0	1.3	蓄意自我傷害（自殺）	321	17.12	2.44	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	137	4.9	0.8	
14	原位與 良性腫 瘤（惡 性腫瘤 除外）	115	2.96	0.63	骨骼肌肉系統及結 締組織之 疾病	106	4.0	0.7	原位與 良性腫 瘤（惡 性腫瘤 除外）	75	4.00	0.57	骨骼肌肉系統及結 締組織之 疾病	136	4.9	0.8	
15	衰老/ 老邁	97	2.50	0.53	原位與 良性腫 瘤（惡 性腫瘤 除外）	100	3.8	0.7	骨骼肌肉系統及結 締組織之 疾病	68	3.63	0.52	衰老/ 老邁	120	4.3	0.7	
年中人口數		3,885,510				2,642,090				1,874,600				2,772,185			

表2.新北市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較

順位	新北市 2010				臺中市 2010				臺南市 2010				高雄市 2010				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	
1	所有死亡原因	5,476	140.93	100.00	所有死亡原因	4,089	154.8	100.0	所有死亡原因	3,741	199.6	100.00	所有死亡原因	5,118	184.6	100.0	
2	氣管、支氣管和肺癌	1,142	29.39	20.85	肝和肝內膽管癌	787	29.8	19.2	肝和肝內膽管癌	793	42.3	21.20	肝和肝內膽管癌	1,089	39.3	21.3	
3	肝和肝內膽管癌	874	22.49	15.96	氣管、支氣管和肺癌	756	28.6	18.5	氣管、支氣管和肺癌	758	40.4	20.26	氣管、支氣管和肺癌	883	31.9	17.3	
4	結腸、直腸和肛門癌	634	16.32	11.58	結腸、直腸和肛門癌	472	17.9	11.5	結腸、直腸和肛門癌	443	23.6	11.84	結腸、直腸和肛門癌	601	21.7	11.7	
5	女性乳房癌(1)	296	15.15	5.41	女性乳房癌(1)	207	15.6	5.1	女性乳房癌(1)	159	17.1	4.25	女性乳房癌(1)	188	13.6	3.7	
6	胃癌	344	8.85	6.28	口腔癌	243	9.2	5.9	前列腺(攝護腺)癌(2)	90	9.5	2.41	口腔癌	309	11.1	6.0	
7	口腔癌	310	7.98	5.66	胃癌	207	7.8	5.1	口腔癌	176	9.4	4.70	胃癌	247	8.9	4.8	
8	前列腺(攝護腺)癌(2)	124	6.42	2.26	前列腺(攝護腺)癌(2)	93	7.1	2.3	胃癌	176	9.4	4.70	前列腺(攝護腺)癌(2)	107	7.7	2.1	
9	胰臟癌	212	5.46	3.87	食道癌	186	7.0	4.5	食道癌	128	6.8	3.42	食道癌	210	7.6	4.1	
10	食道癌	200	5.15	3.65	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	71	5.4	1.7	胰臟癌	116	6.2	3.10	胰臟癌	189	6.8	3.7	
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	94	4.81	1.72	胰臟癌	136	5.1	3.3	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	56	6.0	1.50	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	89	6.4	1.7	
12	其他	1,246	32.07	22.75	其他	931	35.2	22.8	其他	846	45.1	22.61	其他	1,206	43.5	23.6	
13	非何杰金氏淋巴瘤	154	3.96	2.81	白血病	114	4.3	2.8	膀胱癌	94	5.01	2.51	非何杰金氏淋巴瘤	130	4.7	2.5	
14	卵巢癌(1)	77	3.94	1.41	非何杰金氏淋巴瘤	87	3.3	2.1	白血病	84	4.48	2.25	膀胱癌	108	3.9	2.1	
15	白血病	146	3.76	2.67	卵巢癌(1)	35	2.6	0.9	卵巢癌(1)	38	4.09	1.02	卵巢癌(1)	52	3.8	1.0	
16	鼻咽癌	90	2.32	1.64	膀胱癌	66	2.5	1.6	非何杰金氏淋巴瘤	67	3.57	1.79	白血病	96	3.5	1.9	
17	膀胱癌	77	1.98	1.41	鼻咽癌	63	2.4	1.5	膽囊和其他膽道癌	59	3.15	1.58	鼻咽癌	89	3.2	1.7	
年中人口數		3,885,510				2,642,090				1,874,600				2,772,185			

附註：(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

【附錄4】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

表1.臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2010				全國 2010				日本 2009(平成21年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	15,047	575.83	100.00	所有死亡原因	144,709	625.3	100.0	所有死亡原因	1,141,865	907.5	100.00
1	惡性腫瘤	4,632	177.26	30.78	惡性腫瘤	41,046	177.4	28.4	惡性腫瘤	344,105	273.5	30.14
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,723	65.94	11.45	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15,675	67.7	10.8	心臟疾病	180,745	143.7	15.83
3	腦血管疾病	1,047	40.07	6.96	腦血管疾病	10,134	43.8	7.0	腦血管疾病	122,350	97.2	10.71
4	肺炎	899	34.40	5.97	肺炎	8,909	38.5	6.2	肺炎	112,004	89.0	9.81
5	糖尿病	769	29.43	5.11	糖尿病	8,211	35.5	5.7	老邁	38,670	30.7	3.39
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	474	18.14	3.15	事故傷害	6,669	28.8	4.6	事故傷害	37,756	30.0	3.31
7	慢性下呼吸道疾病	465	17.79	3.09	慢性下呼吸道疾病	5,197	22.5	3.6	自殺	30,707	24.4	2.69
8	敗血症	449	17.18	2.98	慢性肝病及肝硬化	4,912	21.2	3.4	腎衰竭	22,743	18.1	1.99
9	高血壓性疾病	422	16.15	2.80	高血壓性疾病	4,174	18.0	2.9	肝臟疾病	15,969	12.7	1.40
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	380	14.54	2.53	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,105	17.7	2.8	慢性阻塞性肺病	15,359	12.2	1.35
	其他	3,787	144.92	25.17	其他	35,677	154.2	24.7	其他	221,457	176.0	19.39
11	事故傷害	359	13.74	2.39	蓄意自我傷害(自殺)	3,889	16.8	2.7				
12	蓄意自我傷害(自殺)	329	12.59	2.19	敗血症	3,784	16.4	2.6				
13	慢性肝病及肝硬化	318	12.17	2.11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,534	6.6	1.1				
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	120	4.59	0.80	衰老/老邁	1,518	6.6	1.0				
15	血管性及未明示之癱瘓症	116	4.44	0.77	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	968	4.2	0.7				
	年中人口數	2,613,100			23,140,948			125,820,336				

附註：斜體字列示參考，與順位無關。

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2010				全國 2010				日本 2009(平成21年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比
	所有死亡原因	71	383.16	100.00	所有死亡原因	705	423.49	100.00	所有死亡原因	2,556	239.4	100.00
1	源於周產期的特定病況	41	221.26	57.75	先天性畸形、變形及染色體異常	161	96.71	22.84	先天性畸形	897	84.0	35.09
2	先天性畸形變形及染色體異常	14	75.55	19.72	源於周產期的呼吸性疾患	107	64.27	15.18	特發於周產期的呼吸和心臟血管疾患	361	33.8	14.12
3	事故傷害	4	21.59	5.63	特發於周產期的感染	39	23.43	5.53	嬰兒猝死症候群	145	13.6	5.67
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	5.40	1.41	事故傷害	37	22.23	5.25	事故傷害	124	11.6	4.85
5	貧血	1	5.40	1.41	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	33	19.82	4.68	胎兒及新生兒出血和血液疾患	99	9.3	3.87
6	加害(他殺)	1	5.40	1.41	嬰兒猝死症候群(SIDS)	26	15.62	3.69	心臟疾病	81	7.6	3.17
7	腦膜炎	1	5.40	1.41	胎兒及新生兒出血及血液疾患	21	12.61	2.98	肺炎	39	3.7	1.53
8	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	5.40	1.41	心臟疾病(高血壓性心臟病除外)	17	10.21	2.41				
9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.40	1.41	新陳代謝疾患	14	8.41	1.99				
10					母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	9	5.41	1.28				
	其他	7	37.78	9.86	其他	241	144.77	34.18	其他	810	75.9	31.69
出生數		18,530			166,473			1,067,875				

表3. 少年（1-14歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2010				全國 2010				日本 2009(平成21年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	45	12.16	100.00	所有死亡原因	574	16.25	100.00	所有死亡原因	1,925	12.19	100.00
1	惡性腫瘤	13	3.51	28.89	事故傷害	150	4.25	26.13	事故傷害	378	2.39	19.64
2	事故傷害	8	2.16	17.78	惡性腫瘤	107	3.03	18.64	惡性腫瘤	293	1.85	15.22
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	4	1.08	8.89	先天性畸形變形及染色體異常	43	1.22	7.49	心臟疾病	133	0.84	6.91
4	先天性畸形變形及染色體異常	3	0.81	6.67	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	0.74	4.53	肺炎	85	0.54	4.42
5	腦血管疾病	1	0.27	2.22	肺炎	18	0.51	3.14	自殺	55	0.35	2.86
6	肺炎	1	0.27	2.22	加害(他殺)	13	0.37	2.26	腦血管疾病	27	0.17	1.40
7	敗血症	1	0.27	2.22	敗血症	12	0.34	2.09				
8	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.27	2.22	腦血管疾病	11	0.31	1.92				
9					骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	0.23	1.39				
10					原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	0.17	1.05				
	其他	13	3.51	28.89	其他	180	5.10	31.36	其他	954	6.04	49.56
年中人口數		369,984			3,531,224			15,796,607				

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2010				全國 2010				日本 2009(平成21年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	82	26.18	100.00	所有死亡原因	1,336	41.73	100.00	所有死亡原因	4,427	34.92	100.00
1	事故傷害	28	8.94	34.15	事故傷害	691	21.58	51.72	自殺	1,931	15.23	43.62
2	惡性腫瘤	18	5.75	21.95	蓄意自我傷害(自殺)	176	5.50	13.17	事故傷害	1,025	8.08	23.15
3	蓄意自我傷害(自殺)	15	4.79	18.29	惡性腫瘤	140	4.37	10.48	惡性腫瘤	365	2.88	8.24
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	0.96	3.66	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	1.31	3.14	心臟疾病	241	1.90	5.44
5	腦血管疾病	2	0.64	2.44	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20	0.62	1.50	腦血管疾病	80	0.63	1.81
6	糖尿病	1	0.32	1.22	肺炎	17	0.53	1.27	肺炎	32	0.25	0.72
7	敗血症	1	0.32	1.22	先天性畸形變形及染色體異常	17	0.53	1.27				
8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.32	1.22	腦血管疾病	14	0.44	1.05				
9	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.32	1.22	加害(他殺)	10	0.31	0.75				
10					原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	0.19	0.45				
	其他	12	3.83	14.63	其他	203	6.34	15.19	其他	753	5.94	17.01
年中人口數		313,173			3,201,572			12,678,309				

表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2010				全國 2010				日本 2009(平成21年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	682	84.38	100.00	所有死亡原因	10,045	132.38	100.00	所有死亡原因	26,653	79.26	100.00
1	惡性腫瘤	221	27.34	32.40	惡性腫瘤	2,563	33.78	25.52	自殺	8,634	25.68	32.39
2	蓄意自我傷害(自殺)	100	12.37	14.66	事故傷害	1,522	20.06	15.15	惡性腫瘤	5,627	16.73	21.11
3	事故傷害	68	8.41	9.97	蓄意自我傷害(自殺)	1,413	18.62	14.07	心臟疾病	2,633	7.83	9.88
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	65	8.04	9.53	慢性肝病及肝硬化	824	10.86	8.20	事故傷害	2,504	7.45	9.39
5	慢性肝病及肝硬化	37	4.58	5.43	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	686	9.04	6.83	腦血管疾病	1,601	4.76	6.01
6	腦血管疾病	12	1.48	1.76	腦血管疾病	330	4.35	3.29	肝臟疾病	739	2.20	2.77
7	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	9	1.11	1.32	肺炎	160	2.11	1.59	肝炎	325	0.97	1.22
8	高血壓性疾病	8	0.99	1.17	糖尿病	158	2.08	1.57	糖尿病	200	0.59	0.75
9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	0.99	1.17	敗血症	104	1.37	1.04	主動脈瘤剝離	177	0.53	0.66
10	糖尿病	7	0.87	1.03	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	103	1.36	1.03	腎衰竭	103	0.31	0.39
	其他	147	18.19	21.55	其他	2,182	28.76	21.72	其他	4,110	12.22	15.42
年中人口數		808,277			7,588,001			33,625,612				

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2010				全國 2010				日本 2009(平成21年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	2,874	371.91	100.00	所有死亡原因	32,985	533.96	100.00	所有死亡原因	140,810	416.95	100.00
1	惡性腫瘤	1,342	173.66	46.69	惡性腫瘤	13,589	219.98	41.20	惡性腫瘤	62,740	185.78	44.56
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	291	37.66	10.13	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	2,874	46.52	8.71	心臟疾病	17,141	50.76	12.17
3	腦血管疾病	154	19.93	5.36	慢性肝病及肝硬化	2,143	34.69	6.50	腦血管疾病	11,970	35.44	8.50
4	糖尿病	121	15.66	4.21	腦血管疾病	1,933	31.29	5.86	自殺	11,608	34.37	8.24
5	蓄意自我傷害(自 殺)	116	15.01	4.04	事故傷害	1,910	30.92	5.79	事故傷害	5,952	17.62	4.23
6	慢性肝病及肝硬化	108	13.98	3.76	糖尿病	1,634	26.45	4.95	肝臟疾病	5,093	15.08	3.62
7	事故傷害	97	12.55	3.38	蓄意自我傷害(自 殺)	1,408	22.79	4.27	肺炎	3,280	9.71	2.33
8	腎炎、腎病徵候群 及腎病變	69	8.93	2.40	肺炎	735	11.90	2.23	糖尿病	2,011	5.95	1.43
9	敗血症	50	6.47	1.74	腎炎、腎病症候群 及腎病變	672	10.88	2.04	主動脈瘤剝離	1,464	4.34	1.04
10	高血壓性疾病	50	6.47	1.74	高血壓性疾病	593	9.60	1.80	腎衰竭	1,075	3.18	0.76
	其他	476	61.60	16.56	其他	5,494	88.94	16.66	其他	18,476	54.71	13.12
年中人口數		772,772			6,177,440			33,771,170				

表7.老年人口(65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2010				全國 2010				日本 2009(平成21年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	11,293	3420.45	100.00	所有死亡原因	99,064	4006.19	100.00	所有死亡原因	964,863	3340.85	100.00
1	惡性腫瘤	3,038	920.16	26.90	惡性腫瘤	24,644	996.61	24.88	惡性腫瘤	275,047	952.35	28.51
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,359	411.62	12.03	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	12,030	486.50	12.14	心臟疾病	160,480	555.66	16.63
3	腦血管疾病	878	265.93	7.77	肺炎	7,974	322.47	8.05	腦血管疾病	108,649	376.20	11.26
4	肺炎	851	257.75	7.54	腦血管疾病	7,842	317.13	7.92	肺炎	108,236	374.77	11.22
5	糖尿病	640	193.84	5.67	糖尿病	6,416	259.47	6.48	老邁	38,662	133.87	4.01
6	慢性下呼吸道疾病	434	131.45	3.84	慢性下呼吸道疾病	4,819	194.88	4.86	事故傷害	27,710	95.95	2.87
7	腎炎、腎病徵候群 及腎病變	398	120.55	3.52	高血壓性疾病	3,513	142.07	3.55	腎衰竭	21,538	74.58	2.23
8	敗血症	391	118.43	3.46	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3,340	135.07	3.37	慢性阻塞性肺病	14,913	51.64	1.55
9	高血壓性疾病	364	110.25	3.22	敗血症	3,103	125.49	3.13	主動脈瘤剝離	12,254	42.43	1.27
10	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	348	105.40	3.08	事故傷害	2,359	95.40	2.38	糖尿病	11,758	40.71	1.22
	其他	2,592	785.07	22.95	其他	23,024	931.10	23.24	其他	185,616	642.70	19.24
年中人口數		330,161			2,472,771			28,880,763				

【附錄5】99年臺北市行政區別衛生統計指標

一、臺北市行政區別衛生統計指標 — 人口統計

中華民國99年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km ²	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km ²	9,635	22,442	20,084	27,423	16,089	20,972	21,931	21,362	8,325	5,220	8,558	4,562	4,386
年底人口數	合計		2,618,772	208,434	225,092	311,565	220,126	159,536	124,600	189,099	262,307	114,023	270,245	284,539	249,206
	男性	人	1,262,554	98,868	108,402	146,662	103,598	76,957	61,398	94,226	127,002	56,063	130,289	138,216	120,873
	女性		1,356,218	109,566	116,690	164,903	116,528	82,579	63,202	94,873	135,305	57,960	139,956	146,323	128,333
	性比例		93.09	90.24	92.90	88.94	88.90	93.19	97.15	99.32	93.86	96.73	93.09	94.46	94.19
人口變動	出生數	人	18,530	1,414	1,653	2,147	1,568	1,024	956	1,336	1,834	911	1,981	1,937	1,769
	死亡數	人	15,398	1,119	1,369	1,845	1,277	926	819	1,596	1,489	707	1,183	1,615	1,453
	粗出生率	‰	7.09	6.79	7.34	6.89	7.15	6.43	7.71	7.08	7.01	8.02	7.37	6.82	7.12
	粗死亡率	‰	5.89	5.37	6.08	5.92	5.83	5.82	6.60	8.45	5.69	6.22	4.40	5.68	5.84
	人口增加率	‰	4.35	2.11	-1.21	-0.15	8.62	4.94	9.73	3.51	5.51	7.72	9.49	2.41	4.67
	自然增加率	‰	1.20	1.42	1.26	0.97	1.33	0.62	1.10	-1.38	1.32	1.80	2.97	1.13	1.27
社會增加率	‰	3.14	0.69	-2.47	-1.12	7.25	4.31	8.58	4.88	4.18	5.90	6.48	1.27	3.39	
生育率	一般生育率		27	26	28	27	26	25	30	28	26	30	26	26	27
	總生育率		895	880	905	920	860	845	970	890	890	960	915	865	880
	15-19歲		2	1	4	1	1	0	3	3	1	2	1	2	1
	20-24歲		11	7	11	7	10	9	18	18	11	14	9	12	14
	24-29歲	%	42	40	41	38	40	37	47	44	45	53	40	42	42
	30-34歲		77	80	77	82	75	78	84	73	75	73	85	72	74
	35-39歲		41	41	41	48	40	40	36	34	40	43	41	40	40
	40-44歲		6	6	7	8	6	5	5	6	6	7	7	5	5
45-49歲		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
人口組成 (年底)	14歲以下 (a)		383,774	33,503	29,545	48,750	28,382	27,061	17,110	22,182	41,273	16,311	43,500	39,410	36,747
	15-64歲 (b)	人	1,903,092	147,157	165,134	216,953	163,165	110,370	90,392	138,069	190,511	84,852	203,498	209,735	183,256
	65歲以上 (c)		331,906	27,774	30,413	45,862	28,579	22,105	17,098	28,848	30,523	12,860	23,247	35,394	29,203
人口組成結 構比(年底)	14歲以下		14.65	16.07	13.13	15.65	12.89	16.96	13.73	11.73	15.73	14.31	16.10	13.85	14.75
	15-64歲	%	72.67	70.60	73.36	69.63	74.12	69.18	72.55	73.01	72.63	74.42	75.30	73.71	73.54
	65歲以上		12.67	13.33	13.51	14.72	12.98	13.86	13.72	15.26	11.64	11.28	8.60	12.44	11.72
	扶養比(a+c)/b	%	37.61	41.64	36.31	43.61	34.91	44.55	37.84	36.96	37.69	34.38	32.80	35.67	35.99
	老化指數c/a		86.48	82.90	102.94	94.08	100.69	81.69	99.93	130.05	73.95	78.84	53.44	89.81	79.47

二、臺北市行政區別衛生統計指標 — 醫療資源

中華民國99年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家	39	6	2	5	4	3	2	5	2	1	3	1	5
	診所		3,108	277	259	654	399	235	164	189	180	70	209	296	176
	護產機構		87	9	5	12	12	11	6	4	4	2	6	9	7
	精神復建機構		48	2	1	3	10	3	3	4	4	1	3	5	9
	其他醫療及醫事機構		110	10	9	26	18	8	6	7	5	1	8	8	4
	非醫事機構		560	27	31	54	51	45	27	30	73	26	45	73	78
	藥商		10,561	1,080	900	1,600	1,727	1,052	755	527	484	294	906	726	510
	合計		24,220	1,848	947	2,067	1,929	3,047	4,001	622	957	73	2,346	1,203	5,180
病床數	醫院病床	床	21,216	1,470	797	1,436	1,380	2,791	3,829	497	848	35	2,175	936	5,022
	一般急性病床		15,000	824	545	1,061	853	2,165	2,600	267	589	30	1,616	586	3,864
	一般慢性病床		742	141	-	-	20	-	175	98	-	-	-	-	308
	特殊病床		5,474	505	252	375	507	626	1,054	132	259	5	559	350	850
	診所病床		3,004	378	150	631	549	256	172	125	109	38	171	267	158
醫事人力 (醫療及醫事機構)	合計	人	44,869	3,220	2,390	5,171	4,290	6,067	4,726	1,341	2,294	370	3,635	2,975	8,390
	醫師		11,620	859	682	1,549	1,105	1,626	1,052	398	624	104	1,002	847	1,772
	西醫師		8,245	481	411	910	740	1,311	842	234	411	46	742	574	1,543
	中醫師		771	74	63	118	75	74	109	45	52	11	46	55	49
	牙醫師		2,604	304	208	521	290	241	101	119	161	47	214	218	180
	藥事人員		5,121	493	376	689	673	547	428	243	265	109	401	347	550
	護產人員		22,969	1,522	1,110	2,221	2,047	3,191	2,696	569	1,143	133	1,793	1,463	5,081
	醫檢人員		2,969	184	114	354	271	515	345	56	118	5	261	143	603
其他	2,190	162	108	358	194	188	205	75	144	19	178	175	384		
平均 每萬人 醫療資源	醫院	家	0.15	0.29	0.09	0.16	0.18	0.19	0.16	0.26	0.08	0.09	0.11	0.04	0.20
	診所	家	11.87	13.29	11.51	20.99	18.13	14.73	13.16	9.99	6.86	6.14	7.73	10.40	7.06
	病床數	床	92.49	88.66	42.07	66.34	87.63	190.99	321.11	32.89	36.48	6.40	86.81	42.28	207.86
	醫事人員數	人	171.34	154.49	106.18	165.97	194.89	380.29	379.29	70.92	87.45	32.45	134.51	104.56	336.67
	醫師	人	44.37	41.21	30.30	49.72	50.20	101.92	84.43	21.05	23.79	9.12	37.08	29.77	71.11
	西醫師	人	31.48	23.08	18.26	29.21	33.62	82.18	67.58	12.37	15.67	4.03	27.46	20.17	61.92
	中醫師	人	2.94	3.55	2.80	3.79	3.41	4.64	8.75	2.38	1.98	0.96	1.70	1.93	1.97
	牙醫師	人	9.94	14.58	9.24	16.72	13.17	15.11	8.11	6.29	6.14	4.12	7.92	7.66	7.22
	藥事人員	人	19.55	23.65	16.70	22.11	30.57	34.29	34.35	12.85	10.10	9.56	14.84	12.20	22.07
	護產人員	人	87.71	73.02	49.31	71.29	92.99	200.02	216.37	30.09	43.57	11.66	66.35	51.42	203.89
	醫檢人員	人	11.34	8.83	5.06	11.36	12.31	32.28	27.69	2.96	4.50	0.44	9.66	5.03	24.20
其他	人	8.36	7.77	4.80	11.49	8.81	11.78	16.45	3.97	5.49	1.67	6.59	6.15	15.41	

三、臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計

中華民國99年

單位		臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	腦血管疾病	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	肺炎	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
	糖尿病	5	4	5	5	5	7	5	5	5	6	4	4	5
	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	7	6	9	6	10	7	8	8	7	7	6	7
	慢性下呼吸道疾病	7	6	7	7	11	9	8	10	7	5	10	7	6
	敗血症	8	8	9	6	7	6	6	6	9	10	13	8	13
	高血壓性疾病	9	9	12	10	12	5	12	7	6	13	12	9	9
	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	12	8	8	8	8	13	12	10	11	8	10	12
十大死因 死亡率	所有死因	575.83	521.10	593.18	570.95	575.31	556.10	650.00	807.87	555.84	619.79	439.82	561.23	576.77
	惡性腫瘤	177.26	169.06	188.25	183.58	183.41	174.68	205.65	236.27	159.41	189.28	135.33	169.95	170.54
	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	65.94	69.64	63.49	68.36	66.15	64.72	66.94	88.47	57.34	65.15	49.45	65.45	72.80
	腦血管疾病	40.07	33.62	36.41	41.40	40.60	35.19	46.77	60.39	39.37	47.54	32.35	40.82	35.80
	肺炎	34.40	26.90	41.29	34.66	33.31	32.05	39.52	56.68	32.88	38.74	20.08	32.02	34.99
	糖尿病	29.43	28.34	24.86	25.03	28.74	20.11	34.68	45.56	30.58	29.05	23.05	32.02	34.59
	腎炎、腎病症候群及腎病變	18.14	14.41	19.98	14.44	20.99	11.31	22.58	25.43	20.26	22.01	14.87	18.65	17.30
	慢性下呼吸道疾病	17.79	15.37	18.65	15.40	14.14	13.20	18.55	20.66	24.08	32.57	13.01	17.59	17.70
	敗血症	17.18	13.45	15.98	18.29	19.16	22.62	25.81	31.79	15.67	15.85	8.92	15.48	12.47
	高血壓性疾病	16.15	13.45	14.21	14.44	13.69	25.76	12.10	25.96	24.08	11.45	11.15	14.07	14.48
骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14.54	11.53	16.87	14.76	16.42	15.71	12.10	17.48	15.29	14.09	13.38	12.67	14.08	

三、臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續1)

中華民國99年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世 界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	338.78	285.11	328.10	277.62	338.60	290.83	378.19	433.84	338.70	424.60	352.11	346.64	368.89
	惡性腫瘤		110.14	99.86	110.88	96.42	110.80	99.77	125.45	132.66	103.33	134.00	110.36	109.04	114.79
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)		36.69	34.19	31.30	30.67	35.98	34.02	37.30	45.11	32.62	43.64	39.58	39.89	43.99
	腦血管疾病		21.91	16.86	17.83	17.92	22.88	17.22	24.92	30.20	22.01	32.10	25.63	23.32	21.68
	肺炎		16.89	12.04	17.91	13.68	17.01	12.28	19.33	25.11	17.27	23.58	14.41	16.78	19.28
	糖尿病		16.78	14.64	13.88	11.66	15.36	9.59	19.34	23.81	17.62	19.03	19.20	19.02	21.84
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		10.07	7.66	10.29	6.70	11.43	5.39	12.11	12.97	11.99	14.46	11.87	10.79	10.33
	慢性下呼吸道疾 病		8.87	6.79	9.14	5.64	6.90	4.97	9.43	9.26	12.15	20.48	9.01	10.05	10.03
	敗血症		9.25	7.27	7.32	7.89	10.53	9.46	14.64	14.88	9.43	10.45	6.67	8.74	7.70
	高血壓性疾病 骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病		8.49	6.52	8.07	5.65	6.59	11.40	6.41	12.67	13.61	7.41	8.25	8.07	8.33
十大死因 標準化 死亡率 區排名	所有死亡原因	區排名		11	9	12	8	10	3	1	7	2	5	6	4
	惡性腫瘤			10	5	12	6	11	3	2	9	1	7	8	4
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)			8	11	12	7	9	6	1	10	3	5	4	2
	腦血管疾病			12	10	9	6	11	4	2	7	1	3	5	8
	肺炎			12	5	10	7	11	3	1	6	2	9	8	4
	糖尿病			9	10	11	8	12	3	1	7	5	4	6	2
	腎炎、腎病症候 群及腎病變			10	9	11	6	12	3	2	4	1	5	7	8
	慢性下呼吸道疾 病			10	7	11	9	12	5	6	2	1	8	3	4
	敗血症			11	10	8	3	5	2	1	6	4	12	7	9
	高血壓性疾病 骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病			10	7	12	9	3	11	2	1	8	5	6	4
			12	7	11	4	9	10	2	5	3	1	8	6	

三、臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續完)

中華民國99年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	合計	人/每十 萬人口	575.83	521.10	593.18	570.95	575.31	556.10	650.00	807.87	555.84	619.79	439.82	561.23	576.77
	0歲		379.01	286.94	535.40	421.45	520.66	379.69	317.80	365.36	420.28	217.16	300.30	354.61	329.04
	1-4歲		17.92	-	26.73	9.38	13.92	-	-	16.50	31.98	48.39	31.30	10.61	23.40
	5-14歲		10.33	11.83	19.14	10.98	5.02	14.52	0.00	19.87	3.26	8.75	12.27	13.99	3.72
	15-24歲		26.18	21.74	29.92	3.01	40.60	5.64	34.32	45.47	31.07	54.92	23.71	25.44	19.26
	25-44歲		84.38	76.32	65.29	75.59	85.83	77.36	105.06	125.22	77.47	97.01	82.57	85.99	80.51
	45-64歲		371.91	282.62	362.19	295.42	345.03	320.92	464.19	561.97	347.79	490.61	341.68	398.43	398.55
	65歲以上		3420.45	3091.02	3369.49	3100.66	3319.63	3153.64	3461.14	3880.36	3652.59	3899.35	3563.60	3298.35	3690.66
年齡別 死亡率 區排名	合計	區排名		11	4	7	6	9	2	1	10	3	12	8	5
	0歲			11	1	3	2	5	9	6	4	12	10	7	8
	1-4歲			10	4	9	7	10	10	6	2	1	3	8	5
	5-14歲			6	2	7	9	3	12	1	11	8	5	4	10
	15-24歲			9	6	12	3	11	4	2	5	1	8	7	10
	25-44歲			10	12	11	5	9	2	1	8	3	6	4	7
	45-64歲			12	6	11	8	10	3	1	7	2	9	5	4
	65歲以上			12	7	11	8	10	6	2	4	1	5	9	3

