

中華民國 107 年  
臺北市死因統計年報

臺北市政府衛生局編印

中華民國 108 年 11 月出版



## 凡 例

- 一、本年報編印之目的，係提供臺北市死因統計，以提供政府施政及學術研究之參考。
- 二、本年報內容計分：(一) 提要分析 (二) 人口統計指標 (三) 107 年死因統計 (四) 歷年死因統計 (五) 歷年主要癌症發生率等 5 類，凡 56 表；另附錄 1 至 5 共計 20 表。
- 三、部分資料因尾數四捨五入，計算時仍以原始數據計算，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。
- 四、本年報各表所稱「年」係指全年；「年底」係指當年 12 月底。
- 五、本年報所用符號代表意義如下：  
「—」經統計但無數據；「--」有數值，但該數值無意義；「…」數值不明或尚未產生資料；「0」代表有數值而不及半單位；「①」修正數。



# 目次

## 凡例

## 壹、提要分析

## 貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別.....	1
表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數.....	3
表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性.....	4
表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性.....	5
表F·臺北市各行政區年底人口數.....	6
表G·臺北市近十年各行政區年底人口數.....	7
表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	8
表I·臺北市近十年各行政區年中人口數.....	9

## 參、107年死因統計

### 一、主要死因統計

表 1·臺北市、全國主要死亡原因比較.....	11
表 2·ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3·ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

## 目 次

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因.....	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因.....	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因.....	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因.....	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因.....	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因.....	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65-74歲)主要死亡原因.....	23
表14 · ICD-10 臺北市老年(75-84歲)主要死亡原因.....	24
表15 · ICD-10 臺北市老年(85歲以上)主要死亡原因.....	25
表16 · ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因.....	26
表17 · ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因.....	27
表18 · ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因.....	28
表19 · ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因.....	29
表20 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因.....	30
表21 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因.....	31
表22 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式.....	32
表23 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式.....	33
表24 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式.....	34
表25 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因.....	35
表26 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況.....	36
表27 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	37
表28 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	38

# 目次

## 二、行政區別死因統計

表29-1~29-12·ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	39
表30-1~30-12·ICD-10 臺北市十二區事故傷害死亡原因.....	51
表31-1~31-12·ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	63
表32-1~32-12·ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	75

## 肆、歷年死因統計

### 一、主要死因統計

表33·臺北市歷年主要死亡原因.....	87
表34·臺北市歷年男性主要死亡原因.....	90
表35·臺北市歷年女性主要死亡原因.....	93
表36·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	96
表37·臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	97
表38·臺北市歷年事故傷害死亡原因.....	98
表39·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因.....	101
表40·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因.....	104
表41·臺北市歷年自殺死亡方式.....	107
表42·臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	110
表43·臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	113
表44·臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	116
表45·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	118
表46·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	120

# 目 次

表47·臺北市歷年主要癌症死亡原因 .....	122
表48·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因 .....	125
表49·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因 .....	128
表50·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	131
表51·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	133
表52·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	135
<b>二、行政區別死因統計</b>	
表53-1~53-12·臺北市十二區歷年主要死亡原因 .....	137
表54-1~54-12·臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因 .....	173
<b>伍、歷年主要癌症發生率</b>	
表55·臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	209
表56·臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	211
<b>陸、附錄</b>	
【附錄1】107年臺北市十大死因統計結果，慢性疾病囊括7項，癌症續居首席 .....	213
【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較.....	225
【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較.....	229
【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標.....	236
【附錄5】主要名詞解釋與公式.....	241



# 壹、提要分析




# 107 年臺北市主要死因提要說明

## 一、標準化死亡率較上(106)年增加 2.4%，較 98 年則減少 8.5%

107 年臺北市市民死亡人數 1 萬 8,050 人，平均每 29 分鐘就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 674.5 人，分別較上年增加 18.8 人(增 2.9%)；如依世界衛生組織(W.H.O.)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 317.6 人，較上年增加 0.3%，較 98 年則減少 8.5%。若與全國相較，107 年臺北市標準化死亡率較全國標準化死亡率每十萬人口 415.0 人低 23.5%，是全國 22 縣市中除金門縣與連江縣之外，標準化死亡率最低的縣市。

依近 10 年資料觀察，剔除人口結構因素影響後臺北市市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則反之，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。(詳圖 1)




## 二、臺北市市民十大死因惡性腫瘤蟬連榜首

107 年臺北市市民十大死因中惡性腫瘤仍蟬居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、事故傷害、敗血症、高血壓性疾病；十大死因之死亡人數占總死亡人數 78.3%，其中仍以惡性腫瘤占 29.0% 最多，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 16.6% 次之，肺炎占 9.0% 居三。(詳表 1、圖 2)

表 1 ICD-10 107 年臺北市十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	18,050	100.0
1	惡性腫瘤	5,238	29.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3,000	16.6
3	肺炎	1,619	9.0
4	腦血管疾病	1,152	6.4
5	糖尿病	692	3.8
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	621	3.4
7	慢性下呼吸道疾病	514	2.8
8	事故傷害	455	2.5
9	敗血症	449	2.5
10	高血壓性疾病	386	2.1
	其他	3,924	21.7



### 三、死亡年齡平均數較 98 年增加 3.4 歲

107 年臺北市民死亡年齡平均數為 76.4 歲，較全國高 3.4 歲，與 98 年比較則增加 3.4 歲，其中男性死亡年齡平均數為 75.2 歲，女性為 77.9 歲，男性較女性低 2.7 歲；十大死因中死亡年齡平均數以肺炎 85.4 歲最高，慢性下呼吸道疾病 84.2 歲次之，最低為事故傷害 64.9 歲。

若以死亡年齡中位數來看，107 年臺北市民死亡年齡中位數為 80 歲，較全國高 3 歲，與 98 年比較則增加 3 歲，其中男性死亡年齡中位數為 79 歲，女性為 82 歲，男性較女性低 3 歲；十大死因中死亡年齡中位數以肺炎 88 歲最高，慢性下呼吸道疾

病 87 歲次之，最低為事故傷害 69 歲。(詳表 2)

表 2 ICD-10 107 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

單位：歲

死因別	所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性除外)	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性下呼吸道疾病	敗血症	事故傷害	高血壓性疾病	
												死亡年齡平均數
死亡年齡平均數	兩性	76.4	71.5	79.8	85.4	79.1	78.6	80.3	84.2	80.9	64.9	81.5
	男性	75.2	71.8	77.4	84.4	78.2	75.4	79.3	84.1	79.9	62.6	79.3
	女性	77.9	71.1	82.9	86.6	80.4	81.8	81.3	84.4	82.2	69.3	83.6
死亡年齡中位數	兩性	80	73	84	88	83	81	83	87	85	69	85
	男性	79	72	81	87	82	78	81	87	84	66.5	84
	女性	82	73	86	88	84	83	84	86	86	77	86


### 四、臺北市男性十大死因蓄意自我傷害(自殺)進入第 10 名

107 年臺北市男性死亡人數為 10,160 人，死亡率為每十萬男性人口 795.2 人，較上年增加 2.5%；標準化死亡率為每十萬男性人口 403.7 人，較上年增加 1.0%，較 98 年則減少 5.1%。

107 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、慢性下呼吸道疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、事故傷害、敗血症、蓄意自我傷害(自殺)；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 79.0%，其中仍以惡性腫瘤占 28.8% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 16.9%。(詳表 3、圖 3)

表 3 ICD-10 107 年臺北市男性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	10,160	100.0
1	惡性腫瘤	2,926	28.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,715	16.9
3	肺炎	924	9.1
4	腦血管疾病	667	6.6
5	慢性下呼吸道疾病	397	3.9
6	糖尿病	341	3.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	294	2.9
8	事故傷害	294	2.9
9	敗血症	252	2.5
10	蓄意自我傷害(自殺)	219	2.2
	其他	2,131	21.0




### 五、臺北市女性十大死因蓄意自我傷害(自殺)進入第 10 名

107 年臺北市女性死亡人數為 7,890 人，死亡率為每十萬女性人口 564.3 人，較上年增加 3.4%；標準化死亡率為每十萬女性人口 246.2 人，較上年減少 0.5%，較 98 年則減少 11.1%。

107 年女性十大死因之首亦為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病、敗血症、事故傷害及蓄意自我傷害(自殺)；女性十大死因死亡人數占女性總死亡人數 77.9%，其中亦以惡性腫瘤占 29.3% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 16.3%。(詳表 4、圖 4)

表 4 ICD-10 107 年臺北市女性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	7,890	100.0
1	惡性腫瘤	2,312	29.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,285	16.3
3	肺炎	695	8.8
4	腦血管疾病	485	6.1
5	糖尿病	351	4.4
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	327	4.1
7	高血壓性疾病	201	2.5
8	敗血症	197	2.5
9	事故傷害	161	2.0
10	蓄意自我傷害(自殺)	130	1.6
	其他	1,746	22.1



#### 六、嬰兒(未滿1歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占4成8

107年臺北市未滿1歲嬰兒死亡人數為101人，死亡率為每十萬人口445.7人，分別較上年增加11人、增加23.8%。男嬰死亡率為每十萬人口514.8人，較上年增加30.0%；女嬰死亡率為372.4人，較上年增加15.8%。嬰兒主要死因前3項分別為(1)源於周產期的特定病況48人占47.5%，(2)先天性畸形變形及染色體異常21人占20.8%，(3)事故傷害9人占8.9%，3者合占嬰兒死亡人數的77.2%。

#### 七、少年(1-14歲)惡性腫瘤居首位死因，占1成6

107年臺北市1-14歲少年死亡人數為37人，死亡率為每十萬人口10.8人，分別較上年增加5人、16.7%。少年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤6人占16.2%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)5人占13.5%，(3)先天性畸形變形及染色體異常4人占10.8%，3者合占少年死亡人數的40.5%。

#### 八、青年(15-24歲)事故傷害續居死因首位，占3成

107年臺北市15-24歲青年死亡人數為77人，死亡率為每十萬人口28.0人，分別較上年增加11人、20.8%。青年主要死因前3項分別為(1)事故傷害23人占29.9%，(2)蓄意自我傷害(自殺)17人占22.1%，(3)惡性腫瘤13人占16.9%，3者合占青年死亡人數的68.8%。

#### 九、壯年(25-44歲)死因之前二位為惡性腫瘤、蓄意自我傷害(自殺)

107年臺北市25-44歲壯年死亡人數為532人，死亡率為每十萬人口67.4人，分別較上年減少51人、-7.5%。壯年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤163人占30.6%，(2)蓄意自我傷害(自殺)96人占18.1%，(3)事故傷害57人占10.7%，3者合占壯年死亡人數的59.4%。

#### 十、中年(45-64歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占4成7

107年臺北市45-64歲中年死亡人數為3,056人，死亡率為每十萬人口383.8人，分別較上年減少13人、增加0.5%。中年

主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤 1,422 人占 46.5%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 402 人占 13.2%，(3)腦血管疾病 163 人占 5.3%，3 者合占中年死亡人數的 65.0%。

#### 十一、老年(65-74 歲)死亡率以惡性腫瘤為首，占 4 成 2

107 年臺北市 65-74 歲老年死亡人數為 2,874 人，占總死亡人數的 15.9%，死亡率為每十萬人口 1,086.3 人，較上年減少 2.1%。65-74 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,221 人占 42.5%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 406 人占 14.1%，(3)腦血管疾病 155 人占 5.4%，3 者合占 65-74 歲老年死亡人數的 62.0%。

#### 十二、老年(75-84 歲)死亡率亦以惡性腫瘤為首，占 3 成 1

107 年臺北市 75-84 歲老年死亡人數為 4,434 人，占總死亡人數的 24.6%，死亡率為每十萬人口 3,482.2 人，較上年增加 0.4%。75-84 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,363 人占 30.7%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)716 人占 16.2%，(3)肺炎 359 人占 8.1%，3 者合占 75-84 歲老年死亡人數的 55.0%。


#### 十三、老年(85 歲以上)死亡率以心臟疾病(高血壓性疾病除外)為首，占 2 成

107 年臺北市 85 歲以上老年死亡人數為 6,939 人，占總死亡人數的 38.4%，死亡率為每十萬人口 12,173.8 人，較上年增加 1.5%。85 歲以上老年主要死因前 3 項分別為(1)心臟疾病(高

血壓性疾病除外)1,415 人占 20.4%，(2)肺炎 1,053 人占 15.2%，(3)惡性腫瘤 1,049 人占 15.1%，3 者合占 85 歲以上老年死亡人數的 50.7%。

#### 十四、行政區以萬華區標準化死亡率最高，大同區次之

107 年臺北市 12 個行政區死亡率以萬華區每十萬人口 927.0 人最高，大同區 768.4 人次之，內湖區 491.0 人最低；標準化後萬華區每十萬人口 394.2 人仍為最高，南港區 375.9 人次之，大安區 266.1 人最低。(詳圖 5)



#### 十四、惡性腫瘤(癌症)


##### (一)「氣管、支氣管和肺癌」、「結腸、直腸和肛門癌」、「肝和肝內膽管癌」續居癌症死因前三位

107年臺北市惡性腫瘤死亡人數為5,238人，占總死亡人數之29.0%，死亡率為每十萬人口195.7人，較上年增加4.0%；標準化死亡率為每十萬人口100.5人，較上年增加1.8%，較98年則減少9.7%。

107年臺北市十大癌症死因中氣管、支氣管和肺癌仍居榜首，其次依序為結腸、直腸和肛門癌、肝和肝內膽管癌、女性乳房癌、前列腺(攝護腺)癌、胰臟癌、胃癌、口腔癌、非何杰金氏淋巴瘤、卵巢癌；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數75.0%，其中氣管、支氣管和肺癌占20.1%最多，結腸、直腸和肛門癌占13.5%次之，肝和肝內膽管癌占13.0%再次之。(詳表5、圖6)

表 5. ICD-10 107 年臺北市十大癌症死因

單位：人、%			
順位	癌症死因	死亡人數	死亡百分比
	所有癌症死因	5,238	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	1,053	20.1
2	結腸、直腸和肛門癌	705	13.5
2	肝和肝內膽管癌	679	13.0
4	女性乳房癌	321	6.1
5	前列腺(攝護腺)癌	160	3.1
6	胰臟癌	308	5.9
7	胃癌	288	5.5
8	口腔癌	176	3.4
9	非何杰金氏淋巴瘤	159	3.0
10	卵巢癌	79	1.5
	其他	1,310	25.0





(二)男性癌症標準化死亡率較上年增加 4.9%、女性則減少

1.4%，惟男性癌症標準化死亡率仍為女性的 1.5 倍

107 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性為 2,926 人，女性為 2,312 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 123.4 人、每十萬女性人口 82.0 人，男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性增加 152 人、女性增加 24 人，標準化死亡率男性增加 4.9%，女性減少 1.4%。

107 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 71.5 歲，較全國高 2.5 歲，與 98 年比較則增加 2 歲，其中男性死亡年齡平均數為 71.8 歲，女性為 71.1 歲。107 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平均數以前列腺(攝護腺)癌 81.8 歲最高，胃癌 74.2 歲次之，最低為卵巢癌 62.2 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，107 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 73 歲，較全國高 4 歲，與 98 年比較則增加 1 歲，其中男性死亡年齡中位數為 72 歲，女性為 73 歲。107 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡中位數以前列腺(攝護腺)癌 83 歲最高，胃癌 76 歲次之，最低為卵巢癌 61 歲。(詳表 6)

表 6. ICD-10 107 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數  
單位：歲

死因別		所有癌症死因	氣管、支氣管和肺癌	結腸、直腸和肛門癌	肝和肝內膽管癌	女性乳房癌	前列腺(攝護腺)癌	胰臟癌	胃癌	卵巢癌	口腔癌	子宮頸及部位未明示 子宮癌
死亡年齡平均數	兩性	71.5	73.4	72.7	72.4	63.2	81.8	72.0	74.2	62.2	65.9	66.8
	男性	71.8	73.7	72.4	70.4	--	81.8	69.6	74.4	--	65.6	--
	女性	71.1	73.0	73.2	76.1	63.2	--	74.5	73.9	62.2	69.6	66.8
死亡年齡中位數	兩性	73	74	74	74	63	83	72.5	76	61	65	68
	男性	72	74	73	70	--	83	69.5	76	--	65	--
	女性	73	75	75	79	63	--	76	77	61	68	68



## 貳、人口統計指標



表A·臺北市人口統計指標—行政區別

中華民國107年

項 目	單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積	平方公里	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度	人/平方公里	9,818	22,148	19,933	27,184	16,771	20,902	22,463	21,419	8,688	5,570	9,102	4,594	4,497
年底人口數	人	2,668,572	205,702	223,406	308,843	229,456	159,000	127,625	189,603	273,762	121,670	287,429	286,544	255,532
男性		1,273,375	96,393	106,457	144,007	106,664	75,898	62,148	92,969	131,145	59,439	137,196	138,079	122,980
女性		1,395,197	109,309	116,949	164,836	122,792	83,102	65,477	96,634	142,617	62,231	150,233	148,465	132,552
性比例		91.27	88.18	91.03	87.36	86.87	91.33	94.92	96.21	91.96	95.51	91.32	93.00	92.78
出生數	人	22,849	1,558	1,900	2,323	2,036	1,333	1,137	1,711	2,322	1,224	2,623	2,490	2,192
粗出生率	‰	8.54	7.55	8.46	7.51	8.85	8.37	8.85	8.97	8.47	10.04	9.12	8.66	8.56
死亡數	人	17,902	1,341	1,582	2,040	1,579	1,082	982	1,760	1,655	807	1,389	1,949	1,736
粗死亡率	‰	6.69	6.50	7.04	6.59	6.86	6.79	7.64	9.23	6.04	6.62	4.83	6.78	6.78
人口增加率	%	-5.47	-6.21	-10.40	-3.63	-5.44	-3.81	-12.79	-11.71	-2.41	-3.97	-1.19	-6.07	-3.60
自然增加率		1.85	1.05	1.42	0.91	1.99	1.58	1.21	-0.26	2.43	3.42	4.29	1.88	1.78
社會增加率		-7.34	-7.28	-11.87	-4.55	-7.44	-5.39	-14.08	-11.52	-4.85	-7.40	-5.48	-7.97	-5.39
14歲以下年底人口數(a)	人 比重(%)	363,657 13.63	30,327 14.74	27,065 12.11	46,675 15.11	28,488 12.42	25,802 16.23	16,800 13.16	20,950 11.05	37,830 13.82	16,228 13.34	41,804 14.54	36,808 12.85	34,880 13.65
15-64歲年底人口數(b)	人 比重(%)	1,846,280 69.19	136,783 66.50	154,719 69.25	200,575 64.94	159,798 69.64	104,916 65.98	88,406 69.27	132,756 70.02	193,566 70.71	87,013 71.52	209,546 72.90	199,251 69.54	178,951 70.03
65歲以上年底人口數(c)	人 比重(%)	458,635 17.19	38,592 18.76	41,622 18.63	61,593 19.94	41,170 17.94	28,282 17.79	22,419 17.57	35,897 18.93	42,366 15.48	18,429 15.15	36,079 12.55	50,485 17.62	41,701 16.32
扶養比 (a+c)/b	%	44.54	50.39	44.39	53.98	43.59	51.55	44.36	42.82	41.43	39.83	37.17	43.81	42.79
扶幼比 a/b		19.70	22.17	17.49	23.27	17.83	24.59	19.00	15.78	19.54	18.65	19.95	18.47	19.49
扶老比 c/b		24.84	28.21	26.90	30.71	25.76	26.96	25.36	27.04	21.89	21.18	17.22	25.34	23.30
老化指數 c/a		126.12	127.25	153.79	131.96	144.52	109.61	133.45	171.35	111.99	113.56	86.31	137.16	119.56

資料來源：本府民政局。

附註：本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
87	75.76	73.12	78.93	79.11	77.06	81.48
88	75.90	73.33	78.98	79.48	77.47	81.78
89	76.46	73.83	79.56	79.85	77.78	82.24
90	76.75	74.07	79.92	80.08	78.05	82.38
91	77.19	74.58	80.24	80.36	78.34	82.60
93	77.48	74.68	80.75	80.99	78.92	83.20
94	77.42	74.50	80.80	81.17	78.94	83.55
95	77.90	74.86	81.41	81.58	79.19	84.13
96	78.38	75.46	81.72	81.79	79.41	84.31
97	78.57	75.59	81.94	81.99	79.70	84.38
98	79.01	76.03	82.34	82.16	79.86	84.53
99	79.18	76.13	82.55	82.42	80.06	84.81
100	79.15	75.96	82.63	82.70	80.18	85.25
101	79.51	76.43	82.82	82.66	80.00	85.33
102	80.02	76.91	83.36	82.90	80.18	85.63
103	79.84	76.72	83.19	83.10	80.33	85.89
104	80.20	77.01	83.62	83.43	80.64	86.25
105	80.00	76.81	83.42	83.36	80.54	86.18
106	80.39	77.28	83.70	83.57	80.82	86.29
<b>107</b>	<b>80.69</b>	<b>77.55</b>	<b>84.05</b>	<b>83.63</b>	<b>80.93</b>	<b>86.29</b>

資料來源：內政部。

附註：本市配合內政部縣市數據公布係以近3年合併人口編算，例106年平均餘命採104-106年，105年則採103-105年3年合併人口計算。

表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數

年 別	總 計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
				人 數 (人)				
98年	2,615,176	19,295	88,872	292,745	317,673	815,122	755,775	325,696
99年	2,613,100	18,733	89,279	280,706	313,173	808,277	772,772	330,161
100年	2,634,870	21,842	92,078	269,451	312,649	813,915	789,884	335,053
101年	2,662,097	27,281	96,621	259,149	313,265	821,078	801,277	343,428
102年	2,679,871	27,573	105,081	250,714	309,256	823,715	807,903	355,631
103年	2,694,416	27,029	112,644	243,526	303,418	823,648	812,586	371,566
104年	2,703,563	28,102	118,347	233,663	299,539	819,784	814,274	389,855
105年	2,700,257	27,296	122,333	226,649	293,139	810,848	810,837	409,156
106年	2,689,481	25,463	120,512	226,526	284,355	799,934	803,539	429,153
<b>107年</b>	<b>2,675,915</b>	<b>22,839</b>	<b>116,842</b>	<b>227,084</b>	<b>274,605</b>	<b>789,351</b>	<b>796,289</b>	<b>448,906</b>
				百 分 比 (%)				
98年	100.00	0.74	3.40	11.19	12.15	31.17	28.90	12.45
99年	100.00	0.72	3.42	10.74	11.98	30.93	29.57	12.63
100年	100.00	0.83	3.49	10.23	11.87	30.89	29.98	12.72
101年	100.00	1.02	3.63	9.73	11.77	30.84	30.10	12.90
102年	100.00	1.03	3.92	9.36	11.54	30.74	30.15	13.27
103年	100.00	1.00	4.18	9.04	11.26	30.57	30.16	13.79
104年	100.00	1.04	4.38	8.64	11.08	30.32	30.12	14.42
105年	100.00	1.01	4.53	8.39	10.86	30.03	30.03	15.15
106年	100.00	0.95	4.48	8.42	10.57	29.74	29.88	15.96
<b>107年</b>	<b>100.00</b>	<b>0.85</b>	<b>4.37</b>	<b>8.49</b>	<b>10.26</b>	<b>29.50</b>	<b>29.76</b>	<b>16.78</b>

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性

年 別	男性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
98年	1,265,699	9,980	46,379	152,510	164,019	381,047	355,766	156,000	
99年	1,261,502	9,708	46,394	146,399	161,906	377,421	363,045	156,630	
100年	1,269,449	11,286	47,666	140,732	161,751	380,130	370,322	157,563	
101年	1,280,852	14,085	49,976	135,392	162,067	384,448	374,796	160,090	
102年	1,287,653	14,262	54,260	130,921	160,134	386,721	376,956	164,401	
103年	1,292,791	13,863	58,061	127,147	157,322	387,679	378,315	170,405	
104年	1,295,549	14,457	60,873	121,979	155,310	387,029	378,491	177,413	
105年	1,292,486	14,147	62,918	118,216	151,765	384,095	376,393	184,953	
106年	1,285,714	13,131	62,088	118,004	147,062	380,032	372,479	192,920	
<b>107年</b>	<b>1,277,646</b>	<b>11,728</b>	<b>60,209</b>	<b>118,241</b>	<b>142,059</b>	<b>375,789</b>	<b>368,735</b>	<b>200,886</b>	
				百 分 比 (%)					
98年	100.00	0.79	3.66	12.05	12.96	30.11	28.11	12.33	
99年	100.00	0.77	3.68	11.61	12.83	29.92	28.78	12.42	
100年	100.00	0.89	3.75	11.09	12.74	29.94	29.17	12.41	
101年	100.00	1.10	3.90	10.57	12.65	30.02	29.26	12.50	
102年	100.00	1.11	4.21	10.17	12.44	30.03	29.27	12.77	
103年	100.00	1.07	4.49	9.84	12.17	29.99	29.26	13.18	
104年	100.00	1.12	4.70	9.42	11.99	29.87	29.21	13.69	
105年	100.00	1.09	4.87	9.15	11.74	29.72	29.12	14.31	
106年	100.00	1.02	4.83	9.18	11.44	29.56	28.97	15.00	
<b>107年</b>	<b>100.00</b>	<b>0.92</b>	<b>4.71</b>	<b>9.25</b>	<b>11.12</b>	<b>29.41</b>	<b>28.86</b>	<b>15.72</b>	

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。



表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性

年 別	女性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
98年	1,349,477	9,316	42,493	140,235	153,654	434,075	400,009	169,696	
99年	1,351,598	9,025	42,885	134,307	151,268	430,856	409,727	173,531	
100年	1,365,422	10,556	44,412	128,720	150,898	433,785	419,562	177,490	
101年	1,381,245	13,196	46,646	123,757	151,199	436,630	426,481	183,338	
102年	1,392,218	13,312	50,821	119,793	149,123	436,994	430,947	191,230	
103年	1,401,625	13,166	54,583	116,379	146,097	435,969	434,271	201,161	
104年	1,408,014	13,645	57,474	111,685	144,230	432,755	435,784	212,442	
105年	1,407,771	13,150	59,416	108,433	141,374	426,753	434,444	224,203	
106年	1,403,767	12,332	58,424	108,522	137,293	419,903	431,060	236,234	
<b>107年</b>	<b>1,398,269</b>	<b>11,111</b>	<b>56,633</b>	<b>108,843</b>	<b>132,546</b>	<b>413,563</b>	<b>427,554</b>	<b>248,020</b>	
				百 分 比 (%)					
98年	100.00	0.69	3.15	10.39	11.39	32.17	29.64	12.57	
99年	100.00	0.67	3.17	9.94	11.19	31.88	30.31	12.84	
100年	100.00	0.77	3.25	9.43	11.05	31.77	30.73	13.00	
101年	100.00	0.96	3.38	8.96	10.95	31.61	30.88	13.27	
102年	100.00	0.96	3.65	8.60	10.71	31.39	30.95	13.74	
103年	100.00	0.94	3.89	8.30	10.42	31.10	30.98	14.35	
104年	100.00	0.97	4.08	7.93	10.24	30.74	30.95	15.09	
105年	100.00	0.93	4.22	7.70	10.04	30.31	30.86	15.93	
106年	100.00	0.88	4.16	7.73	9.78	29.91	30.71	16.83	
<b>107年</b>	<b>100.00</b>	<b>0.79</b>	<b>4.05</b>	<b>7.78</b>	<b>9.48</b>	<b>29.58</b>	<b>30.58</b>	<b>17.74</b>	

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F·臺北市各行政區年齡別年底人口數

中華民國107年底

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
107年底人口數	2,668,572	205,702	223,406	308,843	229,456	159,000	127,625	189,603	273,762	121,670	287,429	286,544	255,532
0歲	21,561	1,508	1,799	2,254	1,914	1,285	1,076	1,583	2,176	1,129	2,494	2,306	2,037
1-4	115,467	8,459	9,430	13,096	9,729	7,293	5,719	7,909	11,510	5,857	13,442	11,999	11,024
5-9	116,507	10,143	8,471	15,915	9,066	8,542	5,212	6,105	12,069	5,015	13,336	11,447	11,186
10-14	110,122	10,217	7,365	15,410	7,779	8,682	4,793	5,353	12,075	4,227	12,532	11,056	10,633
15-19	125,483	9,822	9,751	14,765	9,572	7,601	5,642	7,919	14,389	5,952	14,674	13,206	12,190
20-24	143,954	10,539	11,785	15,432	11,453	7,779	6,622	10,020	16,362	6,800	17,180	16,011	13,971
25-29	152,022	10,636	13,217	14,843	12,826	7,952	7,245	11,230	15,803	7,381	18,698	16,919	15,272
30-34	180,768	12,381	15,618	17,353	15,847	9,820	9,088	13,602	18,055	9,077	21,584	20,332	18,011
35-39	234,849	16,589	19,845	23,891	20,734	13,480	12,033	17,538	23,432	11,948	26,664	25,287	23,408
40-44	216,371	16,644	17,718	24,421	18,458	13,544	10,731	15,138	22,358	10,643	23,343	22,417	20,956
45-49	199,301	15,706	16,405	23,074	17,234	11,954	9,138	13,733	21,840	9,319	21,171	20,442	19,285
50-54	198,421	15,056	16,674	22,445	17,650	11,149	9,238	14,280	21,891	9,055	21,912	20,720	18,351
55-59	200,265	14,785	16,983	22,156	18,181	10,896	9,396	14,906	20,584	8,750	22,958	21,702	18,968
60-64	194,846	14,625	16,723	22,195	17,843	10,741	9,273	14,390	18,852	8,088	21,362	22,215	18,539
65-69	172,292	13,990	15,524	21,782	15,925	10,012	8,306	12,686	15,913	7,172	15,528	19,340	16,114
70-74	99,973	8,905	9,346	13,857	8,914	6,179	4,712	7,508	9,135	4,011	7,456	10,867	9,083
75-79	77,592	6,436	7,156	10,512	6,835	4,735	3,993	6,580	7,042	3,220	5,319	8,643	7,121
80-84	51,509	4,205	4,394	7,020	4,658	3,450	2,940	4,461	4,621	1,991	3,655	5,645	4,469
85-89	34,511	2,905	3,101	4,912	3,058	2,306	1,577	2,885	3,291	1,250	2,521	3,696	3,009
90-94	17,189	1,590	1,597	2,583	1,379	1,172	653	1,369	1,792	625	1,240	1,732	1,457
95-99	4,767	464	436	795	345	379	192	354	483	141	319	478	381
100歲以上	802	97	68	132	56	49	46	54	89	19	41	84	67

資料來源：本府民政局。

表G·臺北市近十年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	98年底	99年底	100年底	101年底	102年底	103年底	104年底	105年底	106年底	107年底
臺北市	2,607,428	2,618,772	2,650,968	2,673,226	2,686,516	2,702,315	2,704,810	2,695,704	2,683,257	<b>2,668,572</b>
松山區	207,995	208,434	209,948	210,905	210,343	210,473	209,714	208,326	206,988	<b>205,702</b>
信義區	225,364	225,092	226,541	227,734	228,496	229,657	229,211	227,823	225,753	<b>223,406</b>
大安區	311,612	311,565	313,846	313,426	313,363	313,693	313,058	311,506	309,969	<b>308,843</b>
中山區	218,245	220,126	224,102	226,659	228,753	230,496	231,350	231,247	230,710	<b>229,456</b>
中正區	158,752	159,536	161,449	162,154	163,140	163,388	162,475	160,403	159,608	<b>159,000</b>
大同區	123,399	124,600	126,640	128,809	129,820	130,973	130,929	130,071	129,278	<b>127,625</b>
萬華區	188,437	189,099	190,855	192,628	193,480	194,715	194,339	193,539	191,850	<b>189,603</b>
文山區	260,869	262,307	266,442	269,310	271,341	273,921	275,367	275,231	274,424	<b>273,762</b>
南港區	113,149	114,023	116,131	118,490	119,752	121,257	122,245	122,516	122,155	<b>121,670</b>
內湖區	267,704	270,245	275,652	280,025	282,842	285,767	287,566	287,733	287,771	<b>287,429</b>
士林區	283,855	284,539	287,072	288,894	289,742	290,455	290,694	289,939	288,295	<b>286,544</b>
北投區	248,047	249,206	252,290	254,192	255,444	257,520	257,862	257,370	256,456	<b>255,532</b>

資料來源：本府民政局。

表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數

中華民國107年中

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
107年中人口數	2,675,915	206,345	224,580	309,406	230,083	159,304	128,452	190,727	274,093	121,913	287,600	287,420	255,994
0歲	22,839	1,577	1,924	2,345	1,981	1,346	1,198	1,691	2,311	1,185	2,641	2,433	2,211
1-4	116,842	8,573	9,618	13,307	9,911	7,351	5,774	8,040	11,616	5,895	13,503	12,102	11,156
5-9	116,199	10,205	8,502	15,806	8,976	8,446	5,269	6,184	12,086	4,971	13,222	11,435	11,099
10-14	110,885	10,234	7,481	15,370	7,851	8,686	4,866	5,444	12,180	4,294	12,608	11,169	10,706
15-19	127,923	10,015	9,927	15,046	9,728	7,785	5,772	8,024	14,681	6,036	14,998	13,537	12,377
20-24	146,682	10,717	12,127	15,648	11,674	7,948	6,729	10,244	16,521	6,920	17,595	16,287	14,274
25-29	153,797	10,716	13,391	14,960	13,014	8,033	7,408	11,389	15,855	7,518	18,897	17,165	15,454
30-34	184,554	12,555	15,984	17,654	16,231	10,044	9,323	14,053	18,431	9,261	21,868	20,756	18,398
35-39	236,949	16,730	20,057	24,211	20,934	13,619	12,192	17,733	23,605	12,125	26,664	25,488	23,596
40-44	214,052	16,600	17,587	24,132	18,249	13,285	10,579	14,979	22,272	10,538	22,982	22,148	20,703
45-49	201,018	15,851	16,499	23,250	17,359	12,048	9,284	13,858	22,047	9,336	21,430	20,698	19,363
50-54	200,043	15,161	16,848	22,669	17,867	11,180	9,314	14,424	21,904	9,064	22,282	20,887	18,446
55-59	200,777	14,867	17,067	22,164	18,203	11,010	9,456	14,923	20,494	8,719	22,979	21,868	19,030
60-64	194,452	14,700	16,762	22,331	17,859	10,708	9,281	14,336	18,672	8,058	21,064	22,172	18,511
65-69	167,994	13,738	15,163	21,531	15,522	9,860	8,091	12,458	15,453	6,965	14,836	18,782	15,597
70-74	96,580	8,587	9,052	13,392	8,605	5,958	4,593	7,311	8,830	3,887	7,113	10,486	8,769
75-79	76,492	6,327	7,016	10,279	6,731	4,685	4,028	6,520	6,931	3,167	5,246	8,543	7,022
80-84	50,841	4,159	4,350	6,933	4,598	3,403	2,894	4,447	4,543	1,944	3,589	5,562	4,422
85-89	34,779	2,937	3,144	4,917	3,061	2,333	1,551	2,943	3,362	1,274	2,550	3,695	3,015
90-94	16,822	1,553	1,582	2,569	1,335	1,166	622	1,338	1,749	604	1,208	1,675	1,423
95-99	4,616	455	436	768	343	364	194	336	472	139	294	454	363
100歲以上	784	96	67	129	57	53	40	57	85	18	38	83	64

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I·臺北市近十年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年
臺北市	2,615,176	2,613,100	2,634,870	2,662,097	2,679,871	2,694,416	2,703,563	2,700,257	2,689,481	<b>2,675,915</b>
松山區	209,046	208,215	209,191	210,427	210,624	210,408	210,094	209,020	207,657	<b>206,345</b>
信義區	226,567	225,228	225,817	227,138	228,115	229,077	229,434	228,517	226,788	<b>224,580</b>
大安區	312,730	311,589	312,706	313,636	313,395	313,528	313,376	312,282	310,738	<b>309,406</b>
中山區	218,543	219,186	222,114	225,381	227,706	229,625	230,923	231,299	230,979	<b>230,083</b>
中正區	159,045	159,144	160,493	161,802	162,647	163,264	162,932	161,439	160,006	<b>159,304</b>
大同區	124,026	124,000	125,620	127,725	129,315	130,397	130,951	130,500	129,675	<b>128,452</b>
萬華區	189,399	188,768	189,977	191,742	193,054	194,098	194,527	193,939	192,695	<b>190,727</b>
文山區	261,294	261,588	264,375	267,876	270,326	272,631	274,644	275,299	274,828	<b>274,093</b>
南港區	113,411	113,586	115,077	117,311	119,121	120,505	121,751	122,381	122,336	<b>121,913</b>
內湖區	267,256	268,975	272,949	277,839	281,434	284,305	286,667	287,650	287,752	<b>287,600</b>
士林區	284,960	284,197	285,806	287,983	289,318	290,099	290,575	290,317	289,117	<b>287,420</b>
北投區	248,900	248,627	250,748	253,241	254,818	256,482	257,691	257,616	256,913	<b>255,994</b>

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。



# 參、107 年死因統計

## 一、主要死因統計





表1·ICD-10 臺北市、全國主要死亡原因比較  
中華民國107年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾病碼 ICD 10	死亡原因	臺北市					全國				
		順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
A00-Y98	所有死亡原因		18,050	674.54	317.59	100.00		172,859	733.07	415.04	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	5,238	195.75	100.48	29.02	1	48,784	206.89	121.76	28.22
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	3,000	112.11	47.98	16.62	2	21,569	91.47	48.82	12.48
J12-J18	肺炎	3	1,619	60.50	22.32	8.97	3	13,421	56.92	27.43	7.76
I60-I69	腦血管疾病	4	1,152	43.05	18.57	6.38	4	11,520	48.85	26.10	6.66
E10-E14	糖尿病	5	692	25.86	11.34	3.83	5	9,374	39.75	21.54	5.42
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	6	621	23.21	9.73	3.44	9	5,523	23.42	12.27	3.20
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	514	19.21	7.38	2.85	7	6,146	26.06	12.75	3.56
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	455	17.00	10.85	2.52	6	6,846	29.03	21.06	3.96
A40-A41	敗血症	9	449	16.78	7.00	2.49	12	3,773	16.00	8.42	2.18
I10-I15	高血壓性疾病	10	386	14.42	5.97	2.14	8	5,991	25.41	12.76	3.47
	其他		3,924	146.64	75.96	21.74		39,912	169.26	102.13	23.09
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	349	13.04	9.84	1.93	11	3,865	16.39	12.45	2.24
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	238	8.89	4.97	1.32	10	4,315	18.30	11.62	2.50
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	13	169	6.32	2.10	0.94	13	1,521	6.45	2.84	0.88
G20-G21	帕金森病	14	147	5.49	2.15	0.81	16	1,178	5.00	2.50	0.68
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	15	146	5.46	2.59	0.81	15	1,432	6.07	3.31	0.83

資料來源：衛生福利部。

表2. ICD-10 全國縣市別死亡概況

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口

縣市別	總 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
總 計	172,859	733.07	415.04	101,949	870.15	538.38	70,910	597.70	304.47
新北市	23,970	600.57	382.33	14,290	731.25	497.24	9,680	475.20	283.76
臺北市	18,050	674.54	317.59	10,160	795.21	403.72	7,890	564.27	246.23
桃園市	12,745	578.15	396.88	7,891	719.43	509.80	4,854	438.25	294.42
臺中市	17,059	610.23	408.14	10,053	730.01	524.45	7,006	493.94	305.96
臺南市	15,202	806.40	432.59	8,807	935.80	560.49	6,395	677.40	316.93
高雄市	21,545	776.33	454.41	12,859	936.06	584.59	8,686	619.77	337.83
宜蘭縣	3,921	860.03	438.35	2,253	977.43	553.91	1,668	739.98	331.54
新竹縣	3,701	667.34	404.48	2,203	777.82	509.58	1,498	552.03	302.21
苗栗縣	4,953	898.36	451.19	2,895	1,017.54	576.08	2,058	771.29	325.08
彰化縣	10,501	820.30	426.88	6,073	931.21	562.56	4,428	705.12	300.41
南投縣	4,836	969.06	466.33	2,825	1,105.07	603.64	2,011	826.21	331.89
雲林縣	7,240	1,052.02	483.49	4,274	1,197.61	652.65	2,966	895.21	318.43
嘉義縣	5,553	1,090.69	476.87	3,239	1,223.80	623.77	2,314	946.58	329.97
屏東縣	8,242	995.80	526.45	4,990	1,179.64	682.93	3,252	803.63	372.77
臺東縣	2,302	1,050.04	566.27	1,395	1,233.30	726.06	907	854.71	408.34
花蓮縣	3,497	1,064.20	577.67	2,140	1,283.60	754.38	1,357	838.25	409.30
澎湖縣	902	865.17	404.61	526	979.01	522.80	376	744.13	290.32
基隆市	3,043	820.64	443.77	1,817	979.92	583.59	1,226	661.34	320.31
新竹市	2,680	604.44	386.98	1,536	701.89	489.77	1,144	509.47	297.34
嘉義市	2,100	780.64	430.28	1,211	926.58	563.69	889	642.74	320.36
金門縣	755	545.66	316.44	464	671.41	433.39	291	420.18	211.13
連江縣	62	478.10	314.70	48	648.78	485.74	14	251.37	122.06

資料來源：衛生福利部。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3·ICD-10 臺北市主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	18,050	674.54	317.59	100.00	所有死亡原因	10,160	795.21	403.72	100.00	所有死亡原因	7,890	564.27	246.23	100.00
1	惡性腫瘤	5,238	195.75	100.48	29.02	惡性腫瘤	2,926	229.01	123.42	28.80	惡性腫瘤	2,312	165.35	81.96	29.30
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3,000	112.11	47.98	16.62	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,715	134.23	63.69	16.88	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,285	91.90	34.91	16.29
3	肺炎	1,619	60.50	22.32	8.97	肺炎	924	72.32	29.18	9.09	肺炎	695	49.70	16.80	8.81
4	腦血管疾病	1,152	43.05	18.57	6.38	腦血管疾病	667	52.21	24.20	6.56	腦血管疾病	485	34.69	13.97	6.15
5	糖尿病	692	25.86	11.34	3.83	慢性下呼吸道疾病	397	31.07	12.71	3.91	糖尿病	351	25.10	9.76	4.45
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	621	23.21	9.73	3.44	糖尿病	341	26.69	13.21	3.36	腎炎、腎病症候群及腎病變	327	23.39	9.09	4.14
7	慢性下呼吸道疾病	514	19.21	7.38	2.85	腎炎、腎病症候群及腎病變	294	23.01	10.52	2.89	高血壓性疾病	201	14.37	5.41	2.55
8	事故傷害	455	17.00	10.85	2.52	事故傷害	294	23.01	15.59	2.89	敗血症	197	14.09	5.42	2.50
9	敗血症	449	16.78	7.00	2.49	敗血症	252	19.72	8.96	2.48	事故傷害	161	11.51	6.71	2.04
10	高血壓性疾病	386	14.42	5.97	2.14	蓄意自我傷害（自殺）	219	17.14	12.86	2.16	蓄意自我傷害（自殺）	130	9.30	7.21	1.65
	其他	3,924	146.64	75.96	21.74	其他	2,131	166.79	89.38	20.97	其他	1,746	124.87	55.00	22.13
11	蓄意自我傷害（自殺）	349	13.04	9.84	1.93	高血壓性疾病	185	14.48	6.65	1.82	慢性下呼吸道疾病 血管性及未明示之癱瘓症	117	8.37	3.06	1.48
12	慢性肝病及肝硬化	238	8.89	4.97	1.32	慢性肝病及肝硬化	158	12.37	7.66	1.56	慢性肝病及肝硬化	102	7.29	2.26	1.29
13	血管性及未明示之癱瘓症	169	6.32	2.10	0.94	帕金森病	88	6.89	2.93	0.87	慢性肝病及肝硬化	80	5.72	2.68	1.01
14	帕金森病	147	5.49	2.15	0.81	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	78	6.10	3.17	0.77	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	68	4.86	2.16	0.86
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	146	5.46	2.59	0.81	血管性及未明示之癱瘓症	67	5.24	1.93	0.66	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	66	4.72	2.49	0.84

資料來源：衛生福利部。

附註：107年年中人口數計 2,675,915人, 男性 1,277,646人, 女性 1,398,269人。

表4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
1	A00-Y98	所有死亡原因	18,050	674.54	101	442.23	37	10.76	77	28.04	532	67.40	3,056	383.78	2,874	1,086.28	4,434	3,482.22	6,939	12,173.79		
	C00-C97	惡性腫瘤	5,238	195.75	1	4.38	6	1.74	13	4.73	163	20.65	1,422	178.58	1,221	461.50	1,363	1,070.43	1,049	1,840.37		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3,000	112.11	3	13.14	5	1.45	3	1.09	50	6.33	402	50.48	406	153.45	716	562.31	1,415	2,482.48		
3	J12-J18	肺炎	1,619	60.50	-	-	3	0.87	-	-	7	0.89	68	8.54	129	48.76	359	281.94	1,053	1,847.38		
4	I60-I69	腦血管疾病	1,152	43.05	-	-	-	-	-	-	22	2.79	163	20.47	155	58.58	301	236.39	511	896.50		
5	E10-E14	糖尿病	692	25.86	-	-	-	-	-	-	9	1.14	97	12.18	115	43.47	197	154.71	274	480.71		
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	621	23.21	-	-	1	0.29	-	-	4	0.51	58	7.28	89	33.64	195	153.14	274	480.71		
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	514	19.21	1	4.38	-	-	-	-	4	0.51	22	2.76	45	17.01	138	108.38	304	533.34		
8	V01-X59, Y85-V86	事故傷害	455	17.00	9	39.41	-	-	23	8.38	57	7.22	97	12.18	70	26.46	98	76.96	101	177.19		
9	A40-A41	敗血症	449	16.78	2	8.76	1	0.29	-	-	6	0.76	41	5.15	65	24.57	103	80.89	231	405.27		
10	I10-I15	高血壓性疾病	386	14.42	-	-	1	0.29	-	-	5	0.63	46	5.78	36	13.61	98	76.96	200	350.88		
		其他	3,924	146.64	85	372.17	20	5.82	38	13.84	205	25.97	640	80.37	543	205.24	866	680.11	1,527	2,678.97		
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	349	13.04	-	-	2	0.58	17	6.19	96	12.16	133	16.70	56	21.17	29	22.78	16	28.07		
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	238	8.89	-	-	-	-	-	-	9	1.14	90	11.30	46	17.39	62	48.69	31	54.39		
13	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	169	6.32	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.38	4	1.51	32	25.13	130	228.07		
14	G20-G21	帕金森病	147	5.49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	20	7.56	48	37.70	77	135.09		
15	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	146	5.46	-	-	1	0.29	1	0.36	3	0.38	14	1.76	27	10.21	53	41.62	47	82.46		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為 2,675,915人。

表5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況

中華民國107年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
1	A00-Y98 C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	10,160	795.21	60	511.60	19	10.65	55	38.72	312	83.03	1,947	528.02	1,785	1,478.16	2,364	4,433.82	3,618	13,494.96		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,715	134.23	2	17.05	2	1.12	3	2.11	39	10.38	309	83.80	274	226.90	370	693.96	716	2,670.65		
3	J12-J18	肺炎	924	72.32	-	-	2	1.12	-	-	3	0.80	50	13.56	89	73.70	211	395.74	569	2,122.34		
4	I60-I69	腦血管疾病	667	52.21	-	-	-	-	-	-	12	3.19	109	29.56	96	79.50	164	307.59	286	1,066.77		
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	397	31.07	1	8.53	-	-	-	-	2	0.53	18	4.88	37	30.64	103	193.18	236	880.27		
6	E10-E14	糖尿病	341	26.69	-	-	-	-	-	-	8	2.13	75	20.34	60	49.69	86	161.30	112	417.75		
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	294	23.01	4	34.11	-	-	19	13.37	44	11.71	66	17.90	52	43.06	58	108.78	51	190.23		
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	294	23.01	-	-	-	-	-	-	2	0.53	37	10.03	51	42.23	82	153.80	122	455.05		
9	A40-A41	敗血症	252	19.72	1	8.53	1	0.56	-	-	3	0.80	29	7.86	38	31.47	59	110.66	121	451.32		
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	219	17.14	-	-	2	1.12	6	4.22	56	14.90	90	24.41	35	28.98	18	33.76	12	44.76		
		其他	2,131	166.79	52	443.38	9	5.04	18	12.67	79	21.02	381	103.33	312	258.37	473	887.14	807	3,010.07		
11	I10-I15	高血壓性疾病	185	14.48	-	-	-	-	-	-	4	1.06	33	8.95	19	15.73	41	76.90	88	328.24		
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	158	12.37	-	-	-	-	-	-	9	2.39	79	21.42	25	20.70	30	56.27	15	55.95		
13	G20-G21	帕金森病	88	6.89	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.54	12	9.94	29	54.39	45	167.85		
14	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	78	6.10	-	-	-	-	1	0.70	2	0.53	7	1.90	14	11.59	33	61.89	21	78.33		
15	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	67	5.24	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.81	2	1.66	14	26.26	48	179.04		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為 1,277,646人。

表6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況

中華民國107年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	A00-Y98	總計	7,890	564.27	41	369.00	18	10.88	22	16.60	220	53.20	1,109	259.38	1,089	-	2,070	-	3,321	11,000.51		
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,312	165.35	1	9.00	3	1.81	4	3.02	99	23.94	639	149.45	480	333.76	623	841.72	463	1,533.65		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性除除外)	1,285	91.90	1	9.00	3	1.81	-	-	11	2.66	93	21.75	132	91.78	346	467.47	699	2,315.37		
3	J12-J18	肺炎	695	49.70	-	-	1	0.60	-	-	4	0.97	18	4.21	40	27.81	148	199.96	484	1,603.21		
4	I60-I69	腦血管疾病	485	34.69	-	-	-	-	-	-	10	2.42	54	12.63	59	-	137	-	225	745.29		
5	E10-E14	糖尿病	351	25.10	-	-	-	-	-	-	1	0.24	22	5.15	55	-	111	-	162	536.61		
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	327	23.39	-	-	1	0.60	-	-	2	0.48	21	4.91	38	-	113	-	152	503.49		
7	I10-I15	高血壓性疾病	201	14.37	-	-	1	0.60	-	-	1	0.24	13	3.04	17	11.82	57	77.01	112	370.99		
8	A40-A41	敗血症	197	14.09	1	9.00	-	-	-	-	3	0.73	12	2.81	27	18.77	44	59.45	110	364.37		
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	161	11.51	5	45.00	-	-	4	3.02	13	3.14	31	7.25	18	12.52	40	54.04	50	165.62		
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	130	9.30	-	-	-	-	11	8.30	40	9.67	43	10.06	21	-	11	-	4	13.25		
		其他	1,746	124.87	33	297.00	9	5.44	3	2.26	36	8.70	163	38.12	202	-	496.47	440	-1,699.66	860	2,848.67	
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	117	8.37	-	-	-	-	-	-	2	0.48	4	0.94	8	-	35	-	68	225.24		
12	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	102	7.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.39	18	24.32	82	271.62		
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	80	5.72	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.57	21	-	32	-	16	53.00		
14	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	68	4.86	-	-	1	0.60	-	-	1	0.24	7	1.64	13	9.04	20	27.02	26	86.12		
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	66	4.72	-	-	-	-	-	-	5	1.21	22	5.15	12	8.34	18	24.32	9	29.81		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為 1,398,269人。

表7·ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	101	445.66	100.00		所有死亡原因	60	514.84	100.00		所有死亡原因	41	372.42	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	48	211.80	47.52	P00-P96	源於周產期的特定病況	30	257.42	50.00	P00-P96	源於周產期的特定病況	18	163.50	43.90
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	21	92.66	20.79	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	14	120.13	23.33	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	7	63.58	17.07
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	39.71	8.91	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	34.32	6.67	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	45.42	12.20
4	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	4	17.65	3.96	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	2	17.16	3.33	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	4	36.33	9.76
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	3	13.24	2.97	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	8.58	1.67	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	1	9.08	2.44
6	A40-A41	敗血症	2	8.82	1.98	A40-A41	敗血症	1	8.58	1.67	A40-A41	敗血症	1	9.08	2.44
7	C00-C97	惡性腫瘤	1	4.41	0.99	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	8.58	1.67	C00-C97	惡性腫瘤	1	9.08	2.44
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	4.41	0.99						G00, G03	腦膜炎	1	9.08	2.44
9	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	4.41	0.99										
10	G00, G03	腦膜炎	1	4.41	0.99										
		其他	10	44.12	9.90		其他	7	60.07	11.67		其他	3	27.25	7.32

資料來源：衛生福利部。

附註：出生發生數為 22,663人，其中男性為 11,654人，女性為 11,009人。

表8·ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	101	442.23	100.00		所有死亡原因	60	511.60	100.00		所有死亡原因	41	369.00	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	48	210.17	47.52	P00-P96	源於周產期的特定病況	30	255.80	50.00	P00-P96	源於周產期的特定病況	18	162.00	43.90
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	21	91.95	20.79	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	14	119.37	23.33	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	7	63.00	17.07
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	39.41	8.91	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	34.11	6.67	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	45.00	12.20
4	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	4	17.51	3.96	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	2	17.05	3.33	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	4	36.00	9.76
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	3	13.14	2.97	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	8.53	1.67	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	1	9.00	2.44
6	A40-A41	敗血症	2	8.76	1.98	A40-A41	敗血症	1	8.53	1.67	A40-A41	敗血症	1	9.00	2.44
7	C00-C97	惡性腫瘤	1	4.38	0.99	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	8.53	1.67	C00-C97	惡性腫瘤	1	9.00	2.44
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	4.38	0.99						G00, G03	腦膜炎	1	9.00	2.44
9	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	4.38	0.99										
10	G00, G03	腦膜炎	1	4.38	0.99										
		其他	10	43.78	9.90		其他	7	59.69	11.67		其他	3	27.00	7.32

資料來源：衛生福利部。

附註：0歲年中人口數為 22,839人，其中男性為 11,728人，女性為 11,111人。



表9·ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	37	10.76	100.00		所有死亡原因	19	10.65	100.00		所有死亡原因	18	10.88	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	6	1.74	16.22	C00-C97	惡性腫瘤	3	1.68	15.79	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	1.81	16.67
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	5	1.45	13.51	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1.12	10.53	C00-C97	惡性腫瘤	3	1.81	16.67
3	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	4	1.16	10.81	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.12	10.53	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.21	11.11
4	J12-J18	肺炎	3	0.87	8.11	J12-J18	肺炎	2	1.12	10.53	J12-J18	肺炎	1	0.60	5.56
5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2	0.58	5.41	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2	1.12	10.53	J10-J11	流行性感冒	1	0.60	5.56
6	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	0.29	2.70	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	0.56	5.26	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1	0.60	5.56
7	J10-J11	流行性感冒	1	0.29	2.70	A40-A41	敗血症	1	0.56	5.26	I10-I15	高血壓性疾病	1	0.60	5.56
8	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1	0.29	2.70	D50-D64	貧血	1	0.56	5.26	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.60	5.56
9	I10-I15	高血壓性疾病	1	0.29	2.70										
10	A40-A41	敗血症	1	0.29	2.70										
	D50-D64	貧血	1	0.29	2.70										
	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.29	2.70										
		其他	10	2.91	27.03		其他	5	2.80	26.32		其他	5	3.02	27.78

資料來源：衛生福利部。

附註：1-14歲年中人口數為 343,925.5人，其中男性為 178,449.5人，女性為 165,476人。

表10·ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	77	28.04	100.00		所有死亡原因	55	38.72	100.00		所有死亡原因	22	16.60	100.00
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	23	8.38	29.87	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	19	13.37	34.55	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	11	8.30	50.00
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	17	6.19	22.08	C00-C97	惡性腫瘤	9	6.34	16.36	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	3.02	18.18
3	C00-C97	惡性腫瘤	13	4.73	16.88	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	6	4.22	10.91	C00-C97	惡性腫瘤	4	3.02	18.18
4	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	4	1.46	5.19	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	4	2.82	7.27					
5	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	3	1.09	3.90	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	3	2.11	5.45					
6	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.73	2.60	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	1.41	3.64					
7	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	1	0.36	1.30	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	1	0.70	1.82					
		其他	14	5.10	18.18		其他	11	7.74	20.00		其他	3	2.26	13.64

資料來源：衛生福利部。

附註：15-24歲年中人口數為274,604.5人，其中男性為142,059人，女性為132,545.5人。

表11·ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	532	67.40	100.00		所有死亡原因	312	83.03	100.00		所有死亡原因	220	53.20	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	163	20.65	30.64	C00-C97	惡性腫瘤	64	17.03	20.51	C00-C97	惡性腫瘤	99	23.94	45.00
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	96	12.16	18.05	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	56	14.90	17.95	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	40	9.67	18.18
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	57	7.22	10.71	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	44	11.71	14.10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	3.14	5.91
4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	6.33	9.40	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	10.38	12.50	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	2.66	5.00
5	I60-I69	腦血管疾病	22	2.79	4.14	I60-I69	腦血管疾病	12	3.19	3.85	I60-I69	腦血管疾病	10	2.42	4.55
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	9	1.14	1.69	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	9	2.39	2.88	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	1.21	2.27
7	E10-E14	糖尿病	9	1.14	1.69	E10-E14	糖尿病	8	2.13	2.56	J12-J18	肺炎	4	0.97	1.82
8	J12-J18	肺炎	7	0.89	1.32	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	4	1.06	1.28	O00-O99	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	3	0.73	1.36
9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	0.89	1.32	I10-I15	高血壓性疾病	4	1.06	1.28	A40-A41	敗血症	3	0.73	1.36
10	A40-A41	敗血症	6	0.76	1.13	B20-B24	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	3	0.80	0.96	I71	主動脈瘤及剝離	2	0.48	0.91
						J12-J18	肺炎	3	0.80	0.96	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	0.48	0.91
						A40-A41	敗血症	3	0.80	0.96	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	0.48	0.91
		其他	106	13.43	19.92		其他	63	16.76	20.19		其他	26	6.29	11.82

資料來源：衛生福利部。

附註：25-44歲年中人口數為789,351人，其中男性為375,788.5人，女性為413,562.5人。

表12·ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	3,056	383.78	100.00		所有死亡原因	1,947	528.02	100.00		所有死亡原因	1,109	259.38	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,422	178.58	46.53	C00-C97	惡性腫瘤	783	212.35	40.22	C00-C97	惡性腫瘤	639	149.45	57.62
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	402	50.48	13.15	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	309	83.80	15.87	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	93	21.75	8.39
3	I60-I69	腦血管疾病	163	20.47	5.33	I60-I69	腦血管疾病	109	29.56	5.60	I60-I69	腦血管疾病	54	12.63	4.87
4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	133	16.70	4.35	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	90	24.41	4.62	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	43	10.06	3.88
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	97	12.18	3.17	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	79	21.42	4.06	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	31	7.25	2.80
6	E10-E14	糖尿病	97	12.18	3.17	E10-E14	糖尿病	75	20.34	3.85	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	22	5.15	1.98
7	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	90	11.30	2.95	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	66	17.90	3.39	E10-E14	糖尿病	22	5.15	1.98
8	J12-J18	肺炎	68	8.54	2.23	J12-J18	肺炎	50	13.56	2.57	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	4.91	1.89
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	58	7.28	1.90	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	37	10.03	1.90	J12-J18	肺炎	18	4.21	1.62
10	I10-I15	高血壓性疾病	46	5.78	1.51	I10-I15	高血壓性疾病	33	8.95	1.69	I10-I15	高血壓性疾病	13	3.04	1.17
		其他	480	60.28	15.71		其他	316	85.70	16.23		其他	153	35.78	13.80

資料來源：衛生福利部。

附註：45-64歲年中人口數為796,289人，其中男性為368,735人，女性為427,554人。

表13·ICD-10 臺北市老年(65-74歲)主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	2,874	1,086.28	100.00		所有死亡原因	1,785	1,478.16	100.00		所有死亡原因	1,089	757.22	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,221	461.50	42.48	C00-C97	惡性腫瘤	741	613.62	41.51	C00-C97	惡性腫瘤	480	333.76	44.08
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	406	153.45	14.13	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	274	226.90	15.35	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	132	91.78	12.12
3	I60-I69	腦血管疾病	155	58.58	5.39	I60-I69	腦血管疾病	96	79.50	5.38	I60-I69	腦血管疾病	59	41.02	5.42
4	J12-J18	肺炎	129	48.76	4.49	J12-J18	肺炎	89	73.70	4.99	E10-E14	糖尿病	55	38.24	5.05
5	E10-E14	糖尿病	115	43.47	4.00	E10-E14	糖尿病	60	49.69	3.36	J12-J18	肺炎	40	27.81	3.67
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	89	33.64	3.10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	52	43.06	2.91	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	38	26.42	3.49
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	70	26.46	2.44	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	51	42.23	2.86	A40-A41	敗血症	27	18.77	2.48
8	A40-A41	敗血症	65	24.57	2.26	A40-A41	敗血症	38	31.47	2.13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	21	14.60	1.93
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	56	21.17	1.95	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	37	30.64	2.07	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	21	14.60	1.93
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	46	17.39	1.60	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	35	28.98	1.96	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	18	12.52	1.65
		其他	522	197.30	18.16		其他	312	258.37	17.48		其他	198	137.68	18.18
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	45	17.01	1.57	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	25	20.70	1.40	I10-I15	高血壓性疾病	17	11.82	1.56
12	I10-I15	高血壓性疾病	36	13.61	1.25	I10-I15	高血壓性疾病	19	15.73	1.06	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	13	9.04	1.19
13	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	27	10.21	0.94	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	14	11.59	0.78	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	8.34	1.10
14	G20-G21	帕金森病	20	7.56	0.70	G20-G21	帕金森病	12	9.94	0.67	G20-G21	帕金森病	8	5.56	0.73
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19	7.18	0.66	I71	主動脈瘤及剝離	10	8.28	0.56	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	5.56	0.73

資料來源：衛生福利部。

附註：65-74歲年中人口數為 264,574 人，其中男性為 120,759 人，女性為 148,815 人。

表14·ICD-10 臺北市老年(75-84歲)主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	4,434	3,482.22	100.00		所有死亡原因	2,364	4,433.82	100.00		所有死亡原因	2,070	2,796.73	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,363	1,070.43	30.74	C00-C97	惡性腫瘤	740	1,387.91	31.30	C00-C97	惡性腫瘤	623	841.72	30.10
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	716	562.31	16.15	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	370	693.96	15.65	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	346	467.47	16.71
3	J12-J18	肺炎	359	281.94	8.10	J12-J18	肺炎	211	395.74	8.93	J12-J18	肺炎	148	199.96	7.15
4	I60-I69	腦血管疾病	301	236.39	6.79	I60-I69	腦血管疾病	164	307.59	6.94	I60-I69	腦血管疾病	137	185.10	6.62
5	E10-E14	糖尿病	197	154.71	4.44	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	103	193.18	4.36	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	113	152.67	5.46
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	195	153.14	4.40	E10-E14	糖尿病	86	161.30	3.64	E10-E14	糖尿病	111	149.97	5.36
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	138	108.38	3.11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	82	153.80	3.47	I10-I15	高血壓性疾病	57	77.01	2.75
8	A40-A41	敗血症	103	80.89	2.32	A40-A41	敗血症	59	110.66	2.50	A40-A41	敗血症	44	59.45	2.13
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	98	76.96	2.21	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	58	108.78	2.45	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	40	54.04	1.93
10	I10-I15	高血壓性疾病	98	76.96	2.21	I10-I15	高血壓性疾病	41	76.90	1.73	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	35	47.29	1.69
		其他	866	680.11	19.53		其他	450	844.00	19.04		其他	416	562.05	20.10
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	62	48.69	1.40	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	33	61.89	1.40	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	32	43.23	1.55
12	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	53	41.62	1.20	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	30	56.27	1.27	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	20	27.02	0.97
13	G20-G21	帕金森病	48	37.70	1.08	G20-G21	帕金森病	29	54.39	1.23	G20-G21	帕金森病	19	25.67	0.92
14	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	32	25.13	0.72	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	18	33.76	0.76	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	18	24.32	0.87
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	32	25.13	0.72	I71	主動脈瘤及剝離	17	31.88	0.72	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	18	24.32	0.87

資料來源：衛生福利部。

附註：75-84歲年中人口數為 127,333人，其中男性為 53,318人，女性為 74,015人。

表15·ICD-10 臺北市老年(85歲以上)主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	6,939	12,173.79	100.00		所有死亡原因	3,618	13,494.96	100.00		所有死亡原因	3,321	11,000.51	100.00
1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,415	2,482.48	20.39	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	716	2,670.65	19.79	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	699	2,315.37	21.05
2	J12-J18	肺炎	1,053	1,847.38	15.18	C00-C97	惡性腫瘤	586	2,185.75	16.20	J12-J18	肺炎	484	1,603.21	14.57
3	C00-C97	惡性腫瘤	1,049	1,840.37	15.12	J12-J18	肺炎	569	2,122.34	15.73	C00-C97	惡性腫瘤	463	1,533.65	13.94
4	I60-I69	腦血管疾病	511	896.50	7.36	I60-I69	腦血管疾病	286	1,066.77	7.90	I60-I69	腦血管疾病	225	745.29	6.78
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	304	533.34	4.38	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	236	880.27	6.52	E10-E14	糖尿病	162	536.61	4.88
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	274	480.71	3.95	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	122	455.05	3.37	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	152	503.49	4.58
7	E10-E14	糖尿病	274	480.71	3.95	A40-A41	敗血症	121	451.32	3.34	I10-I15	高血壓性疾病	112	370.99	3.37
8	A40-A41	敗血症	231	405.27	3.33	E10-E14	糖尿病	112	417.75	3.10	A40-A41	敗血症	110	364.37	3.31
9	I10-I15	高血壓性疾病	200	350.88	2.88	I10-I15	高血壓性疾病	88	328.24	2.43	F01-F03	血管性及未明示之 癡呆症	82	271.62	2.47
10	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	130	228.07	1.87	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	51	190.23	1.41	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	68	225.24	2.05
		其他	1,498	2,628.09	21.59		其他	731	2,726.59	20.20		其他	764	2,530.68	23.01
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	101	177.19	1.46	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	48	179.04	1.33	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	50	165.62	1.51
12	G20-G21	帕金森病	77	135.09	1.11	G20-G21	帕金森病	45	167.85	1.24	G20-G21	帕金森病	32	106.00	0.96
13	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺 部病況(塵肺症及肺 炎除外)	61	107.02	0.88	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺 部病況(塵肺症及肺 炎除外)	33	123.09	0.91	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之 肺部病況(塵肺症 及肺炎除外)	28	92.75	0.84
14	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	47	82.46	0.68	A15-A19	結核病	28	104.44	0.77	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	26	86.12	0.78
15	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	31	54.39	0.45	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	21	78.33	0.58	R54	衰老/老邁	17	56.31	0.51

資料來源：衛生福利部。

附註：85歲以上年中人口數為57,000人，其中男性為26,810人，女性為30,190人。

表16·ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
總計	455	17.00	135	5.05	117	4.37	20	0.75	29	1.08	12	0.45	42	1.57	100	3.74
0歲	9	39.41	-	-	1	4.38	-	-	5	21.89	-	-	-	-	3	13.14
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	23	8.38	18	6.55	2	0.73	2	0.73	-	-	-	-	1	0.36	-	0.00
25-44歲	57	7.22	21	2.66	6	0.76	3	0.38	1	0.13	1	0.13	15	1.90	10	1.27
45-64歲	97	12.18	32	4.02	25	3.14	6	0.75	6	0.75	1	0.13	20	2.51	7	0.88
65-79歲	126	36.94	41	12.02	38	11.14	7	2.05	7	2.05	5	1.47	4	1.17	24	7.04
80歲以上	143	132.60	23	21.33	45	41.73	2	1.85	10	9.27	5	4.64	2	1.85	56	51.93

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,675,915人。



表17·ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	294	23.01	91	7.12	78	6.10	16	1.25	15	1.17	6	0.47	30	2.35	58	4.54
0歲	4	34.11	-	-	1	8.53	-	-	1	8.53	-	-	-	-	2	17.05
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	19	13.37	16	11.26	-	-	2	1.41	-	-	-	-	1	0.70	-	-
25-44歲	44	11.71	13	3.46	6	1.60	3	0.80	-	-	1	0.27	12	3.19	9	2.39
45-64歲	66	17.90	20	5.42	16	4.34	5	1.36	5	1.36	1	0.27	13	3.53	6	1.63
65-79歲	85	55.40	26	16.95	28	18.25	6	3.91	4	2.61	3	1.96	4	2.61	14	9.13
80歲以上	76	160.12	16	33.71	27	56.88	-	-	5	10.53	1	2.11	-	-	27	56.88

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,277,646人。

表18·ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	161	11.51	44	3.15	39	2.79	4	0.29	14	1.00	6	0.43	12	0.86	42	3.00
0歲	5	45.00	-	-	-	-	-	-	4	36.00	-	-	-	-	1	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	4	3.02	2	1.51	2	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44歲	13	3.14	8	1.93	-	-	-	-	1	0.24	-	-	3	0.73	1	0.24
45-64歲	31	7.25	12	2.81	9	2.10	1	0.23	1	0.23	-	-	7	1.64	1	0.23
65-79歲	41	21.85	15	7.99	10	5.33	1	0.53	3	1.60	2	1.07	-	-	10	5.33
80歲以上	67	110.97	7	11.59	18	29.81	2	3.31	5	8.28	4	6.63	2	3.31	29	48.03

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,398,269人。

表19·ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
總計	135	5.05	34	1.27	6	0.22	24	0.90	7	0.26	1	0.04	61	2.28	2	0.07
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	18	6.55	-	-	1	0.36	4	1.46	1	0.36	-	-	12	4.37	-	-
25-44歲	21	2.66	1	0.13	-	-	4	0.51	2	0.25	-	-	14	1.77	-	-
45-64歲	32	4.02	4	0.50	2	0.25	6	0.75	2	0.25	-	-	17	2.13	1	0.13
65-79歲	41	12.02	18	5.28	1	0.29	8	2.35	1	0.29	1	0.29	11	3.23	1	0.29
80歲以上	23	21.33	11	10.20	2	1.85	2	1.85	1	0.93	-	-	7	6.49	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,675,915人。

表20·ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	91	7.12	18	1.41	4	0.31	16	1.25	3	0.23	1	0.08	48	3.76	1	0.08
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	16	11.26	-	-	1	0.70	4	2.82	1	0.70	-	-	10	7.04	-	-
25-44歲	13	3.46	1	0.27	-	-	3	0.80	-	-	-	-	9	2.39	-	-
45-64歲	20	5.42	2	0.54	-	-	1	0.27	2	0.54	-	-	14	3.80	1	0.27
65-79歲	26	16.95	7	4.56	1	0.65	7	4.56	-	-	1	0.65	10	6.52	-	-
80歲以上	16	33.71	8	16.85	2	4.21	1	2.11	-	-	-	-	5	10.53	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,277,646人。

表21·ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	44	3.15	16	1.14	2	0.14	8	0.57	4	0.29	13	0.93	1	0.07	-	-
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	2	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.51	-	-	-	-
25-44歲	8	1.93	-	-	-	-	1	0.24	2	0.48	5	1.21	-	-	-	-
45-64歲	12	2.81	2	0.47	2	0.47	5	1.17	-	-	3	0.70	-	-	-	-
65-79歲	15	7.99	11	5.86	-	-	1	0.53	1	0.53	1	0.53	1	0.53	-	-
80歲以上	7	11.59	3	4.97	-	-	1	1.66	1	1.66	2	3.31	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,398,269人。

表22·ICD-10 臺北市自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	349	13.04	-	-	2	0.58	17	6.19	96	12.16	133	16.70	73	21.40	28	25.96
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.11	-	-	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	1	0.29	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	0.19	-	-	-	-	-	-	3	0.38	1	0.13	1	0.29	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	73	2.73	-	-	-	-	1	0.36	31	3.93	36	4.52	5	1.47	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.30	-	-	-	-	1	0.36	-	-	4	0.50	3	0.88	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	1	0.29	1	0.93
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	136	5.08	-	-	-	-	7	2.55	31	3.93	54	6.78	28	8.21	16	14.84
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	26	0.97	-	-	-	-	-	-	1	0.13	12	1.51	12	3.52	1	0.93
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	4	0.15	-	-	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	1	0.29	1	0.93
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	3	0.11	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	1	0.29	1	0.93
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.63	2	0.59	3	2.78
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	75	2.80	-	-	2	0.58	8	2.91	25	3.17	18	2.26	18	5.28	4	3.71
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.93
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,675,915人。

表23·ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	219	17.14	-	-	2	1.12	6	4.22	56	14.90	90	24.41	45	29.33	20	42.14
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.31	-	-	-	-	-	-	2	0.53	1	0.27	1	0.65	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	53	4.15	-	-	-	-	-	-	23	6.12	27	7.32	3	1.96	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.55	-	-	-	-	1	0.70	-	-	3	0.81	3	1.96	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.27	1	0.65	1	2.11
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	80	6.26	-	-	-	-	3	2.11	14	3.73	34	9.22	19	12.38	10	21.07
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	14	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.90	6	3.91	1	2.11
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	4	0.31	-	-	-	-	-	-	1	0.27	1	0.27	1	0.65	1	2.11
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	3	0.23	-	-	-	-	-	-	1	0.27	-	-	1	0.65	1	2.11
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.36	1	0.65	2	4.21
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	41	3.21	-	-	2	1.12	2	1.41	14	3.73	11	2.98	9	5.87	3	6.32
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.27	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.11
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,277,646人。

表24·ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	130	9.30	-	-	-	-	11	8.30	40	9.67	43	10.06	28	14.92	8	13.25
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.21	-	-	-	-	-	-	1	0.24	1	0.23	1	0.53	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.24	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.24	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	20	1.43	-	-	-	-	1	0.75	8	1.93	9	2.10	2	1.07	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	56	4.00	-	-	-	-	4	3.02	17	4.11	20	4.68	9	4.80	6	9.94
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	12	0.86	-	-	-	-	-	-	1	0.24	5	1.17	6	3.20	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.53	1	1.66
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	34	2.43	-	-	-	-	6	4.53	11	2.66	7	1.64	9	4.80	1	1.66
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,398,269人。



表25·ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死 亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有癌症死亡原因	5,238	195.75	100.48	100.00	惡性腫瘤	2,926	229.01	123.42	100.00	惡性腫瘤	2,312	165.35	81.96	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	1,053	39.35	19.52	20.10	氣管、支氣管和肺癌	629	49.23	25.77	21.50	氣管、支氣管和肺癌	424	30.32	14.52	18.34
2	結腸、直腸和肛門癌	705	26.35	13.03	13.46	肝和肝內膽管癌	432	33.81	18.59	14.76	女性乳癌	321	22.96	12.92	13.88
3	肝和肝內膽管癌	679	25.37	12.82	12.96	結腸、直腸和肛門癌	391	30.60	16.16	13.36	結腸、直腸和肛門癌	314	22.46	10.47	13.58
4	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	321	22.96	12.92	6.13	口腔癌	161	12.60	7.36	5.50	肝和肝內膽管癌	247	17.66	8.01	10.68
5	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	160	12.52	5.57	3.05	胃癌	160	12.52	6.40	5.47	胰臟癌	150	10.73	4.87	6.49
6	胰臟癌	308	11.51	5.81	5.88	前列腺(攝護腺)癌	160	12.52	5.57	5.47	胃癌	128	9.15	4.27	5.54
7	胃癌	288	10.76	5.24	5.50	胰臟癌	158	12.37	6.92	5.40	卵巢癌	79	5.65	3.30	3.42
8	口腔癌	176	6.58	3.65	3.36	食道癌	128	10.02	5.87	4.37	子宮頸及部位未明示子宮癌	66	4.72	2.53	2.85
9	非何杰金氏淋巴瘤	159	5.94	2.89	3.04	非何杰金氏淋巴瘤	96	7.51	4.01	3.28	非何杰金氏淋巴瘤	63	4.51	1.96	2.72
10	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	79	5.65	3.30	1.51	膀胱癌	71	5.56	2.53	2.43	白血病	59	4.22	2.39	2.55
	其他	1,310	48.96	26.28	25.01	其他	540	42.27	24.23	18.46	其他	461	32.97	16.73	19.94
11	食道癌	140	5.23	2.92	2.67	白血病	65	5.09	3.20	2.22	子宮體癌	54	3.86	2.03	2.34
12	子宮頸及部位未明示子宮癌 <sup>(1)</sup>	66	4.72	2.53	1.26	腎臟癌	53	4.15	2.30	1.81	腦癌	40	2.86	1.97	1.73
13	白血病	124	4.63	2.76	2.37	鼻咽癌	44	3.44	2.27	1.50	膀胱癌	38	2.72	1.03	1.64
14	膀胱癌	109	4.07	1.69	2.08	腦癌	41	3.21	2.14	1.40	間皮和軟組織癌	34	2.43	1.33	1.47
15	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	54	3.86	2.03	1.03	膽囊和其他膽道癌	29	2.27	1.08	0.99	腎臟癌	33	2.36	1.06	1.43

資料來源：衛生福利部。

附註：1. 臺北市年中人口數為 2,675,915 人，其中男性 1,277,646 人，女性 1,398,269 人。

2. (1) 死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2) 死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表26·ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	5,238	195.75	1	4.38	6	1.74	13	4.73	163	20.65	1,422	178.58	1,221	461.50	1,363	1,070.43	1,049	1,840.37		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,053	39.35	-	-	-	-	-	-	16	2.03	243	30.52	269	101.67	308	241.89	217	380.71		
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	705	26.35	-	-	-	-	1	0.36	16	2.03	180	22.60	162	61.23	175	137.44	171	300.00		
3	C22	肝和肝內膽管癌	679	25.37	-	-	-	-	-	-	16	2.03	160	20.09	178	67.28	204	160.21	121	212.28		
4	C50	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	321	22.96	-	-	-	-	-	-	26	6.29	153	35.78	70	48.67	50	67.55	22	72.87		
5	C61	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	160	12.52	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.63	25	20.70	61	114.41	68	253.64		
6	C25	胰臟癌	308	11.51	-	-	-	-	-	-	5	0.63	89	11.18	68	25.70	92	72.25	54	94.74		
7	C16	胃癌	288	10.76	-	-	-	-	-	-	5	0.63	64	8.04	65	24.57	80	62.83	74	129.83		
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	176	6.58	-	-	-	-	-	-	5	0.63	77	9.67	53	20.03	26	20.42	15	26.32		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	159	5.94	-	-	-	-	1	0.36	4	0.51	29	3.64	39	14.74	47	36.91	39	68.42		
10	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	79	5.65	-	-	-	-	1	0.75	5	1.21	39	9.12	17	11.82	15	20.27	2	6.62		
		其他	1,310	48.96	1	4.38	6	1.74	10	3.64	65	8.23	382	47.97	275	103.94	305	239.53	266	466.67		
11	C15	食道癌	140	5.23	-	-	-	-	1	0.36	1	0.13	74	9.29	35	13.23	16	12.57	13	22.81		
12	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌 <sup>(1)</sup>	66	4.72	-	-	-	-	-	-	9	2.18	22	5.15	8	5.56	12	16.21	15	49.69		
13	C91-C95	白血病	124	4.63	-	-	1	0.29	4	1.46	13	1.65	31	3.89	24	9.07	27	21.20	24	42.11		
14	C67	膀胱癌	109	4.07	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.76	13	4.91	32	25.13	50	87.72		
15	C54	子宮體癌	54	3.86	-	-	-	-	-	-	1	0.24	28	6.55	12	8.34	9	12.16	4	13.25		

資料來源：衛生福利部。

附註：1.臺北市年中人口數為 2,675,915人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表27·ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國107年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,926	229.01	-	-	3	1.68	9	6.34	64	17.03	783	212.35	741	613.62	740	1,387.91	586	2,185.75		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	629	49.23	-	-	-	-	-	-	4	1.06	141	38.24	174	144.09	180	337.60	130	484.89		
2	C22	肝和肝內膽管癌	432	33.81	-	-	-	-	-	-	11	2.93	129	34.98	123	101.86	108	202.56	61	227.53		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	391	30.60	-	-	-	-	1	0.70	9	2.39	99	26.85	96	79.50	94	176.30	92	343.16		
4	C00-C06, C09-C10.	口腔癌	161	12.60	-	-	-	-	-	-	5	1.33	73	19.80	46	38.09	25	46.89	12	44.76		
5	C16	胃癌	160	12.52	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.63	25	20.70	61	114.41	68	253.64		
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	160	12.52	-	-	-	-	-	-	3	0.80	33	8.95	41	33.95	40	75.02	43	160.39		
7	C25	胰臟癌	158	12.37	-	-	-	-	-	-	3	0.80	55	14.92	36	29.81	40	75.02	24	89.52		
8	C15	食道癌	128	10.02	-	-	-	-	1	0.70	1	0.27	71	19.26	31	25.67	13	24.38	11	41.03		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	96	7.51	-	-	-	-	1	0.70	3	0.80	20	5.42	26	21.53	26	48.76	20	74.60		
10	C67	膀胱癌	71	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.71	8	6.62	23	43.14	30	111.90		
		其他	540	42.27	-	-	3	1.68	6	4.22	25	6.65	146	39.59	135	111.79	130	243.82	95	354.35		
11	C91-C95	白血病	65	5.09	-	-	1	0.56	3	2.11	5	1.33	13	3.53	17	14.08	15	28.13	11	41.03		
12	C64	腎臟癌	53	4.15	-	-	-	-	-	-	1	0.27	13	3.53	15	12.42	15	28.13	9	33.57		
13	C11	鼻咽癌	44	3.44	-	-	-	-	-	-	3	0.80	21	5.70	14	11.59	6	11.25	-	-		
14	C71	腦癌	41	3.21	-	-	1	0.56	-	-	3	0.80	19	5.15	11	9.11	5	9.38	2	7.46		
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	29	2.27	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.36	7	5.80	7	13.13	10	37.30		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為 1,277,646人。

表28·ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國107年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,312	165.35	1	-	3	1.81	4	3.02	99	23.94	639	149.45	480	333.76	623	841.72	463	1,533.65		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	424	30.32	-	-	-	-	-	-	12	2.90	102	23.86	95	66.06	128	172.94	87	288.18		
2	C50	女性乳房癌	321	22.96	-	-	-	-	-	-	26	6.29	153	35.78	70	48.67	50	67.55	22	72.87		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	314	22.46	-	-	-	-	-	-	7	1.69	81	18.94	66	45.89	81	109.44	79	261.68		
4	C22	肝和肝內膽管癌	247	17.66	-	-	-	-	-	-	5	1.21	31	7.25	55	38.24	96	129.70	60	198.74		
5	C25	胰臟癌	150	10.73	-	-	-	-	-	-	2	0.48	34	7.95	32	22.25	52	70.26	30	99.37		
6	C16	胃癌	128	9.15	-	-	-	-	-	-	2	0.48	31	7.25	24	16.69	40	54.04	31	102.68		
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	79	5.65	-	-	-	-	1	0.75	5	1.21	39	9.12	17	11.82	15	20.27	2	6.62		
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	66	4.72	-	-	-	-	-	-	9	2.18	22	5.15	8	5.56	12	16.21	15	49.69		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	63	4.51	-	-	-	-	-	-	1	0.24	9	2.10	13	9.04	21	28.37	19	62.94		
10	C91-C95	白血病	59	4.22	-	-	-	-	1	0.75	8	1.93	18	4.21	7	4.87	12	16.21	13	43.06		
		其他	461	32.97	1	-	3	1.81	2	1.51	22	5.32	119	27.83	93	64.67	116	156.72	105	347.80		
11	C54	子宮體癌	54	3.86	-	-	-	-	-	-	1	0.24	28	6.55	12	8.34	9	12.16	4	13.25		
12	C71	腦癌	40	2.86	1	-	2	1.21	-	-	6	1.45	8	1.87	9	6.26	10	13.51	4	13.25		
13	C67	膀胱癌	38	2.72	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.94	5	3.48	9	12.16	20	66.25		
14	C45-C49	間皮和軟組織癌	34	2.43	-	-	-	-	1	0.75	2	0.48	7	1.64	9	6.26	13	17.56	2	6.62		
15	C64	腎臟癌	33	2.36	-	-	-	-	-	-	2	0.48	7	1.64	9	6.26	3	4.05	12	39.75		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為 1,398,269人。

# 參、107 年死因統計

## 二、行政區別死因統計



表29-1·ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1351	654.73	281.89	100.00	所有死亡原因	747	772.14	359.16	100.00	所有死亡原因	604	551.09	219.44	100.00
1	惡性腫瘤	408	197.73	94.36	30.20	惡性腫瘤	221	228.44	116.23	29.59	惡性腫瘤	187	170.62	77.11	30.96
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	198	95.96	35.58	14.66	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	114	117.84	46.62	15.26	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	84	76.64	26.54	13.91
3	肺炎	147	71.24	22.28	10.88	肺炎	78	80.62	27.05	10.44	肺炎	69	62.96	18.33	11.42
4	腦血管疾病	95	46.04	19.58	7.03	腦血管疾病	51	52.72	24.03	6.83	腦血管疾病	44	40.15	16.08	7.28
5	糖尿病	52	25.20	8.33	3.85	慢性下呼吸道疾病	24	24.81	8.56	3.21	糖尿病	28	25.55	7.57	4.64
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	33	15.99	5.48	2.44	糖尿病	24	24.81	9.21	3.21	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	14.60	4.43	2.65
7	慢性下呼吸道疾病	30	14.54	4.88	2.22	蓄意自我傷害（自殺）	20	20.67	18.00	2.68	敗血症	10	9.12	2.89	1.66
8	蓄意自我傷害（自 殺）	29	14.05	12.78	2.15	腎炎、腎病症候群 及腎病變	17	17.57	6.78	2.28	蓄意自我傷害（自 殺）	9	8.21	8.34	1.49
9	事故傷害	22	10.66	6.83	1.63	事故傷害	14	14.47	10.38	1.87	血管性及未明示之 癱瘓症	8	7.30	1.99	1.32
10	敗血症	21	10.18	3.92	1.55	慢性肝病及肝硬化	13	13.44	8.39	1.74	事故傷害	8	7.30	3.59	1.32
	其他	316	153.14	67.88	23.39	其他	171	176.75	83.90	22.89	其他	141	128.65	52.59	23.34
11	高血壓性疾病	20	9.69	3.63	1.48	高血壓性疾病	12	12.40	5.07	1.61	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	8	7.30	2.71	1.32
12	慢性肝病及肝硬化	18	8.72	4.77	1.33	敗血症	11	11.37	5.07	1.47	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	8	7.30	3.62	1.32
13	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	17	8.24	3.27	1.26	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	9	9.30	4.00	1.20	高血壓性疾病	8	7.30	2.46	1.32
14	血管性及未明示之 癱瘓症	15	7.27	2.19	1.11	血管性及未明示之 癱瘓症	7	7.24	2.50	0.94	帕金森病	7	6.39	1.56	1.16
15	帕金森病	14	6.78	2.10	1.04	帕金森病	7	7.24	2.87	0.94	慢性下呼吸道疾病	6	5.47	1.96	0.99

資料來源：衛生福利部。

表29-2·ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	1,592	708.88	308.17	100.00	所有死亡原因	898	838.32	388.38	100.00	所有死亡原因	694	590.83	242.04	100.00
2	惡性腫瘤	464	206.61	98.29	29.15	惡性腫瘤	251	234.32	115.86	27.95	惡性腫瘤	213	181.34	83.82	30.69
3	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	266	118.44	47.69	16.71	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	139	129.76	57.18	15.48	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	127	108.12	40.67	18.30
4	肺炎	142	63.23	20.95	8.92	肺炎	78	72.82	24.75	8.69	肺炎	64	54.49	17.68	9.22
5	腦血管疾病	99	44.08	16.73	6.22	腦血管疾病	60	56.01	23.39	6.68	腦血管疾病	39	33.20	11.39	5.62
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	71	31.61	12.24	4.46	腎炎、腎病症候群及腎病變	39	36.41	14.67	4.34	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	27.24	10.01	4.61
7	糖尿病	53	23.60	9.64	3.33	慢性下呼吸道疾病	36	33.61	11.67	4.01	糖尿病	23	19.58	7.40	3.31
8	敗血症	43	19.15	7.60	2.70	糖尿病	30	28.01	12.08	3.34	敗血症	16	13.62	4.77	2.31
9	慢性下呼吸道疾病	42	18.70	6.17	2.64	敗血症	27	25.21	11.19	3.01	高血壓性疾病	13	11.07	3.50	1.87
10	事故傷害	31	13.80	8.34	1.95	事故傷害	22	20.54	14.66	2.45	蓄意自我傷害（自 殺）	10	8.51	4.92	1.44
11	高血壓性疾病	31	13.80	5.32	1.95	蓄意自我傷害（自殺）	18	16.80	10.03	2.00	事故傷害	9	7.66	2.68	1.30
12	其他	350	155.85	75.21	21.98	其他	198	184.84	92.90	22.05	其他	148	126.00	55.20	21.33
13	蓄意自我傷害（自 殺）	28	12.47	7.36	1.76	高血壓性疾病	18	16.80	7.68	2.00	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	9	7.66	3.10	1.30
14	帕金森病	18	8.01	3.05	1.13	帕金森病	13	12.14	5.06	1.45	血管性及未明示之癱瘓症	8	6.81	2.24	1.15
15	血管性及未明示之癱瘓症	17	7.57	2.52	1.07	慢性肝病及肝硬化	12	11.20	7.88	1.34	主動脈瘤及剝離	6	5.11	1.81	0.86
16	慢性肝病及肝硬化	17	7.57	4.39	1.07	血管性及未明示之癱瘓症	9	8.40	2.83	1.00	慢性下呼吸道疾病	6	5.11	1.53	0.86
17	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	15	6.68	2.91	0.94	主動脈瘤及剝離	7	6.53	3.26	0.78	帕金森病 <sup>(1)</sup>	5	4.26	1.43	0.72

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)女性：慢性肝病及肝硬化、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.26人，每十萬人口標準化死亡率為1.43人。



表29-3 · ICD-10 臺北市大安區主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	2,092	676.13	266.08	100.00	所有死亡原因	1,161	804.05	332.08	100.00	所有死亡原因	931	564.20	213.53	100.00
1	惡性腫瘤	580	187.46	84.68	27.72	惡性腫瘤	319	220.92	101.38	27.48	惡性腫瘤	261	158.17	71.38	28.03
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	388	125.40	42.38	18.55	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	214	148.21	57.02	18.43	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	174	105.45	30.83	18.69
3	肺炎	170	54.94	15.72	8.13	肺炎	98	67.87	20.84	8.44	肺炎	72	43.63	11.82	7.73
4	腦血管疾病	147	47.51	15.87	7.03	腦血管疾病	89	61.64	21.45	7.67	腦血管疾病	58	35.15	11.36	6.23
5	糖尿病	65	21.01	7.11	3.11	慢性下呼吸道疾病	47	32.55	10.21	4.05	糖尿病	36	21.82	6.59	3.87
6	慢性下呼吸道疾病	63	20.36	6.06	3.01	糖尿病	29	20.08	7.84	2.50	腎炎、腎病症候群及腎病變	28	16.97	7.01	3.01
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	54	17.45	6.51	2.58	蓄意自我傷害（自殺）	28	19.39	14.89	2.41	敗血症	24	14.54	4.00	2.58
8	敗血症	51	16.48	5.14	2.44	敗血症	27	18.70	6.60	2.33	事故傷害	23	13.94	9.66	2.47
9	事故傷害	49	15.84	8.76	2.34	事故傷害	26	18.01	8.43	2.24	高血壓性疾病	17	10.30	3.48	1.83
10	蓄意自我傷害（自殺）	45	14.54	11.55	2.15	腎炎、腎病症候群及腎病變	26	18.01	6.05	2.24	蓄意自我傷害（自殺）	17	10.30	8.88	1.83
	其他	480	155.14	62.30	22.94	其他	258	178.68	77.38	22.22	其他	221	133.93	48.52	23.74
11	高血壓性疾病	34	10.99	3.62	1.63	帕金森病	19	13.16	4.15	1.64	慢性下呼吸道疾病	16	9.70	2.61	1.72
12	血管性及未明示之癱瘓症	24	7.76	1.91	1.15	高血壓性疾病	17	11.77	3.77	1.46	血管性及未明示之癱瘓症	13	7.88	1.74	1.40
13	帕金森病	24	7.76	2.35	1.15	血管性及未明示之 癱瘓症	11	7.62	2.19	0.95	肇因於吸入外物之肺部病況（ 塵肺症及肺炎除外）	12	7.27	2.03	1.29
14	肇因於吸入外物之肺部病況（ 塵肺症及肺炎除外）	21	6.79	1.95	1.00	慢性肝病及肝硬化	11	7.62	4.31	0.95	慢性肝病及肝硬化	8	4.85	1.73	0.86
15	慢性肝病及肝硬化	19	6.14	2.90	0.91	主動脈瘤及剝離 <sup>(1)</sup>	9	6.23	2.06	0.78	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	7	4.24	1.29	0.75

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、6.23人，每十萬人口標準化死亡率為2.06人。

表29-4 · ICD-10 臺北市中山區主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,595	693.23	321.10	100.00	所有死亡原因	841	786.25	396.58	100.00	所有死亡原因	754	612.41	262.00	100.00
1	惡性腫瘤	464	201.67	100.03	29.09	惡性腫瘤	233	217.83	112.42	27.71	惡性腫瘤	231	187.62	90.75	30.64
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	265	115.18	49.75	16.61	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	150	140.24	66.69	17.84	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	115	93.40	36.64	15.25
3	肺炎	148	64.32	25.02	9.28	肺炎	78	72.92	33.43	9.27	肺炎	70	56.86	18.10	9.28
4	腦血管疾病	90	39.12	17.20	5.64	腦血管疾病	52	48.61	22.93	6.18	腎炎、腎病症候群及腎病變	38	30.86	11.38	5.04
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	70	30.42	12.67	4.39	糖尿病	38	35.53	19.13	4.52	腦血管疾病	38	30.86	12.80	5.04
6	糖尿病	63	27.38	12.79	3.95	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	29.92	14.31	3.80	糖尿病	25	20.31	7.71	3.32
7	事故傷害	49	21.30	12.47	3.07	事故傷害	31	28.98	19.06	3.69	敗血症	22	17.87	7.26	2.92
8	高血壓性疾病	38	16.52	7.19	2.38	慢性下呼吸道疾病	24	22.44	9.08	2.85	高血壓性疾病	19	15.43	5.16	2.52
9	敗血症	37	16.08	6.61	2.32	高血壓性疾病	19	17.76	9.72	2.26	事故傷害	18	14.62	6.36	2.39
10	慢性下呼吸道疾病	37	16.08	6.06	2.32	蓄意自我傷害（自殺）	18	16.83	11.74	2.14	慢性下呼吸道疾病	13	10.56	3.84	1.72
	其他	334	145.17	71.30	20.94	其他	166	155.19	78.07	19.74	其他	165	134.02	62.00	21.88
11	蓄意自我傷害（自殺）	28	12.17	8.92	1.76	敗血症	15	14.02	5.86	1.78	蓄意自我傷害（自殺）	10	8.12	6.70	1.33
12	慢性肝病及肝硬化	20	8.69	4.41	1.25	慢性肝病及肝硬化	14	13.09	7.47	1.66	血管性及未明示之癱瘓症	9	7.31	2.20	1.19
13	血管性及未明示之癱瘓症	14	6.08	1.96	0.88	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	8	7.48	3.89	0.95	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	7	5.69	2.58	0.93
14	帕金森病	12	5.22	1.64	0.75	帕金森病	7	6.54	2.36	0.83	主動脈瘤及剝離	6	4.87	1.91	0.80
15	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	12	5.22	2.35	0.75	血管性及未明示之 癱瘓症 <sup>(1)</sup>	5	4.67	1.65	0.59	慢性肝病及肝硬化	6	4.87	1.96	0.80

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.67人，每十萬人口標準化死亡率為1.65人。

表29-5·ICD-10 臺北市中正區主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	1,043	654.72	291.54	100.00	所有死亡原因	590	775.85	370.72	100.00	所有死亡原因	453	544.09	222.77	100.00
2	惡性腫瘤	298	187.06	92.71	28.57	惡性腫瘤	173	227.49	117.24	29.32	惡性腫瘤	125	150.14	71.61	27.59
3	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	157	98.55	37.03	15.05	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	88	115.72	48.36	14.92	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	69	82.87	27.37	15.23
4	肺炎	91	57.12	19.50	8.72	肺炎	51	67.06	24.94	8.64	肺炎	40	48.04	14.80	8.83
5	腦血管疾病	70	43.94	16.30	6.71	腦血管疾病	37	48.65	18.59	6.27	腦血管疾病	33	39.64	14.13	7.28
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	44	27.62	10.16	4.22	慢性下呼吸道疾病	27	35.50	12.07	4.58	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	30.03	10.08	5.52
7	慢性下呼吸道疾病	32	20.09	6.66	3.07	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	24.98	10.12	3.22	高血壓性疾病	15	18.02	6.33	3.31
8	高血壓性疾病	29	18.20	7.70	2.78	糖尿病	18	23.67	11.35	3.05	蓄意自我傷害（自殺）	14	16.82	17.69	3.09
9	事故傷害	26	16.32	8.91	2.49	事故傷害	16	21.04	12.06	2.71	血管性及未明示之癱瘓症	12	14.41	3.50	2.65
10	糖尿病	26	16.32	6.97	2.49	敗血症	15	19.72	7.93	2.54	事故傷害	10	12.01	6.44	2.21
11	敗血症	23	14.44	5.56	2.21	高血壓性疾病	14	18.41	9.33	2.37	敗血症	8	9.61	3.52	1.77
12	其他	247	155.05	80.04	23.68	其他	132	173.58	98.73	22.37	其他	102	122.51	47.30	22.52
13	蓄意自我傷害（自殺）	23	14.44	13.73	2.21	蓄意自我傷害（自殺）	9	11.83	10.23	1.53	糖尿病	8	9.61	3.27	1.77
14	血管性及未明示之 癱瘓症	15	9.42	2.30	1.44	帕金森病	7	9.20	3.71	1.19	慢性下呼吸道疾病	5	6.01	1.92	1.10
15	帕金森病	10	6.28	2.25	0.96	原位於良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	7.89	4.84	1.02	慢性肝病及肝硬化	5	6.01	2.64	1.10
16	原位於良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	10	6.28	3.19	0.96	結核病	5	6.57	2.29	0.85	皮膚及皮下組織疾病	4	4.80	1.63	0.88
17	皮膚及皮下組織疾病 <sup>(1)</sup>	7	4.39	1.61	0.67	源於周產期的特定病況	5	6.57	13.18	0.85	原位於良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	4	4.80	1.63	0.88

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：慢性肝病及肝硬化死亡人數、每十萬人口死亡率亦為7人、4.39人，每十萬人口標準化死亡率為1.61人。

表29-6 · ICD-10 臺北市大同區主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	987	768.38	375.54	100.00	所有死亡原因	581	928.04	507.20	100.00	所有死亡原因	406	616.59	260.43	100.00
1	惡性腫瘤	303	235.89	121.22	30.70	惡性腫瘤	174	277.93	152.40	29.95	惡性腫瘤	129	195.91	94.11	31.77
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	169	131.57	59.36	17.12	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	109	174.11	91.22	18.76	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	60	91.12	31.77	14.78
3	肺炎	80	62.28	24.92	8.11	肺炎	43	68.68	32.28	7.40	肺炎	37	56.19	19.19	9.11
4	腦血管疾病	55	42.82	20.66	5.57	腦血管疾病	34	54.31	28.65	5.85	腦血管疾病	21	31.89	13.98	5.17
5	事故傷害	35	27.25	17.60	3.55	事故傷害	21	33.54	23.37	3.61	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	25.82	9.65	4.19
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	35	27.25	11.70	3.55	慢性下呼吸道疾病	19	30.35	17.26	3.27	糖尿病	17	25.82	9.22	4.19
7	糖尿病	31	24.13	10.27	3.14	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	28.75	14.09	3.10	事故傷害	14	21.26	11.97	3.45
8	慢性下呼吸道疾病	26	20.24	10.07	2.63	慢性肝病及肝硬化	15	23.96	13.88	2.58	高血壓性疾病	12	18.22	6.77	2.96
9	敗血症	22	17.13	7.30	2.23	糖尿病	14	22.36	11.10	2.41	敗血症	9	13.67	4.10	2.22
10	高血壓性疾病	20	15.57	6.49	2.03	敗血症	13	20.77	11.06	2.24	慢性下呼吸道疾病	7	10.63	3.90	1.72
	其他	211	164.26	85.95	21.38	其他	121	193.28	111.89	20.83	其他	83	126.05	55.75	20.44
11	慢性肝病及肝硬化	19	14.79	8.49	1.93	蓄意自我傷害（自殺）	11	17.57	13.90	1.89	蓄意自我傷害（自殺）	5	7.59	5.12	1.23
12	蓄意自我傷害（自殺）	16	12.46	9.40	1.62	高血壓性疾病	8	12.78	6.14	1.38	貧血	4	6.07	2.26	0.99
13	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	6.23	2.80	0.81	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	7	11.18	5.50	1.20	慢性肝病及肝硬化	4	6.07	3.57	0.99
14	貧血	6	4.67	2.10	0.61	結核病	3	4.79	2.68	0.52	血管性及未明示之癱瘓症	3	4.56	1.50	0.74
15	血管性及未明示之癱瘓症	5	3.89	1.37	0.51	源於周產期的特定病況	3	4.79	8.46	0.52	衰老/老邁	3	4.56	1.23	0.74

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病、源於周產期的特定病況、肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、3.89人，每十萬人口標準化死亡率為0.51人。

(2)男性：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、4.79人，每十萬人口標準化死亡率為8.46人。

(3)女性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、4.56人，每十萬人口標準化死亡率為1.23人。

表29-7·ICD-10 臺北市萬華區主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,768	926.98	394.23	100.00	所有死亡原因	1,025	1,095.07	499.20	100.00	所有死亡原因	743	764.99	300.39	100.00
1	惡性腫瘤	468	245.38	114.65	26.47	惡性腫瘤	282	301.28	147.51	27.51	惡性腫瘤	186	191.51	85.75	25.03
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	315	165.16	64.63	17.82	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	180	192.30	83.66	17.56	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	135	139.00	47.99	18.17
3	肺炎	165	86.51	28.44	9.33	肺炎	103	110.04	39.47	10.05	肺炎	62	63.84	18.86	8.34
4	腦血管疾病	110	57.67	22.37	6.22	腦血管疾病	59	63.03	26.31	5.76	糖尿病	53	54.57	21.48	7.13
5	糖尿病	87	45.62	20.01	4.92	慢性下呼吸道疾病	44	47.01	16.01	4.29	腦血管疾病	51	52.51	19.02	6.86
6	慢性下呼吸道疾病	51	26.74	8.60	2.88	糖尿病	34	36.32	17.53	3.32	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	27.80	9.91	3.63
7	高血壓性疾病	49	25.69	10.13	2.77	事故傷害	27	28.85	13.64	2.63	高血壓性疾病	24	24.71	8.47	3.23
8	敗血症	49	25.69	9.63	2.77	敗血症	26	27.78	11.72	2.54	敗血症	23	23.68	7.54	3.10
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	48	25.17	9.45	2.71	高血壓性疾病	25	26.71	11.90	2.44	事故傷害	13	13.38	7.08	1.75
10	事故傷害	40	20.97	10.10	2.26	慢性肝病及肝硬化	22	23.50	14.86	2.15	慢性肝病及肝硬化	12	12.36	6.31	1.62
	其他	386	202.38	96.23	21.83	其他	223	238.24	116.60	21.76	其他	157	161.65	67.97	21.13
11	慢性肝病及肝硬化	34	17.83	10.45	1.92	蓄意自我傷害（自殺）	22	23.50	15.77	2.15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	11	11.33	3.99	1.48
12	蓄意自我傷害（自殺）	30	15.73	10.16	1.70	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	22.44	9.01	2.05	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	8.24	4.14	1.08
13	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	19	9.96	3.88	1.07	血管性及未明示之癱瘓症	9	9.62	3.21	0.88	蓄意自我傷害（自殺）	8	8.24	4.89	1.08
14	帕金森病	16	8.39	3.03	0.90	帕金森病	9	9.62	3.50	0.88	帕金森病	7	7.21	2.57	0.94
15	血管性及未明示之癱瘓症	15	7.86	2.44	0.85	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	8	8.55	3.79	0.78	慢性下呼吸道疾病	7	7.21	2.18	0.94

資料來源：衛生福利部。

表29-8·ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,675	611.11	300.33	100.00	所有死亡原因	939	714.45	376.83	100.00	所有死亡原因	736	515.90	239.72	100.00
1	惡性腫瘤	452	164.91	90.69	26.99	惡性腫瘤	251	190.98	113.33	26.73	惡性腫瘤	201	140.89	73.80	27.31
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	297	108.36	47.97	17.73	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	168	127.82	62.67	17.89	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	129	90.42	36.17	17.53
3	肺炎	155	56.55	22.15	9.25	肺炎	90	68.48	27.95	9.58	肺炎	65	45.56	17.43	8.83
4	腦血管疾病	97	35.39	16.54	5.79	腦血管疾病	60	45.65	21.80	6.39	糖尿病	43	30.14	12.86	5.84
5	糖尿病	79	28.82	13.25	4.72	糖尿病	36	27.39	13.29	3.83	腦血管疾病	37	25.94	12.44	5.03
6	敗血症	61	22.26	10.61	3.64	慢性下呼吸道疾病	35	26.63	11.16	3.73	腎炎、腎病症候群及腎病變	36	25.23	10.56	4.89
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	55	20.07	9.36	3.28	敗血症	32	24.35	12.34	3.41	敗血症	29	20.33	9.48	3.94
8	慢性下呼吸道疾病	47	17.15	6.85	2.81	事故傷害	23	17.50	11.84	2.45	高血壓性疾病	24	16.82	7.13	3.26
9	高血壓性疾病	45	16.42	7.14	2.69	高血壓性疾病	21	15.98	7.19	2.24	事故傷害	15	10.51	6.23	2.04
10	事故傷害	38	13.86	8.57	2.27	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	14.46	8.13	2.02	慢性下呼吸道疾病	12	8.41	3.26	1.63
	其他	349	127.33	67.21	20.84	其他	204	155.22	87.13	21.73	其他	145	101.64	50.35	19.70
11	慢性肝病及肝硬化	28	10.22	6.27	1.67	慢性肝病及肝硬化	19	14.46	9.50	2.02	蓄意自我傷害（自殺）	10	7.01	5.00	1.36
12	蓄意自我傷害（自殺）	27	9.85	7.23	1.61	蓄意自我傷害（自殺）	17	12.93	9.69	1.81	慢性肝病及肝硬化	9	6.31	3.46	1.22
13	血管性及未明示之癱瘓症	14	5.11	1.90	0.84	主動脈瘤及剝離	6	4.57	2.96	0.64	血管性及未明示之癱瘓症	8	5.61	1.93	1.09
14	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	13	4.74	2.97	0.78	血管性及未明示之癱瘓症	6	4.57	1.85	0.64	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	7	4.91	3.64	0.95
15	主動脈瘤及剝離	8	2.92	1.78	0.48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	4.57	2.28	0.64	先天性畸形變形及染色體異常	3	2.10	3.30	0.41

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：帕金森病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、2.92人，每十萬人口標準化死亡率為1.78人。

(2)男性：結核病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、4.57人，每十萬人口標準化死亡率為2.28人。

(3)女性：帕金森病、胃及十二指腸潰瘍、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病、衰老/老邁之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.10人，每十萬人口標準化死亡率為3.30人。

表29-9 · ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	821	673.43	375.89	100.00	所有死亡原因	473	794.00	477.49	100.00	所有死亡原因	348	558.22	288.22	100.00
1	惡性腫瘤	280	229.67	132.46	34.10	惡性腫瘤	153	256.83	160.75	32.35	惡性腫瘤	127	203.72	109.19	36.49
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	108	88.59	43.28	13.15	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	57	95.68	49.86	12.05	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	51	81.81	36.66	14.66
3	肺炎	58	47.58	21.66	7.06	腦血管疾病	42	70.50	39.83	8.88	肺炎	19	30.48	12.80	5.46
4	腦血管疾病	57	46.75	24.57	6.94	肺炎	39	65.47	33.16	8.25	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	25.67	12.73	4.60
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	29	23.79	12.56	3.53	慢性下呼吸道疾病	22	36.93	20.14	4.65	腦血管疾病	15	24.06	11.76	4.31
6	糖尿病	28	22.97	11.34	3.41	糖尿病	16	26.86	14.63	3.38	糖尿病	12	19.25	8.56	3.45
7	慢性下呼吸道疾病	27	22.15	11.56	3.29	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	21.82	12.14	2.75	事故傷害	11	17.65	12.12	3.16
8	事故傷害	21	17.23	14.93	2.56	慢性肝病及肝硬化	12	20.14	13.41	2.54	高血壓性疾病	9	14.44	8.51	2.59
9	慢性肝病及肝硬化	16	13.12	8.05	1.95	敗血症	11	18.47	9.91	2.33	血管性及未明示之癱瘓症	7	11.23	4.15	2.01
10	敗血症	15	12.30	6.02	1.83	事故傷害	10	16.79	16.94	2.11	蓄意自我傷害（自殺）	7	11.23	7.79	2.01
	其他	182	149.29	89.47	22.17	其他	98	164.51	106.72	20.72	其他	74	118.70	63.94	21.26
11	高血壓性疾病	13	10.66	6.12	1.58	蓄意自我傷害（自殺）	6	10.07	8.04	1.27	主動脈瘤及剝離	5	8.02	4.26	1.44
12	蓄意自我傷害（自殺）	13	10.66	8.01	1.58	血管性及未明示之癱瘓症	4	6.71	2.51	0.85	慢性下呼吸道疾病	5	8.02	5.06	1.44
13	血管性及未明示之 癱瘓症	11	9.02	3.42	1.34	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	4	6.71	3.44	0.85	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	4	6.42	3.14	1.15
14	主動脈瘤及剝離	8	6.56	3.60	0.97	高血壓性疾病	4	6.71	3.63	0.85	敗血症	4	6.42	2.93	1.15
15	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	4.92	2.70	0.73	主動脈瘤及剝離	3	5.04	2.87	0.63	慢性肝病及肝硬化	4	6.42	3.42	1.15

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：源於周產期的特定病況、塵肺症之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、5.04人，每十萬人口標準化死亡率為2.87人。

表29-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,412	490.96	305.05	100.00	所有死亡原因	812	591.13	397.52	100.00	所有死亡原因	600	399.37	231.13	100.00
1	惡性腫瘤	416	144.65	94.29	29.46	惡性腫瘤	237	172.54	118.78	29.19	惡性腫瘤	179	119.15	74.08	29.83
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	218	75.80	46.38	15.44	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	134	97.55	64.97	16.50	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	84	55.91	31.28	14.00
3	肺炎	128	44.51	23.37	9.07	肺炎	76	55.33	32.78	9.36	肺炎	52	34.61	16.58	8.67
4	腦血管疾病	98	34.08	18.90	6.94	腦血管疾病	53	38.58	22.86	6.53	腦血管疾病	45	29.95	15.88	7.50
5	糖尿病	54	18.78	11.96	3.82	事故傷害	35	25.48	21.55	4.31	糖尿病	26	17.31	9.40	4.33
6	敗血症	44	15.30	8.76	3.12	慢性下呼吸道疾病	29	21.11	13.64	3.57	腎炎、腎病症候群及腎病變	23	15.31	8.38	3.83
7	事故傷害	42	14.60	11.44	2.97	糖尿病	28	20.38	15.26	3.45	敗血症	20	13.31	7.01	3.33
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	42	14.60	8.30	2.97	敗血症	24	17.47	10.93	2.96	蓄意自我傷害（自殺）	14	9.32	6.47	2.33
9	慢性下呼吸道疾病	38	13.21	7.40	2.69	蓄意自我傷害（自殺）	22	16.02	12.84	2.71	高血壓性疾病	12	7.99	3.74	2.00
10	蓄意自我傷害（自殺）	36	12.52	9.39	2.55	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	13.83	8.19	2.34	慢性下呼吸道疾病	9	5.99	2.91	1.50
	其他	296	102.92	64.85	20.96	其他	155	112.84	75.70	19.09	其他	136	90.52	55.39	22.67
11	高血壓性疾病	23	8.00	4.01	1.63	高血壓性疾病	11	8.01	4.43	1.35	慢性肝病及肝硬化	9	5.99	3.96	1.50
12	慢性肝病及肝硬化	19	6.61	4.22	1.35	慢性肝病及肝硬化	10	7.28	4.60	1.23	事故傷害	7	4.66	2.53	1.17
13	主動脈瘤及剝離	12	4.17	2.63	0.85	主動脈瘤及剝離	9	6.55	4.62	1.11	血管性及未明示之癱瘓症	5	3.33	1.81	0.83
14	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	11	3.82	2.33	0.78	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	7	5.10	3.08	0.86	帕金森病	5	3.33	1.91	0.83
15	帕金森病	10	3.48	1.95	0.71	帕金森病	5	3.64	1.91	0.62	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	5	3.33	2.10	0.83

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)總計：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為10人、3.48人，每十萬人口標準化死亡率為1.95人。

(2)男性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、3.64人，每十萬人口標準化死亡率為1.91人。



表29-11·ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,958	681.23	322.71	100.00	所有死亡原因	1,090	786.56	407.94	100.00	所有死亡原因	868	583.17	250.86	100.00
1	惡性腫瘤	578	201.10	100.78	29.52	惡性腫瘤	322	232.36	120.42	29.54	惡性腫瘤	256	172.00	85.34	29.49
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	333	115.86	50.54	17.01	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	194	139.99	67.24	17.80	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	139	93.39	36.41	16.01
3	肺炎	166	57.76	21.65	8.48	肺炎	92	66.39	28.39	8.44	肺炎	74	49.72	16.74	8.53
4	腦血管疾病	119	41.40	19.17	6.08	腦血管疾病	66	47.63	25.19	6.06	腦血管疾病	53	35.61	13.96	6.11
5	糖尿病	89	30.97	13.83	4.55	糖尿病	44	31.75	16.25	4.04	糖尿病	45	30.23	11.69	5.18
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	81	28.18	11.34	4.14	事故傷害	39	28.14	20.39	3.58	腎炎、腎病症候群及腎病變	44	29.56	10.58	5.07
7	事故傷害	56	19.48	13.48	2.86	慢性下呼吸道疾病	38	27.42	11.76	3.49	高血壓性疾病	27	18.14	6.51	3.11
8	慢性下呼吸道疾病	50	17.40	6.87	2.55	腎炎、腎病症候群及腎病變	37	26.70	12.11	3.39	敗血症	19	12.77	4.60	2.19
9	敗血症	48	16.70	6.71	2.45	敗血症	29	20.93	9.43	2.66	事故傷害	17	11.42	7.14	1.96
10	蓄意自我傷害（自殺）	42	14.61	10.32	2.15	蓄意自我傷害（自殺）	29	20.93	14.46	2.66	血管性及未明示之癱瘓症	14	9.41	3.05	1.61
	其他	396	137.78	68.04	20.22	其他	200	144.32	82.30	18.35	其他	180	120.93	54.85	20.74
11	高血壓性疾病	41	14.26	5.93	2.09	慢性肝病及肝硬化	15	10.82	7.03	1.38	蓄意自我傷害（自殺）	13	8.73	6.64	1.50
12	慢性肝病及肝硬化	22	7.65	4.38	1.12	高血壓性疾病	14	10.10	5.11	1.28	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	12	8.06	4.69	1.38
13	血管性及未明示之 癱瘓症	19	6.61	2.39	0.97	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	8	5.77	2.11	0.73	慢性下呼吸道疾病	12	8.06	3.02	1.38
14	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	17	5.91	3.24	0.87	帕金森病	7	5.05	2.70	0.64	帕金森病	7	4.70	1.88	0.81
15	帕金森病	14	4.87	2.26	0.72	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	7	5.05	2.92	0.64	慢性肝病及肝硬化	7	4.70	2.07	0.81

資料來源：衛生福利部。

表29-12·ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	所有死亡原因	1,756	685.95	349.35	100.00	所有死亡原因	1003	813.93	449.34	100.00	所有死亡原因	753	567.17	267.46	100.00
2	惡性腫瘤	527	205.86	112.17	30.01	惡性腫瘤	310	251.56	146.16	30.91	惡性腫瘤	217	163.45	85.76	28.82
3	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	286	111.72	53.88	16.29	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	168	136.33	73.06	16.75	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	118	88.88	37.57	15.67
4	肺炎	169	66.02	27.06	9.62	肺炎	98	79.53	35.08	9.77	肺炎	71	53.48	20.41	9.43
5	腦血管疾病	115	44.92	20.91	6.55	腦血管疾病	64	51.94	26.21	6.38	腦血管疾病	51	38.41	16.67	6.77
6	慢性下呼吸道疾病	71	27.74	11.22	4.04	慢性下呼吸道疾病	52	42.20	18.56	5.18	糖尿病	35	26.36	11.41	4.65
7	糖尿病	65	25.39	12.13	3.70	腎炎、腎病症候群及腎病變	34	27.59	14.61	3.39	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	18.83	7.55	3.32
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	59	23.05	10.60	3.36	事故傷害	30	24.34	16.82	2.99	高血壓性疾病	21	15.82	6.26	2.79
9	事故傷害	46	17.97	12.51	2.62	糖尿病	30	24.34	13.12	2.99	慢性下呼吸道疾病	19	14.31	5.31	2.52
10	高血壓性疾病	43	16.80	6.91	2.45	高血壓性疾病	22	17.85	7.65	2.19	事故傷害	16	12.05	8.88	2.12
11	敗血症	35	13.67	6.50	1.99	敗血症	22	17.85	8.65	2.19	敗血症	13	9.79	4.74	1.73
12	其他	340	132.82	75.47	19.36	其他	173	140.39	89.42	17.25	其他	167	125.79	62.89	22.18
13	蓄意自我傷害（自殺）	32	12.50	10.02	1.82	蓄意自我傷害（自殺）	19	15.42	12.69	1.89	蓄意自我傷害（自殺）	13	9.79	7.49	1.73
14	慢性肝病及肝硬化	19	7.42	4.07	1.08	慢性肝病及肝硬化	13	10.55	6.42	1.30	血管性及未明示之 癱瘓症	9	6.78	2.18	1.20
15	帕金森病	14	5.47	2.44	0.80	主動脈瘤及剝離	6	4.87	2.95	0.60	帕金森病	9	6.78	2.87	1.20
16	血管性及未明示之 癱瘓症	13	5.08	1.81	0.74	帕金森病	5	4.06	1.89	0.50	慢性肝病及肝硬化	6	4.52	1.97	0.80
17	主動脈瘤及剝離	10	3.91	2.05	0.57	結核病	5	4.06	2.06	0.50	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	5	3.77	1.56	0.66

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)男性：肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.06人，每十萬人口標準化死亡率為2.06人。

(2)女性：骨骼肌肉系統及結締組織之疾病死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、3.77人，每十萬人口標準化死亡率為1.56人。

表30-1·ICD-10 臺北市松山區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	22	10.66	100.00	14	14.47	100.00	8	7.30	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	8	3.88	36.36	5	5.17	35.71	3	2.74	37.50
W00-W19	跌倒(落)	6	2.91	27.27	4	4.13	28.57	2	1.82	25.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.48	4.55	1	1.03	7.14	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.45	13.64	2	2.07	14.29	1	0.91	12.50
	其他	4	1.94	18.18	2	2.07	14.29	2	1.82	25.00

資料來源：衛生福利部。

表30-2·ICD-10 臺北市信義區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	31	13.80	100.00	22	20.54	100.00	9	7.66	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	11	4.90	35.48	8	7.47	36.36	3	2.55	33.33
W00-W19	跌倒(落)	5	2.23	16.13	4	3.73	18.18	1	0.85	11.11
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.34	9.68	3	2.80	13.64	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	1.78	12.90	4	3.73	18.18	-	-	-
	其他	8	3.56	36.36	3	2.80	21.43	5	4.26	62.50

資料來源：衛生福利部。

表30-3·ICD-10 臺北市大安區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	49	15.84	100.00	26	18.01	100.00	23	13.94	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	8	2.59	16.33	6	4.16	23.08	2	1.21	8.70
W00-W19	跌倒(落)	14	4.52	28.57	5	3.46	19.23	9	5.45	39.13
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	1.29	8.16	4	2.77	15.38	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	1.94	12.24	2	1.39	7.69	4	2.42	17.39
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.65	4.08	1	0.69	3.85	1	0.61	4.35
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.65	4.08	-	-	-	2	1.21	8.70
	其他	13	4.20	59.09	8	5.54	57.14	5	3.03	62.50

資料來源：衛生福利部。

表30-4·ICD-10 臺北市中山區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	49	21.30	100.00	31	28.98	100.00	18	14.62	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	19	8.26	38.78	11	10.28	35.48	8	6.50	44.44
W00-W19	跌倒(落)	13	5.65	26.53	8	7.48	25.81	5	4.06	27.78
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	2.61	12.24	5	4.67	16.13	1	0.81	5.56
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.30	6.12	2	1.87	6.45	1	0.81	5.56
	其他	8	3.48	36.36	5	4.67	35.71	3	2.44	37.50

資料來源：衛生福利部。

表30-5 · ICD-10 臺北市中正區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	26	16.32	100.00	16	21.04	100.00	10	12.01	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	8	5.02	30.77	3	3.94	18.75	5	6.01	50.00
W00-W19	跌倒(落)	8	5.02	30.77	7	9.20	43.75	1	1.20	10.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.63	3.85	1	1.31	6.25	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.63	3.85	-	-	-	1	1.20	10.00
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.26	7.69	1	1.31	6.25	1	1.20	10.00
	其他	6	3.77	27.27	4	5.26	28.57	2	2.40	25.00

資料來源：衛生福利部。

表30-6·ICD-10 臺北市大同區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	35	27.25	100.00	21	33.54	100.00	14	21.26	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	6	4.67	17.14	6	9.58	28.57	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	7	5.45	20.00	6	9.58	28.57	1	1.52	7.14
W65-W74	意外溺死和淹沒	5	3.89	14.29	2	3.19	9.52	3	4.56	21.43
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	3	2.34	8.57	1	1.60	4.76	2	3.04	14.29
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	8	6.23	22.86	6	9.58	28.57	2	3.04	14.29
	其他	6	4.67	27.27	-	-	-	6	9.11	75.00

資料來源：衛生福利部。



表30-7·ICD-10 臺北市萬華區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	40	20.97	100.00	27	28.85	100.00	13	13.38	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	8	4.19	20.00	4	4.27	14.81	4	4.12	30.77
W00-W19	跌倒(落)	10	5.24	25.00	8	8.55	29.63	2	2.06	15.38
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.57	7.50	3	3.21	11.11	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.52	2.50	1	1.07	3.70	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	2.62	12.50	4	4.27	14.81	1	1.03	7.69
	其他	13	6.82	59.09	7	7.48	50.00	6	6.18	75.00

資料來源：衛生福利部。

表30-8 · ICD-10 臺北市文山區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	38	13.86	100.00	23	17.50	100.00	15	10.51	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	16	5.84	42.11	9	6.85	39.13	7	4.91	46.67
W00-W19	跌倒(落)	6	2.19	15.79	5	3.80	21.74	1	0.70	6.67
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.36	2.63	-	-	-	1	0.70	6.67
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.36	2.63	-	-	-	1	0.70	6.67
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.73	5.26	1	0.76	4.35	1	0.70	6.67
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.09	7.89	2	1.52	8.70	1	0.70	6.67
	其他	9	3.28	40.91	6	4.57	42.86	3	2.10	37.50

資料來源：衛生福利部。

表30-9 · ICD-10 臺北市南港區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	21	17.23	100.00	10	16.79	100.00	11	17.65	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	6	4.92	28.57	2	3.36	20.00	4	6.42	36.36
W00-W19	跌倒(落)	4	3.28	19.05	2	3.36	20.00	2	3.21	18.18
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	1.64	9.52	-	-	-	2	3.21	18.18
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.82	4.76	1	1.68	10.00	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.82	4.76	-	-	-	1	1.60	9.09
	其他	7	5.74	31.82	5	8.39	35.71	2	3.21	25.00

資料來源：衛生福利部。

表30-10 · ICD-10 臺北市內湖區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	42	14.60	100.00	35	25.48	100.00	7	4.66	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	13	4.52	30.95	13	9.46	37.14	-	-	-
W00-W19	跌倒(落)	12	4.17	28.57	8	5.82	22.86	4	2.66	57.14
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.70	4.76	2	1.46	5.71	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.04	7.14	3	2.18	8.57	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	4	1.39	9.52	4	2.91	11.43	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	8	2.78	36.36	5	3.64	35.71	3	2.00	37.50

資料來源：衛生福利部。

表30-11 · ICD-10 臺北市士林區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	56	19.48	100.00	39	28.14	100.00	17	11.42	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	20	6.96	35.71	15	10.82	38.46	5	3.36	29.41
W00-W19	跌倒(落)	15	5.22	26.79	10	7.22	25.64	5	3.36	29.41
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.04	5.36	3	2.16	7.69	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.39	7.14	1	0.72	2.56	3	2.02	17.65
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	6	2.09	10.71	5	3.61	12.82	1	0.67	5.88
	其他	8	2.78	36.36	5	3.61	35.71	3	2.02	37.50

資料來源：衛生福利部。

表30-12 · ICD-10 臺北市北投區事故傷害死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	46	17.97	100.00	30	24.34	100.00	16	12.05	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	12	4.69	26.09	9	7.30	30.00	3	2.26	18.75
W00-W19	跌倒(落)	17	6.64	36.96	11	8.93	36.67	6	4.52	37.50
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.78	4.35	2	1.62	6.67	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.17	6.52	-	-	-	3	2.26	18.75
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.39	2.17	-	-	-	1	0.75	6.25
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.39	2.17	-	-	-	1	0.75	6.25
	其他	10	3.91	45.45	8	6.49	57.14	2	1.51	25.00

資料來源：衛生福利部。

表31-1 · ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	29	14.05	100.00	20	20.67	100.00	9	8.21	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.48	3.45	-	-	-	1	0.91	11.11			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	1.45	10.34	3	3.10	15.00	-	-	-			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.48	3.45	1	1.03	5.00	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	8	3.88	27.59	7	7.24	35.00	1	0.91	11.11			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.97	6.90	1	1.03	5.00	1	0.91	11.11			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2	0.97	6.90	2	2.07	10.00	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.48	3.45	-	-	-	1	0.91	11.11			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	11	5.33	37.93	6	6.20	30.00	5	4.56	55.56			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-2 · ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	28	12.47	100.00	18	16.80	100.00	10	8.51	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.45	3.57	-	-	-	1	0.85	10.00			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	3.56	28.57	4	3.73	22.22	4	3.41	40.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.45	3.57	1	0.93	5.56	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	9	4.01	32.14	6	5.60	33.33	3	2.55	30.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.45	3.57	-	-	-	1	0.85	10.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.89	7.14	2	1.87	11.11	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.45	3.57	1	0.93	5.56	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	1.78	14.29	3	2.80	16.67	1	0.85	10.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.45	3.57	1	0.93	5.56	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。



表31-3 · ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	45	14.54	100.00	28	19.39	100.00	17	10.30	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.32	2.22	-	-	-	1	0.61	5.88			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	1.94	13.33	4	2.77	14.29	2	1.21	11.76			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	15	4.85	33.33	9	6.23	32.14	6	3.64	35.29			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	5	1.62	11.11	3	2.08	10.71	2	1.21	11.76			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.32	2.22	1	0.69	3.57	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	3	0.97	6.67	3	2.08	10.71	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	14	4.52	31.11	8	5.54	28.57	6	3.64	35.29			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-4 · ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	28	12.17	100.00	18	16.83	100.00	10	8.12	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.43	3.57	-	-	-	1	0.81	10.00			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.74	14.29	1	0.93	5.56	3	2.44	30.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.87	7.14	2	1.87	11.11	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	5.22	42.86	9	8.41	50.00	3	2.44	30.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.87	7.14	2	1.87	11.11	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	3.04	25.00	4	3.74	22.22	3	2.44	30.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-5 · ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	23	14.44	100.00	9	11.83	100.00	14	16.82	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	3.14	21.74	3	3.94	33.33	2	2.40	14.29			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	10	6.28	43.48	3	3.94	33.33	7	8.41	50.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	1.26	8.70	-	-	-	2	2.40	14.29			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.63	4.35	1	1.31	11.11	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	3.14	21.74	2	2.63	22.22	3	3.60	21.43			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-6 · ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	16	12.46	100.00	11	17.57	100.00	5	7.59	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	3.89	31.25	4	6.39	36.36	1	1.52	20.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	6	4.67	37.50	4	6.39	36.36	2	3.04	40.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.78	6.25	1	1.60	9.09	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	3.11	25.00	2	3.19	18.18	2	3.04	40.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-7 · ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	30	15.73	100.00	22	23.50	100.00	8	8.24	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	1.05	6.67	2	2.14	9.09	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	4.19	26.67	6	6.41	27.27	2	2.06	25.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	11	5.77	36.67	6	6.41	27.27	5	5.15	62.50			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	2.10	13.33	3	3.21	13.64	1	1.03	12.50			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	1.05	6.67	2	2.14	9.09	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	1.57	10.00	3	3.21	13.64	-	-	-			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-8 · ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	27	9.85	100.00	17	12.93	100.00	10	7.01	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	2.92	29.63	5	3.80	29.41	3	2.10	30.00			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	4.38	44.44	7	5.33	41.18	5	3.50	50.00			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.36	3.70	-	-	-	1	0.70	10.00			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.36	3.70	1	0.76	5.88	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	1.46	14.81	3	2.28	17.65	1	0.70	10.00			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.36	3.70	1	0.76	5.88	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-9 · ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	13	10.66	100.00	6	10.07	100.00	7	11.23	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.82	7.69	-	-	-	1	1.60	14.29			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	3	2.46	23.08	2	3.36	33.33	1	1.60	14.29			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.82	7.69	1	1.68	16.67	-	-	-			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.82	7.69	1	1.68	16.67	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	5.74	53.85	2	3.36	33.33	5	8.02	71.43			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-10 · ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	36	12.52	100.00	22	16.02	100.00	14	9.32	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.70	5.56	2	1.46	9.09	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	3.48	27.78	10	7.28	45.45	-	-	-			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	15	5.22	41.67	7	5.10	31.82	8	5.32	57.14			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.39	11.11	2	1.46	9.09	2	1.33	14.29			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	1.74	13.89	1	0.73	4.55	4	2.66	28.57			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。



表31-11 · ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比			
X60-X84, Y87.0	自殺總計	42	14.61	100.00	29	20.93	100.00	13	8.73	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	2.78	19.05	7	5.05	24.14	1	0.67	7.69			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	1.04	7.14	3	2.16	10.34	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.35	2.38	1	0.72	3.45	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	20	6.96	47.62	12	8.66	41.38	8	5.37	61.54			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.70	4.76	1	0.72	3.45	1	0.67	7.69			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	2.78	19.05	5	3.61	17.24	3	2.02	23.08			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表31-12 · ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計				男性				女性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬人口死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	32	12.50	100.00	19	15.42	100.00	13	9.79	100.00			
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.39	3.13	-	-	-	1	0.75	7.69			
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	3.13	25.00	6	4.87	31.58	2	1.51	15.38			
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.78	6.25	2	1.62	10.53	-	-	-			
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	15	5.86	46.88	8	6.49	42.11	7	5.27	53.85			
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.39	3.13	-	-	-	1	0.75	7.69			
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.39	3.13	1	0.81	5.26	-	-	-			
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.39	3.13	-	-	-	1	0.75	7.69			
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	1.17	9.38	2	1.62	10.53	1	0.75	7.69			
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

資料來源：衛生福利部。

表32-1 · ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	408	197.73	94.36	100.00	所有癌症死亡原因	221	228.44	116.23	100.00	所有癌症死亡原因	187	170.62	77.11	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	89	43.13	20.65	21.81	氣管、支氣管和肺癌	53	54.78	27.56	23.98	氣管、支氣管和肺癌	36	32.85	15.28	19.25
2	結腸、直腸和肛門癌	64	31.02	14.12	15.69	肝和肝內膽管癌	41	42.38	23.83	18.55	結腸、直腸和肛門癌	33	30.11	12.94	17.65
3	肝和肝內膽管癌	55	26.65	13.39	13.48	結腸、直腸和肛門癌	31	32.04	15.60	14.03	女性乳房癌	28	25.55	14.44	14.97
4	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	28	25.55	14.44	6.86	前列腺(攝護腺)癌	17	17.57	6.89	7.69	肝和肝內膽管癌	14	12.77	5.10	7.49
5	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	17	17.57	6.89	4.17	胃癌	14	14.47	6.92	6.33	胃癌	14	12.77	6.22	7.49
6	胃癌	28	13.57	6.54	6.86	口腔癌	8	8.27	4.16	3.62	胰臟癌	12	10.95	4.13	6.42
7	胰臟癌	19	9.21	4.20	4.66	非何杰金氏淋巴瘤	8	8.27	4.40	3.62	間皮和軟組織癌	7	6.39	2.87	3.74
8	非何杰金氏淋巴瘤	14	6.78	2.98	3.43	食道癌	7	7.24	3.58	3.17	非何杰金氏淋巴瘤	6	5.47	1.65	3.21
9	口腔癌	10	4.85	2.23	2.45	胰臟癌	7	7.24	4.22	3.17	膽囊和其他膽道癌	4	3.65	0.89	2.14
10	膀胱癌	10	4.85	2.01	2.45	膀胱癌	7	7.24	3.14	3.17	子宮體癌	3	2.74	1.21	1.60
	其他	74	35.86	24.45	18.14	其他	28	28.94	15.93	12.67	其他	30	27.37	12.39	16.04
11	腎臟癌	9	4.36	1.94	2.21	白血病	6	6.20	3.23	2.71	腎臟癌	3	2.74	1.16	1.60
12	白血病	8	3.88	1.77	1.96	腎臟癌	6	6.20	3.01	2.71	膀胱癌	3	2.74	1.05	1.60
13	食道癌	7	3.39	1.59	1.72	男性生殖器官癌 (攝護腺除外)	2	2.07	2.42	0.90	口腔癌	2	1.82	0.65	1.07
14	間皮和軟組織癌	7	3.39	1.58	1.72	腦癌	2	2.07	1.70	0.90	子宮頸及部位未明 示子宮癌	2	1.82	0.68	1.07
15	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	3	2.74	1.21	0.74	小腸癌 <sup>(3)</sup>	1	1.03	0.49	0.45	白血病 <sup>(4)</sup>	2	1.82	0.68	1.07

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：主唾液腺癌、喉癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.03人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.57人、0.26人。

(4)女性：卵巢癌、腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.82人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.07、1.81人。

表32-2 · ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	464	206.61	98.29	100.00	所有癌症死亡原因	251	234.32	115.86	100.00	所有癌症死亡原因	213	181.34	83.82	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	103	45.86	20.86	22.20	氣管、支氣管和肺癌	62	57.88	28.25	24.70	氣管、支氣管和肺癌	41	34.91	15.05	19.25
2	結腸、直腸和肛門癌	62	27.61	12.81	13.36	肝和肝內膽管癌	33	30.81	15.61	13.15	結腸、直腸和肛門癌	31	26.39	12.00	14.55
3	肝和肝內膽管癌	59	26.27	12.14	12.72	結腸、直腸和肛門癌	31	28.94	13.80	12.35	肝和肝內膽管癌	26	22.14	9.15	12.21
4	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	22	18.73	10.73	4.74	前列腺(攝護腺)癌	18	16.80	7.06	7.17	女性乳房癌	22	18.73	10.73	10.33
5	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	18	16.80	7.06	3.88	胃癌	16	14.94	6.91	6.37	胃癌	11	9.36	3.92	5.16
6	胃癌	27	12.02	5.20	5.82	非何杰金氏淋巴瘤	10	9.34	3.97	3.98	胰臟癌	11	9.36	3.58	5.16
7	胰臟癌	21	9.35	3.98	4.53	食道癌	10	9.34	5.57	3.98	子宮頸及部位未明 示子宮癌	8	6.81	3.49	3.76
8	子宮頸及部位未明 示子宮癌 <sup>(1)</sup>	8	6.81	3.49	1.72	胰臟癌	10	9.34	4.54	3.98	子宮體癌	7	5.96	3.39	3.29
9	非何杰金氏淋巴瘤	14	6.23	2.68	3.02	膀胱癌	9	8.40	2.83	3.59	卵巢癌	7	5.96	2.77	3.29
10	膀胱癌	14	6.23	1.99	3.02	口腔癌	8	7.47	4.48	3.19	膀胱癌	5	4.26	1.31	2.35
	其他	116	51.65	27.33	25.00	其他	44	41.08	22.85	17.53	其他	44	37.46	18.44	20.66
11	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	7	5.96	3.39	1.51	腎臟癌	7	6.53	3.04	2.79	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.41	1.45	1.88
12	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	7	5.96	2.77	1.51	腦癌	5	4.67	4.00	1.99	間皮和軟組織癌	4	3.41	2.54	1.88
13	食道癌	12	5.34	2.99	2.59	鼻咽癌	5	4.67	3.35	1.99	腦癌	4	3.41	1.46	1.88
14	口腔癌	9	4.01	2.28	1.94	白血病	4	3.73	3.04	1.59	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	2.55	1.15	1.41
15	腦癌	9	4.01	2.77	1.94	膽囊和其他膽道癌	3	2.80	0.99	1.20	膽囊和其他膽道癌	3	2.55	1.06	1.41

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表32-3 · ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	580	187.46	84.68	100.00	所有癌症死亡原因	319	220.92	101.38	100.00	所有癌症死亡原因	261	158.17	71.38	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	111	35.88	14.75	19.14	氣管、支氣管和肺癌	58	40.17	16.85	18.18	氣管、支氣管和肺癌	53	32.12	13.11	20.31
2	結腸、直腸和肛門癌	82	26.50	10.83	14.14	結腸、直腸和肛門癌	49	33.93	15.15	15.36	女性乳房癌	34	20.60	10.89	13.03
3	肝和肝內膽管癌	68	21.98	9.62	11.72	肝和肝內膽管癌	48	33.24	15.33	15.05	結腸、直腸和肛門癌	33	20.00	7.32	12.64
4	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	34	20.60	10.89	5.86	胰臟癌	26	18.01	9.30	8.15	胰臟癌	24	14.54	5.35	9.20
5	胰臟癌	50	16.16	7.11	8.62	前列腺(攝護腺)癌	20	13.85	5.34	6.27	肝和肝內膽管癌	20	12.12	4.97	7.66
6	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	20	13.85	5.34	3.45	胃癌	15	10.39	5.01	4.70	卵巢癌	16	9.70	6.16	6.13
7	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	16	9.70	6.16	2.76	口腔癌	11	7.62	3.93	3.45	胃癌	14	8.48	3.18	5.36
8	胃癌	29	9.37	4.01	5.00	非何杰金氏淋巴瘤	11	7.62	3.09	3.45	白血病	12	7.27	4.13	4.60
9	白血病	20	6.46	3.78	3.45	白血病	8	5.54	3.25	2.51	子宮體癌	6	3.64	2.10	2.30
10	非何杰金氏淋巴瘤	14	4.52	1.94	2.41	食道癌	7	4.85	2.63	2.19	子宮頸及部位未明 示子宮癌	4	2.42	1.47	1.53
	其他	136	43.96	23.53	23.45	其他	66	45.71	21.49	20.69	其他	45	27.27	12.70	17.24
11	口腔癌	13	4.20	2.05	2.24	間皮和軟組織癌	6	4.16	2.74	1.88	間皮和軟組織癌	4	2.42	1.19	1.53
12	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	6	3.64	2.10	1.03	膀胱癌	6	4.16	1.84	1.88	腦癌	4	2.42	1.97	1.53
13	間皮和軟組織癌	10	3.23	1.88	1.72	膽囊和其他膽道癌	5	3.46	1.51	1.57	膀胱癌	4	2.42	0.88	1.53
14	膀胱癌	10	3.23	1.30	1.72	鼻咽癌	4	2.77	1.45	1.25	非何杰金氏淋巴瘤	3	1.82	1.01	1.15
15	食道癌	9	2.91	1.42	1.55	甲狀腺癌 <sup>(3)</sup>	3	2.08	1.30	0.94	膽囊和其他膽道癌	3	1.82	0.94	1.15

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：腎臟癌、腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.08人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.78、1.38人。

表32-4·ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	464	201.67	100.03	100.00	所有癌症死亡原因	233	217.83	112.42	100.00	所有癌症死亡原因	231	187.62	90.75	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	104	45.20	22.33	22.41	氣管、支氣管和肺癌	57	53.29	27.51	24.46	氣管、支氣管和肺癌	47	38.17	18.35	20.35
2	結腸、直腸和肛門癌	63	27.38	13.79	13.58	肝和肝內膽管癌	38	35.53	18.48	16.31	女性乳房癌	32	25.99	14.57	13.85
3	肝和肝內膽管癌	62	26.95	13.32	13.36	結腸、直腸和肛門癌	35	32.72	17.98	15.02	結腸、直腸和肛門癌	28	22.74	10.43	12.12
4	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	32	25.99	14.57	6.90	胃癌	13	12.15	6.21	5.58	肝和肝內膽管癌	24	19.49	9.22	10.39
5	胰臟癌	31	13.47	6.32	6.68	前列腺(攝護腺)癌	12	11.22	4.74	5.15	胰臟癌	19	15.43	6.84	8.23
6	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	12	11.22	4.74	2.59	胰臟癌	12	11.22	5.73	5.15	胃癌	10	8.12	4.28	4.33
7	胃癌	23	10.00	5.09	4.96	口腔癌	11	10.28	5.68	4.72	非何杰金氏淋巴瘤	9	7.31	2.96	3.90
8	非何杰金氏淋巴瘤	16	6.95	3.14	3.45	食道癌	9	8.41	4.90	3.86	膀胱癌	8	6.50	2.35	3.46
9	膀胱癌	14	6.08	2.48	3.02	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.54	3.31	3.00	子宮頸及部位未明 示子宮癌	6	4.87	2.24	2.60
10	口腔癌	12	5.22	2.70	2.59	膀胱癌	6	5.61	2.69	2.58	白血病	6	4.87	3.43	2.60
	其他	95	41.29	25.66	20.47	其他	33	30.85	15.19	14.16	其他	42	34.11	16.08	18.18
11	子宮頸及部位未明 示子宮癌 <sup>(1)</sup>	6	4.87	2.24	1.29	膽囊和其他膽道癌	4	3.74	1.29	1.72	卵巢癌	6	4.87	2.43	2.60
12	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	6	4.87	2.43	1.29	白血病	3	2.80	1.26	1.29	子宮體癌	5	4.06	2.02	2.16
13	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	5	4.06	2.02	1.08	腎臟癌	3	2.80	1.48	1.29	腦癌	5	4.06	1.69	2.16
14	白血病	9	3.91	2.36	1.94	主唾液腺癌	2	1.87	1.04	0.86	腎臟癌	3	2.44	0.81	1.30
15	食道癌	9	3.91	2.17	1.94	喉癌 <sup>(3)</sup>	2	1.87	0.95	0.86	膽囊和其他膽道癌	2	1.62	0.68	0.87

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：黑色素瘤和其他皮膚癌、腦癌、鼻咽癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.87人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.08人、1.06及1.13人。

表32-5 · ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	298	187.06	92.71	100.00	所有癌症死亡原因	173	227.49	117.24	100.00	所有癌症死亡原因	125	150.14	71.61	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	43	26.99	12.41	14.43	氣管、支氣管和肺癌	26	34.19	17.87	15.03	女性乳房癌	17	20.42	12.53	13.60
2	結腸、直腸和肛門癌	39	24.48	11.50	13.09	結腸、直腸和肛門癌	26	34.19	17.39	15.03	氣管、支氣管和肺癌	17	20.42	7.82	13.60
3	肝和肝內膽管癌	36	22.60	11.26	12.08	肝和肝內膽管癌	25	32.87	17.14	14.45	結腸、直腸和肛門癌	13	15.61	6.23	10.40
4	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	17	20.42	12.53	5.70	胃癌	13	17.09	8.75	7.51	肝和肝內膽管癌	11	13.21	6.39	8.80
5	胃癌	23	14.44	6.81	7.72	胰臟癌	12	15.78	8.39	6.94	胃癌	10	12.01	5.15	8.00
6	胰臟癌	21	13.18	6.68	7.05	口腔癌	11	14.46	8.26	6.36	胰臟癌	9	10.81	5.30	7.20
7	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	10	13.15	4.60	3.36	前列腺(攝護腺)癌	10	13.15	4.60	5.78	白血病	7	8.41	3.26	5.60
8	口腔癌	12	7.53	4.33	4.03	食道癌	8	10.52	6.08	4.62	子宮體癌	5	6.01	3.79	4.00
9	白血病	12	7.53	3.07	4.03	非何杰金氏淋巴瘤	7	9.20	4.17	4.05	卵巢癌	5	6.01	3.08	4.00
10	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	5	6.01	3.79	1.68	白血病	5	6.57	2.80	2.89	膽囊和其他膽道癌	5	6.01	2.40	4.00
	其他	80	50.22	25.01	26.85	其他	30	39.45	21.79	17.34	其他	26	31.23	15.65	20.80
11	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	5	6.01	3.08	1.68	鼻咽癌	4	5.26	4.06	2.31	子宮頸及部位未明 示子宮癌	3	3.60	1.05	2.40
12	食道癌	9	5.65	3.17	3.02	腦癌	3	3.94	2.43	1.73	腦癌	2	2.40	1.48	1.60
13	非何杰金氏淋巴瘤	9	5.65	2.35	3.02	腎臟癌	3	3.94	2.25	1.73	間皮和軟組織癌	2	2.40	1.04	1.60
14	子宮頸及部位未明 示子宮癌 <sup>(1)</sup>	3	3.60	1.05	1.01	喉癌	2	2.63	1.68	1.16	非何杰金氏淋巴瘤	2	2.40	0.76	1.60
15	腦癌 <sup>(3)</sup>	5	3.14	1.92	1.68	膀胱癌	2	2.63	1.42	1.16	口腔癌 <sup>(4)</sup>	1	1.20	0.91	0.80

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、3.14人，每十萬人口標準化死亡率為1.29人。

(4)女性：食道癌、腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.20人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.58、0.56人。

表32-6 · ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	303	235.89	121.22	100.00	所有癌症死亡原因	174	277.93	152.40	100.00	所有癌症死亡原因	129	195.91	94.11	100.00
1	肝和肝內膽管癌	54	42.04	21.38	17.82	肝和肝內膽管癌	29	46.32	25.01	16.67	肝和肝內膽管癌	25	37.97	18.10	19.38
2	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	22	33.41	18.57	7.26	氣管、支氣管和肺癌	26	41.53	20.82	14.94	女性乳房癌	22	33.41	18.57	17.05
3	氣管、支氣管和肺癌	38	29.58	13.90	12.54	結腸、直腸和肛門癌	17	27.15	14.57	9.77	結腸、直腸和肛門癌	17	25.82	10.74	13.18
4	結腸、直腸和肛門癌	34	26.47	12.70	11.22	前列腺(攝護腺)癌	14	22.36	10.75	8.05	氣管、支氣管和肺癌	12	18.22	8.27	9.30
5	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	14	22.36	10.75	4.62	口腔癌	12	19.17	11.19	6.90	非何杰金氏淋巴瘤	9	13.67	7.17	6.98
6	非何杰金氏淋巴瘤	19	14.79	8.56	6.27	非何杰金氏淋巴瘤	10	15.97	9.93	5.75	胃癌	7	10.63	4.51	5.43
7	胰臟癌	16	12.46	6.76	5.28	胰臟癌	10	15.97	9.56	5.75	胰臟癌	6	9.11	4.02	4.65
8	胃癌	14	10.90	6.04	4.62	食道癌	10	15.97	9.23	5.75	卵巢癌	5	7.59	4.20	3.88
9	口腔癌	12	9.34	5.30	3.96	胃癌	7	11.18	7.39	4.02	腦癌	4	6.07	3.61	3.10
10	白血病	11	8.56	4.14	3.63	白血病	7	11.18	5.63	4.02	白血病	4	6.07	2.90	3.10
	其他	69	53.72	24.79	22.77	其他	32	51.11	28.30	18.39	其他	18	27.34	12.01	13.95
11	食道癌	10	7.79	4.33	3.30	膀胱癌	4	6.39	3.21	2.30	腎臟癌	3	4.56	2.07	2.33
12	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	5	7.59	4.20	1.65	鼻咽癌	3	4.79	3.68	1.72	子宮體癌	2	3.04	1.39	1.55
13	腦癌	7	5.45	3.57	2.31	腦癌	3	4.79	3.48	1.72	子宮頸及部位未明 示子宮癌	2	3.04	0.96	1.55
14	腎臟癌	6	4.67	2.23	1.98	腎臟癌	3	4.79	2.47	1.72	間皮和軟組織癌	1	1.52	0.76	0.78
15	膀胱癌	5	3.89	1.72	1.65	小腸癌	2	3.19	1.67	1.15	甲狀腺癌 <sup>(3)</sup>	1	1.52	0.55	0.78

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.52人，每十萬人口標準化死亡率為0.55人。



表32-7 · ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因  
中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	468	245.38	114.65	100.00	所有癌症死亡原因	282	301.28	147.51	100.00	所有癌症死亡原因	186	191.51	85.75	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	95	49.81	22.30	20.30	氣管、支氣管和肺癌	58	61.96	29.52	20.57	氣管、支氣管和肺癌	37	38.10	16.35	19.89
2	肝和肝內膽管癌	70	36.70	17.25	14.96	肝和肝內膽管癌	52	55.55	27.99	18.44	女性乳房癌	26	26.77	12.42	13.98
3	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	26	26.77	12.42	5.56	結腸、直腸和肛門癌	23	24.57	12.08	8.16	結腸、直腸和肛門癌	24	24.71	10.39	12.90
4	結腸、直腸和肛門癌	47	24.64	11.33	10.04	食道癌	20	21.37	11.77	7.09	肝和肝內膽管癌	18	18.53	8.03	9.68
5	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	18	19.23	6.31	3.85	口腔癌	19	20.30	10.92	6.74	胰臟癌	10	10.30	4.31	5.38
6	胰臟癌	24	12.58	5.98	5.13	前列腺(攝護腺)癌	18	19.23	6.31	6.38	腎臟癌	9	9.27	4.70	4.84
7	胃癌	22	11.53	4.96	4.70	胃癌	16	17.09	7.83	5.67	白血病	9	9.27	4.06	4.84
8	食道癌	21	11.01	5.81	4.49	胰臟癌	14	14.96	7.85	4.96	子宮頸及部位未明 示子宮癌	7	7.21	3.97	3.76
9	口腔癌	20	10.49	5.49	4.27	其他癌症	10	10.68	4.75	3.55	卵巢癌	7	7.21	3.86	3.76
10	白血病	16	8.39	3.97	3.42	膀胱癌	10	10.68	3.71	3.55	胃癌	6	6.18	2.50	3.23
	其他	109	57.15	29.41	23.29	其他	42	44.87	24.78	14.89	其他	33	33.98	15.15	17.74
11	腎臟癌	14	7.34	3.54	2.99	白血病	7	7.48	3.88	2.48	間皮和軟組織癌	3	3.09	1.39	1.61
12	子宮頸及部位未明 示子宮癌 <sup>(1)</sup>	7	7.21	3.97	1.50	非何杰金氏淋巴瘤	7	7.48	3.86	2.48	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.09	1.30	1.61
13	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	7	7.21	3.86	1.50	鼻咽癌	6	6.41	3.68	2.13	腦癌	2	2.06	1.53	1.08
14	非何杰金氏淋巴瘤	10	5.24	2.55	2.14	腎臟癌	5	5.34	2.35	1.77	子宮體癌	2	2.06	1.05	1.08
15	膀胱癌	10	5.24	1.72	2.14	腦癌 <sup>(3)</sup>	4	4.27	2.33	1.42	鼻咽癌	2	2.06	0.85	1.08

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、4.27人，每十萬人口標準化死亡率為1.69人。

表32-8 · ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	452	164.91	90.69	100.00	所有癌症死亡原因	251	190.98	113.33	100.00	所有癌症死亡原因	201	140.89	73.80	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	93	33.93	18.29	20.58	氣管、支氣管和肺癌	57	43.37	24.39	22.71	氣管、支氣管和肺癌	36	25.23	13.52	17.91
2	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	34	23.83	13.55	7.52	結腸、直腸和肛門癌	31	23.59	12.04	12.35	女性乳房癌	34	23.83	13.55	16.92
3	結腸、直腸和肛門癌	60	21.89	10.96	13.27	肝和肝內膽管癌	27	20.54	12.52	10.76	結腸、直腸和肛門癌	29	20.33	10.29	14.43
4	肝和肝內膽管癌	50	18.24	9.54	11.06	胃癌	19	14.46	7.42	7.57	肝和肝內膽管癌	23	16.12	7.29	11.44
5	胃癌	34	12.40	6.13	7.52	食道癌	13	9.89	6.02	5.18	胃癌	15	10.51	5.17	7.46
6	胰臟癌	22	8.03	4.65	4.87	口腔癌	12	9.13	5.71	4.78	胰臟癌	11	7.71	4.16	5.47
7	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	8	6.09	3.50	1.77	胰臟癌	11	8.37	5.40	4.38	子宮頸及部位未明 示子宮癌	6	4.21	2.06	2.99
8	食道癌	15	5.47	3.15	3.32	腎臟癌	9	6.85	4.31	3.59	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.21	1.72	2.99
9	口腔癌	13	4.74	2.84	2.88	前列腺(攝護腺)癌	8	6.09	3.50	3.19	子宮體癌	5	3.50	2.10	2.49
10	非何杰金氏淋巴瘤	12	4.38	2.40	2.65	鼻咽癌	8	6.09	4.17	3.19	白血病	5	3.50	2.05	2.49
	其他	111	40.50	23.95	24.56	其他	56	42.61	27.84	22.31	其他	31	21.73	11.88	15.42
11	子宮頸及部位未明 示子宮癌 <sup>(1)</sup>	6	4.21	2.06	1.33	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.57	3.40	2.39	卵巢癌	5	3.50	1.98	2.49
12	腎臟癌	11	4.01	2.21	2.43	白血病	5	3.80	2.74	1.99	膀胱癌	5	3.50	1.43	2.49
13	白血病	10	3.65	2.47	2.21	腦癌	5	3.80	2.51	1.99	食道癌	2	1.40	0.65	1.00
14	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	5	3.50	2.10	1.11	間皮和軟組織癌	4	3.04	2.16	1.59	腎臟癌	2	1.40	0.57	1.00
15	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	5	3.50	1.98	1.11	膀胱癌	4	3.04	1.75	1.59	間皮和軟組織癌 <sup>(3)</sup>	2	1.40	1.29	1.00

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.40人，每十萬人口標準化死亡率為0.78人。

表32-9 · ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	280	229.67	132.46	100.00	所有癌症死亡原因	153	256.83	160.75	100.00	所有癌症死亡原因	127	203.72	109.19	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	63	51.68	29.13	22.50	氣管、支氣管和肺癌	38	63.79	39.02	24.84	氣管、支氣管和肺癌	25	40.10	21.06	19.69
2	結腸、直腸和肛門癌	36	29.53	16.93	12.86	肝和肝內膽管癌	20	33.57	22.31	13.07	結腸、直腸和肛門癌	17	27.27	14.08	13.39
3	肝和肝內膽管癌	34	27.89	16.51	12.14	結腸、直腸和肛門癌	19	31.89	20.39	12.42	女性乳房癌	14	22.46	13.54	11.02
4	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	14	22.46	13.54	5.00	口腔癌	11	18.47	11.96	7.19	肝和肝內膽管癌	14	22.46	11.16	11.02
5	胰臟癌	14	11.48	5.63	5.00	食道癌	9	15.11	11.12	5.88	子宮頸及部位未明 示子宮癌	7	11.23	6.90	5.51
6	子宮頸及部位未明 示子宮癌 <sup>(1)</sup>	7	11.23	6.90	2.50	胰臟癌	9	15.11	7.75	5.88	卵巢癌	6	9.62	6.84	4.72
7	口腔癌	13	10.66	6.75	4.64	前列腺(攝護腺)癌	5	8.39	4.26	3.27	胃癌	6	9.62	4.83	4.72
8	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	6	9.62	6.84	2.14	非何杰金氏淋巴瘤	4	6.71	4.16	2.61	子宮體癌	5	8.02	3.72	3.94
9	食道癌	11	9.02	6.12	3.93	腎臟癌	4	6.71	4.34	2.61	胰臟癌	5	8.02	3.75	3.94
10	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	5	8.39	4.26	1.79	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	3	5.04	3.05	1.96	非何杰金氏淋巴瘤	4	6.42	2.92	3.15
	其他	77	63.16	27.92	27.50	其他	31	52.04	32.38	20.26	其他	24	38.50	20.38	18.90
11	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	5	8.02	3.72	1.79	白血病	3	5.04	3.34	1.96	腦癌	3	4.81	2.80	2.36
12	非何杰金氏淋巴瘤	8	6.56	3.48	2.86	膀胱癌	3	5.04	2.40	1.96	口腔癌	2	3.21	2.19	1.57
13	胃癌	8	6.56	3.47	2.86	鼻咽癌	3	5.04	3.75	1.96	白血病	2	3.21	1.79	1.57
14	白血病	5	4.10	2.38	1.79	胃癌	2	3.36	1.77	1.31	食道癌	2	3.21	1.69	1.57
15	腎臟癌 <sup>(3)</sup>	5	4.10	2.40	1.79	間皮和軟組織癌 <sup>(4)</sup>	2	3.36	3.40	1.31	膽囊和其他膽道癌 <sup>(5)</sup>	2	3.21	1.37	1.57

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.10人，每十萬人口標準化死亡率為1.81人。

(4)男性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.36人，每十萬人口標準化死亡率為2.29人。

(5)女性：膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、3.21人，每十萬人口標準化死亡率為1.33人。

表32-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	416	144.65	94.29	100.00	所有癌症死亡原因	237	172.54	118.78	100.00	所有癌症死亡原因	179	119.15	74.08	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	87	30.25	19.45	20.91	氣管、支氣管和肺癌	59	42.95	29.17	24.89	女性乳房癌	34	22.63	14.34	18.99
2	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	34	22.63	14.34	8.17	肝和肝內膽管癌	31	22.57	14.39	13.08	氣管、支氣管和肺癌	28	18.64	11.85	15.64
3	肝和肝內膽管癌	53	18.43	11.98	12.74	結腸、直腸和肛門癌	27	19.66	12.24	11.39	肝和肝內膽管癌	22	14.64	9.44	12.29
4	結腸、直腸和肛門癌	43	14.95	8.92	10.34	口腔癌	19	13.83	9.88	8.02	結腸、直腸和肛門癌	16	10.65	6.04	8.94
5	胰臟癌	28	9.74	6.04	6.73	胰臟癌	16	11.65	7.24	6.75	胰臟癌	12	7.99	4.82	6.70
6	口腔癌	19	6.61	4.41	4.57	胃癌	11	8.01	5.91	4.64	子宮頸及部位未明 示子宮癌	9	5.99	3.57	5.03
7	非何杰金氏淋巴瘤	18	6.26	4.04	4.33	非何杰金氏淋巴瘤	10	7.28	5.03	4.22	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.32	3.21	4.47
8	子宮頸及部位未明 示子宮癌 <sup>(1)</sup>	9	5.99	3.57	2.16	食道癌	9	6.55	4.39	3.80	腦癌	6	3.99	2.46	3.35
9	胃癌	17	5.91	3.81	4.09	白血病	7	5.10	4.90	2.95	胃癌	6	3.99	2.46	3.35
10	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	6	4.37	2.98	1.44	前列腺(攝護腺)癌	6	4.37	2.98	2.53	子宮體癌	5	3.33	1.87	2.79
	其他	102	35.47	30.19	24.52	其他	42	30.58	22.65	17.72	其他	33	21.97	14.02	18.44
11	白血病	11	3.82	3.55	2.64	膀胱癌	5	3.64	3.17	2.11	白血病	4	2.66	2.22	2.23
12	腦癌	11	3.82	2.53	2.64	腦癌	5	3.64	2.55	2.11	卵巢癌	4	2.66	1.80	2.23
13	食道癌	10	3.48	2.20	2.40	間皮和軟組織癌	3	2.18	1.82	1.27	胸腺癌	2	1.33	1.19	1.12
14	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	5	3.33	1.87	1.20	鼻咽癌	3	2.18	1.74	1.27	鼻咽癌	2	1.33	0.66	1.12
15	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	4	2.66	1.80	0.96	腎臟癌 <sup>(3)</sup>	2	1.46	1.24	0.84	膽囊和其他膽道癌 <sup>(4)</sup>	1	0.67	0.57	0.56

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：膽囊和其他膽道癌、胸腺癌、喉癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.46人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.10、1.10、1.09人。

(4)女性：黑色素瘤和其他皮膚癌、喉癌、食道癌、間皮和軟組織癌、小腸癌、腎臟癌、膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、0.67人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.53人、0.48人、0.44、0.39、0.37、0.37、0.28人。

表32-11 · ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	578	201.10	100.78	100.00	所有癌症死亡原因	322	232.36	120.42	100.00	所有癌症死亡原因	256	172.00	85.34	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	112	38.97	18.42	19.38	氣管、支氣管和肺癌	68	49.07	24.43	21.12	氣管、支氣管和肺癌	44	29.56	13.69	17.19
2	結腸、直腸和肛門癌	98	34.10	16.99	16.96	結腸、直腸和肛門癌	55	39.69	20.90	17.08	結腸、直腸和肛門癌	43	28.89	13.86	16.80
3	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	39	26.20	14.19	6.75	肝和肝內膽管癌	43	31.03	16.63	13.35	女性乳房癌	39	26.20	14.19	15.23
4	肝和肝內膽管癌	74	25.75	12.61	12.80	胰臟癌	20	14.43	8.34	6.21	肝和肝內膽管癌	31	20.83	9.13	12.11
5	胰臟癌	44	15.31	7.98	7.61	口腔癌	18	12.99	7.10	5.59	胰臟癌	24	16.12	7.66	9.38
6	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	18	12.99	5.51	3.11	前列腺(攝護腺)癌	18	12.99	5.51	5.59	胃癌	11	7.39	3.51	4.30
7	胃癌	26	9.05	4.14	4.50	胃癌	15	10.82	4.92	4.66	卵巢癌	7	4.70	3.20	2.73
8	口腔癌	20	6.96	3.57	3.46	食道癌	14	10.10	5.76	4.35	子宮頸及部位未明 示子宮癌	6	4.03	2.94	2.34
9	食道癌	15	5.22	2.83	2.60	非何杰金氏淋巴瘤	11	7.94	4.01	3.42	子宮體癌	5	3.36	1.46	1.95
10	膀胱癌	14	4.87	2.06	2.42	膀胱癌	10	7.22	3.12	3.11	白血病	4	2.69	1.77	1.56
	其他	118	41.05	25.90	20.42	其他	50	36.08	19.69	15.53	其他	42	28.22	13.95	16.41
11	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	7	4.70	3.20	1.21	白血病	5	3.61	2.26	1.55	間皮和軟組織癌	4	2.69	1.52	1.56
12	非何杰金氏淋巴瘤	13	4.52	2.01	2.25	鼻咽癌	4	2.89	1.75	1.24	膀胱癌	4	2.69	1.19	1.56
13	子宮頸及部位未明 示子宮癌 <sup>(1)</sup>	6	4.03	2.94	1.04	腎臟癌	3	2.16	0.97	0.93	甲狀腺癌	4	2.69	1.19	1.56
14	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	5	3.36	1.46	0.87	膽囊和其他膽道癌	3	2.16	0.97	0.93	腎臟癌	4	2.69	0.82	1.56
15	白血病	9	3.13	1.97	1.56	骨和關節軟骨癌 <sup>(3)</sup>	2	1.44	1.17	0.62	腦癌 <sup>(4)</sup>	3	2.02	2.14	1.17

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：間皮和軟組織癌、甲狀腺癌、黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.44人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.60人、0.60人、0.48人。

(4)女性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.02人，每十萬人口標準化死亡率為1.16人。

表32-12 · ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因

中華民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	527	205.86	112.17	100.00	所有癌症死亡原因	310	251.56	146.16	100.00	所有癌症死亡原因	217	163.45	85.76	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	115	44.92	23.76	21.82	氣管、支氣管和肺癌	67	54.37	30.56	21.61	氣管、支氣管和肺癌	48	36.15	18.25	22.12
2	結腸、直腸和肛門癌	77	30.08	16.23	14.61	結腸、直腸和肛門癌	47	38.14	21.98	15.16	結腸、直腸和肛門癌	30	22.60	11.85	13.82
3	肝和肝內膽管癌	64	25.00	12.66	12.14	肝和肝內膽管癌	45	36.52	20.73	14.52	女性乳房癌	19	14.31	8.22	8.76
4	胃癌	37	14.45	7.63	7.02	口腔癌	21	17.04	10.64	6.77	肝和肝內膽管癌	19	14.31	5.96	8.76
5	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	19	14.31	8.22	3.61	胃癌	19	15.42	8.78	6.13	胃癌	18	13.56	6.78	8.29
6	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	14	11.36	6.02	2.66	前列腺(攝護腺)癌	14	11.36	6.02	4.52	卵巢癌	9	6.78	3.75	4.15
7	口腔癌	23	8.98	5.15	4.36	食道癌	12	9.74	6.23	3.87	膽囊和其他膽道癌	7	5.27	2.81	3.23
8	胰臟癌	18	7.03	3.93	3.42	胰臟癌	11	8.93	5.74	3.55	胰臟癌	7	5.27	2.36	3.23
9	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	9	6.78	3.75	1.71	腦癌	7	5.68	4.23	2.26	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.27	2.00	3.23
10	食道癌	12	4.69	2.86	2.28	黑色素瘤和其他皮膚癌	5	4.06	2.80	1.61	子宮頸及部位未明 示子宮癌	6	4.52	2.83	2.76
	其他	139	54.30	26.33	26.38	其他	62	50.31	28.45	20.00	其他	47	35.40	20.94	21.66
11	非何杰金氏淋巴瘤	12	4.69	2.09	2.28	腎臟癌	5	4.06	2.66	1.61	間皮和軟組織癌	5	3.77	1.67	2.30
12	子宮頸及部位未明 示子宮癌 <sup>(1)</sup>	6	4.52	2.83	1.14	白血病	5	4.06	2.37	1.61	膀胱癌	5	3.77	1.49	2.30
13	腦癌	10	3.91	3.37	1.90	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.06	2.27	1.61	子宮體癌	4	3.01	1.55	1.84
14	膽囊和其他膽道癌	10	3.91	2.12	1.90	膀胱癌	5	4.06	1.98	1.61	腎臟癌	4	3.01	1.18	1.84
15	膀胱癌	10	3.91	1.71	1.90	喉癌 <sup>(3)</sup>	3	2.43	1.38	0.97	腦癌	3	2.26	2.81	1.38

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：膽囊和其他膽道癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.43人，每十萬人口標準化死亡率為1.24人。

## 肆、歷年死因統計

### 一、主要死因統計





表33·臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		11,551	437.00	473.41		13,733	523.20	392.14		14,339	547.41	392.62		13,875	528.71	364.83		14,486	550.64	363.48
08-14	惡性腫瘤	1	3,180	120.31	126.30	1	4,202	160.09	122.12	1	4,290	163.78	120.21	1	4,423	168.54	118.90	1	4,566	173.56	118.18
25-27-28*	心臟疾病	3	1,257	47.56	52.39	2	1,732	65.99	46.85	2	1,665	63.56	42.87	2	1,527	58.19	38.38	2	1,642	62.42	39.41
29	腦血管疾病	2	1,306	49.41	53.45	3	1,240	47.24	33.77	3	1,367	52.19	35.74	3	1,182	45.04	29.23	3	1,289	49.00	30.31
181	糖尿病	5	620	23.46	25.12	4	893	34.02	24.96	4	988	37.72	26.19	4	946	36.05	23.79	4	958	36.42	23.27
321	肺炎	7	372	14.07	16.31	7	447	17.03	11.49	5	572	21.84	13.82	5	575	21.91	13.32	5	688	26.15	14.96
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	358	13.54	14.96	5	503	19.16	13.77	6	544	20.77	13.94	6	485	18.48	12.19	6	549	20.87	12.78
E47-E53	事故傷害	4	752	28.45	28.41	6	463	17.64	15.78	8	415	15.84	14.03	8	379	14.44	12.68	7	372	14.14	11.97
E54	自殺	10	206	7.79	7.56	8	346	13.18	10.93	7	467	17.83	14.79	7	454	17.30	14.12	8	364	13.84	11.27
347	慢性肝病及肝硬化	6	380	14.38	14.81	9	333	12.69	9.96	9	323	12.33	9.20	9	317	12.08	8.86	9	331	12.58	8.92
038	敗血症	13	96	3.63	4.04	12	94	3.58	2.52	11	150	5.73	3.78	11	145	5.53	3.48	10	188	7.15	4.07
26	高血壓性疾病	9	292	11.05	12.14	10	167	6.36	4.43	10	162	6.18	4.14	10	176	6.71	4.30	11	141	5.36	3.17
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	190	7.19	7.76	11	113	4.31	2.92	12	109	4.16	2.79	12	92	3.51	2.26	12	97	3.69	2.23
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	76	2.88	3.05	14	70	2.67	1.89	13	77	2.94	2.06	13	79	3.01	1.89	13	80	3.04	1.87
02	結核病	15	80	3.03	3.20	13	74	2.82	2.01	14	60	2.29	1.62	14	68	2.59	1.63	14	57	2.17	1.32
44	先天性畸形	12	99	3.75	5.51	15	48	1.83	3.32	16	39	1.49	2.66	15	42	1.60	2.92	15	48	1.82	3.51
	其他		2,287	86.52	98.40		3,008	114.60	85.42		3,111	118.77	84.77		2,985	113.74	76.88		3,116	118.45	76.24

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表33·臺北市歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		15,119	575.72	366.18		15,047	575.83	338.78		15,834	600.94	343.47		16,397	615.94	344.34		16,100	600.78	326.27
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10	112.87	1	4,632	177.26	110.14	1	4,732	179.59	109.78	1	4,981	187.11	111.52	1	4,919	183.55	106.98
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2,014	76.69	46.14	2	1,723	65.94	36.69	2	1,905	72.30	38.51	2	2,028	76.18	40.21	2	2,075	77.43	39.81
J12-J18	肺炎	4	950	36.18	20.14	4	899	34.40	16.89	4	942	35.75	16.96	4	905	34.00	15.54	4	883	32.95	14.46
I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66	27.26	3	1,047	40.07	21.91	3	1,137	43.15	23.13	3	1,186	44.55	22.94	3	1,210	45.15	22.34
E10-E14	糖尿病	5	716	27.26	16.89	5	769	29.43	16.78	5	775	29.41	16.39	5	817	30.69	16.63	5	860	32.09	16.84
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	491	18.70	11.20	6	474	18.14	10.07	8	448	17.00	8.89	9	531	19.95	10.62	8	488	18.21	9.13
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98	9.27	7	465	17.79	8.87	6	582	22.09	10.48	6	591	22.20	10.31	6	573	21.38	9.73
A40-A41	敗血症	6	513	19.53	11.27	8	449	17.18	9.25	7	566	21.48	10.81	7	559	21.00	10.47	9	466	17.39	8.18
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	389	14.81	11.94	11	359	13.74	10.71	10	402	15.26	10.92	10	430	16.15	11.31	10	406	15.15	10.47
I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24	8.21	9	422	16.15	8.49	9	446	16.93	8.47	8	536	20.13	9.74	7	493	18.40	8.66
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	370	14.09	11.40	12	329	12.59	9.67	12	306	11.61	8.98	11	333	12.51	9.82	12	261	9.74	7.40
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	17	69	2.63	1.29	15	116	4.44	2.00	14	136	5.16	2.18	15	129	4.85	1.94	15	142	5.30	2.11
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27	7.69	13	318	12.17	7.90	11	315	11.96	7.65	12	286	10.74	6.77	11	310	11.57	6.99
G20-G21	帕金森病	15	93	3.54	1.88	16	111	4.25	2.10	16	121	4.59	2.33	14	158	5.94	2.92	14	155	5.78	2.71
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	281	10.70	5.87	10	380	14.54	6.79	13	217	8.24	4.45	13	167	6.27	3.41	13	191	7.13	3.62
	其他		2,451	93.33	62.86		2,554	97.74	60.52		2,804	106.42	63.54		2,760	103.68	60.21		2,668	99.56	56.83

表33·臺北市歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		16,953	629.19	332.49		17,160	634.72	325.57		18,039	668.05	332.75		17,634	655.67	316.47		18,050	674.54	317.59
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,903	181.97	103.66	1	5,025	185.87	102.84	1	5,219	193.28	105.00	1	5,062	188.21	98.69	1	5,238	195.75	100.48
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,489	92.38	46.23	2	2,381	88.07	42.60	2	2,631	97.44	45.78	2	2,750	102.25	45.83	2	3,000	112.11	47.98
J12-J18	肺炎	4	1,060	39.34	17.10	4	1,125	41.61	17.37	3	1,274	47.18	19.36	3	1,423	52.91	20.75	3	1,619	60.50	22.32
I60-I69	腦血管疾病	3	1,212	44.98	22.40	3	1,153	42.65	20.08	4	1,206	44.66	20.76	4	1,197	44.51	20.28	4	1,152	43.05	18.57
E10-E14	糖尿病	5	854	31.70	16.16	5	773	28.59	13.87	5	829	30.70	14.50	5	728	27.07	12.43	5	692	25.86	11.34
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	556	20.64	9.89	7	565	20.90	9.68	7	611	22.63	10.24	6	592	22.01	9.55	6	621	23.21	9.73
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	657	24.38	10.28	6	636	23.52	9.54	6	626	23.18	9.64	7	590	21.94	8.54	7	514	19.21	7.38
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	458	17.00	11.23	10	435	16.09	11.05	9	457	16.92	11.14	9	443	16.47	11.09	8	455	17.00	10.85
A40-A41	敗血症	10	445	16.52	7.62	9	462	17.09	7.49	8	529	19.59	8.15	8	463	17.22	7.20	9	449	16.78	7.00
I10-I15	高血壓性疾病	8	461	17.11	7.55	8	463	17.13	7.65	10	386	14.29	6.37	10	369	13.72	5.80	10	386	14.42	5.97
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	311	11.54	9.06	11	318	11.76	8.72	13	308	11.41	8.38	11	317	11.79	8.89	11	349	13.04	9.84
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	284	10.54	6.29	14	278	10.28	5.96	14	279	10.33	5.97	13	269	10.00	5.58	12	238	8.89	4.97
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	14	198	7.35	2.78	12	299	11.06	3.97	11	344	12.74	4.40	12	310	11.53	3.88	13	169	6.32	2.10
G20-G21	帕金森病	15	135	5.01	2.23	15	180	6.66	2.95	15	206	7.63	3.29	15	189	7.03	2.87	14	147	5.49	2.15
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	16	124	4.60	2.30	16	174	6.44	3.24	16	161	5.96	2.81	16	165	6.14	2.77	15	146	5.46	2.59
	其他		2,806	104.14	57.72		2,893	107.01	58.57		2,973	110.10	56.98		2,767	102.88	52.31		2,875	107.44	54.32

表34·臺北市歷年男性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		7,172	541.89	552.47		8,352	647.93	474.26		8,763	683.06	480.28		8,387	654.67	445.74		8,633	674.39	445.81
08-14	惡性腫瘤	1	1,977	149.38	148.48	1	2,594	201.24	149.63	1	2,630	205.00	148.15	1	2,695	210.37	146.09	1	2,757	215.37	146.53
25-27-28*	心臟疾病	3	791	59.77	61.02	2	1,107	85.88	59.64	2	1,060	82.62	54.25	2	971	75.79	49.62	2	1,026	80.15	51.54
29	腦血管疾病	2	800	60.45	60.80	3	725	56.24	39.19	3	822	64.07	43.39	3	680	53.08	34.17	3	768	59.99	37.36
181	糖尿病	5	328	24.78	25.13	4	440	34.13	24.46	4	521	40.61	27.75	4	473	36.92	24.11	4	495	38.67	25.11
321	肺炎	7	245	18.51	20.24	6	300	23.27	14.96	5	370	28.84	17.20	5	373	29.12	17.22	5	446	34.84	19.16
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	185	13.98	14.57	7	278	21.57	14.97	6	324	25.26	16.55	8	261	20.37	13.06	6	272	21.25	12.61
E47-E53	事故傷害	4	535	40.42	39.71	5	342	26.53	23.74	8	312	24.32	21.46	7	281	21.93	19.32	7	265	20.70	17.90
E54	自殺	11	123	9.29	8.97	8	225	17.46	14.81	7	313	24.40	20.52	6	309	24.12	20.00	8	228	17.81	14.72
347	慢性肝病及肝硬化	6	273	20.63	20.35	9	222	17.22	13.87	9	192	14.97	11.51	9	210	16.39	12.38	9	222	17.34	12.80
038	敗血症	14	50	3.78	3.89	13	54	4.19	2.83	11	73	5.69	3.62	11	73	5.70	3.34	10	82	6.41	3.70
26	高血壓性疾病	9	167	12.62	12.56	10	82	6.36	4.29	10	106	8.26	5.49	10	94	7.34	4.78	11	69	5.39	3.04
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	131	9.90	10.03	11	73	5.66	3.64	12	71	5.53	3.57	12	58	4.53	2.83	12	61	4.77	2.83
02	胃及十二指腸之潰瘍	13	58	4.38	4.31	14	43	3.34	2.25	13	52	4.05	2.78	14	43	3.36	2.06	13	48	3.75	2.30
02	結核病	12	71	5.36	5.31	12	59	4.58	3.14	14	50	3.90	2.70	13	53	4.14	2.46	14	40	3.12	1.84
44	先天性畸形	16	48	3.63	5.11	16	25	1.94	3.25	17	17	1.33	2.20	16	16	1.25	2.40	15	23	1.80	3.55
	其他		1,390	105.02	111.99		1,783	138.32	99.59		1,850	144.20	99.15		1,797	140.27	91.90		1,831	143.03	90.82

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表34·臺北市歷年男性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		8,992	705.67	449.24		8,882	704.08	421.30		9,359	737.25	426.54		9,628	751.69	429.77		9,436	732.81	409.56
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,698	211.73	140.18	1	2,771	219.66	137.29	1	2,749	216.55	132.95	1	2,937	229.30	138.02	1	2,854	221.64	130.87
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1,278	100.29	60.74	2	1,039	82.36	47.58	2	1,155	90.98	50.79	2	1,246	97.28	54.52	2	1,252	97.23	53.17
J12-J18	肺炎	4	619	48.58	26.32	4	548	43.44	21.00	4	605	47.66	22.21	4	563	43.96	20.08	4	575	44.65	19.94
I60-I69	腦血管疾病	3	677	53.13	32.56	3	602	47.72	26.99	3	697	54.91	29.93	3	679	53.01	28.56	3	699	54.28	28.22
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	337	26.45	13.76	6	335	26.56	12.91	5	445	35.05	16.00	5	430	33.57	15.24	5	431	33.47	15.30
E10-E14	糖尿病	5	352	27.62	17.36	5	384	30.44	17.70	6	393	30.96	18.33	6	414	32.32	18.20	6	428	33.24	18.44
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	269	21.11	17.19	7	258	20.45	16.18	8	267	21.03	15.84	8	285	22.25	16.23	8	271	21.05	15.04
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	240	18.83	11.24	8	234	18.55	10.57	9	236	18.59	9.68	10	255	19.91	11.13	10	242	18.79	9.69
A40-A41	敗血症	8	263	20.64	11.78	10	230	18.23	9.72	7	337	26.55	13.53	7	308	24.05	11.78	7	274	21.28	10.03
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	231	18.13	15.00	11	212	16.81	13.01	12	188	14.81	11.63	11	207	16.16	12.59	12	166	12.89	9.96
I10-I15	高血壓性疾病	11	204	16.01	9.43	9	231	18.31	9.74	10	230	18.12	9.32	9	274	21.39	10.76	9	255	19.80	9.82
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	197	15.46	10.94	12	198	15.70	10.91	11	211	16.62	11.40	12	187	14.60	9.70	11	198	15.38	10.12
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	19	31	2.43	1.15	17	55	4.36	1.97	16	63	4.96	2.10	16	64	5.00	2.00	17	63	4.89	1.88
G20-G21	帕金森病	15	56	4.39	2.24	16	64	5.07	2.28	15	70	5.51	2.83	13	96	7.50	3.72	13	94	7.30	3.49
D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	14	101	7.93	4.79	14	75	5.95	3.48	14	75	5.91	3.26	17	60	4.68	2.45	15	80	6.21	3.31
	其他		1,439	112.93	74.56		1,646	130.48	79.96		1,638	129.03	76.75		1,623	126.71	74.79		1,554	120.68	70.27

表34·臺北市歷年男性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		9,908	766.40	422.76		9,932	766.62	414.33		10,369	802.25	424.60		9,974	775.76	399.58		10,160	795.21	403.72
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,824	218.44	127.74	1	2,855	220.37	127.13	1	2,920	225.92	127.78	1	2,774	215.76	117.67	1	2,926	229.01	123.42
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,480	114.48	61.76	2	1,415	109.22	56.98	2	1,580	122.25	63.29	2	1,619	125.92	62.84	2	1,715	134.23	63.69
J12-J18	肺炎	4	638	49.35	22.19	3	685	52.87	22.79	3	780	60.35	26.06	3	868	67.51	28.54	3	924	72.32	29.18
I60-I69	腦血管疾病	3	722	55.85	29.48	4	667	51.48	26.11	4	692	53.54	27.20	4	695	54.06	26.70	4	667	52.21	24.20
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	476	36.82	15.91	5	470	36.28	15.00	5	456	35.28	15.27	5	432	33.60	13.73	5	397	31.07	12.71
E10-E14	糖尿病	6	433	33.49	18.27	6	413	31.88	16.92	6	398	30.79	15.92	6	341	26.52	13.49	6	341	26.69	13.21
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	284	21.97	10.97	9	282	21.77	10.57	7	334	25.84	12.57	8	289	22.48	10.61	8	294	23.01	10.52
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	318	24.60	16.98	7	303	23.39	16.86	8	304	23.52	16.38	7	303	23.57	16.53	7	294	23.01	15.59
A40-A41	敗血症	9	269	20.81	10.00	8	285	22.00	10.05	9	290	22.44	9.62	9	278	21.62	9.65	9	252	19.72	8.96
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	181	14.00	10.85	11	205	15.82	11.73	11	197	15.24	11.07	10	193	15.01	11.45	10	219	17.14	12.86
I10-I15	高血壓性疾病	10	241	18.64	8.72	10	237	18.29	9.34	10	208	16.09	8.07	11	190	14.78	6.95	11	185	14.48	6.65
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	188	14.54	9.34	12	173	13.35	8.46	12	190	14.70	9.09	12	169	13.14	8.18	12	158	12.37	7.66
G20-G21	帕金森病	14	91	7.04	3.16	14	116	8.95	4.19	15	130	10.06	4.51	14	106	8.24	3.54	13	88	6.89	2.93
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	16	74	5.72	2.83	16	88	6.79	3.42	16	91	7.04	3.37	15	89	6.92	3.19	14	78	6.10	3.17
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	15	84	6.50	2.52	13	128	9.88	3.60	13	148	11.45	4.06	13	141	10.97	3.91	15	67	5.24	1.93
	其他		1,605	124.15	72.03		1,610	124.27	71.19		1,651	127.74	70.34		1,487	115.66	62.59		1,555	121.71	67.04

表35·臺北市歷年女性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		4,379	331.81	385.49		5,381	402.84	312.67		5,576	417.20	309.11		5,488	408.57	288.49		5,853	433.35	288.22
08-14	惡性腫瘤	1	1,203	91.16	101.11	1	1,608	120.38	94.63	1	1,660	124.20	93.11	1	1,728	128.65	92.46	1	1,809	133.94	91.74
25-27-28	心臟疾病	3	466	35.31	42.12	2	625	46.79	34.35	2	605	45.27	31.66	2	556	41.39	27.76	2	616	45.61	28.56
29	腦血管疾病	2	506	38.34	45.36	3	515	38.55	28.72	3	545	40.78	28.68	3	502	37.37	24.78	3	521	38.57	24.01
181	糖尿病	4	292	22.13	25.80	4	453	33.91	26.02	4	467	34.94	25.11	4	473	35.21	23.87	4	463	34.28	22.06
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	173	13.11	15.50	5	225	16.84	12.63	5	220	16.46	11.53	5	224	16.68	11.39	5	277	20.51	13.06
321	肺炎	7	127	9.62	11.80	6	147	11.00	7.84	6	202	15.11	10.25	6	202	15.04	9.47	6	242	17.92	10.74
E54	自殺	10	83	6.29	6.04	7	121	9.06	7.40	7	154	11.52	9.63	7	145	10.80	8.87	7	136	10.07	8.15
347	慢性肝病及肝硬化	9	107	8.11	9.33	9	111	8.31	6.60	8	131	9.80	7.32	8	107	7.97	5.79	8	109	8.07	5.54
E47-E53	事故傷害	5	217	16.44	17.14	7	121	9.06	8.26	9	103	7.71	7.05	9	98	7.30	6.30	9	107	7.92	6.42
038	敗血症	13	46	3.49	4.19	11	40	2.99	2.15	10	77	5.76	4.00	11	72	5.36	3.59	10	106	7.85	4.59
26	高血壓性疾病	8	125	9.47	11.43	10	85	6.36	4.65	11	56	4.19	2.87	10	82	6.10	3.95	11	72	5.33	3.29
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	59	4.47	5.14	11	40	2.99	2.20	12	38	2.84	1.97	13	34	2.53	1.69	12	36	2.67	1.66
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	18	1.36	1.60	13	27	2.02	1.51	13	25	1.87	1.36	12	36	2.68	1.74	13	32	2.37	1.45
44	先天性畸形	12	51	3.86	5.94	14	23	1.72	3.40	14	22	1.65	3.15	14	26	1.94	3.45	14	25	1.85	3.44
200	貧血	17	10	0.76	0.82	16	17	1.27	0.99	16	13	0.97	0.76	15	21	1.56	1.06	15	20	1.48	0.96
	其他		896	67.89	82.17		1,223	91.56	71.32		1,258	94.13	70.66		1,182	88.00	62.32		1,282	94.92	62.55

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表35·臺北市歷年女性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		6,127	453.23	291.00		6,165	456.13	265.58		6,475	474.21	270.05		6,769	490.07	269.77		6,664	478.66	253.90
C00-C97	惡性腫瘤	1	1,769	130.86	87.54	1	1,861	137.69	85.62	1	1,983	145.23	89.19	1	2,044	147.98	88.40	1	2,065	148.32	86.24
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	736	54.44	32.75	2	684	50.61	27.23	2	750	54.93	27.89	2	782	56.62	28.04	2	823	59.11	28.39
J12-J18	肺炎	5	331	24.49	14.14	5	351	25.97	12.95	5	337	24.68	12.06	5	342	24.76	11.42	5	308	22.12	9.54
I60-I69	腦血管疾病	3	522	38.61	22.90	3	445	32.92	17.61	3	440	32.22	17.12	3	507	36.71	18.18	3	511	36.70	17.36
E10-E14	糖尿病	4	364	26.93	16.79	4	385	28.48	16.12	4	382	27.98	14.97	4	403	29.18	15.39	4	432	31.03	15.60
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	251	18.57	11.35	6	240	17.76	9.80	8	212	15.53	8.19	6	276	19.98	10.28	6	246	17.67	8.67
A40-A41	敗血症	7	250	18.49	10.99	7	219	16.20	8.98	6	229	16.77	8.39	8	251	18.17	9.22	8	192	13.79	6.53
I10-I15	高血壓性疾病	8	170	12.58	7.27	9	191	14.13	7.43	7	216	15.82	7.81	7	262	18.97	8.90	7	238	17.10	7.74
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	15	38	2.81	1.48	14	61	4.51	2.11	14	73	5.35	2.32	14	65	4.71	1.91	14	79	5.67	2.33
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	109	8.06	4.57	10	130	9.62	4.94	9	137	10.03	5.06	9	161	11.66	5.67	9	142	10.20	4.64
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	120	8.88	6.98	13	101	7.47	5.74	10	135	9.89	6.49	10	145	10.50	6.82	10	135	9.70	6.34
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	139	10.28	8.19	12	117	8.66	6.70	12	118	8.64	6.65	11	126	9.12	7.31	13	95	6.82	5.17
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	149	11.02	6.25	8	210	15.54	7.61	10	135	9.89	5.54	13	94	6.81	3.86	12	103	7.40	3.88
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	99	7.32	4.87	11	120	8.88	5.36	13	104	7.62	4.44	12	99	7.17	4.18	11	112	8.04	4.28
G20-G21	帕金森病	17	37	2.74	1.52	15	47	3.48	1.90	16	51	3.74	1.90	15	62	4.49	2.23	15	61	4.38	2.03
	其他		1,043	77.15	53.41		1,003	74.21	45.47		1,173	85.91	52.02		1,150	83.26	47.95		1,122	80.59	45.16



表35·臺北市歷年女性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		7,045	502.63	254.34		7,228	513.35	250.23		7,670	544.83	255.48		7,660	545.67	247.47		7,890	564.27	246.23
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,079	148.33	83.12	1	2,170	154.12	82.57	1	2,299	163.31	85.94	1	2,288	162.99	83.14	1	2,312	165.35	81.96
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,009	71.99	33.14	2	966	68.61	30.53	2	1,051	74.66	31.13	2	1,131	80.57	31.74	2	1,285	91.90	34.91
J12-J18	肺炎	4	422	30.11	12.67	4	440	31.25	12.64	4	494	35.09	13.78	3	555	39.54	14.43	3	695	49.70	16.80
I60-I69	腦血管疾病	3	490	34.96	16.33	3	486	34.52	15.13	3	514	36.51	15.42	4	502	35.76	15.09	4	485	34.69	13.97
E10-E14	糖尿病	5	421	30.04	14.40	5	360	25.57	11.32	5	431	30.62	13.33	5	387	27.57	11.57	5	351	25.10	9.76
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	272	19.41	9.01	6	283	20.10	8.92	6	277	19.68	8.33	6	303	21.58	8.69	6	327	23.39	9.09
I10-I15	高血壓性疾病	7	220	15.70	6.59	7	226	16.05	6.33	10	178	12.64	4.98	8	179	12.75	4.82	7	201	14.37	5.41
A40-A41	敗血症	9	176	12.56	5.61	9	177	12.57	5.31	7	239	16.98	6.93	7	185	13.18	5.22	8	197	14.09	5.42
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	140	9.99	6.00	12	132	9.37	5.72	12	153	10.87	6.37	11	140	9.97	6.29	9	161	11.51	6.71
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	130	9.27	7.58	13	113	8.03	6.07	13	111	7.88	6.09	12	124	8.83	6.59	10	130	9.30	7.21
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	181	12.91	5.21	11	166	11.79	4.75	11	170	12.08	4.96	10	158	11.26	4.25	11	117	8.37	3.06
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	13	114	8.13	3.08	10	171	12.14	4.37	8	196	13.92	4.73	9	169	12.04	3.89	12	102	7.29	2.26
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	96	6.85	3.62	14	105	7.46	3.83	14	89	6.32	3.25	14	100	7.12	3.34	13	80	5.72	2.68
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	15	50	3.57	1.80	15	86	6.11	3.10	16	70	4.97	2.36	16	76	5.41	2.42	14	68	4.86	2.16
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	161	11.49	5.03	8	185	13.14	5.53	9	182	12.93	5.01	13	101	7.19	3.00	15	66	4.72	2.49
	其他		1,084	77.34	41.15		1,162	82.53	44.12		1,216	86.38	42.86		1,262	89.90	43.00		1,313	93.90	42.34

表36·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數 (人)	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 95年	40	20	20	1.88	69	30	39	3.24	1	4.70
民國 96年	56	34	22	2.61	89	57	32	4.15	1	4.66
民國 97年	59	33	26	2.89	95	51	44	4.65	1	4.90
民國 98年	32	18	14	1.64	69	34	35	3.54	-	-
民國 99年	52	30	22	2.78	71	41	30	3.80	1	5.35
民國 100年	63	30	33	2.48	96	50	46	3.77	-	-
民國 101年	71	43	28	2.35	105	62	43	3.47	3	9.92
民國 102年	67	41	26	2.56	100	55	45	3.82	2	7.64
民國 103年	71	40	31	2.43	110	70	40	3.77	-	-
民國 104年	94	55	39	3.26	137	78	59	4.75	3	10.39
民國 105年	68	42	26	2.45	106	61	45	3.82	1	3.60
民國 106年	62	38	24	2.48	90	51	39	3.60	1	4.00
<b>民國 107年</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>2.65</b>	<b>101</b>	<b>60</b>	<b>41</b>	<b>4.46</b>	<b>3</b>	<b>13.24</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：1. 新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000。

2. 嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000

3. 孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數) × 100,000。

表37·臺北市歷年年齡結構別死亡率

單位：人/每十萬人口

年別	總計	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
95年	528.71	340.67	29.64	11.84	15.21	34.40	44.62	63.55	65.17	112.92	155.35	237.33	365.65	507.15	721.45	1,150.53	2,001.99	3,249.51	5,306.01	10,046.38
96年	550.64	434.21	20.37	17.43	7.01	25.78	39.69	52.14	56.09	98.39	148.71	246.28	311.48	475.52	708.13	1,171.78	2,041.12	3,320.52	5,341.79	10,629.20
97年	575.72	469.11	23.18	16.16	12.47	19.20	45.78	48.92	66.26	105.37	157.67	230.61	330.13	455.61	699.50	1,124.34	2,016.68	3,257.44	5,549.18	10,992.30
98年	568.60	357.61	21.38	13.08	5.53	26.88	36.77	40.38	63.46	85.57	148.62	225.80	314.22	467.69	638.77	1,116.63	1,912.70	3,080.41	5,353.26	10,468.26
99年	575.83	379.01	17.92	10.66	10.08	23.18	29.30	45.38	63.43	87.69	135.15	207.88	295.07	466.23	627.12	1,073.08	1,722.41	3,119.39	5,172.92	10,733.81
100年	600.94	439.53	17.38	6.91	9.11	23.22	31.96	38.62	61.99	82.84	147.77	212.79	323.21	449.50	647.50	1,009.22	1,742.48	3,149.19	5,256.75	11,145.17
101年	615.94	384.89	30.01	10.62	13.00	22.57	31.22	54.76	55.70	92.04	135.16	209.92	316.51	450.09	642.50	1,046.14	1,634.99	3,111.78	5,368.53	11,362.42
102年	600.78	362.67	15.23	15.26	10.77	27.43	32.79	32.30	39.45	71.26	120.77	221.67	333.36	461.62	598.90	951.72	1,608.36	2,787.57	5,146.12	10,998.33
103年	629.19	406.98	15.98	14.45	12.05	20.39	44.92	33.31	45.32	90.65	131.91	210.82	299.87	453.63	634.57	930.83	1,612.32	2,781.10	5,270.99	11,547.13
104年	634.72	487.52	14.36	4.55	5.65	22.23	33.75	45.47	49.56	68.93	119.14	188.47	315.60	438.19	653.41	919.01	1,564.10	2,713.61	5,014.33	11,595.10
105年	668.05	388.34	17.17	11.82	11.14	22.39	35.94	39.52	46.02	74.97	133.69	202.29	324.95	449.88	643.65	943.09	1,522.98	2,776.81	5,148.48	12,150.42
106年	655.67	353.45	8.30	5.29	14.15	19.30	26.73	42.95	54.93	68.11	116.90	204.11	305.11	432.66	596.45	892.78	1,488.40	2,510.13	4,889.05	11,993.12
<b>107年</b>	<b>674.54</b>	<b>442.23</b>	<b>17.12</b>	<b>6.88</b>	<b>8.12</b>	<b>22.67</b>	<b>32.72</b>	<b>31.86</b>	<b>56.89</b>	<b>65.42</b>	<b>104.18</b>	<b>205.45</b>	<b>302.94</b>	<b>430.33</b>	<b>603.23</b>	<b>909.56</b>	<b>1,393.66</b>	<b>2,612.04</b>	<b>4,791.46</b>	<b>12,173.79</b>

資料來源：衛生福利部。

表38·臺北市歷年事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		97年	
		死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率
E47-E53		463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14	389	14.81
E47	運輸事故	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54	153	5.83
E48	意外中毒	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91	91	3.47
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0.99
E50	意外墜落	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31	19	0.72
E51	火及火焰所致之事故傷害	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27	6	0.23
E52	其他事故傷害，包括後期影響	140	5.33	83	3.17	90	3.43	82	3.12	25	0.95
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	1	0.04	-	-	69	2.63

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表38·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	98年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率	死亡 人數	每十 萬人 死亡率
V01-X59, Y85-Y86		377	14.42	359	13.74	402	15.26	430	16.15	406	15.15	458	17.00
V01-V99	運輸事故傷害	165	6.31	154	5.89	147	5.58	152	5.71	150	5.60	142	5.27
W00-W19	跌倒(落)	72	2.75	83	3.18	100	3.80	96	3.61	88	3.28	118	4.38
W65-W74	意外溺死和淹沒	17	0.65	16	0.61	27	1.02	14	0.53	15	0.56	16	0.59
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	24	0.92	26	0.99	26	0.99	24	0.90	21	0.78	23	0.85
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	7	0.27	6	0.23	5	0.19	16	0.60	9	0.34	6	0.22
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	26	0.99	20	0.77	16	0.61	19	0.71	28	1.04	31	1.15
	其他	66	2.52	54	2.07	81	3.07	109	4.09	95	3.54	122	4.53

表38·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	104年		105年		106年		107年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		435	16.09	457	16.92	443	16.47	455	17.00
V01-V99	運輸事故傷害	131	4.85	159	5.89	153	5.69	135	5.05
W00-W19	跌倒(落)	99	3.66	122	4.52	107	3.98	117	4.37
W65-W74	意外溺死和淹沒	22	0.81	25	0.93	24	0.89	20	0.75
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	34	1.26	32	1.19	20	0.74	29	1.08
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	8	0.30	12	0.44	12	0.45	12	0.45
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	35	1.29	28	1.04	46	1.71	42	1.57
	其他	106	3.92	79	2.93	81	3.01	100	3.74

表39·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		97年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E47-E53		342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70	269	21.11
E47	運輸事故	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06	104	8.16
E48	意外中毒	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25	66	5.18
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1.65
E50	意外墜落	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16	13	1.02
E51	火及火焰所致之事故傷害	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31	5	0.39
E52	其他事故傷害，包括後期影響	110	8.53	68	5.30	70	5.46	63	4.92	17	1.33
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	1	0.08	-	-	43	3.37

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表39·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	98年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		377	20.54	258	20.45	267	21.03	285	22.25	271	21.05	318	24.60
V01-V99	運輸事故傷害	110	8.69	113	8.96	97	7.64	108	8.43	102	7.92	99	7.66
W00-W19	跌倒(落)	55	4.35	64	5.07	67	5.28	72	5.62	66	5.13	86	6.65
W65-W74	意外溺死和淹沒	13	1.03	11	0.87	19	1.50	10	0.78	10	0.78	14	1.08
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	15	1.19	18	1.43	15	1.18	12	0.94	12	0.93	14	1.08
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	7	0.55	3	0.24	5	0.39	6	0.47	6	0.47	5	0.39
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	14	1.11	14	1.11	14	1.10	12	0.94	22	1.71	27	2.09
	其他	46	3.63	35	2.77	50	3.94	65	5.07	53	4.12	73	5.65



表39·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	104年		105年		106年		107年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		303	23.39	304	23.52	303	23.57	294	23.01
V01-V99	運輸事故傷害	83	6.41	105	8.12	103	8.01	91	7.12
W00-W19	跌倒(落)	71	5.48	88	6.81	76	5.91	78	6.10
W65-W74	意外溺死和淹沒	20	1.54	18	1.39	19	1.48	16	1.25
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	26	2.01	16	1.24	10	0.78	15	1.17
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	4	0.31	6	0.46	8	0.62	6	0.47
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	28	2.16	22	1.70	35	2.72	30	2.35
	其他	71	5.48	49	3.79	52	4.04	58	4.54

表40·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	93年		94年		95年		96年		97年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E47-E53		121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92	120	8.88
E47	運輸事故	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15	49	3.62
E48	意外中毒	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59	25	1.85
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.37
E50	意外墜落	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55	6	0.44
E51	火及火焰所致之事故傷害	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22	1	0.07
E52	其他事故傷害，包括後期影響	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41	8	0.59
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1.92

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表40·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	98年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		377	8.67	101	7.47	135	9.89	145	10.50	135	9.70	140	9.99
V01-V99	運輸事故傷害	55	4.08	41	3.03	50	3.66	44	3.19	48	3.45	43	3.07
W00-W19	跌倒(落)	17	1.26	19	1.41	33	2.42	24	1.74	22	1.58	32	2.28
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	0.30	5	0.37	8	0.59	4	0.29	5	0.36	2	0.14
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	9	0.67	8	0.59	11	0.81	12	0.87	9	0.65	9	0.64
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	3	0.22	-	-	10	0.72	3	0.22	1	0.07
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	12	0.89	6	0.44	2	0.15	7	0.51	6	0.43	4	0.29
	其他	20	1.48	19	1.41	31	2.27	44	3.19	42	3.02	49	3.50

表40·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	104年		105年		106年		107年	
		死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		132	9.37	153	10.87	140	9.97	161	11.51
V01-V99	運輸事故傷害	48	3.41	54	3.84	50	3.56	44	3.15
W00-W19	跌倒(落)	28	1.99	34	2.42	31	2.21	39	2.79
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.14	7	0.50	5	0.36	4	0.29
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	8	0.57	16	1.14	10	0.71	14	1.00
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	4	0.28	6	0.43	4	0.28	6	0.43
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	7	0.50	6	0.43	11	0.78	12	0.86
	其他	35	2.49	30	2.13	29	2.07	42	3.00

表41·臺北市歷年自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率
E54	自殺總計	206	7.79	346	13.18	467	17.83	454	17.30	364	13.84
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	109	4.12	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	18	0.68	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	1.51	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表41·臺北市歷年自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	370	14.09	341	13.04	329	12.59	306	11.61	333	12.51	261	9.74
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	1	0.04	-	-	1	0.04	3	0.11	2	0.07
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	6	0.23	5	0.19	9	0.34	7	0.26	4	0.15
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	-	-	-	-	2	0.08	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	124	4.72	99	3.79	100	3.83	72	2.73	82	3.08	55	2.05
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	6	0.23	9	0.34	11	0.42	6	0.23	4	0.15
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	6	0.23	2	0.08	1	0.04	1	0.04	2	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	109	4.17	113	4.32	126	4.78	103	3.87	77	2.87
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	25	0.96	24	0.92	25	0.95	34	1.28	28	1.04
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	2	0.08	4	0.15
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	5	0.19	4	0.15	1	0.04	4	0.15	5	0.19
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	4	0.15	10	0.38	6	0.23	8	0.30	3	0.11
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	68	2.60	55	2.10	52	1.97	71	2.67	67	2.50
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.11	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	3	0.11	4	0.15	1	0.04	2	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	2	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	6	0.23	1	0.04	-	-	4	0.15	6	0.22

表41·臺北市歷年自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103年			104年			105年			106年			107年		
		死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	每 十 萬 人 口 死 亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	311	11.54	318	11.76	308	11.41	317	11.79	349	13.04					
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	7	0.26	5	0.18	4	0.15	6	0.22	3	0.11					
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04					
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.07	3	0.11	3	0.11	11	0.41	5	0.19					
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-					
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	76	2.82	81	3.00	67	2.48	68	2.53	73	2.73					
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.26	8	0.30	4	0.15	4	0.15	8	0.30					
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	2	0.07	3	0.11	1	0.04	3	0.11					
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	104	3.86	105	3.88	104	3.85	105	3.90	136	5.08					
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	32	1.19	20	0.74	38	1.41	33	1.23	26	0.97					
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2	0.07	5	0.18	1	0.04	4	0.15	4	0.15					
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	3	0.11	1	0.04	5	0.19	3	0.11					
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	6	0.22	9	0.33	8	0.30	10	0.37	10	0.37					
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	70	2.60	69	2.55	68	2.52	67	2.49	0	-					
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	75	2.80					
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.07	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04					
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04					
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.07	5	0.18	5	0.19	1	0.04	-	-					

表42·臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率
E54	自殺總計	123	9.29	225	17.46	313	24.40	309	24.12	228	17.81
E950	以固體或液體物質自殺及自 為中毒	11	0.83	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自 為中毒	-	-	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及 自傷	71	5.36	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	8	0.60	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.15	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16
E957	由高處跳下自殺及自傷	24	1.81	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89
E958	其他及未明示之方式自殺及 自傷	7	0.53	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表42·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
		人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	231	18.13	234	18.49	212	16.81	188	14.81	207	16.16	166	12.89
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	2	0.16
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	3	0.24	2	0.16	6	0.47	3	0.23	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	6.36	72	5.69	70	5.55	43	3.39	59	4.61	40	3.11
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	3	0.24	7	0.55	8	0.63	5	0.39	3	0.23
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.32	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	81	6.40	80	6.34	83	6.54	62	4.84	56	4.35
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	19	1.50	13	1.03	17	1.34	21	1.64	17	1.32
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.16	4	0.31
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	4	0.32	1	0.08	1	0.08	2	0.16	5	0.39
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	2	0.16	7	0.55	3	0.24	5	0.39	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	37	2.92	26	2.06	25	1.97	40	3.12	32	2.49
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.16	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	3	0.24	-	-	1	0.08	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	5	0.40	1	0.08	-	-	2.00	0.16	4	0.31

表42·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103年			104年			105年			106年			107年		
		死亡 人數	每 十 萬 口 率	死亡 人數	每 十 萬 口 率	死亡 人數	每 十 萬 口 率	死亡 人數	每 十 萬 口 率	死亡 人數	每 十 萬 口 率	死亡 人數	每 十 萬 口 率			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	181	14.00	205	15.82	197	15.24	193	15.01	219	17.14					
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.08	2	0.15	2	0.15	3	0.23	-	-					
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-					
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	2	0.15	1	0.08	3	0.23	4	0.31					
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-					
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	52	4.02	56	4.32	42	3.25	46	3.58	53	4.15					
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.54	4	0.31	4	0.31	2	0.16	7	0.55					
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	3	0.23	-	-	3	0.23					
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	67	5.18	72	5.56	67	5.18	66	5.13	80	6.26					
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	14	1.08	12	0.93	25	1.93	18	1.40	14	1.10					
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	2	0.15	5	0.39	-	-	3	0.23	4	0.31					
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	2	0.15	1	0.08	4	0.31	3	0.23					
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	4	0.31	7	0.54	7	0.54	5	0.39	8	0.63					
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	32	2.48	38	2.93	39	3.02	40	3.11	41	3.21					
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08					
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08					
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	2	0.15	4	0.31	1	0.08	-	-					

表43·臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 女性人口 死亡 率
E54	自殺總計	83	6.29	121	9.06	154	11.52	145	10.80	136	10.07
E950	以固體或液體物質自殺及自 為中毒	14	1.06	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自 為中毒	1	0.08	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及 自傷	38	2.88	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	10	0.76	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44
E958	其他及未明示之方式自殺及 自傷	2	0.15	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表43·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		98年		99年		100年		101年		102年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28	107	7.93	117	8.66	118	8.64	126	9.12	95	6.82
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	3	0.22	3	0.22	3	0.22	4	0.29	4	0.29
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	43	3.18	27	2.00	30	2.22	29	2.12	23	1.67	15	1.08
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	3	0.22	2	0.15	3	0.22	1	0.07	1	0.07
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	2	0.15	1	0.07	-	-	-	-	1	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	28	2.07	33	2.44	43	3.15	41	2.97	21	1.51
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	6	0.44	11	0.81	8	0.59	13	0.94	11	0.79
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	3	0.22	-	-	2	0.14	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	2	0.15	3	0.22	3	0.22	3	0.22	3	0.22
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	31	2.30	29	2.15	27	1.98	31	2.24	35	2.51
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	3	0.22	1	0.07	1	0.07	1	0.07	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-	2	0.14	2	0.14

表43·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	103年			104年			105年			106年			107年		
		死亡 人數	每 十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每 十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每 十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每 十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每 十 萬 人口 死亡 率	死亡 人數	每 十 萬 人口 死亡 率			
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	130	9.27	113	8.03	111	7.88	124	8.83	130	9.30					
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	6	0.43	3	0.21	2	0.14	3	0.21	3	0.21					
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07					
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	1	0.07	2	0.14	8	0.57	1	0.07					
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	24	1.71	25	1.78	25	1.78	22	1.57	20	1.43					
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	4	0.28	-	-	2	0.14	1	0.07					
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-					
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	37	2.64	33	2.34	37	2.63	39	2.78	56	4.00					
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	18	1.28	8	0.57	13	0.92	15	1.07	12	0.86					
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.07	1	0.07	-	-					
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-					
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.14	2	0.14	1	0.07	5	0.36	2	0.14					
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	38	2.71	31	2.20	29	2.06	27	1.92	34	2.43					
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-					
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-					
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.14	3	0.21	1	0.07	-	-	-	-					

表44·臺北市歷年主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
94年	547.41	392.62	163.78	120.21	63.56	42.87	52.19	35.74	37.72	26.19	21.84	13.82	20.77	13.94	15.84	14.03
95年	528.71	364.83	168.54	118.90	58.19	38.38	45.04	29.23	36.05	23.79	21.91	13.32	18.48	12.19	14.44	12.68
96年	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎病徵候群 及腎病變		慢性下呼吸道疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	36.18	20.14	45.66	27.26	27.26	16.89	18.70	11.20	16.98	9.27
98年	568.60	347.27	174.48	111.24	67.61	39.98	32.12	16.59	43.13	24.61	31.55	18.86	17.25	9.72	18.97	9.85
99年	575.83	338.78	177.26	110.14	65.94	36.69	34.40	16.89	40.07	21.91	29.43	16.78	18.14	10.07	17.79	8.87
100年	600.94	343.47	179.59	109.78	72.30	38.51	35.75	16.96	43.15	23.13	29.41	16.39	17.00	8.89	22.09	10.48
101年	615.94	344.34	187.11	111.52	76.18	40.21	34.00	15.54	44.55	22.94	30.69	16.63	19.95	10.62	22.20	10.31
102年	600.78	326.27	183.55	106.98	77.43	39.81	32.95	14.46	45.15	22.34	32.09	16.84	18.21	9.13	21.38	9.73
103年	629.19	332.49	181.97	103.66	92.38	46.23	39.34	17.10	44.98	22.40	31.70	16.16	20.64	9.89	24.38	10.28
104年	634.72	325.57	185.87	102.84	88.07	42.60	41.61	17.37	42.65	20.08	28.59	13.87	20.90	9.68	23.52	9.54
105年	668.05	332.75	193.28	105.00	97.44	45.78	47.18	19.36	44.66	20.76	30.70	14.50	22.63	10.24	23.18	9.64
106年	655.67	316.47	188.21	98.69	102.25	45.83	52.91	20.75	44.51	20.28	27.07	12.43	22.01	9.55	21.94	8.54
<b>107年</b>	<b>674.54</b>	<b>317.59</b>	<b>195.75</b>	<b>100.48</b>	<b>112.11</b>	<b>47.98</b>	<b>60.50</b>	<b>22.32</b>	<b>43.05</b>	<b>18.57</b>	<b>25.86</b>	<b>11.34</b>	<b>23.21</b>	<b>9.73</b>	<b>19.21</b>	<b>7.38</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表44·臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
94年	17.83	14.79	12.33	9.20	5.73	3.78	6.18	4.14	4.16	2.79	2.94	2.06	2.29	1.62	1.49	2.66
95年	17.30	14.12	12.08	8.86	5.53	3.48	6.71	4.30	3.51	2.26	3.01	1.89	2.59	1.63	1.60	2.92
96年	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年別	事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		血管性及未明示之癱瘓症		帕金森病		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	14.81	11.94	19.53	11.27	14.24	8.21	14.09	11.40	11.27	7.69	2.63	1.29	3.54	1.88	6.51	4.05
98年	14.42	11.20	16.86	9.44	14.72	8.17	13.04	10.39	13.35	8.79	4.28	2.06	3.52	1.89	4.86	2.91
99年	13.74	10.71	17.18	9.25	16.15	8.49	12.59	9.67	12.17	7.90	4.44	2.00	4.25	2.10	4.59	2.60
100年	15.26	10.92	21.48	10.81	16.93	8.47	11.61	8.98	11.96	7.65	5.16	2.18	4.59	2.33	4.86	2.68
101年	16.15	11.31	21.00	10.47	20.13	9.74	12.51	9.82	10.74	6.77	4.85	1.94	5.94	2.92	4.55	2.41
102年	15.15	10.47	17.39	8.18	18.40	8.66	9.74	7.40	11.57	6.99	5.30	2.11	5.78	2.71	5.11	2.62
103年	17.00	11.23	16.52	7.62	17.11	7.55	11.54	9.06	10.54	6.29	7.35	2.78	5.01	2.23	4.60	2.30
104年	16.09	11.05	17.09	7.49	17.13	7.65	11.76	8.72	10.28	5.96	11.06	3.97	6.66	2.95	6.44	3.24
105年	16.92	11.14	19.59	8.15	14.29	6.37	11.41	8.38	10.33	5.97	12.74	4.40	7.63	3.29	5.96	2.81
106年	16.47	11.09	17.22	7.20	13.72	5.80	11.79	8.89	10.00	5.58	11.53	3.88	7.03	2.87	6.14	2.77
<b>107年</b>	<b>17.00</b>	<b>10.85</b>	<b>16.78</b>	<b>7.00</b>	<b>14.42</b>	<b>5.97</b>	<b>13.04</b>	<b>9.84</b>	<b>8.89</b>	<b>4.97</b>	<b>6.32</b>	<b>2.10</b>	<b>5.49</b>	<b>2.15</b>	<b>5.46</b>	<b>2.59</b>

表45·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎徵候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
94年	683.06	480.28	205.00	148.15	82.62	54.25	64.07	43.39	40.61	27.75	28.84	17.20	25.26	16.55	24.32	21.46
95年	654.67	445.74	210.37	146.09	75.79	49.62	53.08	34.17	36.92	24.11	29.12	17.22	20.37	13.06	21.93	19.32
96年	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		慢性下呼吸道疾病		糖尿病		腎炎、腎病徵候群及腎病變	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	48.58	26.32	53.13	32.56	26.45	13.76	27.62	17.36	18.83	11.24
98年	693.85	425.20	211.03	134.11	86.99	52.89	41.72	21.04	51.12	29.05	29.79	15.11	33.42	20.41	19.67	10.79
99年	704.08	421.30	219.66	137.29	82.36	47.58	43.44	21.00	47.72	26.99	26.56	12.91	30.44	17.70	18.55	10.57
100年	737.25	426.54	216.55	132.95	90.98	50.79	47.66	22.21	54.91	29.93	35.05	16.00	30.96	18.33	18.59	9.68
101年	751.69	429.77	229.30	138.02	97.28	54.52	43.96	20.08	53.01	28.56	33.57	15.24	32.32	18.20	19.91	11.13
102年	732.81	409.56	221.64	130.87	97.23	53.17	44.65	19.94	54.28	28.22	33.47	15.30	33.24	18.44	18.79	9.69
103年	766.40	422.76	218.44	127.74	114.48	61.76	49.35	22.19	55.85	29.48	36.82	15.91	33.49	18.27	21.97	10.97
104年	766.62	414.33	220.37	127.13	109.22	56.98	52.87	22.79	51.48	26.11	36.28	15.00	31.88	16.92	21.77	10.57
105年	802.25	424.60	225.92	127.78	122.25	63.29	60.35	26.06	53.54	27.20	35.28	15.27	30.79	15.92	25.84	12.57
106年	775.76	399.58	215.76	117.67	125.92	62.84	67.51	28.54	54.06	26.70	33.60	13.73	26.52	13.49	22.48	10.61
<b>107年</b>	<b>795.21</b>	<b>403.72</b>	<b>229.01</b>	<b>123.42</b>	<b>134.23</b>	<b>63.69</b>	<b>72.32</b>	<b>29.18</b>	<b>52.21</b>	<b>24.20</b>	<b>31.07</b>	<b>12.71</b>	<b>26.69</b>	<b>13.21</b>	<b>23.01</b>	<b>10.52</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表45·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
94年	24.40	20.52	14.97	11.51	5.69	3.62	8.26	5.49	5.53	3.57	4.05	2.78	3.90	2.70	1.33	2.20
95年	24.12	20.00	16.39	12.38	5.70	3.34	7.34	4.78	4.53	2.83	3.36	2.06	4.14	2.46	1.25	2.40
96年	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年別	事故傷害		敗血症		蓄意自我傷害(自殺)		高血壓性疾病		慢性肝病及肝硬化		帕金森病		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)		血管性及未明示之癡呆症	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	21.11	17.19	20.64	11.78	18.13	15.00	16.01	9.43	15.46	10.94	4.39	2.24	7.93	4.79	2.43	1.15
98年	20.54	16.29	18.41	10.28	18.49	14.83	16.28	9.25	18.33	12.76	4.90	2.56	5.77	3.39	3.48	1.58
99年	20.45	16.18	18.23	9.72	16.81	13.01	18.31	9.74	15.70	10.91	5.07	2.28	5.95	3.48	4.36	1.97
100年	21.03	15.84	26.55	13.53	14.81	11.63	18.12	9.32	16.62	11.40	5.51	2.83	5.91	3.26	4.96	2.10
101年	22.25	16.23	24.05	11.78	16.16	12.59	21.39	10.76	14.60	9.70	7.50	3.72	4.68	2.45	5.00	2.00
102年	21.05	15.04	21.28	10.03	12.89	9.96	19.80	9.82	15.38	10.12	7.30	3.49	6.21	3.31	4.89	1.88
103年	24.60	16.98	20.81	10.00	14.00	10.85	18.64	8.72	14.54	9.34	7.04	3.16	5.72	2.83	6.50	2.52
104年	23.39	16.86	22.00	10.05	15.82	11.73	18.29	9.34	13.35	8.46	8.95	4.19	6.79	3.42	9.88	3.60
105年	23.52	16.38	22.44	9.62	15.24	11.07	16.09	8.07	14.70	9.09	10.06	4.51	7.04	3.37	11.45	4.06
106年	23.57	16.53	21.62	9.65	15.01	11.45	14.78	6.95	13.14	8.18	8.24	3.54	6.92	3.19	10.97	3.91
107年	<b>23.01</b>	<b>15.59</b>	<b>19.72</b>	<b>8.96</b>	<b>17.14</b>	<b>12.86</b>	<b>14.48</b>	<b>6.65</b>	<b>12.37</b>	<b>7.66</b>	<b>6.89</b>	<b>2.93</b>	<b>6.10</b>	<b>3.17</b>	<b>5.24</b>	<b>1.93</b>

表46·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎徵候群及腎性病變		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
94年	417.20	309.11	124.20	93.11	45.27	31.66	40.78	28.68	34.94	25.11	16.46	11.53	15.11	10.25	11.52	9.63
95年	408.57	288.49	128.65	92.46	41.39	27.76	37.37	24.78	35.21	23.87	16.68	11.39	15.04	9.47	10.80	8.87
96年	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎病徵候群及腎病變		高血壓性疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	24.49	14.14	38.61	22.90	26.93	16.79	18.57	11.35	12.58	7.27
98年	451.14	276.88	140.20	90.07	49.43	28.58	23.12	12.35	35.64	20.63	29.79	17.72	14.97	8.70	13.26	7.33
99年	456.13	265.58	137.69	85.62	50.61	27.23	25.97	12.95	32.92	17.61	28.48	16.12	17.76	9.80	14.13	7.43
100年	474.21	270.05	145.23	89.19	54.93	27.89	24.68	12.06	32.22	17.12	27.98	14.97	15.53	8.19	15.82	7.81
101年	490.07	269.77	147.98	88.40	56.62	28.04	24.76	11.42	36.71	18.18	29.18	15.39	19.98	10.28	18.97	8.90
102年	478.66	253.90	148.32	86.24	59.11	28.39	22.12	9.54	36.70	17.36	31.03	15.60	17.67	8.67	17.10	7.74
103年	502.63	254.34	148.33	83.12	71.99	33.14	30.11	12.67	34.96	16.33	30.04	14.40	19.41	9.01	15.70	6.59
104年	513.35	250.23	154.12	82.57	68.61	30.53	31.25	12.64	34.52	15.13	25.57	11.32	20.10	8.92	16.05	6.33
105年	544.83	255.48	163.31	85.94	74.66	31.13	35.09	13.78	36.51	15.42	30.62	13.33	19.68	8.33	12.64	4.98
106年	545.67	247.47	162.99	83.14	80.57	31.74	39.54	14.43	35.76	15.09	27.57	11.57	21.58	8.69	12.75	4.82
<b>107年</b>	<b>564.27</b>	<b>246.23</b>	<b>165.35</b>	<b>81.96</b>	<b>91.90</b>	<b>34.91</b>	<b>49.70</b>	<b>16.80</b>	<b>34.69</b>	<b>13.97</b>	<b>25.10</b>	<b>9.76</b>	<b>23.39</b>	<b>9.09</b>	<b>14.37</b>	<b>5.41</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表46·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
94年	9.80	7.32	7.71	7.05	5.76	4.00	4.19	2.87	2.84	1.97	1.87	1.36	1.65	3.15	0.97	0.76
95年	7.97	5.79	7.30	6.30	5.36	3.59	6.10	3.95	2.53	1.69	2.68	1.74	1.94	3.45	1.56	1.06
96年	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年別	敗血症		事故傷害		蓄意自我傷害(自殺)		慢性下呼吸道疾病		血管性及未明示之癱瘓症		慢性肝病及肝硬化		原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	18.49	10.99	8.88	6.98	10.28	8.19	8.06	4.57	2.81	1.48	7.32	4.87	5.18	3.35	11.02	6.25
98年	15.41	8.77	8.67	6.49	7.93	6.48	8.82	4.61	5.04	2.57	8.67	5.38	4.00	2.43	14.67	7.76
99年	16.20	8.98	7.47	5.74	8.66	6.70	9.62	4.94	4.51	2.11	8.88	5.36	3.33	1.80	15.54	7.61
100年	16.77	8.39	9.89	6.49	8.64	6.65	10.03	5.06	5.35	2.32	7.62	4.44	3.88	2.16	9.89	5.54
101年	18.17	9.22	10.50	6.82	9.12	7.31	11.66	5.67	4.71	1.91	7.17	4.18	4.42	2.40	6.81	3.86
102年	13.79	6.53	9.70	6.34	6.82	5.17	10.20	4.64	5.67	2.33	8.04	4.28	4.09	2.04	7.40	3.88
103年	12.56	5.61	9.99	6.00	9.27	7.58	12.91	5.21	8.13	3.08	6.85	3.62	3.57	1.80	11.49	5.03
104年	12.57	5.31	9.37	5.72	8.03	6.07	11.79	4.75	12.14	4.37	7.46	3.83	6.11	3.10	13.14	5.53
105年	16.98	6.93	10.87	6.37	7.88	6.09	12.08	4.96	13.92	4.73	6.32	3.25	4.97	2.36	12.93	5.01
106年	13.18	5.22	9.97	6.29	8.83	6.59	11.26	4.25	12.04	3.89	7.12	3.34	5.41	2.42	7.19	3.00
<b>107年</b>	<b>14.09</b>	<b>5.42</b>	<b>11.51</b>	<b>6.71</b>	<b>9.30</b>	<b>7.21</b>	<b>8.37</b>	<b>3.06</b>	<b>7.29</b>	<b>2.26</b>	<b>5.72</b>	<b>2.68</b>	<b>4.86</b>	<b>2.16</b>	<b>4.72</b>	<b>2.49</b>

表47· 臺北市歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		3,180	120.31		4,202	160.09		4,290	163.78		4,423	168.54		4,566	173.56
162	肺癌	1	615	23.27	1	880	33.53	1	870	33.21	1	910	34.68	1	987	37.52
155	肝癌	2	570	21.56	2	677	25.79	2	607	23.17	2	702	26.75	2	666	25.32
153 154	結腸直腸癌	3	329	12.45	3	518	19.73	3	542	20.69	3	532	20.27	3	557	21.17
174	女性乳癌(1)	5	135	10.23	4	203	15.20	4	224	16.76	4	209	15.56	4	203	15.03
151	胃癌	4	328	12.41	5	311	11.85	5	354	13.51	5	363	13.83	5	329	12.51
185	攝護腺癌(2)	7	51	3.85	6	122	9.46	6	133	10.37	6	129	10.07	6	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	92	3.48	9	148	5.64	7	181	6.91	8	175	6.67	7	217	8.25
157	胰臟癌	9	97	3.67	8	164	6.25	9	168	6.41	7	178	6.78	8	178	6.77
179 180	子宮頸癌(1)	6	108	8.18	7	87	6.51	8	86	6.43	10	81	6.03	9	89	6.59
156	膽囊癌	15	64	2.42	11	125	4.76	12	120	4.58	12	116	4.42	10	149	5.66
183	卵巢癌(1)	11	44	3.33	12	58	4.34	14	50	3.74	11	73	5.43	11	74	5.48
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	78	2.95	10	138	5.26	10	146	5.57	9	166	6.33	12	134	5.09
150	食道癌	14	75	2.84	14	106	4.04	11	126	4.81	14	97	3.70	13	126	4.79
204-208	白血病	8	100	3.78	13	108	4.11	13	100	3.82	13	98	3.73	14	107	4.07
188	膀胱癌	17	57	2.16	15	92	3.51	16	66	2.52	16	82	3.12	15	91	3.46
	其他		437	16.53		465	17.72		517	19.74		512	19.51		523	19.88

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表47· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		4,467	170.10		4,563	174.48		4,632	177.26		4,732	179.59		4,981	187.11		4,919	183.55
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34	1	967	36.98	1	990	37.89	1	1,014	38.48	1	1,018	38.24	1	988	36.87
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59	3	592	22.64	3	570	21.81	3	609	23.11	3	648	24.34	3	631	23.55
C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69	2	665	25.43	2	644	24.65	2	672	25.50	2	697	26.18	2	700	26.12
C50	女性乳房癌(1)	4	228	16.87	4	236	17.49	4	266	19.68	4	283	20.73	4	243	17.59	4	264	18.96
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	124	9.73	6	142	11.22	6	144	11.41	6	132	10.40	5	176	13.74	5	155	12.04
C25	胰臟癌	7	192	7.31	7	237	9.06	7	211	8.07	7	231	8.77	7	232	8.71	7	231	8.62
C16	胃癌	5	312	11.88	5	319	12.20	5	307	11.75	5	285	10.82	6	329	12.36	6	315	11.75
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	13	58	4.29	11	65	4.82	12	66	4.88	11	65	4.76	8	88	6.37	9	85	6.11
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	9	131	4.99	8	148	5.66	9	151	5.78	8	153	5.81	9	169	6.35	8	203	7.57
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	75	5.55	9	69	5.11	10	71	5.25	10	74	5.42	12	63	4.56	11	80	5.75
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	131	4.99	12	119	4.55	8	152	5.82	9	149	5.65	10	147	5.52	10	154	5.75
C15	食道癌	12	120	4.57	10	129	4.93	11	137	5.24	12	115	4.36	11	133	5.00	12	121	4.52
C67	膀胱癌	15	80	3.05	14	80	3.06	14	95	3.64	14	78	2.96	14	85	3.19	14	84	3.13
C91-C95	白血病	11	121	4.61	13	106	4.05	13	107	4.09	13	112	4.25	13	110	4.13	13	113	4.22
C54	子宮體癌(1)	17	28	2.07	19	23	1.70	18	29	2.15	18	34	2.49	18	35	2.53	15	39	2.80
	其他		671	25.55		666	25.47		692	26.48		726	27.55		808	30.35		756	28.21

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表47· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順 位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率
C00-C97	所有癌症死亡原因		4,903	181.97		5,025	185.87		5,219	193.28		5,062	188.21		5,238	195.75
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	992	36.82	1	984	36.40	1	1,070	39.63	1	1,034	38.45	1	1,053	39.35
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	666	24.72	2	686	25.37	2	675	25.00	2	670	24.91	2	705	26.35
C22	肝和肝內膽管癌	2	666	24.72	3	667	24.67	3	672	24.89	3	658	24.47	3	679	25.37
C50	女性乳房癌 <sup>(1)</sup>	4	289	20.62	4	288	20.45	4	302	21.45	4	323	23.01	4	321	22.96
C61	前列腺(攝護腺)癌 <sup>(2)</sup>	5	151	11.68	5	163	12.58	5	167	12.92	5	177	13.77	5	160	12.52
C25	胰臟癌	7	257	9.54	7	273	10.10	7	260	9.63	6	294	10.93	6	308	11.51
C16	胃癌	6	312	11.58	6	295	10.91	6	311	11.52	7	278	10.34	7	288	10.76
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	174	6.46	8	183	6.77	8	208	7.70	9	166	6.17	8	176	6.58
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	155	5.75	9	153	5.66	10	174	6.44	11	133	4.95	9	159	5.94
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 <sup>(1)</sup>	9	84	5.99	10	77	5.47	9	107	7.60	8	89	6.34	10	79	5.65
C15	食道癌	11	135	5.01	12	133	4.92	13	123	4.56	12	119	4.42	11	140	5.23
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 <sup>(1)</sup>	12	58	4.14	11	70	4.97	11	72	5.11	10	76	5.41	12	66	4.72
C91-C95	白血病	13	98	3.64	14	108	3.99	12	133	4.93	14	115	4.28	13	124	4.63
C67	膀胱癌	14	93	3.45	13	117	4.33	14	108	4.00	13	116	4.31	14	109	4.07
C54	子宮體癌 <sup>(1)</sup>	17	35	2.50	15	42	2.98	15	47	3.34	15	59	4.20	15	54	3.86
	其他		738	27.39		786	29.07		790	29.26		755	28.07		817	30.53

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表48·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		1,977	149.38		2,594	201.24		2,630	205.00		2,695	210.37		2,757	215.37
162	肺癌	2	414	31.28	1	599	46.47	1	562	43.81	1	608	47.46	1	635	49.60
155	肝癌	1	436	32.94	2	495	38.40	2	445	34.69	2	518	40.43	2	488	38.12
153 154	結腸直腸癌	4	191	14.43	3	306	23.74	3	306	23.85	3	316	24.67	3	308	24.06
151	胃癌	3	212	16.02	4	198	15.36	4	236	18.40	4	240	18.73	4	214	16.72
185	攝護腺癌	11	51	3.85	5	122	9.46	5	133	10.37	6	129	10.07	5	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	66	4.99	7	91	7.06	8	115	8.96	7	112	8.74	6	129	10.08
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	73	5.52	5	122	9.46	6	133	10.37	5	147	11.47	7	117	9.14
150	食道癌	8	64	4.84	7	91	7.06	7	116	9.04	9	87	6.79	8	107	8.36
157	胰臟癌	9	63	4.76	9	89	6.90	9	103	8.03	8	96	7.49	9	91	7.11
156	膽囊癌	16	27	2.04	11	65	5.04	10	70	5.46	11	60	4.68	10	89	6.95
204-208	白血病	7	65	4.91	10	68	5.28	11	59	4.60	12	54	4.22	11	68	5.31
188	膀胱癌	12	42	3.17	12	62	4.81	13	45	3.51	13	50	3.90	12	65	5.08
147	鼻咽癌	9	63	4.76	13	55	4.27	12	59	4.60	10	65	5.07	13	63	4.92
191	腦癌	14	29	2.19	15	26	2.02	14	32	2.49	14	33	2.58	14	26	2.03
161	喉癌	15	28	2.12	16	18	1.40	15	20	1.56	16	20	1.56	15	19	1.48
	其他		153	11.56		187	14.51		196	15.28		160	12.49		202	15.78

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表48·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73		2,671	211.03		2,771	219.66		2,749	216.55		2,937	229.30		2,854	221.64
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54	1	596	47.09	1	617	48.91	1	639	50.34	1	633	49.42	1	610	47.37
C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30	2	449	35.47	2	443	35.12	2	474	37.34	2	475	37.08	2	485	37.67
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13	3	311	24.57	3	331	26.24	3	325	25.60	3	371	28.97	3	358	27.80
C16	胃癌	4	218	17.11	4	203	16.04	4	197	15.62	4	191	15.05	4	203	15.85	4	189	14.68
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73	5	142	11.22	5	144	11.41	5	132	10.40	5	176	13.74	6	155	12.04
C25	胰臟癌	7	114	8.95	6	137	10.82	7	126	9.99	7	111	8.74	8	123	9.60	7	123	9.55
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02	7	136	10.75	6	139	11.02	5	132	10.40	6	146	11.40	5	175	13.59
C15	食道癌	8	107	8.40	8	109	8.61	8	115	9.12	8	104	8.19	7	127	9.92	8	110	8.54
C67	膀胱癌	12	57	4.47	11	56	4.42	11	63	4.99	11	53	4.18	12	55	4.29	11	57	4.43
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96	9	77	6.08	9	102	8.09	9	94	7.40	9	86	6.71	9	80	6.21
C91-C95	白血病	9	76	5.96	10	64	5.06	10	65	5.15	10	63	4.96	10	71	5.54	10	70	5.44
C71	腦癌	14	26	2.04	15	35	2.77	13	41	3.25	13	42	3.31	13	44	3.44	13	46	3.57
C11	鼻咽癌	11	61	4.79	12	49	3.87	12	56	4.44	13	42	3.31	11	56	4.37	12	56	4.35
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43	13	38	3.00	15	30	2.38	15	32	2.52	14	40	3.12	15	28	2.17
C64	腎臟癌	14	26	2.04	13	38	3.00	14	39	3.09	12	48	3.78	15	37	2.89	14	39	3.03
	其他		253	19.85		231	18.25		263	20.85		267	21.03		294	22.95		273	21.20



表48·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,824	218.44		2,855	220.37		2,920	225.92		2,774	215.76		2,926	229.01
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	588	45.48	1	589	45.46	1	626	48.43	1	605	47.06	1	629	49.23
C22	肝和肝內膽管癌	2	447	34.58	2	429	33.11	2	430	33.27	2	437	33.99	2	432	33.81
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	364	28.16	3	361	27.86	3	376	29.09	3	348	27.07	3	391	30.60
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	5	152	11.76	6	161	12.43	5	180	13.93	7	146	11.36	5	161	12.60
C16	胃癌	4	199	15.39	4	185	14.28	4	197	15.24	4	180	14.00	6	160	12.52
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	151	11.68	5	163	12.58	6	167	12.92	5	177	13.77	6	160	12.52
C25	胰臟癌	7	133	10.29	7	140	10.81	7	147	11.37	6	152	11.82	8	158	12.37
C15	食道癌	8	124	9.59	8	124	9.57	8	108	8.36	8	104	8.09	9	128	10.02
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	92	7.12	9	88	6.79	9	98	7.58	10	72	5.60	10	96	7.51
C67	膀胱癌	10	66	5.11	10	86	6.64	10	76	5.88	9	79	6.14	11	71	5.56
C91-C95	白血病	12	55	4.25	11	68	5.25	11	70	5.42	11	66	5.13	12	65	5.09
C64	腎臟癌	14	32	2.48	13	43	3.32	13	36	2.79	15	32	2.49	13	53	4.15
C11	鼻咽癌	11	62	4.80	12	61	4.71	12	45	3.48	13	38	2.96	14	44	3.44
C71	腦癌	15	30	2.32	15	31	2.39	15	35	2.71	12	39	3.03	15	41	3.21
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	45	3.48	14	37	2.86	13	36	2.79	14	33	2.57	16	29	2.27
	其他		284	21.97		289	22.31		293	22.67		266	20.69		308	24.11

表49·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		1,203	91.16		1,608	120.38		1,660	124.20		1,728	128.65		1,809	133.94
162	肺癌	1	201	15.23	1	281	21.04	1	308	23.05	1	302	22.48	1	352	26.06
153 154	結腸直腸癌	2	138	10.46	2	212	15.87	2	236	17.66	2	216	16.08	2	249	18.44
174	女性乳癌	3	135	10.23	3	203	15.20	3	224	16.76	3	209	15.56	3	203	15.03
155	肝癌	4	134	10.15	4	182	13.62	4	162	12.12	4	184	13.70	4	178	13.18
151	胃癌	5	116	8.79	5	113	8.46	5	118	8.83	5	123	9.16	5	115	8.51
179 180	子宮頸癌	6	108	8.18	6	87	6.51	6	86	6.43	7	81	6.03	6	89	6.59
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	11	26	1.97	10	57	4.27	7	66	4.94	9	63	4.69	7	88	6.52
157	胰臟癌	10	34	2.58	7	75	5.61	8	65	4.86	6	82	6.10	8	87	6.44
183	卵巢癌	7	44	3.33	9	58	4.34	10	50	3.74	8	73	5.43	9	74	5.48
156	膽囊癌	8	37	2.80	8	60	4.49	9	50	3.74	10	56	4.17	10	60	4.44
204-208	白血病	9	35	2.65	11	40	2.99	11	41	3.07	11	44	3.28	11	39	2.89
182	子宮體癌	19	8	0.61	14	22	1.65	13	22	1.65	13	25	1.86	12	26	1.93
188	膀胱癌	15	15	1.14	12	30	2.25	14	21	1.57	15	32	2.38	13	26	1.93
191	腦癌	12	23	1.74	13	24	1.80	12	25	1.87	16	22	1.64	14	20	1.48
150	食道癌	16	11	0.83	18	15	1.12	18	10	0.75	19	10	0.74	15	19	1.41
	其他		138	10.46		149	11.15		176	13.17		206	15.34		184	13.62

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表49·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		1,769	130.86		1,892	140.20		1,861	137.69		1,983	145.23		2,044	147.98		2,065	148.32
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78	1	371	27.49	1	373	27.60	1	375	27.46	1	385	27.87	1	378	27.15
C50	女性乳房癌	3	228	16.87	3	236	17.49	2	266	19.68	3	283	20.73	3	243	17.59	3	264	18.96
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31	2	281	20.82	3	239	17.68	2	284	20.80	2	277	20.05	2	273	19.61
C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76	4	216	16.01	4	201	14.87	4	198	14.50	4	222	16.07	4	215	15.44
C25	胰臟癌	6	78	5.77	6	100	7.41	6	85	6.29	5	120	8.79	6	109	7.89	6	108	7.76
C16	胃癌	5	94	6.95	5	116	8.60	5	110	8.14	6	94	6.88	5	126	9.12	5	126	9.05
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	8	58	4.29	8	65	4.82	8	66	4.88	8	65	4.76	7	88	6.37	7	85	6.11
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	75	5.55	7	69	5.11	7	71	5.25	7	74	5.42	8	63	4.56	8	80	5.75
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07	9	42	3.11	9	50	3.70	9	55	4.03	9	61	4.42	9	74	5.32
C54	子宮體癌	12	28	2.07	14	23	1.70	12	29	2.15	11	34	2.49	12	35	2.53	11	39	2.80
C91-C95	白血病	10	45	3.33	9	42	3.11	10	42	3.11	10	49	3.59	10	39	2.82	10	43	3.09
C45-C49	間皮和軟組織癌	13	26	1.92	18	16	1.19	20	9	0.67	18	20	1.46	14	29	2.10	16	23	1.65
C67	膀胱癌	14	23	1.70	13	24	1.78	11	32	2.37	15	25	1.83	13	30	2.17	14	27	1.94
C71	腦癌	14	23	1.70	15	21	1.56	13	28	2.07	13	28	2.05	15	28	2.03	12	29	2.08
C64	腎臟癌	17	22	1.63	12	25	1.85	14	25	1.85	14	27	1.98	17	22	1.59	16	23	1.65
	其他		232	17.16		245	18.16		235	17.39		252	18.46		287	20.78		278	19.97

表49·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,079	148.33		2,170	154.12		2,299	163.31		2,288	162.99		2,312	165.35
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	404	28.82	1	395	28.05	1	444	31.54	1	429	30.56	1	424	30.32
C50	女性乳房癌	3	289	20.62	3	288	20.45	2	302	21.45	2	323	23.01	2	321	22.96
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	302	21.55	2	325	23.08	3	299	21.24	3	322	22.94	3	314	22.46
C22	肝和肝內膽管癌	4	219	15.62	4	238	16.90	4	242	17.19	4	221	15.74	4	247	17.66
C25	胰臟癌	5	124	8.85	5	133	9.45	6	113	8.03	5	142	10.12	5	150	10.73
C16	胃癌	6	113	8.06	6	110	7.81	5	114	8.10	6	98	6.98	6	128	9.15
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	7	84	5.99	7	77	5.47	7	107	7.60	7	89	6.34	7	79	5.65
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	58	4.14	8	70	4.97	9	72	5.11	8	76	5.41	8	66	4.72
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	63	4.49	9	65	4.62	8	76	5.40	9	61	4.35	9	63	4.51
C91-C95	白血病	10	43	3.07	11	40	2.84	10	63	4.48	11	49	3.49	10	59	4.22
C54	子宮體癌	11	35	2.50	10	42	2.98	11	47	3.34	10	59	4.20	11	54	3.86
C71	腦癌	15	25	1.78	15	28	1.99	15	27	1.92	14	35	2.49	12	40	2.86
C67	膀胱癌	14	27	1.93	13	31	2.20	13	32	2.27	12	37	2.64	13	38	2.72
C45-C49	間皮和軟組織癌	12	33	2.35	17	20	1.42	17	26	1.85	12	37	2.64	14	34	2.43
C64	腎臟癌	15	25	1.78	14	30	2.13	12	33	2.34	15	31	2.21	15	33	2.36
	其他		235	16.77		278	19.74		302	21.45		279	19.88		262	18.74

表50·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
94年	163.78	120.21	33.21	23.58	23.17	17.60	20.69	14.85	16.76	12.67	13.51	9.41	10.37	6.14	6.91	5.12
95年	168.54	118.90	34.68	23.70	26.75	19.75	20.27	14.03	15.56	11.37	13.83	9.15	10.07	5.68	6.67	4.78
96年	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		結腸、直腸和肛門癌		肝和肝內膽管癌		女性乳房癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌		胃癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	170.10	112.87	35.34	22.90	21.59	13.90	26.69	18.47	16.87	11.66	9.73	5.35	7.31	4.85	11.88	7.51
98年	174.48	111.24	36.98	22.87	22.64	14.01	25.43	16.63	17.49	11.55	11.22	5.88	9.06	5.74	12.20	7.31
99年	177.26	110.14	37.89	22.60	21.81	13.10	24.65	15.83	19.68	12.87	11.41	5.86	8.07	5.06	11.75	6.67
100年	179.59	109.78	38.48	22.83	23.11	13.85	25.50	15.95	20.73	13.50	10.40	5.12	8.77	5.30	10.82	6.21
101年	187.11	111.52	38.24	22.23	24.34	13.77	26.18	16.07	17.59	10.88	13.74	6.72	8.71	5.19	12.36	6.83
102年	183.55	106.98	36.87	20.72	23.55	13.36	26.12	15.44	18.96	11.90	12.04	5.87	8.62	4.89	11.75	6.27
103年	181.97	103.66	36.82	20.34	24.72	13.54	24.72	14.18	20.62	12.73	11.68	5.14	9.54	5.48	11.58	6.07
104年	185.87	102.84	36.40	19.68	25.37	13.41	24.67	13.72	20.45	12.15	12.58	5.97	10.10	5.60	10.91	5.80
105年	193.28	105.00	39.63	20.84	25.00	12.92	24.89	13.63	21.45	12.52	12.92	5.76	9.63	5.14	11.52	5.83
<b>106年</b>	<b>188.21</b>	<b>98.69</b>	<b>38.45</b>	<b>19.62</b>	<b>24.91</b>	<b>12.56</b>	<b>24.47</b>	<b>12.91</b>	<b>23.01</b>	<b>13.39</b>	<b>13.77</b>	<b>6.11</b>	<b>10.93</b>	<b>5.72</b>	<b>10.34</b>	<b>4.98</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表50·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
94年	6.41	4.61	6.43	4.89	4.58	3.44	3.74	2.76	5.57	4.30	4.81	3.76	3.82	3.07	2.52	1.74
95年	6.78	4.75	6.03	4.26	4.42	3.04	5.43	3.91	6.33	4.81	3.70	2.66	3.73	2.77	3.12	1.97
96年	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年別	口腔癌		非何杰金氏淋巴瘤		卵巢癌		食道癌		子宮頸及部位未 明示子宮癌		白血病		膀胱癌		子宮體癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	4.99	3.43	4.99	3.18	4.29	2.96	4.57	3.16	5.55	3.62	4.61	3.42	3.05	1.83	2.07	1.42
98年	5.66	3.78	4.55	2.85	4.82	3.36	4.93	3.23	5.11	3.31	4.05	2.92	3.06	1.72	1.70	1.15
99年	5.78	3.90	5.82	3.39	4.88	3.21	5.24	3.43	5.25	3.39	4.09	2.78	3.64	1.97	2.15	1.46
100年	5.81	3.86	5.65	3.30	4.76	3.25	4.36	2.71	5.42	3.23	4.25	2.95	2.96	1.57	2.49	1.67
101年	6.35	3.97	5.52	3.30	6.37	4.09	5.00	3.13	4.56	2.87	4.13	2.87	3.19	1.57	2.53	1.53
102年	7.57	4.88	5.75	3.24	6.11	3.79	4.52	2.76	5.75	3.25	4.22	2.89	3.13	1.59	2.80	1.73
103年	6.46	3.97	5.75	3.29	5.99	3.60	5.01	3.04	4.14	2.27	3.64	2.35	3.45	1.72	2.50	1.48
104年	6.77	4.24	5.66	3.09	5.47	3.40	4.92	2.88	4.97	2.73	3.99	2.24	4.33	1.95	2.98	1.76
105年	7.70	4.65	6.44	3.29	7.60	4.52	4.56	2.68	5.11	3.07	4.93	3.01	4.00	1.96	3.34	1.85
<b>106年</b>	<b>6.17</b>	<b>3.51</b>	<b>4.95</b>	<b>2.51</b>	<b>6.34</b>	<b>3.59</b>	<b>4.42</b>	<b>2.47</b>	<b>5.41</b>	<b>3.00</b>	<b>4.28</b>	<b>2.57</b>	<b>4.31</b>	<b>1.88</b>	<b>4.20</b>	<b>2.35</b>

表51·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤		口腔癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
94年	205.00	148.15	43.81	30.08	34.69	26.89	23.85	16.86	18.40	12.46	10.37	6.14	8.96	6.51	10.37	8.18
95年	210.37	146.09	47.46	31.25	40.43	30.73	24.67	17.02	18.73	11.98	10.07	5.68	8.74	6.09	11.47	9.00
96年	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		口腔癌		胃癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	9.02	6.44	17.11	10.69	9.73	5.35	8.95	6.11
98年	211.03	134.11	47.09	28.32	35.47	24.25	24.57	15.19	10.75	7.48	16.04	9.38	11.22	5.88	10.82	6.77
99年	219.66	137.29	48.91	29.60	35.12	23.28	26.24	15.97	11.02	7.70	15.62	8.91	11.41	5.86	9.99	6.41
100年	216.55	132.95	50.34	30.02	37.34	24.12	25.60	15.83	10.40	7.26	15.05	8.67	10.40	5.12	8.74	5.44
101年	229.30	138.02	49.42	28.92	37.08	24.29	28.97	16.89	11.40	7.44	15.85	8.46	13.74	6.72	9.60	5.89
102年	221.64	130.87	47.37	26.87	37.67	23.37	27.80	16.17	13.59	9.10	14.68	7.83	12.04	5.87	9.55	5.59
103年	218.44	127.74	45.48	25.78	34.58	21.20	28.16	16.21	11.76	7.72	15.39	8.16	11.68	5.14	10.29	6.30
104年	220.37	127.13	45.46	25.93	33.11	19.76	27.86	15.56	12.43	8.20	14.28	7.92	12.58	5.97	10.81	6.52
105年	225.92	127.78	48.43	26.77	33.27	19.73	29.09	15.98	13.93	8.91	15.24	7.96	12.92	5.76	11.37	6.38
<b>106年</b>	<b>215.76</b>	<b>117.67</b>	<b>47.06</b>	<b>25.64</b>	<b>33.99</b>	<b>19.44</b>	<b>27.07</b>	<b>14.86</b>	<b>11.36</b>	<b>6.86</b>	<b>14.00</b>	<b>6.91</b>	<b>13.77</b>	<b>6.11</b>	<b>11.82</b>	<b>6.62</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬男性人口

年別	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
94年	9.04	7.40	8.03	5.72	5.46	4.02	4.60	3.50	3.51	2.20	4.60	3.67	2.49	2.11	1.56	1.04
95年	6.79	4.87	7.49	5.21	4.68	3.22	4.22	2.91	3.90	2.30	5.07	4.16	2.58	2.02	1.56	0.99
96年	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99
年別	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		膀胱癌		白血病		腎臟癌		鼻咽癌		腦癌		膽囊和其他 膽道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	8.40	5.90	5.96	3.65	4.47	2.62	5.96	4.28	2.04	1.37	4.79	3.61	2.04	1.86	2.43	1.62
98年	8.61	5.89	6.08	3.83	4.42	2.44	5.06	3.61	3.00	2.05	3.87	2.83	2.77	2.07	3.00	1.81
99年	9.12	6.19	8.09	4.61	4.99	2.63	5.15	3.38	3.09	1.93	4.44	2.99	3.25	2.40	2.38	1.64
100年	8.19	5.30	7.40	4.35	4.18	2.13	4.96	3.26	3.78	2.13	3.31	2.41	3.31	2.45	2.52	1.41
101年	9.92	6.46	6.71	4.13	4.29	1.98	5.54	3.72	2.89	1.69	4.37	2.97	3.44	2.54	3.12	1.97
102年	8.54	5.40	6.21	3.43	4.43	2.33	5.44	3.73	3.03	1.89	4.35	3.02	3.57	2.43	2.17	1.15
103年	9.59	6.04	7.12	4.12	5.11	2.60	4.25	2.91	2.48	1.44	4.80	3.28	2.32	1.78	3.48	2.09
104年	9.57	5.93	6.79	3.90	6.64	3.08	5.25	3.07	3.32	1.95	4.71	3.19	2.39	1.56	2.86	1.64
105年	8.36	5.13	7.58	4.09	5.88	3.11	5.42	3.38	2.79	1.52	3.48	2.28	2.71	2.10	2.79	1.49
<b>106年</b>	<b>8.09</b>	<b>4.81</b>	<b>5.60</b>	<b>2.88</b>	<b>6.14</b>	<b>2.72</b>	<b>5.13</b>	<b>3.02</b>	<b>2.49</b>	<b>1.25</b>	<b>2.96</b>	<b>1.94</b>	<b>3.03</b>	<b>1.77</b>	<b>2.57</b>	<b>1.29</b>



表52·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
94年	124.20	93.11	23.05	16.99	17.66	12.94	16.76	12.67	12.12	9.11	8.83	6.35	6.43	4.89	4.94	3.79
95年	128.65	92.46	22.48	15.97	16.08	11.23	15.56	11.37	13.70	9.88	9.16	6.31	6.03	4.26	4.69	3.44
96年	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		女性乳房癌		結腸、直腸和肛門癌		肝和肝內膽管癌		胰臟癌		胃癌		卵巢癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	130.86	87.54	24.78	16.27	16.87	11.66	17.31	11.20	15.76	10.79	5.77	3.76	6.95	4.47	4.29	2.96
98年	140.20	90.07	27.49	17.54	17.49	11.55	20.82	12.92	16.01	9.98	7.41	4.75	8.60	5.30	4.82	3.36
99年	137.69	85.62	27.60	16.36	19.68	12.87	17.68	10.57	14.87	9.27	6.29	3.86	8.14	4.62	4.88	3.21
100年	145.23	89.19	27.46	16.41	20.73	13.50	20.80	12.16	14.50	8.92	8.79	5.20	6.88	3.97	4.76	3.25
101年	147.98	88.40	27.87	16.31	17.59	10.88	20.05	11.11	16.07	9.11	7.89	4.57	9.12	5.32	6.37	4.09
102年	148.32	86.24	27.15	15.36	18.96	11.90	19.61	10.93	15.44	8.66	7.76	4.29	9.05	4.87	6.11	3.79
103年	148.33	83.12	28.82	15.72	20.62	12.73	21.55	11.34	15.62	8.23	8.85	4.80	8.06	4.26	5.99	3.60
104年	154.12	82.57	28.05	14.50	20.45	12.15	23.08	11.66	16.90	8.63	9.45	4.82	7.81	4.04	5.47	3.40
105年	163.31	85.94	31.54	15.98	21.45	12.52	21.24	10.44	17.19	8.52	8.03	4.09	8.10	4.05	7.60	4.52
<b>106年</b>	<b>162.99</b>	<b>83.14</b>	<b>30.56</b>	<b>14.70</b>	<b>23.01</b>	<b>13.39</b>	<b>22.94</b>	<b>10.72</b>	<b>15.74</b>	<b>7.43</b>	<b>10.12</b>	<b>4.97</b>	<b>6.98</b>	<b>3.37</b>	<b>6.34</b>	<b>3.59</b>

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
94年	4.86	3.55	3.74	2.76	3.74	2.88	3.07	2.58	1.65	1.33	1.57	1.20	1.87	1.63	0.75	0.52
95年	6.10	4.35	5.43	3.91	4.17	2.93	3.28	2.52	1.86	1.41	2.38	1.62	1.64	1.30	0.74	0.56
96年	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94
年別	子宮頸及部位未明示子宮癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		子宮體癌		腦癌		膀胱癌		間皮和軟組織癌		腎臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	5.55	3.62	4.07	2.73	3.33	2.61	2.07	1.42	1.70	1.32	1.70	1.05	1.92	1.35	1.63	1.05
98年	5.11	3.31	3.11	1.96	3.11	2.22	1.70	1.15	1.56	1.21	1.78	1.03	1.19	0.81	1.85	1.14
99年	5.25	3.39	3.70	2.25	3.11	2.19	2.15	1.46	2.07	1.75	2.37	1.32	0.67	0.39	1.85	1.12
100年	5.42	3.23	4.03	2.32	3.59	2.67	2.49	1.67	2.05	1.50	1.83	1.03	1.46	1.02	1.98	1.11
101年	4.56	2.87	4.42	2.61	2.82	2.11	2.53	1.53	2.03	1.84	2.17	1.16	2.10	1.72	1.59	0.90
102年	5.75	3.25	5.32	3.09	3.09	2.15	2.80	1.73	2.08	1.26	1.94	0.96	1.65	0.97	1.65	0.92
103年	4.14	2.27	4.49	2.57	3.07	1.81	2.50	1.48	1.78	1.51	1.93	0.95	2.35	1.53	1.78	1.00
104年	4.97	2.73	4.62	2.40	2.84	1.50	2.98	1.76	1.99	1.34	2.20	0.98	1.42	0.77	2.13	1.08
105年	5.11	3.07	5.40	2.59	4.48	2.69	3.34	1.85	1.92	1.33	2.27	1.02	1.85	1.05	2.34	1.20
<b>106年</b>	<b>5.41</b>	<b>3.00</b>	<b>4.35</b>	<b>2.20</b>	<b>3.49</b>	<b>2.23</b>	<b>4.20</b>	<b>2.35</b>	<b>2.49</b>	<b>1.56</b>	<b>2.64</b>	<b>1.17</b>	<b>2.64</b>	<b>1.58</b>	<b>2.21</b>	<b>1.05</b>

肆、歷年死因統計

二、行政區別死因統計



表53-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		797	375.45	416.72		960	466.52	338.51		1,024	494.61	338.43		963	461.29	311.91		1,011	480.96	304.56
08-14	惡性腫瘤	1	224	105.52	113.20	1	304	147.73	109.05	1	313	151.18	108.08	1	345	165.26	112.76	1	332	157.94	103.23
25-27-28*	心臟疾病	3	91	42.87	49.51	2	101	49.08	33.77	2	134	64.72	42.17	2	104	49.82	31.91	2	108	51.38	31.42
29	腦血管疾病	2	103	48.52	52.72	3	81	39.36	27.79	3	91	43.95	28.56	3	73	34.97	21.58	3	86	40.91	24.13
181	糖尿病	4	42	19.79	21.41	4	62	30.13	20.77	4	67	32.36	21.59	4	65	31.14	18.86	4	79	37.58	22.53
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.25	14.34	7	27	13.12	13.86	7	33	15.94	10.849	8	26	12.45	7.48	5	41	19.50	10.66
321	肺炎	6	27	12.72	14.99	5	42	20.41	12.21	5	41	19.80	12.18	7	28	13.41	7.73	6	37	17.60	8.94
E54	自殺	10	17	8.01	7.75	9	18	8.75	7.03	9	20	9.66	8.07	6	30	14.37	12.01	7	29	13.80	11.28
E47-E53	事故傷害	5	30	14.13	14.38	6	38	18.47	12.94	6	35	16.91	14.15	5	34	16.29	14.98	8	26	12.37	12.27
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	9.89	10.64	8	20	9.72	7.26	8	22	10.63	7.03	8	26	12.45	8.54	9	17	8.09	5.56
038	敗血症	12	7	3.30	3.52	12	9	4.37	3.10	11	10	4.83	3.01	15	3	1.44	0.92	10	14	6.66	3.41
	其他		209	98.45	114.26		258	125.38	90.73		258	124.62	82.74		229	109.69	75.15		242	115.13	71.13

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,057	502.04	305.11		1,085	521.10	285.11		1,218	582.24	307.51		1,189	565.04	287.52		1,239	588.25	288.15
C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34	90.74	1	352	169.06	99.86	1	386	184.52	109.51	1	369	175.36	96.84	1	389	184.69	101.25
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	140	66.50	37.91	2	145	69.64	34.19	2	165	78.88	36.65	2	160	76.04	34.94	2	139	65.99	32.19
J12-J18	肺炎	4	63	29.92	17.22	5	56	26.90	12.04	4	73	34.90	14.29	4	53	25.19	10.11	5	68	32.29	13.00
I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32	24.08	3	70	33.62	16.86	3	87	41.59	20.06	3	92	43.72	20.30	3	95	45.10	20.54
E10-E14	糖尿病	5	49	23.27	13.53	4	59	28.34	14.64	5	50	23.90	12.69	5	47	22.34	11.00	4	70	33.23	15.94
A40-A41	敗血症	6	46	21.85	12.07	8	28	13.45	7.27	6	42	20.08	9.57	6	38	18.06	8.06	9	34	16.14	6.31
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	31	14.72	8.71	7	30	14.41	7.66	7	36	17.21	8.52	10	29	13.78	6.51	6	50	23.74	11.25
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	27	12.82	6.32	6	32	15.37	6.79	9	29	13.86	6.22	8	33	15.68	5.89	8	39	18.52	7.34
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	27	1	0.47	0.20	15	8	3.84	1.51	11	20	9.56	3.29	15	10	4.75	1.67	12	15	7.12	2.37
I10-I15	高血壓性疾病	7	37	17.57	9.93	8	28	13.45	6.52	8	32	15.30	7.00	7	37	17.58	6.60	7	46	21.84	8.35
	其他		270	128.24	84.40		277	133.04	77.77		298	142.45	79.71		321	152.55	85.60		294	139.59	69.61

表53-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,237	587.91	282.34		1,314	625.44	292.93		1,357	649.22	294.60		1,315	633.26	277.91		1,351	654.73	281.89
C00-C97	惡性腫瘤	1	380	180.60	94.62	1	386	183.73	94.55	1	414	198.07	103.45	1	396	190.70	93.31	1	408	197.73	94.36
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	195	92.68	43.14	2	199	94.72	41.30	2	183	87.55	38.28	2	193	92.94	37.14	2	198	95.96	35.58
J12-J18	肺炎	4	70	33.27	14.19	3	101	48.07	17.06	3	108	51.67	17.81	3	115	55.38	18.76	3	147	71.24	22.28
I60-I69	腦血管疾病	3	91	43.25	18.27	4	92	43.79	17.52	4	93	44.49	18.64	4	82	39.49	16.03	4	95	46.04	19.58
E10-E14	糖尿病	5	62	29.47	13.07	6	48	22.85	10.35	5	55	26.31	9.98	5	52	25.04	10.70	5	52	25.20	8.33
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	39	18.54	7.65	10	26	12.38	5.14	8	36	17.22	6.87	7	40	19.26	7.41	6	33	15.99	5.48
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	35	16.63	5.68	5	52	24.75	8.89	7	43	20.57	7.57	8	36	17.34	5.59	7	30	14.54	4.88
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	20	9.51	7.72	11	23	10.95	8.40	15	17	8.13	6.46	13	16	7.71	6.44	8	29	14.05	12.78
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	26	12.36	7.73	12	22	10.47	7.57	9	35	16.74	12.31	11	24	11.56	6.83	9	22	10.66	6.83
A40-A41	敗血症	10	25	11.88	4.78	8	39	18.56	6.54	6	52	24.88	8.71	6	41	19.74	7.25	10	21	10.18	3.92
	其他		294	139.73	65.49		326	155.17	75.61		321	153.57	64.52		320	154.10	68.45		316	153.14	67.88

表53-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,176	479.31	492.27		1,331	569.90	390.54		1,366	589.70	386.92		1,271	549.91	341.85		1,363	592.17	355.26
08-14	惡性腫瘤	1	303	123.50	121.50	1	373	159.71	112.37	1	430	185.63	126.68	1	401	173.50	113.16	1	427	185.51	116.31
25-27-28*	心臟疾病	2	121	49.32	50.71	2	178	76.22	47.58	3	159	68.64	40.03	2	134	57.98	33.71	2	167	72.55	41.68
29	腦血管疾病	3	120	48.91	48.82	3	115	49.24	32.06	2	163	70.37	43.54	3	105	45.43	27.28	3	133	57.78	30.89
181	糖尿病	5	59	24.05	23.40	4	74	31.69	21.30	4	80	34.54	21.74	3	105	45.43	28.66	4	76	33.02	19.69
321	肺炎	6	48	19.56	20.44	6	52	22.27	13.10	5	51	22.02	12.46	5	61	26.39	13.52	5	65	28.24	14.85
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	9	33	13.45	13.33	5	59	25.26	16.94	6	50	21.58	13.21	6	45	19.47	11.14	6	40	17.38	10.28
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.67	14.26	9	32	13.70	10.13	8	31	13.38	19.42	9	23	9.95	7.05	7	29	12.60	8.38
E54	自殺	11	16	6.52	5.99	8	35	14.99	11.81	7	45	19.43	15.35	7	40	17.31	13.73	8	27	11.73	8.86
E47-E53	事故傷害	4	81	33.01	31.34	7	39	16.70	12.87	9	27	11.66	9.75	8	28	12.11	8.83	9	24	10.43	7.17
26	高血壓性疾病	8	34	13.86	14.56	10	21	8.99	5.56	10	18	7.77	5.02	10	17	7.36	3.49	10	15	6.52	3.79
	其他		325	132.46	147.92		353	151.15	106.82		312	134.69	79.72		312	134.99	81.28		360	156.40	93.36

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表53-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77	350.41		1,336	593.18	328.10		1,382	612.00	322.46		1,513	666.11	345.11		1,425	624.68	320.26
C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88	110.89	1	424	188.25	110.88	1	441	195.29	114.01	1	455	200.32	109.20	1	447	195.95	107.17
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	181	79.28	43.10	2	143	63.49	31.30	2	147	65.10	31.01	2	184	81.01	39.29	2	172	75.40	34.24
J12-J18	肺炎	4	87	38.10	19.25	3	93	41.29	17.91	4	87	38.53	17.35	4	94	41.38	17.44	4	76	33.32	13.20
I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37	27.10	4	82	36.41	17.83	3	93	41.18	20.10	3	99	43.59	21.34	3	103	45.15	19.20
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	47	20.59	11.95	6	45	19.98	10.29	9	36	15.94	7.57	8	52	22.89	11.17	6	49	21.48	10.04
E10-E14	糖尿病	5	51	22.34	12.74	5	56	24.86	13.88	7	49	21.70	11.33	5	63	27.74	15.04	5	70	30.69	14.99
A40-A41	敗血症	6	47	20.59	10.86	9	36	15.98	7.32	5	66	29.23	13.37	7	54	23.77	10.42	6	49	21.48	9.39
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	45	19.71	9.97	7	42	18.65	9.14	6	57	25.24	10.95	6	59	25.98	11.23	6	49	21.48	8.64
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	34	14.89	11.03	10	35	15.54	11.93	11	26	11.51	7.08	10	33	14.53	10.92	9	33	14.47	9.82
I10-I15	高血壓性疾病	9	41	17.96	9.81	12	32	14.21	8.07	8	40	17.71	8.54	9	47	20.69	9.14	10	29	12.71	5.83
	其他		297	130.08	83.71		348	154.51	89.55		340	150.56	81.15		373	164.22	89.92		348	152.55	87.74

表53-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,475	643.89	316.23		1,476	643.32	319.90		1,635	715.48	333.55		1,567	690.95	308.54		1,592	708.88	308.17
C00-C97	惡性腫瘤	1	433	189.02	104.37	1	436	190.03	102.25	1	488	213.55	109.72	1	445	196.22	95.89	1	464	206.61	98.29
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	191	83.38	39.14	2	176	76.71	34.50	2	224	98.02	44.76	2	237	104.50	43.78	2	266	118.44	47.69
J12-J18	肺炎	3	127	55.44	20.93	3	111	48.38	19.46	3	125	54.70	21.82	3	126	55.56	19.90	3	142	63.23	20.95
I60-I69	腦血管疾病	4	101	44.09	20.21	4	93	40.53	19.12	4	90	39.38	17.52	4	110	48.50	20.81	4	99	44.08	16.73
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	62	27.07	12.10	6	50	21.79	9.19	6	60	26.26	11.10	7	48	21.17	8.53	5	71	31.61	12.24
E10-E14	糖尿病	5	69	30.12	15.06	5	68	29.64	13.39	5	72	31.51	13.81	5	74	32.63	14.03	6	53	23.60	9.64
A40-A41	敗血症	8	48	20.95	9.08	10	36	15.69	6.30	7	57	24.94	8.98	11	32	14.11	5.03	7	43	19.15	7.60
J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	7	54	23.57	8.62	8	39	17.00	7.36	8	54	23.63	8.83	6	53	23.37	7.94	8	42	18.70	6.17
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	39	17.02	12.21	8	39	17.00	10.13	12	28	12.25	8.44	10	34	14.99	10.24	9	31	13.80	8.34
I10-I15	高血壓性 疾病	10	31	13.53	6.04	7	42	18.31	7.92	9	38	16.63	7.06	9	36	15.87	6.10	9	31	13.80	5.32
	其他		320	139.69	68.47		386	168.24	90.28		399	174.60	81.52		372	164.03	76.29		350	155.85	75.21

表53-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,416	424.70	386.23		1,584	506.42	319.61		1,638	524.39	311.95		1,546	493.66	282.16		1,598	508.03	276.93
08-14	惡性腫瘤	1	410	122.97	110.66	1	527	168.49	111.30	1	501	160.39	99.34	1	495	158.06	94.53	1	473	150.37	90.00
25-27-28*	心臟疾病	2	184	55.19	49.75	2	210	67.14	37.16	2	225	72.03	38.67	2	174	55.56	29.16	2	194	61.68	29.86
29	腦血管疾病	3	169	50.69	44.05	3	126	40.28	24.35	3	142	45.46	25.58	3	121	38.64	19.87	3	145	46.10	21.44
181	糖尿病	5	74	22.19	19.74	4	107	34.21	20.70	4	106	33.94	18.87	4	105	33.53	17.42	4	118	37.51	20.00
321	肺炎	6	49	14.70	13.12	6	51	16.31	8.49	5	89	28.49	13.64	6	46	14.69	6.57	5	78	24.80	10.89
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	45	13.50	12.67	5	63	20.14	11.99	6	78	24.97	13.24	5	58	18.52	10.25	6	61	19.39	9.48
E47-E53	事故傷害	4	80	23.99	22.73	7	43	13.75	12.35	7	44	14.09	11.96	8	37	11.81	10.00	7	37	11.76	8.98
E54	自殺	9	24	7.20	6.30	8	35	11.19	8.30	8	40	12.81	9.30	7	40	12.77	10.22	8	36	11.45	8.61
038	敗血症	12	10	3.00	2.79	12	11	3.52	2.03	14	6	1.92	0.86	11	22	7.02	3.41	9	25	7.95	3.58
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.60	5.76	9	25	7.99	5.42	9	30	9.60	6.77	8	37	11.81	7.33	10	22	6.99	3.78
	其他		349	104.68	98.66		386	123.41	77.52		377	120.69	73.73		411	131.24	73.39		409	130.03	70.31

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51	288.84		1,779	570.94	277.62		1,816	580.74	275.56		1,818	579.65	270.29		1,846	589.03	265.06
C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36	90.51	1	572	183.58	96.42	1	544	173.97	93.07	1	580	184.93	94.20	1	582	185.71	94.86
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	237	75.39	36.28	2	213	68.36	30.67	2	233	74.51	31.26	2	210	66.96	29.84	2	269	85.83	35.58
J12-J18	肺炎	4	92	29.26	11.80	4	108	34.66	13.68	4	100	31.98	11.50	4	96	30.61	10.66	4	89	28.40	8.98
I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67	20.32	3	129	41.40	17.92	3	129	41.25	17.14	3	153	48.78	20.61	3	136	43.40	16.86
E10-E14	糖尿病	5	74	23.54	12.29	5	78	25.03	11.66	5	79	25.26	10.76	6	70	22.32	9.47	5	87	27.76	11.66
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	63	20.04	8.79	7	48	15.40	5.64	6	72	23.02	8.60	7	68	21.68	7.68	6	72	22.97	8.55
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	55	17.49	8.53	9	45	14.44	6.70	9	51	16.31	6.38	9	60	19.13	7.70	10	43	13.72	5.16
A40-A41	敗血症	8	54	17.18	7.80	6	57	18.29	7.89	7	59	18.87	7.66	5	72	22.96	9.02	7	56	17.87	6.08
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	45	14.31	10.65	11	43	13.80	7.98	8	55	17.59	10.72	10	46	14.67	8.01	9	44	14.04	9.85
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	30	9.54	7.17	12	37	11.87	7.70	12	33	10.55	8.40	11	32	10.20	8.41	12	21	6.70	4.90
	其他		433	137.73	74.70		449	144.10	71.36		461	147.42	70.07		431	137.42	64.69		447	142.63	62.58

表53-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		2,054	655.12	289.90		1,962	626.09	259.39		2,090	669.27	275.35		2,060	662.94	263.06		2,092	676.13	266.08
C00-C97	惡性腫瘤	1	593	189.14	93.05	1	565	180.29	83.82	1	616	197.26	91.83	1	601	193.41	87.90	1	580	187.46	84.68
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	317	101.11	41.22	2	275	87.75	32.15	2	323	103.43	37.90	2	337	108.45	39.88	2	388	125.40	42.38
J12-J18	肺炎	4	120	38.27	13.38	4	128	40.85	13.41	3	128	40.99	12.73	3	157	50.52	15.29	3	170	54.94	15.72
I60-I69	腦血管疾病	3	148	47.20	19.41	3	139	44.36	16.37	4	120	38.43	14.57	4	144	46.34	16.19	4	147	47.51	15.87
E10-E14	糖尿病	5	96	30.62	12.21	5	80	25.53	9.71	5	90	28.82	11.05	5	81	26.07	9.27	5	65	21.01	7.11
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	85	27.11	9.44	7	71	22.66	7.81	7	59	18.89	6.29	9	46	14.80	4.22	6	63	20.36	6.06
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	58	18.50	6.53	6	72	22.98	8.81	6	78	24.98	8.92	6	64	20.60	6.77	7	54	17.45	6.51
A40-A41	敗血症	10	42	13.40	5.09	9	51	16.27	5.38	8	50	16.01	5.12	8	49	15.77	5.55	8	51	16.48	5.14
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	44	14.03	9.46	10	45	14.36	8.07	9	47	15.05	8.34	9	46	14.80	7.13	9	49	15.84	8.76
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13	26	8.29	7.63	15	21	6.70	6.13	10	36	11.53	8.02	13	25	8.05	5.83	10	45	14.54	11.55
	其他		525	167.45	72.48		515	164.34	67.73		543	173.88	70.57		510	164.13	65.02		480	155.14	62.30

表53-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		987	440.48	464.15		1,123	517.67	383.52		1,178	543.14	389.31		1,106	506.77	348.65		1,230	561.56	369.71
08-14	惡性腫瘤	1	289	128.97	131.63	1	370	170.56	126.90	1	374	172.44	123.37	1	351	160.83	110.34	1	384	175.32	114.11
25-27-28*	心臟疾病	2	124	55.34	58.98	2	154	70.99	50.46	2	146	67.32	45.60	2	138	63.23	42.24	2	147	67.11	42.14
29	腦血管疾病	3	106	47.31	50.82	3	83	38.26	27.41	3	102	47.03	31.46	3	105	48.11	30.71	3	109	49.76	32.01
181	糖尿病	5	47	20.98	21.96	4	71	32.73	23.36	4	91	41.96	28.41	4	71	32.53	21.35	4	86	39.26	24.71
321	肺炎	7	32	14.28	16.79	5	35	16.13	11.39	5	49	22.59	15.23	6	48	21.99	13.75	5	67	30.59	19.15
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	25	11.16	12.71	7	31	14.29	10.64	7	36	16.60	11.06	7	27	12.37	8.36	6	44	20.09	12.40
E47-E53	事故傷害	4	64	28.56	27.70	9	27	12.45	10.51	8	33	15.22	13.40	8	23	10.54	10.43	7	31	14.15	12.47
E54	自殺	10	20	8.93	7.81	5	35	16.13	12.80	6	44	20.29	17.34	5	49	22.45	18.01	8	29	13.24	10.66
347	慢性肝病及肝硬化	6	37	16.51	16.04	8	30	13.83	10.25	9	27	12.45	9.08	9	22	10.08	7.12	9	23	10.50	7.34
038	敗血症	15	4	1.79	2.11	12	5	2.30	1.58	10	15	6.92	4.44	11	11	5.04	3.61	10	21	9.59	6.23
	其他		239	106.66	117.60		282	129.99	98.22		261	120.34	89.92		261	119.59	82.73		289	131.94	88.49

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,264	578.06	365.58		1,261	575.31	338.60		1,341	603.74	344.73		1,412	626.49	346.62		1,350	592.87	320.24
C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70	114.39	1	402	183.41	110.80	1	418	188.19	111.16	1	430	190.79	112.43	1	412	180.94	103.00
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	167	76.37	45.89	2	145	66.15	35.98	2	156	70.23	36.66	2	153	67.89	36.01	2	173	75.98	40.31
J12-J18	肺炎	4	70	32.01	18.02	4	73	33.31	17.01	4	73	32.87	15.31	4	78	34.61	15.94	4	76	33.38	15.08
I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22	31.21	3	89	40.60	22.88	3	101	45.47	23.70	3	96	42.59	21.64	3	88	38.65	19.42
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	36	16.46	9.55	6	46	20.99	11.43	9	35	15.76	8.84	6	59	26.18	14.46	10	33	14.49	7.41
E10-E14	糖尿病	5	69	31.56	19.49	5	63	28.74	15.36	5	66	29.71	16.69	5	75	33.28	18.00	5	65	28.55	15.01
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	18	8.23	6.75	9	34	15.51	12.55	11	31	13.96	9.25	10	38	16.86	11.08	7	52	22.84	14.73
I10-I15	高血壓性疾病	11	25	11.43	6.27	12	30	13.69	6.59	7	37	16.66	8.58	7	54	23.96	11.71	6	57	25.03	12.51
A40-A41	敗血症	7	37	16.92	9.68	7	42	19.16	10.53	6	61	27.46	14.48	8	51	22.63	11.03	9	36	15.81	8.36
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	30	13.72	7.78	11	31	14.14	6.90	7	37	16.66	8.08	9	46	20.41	9.97	7	52	22.84	10.29
	其他		318	145.43	96.55		306	139.61	88.57		326	146.77	91.98		332	147.31	84.35		306	134.38	74.12

表53-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,431	623.19	331.74		1,416	613.19	316.50		1,527	660.19	318.27		1,542	667.59	322.93		1,595	693.23	321.10
C00-C97	惡性腫瘤	1	427	185.96	103.84	1	424	183.61	101.41	1	486	210.12	110.82	1	467	202.18	103.96	1	464	201.67	100.03
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	208	90.58	47.38	2	179	77.52	39.13	2	220	95.12	43.09	2	250	108.24	46.02	2	265	115.18	49.75
J12-J18	肺炎	4	74	32.23	14.80	4	83	35.94	15.37	3	119	51.45	21.68	3	131	56.72	22.13	3	148	64.32	25.02
I60-I69	腦血管疾病	3	101	43.98	22.72	3	94	40.71	19.04	4	90	38.91	16.02	4	106	45.89	21.22	4	90	39.12	17.20
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	47	20.47	9.35	6	50	21.65	9.96	7	43	18.59	8.27	6	49	21.21	9.25	5	70	30.42	12.67
E10-E14	糖尿病	5	68	29.61	15.11	5	58	25.12	11.55	5	68	29.40	12.97	5	52	22.51	9.71	6	63	27.38	12.79
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	27	11.76	7.11	8	42	18.19	13.30	9	38	16.43	9.16	8	42	18.18	12.50	7	49	21.30	12.47
I10-I15	高血壓性 疾病	8	42	18.29	8.27	9	39	16.89	7.40	11	33	14.27	6.77	10	32	13.85	6.45	8	38	16.52	7.19
A40-A41	敗血症	9	37	16.11	7.33	10	36	15.59	6.57	6	45	19.46	8.72	9	41	17.75	7.26	9	37	16.08	6.61
J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	6	53	23.08	10.20	7	49	21.22	8.48	8	39	16.86	7.03	6	49	21.21	8.13	9	37	16.08	6.06
	其他		347	151.12	85.63		362	156.76	84.29		346	149.59	73.74		323	139.84	76.30		334	145.17	71.30



表53-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		786	454.91	404.71		858	539.48	342.76		892	564.88	349.02		843	533.65	316.60		874	549.53	305.47
08-14	惡性腫瘤	1	244	141.22	125.31	1	245	154.05	101.80	1	282	178.58	117.47	1	267	169.02	105.69	1	258	162.22	96.45
25-27-28*	心臟疾病	3	77	44.57	38.37	2	113	71.05	41.02	2	102	64.59	37.30	2	80	50.64	26.31	2	86	54.07	27.11
29	腦血管疾病	2	86	49.77	43.48	3	89	55.96	32.15	3	88	55.73	34.22	3	62	39.25	21.31	3	75	47.16	23.89
181	糖尿病	4	39	22.57	19.47	4	59	37.10	23.32	4	58	36.73	21.53	4	53	33.55	18.87	4	58	36.47	19.78
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	20	11.58	10.08	5	34	21.38	12.02	7	23	14.57	7.59	6	31	19.62	11.00	5	52	32.70	16.17
321	肺炎	7	27	15.63	14.22	6	24	15.09	7.71	5	30	19.00	10.17	5	51	32.28	15.33	6	38	23.89	11.51
E47-E53	事故傷害	5	32	18.52	17.29	8	21	13.20	9.44	6	24	15.20	13.39	8	25	15.83	13.12	7	25	15.72	12.26
E54	自殺	11	8	4.63	4.35	7	22	13.83	11.94	8	19	12.03	9.39	9	24	15.19	14.32	8	22	13.83	11.16
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	15.63	14.81	8	21	13.20	9.72	9	18	11.40	7.39	7	26	16.46	8.94	9	17	10.69	7.29
26	高血壓性疾病	6	30	17.36	15.38	10	11	6.92	3.65	10	10	6.33	3.06	10	14	8.86	4.73	10	10	6.29	2.79
	其他		196	113.44	101.95		219	137.70	89.99		238	150.72	87.49		210	132.94	76.99		233	146.50	77.06

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		957	600.33	331.54		885	556.10	290.83		957	596.29	307.13		999	617.42	308.90		892	548.43	264.45
C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07	111.73	1	278	174.68	99.77	1	263	163.87	93.15	1	305	188.50	106.54	1	248	152.48	79.50
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	127	79.67	42.36	2	103	64.72	34.02	2	118	73.52	35.53	2	129	79.73	35.84	2	121	74.39	35.70
J12-J18	肺炎	4	70	43.91	19.59	4	51	32.05	12.28	4	52	32.40	13.63	4	71	43.88	17.63	3	76	46.73	16.61
I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54	21.19	3	56	35.19	17.22	3	54	33.65	16.20	3	73	45.12	19.35	4	57	35.05	15.18
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	35	21.96	10.66	10	18	11.31	5.39	6	31	19.32	8.56	8	32	19.78	9.49	6	31	19.06	8.02
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	22	13.80	6.08	9	21	13.20	4.97	8	30	18.69	7.82	8	32	19.78	7.95	6	31	19.06	8.15
I10-I15	高血壓性疾病	10	19	11.92	5.90	5	41	25.76	11.40	10	27	16.82	7.85	5	42	25.96	11.46	9	23	14.14	6.39
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	13.17	11.18	13	15	9.43	5.56	8	30	18.69	11.84	10	24	14.83	10.38	8	24	14.76	9.22
E10-E14	糖尿病	7	30	18.82	10.26	7	32	20.11	9.59	5	38	23.68	12.14	7	39	24.10	10.72	5	47	28.90	13.51
A40-A41	敗血症	5	41	25.72	12.83	6	36	22.62	9.46	6	31	19.32	8.79	5	42	25.96	12.71	10	21	12.91	4.99
	其他		218	136.75	79.76		234	147.04	81.17		283	176.33	91.62		210	129.79	66.83		213	130.96	67.18

表53-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,093	669.47	321.84		1,097	673.29	314.63		1,088	673.94	307.29		1,052	657.48	285.57		1,043	654.72	291.54
C00-C97	惡性腫瘤	1	291	178.24	95.13	1	317	194.56	100.26	1	314	194.50	102.13	1	295	184.37	91.80	1	298	187.06	92.71
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	179	109.64	49.31	2	148	90.84	39.66	2	151	93.53	37.73	2	167	104.37	41.79	2	157	98.55	37.03
J12-J18	肺炎	4	78	47.78	17.15	3	77	47.26	17.86	4	67	41.50	14.43	3	77	48.12	16.72	3	91	57.12	19.50
I60-I69	腦血管疾病	3	94	57.58	25.41	4	67	41.12	18.43	3	79	48.93	19.99	3	77	48.12	19.73	4	70	43.94	16.30
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	33	20.21	8.65	9	29	17.80	7.34	7	36	22.30	8.62	6	41	25.62	9.50	5	44	27.62	10.16
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	33	20.21	8.31	6	48	29.46	10.52	6	40	24.78	9.15	7	38	23.75	7.41	6	32	20.09	6.66
I10-I15	高血壓性疾病	10	28	17.15	6.58	8	31	19.03	6.93	12	18	11.15	5.51	9	25	15.62	5.97	7	29	18.20	7.70
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	29	17.76	10.02	10	28	17.19	12.65	9	30	18.58	14.16	12	16	10.00	6.69	8	26	16.32	8.91
E10-E14	糖尿病	5	45	27.56	12.75	5	51	31.30	14.19	5	54	33.45	14.41	5	46	28.75	12.03	8	26	16.32	6.97
A40-A41	敗血症	8	31	18.99	8.84	7	35	21.48	8.74	8	32	19.82	7.48	8	27	16.87	5.29	10	23	14.44	5.56
	其他		252	154.35	79.69		266	163.26	78.05		267	165.39	73.69		243	151.87	68.65		247	155.05	80.04

表53-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		733	536.47	552.72		766	593.91	430.17		867	679.14	490.25		802	632.16	431.17		810	640.19	415.86
08-14	惡性腫瘤	1	230	168.33	172.79	1	205	158.94	119.59	1	228	178.60	130.70	1	273	215.19	148.40	1	259	204.70	136.29
25-27-28*	心臟疾病	2	73	53.43	55.15	2	89	69.01	47.71	2	95	74.42	46.89	2	96	75.67	49.95	2	94	74.29	48.80
29	腦血管疾病	3	72	52.70	53.79	3	73	56.60	39.88	3	89	69.72	50.44	4	55	43.35	27.79	3	68	53.74	34.48
181	糖尿病	4	48	35.13	36.22	4	60	46.52	33.65	4	63	49.35	34.45	3	56	44.14	29.38	4	50	39.52	24.78
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	30	21.96	22.93	5	33	25.59	18.87	5	42	32.90	23.19	6	25	19.71	13.26	5	35	27.66	17.33
321	肺炎	8	22	16.10	16.94	6	32	24.81	16.63	7	25	19.58	12.88	5	29	22.86	14.12	6	29	22.92	13.40
E47-E53	事故傷害	5	47	34.40	33.69	8	20	15.51	11.96	8	24	18.80	17.98	8	20	15.76	13.61	7	24	18.97	14.65
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.30	18.40	7	21	16.28	12.64	9	22	17.23	12.65	10	10	7.88	5.50	7	24	18.97	12.70
E54	自殺	11	10	7.32	7.33	9	19	14.73	12.08	6	30	23.50	19.84	7	22	17.34	14.17	9	18	14.23	11.77
038	敗血症	10	12	8.78	9.53	12	6	4.65	3.16	10	18	14.10	8.75	9	11	8.67	5.50	10	13	10.27	5.58
	其他		164	120.03	125.95		208	161.27	114.00		231	180.95	132.47		205	161.59	109.48		196	154.91	96.08

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		893	712.17	452.82		806	650.00	378.19		859	683.81	392.95		926	725.00	414.81		889	687.47	383.25
C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93	139.52	1	255	205.65	125.45	1	244	194.24	117.42	1	288	225.48	133.64	1	282	218.07	124.15
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	118	94.11	58.79	2	83	66.94	37.30	2	98	78.01	43.23	2	142	111.18	60.86	2	125	96.66	53.92
J12-J18	肺炎	4	61	48.65	27.90	4	49	39.52	19.33	4	56	44.58	23.36	5	40	31.32	14.99	5	47	36.35	18.59
I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84	30.62	3	58	46.77	24.92	3	61	48.56	25.54	3	65	50.89	27.40	3	59	45.63	23.66
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	16.75	11.45	10	17	13.71	10.58	10	20	15.92	10.46	10	21	16.44	12.21	10	16	12.37	10.28
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	23	18.34	11.73	7	28	22.58	12.11	7	26	20.70	11.24	8	25	19.57	10.32	8	25	19.33	9.79
E10-E14	糖尿病	5	55	43.86	28.02	5	43	34.68	19.34	5	48	38.21	21.30	4	41	32.10	17.49	4	49	37.89	20.13
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	26	20.74	11.40	8	23	18.55	9.43	8	25	19.90	10.53	7	30	23.49	11.44	6	32	24.75	11.79
A40-A41	敗血症	6	32	25.52	14.71	6	32	25.81	14.64	6	39	31.05	15.90	6	34	26.62	13.91	7	29	22.43	12.18
I10-I15	高血壓性疾病	9	21	16.75	10.00	12	15	12.10	6.41	9	22	17.51	8.53	12	15	11.74	6.33	9	20	15.47	8.31
	其他		204	162.69	108.68		203	163.71	98.68		220	175.13	105.44		225	176.16	106.22		205	158.53	90.45

表53-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		843	646.49	350.58		986	752.95	400.99		963	737.93	393.81		998	769.62	382.60		987	768.38	375.54
C00-C97	惡性腫瘤	1	236	180.99	102.39	1	300	229.09	127.23	1	270	206.90	111.16	1	298	229.81	120.04	1	303	235.89	121.22
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	139	106.60	54.84	2	151	115.31	60.97	2	150	114.94	59.19	2	155	119.53	56.46	2	169	131.57	59.36
J12-J18	肺炎	4	53	40.65	19.56	4	57	43.53	21.09	4	68	52.11	25.44	3	88	67.86	29.21	3	80	62.28	24.92
I60-I69	腦血管疾病	3	55	42.18	22.03	3	75	57.27	27.91	3	72	55.17	27.93	4	68	52.44	25.41	4	55	42.82	20.66
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	20	15.34	8.96	9	25	19.09	11.90	8	27	20.69	13.33	8	24	18.51	14.79	5	35	27.25	17.60
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	25	19.17	9.23	5	43	32.84	16.42	6	30	22.99	10.70	5	43	33.16	15.35	5	35	27.25	11.70
E10-E14	糖尿病	5	45	34.51	18.52	5	43	32.84	16.08	5	43	32.95	16.85	7	33	25.45	12.42	7	31	24.13	10.27
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	41	31.44	14.75	7	29	22.15	9.40	6	30	22.99	10.29	6	34	26.22	11.38	8	26	20.24	10.07
A40-A41	敗血症	9	20	15.34	7.72	7	29	22.15	10.00	9	26	19.92	9.16	8	24	18.51	7.59	9	22	17.13	7.30
I10-I15	高血壓性疾 病	8	23	17.64	8.04	11	18	13.75	6.03	10	21	16.09	7.66	14	10	7.71	3.38	10	20	15.57	6.49
	其他		186	142.64	84.54		216	164.95	93.96		226	173.18	102.11		221	170.43	86.56		211	132.45	85.95

表53-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,094	506.93	512.04		1,391	699.50	473.22		1,454	741.48	472.87		1,428	733.02	451.74		1,493	770.88	449.83
08-14	惡性腫瘤	1	270	125.11	121.67	1	414	208.19	142.34	1	431	219.79	142.95	1	427	219.19	140.31	1	458	236.48	142.80
25-27-28*	心臟疾病	2	136	63.02	66.08	2	160	80.46	52.18	2	142	72.41	43.14	2	149	76.48	44.31	2	160	82.61	48.02
29	腦血管疾病	3	127	58.85	59.62	3	125	62.86	39.07	3	139	70.88	43.19	3	138	70.84	41.15	3	126	65.06	37.54
181	糖尿病	5	57	26.41	26.00	4	92	46.26	30.19	4	113	57.63	36.08	4	119	61.08	36.71	4	109	56.28	31.57
321	肺炎	8	30	13.90	15.91	8	43	21.62	12.59	5	60	30.60	16.82	6	49	25.15	12.86	5	87	44.92	21.89
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	35	16.22	16.24	6	54	27.16	17.23	7	45	22.95	13.06	5	58	29.77	17.75	6	63	32.53	16.74
347	慢性肝病及肝硬化	6	43	19.93	19.40	7	53	26.65	20.28	9	28	14.28	9.28	8	35	17.97	12.60	7	42	21.69	13.72
E54	自殺	11	19	8.80	8.27	9	33	16.59	13.23	6	58	29.58	23.44	6	49	25.15	19.60	8	37	19.10	14.47
E47-E53	事故傷害	4	73	33.83	32.04	5	60	30.17	25.38	8	37	18.87	15.47	9	32	16.43	13.17	9	34	17.56	13.70
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	9	24	11.12	10.43	13	11	5.53	3.69	11	16	8.16	4.86	13	7	3.59	1.92	10	14	7.23	3.76
	其他		280	129.74	136.38		346	174.00	117.04		385	196.33	124.58		365	187.36	111.37		363	187.43	105.62

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68	450.30		1,525	807.87	433.84		1,578	830.63	426.38		1,616	842.80	427.68		1,604	830.86	409.75
C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83	122.62	1	446	236.27	132.66	1	426	224.24	121.90	1	448	233.65	127.77	1	464	240.35	128.59
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	203	106.05	56.99	2	167	88.47	45.11	2	185	97.38	45.99	2	207	107.96	50.58	2	215	111.37	49.65
J12-J18	肺炎	3	111	57.99	28.01	4	107	56.68	25.11	4	110	57.90	24.84	4	102	53.20	21.15	5	85	44.03	17.24
I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29	28.82	3	114	60.39	30.20	3	116	61.06	31.08	3	121	63.11	30.02	3	123	63.71	28.28
E10-E14	糖尿病	5	88	45.97	24.11	5	86	45.56	23.81	5	108	56.85	27.65	5	90	46.94	22.73	4	88	45.58	21.54
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	50	26.12	12.13	10	39	20.66	9.26	6	62	32.64	13.30	6	66	34.42	14.17	7	57	29.53	11.93
I10-I15	高血壓性疾病	11	39	20.37	9.94	7	49	25.96	12.67	7	57	30.00	13.98	7	61	31.81	15.24	6	60	31.08	13.48
A40-A41	敗血症	9	46	24.03	11.95	6	60	31.79	14.88	9	44	23.16	10.08	8	58	30.25	12.72	9	43	22.27	9.47
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	61	31.87	16.89	8	48	25.43	12.97	8	50	26.32	12.08	9	43	22.43	11.20	8	45	23.31	10.51
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	45	23.51	17.52	11	33	17.48	14.37	12	34	17.90	11.84	9	43	22.43	15.38	10	42	21.76	13.41
	其他		363	189.64	121.32		376	199.19	112.80		386	203.18	113.64		377	196.62	106.72		382	197.87	105.65



表53-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,651	850.60	405.16		1,716	882.14	412.09		1,743	898.74	413.96		1,666	864.58	383.17		1,768	926.98	394.23
C00-C97	惡性腫瘤	1	458	235.96	121.04	1	459	235.96	120.66	1	456	235.13	117.14	1	438	227.30	113.66	1	468	245.38	114.65
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	253	130.35	59.90	2	268	137.77	60.94	2	277	142.83	62.50	2	289	149.98	60.40	2	315	165.16	64.63
J12-J18	肺炎	3	108	55.64	21.57	3	126	64.77	23.98	3	137	70.64	27.55	3	128	66.43	22.44	3	165	86.51	28.44
I60-I69	腦血管疾病	3	108	55.64	23.79	4	119	61.17	25.82	4	129	66.52	28.18	4	113	58.64	24.06	4	110	57.67	22.37
E10-E14	糖尿病	5	100	51.52	24.77	5	92	47.29	21.97	5	96	49.50	21.90	5	80	41.52	18.36	5	87	45.62	20.01
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	61	31.43	10.63	6	67	34.44	11.34	7	66	34.03	14.30	6	67	34.77	12.41	6	51	26.74	8.60
I10-I15	高血壓性疾病	9	49	25.25	10.47	10	49	25.19	10.62	8	42	21.66	9.51	10	38	19.72	7.43	7	49	25.69	10.13
A40-A41	敗血症	10	43	22.15	8.32	8	52	26.73	9.96	9	39	20.11	8.49	9	43	22.32	8.76	7	49	25.69	9.63
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	66	34.00	14.98	7	54	27.76	11.30	6	68	35.06	15.06	7	63	32.69	13.08	9	48	25.17	9.45
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	52	26.79	16.86	8	52	26.73	17.56	10	37	19.08	11.76	8	53	27.50	17.49	10	40	20.97	10.10
	其他		353	181.87	92.83		378	194.32	97.94		396	204.19	97.57		354	183.71	85.10		386	202.38	96.23

表53-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,041	461.94	512.44		1,277	496.35	392.35		1,297	501.74	377.83		1,301	500.03	360.44		1,402	536.05	368.85
08-14	惡性腫瘤	1	274	121.59	129.12	1	406	157.81	128.43	1	384	148.55	113.36	1	411	157.96	117.84	1	411	157.15	113.05
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.16	47.41	2	165	64.13	48.62	2	148	57.25	40.41	2	133	51.12	33.87	2	168	64.23	42.38
29	腦血管疾病	2	121	53.69	58.88	3	133	51.70	39.73	3	113	43.71	31.45	3	119	45.74	31.14	3	116	44.35	29.52
181	糖尿病	5	70	31.06	33.39	4	79	30.71	22.83	4	79	30.56	23.60	4	71	27.29	19.76	4	84	32.12	20.84
321	肺炎	8	30	13.31	16.05	6	41	15.94	10.85	5	57	22.05	14.27	5	59	22.68	14.74	5	74	28.29	16.39
E54	自殺	12	11	4.88	4.77	7	35	13.60	12.05	7	44	17.02	14.99	7	42	16.14	13.27	6	51	19.50	15.91
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	43	19.08	20.79	5	42	16.32	12.41	6	51	19.73	13.80	6	49	18.83	13.21	7	47	17.97	12.11
E47-E53	事故傷害	4	88	39.05	40.11	9	27	10.49	9.97	8	42	16.25	14.70	8	33	12.68	10.79	8	35	13.38	11.25
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	12.87	13.43	8	30	11.66	9.72	9	29	11.22	8.88	9	27	10.38	8.25	9	29	11.09	8.64
038	敗血症	14	9	3.99	4.61	13	7	2.72	1.96	11	15	5.80	4.05	11	17	6.53	4.51	10	20	7.65	4.55
	其他		271	120.25	143.88		312	121.27	95.78		335	129.59	98.32		340	130.68	93.04		367	140.32	94.21

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39	355.06		1,454	555.84	338.70		1,551	586.67	340.24		1,619	604.38	349.18		1,514	560.07	319.09
C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79	118.80	1	417	159.41	103.33	1	449	169.83	106.17	1	486	181.43	114.23	1	403	149.08	93.22
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	188	71.84	44.69	2	150	57.34	32.62	2	193	73.00	41.56	2	171	63.84	34.40	2	201	74.35	38.66
J12-J18	肺炎	4	86	32.86	19.04	4	86	32.88	17.27	4	90	34.04	15.64	4	103	38.45	18.42	4	96	35.51	17.02
I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98	24.05	3	103	39.37	22.01	3	125	47.28	27.89	3	125	46.66	25.55	3	122	45.13	24.50
E10-E14	糖尿病	5	60	22.93	14.47	5	80	30.58	17.62	5	81	30.64	17.71	5	81	30.24	17.29	5	91	33.66	18.89
A40-A41	敗血症	7	45	17.20	11.44	9	41	15.67	9.43	7	67	25.34	12.56	9	57	21.28	11.23	7	59	21.83	10.51
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	46	17.58	11.13	8	53	20.26	11.99	9	42	15.89	8.55	8	58	21.65	11.96	8	54	19.98	10.97
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	38	14.52	8.46	6	63	24.08	12.15	6	71	26.86	12.89	6	66	24.64	11.30	9	45	16.65	8.41
I10-I15	高血壓性疾 病	10	35	13.37	8.59	6	63	24.08	13.61	8	59	22.32	11.22	7	61	22.77	11.71	6	61	22.57	10.82
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	41	15.67	13.19	11	32	12.23	10.01	10	37	14.00	10.78	10	41	15.31	9.21	10	39	14.43	9.53
	其他		321	122.66	81.20		366	139.91	88.66		337	127.47	75.27		370	138.12	83.88		343	126.88	76.56

表53-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,678	615.48	342.44		1,617	588.76	307.80		1,809	657.10	338.63		1,654	601.83	303.54		1,675	611.11	300.33
C00-C97	惡性腫瘤	1	462	169.46	102.13	1	453	164.94	95.06	1	485	176.17	99.56	1	427	155.37	86.51	1	452	164.91	90.69
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	236	86.56	45.71	2	229	83.38	40.74	2	283	102.80	49.25	2	246	89.51	42.65	2	297	108.36	47.97
J12-J18	肺炎	3	117	42.92	19.61	3	119	43.33	18.06	3	133	48.31	20.79	3	153	55.67	22.62	3	155	56.55	22.15
I60-I69	腦血管疾病	4	109	39.98	21.44	4	95	34.59	17.82	4	128	46.49	22.26	4	104	37.84	17.85	4	97	35.39	16.54
E10-E14	糖尿病	5	82	30.08	16.46	5	70	25.49	12.39	6	73	26.52	13.65	5	65	23.65	11.52	5	79	28.82	13.25
A40-A41	敗血症	8	59	21.64	10.54	8	52	18.93	8.66	8	59	21.43	9.22	7	51	18.56	8.91	6	61	22.26	10.61
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	66	24.21	12.28	6	63	22.94	11.38	7	67	24.34	12.55	9	47	17.10	8.49	7	55	20.07	9.36
J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	7	65	23.84	10.14	7	62	22.57	9.79	5	74	26.88	12.17	6	61	22.20	8.61	8	47	17.15	6.85
I10-I15	高血壓性 疾病	10	39	14.31	6.01	9	45	16.38	8.71	9	52	18.89	8.85	10	45	16.37	7.71	9	45	16.42	7.14
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	52	19.07	12.02	10	38	13.84	8.47	10	48	17.44	10.89	8	50	18.19	12.74	10	38	13.86	8.57
	其他		391	143.42	86.10		391	142.37	76.72		407	147.84	79.45		405	147.37	75.92		349	127.33	67.21

表53-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死人	亡數	死亡率	標準化死亡率
01-56	所有死亡原因		469	415.37	546.64		567	501.54	440.30		587	519.39	432.63		649	573.55	463.19		596	525.17	407.61
08-14	惡性腫瘤	1	139	123.11	156.95	1	193	170.72	146.42	1	186	164.58	138.32	1	206	182.05	149.20	1	195	171.83	132.30
25-27-28*	心臟疾病	3	43	38.08	53.74	2	78	68.99	60.74	2	66	58.40	48.04	2	68	60.09	47.94	2	64	56.39	41.90
29	腦血管疾病	2	49	43.40	59.01	3	48	42.46	36.54	3	55	48.67	38.94	3	61	53.91	41.50	3	60	52.87	39.39
181	糖尿病	5	27	23.91	30.41	4	34	30.07	26.64	4	44	38.93	32.92	4	41	36.23	28.65	4	27	23.79	17.44
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	8	7.09	9.02	6	22	19.46	16.67	7	23	20.35	16.87	8	17	15.02	11.78	5	25	22.03	15.92
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	20.37	24.52	7	17	15.04	13.32	9	10	8.85	7.83	9	15	13.26	10.66	6	22	19.39	14.95
E47-E53	事故傷害	4	32	28.34	30.47	5	30	26.54	24.59	5	25	22.12	20.42	5	30	26.51	23.81	7	19	16.74	17.59
E54	自殺	8	11	9.74	10.82	8	13	11.50	10.27	6	24	21.24	17.91	5	30	26.51	21.67	8	14	12.34	10.40
321	肺炎	13	7	6.20	9.81	9	10	8.85	7.46	8	11	9.73	7.74	7	28	24.74	18.57	8	14	12.34	8.60
038	敗血症	14	5	4.43	6.19	11	3	2.65	2.41	12	5	4.42	3.87	11	7	6.19	5.30	10	10	8.81	6.31
	其他		125	110.71	155.70		119	105.26	95.24		138	122.11	99.76		146	129.03	104.10		146	128.65	102.81

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24	404.97		704	619.79	424.60		662	575.27	384.04		703	599.26	389.06		689	578.40	365.11
C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60	121.11	1	215	189.28	134.00	1	195	169.45	116.63	1	222	189.24	127.96	1	226	189.72	128.04
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	75	65.97	44.97	2	74	65.15	43.64	2	91	79.08	50.10	2	83	70.75	45.08	2	85	71.36	42.12
J12-J18	肺炎	3	58	51.01	35.70	4	44	38.74	23.58	4	43	37.37	22.15	4	48	40.92	22.37	4	43	36.10	19.21
I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74	32.00	3	54	47.54	32.10	3	48	41.71	26.24	3	52	44.33	27.32	3	62	52.05	29.15
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	9	19	16.71	12.35	7	25	22.01	14.46	7	19	16.51	10.35	12	17	14.49	9.71	11	13	10.91	6.96
E10-E14	糖尿病	5	31	27.27	20.03	6	33	29.05	19.03	5	36	31.28	20.87	5	39	33.24	20.86	5	32	26.86	17.24
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	20	17.59	11.63	5	37	32.57	20.48	6	28	24.33	14.96	7	28	23.87	15.04	7	20	16.79	8.93
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	24	21.11	17.83	8	21	18.49	15.80	9	17	14.77	11.79	11	18	15.34	10.17	10	14	11.75	10.07
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	11	15	13.19	9.75	9	19	16.73	12.41	9	17	14.77	11.31	9	19	16.20	11.20	7	20	16.79	10.96
A40-A41	敗血症	9	19	16.71	11.78	10	18	15.85	10.45	7	19	16.51	10.58	6	29	24.72	15.03	6	21	17.63	10.68
	其他		130	114.34	87.82		164	144.38	98.65		149	129.48	89.06		148	126.16	84.32		153	128.44	81.75

表53-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		744	617.40	379.17		722	593.01	361.83		780	637.36	373.37		721	589.36	327.93		821	673.43	375.89
C00-C97	惡性腫瘤	1	228	189.20	122.64	1	231	189.73	120.52	1	213	174.05	107.15	1	204	166.75	97.93	1	280	229.67	132.46
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	94	78.01	44.88	2	108	88.71	53.42	2	122	99.69	55.93	2	116	94.82	50.79	2	108	88.59	43.28
J12-J18	肺炎	4	46	38.17	20.77	4	43	35.32	17.58	3	55	44.94	22.80	3	54	44.14	23.35	3	58	47.58	21.66
I60-I69	腦血管疾病	3	70	58.09	34.78	3	51	41.89	23.28	3	55	44.94	24.21	3	54	44.14	23.43	4	57	46.75	24.57
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	23	19.09	11.18	5	35	28.75	15.47	8	25	20.43	11.47	7	21	17.17	8.69	5	29	23.79	12.56
E10-E14	糖尿病	5	39	32.36	19.71	6	28	23.00	14.16	5	35	28.60	16.50	5	27	22.07	11.20	6	28	22.97	11.34
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	25	20.75	10.06	11	14	11.50	5.37	6	33	26.97	13.81	8	20	16.35	8.36	7	27	22.15	11.56
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	20	16.60	11.72	11	14	11.50	10.77	9	24	19.61	13.60	6	23	18.80	13.24	8	21	17.23	14.93
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	10	17	14.11	9.48	9	17	13.96	8.82	13	14	11.44	6.99	9	19	15.53	9.40	9	16	13.12	8.05
A40-A41	敗血症	9	18	14.94	7.80	13	11	9.03	6.29	7	31	25.33	12.11	11	16	13.08	6.90	10	15	12.30	6.02
	其他		164	136.09	86.15		170	139.63	86.15		173	141.36	88.81		167	136.51	74.64		182	149.29	89.47

表53-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		782	350.67	533.92		1,097	421.12	440.93		1,048	400.74	403.33		1,044	396.61	378.76		1,107	417.62	378.58
08-14	惡性腫瘤	1	198	88.79	126.68	1	314	120.54	128.00	1	306	117.01	117.36	1	357	135.62	126.93	1	373	140.72	127.74
25-27-28*	心臟疾病	2	84	37.67	61.13	2	160	61.42	62.42	2	115	43.97	44.19	2	105	39.89	39.44	2	134	50.55	45.09
29	腦血管疾病	3	71	31.84	53.36	3	90	34.55	35.90	3	107	40.91	41.26	3	104	39.51	38.27	3	96	36.22	33.17
181	糖尿病	5	41	18.39	31.21	4	65	24.95	27.88	4	74	28.30	27.85	4	60	22.79	21.50	4	73	27.54	25.69
321	肺炎	8	24	10.76	20.36	8	31	11.90	12.28	9	35	13.38	12.80	7	37	14.06	13.51	5	51	19.24	17.07
E54	自殺	7	26	11.66	13.75	6	39	14.97	12.99	6	39	14.91	13.18	5	43	16.34	16.08	6	34	12.83	11.20
E47-E53	事故傷害	4	56	25.11	27.25	5	52	19.96	19.36	8	36	13.77	13.82	8	35	13.30	12.36	6	34	12.83	12.42
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	20	8.97	14.06	7	33	12.67	13.66	7	39	14.91	14.97	6	42	15.96	15.46	8	33	12.45	10.91
347	慢性肝病及肝硬化	6	30	13.45	17.26	9	28	10.75	11.17	5	41	15.68	15.55	9	34	12.92	12.24	9	30	11.32	9.99
26	高血壓性疾病	11	16	7.17	12.08	11	11	4.22	4.96	10	23	8.79	8.94	10	14	5.32	4.77	10	15	5.66	5.15
	其他		216	96.86	156.78		274	105.18	112.31		233	89.09	93.41		213	80.92	78.20		234	88.28	80.15

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表53-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,183	444.46	378.30		1,183	439.82	352.11		1,238	453.56	352.86		1,382	497.41	376.04		1,322	469.74	340.25
C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51	118.35	1	364	135.33	110.36	1	376	137.75	113.21	1	418	150.45	118.25	1	403	143.20	105.15
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	153	57.48	49.08	2	133	49.45	39.58	2	129	47.26	37.64	2	152	54.71	39.03	2	161	57.21	41.46
J12-J18	肺炎	5	63	23.67	19.12	5	54	20.08	14.41	5	54	19.78	13.31	5	65	23.39	15.99	5	58	20.61	11.98
I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95	31.77	3	87	32.35	25.63	3	95	34.81	25.67	3	105	37.79	27.47	3	109	38.73	26.89
E10-E14	糖尿病	4	68	25.55	22.23	4	62	23.05	19.20	4	69	25.28	19.67	4	77	27.71	21.25	4	66	23.45	17.63
A40-A41	敗血症	6	42	15.78	12.45	13	24	8.92	6.67	9	31	11.36	7.90	7	45	16.20	12.19	8	37	13.15	8.59
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	33	12.40	11.36	6	42	15.61	13.93	7	40	14.65	11.00	9	43	15.48	12.77	9	34	12.08	8.83
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	33	12.40	10.01	7	40	14.87	11.87	10	30	10.99	8.06	7	45	16.20	12.62	7	38	13.50	10.23
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	28	10.52	8.83	9	35	13.01	9.01	6	46	16.85	11.02	6	47	16.92	12.06	6	56	19.90	13.19
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	7	38	14.28	12.89	11	31	11.53	10.12	12	24	8.79	7.11	11	31	11.16	9.17	12	26	9.24	7.39
	其他		258	96.93	82.21		311	115.62	91.33		344	126.03	98.27		354	127.41	95.24		334	118.68	88.91

表53-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,364	479.77	338.86		1,423	496.40	340.19		1,491	518.34	345.19		1,409	489.66	311.64		1,412	490.96	305.05
C00-C97	惡性腫瘤	1	398	139.99	103.82	1	458	159.77	112.15	1	461	160.26	109.90	1	409	142.14	94.43	1	416	144.65	94.29
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	209	73.51	50.04	2	176	61.40	40.23	2	200	69.53	45.98	2	215	74.72	45.19	2	218	75.80	46.38
J12-J18	肺炎	6	59	20.75	12.93	4	68	23.72	13.65	4	82	28.51	16.12	3	123	42.75	24.69	3	128	44.51	23.37
I60-I69	腦血管疾病	3	105	36.93	25.50	3	105	36.63	23.64	3	114	39.63	26.16	4	100	34.75	21.49	4	98	34.08	18.90
E10-E14	糖尿病	4	61	21.46	14.81	8	42	14.65	9.89	5	69	23.99	16.59	6	50	17.38	11.65	5	54	18.78	11.96
A40-A41	敗血症	11	29	10.20	5.90	7	44	15.35	10.00	6	53	18.43	11.05	5	52	18.07	10.06	6	44	15.30	8.76
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	43	15.12	11.56	6	48	16.74	13.73	7	47	16.34	11.84	9	34	11.82	9.08	7	42	14.60	11.44
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	30	10.55	7.45	10	33	11.51	7.14	10	39	13.56	9.20	6	50	17.38	11.31	7	42	14.60	8.30
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	61	21.46	13.37	5	58	20.23	12.38	8	44	15.30	8.75	8	45	15.64	8.79	9	38	13.21	7.40
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	8	36	12.66	10.99	9	36	12.56	10.04	13	23	8.00	6.35	10	27	9.38	7.39	10	36	12.52	9.39
	其他		333	117.13	82.49		355	123.84	87.34		359	124.80	83.25		304	105.68	67.57		296	102.87	64.85

表53-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,192	399.07	480.62		1,462	505.78	409.93		1,588	550.74	424.34		1,527	530.24	389.46		1,569	545.49	385.22
08-14	惡性腫瘤	1	322	107.80	123.59	1	476	164.67	131.52	1	456	158.15	122.44	1	489	169.80	126.48	1	533	185.31	133.51
25-27-28*	心臟疾病	3	129	43.19	53.54	2	161	55.70	43.66	2	171	59.31	44.17	2	171	59.38	41.99	2	162	56.32	37.83
29	腦血管疾病	2	163	54.57	66.78	3	150	51.89	40.14	3	135	46.82	34.83	3	107	37.16	25.87	3	137	47.63	31.29
181	糖尿病	5	65	21.76	27.61	4	107	37.02	28.91	4	105	36.42	26.71	4	105	36.46	25.84	4	107	37.20	25.08
321	肺炎	7	40	13.39	18.36	7	42	14.53	11.00	5	77	26.70	19.19	5	71	24.65	17.35	5	76	26.42	16.12
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	37	12.39	15.15	6	44	15.22	11.71	6	61	21.16	15.58	6	53	18.40	12.71	6	60	20.86	13.84
E47-E53	事故傷害	4	85	28.46	29.23	5	63	21.79	19.64	8	43	14.91	13.56	7	45	15.63	14.32	7	43	14.95	12.86
E54	自殺	9	26	8.70	9.29	8	30	10.38	9.03	7	49	16.99	14.16	8	43	14.93	11.86	8	38	13.21	11.18
347	慢性肝病及肝硬化	6	41	13.73	15.18	9	24	8.30	6.69	9	36	12.49	9.64	9	30	10.42	8.23	9	31	10.78	8.03
038	敗血症	13	8	2.68	3.16	10	13	4.50	3.51	10	19	6.59	4.92	11	18	6.25	4.20	10	19	6.61	4.00
	其他		276	92.40	118.73		352	121.77	104.12		436	151.21	119.15		395	137.16	100.60		363	126.20	91.48

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50	389.90		1,595	561.23	346.64		1,710	598.31	362.26		1,708	593.09	347.26		1,809	625.26	351.82
C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76	113.15	1	483	169.95	109.04	1	546	191.04	118.60	1	498	172.93	105.87	1	600	207.38	122.24
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	231	80.61	51.65	2	186	65.45	39.89	2	190	66.48	37.56	2	227	78.82	43.55	2	208	71.89	38.91
J12-J18	肺炎	4	97	33.85	20.06	4	91	32.02	16.78	3	113	39.54	21.12	5	96	33.34	16.86	5	90	31.11	14.00
I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02	28.91	3	116	40.82	23.32	4	106	37.09	21.44	3	110	38.20	20.21	3	147	50.81	26.94
E10-E14	糖尿病	5	75	26.17	17.02	4	91	32.02	19.02	5	83	29.04	16.93	4	102	35.42	19.33	4	106	36.64	20.04
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	53	18.50	11.53	6	53	18.65	10.79	8	51	17.84	10.25	7	58	20.14	10.77	6	62	21.43	10.53
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	49	17.10	15.45	13	28	9.85	8.09	10	43	15.05	12.14	9	48	16.67	12.83	9	46	15.90	12.37
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	46	16.05	9.28	7	50	17.59	10.05	6	63	22.04	10.82	6	60	20.83	10.04	7	58	20.05	9.68
A40-A41	敗血症	6	59	20.59	12.75	8	44	15.48	8.74	6	63	22.04	11.70	10	47	16.32	8.74	10	41	14.17	7.08
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	46	16.05	13.39	11	33	11.61	8.79	12	28	9.80	7.66	11	38	13.20	11.17	12	30	10.37	7.25
	其他		392	136.80	96.71		420	147.78	92.13		424	148.35	94.04		424	147.23	87.89		421	145.51	82.78

表53-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,805	622.20	335.93		1,800	619.46	320.83		1,861	641.02	324.26		1,963	678.96	333.19		1,958	681.23	322.71
C00-C97	惡性腫瘤	1	537	185.11	106.70	1	509	175.17	98.15	1	566	194.96	105.59	1	576	199.23	105.14	1	578	201.10	100.78
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	252	86.87	44.38	2	250	86.04	43.50	2	236	81.29	38.26	2	276	95.46	44.21	2	333	115.86	50.54
J12-J18	肺炎	4	104	35.85	15.74	4	109	37.51	16.20	3	124	42.71	18.10	3	161	55.69	21.44	3	166	57.76	21.65
I60-I69	腦血管疾病	3	124	42.74	21.62	3	114	39.23	17.91	4	111	38.23	18.62	4	125	43.24	20.48	4	119	41.40	19.17
E10-E14	糖尿病	5	91	31.37	16.27	5	106	36.48	17.28	5	90	31.00	14.37	6	84	29.05	13.17	5	89	30.97	13.83
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	53	18.27	8.99	7	73	25.12	12.06	7	68	23.42	10.08	7	71	24.56	10.61	6	81	28.18	11.34
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	59	20.34	13.42	9	42	14.45	10.14	8	58	19.98	13.41	8	55	19.02	13.14	7	56	19.48	13.48
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	76	26.20	11.36	6	85	29.25	12.53	6	75	25.83	10.76	5	89	30.78	12.28	8	50	17.40	6.87
A40-A41	敗血症	9	49	16.89	8.30	10	39	13.42	5.99	9	48	16.53	7.13	9	46	15.91	7.01	9	48	16.70	6.71
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	12	39	13.44	10.10	14	32	11.01	7.69	14	26	8.96	6.83	10	41	14.18	10.93	10	42	14.61	10.32
	其他		421	145.12	79.05		441	151.77	79.38		459	158.10	81.09		439	151.84	74.80		396	137.78	68.04

表53-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,078	443.77	525.00		1,317	528.90	428.42		1,400	563.46	441.02		1,395	560.68	423.62		1,433	573.60	424.32
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.03	129.94	1	375	150.60	123.14	1	399	160.59	127.39	1	401	161.17	121.33	1	463	185.33	138.24
25-27-28*	心臟疾病	3	100	41.17	50.55	2	163	65.46	50.99	2	168	67.62	51.55	2	175	70.34	52.55	2	158	63.24	45.28
29	腦血管疾病	2	119	48.99	58.76	3	127	51.00	39.93	3	137	55.14	40.95	3	132	53.05	38.66	3	138	55.24	37.42
181	糖尿病	5	51	20.99	24.62	4	83	33.33	27.29	4	108	43.47	32.61	4	95	38.18	26.50	4	91	36.43	26.67
321	肺炎	7	36	14.82	18.81	6	48	19.28	15.08	7	47	18.92	13.31	5	68	27.33	18.90	5	72	28.82	18.74
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.82	17.49	7	46	18.47	14.65	5	63	25.36	18.55	6	54	21.70	16.30	6	48	19.21	13.04
347	慢性肝病及肝硬化	6	46	18.94	20.87	8	32	12.85	9.94	9	29	11.67	9.24	9	32	12.86	10.28	7	45	18.01	13.82
E47-E53	事故傷害	4	84	34.58	35.77	5	54	21.69	20.71	8	45	18.11	15.40	8	37	14.87	13.44	8	40	16.01	12.86
E54	自殺	10	18	7.41	7.68	8	32	12.85	10.80	6	55	22.14	18.94	7	42	16.88	13.32	9	29	11.61	10.02
038	敗血症	14	12	4.94	6.09	12	9	3.61	2.97	10	15	6.04	4.56	10	18	7.23	4.51	10	18	7.21	4.62
	其他		299	123.09	154.42		348	139.75	112.92		334	134.43	108.52		341	137.05	107.83		331	132.49	103.61

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表53-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				99年				100年				101年				102年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13	426.24		1,434	576.77	368.89		1,522	606.98	384.65		1,512	597.06	367.35		1,521	596.90	352.92
C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70	131.99	1	424	170.54	114.79	1	444	177.07	116.33	1	482	190.33	120.29	1	463	181.70	113.59
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	194	77.64	51.94	2	181	72.80	43.99	2	200	79.76	47.65	2	210	82.92	50.01	2	206	80.84	45.47
J12-J18	肺炎	4	92	36.82	22.98	4	87	34.99	19.28	4	91	36.29	18.91	5	59	23.30	11.23	5	79	31.00	16.15
I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83	34.85	3	89	35.80	21.68	3	122	48.65	28.81	3	95	37.51	20.93	3	109	42.78	22.80
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	51	20.41	12.66	6	44	17.70	10.03	6	62	24.73	13.48	6	56	22.11	11.29	6	62	24.33	12.49
E10-E14	糖尿病	5	66	26.41	17.15	5	86	34.59	21.84	5	68	27.12	16.38	4	93	36.72	22.15	4	89	34.93	19.01
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	52	20.81	13.80	7	43	17.29	10.33	9	41	16.35	9.73	7	53	20.93	12.27	8	45	17.66	9.93
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	36	14.41	11.60	10	35	14.08	10.87	7	48	19.14	14.99	8	43	16.98	12.80	11	37	14.52	10.81
I10-I15	高血壓性 疾病	10	38	15.21	10.01	9	36	14.48	8.33	11	34	13.56	7.05	8	43	16.98	9.10	7	51	20.01	10.36
A40-A41	敗血症	8	45	18.01	11.54	13	31	12.47	7.70	8	44	17.55	9.74	10	32	12.64	6.74	10	40	15.70	7.95
	其他		367	146.88	107.72		378	152.04	100.05		368	146.76	101.58		346	136.63	90.54		340	133.43	84.36

表53-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年				104年				105年				106年				107年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,578	615.25	355.76		1,631	632.93	354.18		1,695	657.96	352.36		1,687	656.64	353.11		1,756	685.95	349.35
C00-C97	惡性腫瘤	1	460	179.35	110.46	1	487	188.99	111.14	1	450	174.68	100.96	1	506	196.95	109.09	1	527	205.86	112.17
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	216	84.22	45.56	2	222	86.15	44.42	2	262	101.70	52.30	2	269	104.70	51.09	2	286	111.72	53.88
J12-J18	肺炎	4	104	40.55	18.88	4	103	39.97	18.40	3	128	49.69	21.07	4	110	42.82	19.31	3	169	66.02	27.06
I60-I69	腦血管疾病	3	106	41.33	22.59	3	109	42.30	22.12	4	125	48.52	24.26	3	114	44.37	22.59	4	115	44.92	20.91
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	68	26.51	13.19	6	62	24.06	10.15	6	69	26.78	11.38	7	52	20.24	9.49	5	71	27.74	11.22
E10-E14	糖尿病	5	96	37.43	20.21	5	87	33.76	18.67	5	84	32.61	16.28	5	84	32.70	16.43	6	65	25.39	12.13
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	54	21.05	11.79	11	37	14.36	7.29	7	61	23.68	11.31	6	55	21.41	9.76	7	59	23.05	10.60
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	47	18.32	13.69	8	40	15.52	11.37	10	38	14.75	10.93	8	42	16.35	11.82	8	46	17.97	12.51
I10-I15	高血壓性 疾病	8	51	19.88	9.95	7	43	16.69	8.20	9	41	15.92	8.02	10	35	13.62	6.36	9	43	16.80	6.91
A40-A41	敗血症	10	44	17.16	8.93	10	38	14.75	7.29	11	37	14.36	6.44	9	41	15.96	7.14	10	35	13.67	6.50
	其他		332	129.44	80.51		403	156.39	95.13		400	155.27	89.41		379	147.52	90.02		340	132.82	75.47



表54-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		224	105.52		304	147.73		313	151.18		345	165.26		332	157.94
162	肺癌	1	38	17.90	1	76	36.93	1	66	31.88	1	61	29.22	1	86	40.91
155	肝癌	2	34	16.02	4	37	17.98	2	51	24.63	2	50	23.95	2	44	20.93
153 154	結腸直腸癌	2	34	16.02	3	40	19.44	3	42	20.29	3	43	20.60	3	40	19.03
174	女性乳癌(1)	4	9	8.30	2	21	19.65	4	17	15.77	4	20	18.34	4	18	16.34
185	攝護腺癌(2)	11	3	2.89	7	8	8.09	5	10	10.08	6	14	14.04	5	11	11.00
179 180	子宮頸癌(1)	7	6	5.53	22	1	0.94	15	3	2.78	14	4	3.67	6	12	10.89
151	胃癌	5	16	7.54	5	19	9.23	7	15	7.25	5	34	16.29	7	21	9.99
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	7	3.30	5	19	9.23	6	15	7.25	8	17	8.14	8	20	9.51
157	胰臟癌	9	8	3.77	9	10	4.86	8	12	5.80	8	17	8.14	9	16	7.61
204-208	白血病	14	5	2.36	13	6	2.92	18	2	0.97	12	9	4.31	10	12	5.71
	其他		64	30.15		67	32.56		80	38.64		76	36.41		52	24.74

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		306	145.34		331	158.34		352	169.06		386	184.52		369	175.36		389	184.69
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92	1	81	38.75	1	77	36.98	1	81	38.72	1	82	38.97	1	65	30.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10	2	54	25.83	3	46	22.09	3	54	25.81	2	49	23.29	2	52	24.69
C22	肝和肝內膽管癌	2	44	20.90	3	51	24.40	4	35	16.81	2	57	27.25	3	48	22.81	4	47	22.31
C50	女性乳房癌(1)	4	16	14.47	4	15	13.66	2	25	22.85	4	22	19.99	4	25	22.57	3	26	23.44
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	14.00	6	7	7.06	10	7	7.09	5	14	14.12	5	16	16.06	6	15	15.05
C16	胃癌	6	22	10.45	5	18	8.61	5	21	10.09	6	26	12.43	6	18	8.55	5	35	16.62
C25	胰臟癌	7	20	9.50	7	12	5.74	12	11	5.28	7	17	8.13	6	18	8.55	7	19	9.02
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	12	5.70	13	7	3.35	8	15	7.20	8	13	6.21	9	10	4.75	10	14	6.65
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	12	8	3.80	14	5	2	13	10	4.80	11	9	4.30	13	8	3.80	11	11	5.22
C67	膀胱癌	16	4	1.90	14	5	2.39	11	12	5.76	16	5	2.39	9	10	4.75	13	10	4.75
	其他		67	31.82		76	36.36		93	44.67		88	42.07		85	40.39		95	45.10

表54-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		380	180.60		386	183.73		414	198.07		396	190.70		408	197.73
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	73	34.69	1	82	39.03	1	73	34.92	1	74	35.64	1	89	43.13
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	57	27.09	2	52	24.75	4	49	23.44	4	48	23.12	2	64	31.02
C22	肝和肝內膽管癌	3	52	24.71	4	46	21.90	2	62	29.66	2	52	25.04	3	55	26.65
C50	女性乳房癌(1)	4	27	24.34	3	26	23.43	3	29	26.22	3	26	23.61	4	28	25.55
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	19	19.10	5	21	21.18	5	17	17.28	5	20	20.51	5	17	17.57
C16	胃癌	6	23	10.93	7	21	10.00	7	20	9.57	7	20	9.63	6	28	13.57
C25	胰臟癌	7	18	8.55	6	24	11.42	6	27	12.92	6	23	11.08	7	19	9.21
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	14	7	3.33	10	11	5.24	8	19	9.09	12	11	5.30	8	14	6.78
C00-C06, C09-C10,	口腔癌	12	8	3.80	8	17	8.09	10	16	7.65	18	4	1.93	9	10	4.85
C67	膀胱癌	10	10	4.75	12	8	3.81	12	11	5.26	10	12	5.78	9	10	4.85
	其他		86	40.87		78	37.13		91	43.54		106	51.05		74	35.86

表54-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		303	123.50		373	159.71		430	185.63		401	173.50		427	185.51
162	肺癌	1	65	26.49	1	71	30.40	1	81	34.97	1	84	36.34	1	103	44.75
155	肝癌	2	56	22.82	2	66	28.26	2	63	27.20	2	55	23.80	2	54	23.46
153 154	結腸直腸癌	3	30	12.23	3	41	17.56	5	51	22.02	3	50	21.63	3	48	20.85
174	女性乳癌(1)	6	8	6.62	7	9	7.62	3	28	23.80	4	21	17.81	4	24	20.35
185	攝護腺癌(2)	15	3	2.41	5	12	10.40	6	12	10.53	6	11	9.71	5	17	15.14
151	胃癌	4	25	10.19	4	29	12.42	4	52	22.45	5	38	16.44	6	30	13.03
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	10	4.08	6	19	8.14	7	24	10.36	10	14	6.06	7	21	9.12
156	膽囊癌	9	9	3.67	12	10	4.28	15	7	3.02	9	15	6.49	8	18	7.82
157	胰臟癌	7	10	4.08	9	15	6.42	8	17	7.34	7	18	7.79	9	16	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	8	3.26	10	12	5.14	9	14	6.04	7	18	7.79	10	12	5.21
	其他		79	32.20		89	38.11		81	34.97		77	33.31		84	36.49

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		397	173.88		437	192.88		424	188.25		441	195.29		455	200.32		447	195.95
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60	1	87	38.40	1	84	37.30	1	85	37.64	1	108	47.55	1	87	38.14
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02	2	67	29.57	3	43	19.09	4	54	23.91	3	55	24.21	4	43	18.85
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15	3	54	23.83	2	61	27.08	3	61	27.01	2	58	25.54	2	60	26.30
C50	女性乳房癌(1)	4	23	19.59	4	25	21.39	4	22	18.87	2	38	32.44	5	23	19.50	3	29	24.46
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	9.92	6	16	14.59	6	12	11.04	9	9	8.28	4	24	21.98	5	17	15.52
C16	胃癌	5	27	11.83	5	40	17.65	7	23	10.21	7	26	11.51	6	29	12.77	6	34	14.90
C25	胰臟癌	7	22	9.64	7	26	11.48	5	30	13.32	5	28	12.40	8	18	7.92	10	17	7.45
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	10	8.52	17	3	2.57	8	7	6.01	8	10	8.54	15	4	3.39	9	10	8.43
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	10	4.38	9	11	4.86	10	11	4.88	10	14	6.20	9	15	6.60	10	17	7.45
C67	膀胱癌	19	4	1.75	18	4	1.77	13	10	4.44	17	6	2.66	16	6	2.64	12	15	6.58
	其他		101	44.24		104	45.90		121	53.72		110	48.71		115	50.63		118	51.73

表54-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		433	189.02		436	190.03		488	213.55		445	196.22		464	206.61
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	82	35.80	1	82	35.74	1	103	45.07	1	91	40.13	1	103	45.86
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	57	24.88	4	50	21.79	2	70	30.63	2	66	29.10	2	62	27.61
C22	肝和肝內膽管癌	3	54	23.57	3	56	24.41	4	45	19.69	3	59	26.02	3	59	26.27
C50	女性乳房癌(1)	4	25	20.98	2	32	26.79	3	33	27.70	4	28	23.64	4	22	18.73
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	10	9.10	9	8	7.27	7	10	9.14	5	16	14.77	5	18	16.80
C16	胃癌	5	32	13.97	5	26	11.33	6	30	13.13	6	25	11.02	6	27	12.02
C25	胰臟癌	8	20	8.73	6	22	9.59	5	32	14.00	7	20	8.82	7	21	9.35
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	7	5.87	8	9	7.54	11	8	6.71	11	6	5.07	8	8	6.81
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	6	22	9.60	14	10	4.36	13	10	4.38	13	11	4.85	9	14	6.23
C67	膀胱癌	16	6	2.62	7	18	7.85	13	10	4.38	18	5	2.20	9	14	6.23
	其他		118	51.51		123	53.61		137	59.95		118	52.03		116	51.65

表54-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		410	122.97		527	168.49		501	160.39		495	158.06		473	150.37
162	肺癌	1	85	25.49	1	113	36.13	1	105	33.62	1	110	35.12	1	96	30.52
153 154	結腸直腸癌	4	45	13.50	2	77	24.62	3	64	20.49	3	58	18.52	2	66	20.98
155	肝癌	2	72	21.59	3	69	22.06	2	73	23.37	2	84	26.82	3	64	20.35
174	女性乳癌(1)	3	24	14.17	4	26	15.96	4	30	18.39	6	19	11.59	4	20	12.11
151	胃癌	5	34	10.20	6	39	12.47	5	46	14.73	4	42	13.41	5	37	11.76
185	攝護腺癌(2)	7	10	6.09	5	22	14.67	6	18	12.06	5	19	12.74	6	16	10.71
183	卵巢癌(1)	8	8	4.72	7	11	6.75	12	7	4.29	7	12	7.32	7	14	8.48
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	13	3.90	13	13	4.16	9	17	5.44	8	20	6.39	8	26	8.27
179 180	子宮頸癌(1)	6	11	6.50	8	10	6.14	8	9	5.52	10	8	4.88	9	12	7.27
156	膽囊癌	20	3	0.90	11	15	4.80	10	15	4.80	11	12	3.83	10	22	6.99
	其他		105	31.49		132	42.20		117	37.46		111	35.44		100	31.79

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		501	159.36		549	175.55		572	183.58		544	173.97		580	184.93		582	185.71
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40	1	116	37.09	1	119	38.19	1	107	34.22	1	116	36.99	1	124	39.57
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86	2	71	22.70	2	70	22.47	2	83	26.54	4	65	20.72	2	91	29.04
C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63	3	70	22.38	5	58	18.61	4	68	21.75	2	83	26.46	3	69	22.02
C50	女性乳房癌(1)	4	24	14.50	4	35	21.20	3	36	21.84	3	37	22.34	5	31	18.64	4	36	21.64
C25	胰臟癌	7	23	7.32	6	36	11.51	6	40	12.84	6	23	7.36	7	37	11.80	7	33	10.53
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	18	12.10	5	19	12.87	4	28	19.08	5	23	15.64	3	31	21.04	6	16	10.88
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	11	6	3.62	12	7	4.24	14	6	3.64	11	7	4.23	9	9	5.41	8	11	6.61
C16	胃癌	6	30	9.54	7	35	11.19	6	40	12.84	7	22	7.04	6	46	14.67	5	41	13.08
C91-C95	白血病	13	10	3.18	10	15	4.80	9	16	5.13	8	20	6.40	13	11	3.51	11	14	4.47
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45	9	18	5.76	8	32	10.27	9	18	5.76	8	19	6.06	10	17	5.42
	其他		128	40.71		127	40.61		127	40.76		136	43.49		132	42.09		130	41.48



表54-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		593	189.14		565	180.29		616	197.26		601	193.41		580	187.46
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	122	38.91	1	126	40.21	1	134	42.91	1	116	37.33	1	111	35.88
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	78	24.88	4	68	21.70	2	80	25.62	3	85	27.35	2	82	26.50
C22	肝和肝內膽管癌	4	76	24.24	3	74	23.61	3	71	22.74	4	75	24.14	3	68	21.98
C50	女性乳房癌(1)	3	41	24.61	2	40	24.00	4	34	20.45	2	54	32.62	4	34	20.60
C25	胰臟癌	5	44	14.03	5	31	9.89	7	31	9.93	7	33	10.62	5	50	16.16
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	17	11.57	7	14	9.54	5	21	14.38	6	19	13.09	6	20	13.85
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	9	13	7.80	11	8	4.80	10	11	6.62	8	13	7.85	7	16	9.70
C16	胃癌	7	31	9.89	8	25	7.98	6	41	13.13	5	43	13.84	8	29	9.37
C91-C95	白血病	10	14	4.47	9	17	5.42	12	16	5.12	10	15	4.83	9	20	6.46
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	26	8.29	5	31	9.89	8	25	8.01	11	14	4.51	10	14	4.52
	其他		131	41.78		131	41.80		152	48.67		134	43.12		136	43.96

表54-4 · 臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		289	128.97		370	170.56		374	172.44		351	160.83		384	175.32
162	肺癌	1	50	22.31	1	70	32.27	1	80	36.89	1	62	28.41	1	84	38.35
155	肝癌	2	42	18.74	2	64	29.50	3	46	21.21	2	61	27.95	2	64	29.22
153 154	結腸直腸癌	4	37	16.51	4	45	20.74	2	56	25.82	3	43	19.70	3	41	18.72
151	胃癌	5	26	11.60	5	24	11.06	5	29	13.37	5	26	11.91	4	37	16.89
174	女性乳癌(1)	6	11	9.68	3	29	25.77	4	21	18.63	4	19	16.70	5	14	12.21
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	10	4.46	13	7	3.23	7	19	8.76	6	21	9.62	6	20	9.13
157	胰臟癌	11	9	4.02	6	19	8.76	9	14	6.45	7	16	7.33	7	18	8.22
150	食道癌	12	6	2.68	10	12	5.53	10	12	5.53	10	13	5.96	8	15	6.85
156	膽囊癌	12	6	2.68	10	12	5.53	12	7	3.23	12	10	4.58	9	14	6.39
185	攝護腺癌(2)	8	6	5.43	8	7	6.71	6	11	10.56	9	7	6.70	10	5	4.79
	其他		86	38.38		81	37.34		79	36.42		73	33.45		72	32.87

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-4 · 臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		98年		99年		100年		101年		102年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
C00-C97	所有癌症死亡原因		382	174.70		417	190.81		402	183.41		418	188.19		430	190.79		412	180.94
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47	1	85	38.89	1	85	38.78	1	84	37.82	1	85	37.71	1	91	39.96
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78	4	42	19.22	3	54	24.64	3	52	23.41	2	58	25.73	3	54	23.71
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35	2	62	28.37	2	63	28.74	2	68	30.61	3	54	23.96	2	59	25.91
C50	女性乳房癌(1)	5	14	12.19	3	25	21.70	4	26	22.44	4	23	19.54	4	22	18.38	4	18	14.86
C25	胰臟癌	8	14	6.40	5	30	13.73	7	14	6.39	6	25	11.26	6	22	9.76	8	19	8.34
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	8	7.71	7	11	10.65	5	17	16.45	5	13	12.45	5	16	15.14	5	13	12.20
C16	胃癌	4	33	15.09	6	26	11.90	6	20	9.12	7	24	10.81	7	21	9.32	6	26	11.42
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	11	5.03	11	11	5.03	10	12	5.47	10	12	5.40	9	15	6.66	9	15	6.59
C67	膀胱癌	13	7	3.20	19	5	2.29	12	11	5.02	19	3	1.35	15	7	3.11	18	5	2.20
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	12	5.49	9	14	6.41	12	11	5.02	8	21	9.45	8	16	7.10	7	21	9.22
	其他		98	44.82		106	48.50		89	40.60		93	41.87		114	50.58		91	39.96

表54-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		427	185.96		424	183.61		486	210.12		467	202.18		464	201.67
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	78	33.97	1	84	36.38	1	101	43.67	1	80	34.64	1	104	45.20
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	60	26.13	2	69	29.88	2	68	29.40	3	60	25.98	2	63	27.38
C22	肝和肝內膽管癌	2	65	28.31	3	56	24.25	3	65	28.10	4	58	25.11	3	62	26.95
C50	女性乳房癌(1)	4	23	18.81	5	17	13.81	4	23	18.64	2	34	27.55	4	32	25.99
C25	胰臟癌	7	21	9.15	8	17	7.36	6	24	10.38	6	32	13.85	5	31	13.47
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	13.04	4	18	16.69	11	6	5.56	7	14	13.02	6	12	11.22
C16	胃癌	6	22	9.58	6	19	8.23	5	31	13.40	5	33	14.29	7	23	10.00
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	14	6.10	9	16	6.93	8	19	8.21	10	14	6.06	8	16	6.95
C67	膀胱癌	14	7	3.05	12	13	5.63	12	10	4.32	16	7	3.03	9	14	6.08
C00-C06, C09-C10,	口腔癌	9	16	6.97	6	19	8.23	8	19	8.21	8	16	6.93	10	12	5.22
	其他		107	46.60		96	41.57		120	51.88		119	51.52		95	41.29

表54-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		244	141.22		245	154.05		282	178.58		267	169.02		258	162.22
162	肺癌	1	48	27.78	1	53	33.32	1	53	33.56	1	57	36.08	1	64	40.24
153 154	結腸直腸癌	4	30	17.36	2	41	25.78	4	32	20.26	3	31	19.62	2	39	24.52
155	肝癌	2	41	23.73	3	34	21.38	3	34	21.53	2	41	25.95	3	32	20.12
179 180	子宮頸癌(1)	5	7	8.17	9	5	6.17	18	2	2.48	8	6	7.41	4	9	11.01
151	胃癌	3	34	19.68	4	21	13.20	5	25	15.83	5	20	12.66	5	12	7.55
200202203	非何杰金淋巴瘤	17	3	1.74	8	10	6.29	6	20	12.67	7	13	8.23	6	11	6.92
150	食道癌	11	6	3.47	12	6	3.77	10	9	5.70	12	6	3.80	6	11	6.92
157	胰臟癌	9	8	4.63	7	12	7.55	7	11	6.97	9	9	5.70	8	10	6.29
174	女性乳癌(1)	6	6	7.00	6	9	11.11	2	19	23.55	4	14	17.28	9	5	6.12
204-208	白血病	12	5	2.89	14	5	3.14	13	8	5.07	11	7	4.43	10	9	5.66
	其他		56	32.41		49	30.81		69	43.70		63	39.88		56	35.21

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		303	190.07		276	173.54		278	174.68		263	163.87		305	188.50		248	152.48
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64	1	57	35.84	1	64	40.22	1	56	34.89	1	62	38.32	1	51	31.36
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48	2	33	20.75	3	37	23.25	2	38	23.68	2	51	31.52	2	42	25.82
C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70	3	31	19.49	2	41	25.76	3	32	19.94	3	45	27.81	4	30	18.44
C50	女性乳房癌(1)	4	16	19.48	4	15	18.27	4	14	17.01	4	15	18.04	5	11	13.10	3	19	22.46
C16	胃癌	5	29	18.19	5	25	15.72	5	19	11.94	7	11	6.85	6	18	11.12	5	15	9.22
C25	胰臟癌	9	9	5.65	7	13	8.17	6	16	10.05	6	16	9.97	7	13	8.03	7	14	8.61
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	11.65	9	5	6.50	7	5	6.51	5	9	11.63	4	13	16.70	6	7	8.97
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	8	5.02	11	7	4.40	9	8	5.03	15	5	3.12	8	11	6.80	14	4	2.46
C91-C95	白血病	8	11	6.90	14	5	3.14	9	8	5.03	7	11	6.85	10	7	4.33	17	3	1.84
C54	子宮體癌(1)	19	2	2.43	19	2	2.44	23	1	1.22	10	4	4.81	18	2	2.38	-	-	-
	其他		83	52.07		81	50.93		66	41.47		67	41.75		77	47.59		51	31.36

表54-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		291	178.24		317	194.56		314	194.50		295	184.37		298	187.06
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	45	27.56	1	59	36.21	1	54	33.45	1	55	34.37	1	43	26.99
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	42	25.73	3	42	25.78	4	42	26.02	2	40	25.00	2	39	24.48
C22	肝和肝內膽管癌	2	43	26.34	4	40	24.55	3	43	26.64	5	25	15.62	3	36	22.60
C50	女性乳房癌(1)	4	14	16.45	2	22	25.87	2	27	32.02	3	17	20.33	4	17	20.42
C16	胃癌	7	21	12.86	7	19	11.66	6	16	9.91	7	18	11.25	5	23	14.44
C25	胰臟癌	5	24	14.70	6	21	12.89	9	13	8.05	6	20	12.50	6	21	13.18
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	14.07	5	11	14.12	5	10	12.97	4	13	17.02	7	10	13.15
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	8	4.90	12	7	4.30	7	15	9.29	15	6	3.75	8	12	7.53
C91-C95	白血病	14	5	3.06	14	6	3.68	11	9	5.57	11	8	5.00	8	12	7.53
C54	子宮體癌(1)		-	-	16	3	3.53	14	3	3.56	16	2	2.39	10	5	6.01
	其他		#N/A	#N/A		87	53.40		82	50.79		91	56.37		80	49.55

表54-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		230	168.33		205	158.94		228	178.60		273	215.19		259	204.70
162	肺癌	1	45	32.93	1	40	31.01	1	41	32.12	2	51	40.20	1	54	42.68
155	肝癌	2	39	28.54	1	40	31.01	3	34	26.63	1	57	44.93	2	40	31.61
153 154	結腸直腸癌	4	22	16.10	3	26	20.16	4	29	22.72	3	30	23.65	3	35	27.66
174	女性乳癌(1)	5	10	14.75	5	7	10.87	2	18	28.19	4	13	20.44	4	14	22.02
185	攝護腺癌(2)	12	3	4.36	13	3	4.64	10	4	6.27	7	6	9.48	5	10	15.89
179 180	子宮頸癌(1)	11	3	4.43	9	3	4.66	11	3	4.70	10	5	7.86	6	8	12.58
151	胃癌	3	30	21.96	4	15	11.63	5	14	10.97	8	12	9.46	7	14	11.06
157	胰臟癌	6	9	6.59	7	8	6.20	13	5	3.92	6	13	10.25	8	12	9.48
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	9	6.59	7	8	6.20	7	11	8.62	11	9	7.09	9	9	7.11
150	食道癌	9	8	5.86	14	3	2.33	6	14	10.97	9	11	8.67	10	8	6.32
	其他		52	38.06		52	40.32		55	43.08		66	52.02		55	43.47

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。



表54-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		267	212.93		255	205.60		255	205.65		244	194.24		288	225.49		282	218.07
C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47	2	36	29.03	2	47	37.90	2	36	28.66	3	39	30.53	2	53	40.99
C50	女性乳房癌(1)	4	16	25.32	4	11	17.55	4	9	14.33	4	12	18.81	4	11	16.93	4	9	13.65
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66	1	56	45.15	1	56	45.16	1	60	47.76	1	56	43.84	1	59	45.63
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91	3	29	23.38	3	35	28.23	3	26	20.70	2	48	37.58	3	33	25.52
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	3	4.82	6	8	13.04	7	5	8.17	9	4	6.47	8	6	9.56	12	3	4.73
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	7	5.58	9	9	7.26	13	5	4.03	12	5	3.98	16	4	3.13	11	7	5.41
C25	胰臟癌	15	5	3.99	8	12	9.68	9	7	5.65	7	10	7.96	6	14	10.96	5	14	10.83
C16	胃癌	5	14	11.17	5	21	16.93	6	14	11.29	5	16	12.74	5	16	12.53	5	14	10.83
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	8	6.38	7	15	12.09	9	7	5.65	6	14	11.14	6	14	10.96	7	11	8.51
C91-C95	白血病	6	9	7.18	12	6	4.84	9	7	5.65	16	3	2.39	14	5	3.91	16	5	3.87
	其他		62	49.45		52	41.93		63	50.81		58	46.17		75	58.72		74	57.22

表54-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		236	180.99		300	229.09		270	206.90		298	229.81		303	235.89
C22	肝和肝內膽管癌	3	36	27.61	3	45	34.36	4	32	24.52	2	45	34.70	1	54	42.04
C50	女性乳房癌(1)	4	11	16.51	4	12	17.92	6	9	13.48	4	17	25.60	2	22	33.41
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	57	43.71	2	48	36.65	1	66	50.57	1	65	50.13	3	38	29.58
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	37	28.37	1	51	38.95	3	33	25.29	3	39	30.08	4	34	26.47
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	6	9.41	7	8	12.50	2	17	26.67	8	5	7.90	5	14	22.36
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	6	4.60	13	7	5.35	16	3	2.30	10	9	6.94	6	19	14.79
C25	胰臟癌	8	6	4.60	6	19	14.51	7	15	11.49	5	21	16.19	7	16	12.46
C16	胃癌	5	15	11.50	5	22	16.80	5	20	15.33	7	13	10.03	8	14	10.90
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	11	8.44	11	8	6.11	8	10	7.66	11	7	5.40	9	12	9.34
C91-C95	白血病	8	6	4.60	10	10	7.64	11	7	5.36	11	7	5.40	10	11	8.56
	其他		45	34.51		70	53.46		58	44.44		70	53.98		69	53.72

表54-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年						
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
08-14	所有癌症死亡原因		270	125.11		414	208.19		431	219.79		427	219.19		458	236.48
155	肝癌	1	50	23.17	2	71	35.70	2	55	28.05	2	72	36.96	1	94	48.54
162	肺癌	2	48	22.24	1	75	37.72	1	88	44.88	1	84	43.12	2	84	43.37
153 154	結腸直腸癌	4	26	12.05	3	47	23.64	3	42	21.42	3	67	34.39	3	55	28.40
174	女性乳癌(1)	6	8	7.60	5	15	15.35	4	19	19.68	5	15	15.60	4	18	18.77
151	胃癌	3	42	19.46	4	36	18.10	5	37	18.87	4	32	16.43	5	35	18.07
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	9	4.17	12	13	6.54	13	10	5.10	11	10	5.13	6	24	12.39
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.52	8	10	9.89	7	12	12.05	6	14	14.19	7	9	9.21
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	12	5.56	7	20	10.06	6	27	13.77	8	22	11.29	8	16	8.26
150	食道癌	16	4	1.85	10	14	7.04	11	18	9.18	15	6	3.08	9	16	8.26
156	膽囊癌	10	6	2.78	15	7	3.52	9	22	11.22	17	5	2.57	10	15	7.74
	其他		60	27.80		106	53.30		101	51.51		100	51.33		92	47.50

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		394	205.83		419	221.23		446	236.27		426	224.24		448	233.65		464	240.35
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54	1	79	41.71	1	86	45.56	1	91	47.90	1	90	46.94	1	101	52.32
C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70	1	79	41.71	2	77	40.79	2	61	32.11	3	60	31.29	2	82	42.48
C50	女性乳房癌(1)	7	9	9.47	6	15	15.90	4	24	25.41	4	24	25.15	5	14	14.50	4	23	23.63
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08	3	57	30.10	3	50	26.49	3	52	27.37	2	64	33.38	3	59	30.56
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	10.37	5	16	16.83	13	4	4.24	6	16	16.92	8	10	10.50	7	13	13.58
C25	胰臟癌	5	20	10.45	8	17	8.98	8	21	11.12	7	17	8.95	7	22	11.47	8	17	8.81
C16	胃癌	4	25	13.06	4	35	18.48	5	38	20.13	5	34	17.90	4	33	17.21	5	27	13.99
C15	食道癌	16	6	3.13	8	17	8.98	14	8	4.24	11	10	5.26	9	16	8.34	10	15	7.77
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75	7	20	10.56	7	23	12.18	7	17	8.95	6	23	12.00	5	27	13.99
C91-C95	白血病	11	9	4.70	16	6	3.17	16	5	2.65	10	12	6.32	13	9	4.69	14	6	3.11
	其他		89	46.50		78	41.18		110	58.27		92	48.43		107	55.80		94	48.69

表54-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		458	235.96		459	235.96		456	235.13		438	227.30		468	245.38
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	100	51.52	1	91	46.78	1	84	43.31	1	99	51.38	1	95	49.81
C22	肝和肝內膽管癌	2	65	33.49	2	65	33.41	2	63	32.48	2	66	34.25	2	70	36.70
C50	女性乳房癌(1)	4	25	25.49	4	29	29.45	4	26	26.43	5	19	19.39	3	26	26.77
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	60	30.91	2	65	33.41	3	57	29.39	3	59	30.62	4	47	24.64
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	16	16.66	5	15	15.62	6	12	12.56	4	19	20.06	5	18	19.23
C25	胰臟癌	8	20	10.30	9	17	8.74	7	23	11.86	7	19	9.86	6	24	12.58
C16	胃癌	6	29	14.94	6	26	13.37	5	34	17.53	6	23	11.94	7	22	11.53
C15	食道癌	9	15	7.73	8	19	9.77	9	15	7.73	14	8	4.15	8	21	11.01
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	28	14.43	7	21	10.80	8	20	10.31	7	19	9.86	9	20	10.49
C91-C95	白血病	16	4	2.06	14	8	4.11	11	11	5.67	14	8	4.15	10	16	8.39
	其他		96	49.46		103	52.95		111	57.23		99	51.38		109	57.15

表54-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		274	121.59		406	157.81		384	148.55		411	157.96		411	157.15
162	肺癌	1	53	23.52	1	90	34.98	1	84	32.50	1	88	33.82	1	85	32.50
155	肝癌	2	51	22.63	2	63	24.49	3	43	16.63	3	45	17.30	2	53	20.26
153 154	結腸直腸癌	5	28	12.42	4	45	17.49	2	44	17.02	2	53	20.37	3	43	16.44
174	女性乳癌(1)	3	16	14.36	3	25	19.18	4	19	14.47	4	21	15.83	4	19	14.20
151	胃癌	4	29	12.87	6	24	9.33	5	36	13.93	5	34	13.07	5	33	12.62
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.39	5	12	9.45	6	14	11.01	6	16	12.55	6	13	10.18
179 180	子宮頸癌(1)	6	9	8.08	9	8	6.14	10	7	5.33	12	6	4.52	7	11	8.22
157	胰臟癌	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	7	24	9.22	8	16	6.12
183	卵巢癌(1)	9	4	3.59	15	4	3.07	16	3	2.28	8	9	6.78	9	8	5.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	9	16	6.15	10	15	5.74
	其他		65	28.84		211	82.01		202	78.14		203	78.02		215	82.20

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		426	162.79		394	150.79		417	159.41		449	169.83		486	181.43		403	149.08
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83	1	82	31.38	1	95	36.32	1	104	39.34	1	96	35.84	1	69	25.52
C50	女性乳房癌(1)	3	28	20.87	4	19	14.15	3	27	20.03	4	27	19.79	4	26	18.79	6	17	12.16
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34	3	47	17.99	2	58	22.17	2	68	25.72	3	57	21.28	3	53	19.61
C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46	2	58	22.20	4	49	18.73	3	56	21.18	2	70	26.13	2	57	21.09
C16	胃癌	5	21	8.02	6	29	11.10	5	43	16.44	5	30	11.35	5	46	17.17	4	35	12.95
C25	胰臟癌	7	18	6.88	7	16	6.12	8	15	5.73	10	17	6.43	7	23	8.59	7	24	8.88
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	7.06	5	16	12.60	6	17	13.41	6	11	8.60	6	14	10.81	5	16	12.26
C15	食道癌	8	16	6.11	11	10	3.83	17	3	1.15	13	9	3.40	17	7	2.61	16	5	1.85
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	11	4.20	14	9	3.44	11	9	3.44	11	11	4.16	9	14	5.23	10	12	4.44
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	12	4.59	10	12	4.59	7	17	6.50	9	19	7.19	8	17	6.35	9	15	5.55
	其他		100	38.21		96	36.74		84	32.11		97	36.69		116	43.30		100	36.99

表54-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		462	169.46		453	164.94		485	176.17		427	155.37		452	164.91
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	93	34.11	1	85	30.95	1	85	30.88	1	92	33.48	1	93	33.93
C50	女性乳房癌(1)	2	41	29.03	4	28	19.66	2	36	25.18	4	24	16.80	2	34	23.83
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	63	23.11	2	60	21.85	3	62	22.52	2	51	18.56	3	60	21.89
C22	肝和肝內膽管癌	3	69	25.31	3	56	20.39	4	50	18.16	3	48	17.47	4	50	18.24
C16	胃癌	5	33	12.10	6	32	11.65	6	30	10.90	7	24	8.73	5	34	12.40
C25	胰臟癌	7	19	6.97	10	16	5.83	8	27	9.81	6	28	10.19	6	22	8.03
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	7.61	5	23	17.40	5	20	15.12	5	17	12.89	7	8	6.09
C15	食道癌	17	7	2.57	12	10	3.64	12	11	4.00	9	15	5.46	8	15	5.47
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	17	6.24	9	18	6.55	8	27	9.81	10	14	5.09	9	13	4.74
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	13	4.77	12	10	3.64	10	20	7.26	13	7	2.55	10	12	4.38
	其他		97	35.58		115	41.87		117	42.50		107	38.93		111	40.50



表54-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		139	123.11		193	170.72		186	164.58		206	182.05		195	171.83
162	氣管、支氣管和肺癌	1	28	24.80	2	36	31.84	2	34	30.08	2	33	29.16	1	41	36.13
155	結腸、直腸和肛門癌	2	23	20.37	1	37	32.73	1	39	34.51	1	38	33.58	2	30	26.43
153 154	肝和肝內膽管癌	5	12	10.63	6	17	15.04	3	22	19.47	3	24	21.21	3	24	21.15
151	女性乳房癌(1)	3	16	14.17	4	19	16.81	6	12	10.62	4	19	16.79	4	15	13.22
174	胰臟癌	4	6	10.80	3	10	17.73	4	9	15.96	5	8	14.14	5	7	12.30
200202203	子宮頸及部位未明示子宮	8	6	5.31	15	4	3.54	9	6	5.31	7	8	7.07	6	11	9.69
185	口腔癌	14	1	1.74	11	3	5.30	7	4	7.07	7	4	7.07	7	5	8.84
140-149*	卵巢癌(1)	7	10	8.86	8	8	7.08	12	5	4.42	6	10	8.84	8	8	7.05
156	食道癌	10	4	3.54	8	8	7.08	9	6	5.31	11	5	4.42	8	8	7.05
179 180	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	5	9.00	5	9	15.96	5	7	12.41	17	1	1.77	10	4	7.03
	其他		28	24.80		42	37.15		42	37.16		56	49.49		42	37.01

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-9 · 臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		186	163.60		206	181.64		215	189.28		195	169.45		222	189.24		226	189.72
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66	1	52	45.85	1	51	44.90	1	44	38.24	1	48	40.92	1	43	36.10
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47	2	28	24.69	4	25	22.01	3	23	19.99	4	30	25.57	4	22	18.47
C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87	3	22	19.40	2	37	32.57	2	30	26.07	2	36	30.69	2	32	26.86
C50	女性乳房癌(1)	2	14	24.46	4	8	13.97	3	15	26.05	4	10	17.09	3	18	30.12	3	13	21.38
C25	胰臟癌	7	8	7.04	5	13	11.46	9	7	6.16	6	10	8.69	8	8	6.82	9	9	7.56
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	19	1	1.75	8	4	6.99	14	2	3.47	11	3	5.13	11	3	5.02	8	5	8.22
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	5	4.40	9	7	6.17	5	15	13.21	6	10	8.69	8	8	6.82	5	15	12.59
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	10	3	5.24	12	3	5.24	-	-	-	18	1	1.71	10	4	6.69	11	3	4.93
C15	食道癌	7	8	7.04	14	4	3.53	7	9	7.92	13	3	2.61	7	9	7.67	10	7	5.88
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	4	7.09	7	6	10.69	8	4	7.14	9	3	5.30	5	8	13.90	7	6	10.29
	其他		60	52.77		59	52.02		50	44.02		58	50.40		50	42.62		71	59.60

表54-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		228	189.20		231	189.73		213	174.05		204	166.75		280	229.67
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	45	37.34	1	45	36.96	1	44	35.95	1	44	35.97	1	63	51.68
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	24	19.92	3	30	24.64	4	29	23.70	4	29	23.71	2	36	29.53
C22	肝和肝內膽管癌	2	36	29.87	2	33	27.10	2	35	28.60	3	31	25.34	3	34	27.89
C50	女性乳房癌(1)	5	10	16.23	4	10	16.05	3	15	23.97	2	18	28.79	4	14	22.46
C25	胰臟癌	8	8	6.64	6	14	11.50	7	6	4.90	9	7	5.72	5	14	11.48
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	15	2	3.25	12	3	4.82	13	3	4.79	8	4	6.40	6	7	11.23
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	7	5.81	7	8	6.57	7	6	4.90	9	7	5.72	7	13	10.66
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	7	7	11.36	21	1	1.61	5	6	9.59	12	2	3.20	8	6	9.62
C15	食道癌	9	7	5.81	8	7	5.75	7	6	4.90	7	8	6.54	9	11	9.02
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	4	10	16.98	10	3	5.05	6	4	6.69	5	7	11.70	10	5	8.39
	其他		72	59.75		77	63.24		59	48.21		47	38.42		77	63.16

表54-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		198	88.79		314	120.54		306	117.01		357	135.62		373	140.72
162	肺癌	2	29	13.00	2	55	21.11	1	56	21.41	1	87	33.05	1	71	26.79
153 154	結腸直腸癌	4	19	8.52	3	41	15.74	3	41	15.68	4	33	12.54	2	52	19.62
155	肝癌	1	42	18.83	1	58	22.27	2	43	16.44	2	53	20.13	3	47	17.73
151	胃癌	3	25	11.21	6	19	7.29	7	24	9.18	4	33	12.54	4	33	12.45
174	女性乳癌(1)	5	8	7.20	4	13	9.80	4	15	11.22	3	19	14.08	5	16	11.74
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.79	5	12	9.39	6	12	9.39	9	7	5.46	6	15	11.65
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.79	9	13	4.99	15	5	1.91	10	10	3.80	7	16	6.04
183	卵巢癌(1)	8	3	2.70	15	4	3.01	10	6	4.49	11	5	3.70	8	8	5.87
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	6	2.69	10	11	4.22	9	12	4.59	8	16	6.08	9	15	5.66
157	胰臟癌	11	5	2.24	8	14	5.37	12	9	3.44	6	19	7.22	9	15	5.66
	其他		55	24.66		74	28.41		83	31.74		75	28.49		85	32.07

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		366	137.51		365	136.57		364	135.33		376	137.75		418	150.45		403	143.20
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55	1	74	27.69	1	77	28.63	1	85	31.14	1	71	25.55	1	89	31.62
C50	女性乳房癌(1)	3	21	15.32	4	16	11.60	4	20	14.37	4	19	13.43	4	23	15.95	4	20	13.67
C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80	3	59	22.08	3	46	17.10	2	56	20.52	2	63	22.68	2	69	24.52
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28	2	60	22.45	2	48	17.85	3	37	13.56	3	56	20.16	3	55	19.54
C25	胰臟癌	7	16	6.01	7	17	6.36	9	12	4.46	7	20	7.33	9	18	6.48	10	14	4.97
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	11	4.13	9	14	5.24	11	10	3.72	11	8	2.93	9	18	6.48	10	14	4.97
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	9	3.38	12	8	2.99	13	8	2.97	8	18	6.59	12	11	3.96	14	6	2.13
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	8	5.83	8	8	5.80	10	6	4.31	9	6	4.24	6	11	7.63	8	8	5.47
C16	胃癌	5	25	9.39	5	21	7.86	6	21	7.81	6	21	7.69	8	20	7.20	7	21	7.46
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	6.97	6	9	6.96	5	11	8.48	5	16	12.17	7	10	7.48	5	15	11.10
	其他		87	32.69		79	29.56		105	39.04		90	32.97		117	42.11		92	32.69

表54-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		398	139.99		458	159.77		461	160.26		409	142.14		416	144.65
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	88	30.95	1	84	29.30	1	85	29.55	1	83	28.84	1	87	30.25
C50	女性乳房癌(1)	4	19	12.84	4	26	17.41	4	24	16.00	3	27	17.98	2	34	22.63
C22	肝和肝內膽管癌	3	46	16.18	2	63	21.98	3	61	21.21	2	65	22.59	3	53	18.43
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	48	16.88	3	54	18.84	2	62	21.55	4	43	14.94	4	43	14.95
C25	胰臟癌	14	10	3.52	6	26	9.07	11	17	5.91	6	25	8.69	5	28	9.74
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	17	5.98	8	18	6.28	6	24	8.34	9	18	6.26	6	19	6.61
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	16	5.63	11	16	5.58	9	21	7.30	11	10	3.48	7	18	6.26
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	10	6	4.05	13	6	4.02	10	10	6.67	15	4	2.66	8	9	5.99
C16	胃癌	5	28	9.85	5	30	10.47	6	24	8.34	8	19	6.60	9	17	5.91
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	13	9.54	7	10	7.28	5	14	10.17	5	15	10.90	10	6	4.37
	其他		107	37.64		125	43.60		119	41.37		100	34.75		102	35.47

表54-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		322	107.80		476	164.67		456	158.15		489	169.80		533	185.31
162	肺癌	1	74	24.77	1	120	41.51	1	99	34.33	1	101	35.07	1	113	39.29
155	肝癌	2	62	20.76	2	66	22.83	2	67	23.24	2	83	28.82	2	83	28.86
174	女性乳癌(1)	5	10	6.67	4	26	17.74	6	13	8.87	3	28	19.09	3	29	19.75
153 154	結腸直腸癌	4	28	9.37	3	56	19.37	2	67	23.24	4	54	18.75	4	55	19.12
185	攝護腺癌(2)	7	7	4.70	6	15	10.53	4	18	12.69	6	15	10.62	5	16	11.36
151	胃癌	3	29	9.71	5	32	11.07	5	32	11.10	5	39	13.54	6	29	10.08
183	卵巢癌(1)	9	6	4.00	8	9	6.14	15	4	2.73	8	9	6.14	7	14	9.53
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	9	3.01	12	14	4.84	9	16	5.55	10	16	5.56	8	22	7.65
157	胰臟癌	10	11	3.68	11	15	5.19	7	22	7.63	12	15	5.21	9	21	7.30
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	6	2.01	7	24	8.30	9	16	5.55	7	19	6.60	10	19	6.61
	其他		80	26.78		99	34.25		102	35.38		110	38.20		132	45.89

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		475	165.76		482	169.15		483	169.95		546	191.04		498	172.93		600	207.38
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15	1	114	40.01	1	99	34.83	1	125	43.74	1	107	37.15	1	114	39.40
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38	4	45	15.79	3	59	20.76	3	67	23.44	3	54	18.75	2	73	25.23
C50	女性乳房癌(1)	4	27	18.43	3	24	16.44	4	20	13.71	4	27	18.36	4	22	14.84	4	30	20.12
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82	2	86	30.18	2	71	24.98	2	74	25.89	2	71	24.65	3	70	24.19
C25	胰臟癌	8	18	6.28	7	28	9.83	7	21	7.39	6	31	10.85	7	18	6.25	6	33	11.41
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	15	10.71	5	15	10.79	6	11	7.96	12	6	4.32	5	14	10.02	5	19	13.55
C16	胃癌	5	33	11.52	6	29	10.18	5	32	11.26	5	34	11.90	6	27	9.38	6	33	11.41
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93	8	14	4.91	9	17	5.98	7	20	7.00	12	13	4.51	8	31	10.71
C15	食道癌	7	19	6.63	13	10	3.51	8	20	7.04	8	17	5.95	10	15	5.21	10	23	7.95
C67	膀胱癌	18	3	1.05	10	12	4.21	16	7	2.46	13	12	4.20	11	14	4.86	15	10	3.46
	其他		107	37.34		105	36.85		126	44.34		133	46.54		143	49.66		164	56.69



表54-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		537	185.11		509	175.17		566	194.96		576	199.23		578	201.10
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	125	43.09	1	105	36.14	1	134	46.16	1	142	49.12	1	112	38.97
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	25.85	2	81	27.88	3	69	23.77	2	74	25.60	2	98	34.10
C50	女性乳房癌(1)	4	31	20.71	4	22	14.66	4	26	17.32	4	31	20.73	3	39	26.20
C22	肝和肝內膽管癌	3	66	22.75	3	65	22.37	2	83	28.59	3	70	24.21	4	74	25.75
C25	胰臟癌	5	35	12.06	6	34	11.70	7	24	8.27	5	38	13.14	5	44	15.31
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	11	7.83	5	17	12.10	5	23	16.40	6	16	11.47	6	18	12.99
C16	胃癌	6	29	10.00	7	30	10.32	6	35	12.06	7	26	8.99	7	26	9.05
C00-C06, C09-C10,	口腔癌	8	21	7.24	8	20	6.88	9	18	6.20	8	22	7.61	8	20	6.96
C15	食道癌	9	16	5.52	10	13	4.47	11	16	5.51	12	16	5.53	9	15	5.22
C67	膀胱癌	10	15	5.17	12	11	3.79	17	7	2.41	14	14	4.84	10	14	4.87
	其他		113	38.95		111	38.20		131	45.12		127	43.93		118	41.05

表54-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		277	114.03		375	150.60		399	160.59		401	161.17		463	185.33
162	肺癌	2	52	21.41	1	81	32.53	1	78	31.39	1	92	36.98	1	106	42.43
155	肝癌	1	58	23.88	2	72	28.91	2	64	25.76	2	63	25.32	2	61	24.42
153 154	結腸直腸癌	5	18	7.41	3	42	16.87	3	52	20.93	3	46	18.49	3	59	23.62
174	女性乳癌(1)	3	19	15.73	5	13	10.30	5	16	12.67	6	12	9.47	4	19	14.89
151	胃癌	4	22	9.06	4	34	13.65	4	32	12.88	4	34	13.67	5	33	13.21
185	攝護腺癌(2)	18	2	1.64	6	9	7.33	6	13	10.64	7	8	6.56	6	15	12.28
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	2.47	11	11	4.42	8	16	6.44	8	15	6.03	7	26	10.41
179 180	子宮頸癌(1)	6	8	6.62	7	8	6.34	9	8	6.34	5	13	10.25	8	9	7.05
157	胰臟癌	7	10	4.12	9	13	5.22	11	12	4.83	10	13	5.22	9	17	6.80
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.65	10	12	4.82	7	17	6.84	10	13	5.22	10	16	6.40
	其他		78	32.11		80	32.13		91	36.63		92	36.98		102	40.83

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表54-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			98年			99年			100年			101年			102年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		464	185.70		432	173.56		424	170.54		444	177.07		482	190.33		463	181.70
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82	1	84	33.75	1	97	39.01	1	92	36.69	1	97	38.30	1	95	37.28
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81	2	59	23.70	5	45	18.10	4	55	21.93	3	61	24.09	3	54	21.19
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62	3	57	22.90	2	59	23.73	2	73	29.11	2	70	27.64	2	72	28.26
C16	胃癌	6	27	10.81	6	27	10.85	6	23	9.25	5	29	11.57	4	44	17.37	7	21	8.24
C50	女性乳房癌(1)	4	20	15.62	4	28	21.92	3	28	21.90	3	29	22.46	5	17	13.03	4	24	18.27
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	11.49	5	14	11.56	4	23	19.04	7	8	6.58	6	14	11.40	5	15	12.15
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.20	7	20	8.04	9	15	6.03	8	16	6.38	8	16	6.32	6	28	10.99
C25	胰臟癌	8	19	7.60	8	17	6.83	8	17	6.84	6	17	6.78	7	21	8.29	8	18	7.06
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	12	6	4.69	12	6	4.70	12	5	3.91	12	5	3.87	10	7	5.37	11	7	5.33
C15	食道癌	10	13	5.20	8	17	6.83	11	12	4.83	8	16	6.38	13	11	4.34	12	12	4.71
	其他		129	51.63		103	41.38		100	40.22		104	41.48		124	48.97		117	45.92

表54-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因(續2完)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	103年			104年			105年			106年			107年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		460	179.35		487	188.99		450	174.68		506	196.95		527	205.86
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	84	32.75	1	93	36.09	1	107	41.53	1	93	36.20	1	115	44.92
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	65	25.34	3	64	24.84	3	54	20.96	2	76	29.58	2	77	30.08
C22	肝和肝內膽管癌	3	58	22.61	2	68	26.39	2	62	24.07	3	64	24.91	3	64	25.00
C16	胃癌	6	30	11.70	7	26	10.09	6	24	9.32	8	23	8.95	4	37	14.45
C50	女性乳房癌(1)	4	22	16.62	4	24	18.02	4	20	15.01	4	28	21.04	5	19	14.31
C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	14	11.28	6	15	12.05	5	13	10.46	5	16	12.92	6	14	11.36
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	19	7.41	8	25	9.70	12	12	4.66	8	23	8.95	7	23	8.98
C25	胰臟癌	5	32	12.48	5	32	12.42	7	21	8.15	6	28	10.90	8	18	7.03
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	10	8	6.04	12	5	3.75	8	10	7.50	7	13	9.77	9	9	6.78
C15	食道癌	9	18	7.02	10	11	4.27	16	7	2.72	12	14	5.45	10	12	4.69
	其他		110	42.89		124	48.12		120	46.58		128	49.82		139	54.30

## 伍、歷年主要癌症發生率



表55·臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人／每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
86年	266.91	220.52	37.80	29.26	44.42	39.08	36.72	30.44	26.25	20.38	21.40	15.83	12.86	11.45	5.70	4.54
87年	287.79	231.95	43.41	33.25	44.57	37.95	39.66	32.28	25.24	19.54	24.55	17.05	16.87	14.86	6.98	5.35
88年	306.62	268.49	43.38	36.36	46.89	42.54	42.84	38.20	24.29	20.45	29.10	23.72	18.40	16.97	6.95	5.66
89年	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90年	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91年	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92年	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93年	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94年	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95年	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26
96年	378.22	269.92	52.91	35.29	50.72	37.87	59.72	41.30	25.13	16.59	43.60	29.51	25.05	19.30	9.16	6.40
97年	419.14	290.36	57.04	37.19	53.42	38.00	70.42	48.07	26.67	16.95	55.16	34.93	28.80	21.56	9.99	6.85
98年	433.34	291.45	62.83	39.86	52.76	36.30	72.20	47.48	26.10	15.81	57.60	36.28	30.62	22.30	10.23	6.38
99年	456.61	303.85	61.07	38.75	54.41	37.43	80.47	53.22	26.61	15.61	58.37	36.42	28.59	20.26	9.82	6.30
100年	451.05	299.70	63.31	39.63	53.90	36.30	79.13	52.15	25.62	15.72	59.08	37.28	31.10	21.88	11.20	7.18
101年	459.72	298.65	61.77	37.67	52.36	34.50	83.56	53.18	24.66	14.53	57.65	35.21	30.89	21.68	10.97	6.89
102年	451.49	289.90	62.33	38.00	51.48	33.25	76.59	48.40	23.49	13.85	57.99	35.00	35.27	24.12	11.32	6.88
103年	450.13	284.34	61.75	37.69	49.63	31.14	82.04	51.02	23.15	13.21	52.25	31.00	32.26	21.93	11.35	6.95
104年	456.98	285.34	68.70	40.69	43.85	27.77	81.05	49.39	23.47	13.03	57.35	33.43	33.50	22.41	14.28	8.64
<b>105年</b>	<b>460.84</b>	<b>280.31</b>	<b>68.01</b>	<b>39.96</b>	<b>44.28</b>	<b>27.28</b>	<b>79.02</b>	<b>46.85</b>	<b>22.57</b>	<b>12.09</b>	<b>58.32</b>	<b>32.88</b>	<b>30.86</b>	<b>20.37</b>	<b>11.09</b>	<b>6.75</b>

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表55·臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人/每十萬男性人口

年別	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
86年	8.55	7.30	4.47	4.32	9.24	8.22	10.09	8.20	3.31	2.49	5.24	4.64	3.46	3.16	3.39	2.88
87年	7.06	5.71	5.37	5.20	7.29	6.22	12.66	9.50	2.91	2.31	5.98	5.06	2.53	2.46	3.61	2.86
88年	9.39	8.39	5.04	4.86	8.94	8.06	13.52	11.32	2.67	2.19	3.89	3.34	3.67	3.68	4.89	4.26
89年	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90年	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91年	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92年	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93年	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94年	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95年	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69
96年	10.96	7.94	9.78	8.19	10.02	7.85	11.19	7.32	4.07	2.78	6.18	4.67	3.13	2.59	4.07	2.97
97年	12.75	9.08	9.13	7.31	8.81	7.04	13.06	8.79	3.86	2.54	7.55	5.34	3.78	3.51	4.48	3.04
98年	11.19	7.77	9.84	7.76	10.00	7.84	13.41	8.28	3.57	2.21	6.51	4.63	3.25	2.95	4.60	3.33
99年	12.59	8.33	12.83	9.34	9.82	7.59	13.15	8.02	4.75	3.15	9.43	6.48	4.59	3.50	5.54	3.49
100年	10.89	7.25	11.83	9.23	9.25	7.21	14.10	8.70	4.39	2.49	7.99	5.77	2.90	2.25	4.54	2.94
101年	12.37	8.03	11.20	8.01	9.96	7.35	12.91	7.80	4.59	2.75	10.43	7.03	3.73	3.17	3.97	2.60
102年	11.55	7.43	11.40	8.32	8.06	6.00	13.95	8.19	4.34	2.59	9.77	6.54	3.57	2.86	4.42	2.83
103年	14.20	9.03	10.65	7.25	9.34	6.89	13.20	7.60	5.71	3.24	11.65	7.80	3.16	2.49	4.17	2.70
104年	11.58	7.18	10.11	7.12	7.56	5.59	13.05	7.48	4.79	2.70	10.34	6.87	3.94	3.15	4.32	2.53
<b>105年</b>	<b>11.48</b>	<b>7.22</b>	<b>11.17</b>	<b>7.73</b>	<b>7.06</b>	<b>5.13</b>	<b>13.96</b>	<b>7.55</b>	<b>6.20</b>	<b>3.50</b>	<b>9.62</b>	<b>6.03</b>	<b>3.10</b>	<b>2.27</b>	<b>5.12</b>	<b>3.18</b>



表56·臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
86年	258.48	227.82	19.80	17.73	27.32	25.15	53.42	44.91	16.65	16.39	14.35	12.57	3.30	3.07	26.94	23.38
87年	282.48	240.29	21.06	18.80	31.62	27.55	55.26	45.34	16.12	14.77	12.39	10.47	3.34	2.97	24.48	20.76
88年	293.65	268.19	20.05	19.10	32.44	30.93	65.92	57.65	18.77	18.27	13.66	12.77	3.53	3.31	22.15	19.72
89年	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90年	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91年	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92年	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93年	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94年	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95年	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21
96年	328.84	236.19	32.11	22.18	48.16	33.66	92.48	66.76	19.53	13.51	14.06	9.49	5.62	3.78	12.06	8.53
97年	351.41	244.08	34.99	23.40	49.63	32.68	96.16	67.67	22.56	15.27	14.20	9.24	6.51	4.29	12.94	8.79
98年	396.37	269.25	43.95	28.41	54.34	35.37	109.65	76.05	21.68	13.79	15.29	9.64	8.54	5.54	14.11	9.59
99年	394.55	262.64	43.06	26.78	55.96	35.31	110.60	75.15	21.90	14.11	13.49	8.15	7.23	4.39	13.12	8.74
100年	408.04	269.40	41.47	25.97	60.89	37.26	113.70	76.63	23.13	14.31	15.06	9.29	9.89	6.18	13.53	9.05
101年	413.08	268.08	46.83	28.44	60.31	36.11	115.93	78.19	21.04	12.94	15.20	8.71	9.08	5.43	12.54	8.44
102年	418.53	266.57	46.69	27.57	58.07	33.93	121.15	80.63	21.27	12.16	13.82	8.11	9.17	5.18	10.88	6.94
103年	443.53	278.02	50.97	29.83	61.78	35.23	125.26	82.07	21.47	12.00	15.21	8.62	9.31	5.07	10.45	6.77
104年	467.02	286.23	56.34	31.79	61.59	34.27	134.96	87.46	21.64	11.66	14.40	8.20	10.71	5.49	11.85	7.70
<b>105年</b>	<b>458.26</b>	<b>278.50</b>	<b>59.45</b>	<b>33.22</b>	<b>61.66</b>	<b>33.61</b>	<b>133.13</b>	<b>85.84</b>	<b>21.55</b>	<b>11.24</b>	<b>10.74</b>	<b>5.69</b>	<b>9.96</b>	<b>5.28</b>	<b>10.03</b>	<b>6.34</b>

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表56·臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎臟癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
86年	7.60	6.52	2.53	2.68	2.30	2.04	6.60	5.96	2.46	2.17	3.61	3.02	1.84	1.92	4.22	3.86
87年	9.58	8.15	4.03	3.95	3.27	2.69	8.44	7.49	2.58	2.32	4.03	3.41	2.05	1.83	3.65	3.11
88年	9.54	8.62	3.00	3.06	2.10	2.08	6.76	6.17	2.18	2.16	3.23	2.73	2.25	2.13	5.41	5.18
89年	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90年	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91年	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92年	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93年	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94年	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95年	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67
96年	11.61	8.93	5.03	4.55	3.18	2.09	13.76	10.11	2.44	1.79	2.89	2.15	2.22	2.04	5.40	3.52
97年	12.35	9.00	5.25	4.19	3.85	2.48	16.79	11.52	3.55	2.64	3.40	2.60	2.96	2.61	5.18	3.21
98年	12.62	9.16	7.28	5.54	3.49	2.15	16.26	11.06	3.86	2.61	2.08	1.53	1.71	1.50	5.57	3.38
99年	13.79	9.96	6.19	4.66	4.20	2.58	19.76	13.57	3.83	2.44	3.02	2.13	2.51	2.17	4.65	2.88
100年	14.11	10.06	6.47	5.33	4.00	2.33	18.77	12.58	3.49	2.31	2.69	2.02	3.27	2.62	5.24	3.05
101年	11.89	8.56	7.49	5.79	3.75	2.21	19.81	13.16	3.82	2.48	2.52	1.80	2.52	1.94	4.76	2.73
102年	13.25	9.12	7.80	5.91	3.08	1.65	20.69	13.61	4.15	2.74	2.94	2.04	2.65	2.38	4.08	2.34
103年	15.21	10.91	8.67	6.37	3.55	1.90	24.38	15.79	4.27	2.71	3.34	2.37	2.27	1.70	5.19	2.79
104年	14.26	9.60	6.74	4.44	4.54	2.36	23.56	14.93	6.31	3.95	1.99	1.34	2.98	2.25	5.11	2.60
<b>105年</b>	<b>14.86</b>	<b>10.06</b>	<b>8.82</b>	<b>7.11</b>	<b>4.41</b>	<b>2.14</b>	<b>25.96</b>	<b>16.24</b>	<b>4.05</b>	<b>2.36</b>	<b>1.49</b>	<b>1.00</b>	<b>3.63</b>	<b>2.76</b>	<b>6.12</b>	<b>3.05</b>

## 陸、附錄



## 【附錄 1】107 年臺北市十大死因統計結果 慢性疾病囊括 7 項，癌症續居首席

107 年臺北市十大死因出爐，慢性疾病囊括 7 項，每 100 人中約有 64.3 人死於慢性疾病，惡性腫瘤則續居首席，而十大死因排名順序與上(106)年相較，僅事故傷害與敗血症排名互換。至於十大癌症死因仍以肺癌、大腸癌分別連續 33 年及 5 年蟬聯首席與次席。

107 年臺北市民死亡人數為 1 萬 8,050 人，較上年增 2.4% (或增 416 人)，近 10 年平均年增率 1.8%；死亡率則為每十萬人口 674.5 人，較上年增 2.9%(或增 18.8 人)，近 10 年平均年增率 1.6%，死亡者平均年齡為 76.4 歲，較全國 73.0 歲為高。如依世界衛生組織(WHO)公布 2000 年世界標準人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 317.6 人，較上年增 0.3%(或增 1.1 人)，近 10 年則平均年降 1.4%，並低於全國標準化死亡率 415.0 人，是全國 22 縣市中除金門縣與連江縣之外，標準化死亡率最低的縣市。

十大主要死因死亡人數占總死亡人數的 7 成 8，其中包括慢性疾病 7 項(占 64.3%)，而惡性腫瘤(占 29.0%)仍居首位，其餘依序為心臟疾病(占 16.6%)；肺炎(占 9.0%)；腦血管疾病(占 6.4%)；糖尿病(占 3.8%)；腎炎、腎病症候群及腎病變(占 3.4%)；慢性下呼吸道疾病(占 2.8%)；事故傷害(占 2.5%)；敗血症(占 2.5%)；高血壓性疾病(占 2.1%)。與 106 年相較，僅事故傷害與敗血症排名互換，為第 8 名與第 9 名，其餘與上年相同。

107年臺北市十大主要死因標準化死亡率較上年增加者計5項，分別為肺炎(增7.6%)、心臟疾病(高血壓性疾病除外)(增4.7%)、高血壓性疾病(增2.9%)、腎炎、腎病症候群及腎病變(增1.9%)與惡性腫瘤(增1.8%)；而減少者亦有5項，為慢性下呼吸道疾病(減13.5%)、糖尿病(減8.8%)、腦血管疾病(減8.4%)、敗血症(減2.8%)及事故傷害(減2.1%)。

依性別觀察，死亡人數、死亡率與標準化死亡率結果呈現男高於女，分別是女性的1.3倍、1.4倍與1.6倍。107年兩性死因前四名皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎及腦血管疾病，若與上年相較，男性十大死因部分僅腎炎、腎病症候群及腎病變上升1名為第7名，而事故傷害則退後1名，為第8名，其餘與上年相同；女性死因部分，則高血壓性疾病上升1名為第7名，事故傷害及自殺皆上升2名為，分別為第9名及第10名，敗血症則下滑1名為第8名。男、女性標準化死亡率分別較上年增1.0%及減0.5%，其中增幅最顯著分別為男性自殺增12.8%，女性肺炎增16.7%，而減幅最大為男性腦血管疾病減9.4%，女性糖尿病減15.8%。

依年齡層觀察，107年臺北市15-24歲青少年死因前三名分別為事故傷害(占29.9%)、自殺(占22.1%)及惡性腫瘤(占16.9%)；25-44歲壯年則以惡性腫瘤(占30.6%)為首、自殺(占18.0%)及事故傷害(占10.7%)次之；45-64歲中年仍以惡性腫瘤(占46.5%)居首、心臟疾病(占13.2%)及腦血管疾病(占5.3%)次之；65歲以上老年則以惡性腫瘤(占25.5%)、心臟疾病(占17.8%)及肺炎(占10.8%)分列前三名。

107年臺北市民因自殺死亡人數為349人，較上年增10.1%(或增32人)，其死亡人數依年齡層分以45-64歲最多占38.1%，65歲以上次之占28.9%。107年自殺死亡率為每十萬人口13.0人，相較上年增10.6%，為全國自殺死亡率，除金門縣(10.1人)與新竹市(12.6人)外之最低縣市。

107年臺北市民癌症死亡人數為5,238人，較上年增176人，平均每日死於癌症人數約有14.4位市民；死亡率

為每十萬人口 195.7 人，死亡者平均年齡為 71.5 歲；若經標準化後之死亡率為 100.5 人，較上年增 1.8%，但低於全國標準化死亡率 121.8 人，在全國 22 縣市中為標準化死亡率最低的縣市。

十大癌症死因仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為 2.結腸、直腸和肛門癌、3.肝和肝內膽管癌、4.女性乳房癌、5.前列腺(攝護腺)癌、6.胰臟癌、7.胃癌、8.口腔癌、9.非何杰金氏淋巴瘤、10.卵巢癌；與上年相較，口腔癌前進 1 名，為第 8 名，而非何杰金氏淋巴瘤前進 2 名，為第 9 名；卵巢癌退後 2 名，為第 10 名。其中十大癌症死因標準化死亡率較上年增加者有 5 項，增幅較多者為非何杰金氏淋巴瘤(增 15.1%)、胃癌(增 5.1%)；減少者有 5 項，減幅較多者為前列腺(攝護腺)癌(減 8.7%)、卵巢癌(減 8.2%)。

依性別觀察，107 年臺北市男性十大癌症死因，以口腔癌上升 3 名為第 4 名，非何杰金氏淋巴瘤上升 1 名為第 9 名，而胃癌、前列腺(攝護腺)癌、胰臟癌及膀胱癌均退後 1 名，分別為第 5 名、第 6 名、第 7 名與第 10 名，其餘死因及順位與上年相同；而男性標準化死亡率較上年增 4.9%，其中以非何杰金氏淋巴瘤增幅 38.4%最顯著，減幅則以前列腺(攝護腺)癌 8.6%最多。107 年女性十大癌症死因排名變化，僅以白血病上升 1 名為第 10 名，其餘死因及順位與上年相同；而女性標準化死亡率較上年減 1.4%，其中以子宮頸及部位未明示子宮癌減幅 15.7%最顯著，增幅以胃癌增 25.7%最多。

臺北市政府衛生局呼籲，癌症已分別蟬聯 37 年國人死因第 1 名與 47 年臺北市十大死因之首，落實健康飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳的健康生活型態，可預防癌症的發生。為了照護女性市民健康，自 107 年 6 月 1 日起提供設籍臺北市 30 歲以下有性生活史之女性市民，每年 1 次免費子宮頸抹片檢查服務，並同時提供篩檢疑似陽性個案追蹤及轉介服務，相關資訊請參閱臺北市政府衛生局網頁(<https://health.gov.taipei/Default.aspx>)。

四項癌症篩檢資格一覽表

篩檢項目	篩檢資格
乳房 X 光攝影檢查	45-69 歲婦女、40-44 歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每 2 年 1 次
子宮頸抹片檢查	30 歲以上婦女，建議每 3 年進行 1 次
糞便潛血檢查	50 至未滿 75 歲民眾，每 2 年 1 次
口腔黏膜檢查	30 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每 2 年 1 次

資料來源：衛生福利部國民健康署



表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因

民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男 性				女 性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比
	所有死亡原因	18,050	674.5	100.0	所有死亡原因	10,160	795.2	100.0	所有死亡原因	7,890	564.3	100.0
1	惡性腫瘤	5,238	195.7	29.0	惡性腫瘤	2,926	229.0	28.8	惡性腫瘤	2,312	165.3	29.3
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3,000	112.1	16.6	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,715	134.2	16.9	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,285	91.9	16.3
3	肺炎	1,619	60.5	9.0	肺炎	924	72.3	9.1	肺炎	695	49.7	8.8
4	腦血管疾病	1,152	43.1	6.4	腦血管疾病	667	52.2	6.6	腦血管疾病	485	34.7	6.1
5	糖尿病	692	25.9	3.8	慢性下呼吸道疾病	397	31.1	3.9	糖尿病	351	25.1	4.4
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	621	23.2	3.4	糖尿病	341	26.7	3.4	腎炎、腎病症候群及腎病變	327	23.4	4.1
7	慢性下呼吸道疾病	514	19.2	2.8	腎炎、腎病症候群及腎病變	294	23.0	2.9	高血壓性疾病	201	14.4	2.5
8	事故傷害	455	17.0	2.5	事故傷害	294	23.0	2.9	敗血症	197	14.1	2.5
9	敗血症	449	16.8	2.5	敗血症	252	19.7	2.5	事故傷害	161	11.5	2.0
10	高血壓性疾病	386	14.4	2.1	蓄意自我傷害（自殺）	219	17.1	2.2	蓄意自我傷害（自殺）	130	9.3	1.6
	其他	3,924	146.6	21.7	其他	2,131	166.8	21.0	其他	1,746	124.9	22.1

資料來源：衛生福利部。

表2 ICD-10 臺北市10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	106年		107年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	316.5	所有死亡原因	317.6	0.4
1	惡性腫瘤	98.7	惡性腫瘤	100.5	1.8
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	45.8	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	48.0	4.7
3	肺炎	20.8	肺炎	22.3	7.6
4	腦血管疾病	20.3	腦血管疾病	18.6	-8.4
5	糖尿病	12.4	糖尿病	11.3	-8.8
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.7	1.9
7	慢性下呼吸道疾病	8.5	慢性下呼吸道疾病	7.4	-13.5
8	敗血症	7.2	事故傷害	10.9	-2.1
9	事故傷害	11.1	敗血症	7.0	-2.8
10	高血壓性疾病	5.8	高血壓性疾病	6.0	2.9

資料來源：衛生福利部。

表3 ICD-10 臺北市男性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	106年		107年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	399.6	所有死亡原因	403.7	1.0
1	惡性腫瘤	117.7	惡性腫瘤	123.4	4.9
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	62.8	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	63.7	1.4
3	肺炎	28.5	肺炎	29.2	2.4
4	腦血管疾病	26.7	腦血管疾病	24.2	-9.4
5	慢性下呼吸道疾病	13.7	慢性下呼吸道疾病	12.7	-7.2
6	糖尿病	13.5	糖尿病	13.2	-2.2
7	事故傷害	16.5	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.5	-0.8
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	10.6	事故傷害	15.6	-5.5
9	敗血症	9.7	敗血症	9.0	-7.6
10	蓄意自我傷害（自殺）	11.4	蓄意自我傷害（自殺）	12.9	12.8

資料來源：衛生福利部。

表4 ICD-10 臺北市女性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	106年		107年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	247.5	所有死亡原因	246.2	-0.5
1	惡性腫瘤	83.1	惡性腫瘤	82.0	-1.4
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	31.7	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	34.9	10.1
3	肺炎	14.4	肺炎	16.8	16.7
4	腦血管疾病	15.1	腦血管疾病	14.0	-7.5
5	糖尿病	11.6	糖尿病	9.8	-15.8
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.1	4.4
7	敗血症	5.2	高血壓性疾病	5.4	12.7
8	高血壓性疾病	4.8	敗血症	5.4	4.2
9	血管性及未明示之癱瘓症	3.9	事故傷害	6.7	6.7
10	慢性下呼吸道疾病	4.2	蓄意自我傷害（自殺）	7.2	9.5

資料來源：衛生福利部。

### 表5 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因

民國107年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男性				女性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比
	所有癌症死亡原因	5,238	195.7	100.0	所有癌症死亡原因	2,926	229.0	100.0	所有癌症死亡原因	2,312	165.3	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	1,053	39.4	20.1	氣管、支氣管和肺癌	629	49.2	21.5	氣管、支氣管和肺癌	424	30.3	18.3
2	結腸、直腸和肛門癌	705	26.3	13.5	肝和肝內膽管癌	432	33.8	14.8	女性乳癌①	321	23.0	13.9
3	肝和肝內膽管癌	679	25.4	13.0	結腸、直腸和肛門癌	391	30.6	13.4	結腸、直腸和肛門癌	314	22.5	13.6
4	女性乳癌①	321	23.0	6.1	口腔癌	161	12.6	5.5	肝和肝內膽管癌	247	17.7	10.7
5	前列腺(攝護腺)癌②	160	12.5	3.1	胃癌	160	12.5	5.5	胰臟癌	150	10.7	6.5
6	胰臟癌	308	11.5	5.9	前列腺(攝護腺)癌②	160	12.5	5.5	胃癌	128	9.2	5.5
7	胃癌	288	10.8	5.5	胰臟癌	158	12.4	5.4	卵巢癌①	79	5.6	3.4
8	口腔癌	176	6.6	3.4	食道癌	128	10.0	4.4	子宮頸及部位未明示子宮癌①	66	4.7	2.9
9	非何杰金氏淋巴瘤	159	5.9	3.0	非何杰金氏淋巴瘤	96	7.5	3.3	非何杰金氏淋巴瘤	63	4.5	2.7
10	卵巢癌①	79	5.6	1.5	膀胱癌	71	5.6	2.4	白血病	59	4.2	2.6
	其他	1,310	49.0	25.0	其他	540	42.3	18.5	其他	461	33.0	19.9

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表6 ICD-10 臺北市10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	106年		107年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死因	98.7	所有癌症死因	100.5	1.8
1	氣管、支氣管和肺癌	19.6	氣管、支氣管和肺癌	19.5	-0.5
2	結腸、直腸和肛門癌	12.6	結腸、直腸和肛門癌	13.0	3.7
3	肝和肝內膽管癌	12.9	肝和肝內膽管癌	12.8	-0.8
4	女性乳癌①	13.4	女性乳癌①	12.9	-3.6
5	前列腺(攝護腺)癌②	6.1	前列腺(攝護腺)癌②	5.6	-8.7
6	胰臟癌	5.7	胰臟癌	5.8	1.4
7	胃癌	5.0	胃癌	5.2	5.1
8	卵巢癌①	3.6	口腔癌	3.6	3.9
9	口腔癌	3.5	非何杰金氏淋巴瘤	2.9	15.1
10	子宮頸及部位未明示子宮癌①	3.0	卵巢癌①	3.3	-8.2

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表7 ICD-10 臺北市男性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	106年		107年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	117.7	所有癌症死亡原因	123.4	4.9
1	氣管、支氣管和肺癌	25.6	氣管、支氣管和肺癌	25.8	0.6
2	肝和肝內膽管癌	19.4	肝和肝內膽管癌	18.6	-4.2
3	結腸、直腸和肛門癌	14.9	結腸、直腸和肛門癌	16.2	8.4
4	胃癌	6.9	口腔癌	7.4	6.7
5	前列腺(攝護腺)癌	6.1	胃癌	6.4	-7.2
6	胰臟癌	6.6	前列腺(攝護腺)癌	5.6	-8.6
7	口腔癌	6.9	胰臟癌	6.9	4.8
8	食道癌	4.8	食道癌	5.9	22.3
9	膀胱癌	2.7	非何杰金氏淋巴瘤	4.0	38.4
10	非何杰金氏淋巴瘤	2.9	膀胱癌	2.5	-6.2

資料來源：衛生福利部。

表8 ICD-10 臺北市女性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	106年		107年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	83.1	所有癌症死亡原因	82.0	-1.4
1	氣管、支氣管和肺癌	14.7	氣管、支氣管和肺癌	14.5	-1.2
2	女性乳癌	13.4	女性乳癌	12.9	-3.6
3	結腸、直腸和肛門癌	10.7	結腸、直腸和肛門癌	10.5	-2.1
4	肝和肝內膽管癌	7.4	肝和肝內膽管癌	8.0	8.2
5	胰臟癌	5.0	胰臟癌	4.9	-2.7
6	胃癌	3.4	胃癌	4.3	25.7
7	卵巢癌	3.6	卵巢癌	3.3	-8.4
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	3.0	子宮頸及部位未明示子宮癌	2.5	-15.7
9	非何杰金氏淋巴瘤	2.2	非何杰金氏淋巴瘤	2.0	-10.9
10	子宮體癌	2.4	白血病	2.4	6.8

資料來源：衛生福利部。



## 【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較

順位	臺北市 2018					新北市 2018					桃園市 2018				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有死亡原因	18,050	674.54	317.59	100.00	所有死亡原因	23,970	600.57	382.33	100.00	所有死亡原因	12,745	578.15	396.88	100.00
1	惡性腫瘤	5,238	195.75	100.48	29.02	惡性腫瘤	7,026	176.04	110.86	29.31	惡性腫瘤	3,326	150.88	106.84	26.10
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	3,000	112.11	47.98	16.62	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	3,685	92.33	56.42	15.37	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	1,615	73.26	49.08	12.67
3	肺炎	1,619	60.50	22.32	8.97	肺炎	2,218	55.57	32.64	9.25	腦血管疾病	955	43.32	29.06	7.49
4	腦血管疾病	1,152	43.05	18.57	6.38	腦血管疾病	1,471	36.86	22.90	6.14	肺炎	768	34.84	21.58	6.03
5	糖尿病	692	25.86	11.34	3.83	糖尿病	1,133	28.39	17.67	4.73	高血壓性 疾病	707	32.07	20.16	5.55
6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	621	23.21	9.73	3.44	腎炎、腎病症候群 及腎病變	761	19.07	11.65	3.17	糖尿病	670	30.39	20.74	5.26
7	慢性下呼吸道疾病	514	19.21	7.38	2.85	事故傷害	750	18.79	14.63	3.13	事故傷害	546	24.77	20.29	4.28
8	事故傷害	455	17.00	10.85	2.52	慢性下呼吸道疾病	682	17.09	10.04	2.85	慢性下呼吸道疾病	432	19.60	11.89	3.39
9	敗血症	449	16.78	7.00	2.49	蓄意自我傷害（自 殺）	638	15.99	12.40	2.66	腎炎、腎病症候群 及腎病變	355	16.10	10.71	2.79
10	高血壓性 疾病	386	14.42	5.97	2.14	高血壓性 疾病	517	12.95	7.79	2.16	蓄意自我傷害（自 殺）	321	14.56	11.91	2.52
	其他	3,924	146.64	75.96	21.74	其他	5,089	127.51	85.34	21.23	其他	3,050	138.36	94.61	23.93
11	蓄意自我傷害（自 殺）	349	13.04	9.84	1.93	敗血症	486	12.18	7.50	2.03	慢性肝病及肝硬化	316	14.33	10.35	2.48
12	慢性肝病及肝硬化	238	8.89	4.97	1.32	慢性肝病及肝硬化	477	11.95	7.78	1.99	敗血症	302	13.70	8.96	2.37
13	血管性及未明示之 癡呆症	169	6.32	2.10	0.94	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	196	4.91	2.96	0.82	衰老/老邁	133	6.03	3.31	1.04
14	帕金森病	147	5.49	2.15	0.81	血管性及未明示之 癡呆症	161	4.03	2.20	0.67	血管性及未明示之 癡呆症	128	5.81	3.28	1.00
15	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	146	5.46	2.59	0.81	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	152	3.81	2.56	0.63	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	100	4.54	3.06	0.78

資料來源：衛生福利部。

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較(續)

順位	臺中市 2018					臺南市 2018					高雄市 2018				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	17,059	610.23	408.14	100.00	所有死亡原因	15,202	806.40	432.59	100.00	所有死亡原因	21,545	776.33	454.41	100.00
1	惡性腫瘤	5,145	184.05	124.57	30.16	惡性腫瘤	4,529	240.24	134.78	29.79	惡性腫瘤	6,212	223.84	131.68	28.83
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	1,588	56.81	36.83	9.31	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	1,678	89.01	45.85	11.04	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	2,201	79.31	44.54	10.22
3	腦血管疾病	1,109	39.67	25.78	6.50	肺炎	1,142	60.58	27.21	7.51	肺炎	1,724	62.12	32.37	8.00
4	肺炎	1,106	39.56	24.11	6.48	腦血管疾病	1,090	57.82	28.59	7.17	腦血管疾病	1,295	46.66	25.92	6.01
5	糖尿病	1,066	38.13	25.00	6.25	糖尿病	1,038	55.06	28.32	6.83	糖尿病	1,208	43.53	24.27	5.61
6	高血壓性疾病	734	26.26	16.25	4.30	事故傷害	619	32.84	22.59	4.07	高血壓性疾病	920	33.15	17.80	4.27
7	事故傷害	734	26.26	20.27	4.30	慢性下呼吸道疾病	512	27.16	12.30	3.37	事故傷害	824	29.69	21.64	3.82
8	腎炎、腎病症候群 及腎病變	624	22.32	14.17	3.66	高血壓性疾病	503	26.68	12.46	3.31	慢性下呼吸道疾病	657	23.67	12.57	3.05
9	慢性下呼吸道疾病	576	20.60	12.76	3.38	腎炎、腎病症候群 及腎病變	447	23.71	11.95	2.94	腎炎、腎病症候群 及腎病變	628	22.63	12.33	2.91
10	蓄意自我傷害（自 殺）	440	15.74	12.55	2.58	慢性肝病及肝硬化	337	17.88	10.52	2.22	慢性肝病及肝硬化	523	18.85	11.62	2.43
	其他	3,937	140.83	95.85	23.08	其他	3,307	175.42	98.01	21.75	其他	5,353	192.89	119.67	24.85
11	慢性肝病及肝硬化	431	15.42	10.74	2.53	蓄意自我傷害（自 殺）	328	17.40	12.69	2.16	敗血症	497	17.91	9.81	2.31
12	敗血症	332	11.88	7.79	1.95	敗血症	259	13.74	6.62	1.70	蓄意自我傷害（自 殺）	479	17.26	12.84	2.22
13	衰老/老邁	182	6.51	3.51	1.07	衰老/老邁	199	10.56	4.20	1.31	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	241	8.68	4.89	1.12
14	血管性及未明示之 癡呆症	163	5.83	3.28	0.96	血管性及未明示之 癡呆症	196	10.40	4.30	1.29	衰老/老邁	203	7.31	3.46	0.94
15	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	149	5.33	3.70	0.87	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	123	6.52	3.46	0.81	帕金森病	153	5.51	2.99	0.71

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較

順位	臺北市 2018					新北市 2018					桃園市 2018				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	惡性腫瘤	5,238	195.75	100.48	100.00	惡性腫瘤	7,026	176.04	110.86	100.00	惡性腫瘤	3,326	150.88	106.84	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	1,053	39.35	19.52	20.10	氣管、支氣管和肺癌	1,402	35.13	21.88	19.95	氣管、支氣管和肺癌	646	29.30	20.84	19.42
2	結腸、直腸和肛門癌	705	26.35	13.03	13.46	肝和肝內膽管癌	1,067	26.73	16.61	15.19	肝和肝內膽管癌	452	20.50	14.53	13.59
3	肝和肝內膽管癌	679	25.37	12.82	12.96	女性乳房癌(1)	404	19.83	12.00	5.75	結腸、直腸和肛門癌	423	19.19	13.41	12.72
4	女性乳房癌(1)	321	22.96	12.92	6.13	結腸、直腸和肛門癌	791	19.82	12.49	11.26	女性乳房癌(1)	157	14.17	9.81	4.72
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	160	12.52	5.57	3.05	口腔癌	425	10.65	6.72	6.05	口腔癌	203	9.21	6.57	6.10
6	胰臟癌	308	11.51	5.81	5.88	胃癌	376	9.42	5.85	5.35	前列腺(攝護腺)癌(2)	101	9.21	5.93	3.04
7	胃癌	288	10.76	5.24	5.50	前列腺(攝護腺)癌(2)	184	9.42	6.33	2.62	食道癌	166	7.53	5.35	4.99
8	口腔癌	176	6.58	3.65	3.36	胰臟癌	360	9.02	5.48	5.12	胃癌	158	7.17	4.85	4.75
9	非何杰金氏淋巴瘤	159	5.94	2.89	3.04	食道癌	268	6.71	4.18	3.81	胰臟癌	157	7.12	5.00	4.72
10	卵巢癌(1)	79	5.65	3.30	1.51	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	109	5.35	3.29	1.55	非何杰金氏淋巴瘤	99	4.49	3.11	2.98
	其他	1,310	48.96	26.28	25.01	其他	1,640	41.09	26.65	23.34	其他	764	34.66	25.21	22.97
11	食道癌	140	5.23	2.92	2.67	卵巢癌(1)	104	5.11	3.05	1.48	卵巢癌(1)	44	3.97	2.79	1.32
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	66	4.72	2.53	1.26	非何杰金氏淋巴瘤	180	4.51	2.89	2.56	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	43	3.88	2.61	1.29
13	白血病	124	4.63	2.76	2.37	白血病	173	4.33	2.96	2.46	子宮體癌(1)	40	3.61	2.61	1.20
14	膀胱癌	109	4.07	1.69	2.08	子宮體癌(1)	68	3.34	1.93	0.97	白血病	72	3.27	2.50	2.16
15	子宮體癌(1)	54	3.86	2.03	1.03	膀胱癌	115	2.88	1.75	1.64	膀胱癌	66	2.99	2.00	1.98

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較(續)

順位	臺中市 2018					臺南市 2018					高雄市 2018				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	惡性腫瘤	5,145	184.05	124.57	100.00	惡性腫瘤	4,529	240.24	134.78	100.00	惡性腫瘤	6,212	223.84	131.68	100.00
2	肝和肝內膽管癌	919	32.87	22.14	17.86	氣管、支氣管和肺癌	860	45.62	24.86	18.99	肝和肝內膽管癌	1,171	42.19	24.66	18.85
3	氣管、支氣管和肺癌	919	32.87	21.88	17.86	肝和肝內膽管癌	810	42.97	24.02	17.88	氣管、支氣管和肺癌	1,131	40.75	23.38	18.21
4	結腸、直腸和肛門癌	596	21.32	14.25	11.58	結腸、直腸和肛門癌	602	31.93	17.12	13.29	結腸、直腸和肛門癌	753	27.13	15.29	12.12
5	女性乳房癌(1)	265	18.68	12.45	5.15	女性乳房癌(1)	221	23.41	14.28	4.88	女性乳房癌(1)	328	23.40	13.99	5.28
6	口腔癌	357	12.77	8.81	6.94	前列腺(攝護腺)癌(2)	140	14.88	8.00	3.09	口腔癌	393	14.16	8.85	6.33
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	146	10.60	7.35	2.84	口腔癌	222	11.78	7.25	4.90	前列腺(攝護腺)癌(2)	152	11.06	6.40	2.45
8	胃癌	226	8.08	5.43	4.39	胰臟癌	213	11.30	6.36	4.70	胃癌	269	9.69	5.44	4.33
9	胰臟癌	223	7.98	5.44	4.33	胃癌	178	9.44	5.01	3.93	胰臟癌	262	9.44	5.39	4.22
10	食道癌	209	7.48	5.10	4.06	食道癌	139	7.37	4.50	3.07	食道癌	228	8.22	4.97	3.67
11	卵巢癌(1)	82	5.78	3.85	1.59	膀胱癌	133	7.06	3.61	2.94	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	101	7.21	4.26	1.63
12	其他	1,203	43.03	29.57	23.38	其他	1,011	53.63	31.19	22.32	其他	1,424	51.31	31.24	22.92
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	65	4.58	2.97	1.26	卵巢癌(1)	61	6.46	3.97	1.35	膀胱癌	144	5.19	2.79	2.32
14	白血病	127	4.54	3.37	2.47	非何杰金氏淋巴瘤	96	5.09	2.90	2.12	非何杰金氏淋巴瘤	136	4.90	2.90	2.19
15	非何杰金氏淋巴瘤	110	3.93	2.66	2.14	白血病	93	4.93	2.86	2.05	白血病	135	4.86	3.21	2.17
16	膀胱癌	107	3.83	2.45	2.08	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	42	4.45	2.44	0.93	卵巢癌(1)	67	4.78	2.90	1.08
17	子宮體癌(1)	44	3.10	2.02	0.86	膽囊和其他膽道癌	66	3.50	1.90	1.46	鼻咽癌	91	3.28	2.16	1.46

### 【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

表1.臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2018				全國 2018				日本 2017(平成29年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
1	所有死亡原因	18,050	674.54	100.00	所有死亡原因	172,859	733.07	100.00	所有死亡原因	1,340,397	1075.34	100.00
2	惡性腫瘤	5,238	195.75	29.02	惡性腫瘤	48,784	206.89	28.22	惡性腫瘤	373,334	299.51	27.85
3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3,000	112.11	16.62	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	21,569	91.47	12.48	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	204,837	164.33	15.28
4	肺炎	1,619	60.50	8.97	肺炎	13,421	56.92	7.76	腦血管疾病	109,880	88.15	8.20
5	腦血管疾病	1,152	43.05	6.38	腦血管疾病	11,520	48.85	6.66	老邁	101,396	81.35	7.56
6	糖尿病	692	25.86	3.83	糖尿病	9,374	39.75	5.42	肺炎	96,841	77.69	7.22
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	621	23.21	3.44	事故傷害	6,846	29.03	3.96	事故傷害	40,329	32.35	3.01
8	慢性下呼吸道疾病	514	19.21	2.85	慢性下呼吸道疾病	6,146	26.06	3.56	腎衰竭	25,134	20.16	1.88
9	敗血症	455	17.00	2.52	高血壓性疾病	5,991	25.41	3.47	自殺	20,465	16.42	1.53
10	事故傷害	449	16.78	2.49	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,523	23.42	3.20	血管性及未明示之癡呆症	19,546	15.68	1.46
11	高血壓性疾病	386	14.42	2.14	慢性肝病及肝硬化	4,315	18.30	2.50	主動脈瘤及剝離	19,126	15.34	1.43
12	其他	3,924	146.64	21.74	其他	39,370	166.96	22.78	其他	329,509	264.35	24.58
13	蓄意自我傷害（自殺）	349	13.04	1.93	蓄意自我傷害（自殺）	3,865	16.39	2.24	慢性阻塞性肺病	18,523	14.86	1.38
14	血管性及未明示之癡呆症	238	8.89	1.32	敗血症	3,773	16.00	2.18	肝臟疾病	17,018	13.65	1.27
15	慢性肝病及肝硬化	169	6.32	0.94	血管性及未明示之癡呆症	1,521	6.45	0.88	糖尿病	13,969	11.21	1.04
16	帕金森病	147	5.49	0.81	衰老/老邁	1,487	6.31	0.86	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	13,020	10.45	0.97
17	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	146	5.46	0.81	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,432	6.07	0.83	敗血症	10,213	8.19	0.76

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2018				全國 2018				日本 2017(平成29年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	90	359.94	100.00	所有死亡原因	772	396.68	100.00	所有死亡原因	1,761	186.14	100.00
1	源於周產期的特定病況	44	175.97	48.89	先天性畸形、變形及染色體異常	152	78.10	19.69	先天性畸形變形及染色體異常	635	67.12	36.06
2	先天性畸形變形及染色體異常	23	91.99	25.56	源於周產期的呼吸性疾患	107	54.98	13.86	源於周產期的特定病況	468	49.47	26.58
3	事故傷害	6	24.00	6.67	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	80	41.11	10.36	源於周產期的呼吸和心臟血管疾患	236	24.95	13.40
4	腦血管疾病	3	12.00	3.33	事故傷害	59	30.32	7.64	事故傷害	77	8.14	4.37
5	嬰兒猝死症候群（SIDS）	2	8.00	2.22	特發於周產期的感染	39	20.04	5.05	嬰兒猝死症候群（SIDS）	69	7.29	3.92
6	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1	4.00	1.11	嬰兒猝死症候群（SIDS）	23	11.82	2.98	胎兒及新生兒出血及血液疾患	64	6.76	3.63
7	肺炎	1	4.00	1.11	心臟疾病（高血壓性心臟病除外）	17	8.74	2.20	妊娠期間及胎兒生長有關的疾患	58	6.13	3.29
8	敗血症	1	4.00	1.11	肺炎	17	8.74	2.20	特發於周產期的感染	45	4.76	2.56
9					胎兒及新生兒出血及血液疾患	13	6.68	1.68	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	27	2.85	1.53
10					敗血症	12	6.17	1.55	敗血症	19	2.01	1.08
	其他	9	35.99	10.00	其他	253	130.00	32.77	其他	63	6.66	3.58

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

附註：(1)源於周產期的特定病況包含胎兒及新生兒受母體因素和妊娠、產程[臨產]及分娩併發症的影響、妊娠期長短和胎兒生長有關的疾患、生產創傷、特發於周產期的呼吸和心臟血管疾患、特發於周產期的感染(症)、胎兒及新生兒出血和血液疾患、特發於胎兒及新生兒的短暫性內分泌和(新陳)代謝(性)疾患、胎兒和新生兒消化系統疾患、侵及(侵犯、涉及)胎兒及新生兒體被[被膜、皮膚]和體溫調節的病況。

表3. 少年（1-14歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2018				全國 2018				日本 2017(平成29年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	32	9.22	100.00	所有死亡原因	390	13.33	100.00	所有死亡原因	1,481	10.24	100.00
1	事故傷害	8	2.31	25.00	事故傷害	86	2.94	22.05	先天性畸形變形及染色體異常	266	1.84	17.96
2	先天性畸形變形及染色體異常	4	1.15	12.50	惡性腫瘤	76	2.60	19.49	惡性腫瘤	234	1.62	15.80
3	惡性腫瘤	4	1.15	12.50	先天性畸形變形及染色體異常	29	0.99	7.44	事故傷害	181	1.25	12.22
4	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	0.58	6.25	加害（他殺）	19	0.65	4.87	自殺	100	0.69	6.75
5	加害（他殺）	2	0.58	6.25	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	15	0.51	3.85	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	69	0.48	4.66
6	敗血症	2	0.58	6.25	肺炎	8	0.27	2.05	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	37	0.26	2.50
7	肺炎	1	0.29	3.13	敗血症	7	0.24	1.79	肺炎	31	0.21	2.09
8	流行性感冒	1	0.29	3.13	腦血管疾病	7	0.24	1.79	腦血管疾病	23	0.16	1.55
9	蓄意自我傷害（自殺）	1	0.29	3.13	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	0.21	1.54	腸道感染症	22	0.15	1.49
10					流行性感冒	4	0.14	1.03	敗血症	20	0.14	1.35
10									他殺	20	0.14	1.35
	其他	7	2.02	21.88	其他	133	4.54	34.11	其他	478	3.31	32.28

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2018				全國 2018				日本 2017(平成29年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	66	23.21	100.00	所有死亡原因	1,157	38.49	100.00	所有死亡原因	3,185	26.95	100.00
1	事故傷害	19	6.68	28.79	事故傷害	530	17.63	45.81	自殺	1,514	12.81	47.54
2	蓄意自我傷害（自殺）	15	5.28	22.73	蓄意自我傷害（自殺）	193	6.42	16.68	事故傷害	567	4.80	17.80
3	惡性腫瘤	7	2.46	10.61	惡性腫瘤	122	4.06	10.54	惡性腫瘤	299	2.53	9.39
4	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	4	1.41	6.06	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	55	1.83	4.75	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	152	1.29	4.77
5	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	2	0.70	3.03	加害（他殺）	19	0.63	1.64	先天性畸形變形及染色體異常	46	0.39	1.44
6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	0.70	3.03	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	18	0.60	1.56	腦血管疾病	29	0.25	0.91
7	腦血管疾病	2	0.70	3.03	腦血管疾病	17	0.57	1.47	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	29	0.25	0.91
8	人類免疫缺乏病毒（HIV）疾病	1	0.35	1.52	先天性畸形變形及染色體異常	14	0.47	1.21	肺炎	20	0.17	0.63
9	病毒性肝炎	1	0.35	1.52	肺炎	10	0.33	0.86	他殺	17	0.14	0.53
10	敗血症	1	0.35	1.52	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	7	0.23	0.60	敗血症	14	0.12	0.44
	其他	12	4.22	18.18	其他	172	5.72	14.87	其他	498	4.21	15.64

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>



表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2018				全國 2018				日本 2017(平成29年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	583	72.88	100.00	所有死亡原因	8,351	115.54	100.00	所有死亡原因	19,096	63.99	100.00
1	惡性腫瘤	158	19.75	27.10	惡性腫瘤	2,035	28.15	24.37	自殺	5,323	17.84	27.87
2	蓄意自我傷害（自殺）	91	11.38	15.61	事故傷害	1,234	17.07	14.78	惡性腫瘤	4,679	15.68	24.50
3	事故傷害	78	9.75	13.38	蓄意自我傷害（自殺）	1,200	16.60	14.37	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,788	5.99	9.36
4	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	57	7.13	9.78	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	734	10.16	8.79	事故傷害	1,469	4.92	7.69
5	腦血管疾病	26	3.25	4.46	慢性肝病及肝硬化	601	8.31	7.20	腦血管疾病	1,247	4.18	6.53
6	慢性肝病及肝硬化	13	1.63	2.23	腦血管疾病	318	4.40	3.81	肝臟疾病	585	1.96	3.06
7	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	9	1.13	1.54	糖尿病	199	2.75	2.38	主動脈瘤及剝離	206	0.69	1.08
8	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	0.88	1.20	肺炎	144	1.99	1.72	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	190	0.64	0.99
9	糖尿病	7	0.88	1.20	高血壓性 疾病	117	1.62	1.40	糖尿病	156	0.52	0.82
10	肺炎	6	0.75	1.03	腎炎、腎病症候群及 腎病變	92	1.27	1.10	肺炎	144	0.48	0.75
	其他	131	16.38	22.47	其他	1,677	23.20	20.08	其他	3,309	11.09	17.33

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2018				全國 2018				日本 2017(平成29年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	3,069	381.94	100.00	所有死亡原因	37,644	536.44	100.00	所有死亡原因	105,510	323.96	100.00
1	惡性腫瘤	1,403	174.60	45.72	惡性腫瘤	16,010	228.15	42.53	惡性腫瘤	45,480	139.64	43.10
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	435	54.14	14.17	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	3,872	55.18	10.29	心臟疾病(高血 壓性 疾病除外)	12,963	39.80	12.29
3	腦血管疾病	170	21.16	5.54	慢性肝病及肝硬化	2,092	29.81	5.56	腦血管疾病	8,147	25.01	7.72
4	蓄意自我傷害(自殺)	122	15.18	3.98	腦血管疾病	2,047	29.17	5.44	自殺	6,763	20.77	6.41
5	事故傷害	114	14.19	3.71	事故傷害	1,911	27.23	5.08	肝臟疾病	4,352	13.36	4.12
6	糖尿病	112	13.94	3.65	糖尿病	1,671	23.81	4.44	事故傷害	4,158	12.77	3.94
7	慢性肝病及肝硬化	95	11.82	3.10	蓄意自我傷害(自殺)	1,482	21.12	3.94	肺炎	1,807	5.55	1.71
8	肺炎	67	8.34	2.18	肺炎	936	13.34	2.49	主動脈瘤及剝離	1,621	4.98	1.54
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	49	6.10	1.60	高血壓性 疾病	883	12.58	2.35	糖尿病	1,423	4.37	1.35
10	高血壓性 疾病	48	5.97	1.56	腎炎、腎病症候群及腎病變	693	9.88	1.84	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	906	2.78	0.86
	其他	454	56.50	14.79	其他	6,047	86.17	16.06	其他	17,890	54.93	16.96

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表7.老年人口(65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2018				全國 2018				日本 2017(平成29年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	13,794	3,214.24	100.00	所有死亡原因	123,543	3,876.40	100.00	所有死亡原因	1,208,895	3,453.33	100.00
1	惡性腫瘤	3,490	813.23	25.30	惡性腫瘤	29,790	934.72	24.11	惡性腫瘤	322,608	921.56	26.69
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	2,251	524.52	16.32	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	15,951	500.49	12.91	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)	189,806	542.20	15.70
3	肺炎	1,348	314.11	9.77	肺炎	11,365	356.60	9.20	老邁	101,375	289.59	8.39
4	腦血管疾病	996	232.09	7.22	腦血管疾病	9,360	293.69	7.58	腦血管疾病	100,425	286.87	8.31
5	糖尿病	609	141.91	4.41	糖尿病	7,969	250.04	6.45	肺炎	94,811	270.84	7.84
6	慢性下呼吸道疾病	564	131.42	4.09	慢性下呼吸道疾病	5,821	182.64	4.71	事故傷害	33,844	96.68	2.80
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	536	124.90	3.89	高血壓性 疾病	5,072	159.14	4.11	腎衰竭	24,293	69.40	2.01
8	敗血症	425	99.03	3.08	腎炎、腎病症候群 及腎病變	4,588	143.96	3.71	血管性及未明示 之癡呆症	19,468	55.61	1.61
9	高血壓性 疾病	315	73.40	2.28	敗血症	3,147	98.74	2.55	慢性阻塞性 肺病	18,130	51.79	1.50
10	血管性及未明示之 癡呆症	309	72.00	2.24	事故傷害	3,145	98.68	2.55	主動脈瘤及 剝離	17,286	49.38	1.43
	其他	2,951	687.63	21.39	其他	27,335	857.69	22.13	其他	286,849	819.41	23.73

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

## 【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標

### 表1.臺北市行政區別衛生統計指標 — 人口統計

中華民國107年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km <sup>2</sup>	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km <sup>2</sup>	9,818	22,148	19,933	27,184	16,771	20,902	22,463	21,419	8,688	5,570	9,102	4,594	4,497
年底人口數	總計		2,668,572	205,702	223,406	308,843	229,456	159,000	127,625	189,603	273,762	121,670	287,429	286,544	255,532
	男性	人	1,273,375	96,393	106,457	144,007	106,664	75,898	62,148	92,969	131,145	59,439	137,196	138,079	122,980
	女性		1,395,197	109,309	116,949	164,836	122,792	83,102	65,477	96,634	142,617	62,231	150,233	148,465	132,552
	性比例		91.27	88.18	91.03	87.36	86.87	91.33	94.92	96.21	91.96	95.51	91.32	93.00	92.78
人口變動	出生數	人	22,849	1,558	1,900	2,323	2,036	1,333	1,137	1,711	2,322	1,224	2,623	2,490	2,192
	死亡數	人	17,902	1,341	1,582	2,040	1,579	1,082	982	1,760	1,655	807	1,389	1,949	1,736
	粗出生率	‰	8.54	7.55	8.46	7.51	8.85	8.37	8.85	8.97	8.47	10.04	9.12	8.66	8.56
	粗死亡率	‰	6.69	6.50	7.04	6.59	6.86	6.79	7.64	9.23	6.04	6.62	4.83	6.78	6.78
	人口增加率	‰	-5.47	-6.21	-10.40	-3.63	-5.44	-3.81	-12.79	-11.71	-2.41	-3.97	-1.19	-6.07	-3.60
	自然增加率	‰	1.85	1.05	1.42	0.91	1.99	1.58	1.21	-0.26	2.43	3.42	4.29	1.88	1.78
	社會增加率	‰	-7.34	-7.28	-11.87	-4.55	-7.44	-5.39	-14.08	-11.52	-4.85	-7.40	-5.48	-7.97	-5.39
生育率	一般生育率		35	31	35	32	36	35	37	38	33	38	35	35	34
	總生育率		1,125	1,065	1,095	1,085	1,135	1,160	1,160	1,205	1,130	1,230	1,120	1,135	1,120
	15-19歲		1	1	1	1	1	1	2	3	1	4	1	1	2
	20-24歲		11	6	10	4	12	8	12	21	11	15	10	12	14
	25-29歲	‰	45	39	42	37	43	45	55	52	45	50	45	46	47
	30-34歲		93	95	88	94	93	103	90	86	96	99	89	95	97
	35-39歲		61	59	62	65	65	61	59	65	58	61	63	59	54
	40-44歲		13	12	15	15	12	13	13	14	14	15	15	13	10
	45-49歲		1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	0	
人口組成 (年底)	14歲以下 (a)		363,657	30,327	27,065	46,675	28,488	25,802	16,800	20,950	37,830	16,228	41,804	36,808	34,880
	15-64歲 (b)	人	1,846,280	136,783	154,719	200,575	159,798	104,916	88,406	132,756	193,566	87,013	209,546	199,251	178,951
	65歲以上 (c)		458,635	38,592	41,622	61,593	41,170	28,282	22,419	35,897	42,366	18,429	36,079	50,485	41,701
人口組成結 構比(年底)	14歲以下		13.63	14.74	12.11	15.11	12.42	16.23	13.16	11.05	13.82	13.34	14.54	12.85	13.65
	15-64歲	‰	69.19	66.50	69.25	64.94	69.64	65.98	69.27	70.02	70.71	71.52	72.90	69.54	70.03
	65歲以上		17.19	18.76	18.63	19.94	17.94	17.79	17.57	18.93	15.48	15.15	12.55	17.62	16.32
	扶養比(a+c)/b	‰	44.54	50.39	44.39	53.98	43.59	51.55	44.36	42.82	41.43	39.83	37.17	43.81	42.79
	老化指數c/a		126.12	127.25	153.79	131.96	144.52	109.61	133.45	171.35	111.99	113.56	86.31	137.16	119.56

表2.臺北市行政區別衛生統計指標—醫療資源

中華民國107年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家	36	5	1	6	4	3	1	4	2	-	3	1	6
	診所		3,572	297	292	843	471	285	168	179	200	79	251	309	198
	護產機構		144	17	8	19	24	14	7	6	8	4	12	14	11
	精神復建機構		50	3	1	4	11	5	3	1	4	1	3	6	8
	其他醫療及醫事機構		312	27	28	52	49	27	21	8	26	27	12	16	19
	非醫事機構		1,276	94	112	119	130	116	75	88	110	69	121	128	114
	藥商		12,178	1,157	1,130	1,900	2,035	1,084	880	586	489	387	1,227	779	524
	總計		25,464	1,804	1,547	3,693	2,329	3,722	681	636	1,032	484	2,600	1,579	5,357
病床數	醫院病床	床	19,934	1,291	1,273	2,078	1,303	3,234	450	440	861	411	2,241	1,292	5,060
	一般急性病床		13,894	745	896	1,531	834	2,244	329	169	592	281	1,610	876	3,787
	一般慢性病床		619	103	133	-	20	-	-	79	-	-	-	-	284
	特殊病床		5,421	443	244	547	449	990	121	192	269	130	631	416	989
	診所病床		5,530	513	274	1,615	1,026	488	231	196	171	73	359	287	297
醫事人力 (醫療及醫事機構)	總計	人	56,232	4,044	3,526	7,867	5,971	8,509	1,532	1,533	2,826	1,217	5,315	4,104	9,788
	醫師		14,359	984	980	2,310	1,562	2,208	374	433	775	258	1,262	1,064	2,149
	西醫師		10,112	573	613	1,475	1,058	1,795	207	256	508	164	913	711	1,839
	中醫師		978	80	84	181	155	93	67	55	58	22	48	71	64
	牙醫師		3,269	331	283	654	349	320	100	122	209	72	301	282	246
	藥事人員		5,662	510	447	750	764	621	250	282	305	176	540	400	617
	護產人員		28,380	2,008	1,610	3,558	2,801	4,536	627	601	1,382	606	2,822	2,040	5,789
	醫檢人員		3,561	236	174	480	327	703	100	62	133	80	357	198	711
其他	4,270	306	315	769	517	441	181	155	231	97	334	402	522		
平均 每萬人 醫療資源	醫院	家	0.13	0.24	0.04	0.19	0.17	0.19	0.08	0.21	0.07	0.00	0.10	0.03	0.23
	診所	家	13.39	14.44	13.07	27.30	20.53	17.92	13.16	9.44	7.31	6.49	8.73	10.78	7.75
	病床數	床	95.42	87.70	69.25	119.58	101.50	234.09	53.36	33.54	37.70	39.78	90.46	55.10	209.64
	醫事人員數	人	210.72	196.60	157.83	254.72	260.22	535.16	120.04	80.85	103.23	100.02	184.92	143.22	383.04
	醫師	人	53.81	47.84	43.87	74.80	68.07	138.87	29.30	22.84	28.31	21.20	43.91	37.13	84.10
	西醫師	人	37.89	27.86	27.44	47.76	46.11	112.89	16.22	13.50	18.56	13.48	31.76	24.81	71.97
	中醫師	人	3.66	3.89	3.76	5.86	6.76	5.85	5.25	2.90	2.12	1.81	1.67	2.48	2.50
	牙醫師	人	12.25	16.09	12.67	21.18	15.21	20.13	7.84	6.43	7.63	5.92	10.47	9.84	9.63
	藥事人員	人	21.22	24.79	20.01	24.28	33.30	39.06	19.59	14.87	11.14	14.47	18.79	13.96	24.15
	護產人員	人	106.35	97.62	72.07	115.20	122.07	285.28	49.13	31.70	50.48	49.81	98.18	71.19	226.55
醫檢人員	人	13.34	11.47	7.79	15.54	14.25	44.21	7.84	3.27	4.86	6.58	12.42	6.91	27.82	
其他	人	16.00	14.88	14.10	24.90	22.53	27.74	14.18	8.17	8.44	7.97	11.62	14.03	20.43	

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計

中華民國107年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	肺炎		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	腦血管疾病		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	糖尿病		5	5	6	5	6	8	7	5	5	6	5	5	6
	腎炎、腎病症候群及腎病變		6	6	5	7	5	5	5	9	7	5	7	6	7
	慢性下呼吸道疾病		7	7	8	6	9	6	8	6	8	7	9	8	5
	敗血症		8	10	7	8	9	10	9	7	6	10	6	9	10
	事故傷害		9	9	9	9	7	8	5	10	10	8	7	7	8
	高血壓性疾病		10	11	9	11	8	7	10	7	9	11	11	11	9
十大死因 死亡率	所有死亡原因	人/每十 萬人口	674.54	654.73	708.88	676.13	693.23	654.72	768.38	926.98	611.11	673.43	490.96	681.23	685.95
	惡性腫瘤		195.75	197.73	206.61	187.46	201.67	187.06	235.89	245.38	164.91	229.67	144.65	201.10	205.86
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		112.11	95.96	118.44	125.40	115.18	98.55	131.57	165.16	108.36	88.59	75.80	115.86	111.72
	肺炎		60.50	71.24	63.23	54.94	64.32	57.12	62.28	86.51	56.55	47.58	44.51	57.76	66.02
	腦血管疾病		43.05	46.04	44.08	47.51	39.12	43.94	42.82	57.67	35.39	46.75	34.08	41.40	44.92
	糖尿病		25.86	25.20	23.60	21.01	27.38	16.32	24.13	45.62	28.82	22.97	18.78	30.97	25.39
	腎炎、腎病症候群及腎病變		23.21	15.99	31.61	17.45	30.42	27.62	27.25	25.17	20.07	23.79	14.60	28.18	23.05
	慢性下呼吸道疾病		19.21	14.54	18.70	20.36	16.08	20.09	20.24	26.74	17.15	22.15	13.21	17.40	27.74
	敗血症		17.00	10.18	19.15	16.48	16.08	14.44	17.13	25.69	22.26	12.30	15.30	16.70	13.67
	事故傷害		16.78	10.66	13.80	15.84	21.30	16.32	27.25	20.97	13.86	17.23	14.60	19.48	17.97
高血壓性疾病	14.42	9.69	13.80	10.99	16.52	18.20	15.57	25.69	16.42	10.66	8.00	14.26	16.80		

表3.臺北市行政區別衛生統計指標—ICD-10死因統計(續1)

中華民國107年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世 界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	317.59	281.89	308.17	266.08	321.10	291.54	375.54	394.23	300.33	375.89	305.05	322.71	349.35
	惡性腫瘤		100.48	94.36	98.29	84.68	100.03	92.71	121.22	114.65	90.69	132.46	94.29	100.78	112.17
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)		47.98	35.58	47.69	42.38	49.75	37.03	59.36	64.63	47.97	43.28	46.38	50.54	53.88
	肺炎		22.32	22.28	20.95	15.72	25.02	19.50	24.92	28.44	22.15	21.66	23.37	21.65	27.06
	腦血管疾病		18.57	19.58	16.73	15.87	17.20	16.30	20.66	22.37	16.54	24.57	18.90	19.17	20.91
	糖尿病		11.34	8.33	9.64	7.11	12.79	6.97	10.27	20.01	13.25	11.34	11.96	13.83	12.13
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		9.73	5.48	12.24	6.51	12.67	10.16	11.70	9.45	9.36	12.56	8.30	11.34	10.60
	慢性下呼吸道疾 病		7.38	4.88	6.17	6.06	6.06	6.66	10.07	8.60	6.85	11.56	7.40	6.87	11.22
	敗血症		10.85	3.92	7.60	5.14	6.61	5.56	7.30	9.63	10.61	6.02	8.76	6.71	6.50
	事故傷害		7.00	6.83	8.34	8.76	12.47	8.91	17.60	10.10	8.57	14.93	11.44	13.48	12.51
高血壓性疾病	5.97	3.63	5.32	3.62	7.19	7.70	6.49	10.13	7.14	6.12	4.01	5.93	6.91		
十大死因 標準化 死亡率 區排名	所有死亡原因	區排名		11	7	12	6	10	3	1	9	2	8	5	4
	惡性腫瘤			8	7	12	6	10	2	3	11	1	9	5	4
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)			12	7	10	5	11	2	1	6	9	8	4	3
	肺炎			6	10	12	3	11	4	1	7	8	5	9	2
	腦血管疾病			5	9	12	8	11	4	2	10	1	7	6	3
	糖尿病			10	9	11	4	12	8	1	3	7	6	2	5
	腎炎、腎病症候 群及腎病變			12	3	11	1	7	4	8	9	2	10	5	6
	慢性下呼吸道疾 病			12	9	10	11	8	3	4	7	1	5	6	2
	敗血症			12	4	11	7	10	5	2	1	9	3	6	8
	事故傷害			12	11	9	5	8	1	7	10	2	6	3	4
高血壓性疾病		11	9	12	3	2	6	1	4	7	10	8	5		

表3.臺北市行政區別衛生統計指標—ICD-10死因統計(續2完)

中華民國107年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	全部	人/每十 萬人口	674.54	654.73	708.88	676.13	187.62	654.72	768.38	926.98	611.11	203.72	490.96	172.00	685.95
	0歲		442.23	443.88	311.85	511.84	-	594.57	584.55	177.46	432.81	-	378.64	84.39	407.06
	1-4歲		17.12	-	51.99	15.03	-	27.21	-	12.44	8.61	-	7.41	-	26.89
	5-14歲		15.00	9.77	35.29	13.01	-	23.68	-	16.17	24.76	-	7.93	-	9.34
	15-24歲		55.39	76.61	43.06	32.21	17.57	126.62	17.33	41.75	39.35	-	49.40	12.65	78.14
	25-44歲		258.35	223.19	232.50	238.04	92.21	199.11	291.91	355.07	214.02	135.84	241.04	87.36	282.08
	45-64歲		1,541.95	1,391.30	1,474.52	1,224.39	731.39	1,410.19	2,098.91	2,019.54	1,406.58	685.85	1,374.91	732.37	1,593.88
	65歲以上		21,880.51	20,128.58	21,952.65	18,995.55	4,195.93	19,885.11	23,933.76	25,777.39	21,501.55	5,644.14	21,741.81	3,972.80	23,826.86
年齡別 死亡率 區排名	全部	區排名		6	3	5	11	7	2	1	8	10	9	12	4
	0歲			4	8	3	11	1	2	9	5	11	7	10	6
	1-4歲			8	1	4	8	2	8	5	6	8	7	8	3
	5-14歲			6	1	5	9	3	9	4	2	9	8	9	7
	15-24歲			3	5	8	9	1	10	6	7	12	4	11	2
	25-44歲			7	6	5	11	9	2	1	8	10	4	12	3
	45-64歲			7	4	9	11	5	1	2	6	12	8	10	3
	65歲以上			7	4	9	11	8	2	1	6	10	5	12	3



## 【附錄 5】主要名詞解釋與公式

本死因統計摘要係依據世界衛生組織所公告之「國際疾病與死因分類標準第十版 (ICD-10)」加註死因碼，所統計之死因為原死因 (Underlying causes of death)。

### 一、原 (肇始) 死因

死亡證明書上所填之死因係指所有導致死亡或與死亡相關的疾病、罹病狀況、或是造成這些傷害的意外或暴力環境等。

原死因係指(a)可引起一連串病症而導致直接死亡之疾病或傷害；(b)造成致命傷害之事故或暴力之環境。

### 二、孕產婦死亡

孕產婦死亡係指在懷孕期間或懷孕終止後 42 天內之婦女死亡，而不論其懷孕期長短或懷孕的位置為何；或任何與懷孕有關或因懷孕而加重之原因所導致之死亡。但不包括因事故或偶發原因所致之死亡。

孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數 \* 100,000。

### 三、嬰兒死亡

嬰兒死亡係指嬰兒出生後未滿一歲之死亡數。

嬰兒死亡率 = 嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數 \* 1,000。

#### 四、新生兒死亡

新生兒死亡係指係指嬰兒出生後，在未滿四週（28天）內之死亡數。

新生兒死亡率 = 新生兒死亡數 / 活產嬰兒數 \* 1,000。

#### 五、年齡別死亡率

年齡別死亡率 = 年齡別死亡數 / 該年齡別年中人口數 \* 100,000。

#### 六、標準化死亡率

標準化死亡率是將兩國或兩地不同性別、年齡、城鄉、所得、職業、婚姻、種族等項組合，化成為同一的基礎，用以剔除其人口在組合上之差異，俾可受到純正而客觀的比較。本書刊所用的標準化死亡率是指去除年齡組成影響、以 WHO 2000 年世界人口結構為基準的死亡率。

標準化死亡率 =  $\left[ \sum (\text{年齡別死亡率} * \text{標準組年齡別人口數}) \right] / \text{標準組總人口數}$ 。