

中華民國 109 年
臺北市死因統計年報

臺北市政府衛生局編印

中華民國 110 年 10 月出版

凡 例

- 一、本年報編印之目的，係提供臺北市死因統計，以提供政府施政及學術研究之參考。
- 二、本年報內容計分：(一) 提要分析 (二) 人口統計指標 (三) 109 年死因統計 (四) 歷年死因統計 (五) 歷年主要癌症發生率等 5 類，凡 56 表；另附錄 1 至 5 共計 20 表。
- 三、部分資料因尾數四捨五入，計算時仍以原始數據計算，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。
- 四、本年報各表所稱「年」係指全年；「年底」係指當年 12 月底。
- 五、本年報所用符號代表意義如下：
「—」經統計但無數據；「--」有數值，但該數值無意義；「…」數值不明或尚未產生資料；「0」代表有數值而不及半單位；「①」修正數。

目次

凡例

壹、提要分析

貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別.....	1
表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數.....	3
表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性.....	4
表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性.....	5
表F·臺北市各行政區年底人口數.....	6
表G·臺北市近十年各行政區年底人口數.....	7
表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	8
表I·臺北市近十年各行政區年中人口數.....	9

參、109年死因統計

一、主要死因統計

表 1·臺北市、全國主要死亡原因比較.....	11
表 2·ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3·ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

目 次

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因.....	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因.....	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因.....	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因.....	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因.....	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因.....	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65-74歲)主要死亡原因.....	23
表14 · ICD-10 臺北市老年(75-84歲)主要死亡原因.....	24
表15 · ICD-10 臺北市老年(85歲以上)主要死亡原因.....	25
表16 · ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因.....	26
表17 · ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因.....	27
表18 · ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因.....	28
表19 · ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因.....	29
表20 · ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因.....	30
表21 · ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因.....	31
表22 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式.....	32
表23 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式.....	33
表24 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式.....	34
表25 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因.....	35
表26 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況.....	36
表27 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	37
表28 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況.....	38

目次

二、行政區別死因統計

表29-1~29-12 · ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	39
表30-1~30-12 · ICD-10 臺北市十二區事故傷害死亡原因.....	51
表31-1~31-12 · ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	63
表32-1~32-12 · ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	75

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表33 · 臺北市歷年主要死亡原因	87
表34 · 臺北市歷年男性主要死亡原因	90
表35 · 臺北市歷年女性主要死亡原因	93
表36 · 臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	96
表37 · 臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	97
表38 · 臺北市歷年事故傷害死亡原因	98
表39 · 臺北市歷年男性事故傷害死亡原因.....	101
表40 · 臺北市歷年女性事故傷害死亡原因	104
表41 · 臺北市歷年自殺死亡方式.....	107
表42 · 臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	110
表43 · 臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	113
表44 · 臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	116
表45 · 臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	118
表46 · 臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	120

目 次

表47·臺北市歷年主要癌症死亡原因	122
表48·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因	125
表49·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因	128
表50·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	131
表51·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	133
表52·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	135

二、行政區別死因統計

表53-1~53-12·臺北市十二區歷年主要死亡原因	137
表54-1~54-12·臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因	173

伍、歷年主要癌症發生率

表55·臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	209
表56·臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	211

陸、附錄

【附錄1】109年臺北市十大死因統計結果，慢性疾病囊括7項，癌症續居首席	213
【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較.....	225
【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較.....	229
【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標.....	236
【附錄5】主要名詞解釋與公式.....	241


壹、提要分析

109 年臺北市主要死因提要說明

一、標準化死亡率較上(108)年減少 6.6%，較 100 年則減少 15.7%

109 年臺北市市民死亡人數 1 萬 7,196 人，平均每 31 分鐘就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 655.4 人，分別較上年減少 23.0 人(減 3.4%)；如依世界衛生組織(W.H.O.)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 289.6 人，較上年減少 6.6%，較 100 年則減少 15.7%。若與全國相較，109 年臺北市標準化死亡率較全國標準化死亡率每十萬人口 390.8 人低 25.9%，是全國 22 縣市中除金門縣外，標準化死亡率最低的縣市。

依近 10 年資料觀察，剔除人口結構因素影響後臺北市市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則反之，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。(詳圖 1)




二、臺北市市民十大死因惡性腫瘤蟬連榜首

109 年臺北市市民十大死因中惡性腫瘤仍蟬居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、事故傷害、蓄意自我傷害(自殺)；十大死因之死亡人數占總死亡人數 77.7%，其中仍以惡性腫瘤占 29.9%最多，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 16.3%次之，肺炎占 9.1%居三。(詳表 1、圖 2)

表 1 109 年臺北市十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	17,196	100.0
1	惡性腫瘤	5,146	29.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,809	16.3
3	肺炎	1,571	9.1
4	腦血管疾病	1,037	6.0
5	糖尿病	734	4.3
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	503	2.9
7	慢性下呼吸道疾病	457	2.7
8	高血壓性疾病	414	2.4
9	事故傷害	367	2.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	315	1.8
	其他	3,843	22.3



三、死亡年齡平均數較 100 年增加 2.9 歲

109 年臺北市民死亡年齡平均數為 76.9 歲，較全國高 3.3 歲，與 100 年比較則增加 2.9 歲，其中男性死亡年齡平均數為 75.5 歲，女性為 78.6 歲，男性較女性低 3.1 歲；十大死因中死亡年齡平均數以肺炎 84.7 歲最高，慢性下呼吸道疾病 84.1 歲次之，最低為蓄意自我傷害(自殺)54.5 歲。

若以死亡年齡中位數來看，109 年臺北市民死亡年齡中位數為 80 歲，較全國高 3 歲，與 100 年比較則增加 1 歲，其中男性死亡年齡中位數為 79 歲，女性為 83 歲，男性較女性低 4 歲；十大死因中死亡年齡中位數以肺炎、慢性下呼吸道疾病及高血壓性疾病 87 歲最高，最低為蓄意自我傷害(自殺)57 歲。(詳表 2)

表 2 109 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

單位：歲

死因別	所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性下呼吸道疾病	高血壓性疾病	事故傷害	蓄意自我傷害(自殺)	
												死亡年齡平均數
死亡年齡平均數	兩性	76.9	72.4	78.9	84.7	78.2	79.1	81.3	84.1	83.0	65.7	54.5
	男性	75.5	72.8	75.8	84.1	76.3	76.0	80.1	84.4	78.5	63.2	54.8
死亡年齡中位數	女性	78.6	72.0	83.0	85.6	81.0	82.2	82.4	83.4	87.6	70.3	54.0
	兩性	80	73	83	87	82	81	84	87	87	69	57
死亡年齡中位數	男性	79	73	79	87	79	79	82	88	82	66	57
	女性	83	73	86	88	84	83.5	85	85.5	89	76	55


四、臺北市男性十大死因蓄意自我傷害(自殺)下降 1 名為第 10 名

109 年臺北市男性死亡人數為 9,533 人，死亡率為每十萬男性人口 763.0 人，較上年減少 4.0%；標準化死亡率為每十萬男性人口 368.7 人，較上年減少 6.6%，較 100 年則減少 13.6%。

109 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、事故傷害、高血壓性疾病及蓄意自我傷害(自殺)；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 78.7%，其中仍以惡性腫瘤占 29.8% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 16.7%。(詳表 3、圖 3)

表 3 109 年臺北市男性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	9,533	100.0
1	惡性腫瘤	2,837	29.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,592	16.7
3	肺炎	906	9.5
4	腦血管疾病	610	6.4
5	糖尿病	362	3.8
6	慢性下呼吸道疾病	325	3.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	240	2.5
8	事故傷害	238	2.5
9	高血壓性疾病	209	2.2
10	蓄意自我傷害(自殺)	187	2.0
	其他	2,027	21.3




五、臺北市女性十大死因血管性及未明示之癱瘓症上升 1 名為第 8 名

109 年臺北市女性死亡人數為 7,663 人，死亡率為每十萬女性人口 557.6 人，較上年減少 2.6%；標準化死亡率為每十萬女性人口 225.2 人，較上年減少 6.1%，較 100 年則減少 16.6%。

109 年女性十大死因之首亦是惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病、血管性及未明示之癱瘓症、慢性下呼吸道疾病及事故傷害；女性十大死因死亡人數占女性總死亡人數 76.8%，其中亦以惡性腫瘤占 30.1%最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 15.9%。(詳表 4、圖 4)

表 4 109 年臺北市女性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	7,663	100.0
1	惡性腫瘤	2,309	30.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,217	15.9
3	肺炎	665	8.7
4	腦血管疾病	427	5.6
5	糖尿病	372	4.9
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	263	3.4
7	高血壓性疾病	205	2.7
8	血管性及未明示之癱瘓症	164	2.1
9	慢性下呼吸道疾病	132	1.7
10	事故傷害	129	1.7
	其他	1,780	23.2



六、嬰兒(未滿1歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占5成8

109年臺北市未滿1歲嬰兒死亡人數為64人，死亡率為每十萬人口347.8人，分別較上年減少8人、增加1.4%。男嬰死亡率為每十萬人口352.7人，較上年減少14.9%；女嬰死亡率為342.5人，較上年增加28.5%。嬰兒主要死因前3項分別為(1)源於周產期的特定病況37人占57.8%，(2)先天性畸形變形及染色體異常13人占20.3%，(3)心臟疾病(高血壓性疾病除外)及嬰兒猝死症候群(SIDS)各3人共占9.4%，4者合占嬰兒死亡人數的87.5%。

七、少年(1-14歲)蓄意自我傷害(自殺)居首位死因，占2成8

109年臺北市1-14歲少年死亡人數為25人，而死亡率為每十萬人口7.6人，分別較上年減少16人與37.6%。少年主要死因前3項分別為(1)蓄意自我傷害(自殺)7人占28.0%，(2)惡性腫瘤5人占20.0%，(3)心臟疾病(高血壓性疾病除外)及事故傷害各3人共占24.0%，4者合占少年死亡人數的72.0%。

八、青年(15-24歲)蓄意自我傷害(自殺)居死因首位，占2成8

109年臺北市15-24歲青年死亡人數為74人，而死亡率為每十萬人口29.5人，分別較上年減少5人與1.5%。青年主要死因前3項分別為(1)蓄意自我傷害(自殺)21人占28.4%，(2)事故傷害19人占25.7%，(3)惡性腫瘤7人占9.5%，3者合占青年死亡人數的63.5%。

九、壯年(25-44歲)惡性腫瘤居死因首位，占2成8

109年臺北市25-44歲壯年死亡人數為482人，而死亡率為每十萬人口63.8人，分別較上年減少57人與8.3%。壯年主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤136人占28.2%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)70人占14.5%，(3)蓄意自我傷害(自殺)68人占14.1%，3者合占壯年死亡人數的56.8%。

十、中年(45-64歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占4成6

109年臺北市45-64歲中年死亡人數為2,837人，而死亡率為每十萬人口363.7人，分別較上年減少262人與7.3%。中年

主要死因前3項分別為(1)惡性腫瘤 1,304 人占 46.0%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 418 人占 14.7%，(3)腦血管疾病 150 人占 5.3%，3 者合占中年死亡人數的 66.0%。

十一、老年(65-74 歲)死亡率以惡性腫瘤為首，占 4 成 4

109 年臺北市 65-74 歲老年死亡人數為 2,840 人，占總死亡人數的 16.5%，死亡率為每十萬人口 959.4 人，較上年減少 6.7%。65-74 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,262 人占 44.4%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)412 人占 14.5%，(3)腦血管疾病 138 人占 4.9%，3 者合占 65-74 歲老年死亡人數的 63.8%。

十二、老年(75-84 歲)死亡率亦以惡性腫瘤為首，占 3 成 2

109 年臺北市 75-84 歲老年死亡人數為 4,217 人，占總死亡人數的 24.5%，死亡率為每十萬人口 3,182.2 人，較上年減少 2.7%。75-84 歲老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,357 人占 32.2%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外) 660 人占 15.7%，(3)肺炎 368 人占 8.7%，3 者合占 75-84 歲老年死亡人數的 56.6%。


十三、老年(85 歲以上)死亡率以心臟疾病(高血壓性疾病除外)為首，占 1 成 9

109 年臺北市 85 歲以上老年死亡人數為 6,657 人，占總死亡人數的 38.7%，死亡率為每十萬人口 11,427.7 人，較上年減少 6.6%。85 歲以上老年主要死因前 3 項分別為(1)心臟疾病(高

血壓性疾病除外)1,241 人占 18.6%，(2)惡性腫瘤 1,075 人占 16.1%，(3)肺炎 981 人占 14.7%，3 者合占 85 歲以上老年死亡人數的 49.5%。

十四、行政區以萬華區標準化死亡率最高，大同區次之

109 年臺北市 12 個行政區死亡率以萬華區每十萬人口 922.8 人最高，大同區 773.1 人次之，內湖區 501.1 人最低；標準化後萬華區每十萬人口 382.1 人仍為最高，大同區 349.0 人次之，大安區 221.4 人最低。(詳圖 5)



十四、惡性腫瘤(癌症)


(一)「氣管、支氣管和肺癌」、「女性乳房癌」、「結腸、直腸和肛門癌」續居癌症死因前三位

109年臺北市惡性腫瘤死亡人數為5,146人，占總死亡人數之29.9%，死亡率為每十萬人口196.1人，較上年減少2.2%；標準化死亡率為每十萬人口92.9人，較上年減少6.6%，較100年則減少15.3%。

109年臺北市十大癌症死因中氣管、支氣管和肺癌仍居榜首，其次依序為女性乳房癌、結腸、直腸和肛門癌、肝和肝內膽管癌、前列腺(攝護腺)癌、胰臟癌、胃癌、卵巢癌、口腔癌、非何杰金氏淋巴瘤；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數76.9%，其中氣管、支氣管和肺癌占19.9%最多，結腸、直腸和肛門癌占13.0%次之，肝和肝內膽管癌占12.6%再次之。(詳表5、圖6)

表 5. 109 年臺北市十大癌症死因

單位：人、%			
順位	癌症死因	死亡人數	死亡百分比
	所有癌症死因	5,146	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	1,026	19.9
2	女性乳房癌	354	6.9
2	結腸、直腸和肛門癌	667	13.0
4	肝和肝內膽管癌	646	12.6
5	前列腺(攝護腺)癌	207	4.0
6	胰臟癌	324	6.3
7	胃癌	277	5.4
8	卵巢癌	106	2.1
9	口腔癌	184	3.6
10	非何杰金氏淋巴瘤	168	3.3
	其他	1,187	23.1



(二)男性癌症標準化死亡率較上年減少 6.4%、女性則減少

6.6%，惟男性癌症標準化死亡率仍為女性的 1.5 倍

109 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性為 2,837 人，女性為 2,309 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 113.4 人、每十萬女性人口 76.8 人，男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性減少 109 人、女性減少 71 人，標準化死亡率男性減少 6.4%，女性減少 6.6%。

109 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 72.4 歲，較全國高 2.8 歲，與 100 年比較則增加 2.6 歲，其中男性死亡年齡平均數為 72.8 歲，女性為 72.0 歲。109 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平均數以前列腺(攝護腺)癌 82.3 歲最高，胃癌 75.9 歲次之，最低為卵巢癌 63.3 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，109 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 73 歲，較全國高 3 歲，與 100 年比較則增加 1 歲，其中男性死亡年齡中位數為 73 歲，女性為 73 歲。109 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡中位數以前列腺(攝護腺)癌 83 歲最高，胃癌 79 歲次之，最低為卵巢癌及口腔癌 63 歲。(詳表 6)

表 6. 109 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數
單位：歲

死因別		所有癌症死因	氣管、支氣管和肺癌	女性乳房癌	結腸、直腸和肛門癌	肝和肝內膽管癌	前列腺(攝護腺)癌	胰臟癌	胃癌	卵巢癌	口腔癌	非何杰金氏淋巴瘤
死亡年齡平均數	兩性	72.4	73.3	66.7	74.5	72.9	82.3	72.3	75.9	63.3	64.7	74.8
	男性	72.8	72.9	--	74.1	71.4	82.3	71.5	77.3	--	64.3	75.1
	女性	72.0	73.8	66.7	75.0	75.9	--	73.3	74.0	63.3	69.3	74.6
死亡年齡中位數	兩性	73	74	66	76	74	83	72	79	63	63	76.5
	男性	73	73	--	76	70	83	71	80	--	63	75
	女性	73	75	66	77	78	--	73	78	63	67	78

貳、人口統計指標

表A·臺北市人口統計指標—行政區別

中華民國109年

項 目	單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積	平方公里	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度	人/平方公里	9,575	21,568	19,205	26,638	16,363	20,428	21,799	20,683	8,510	5,437	8,947	4,465	4,402
年底人口數	人	2,602,418	200,316	215,240	302,644	223,876	155,397	123,849	183,088	268,130	118,758	282,525	278,451	250,144
男性		1,238,618	93,573	102,171	140,899	103,720	73,952	60,026	89,578	128,096	57,916	134,624	134,007	120,056
女性		1,363,800	106,743	113,069	161,745	120,156	81,445	63,823	93,510	140,034	60,842	147,901	144,444	130,088
性比例		90.82	87.66	90.36	87.11	86.32	90.80	94.05	95.80	91.47	95.19	91.02	92.77	92.29
出生數	人	19,029	1,312	1,670	2,021	1,686	1,058	958	1,333	1,848	942	2,267	2,009	1,925
粗出生率	‰	7.25	6.49	7.67	6.62	7.47	6.75	7.67	7.20	6.85	7.88	7.98	7.15	7.65
死亡數	人	17,212	1,246	1,516	1,869	1,476	1,007	971	1,701	1,681	783	1,431	1,822	1,709
粗死亡率	‰	6.56	6.16	6.97	6.13	6.54	6.43	7.77	9.19	6.23	6.55	5.04	6.49	6.79
人口增加率	%	-24.79	-26.18	-36.55	-20.07	-24.32	-22.66	-29.59	-34.36	-20.57	-23.93	-17.06	-28.24	-21.09
自然增加率		0.69	0.33	0.71	0.50	0.93	0.33	-0.10	-1.99	0.62	1.33	2.94	0.67	0.86
社會增加率		-25.48	-26.51	-37.26	-20.57	-25.25	-22.99	-29.48	-32.37	-21.19	-25.26	-20.00	-28.91	-21.94
14歲以下年底人口數(a)	人 比重(%)	344,525 13.24	29,199 14.58	24,823 11.53	45,971 15.19	26,877 12.01	25,252 16.25	15,840 12.79	18,636 10.18	35,530 13.25	14,942 12.58	40,186 14.22	34,132 12.26	33,137 13.25
15-64歲年底人口數(b)	人 比重(%)	1,762,254 67.72	130,064 64.93	145,978 67.82	191,640 63.32	152,157 67.96	100,312 64.55	84,018 67.84	125,972 68.80	186,575 69.58	83,787 70.55	201,264 71.24	189,189 67.94	171,298 68.48
65歲以上年底人口數(c)	人 比重(%)	495,639 19.05	41,053 20.49	44,439 20.65	65,033 21.49	44,842 20.03	29,833 19.20	23,991 19.37	38,480 21.02	46,025 17.17	20,029 16.87	41,075 14.54	55,130 19.80	45,709 18.27
扶養比(a+c)/b	%	47.68	54.01	47.45	57.92	47.13	54.91	47.41	45.34	43.71	41.74	40.38	47.18	46.03
扶幼比 a/b		19.55	22.45	17.00	23.99	17.66	25.17	18.85	14.79	19.04	17.83	19.97	18.04	19.34
扶老比 c/b		28.13	31.56	30.44	33.93	29.47	29.74	28.55	30.55	24.67	23.90	20.41	29.14	26.68
老化指數 c/a		143.86	140.60	179.02	141.47	166.84	118.14	151.46	206.48	129.54	134.04	102.21	161.52	137.94

資料來源：本府民政局。

附註：本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B·臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
87	75.76	73.12	78.93	79.11	77.06	81.48
90	76.75	74.07	79.92	80.08	78.05	82.38
92	77.35	74.77	80.33	80.61	78.64	82.76
93	77.48	74.68	80.75	80.99	78.92	83.20
94	77.42	74.50	80.80	81.17	78.94	83.55
95	77.90	74.86	81.41	81.58	79.19	84.13
96	78.38	75.46	81.72	81.79	79.41	84.31
97	78.57	75.59	81.94	81.99	79.70	84.38
98	79.01	76.03	82.34	82.16	79.86	84.53
99	79.18	76.13	82.55	82.42	80.06	84.81
100	79.15	75.96	82.63	82.70	80.18	85.25
101	79.51	76.43	82.82	82.66	80.00	85.33
102	80.02	76.91	83.36	82.90	80.18	85.63
103	79.84	76.72	83.19	83.10	80.33	85.89
104	80.20	77.01	83.62	83.43	80.64	86.25
105	80.00	76.81	83.42	83.36	80.54	86.18
106	80.39	77.28	83.70	83.57	80.82	86.29
107	80.69	77.55	84.05	83.63	80.93	86.29
108	80.86	77.69	84.23	83.86	81.19	86.50
109	81.32	78.11	84.75	84.12	81.43	86.79

資料來源：內政部。

附註：本市配合內政部縣市數據公布係以近3年合併人口編算，例109年平均餘命採107-109年，108年則採106-108年3年合併人口計算。

表C·臺北市近十年各年齡組年中人口數

年 別	總 計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
100年	2,634,870	21,842	92,078	269,451	312,649	813,915	789,884	335,053	
101年	2,662,097	27,281	96,621	259,149	313,265	821,078	801,277	343,428	
102年	2,679,871	27,573	105,081	250,714	309,256	823,715	807,903	355,631	
103年	2,694,416	27,029	112,644	243,526	303,418	823,648	812,586	371,566	
104年	2,703,563	28,102	118,347	233,663	299,539	819,784	814,274	389,855	
105年	2,700,257	27,296	122,333	226,649	293,139	810,848	810,837	409,156	
106年	2,689,481	25,463	120,512	226,526	284,355	799,934	803,539	429,153	
107年	2,675,915	22,839	116,842	227,084	274,605	789,351	796,289	448,906	
108年	2,656,807	20,861	110,774	227,944	263,672	775,537	789,730	468,290	
109年	2,623,730	18,995	100,508	230,510	250,842	756,003	780,081	486,792	
				百 分 比 (%)					
100年	100.00	0.83	3.49	10.23	11.87	30.89	29.98	12.72	
101年	100.00	1.02	3.63	9.73	11.77	30.84	30.10	12.90	
102年	100.00	1.03	3.92	9.36	11.54	30.74	30.15	13.27	
103年	100.00	1.00	4.18	9.04	11.26	30.57	30.16	13.79	
104年	100.00	1.04	4.38	8.64	11.08	30.32	30.12	14.42	
105年	100.00	1.01	4.53	8.39	10.86	30.03	30.03	15.15	
106年	100.00	0.95	4.48	8.42	10.57	29.74	29.88	15.96	
107年	100.00	0.85	4.37	8.49	10.26	29.50	29.76	16.78	
108年	100.00	0.79	4.17	8.58	9.92	29.19	29.72	17.63	
109年	100.00	0.72	3.83	8.79	9.56	28.81	29.73	18.55	

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D·臺北市近十年各年齡組年中人口數—男性

年 別	男性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	
				人 數 (人)					
100年	1,269,449	11,286	47,666	140,732	161,751	380,130	370,322	157,563	
101年	1,280,852	14,085	49,976	135,392	162,067	384,448	374,796	160,090	
102年	1,287,653	14,262	54,260	130,921	160,134	386,721	376,956	164,401	
103年	1,292,791	13,863	58,061	127,147	157,322	387,679	378,315	170,405	
104年	1,295,549	14,457	60,873	121,979	155,310	387,029	378,491	177,413	
105年	1,292,486	14,147	62,918	118,216	151,765	384,095	376,393	184,953	
106年	1,285,714	13,131	62,088	118,004	147,062	380,032	372,479	192,920	
107年	1,277,646	11,728	60,209	118,241	142,059	375,789	368,735	200,886	
108年	1,266,712	10,745	57,118	118,460	136,505	369,832	365,246	208,808	
109年	1,249,334	9,877	51,828	119,480	129,997	361,493	360,109	216,552	
				百 分 比 (%)					
100年	100.00	0.89	3.75	11.09	12.74	29.94	29.17	12.41	
101年	100.00	1.10	3.90	10.57	12.65	30.02	29.26	12.50	
102年	100.00	1.11	4.21	10.17	12.44	30.03	29.27	12.77	
103年	100.00	1.07	4.49	9.84	12.17	29.99	29.26	13.18	
104年	100.00	1.12	4.70	9.42	11.99	29.87	29.21	13.69	
105年	100.00	1.09	4.87	9.15	11.74	29.72	29.12	14.31	
106年	100.00	1.02	4.83	9.18	11.44	29.56	28.97	15.00	
107年	100.00	0.92	4.71	9.25	11.12	29.41	28.86	15.72	
108年	100.00	0.85	4.51	9.35	10.78	29.20	28.83	16.48	
109年	100.00	0.79	4.15	9.56	10.41	28.93	28.82	17.33	

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表E·臺北市近十年各年齡組年中人口數—女性

年 別	女性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
				人 數 (人)				
100年	1,365,422	10,556	44,412	128,720	150,898	433,785	419,562	177,490
101年	1,381,245	13,196	46,646	123,757	151,199	436,630	426,481	183,338
102年	1,392,218	13,312	50,821	119,793	149,123	436,994	430,947	191,230
103年	1,401,625	13,166	54,583	116,379	146,097	435,969	434,271	201,161
104年	1,408,014	13,645	57,474	111,685	144,230	432,755	435,784	212,442
105年	1,407,771	13,150	59,416	108,433	141,374	426,753	434,444	224,203
106年	1,403,767	12,332	58,424	108,522	137,293	419,903	431,060	236,234
107年	1,398,269	11,111	56,633	108,843	132,546	413,563	427,554	248,020
108年	1,390,095	10,116	53,656	109,485	127,168	405,705	424,484	259,482
109年	1,374,396	9,118	48,681	111,031	120,846	394,511	419,972	270,240
				百 分 比 (%)				
100年	100.00	0.77	3.25	9.43	11.05	31.77	30.73	13.00
101年	100.00	0.96	3.38	8.96	10.95	31.61	30.88	13.27
102年	100.00	0.96	3.65	8.60	10.71	31.39	30.95	13.74
103年	100.00	0.94	3.89	8.30	10.42	31.10	30.98	14.35
104年	100.00	0.97	4.08	7.93	10.24	30.74	30.95	15.09
105年	100.00	0.93	4.22	7.70	10.04	30.31	30.86	15.93
106年	100.00	0.88	4.16	7.73	9.78	29.91	30.71	16.83
107年	100.00	0.79	4.05	7.78	9.48	29.58	30.58	17.74
108年	100.00	0.73	3.86	7.88	9.15	29.19	30.54	18.67
109年	100.00	0.66	3.54	8.08	8.79	28.70	30.56	19.66

資料來源：本府民政局。

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F·臺北市各行政區年齡別年底人口數

中華民國109年底

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
109年底人口數	2,602,418	200,316	215,240	302,644	223,876	155,397	123,849	183,088	268,130	118,758	282,525	278,451	250,144
0歲	17,829	1,248	1,544	1,927	1,562	1,009	873	1,230	1,760	877	2,152	1,849	1,798
1-4	94,935	6,991	7,537	11,120	7,934	6,123	4,704	6,196	9,442	4,834	11,282	9,770	9,002
5-9	124,028	10,695	8,728	17,075	9,739	9,389	5,467	6,368	12,725	5,325	14,534	12,078	11,905
10-14	107,733	10,265	7,014	15,849	7,642	8,731	4,796	4,842	11,603	3,906	12,218	10,435	10,432
15-19	108,240	8,315	8,321	12,661	8,359	6,596	4,937	6,929	12,412	5,188	12,401	11,471	10,650
20-24	135,537	10,022	10,917	14,781	10,778	7,273	6,178	9,285	15,625	6,514	16,112	14,842	13,210
25-29	148,225	10,361	12,651	14,749	12,468	7,770	7,008	10,879	16,040	7,224	18,016	16,479	14,580
30-34	162,892	11,266	14,157	15,573	14,153	8,710	8,013	12,006	16,542	8,150	20,120	18,113	16,089
35-39	211,285	14,891	17,575	21,594	18,515	12,238	10,631	15,388	21,081	10,694	24,603	23,080	20,995
40-44	222,541	16,934	17,950	25,203	18,994	14,106	11,116	15,466	22,481	10,830	24,715	22,985	21,761
45-49	191,380	15,290	15,439	22,258	16,477	11,707	8,841	13,078	20,594	9,073	20,248	19,480	18,895
50-54	194,064	14,625	16,118	21,679	17,229	10,837	9,059	14,037	21,876	9,058	20,938	20,394	18,214
55-59	195,422	14,254	16,444	21,788	17,701	10,564	9,139	14,538	20,795	8,699	22,360	20,694	18,446
60-64	192,668	14,106	16,406	21,354	17,483	10,511	9,096	14,366	19,129	8,357	21,751	21,651	18,458
65-69	180,387	14,083	15,742	21,511	16,730	10,101	8,676	13,440	17,027	7,450	17,770	20,545	17,312
70-74	124,001	10,691	11,504	16,889	11,427	7,569	5,797	9,201	11,263	4,981	9,844	13,589	11,246
75-79	76,290	6,541	7,090	10,380	6,633	4,542	3,747	6,133	7,115	3,256	5,351	8,364	7,138
80-84	56,192	4,579	4,916	7,600	4,913	3,643	3,102	4,802	5,057	2,265	3,920	6,357	5,038
85-89	34,250	2,875	2,960	4,906	3,154	2,335	1,729	2,922	3,038	1,267	2,407	3,721	2,936
90-94	18,141	1,640	1,630	2,710	1,507	1,181	676	1,522	1,862	607	1,359	1,910	1,537
95-99	5,388	529	503	877	415	386	209	390	570	171	376	544	418
100歲以上	990	115	94	160	63	76	55	70	93	32	48	100	84

資料來源：本府民政局。

表G·臺北市近十年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	100年底	101年底	102年底	103年底	104年底	105年底	106年底	107年底	108年底	109年底
臺北市	2,650,968	2,673,226	2,686,516	2,702,315	2,704,810	2,695,704	2,683,257	2,668,572	2,645,041	2,602,418
松山區	209,948	210,905	210,343	210,473	209,714	208,326	206,988	205,702	204,193	200,316
信義區	226,541	227,734	228,496	229,657	229,211	227,823	225,753	223,406	220,021	215,240
大安區	313,846	313,426	313,363	313,693	313,058	311,506	309,969	308,843	307,631	302,644
中山區	224,102	226,659	228,753	230,496	231,350	231,247	230,710	229,456	227,387	223,876
中正區	161,449	162,154	163,140	163,388	162,475	160,403	159,608	159,000	158,014	155,397
大同區	126,640	128,809	129,820	130,973	130,929	130,071	129,278	127,625	126,043	123,849
萬華區	190,855	192,628	193,480	194,715	194,339	193,539	191,850	189,603	187,076	183,088
文山區	266,442	269,310	271,341	273,921	275,367	275,231	274,424	273,762	271,806	268,130
南港區	116,131	118,490	119,752	121,257	122,245	122,516	122,155	121,670	120,297	118,758
內湖區	275,652	280,025	282,842	285,767	287,566	287,733	287,771	287,429	285,795	282,525
士林區	287,072	288,894	289,742	290,455	290,694	289,939	288,295	286,544	283,459	278,451
北投區	252,290	254,192	255,444	257,520	257,862	257,370	256,456	255,532	253,319	250,144

資料來源：本府民政局。

表H·臺北市各行政區年齡別年中人口數

中華民國109年中

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
109年中人口數	2,623,730	202,255	217,631	305,138	225,632	156,706	124,946	185,082	269,968	119,528	284,160	280,955	251,732
0歲	18,995	1,345	1,607	2,037	1,667	1,085	954	1,347	1,879	982	2,261	1,974	1,860
1-4	100,508	7,374	8,044	11,667	8,363	6,487	4,933	6,679	10,045	5,098	11,895	10,421	9,506
5-9	121,715	10,579	8,661	16,803	9,563	9,113	5,389	6,291	12,463	5,229	14,169	11,829	11,627
10-14	108,795	10,300	7,126	15,814	7,721	8,760	4,802	4,963	11,804	3,978	12,366	10,638	10,525
15-19	113,228	8,752	8,736	13,316	8,699	6,883	5,157	7,237	12,941	5,422	13,049	11,973	11,067
20-24	137,614	10,153	11,105	14,945	10,922	7,456	6,289	9,463	15,808	6,582	16,364	15,127	13,403
25-29	149,861	10,446	12,836	14,877	12,648	7,845	7,091	11,027	16,103	7,274	18,224	16,646	14,847
30-34	166,361	11,529	14,476	15,911	14,492	8,934	8,200	12,291	16,825	8,276	20,401	18,584	16,444
35-39	218,128	15,395	18,179	22,263	19,141	12,622	11,018	16,033	21,781	11,032	25,218	23,771	21,677
40-44	221,654	16,918	17,927	25,121	18,885	14,005	11,067	15,439	22,498	10,822	24,445	22,882	21,647
45-49	193,557	15,416	15,704	22,461	16,706	11,789	8,940	13,258	20,899	9,140	20,460	19,760	19,026
50-54	195,283	14,706	16,300	21,949	17,366	10,922	9,068	14,099	21,897	9,027	21,230	20,499	18,222
55-59	197,221	14,483	16,581	21,976	17,814	10,721	9,263	14,679	20,821	8,746	22,563	20,948	18,628
60-64	194,021	14,330	16,586	21,556	17,690	10,600	9,179	14,445	19,134	8,320	21,754	21,875	18,554
65-69	178,597	14,095	15,710	21,743	16,516	10,081	8,610	13,249	16,737	7,340	17,180	20,316	17,024
70-74	117,424	10,219	10,903	16,119	10,760	7,233	5,454	8,708	10,681	4,730	9,181	12,836	10,604
75-79	77,510	6,633	7,199	10,535	6,763	4,630	3,851	6,313	7,173	3,292	5,364	8,525	7,235
80-84	55,008	4,457	4,800	7,461	4,857	3,596	3,072	4,712	4,918	2,187	3,875	6,184	4,892
85-89	34,161	2,870	2,959	4,879	3,131	2,328	1,696	2,914	3,091	1,256	2,422	3,676	2,940
90-94	17,940	1,640	1,616	2,705	1,481	1,165	668	1,483	1,837	609	1,338	1,878	1,524
95-99	5,212	513	489	853	388	390	198	389	545	163	357	522	409
100歲以上	940	107	91	151	64	67	53	67	94	28	49	96	77

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I·臺北市近十年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
臺北市	2,634,870	2,662,097	2,679,871	2,694,416	2,703,563	2,700,257	2,689,481	2,675,915	2,656,807	2,623,730
松山區	209,191	210,427	210,624	210,408	210,094	209,020	207,657	206,345	204,948	202,255
信義區	225,817	227,138	228,115	229,077	229,434	228,517	226,788	224,580	221,714	217,631
大安區	312,706	313,636	313,395	313,528	313,376	312,282	310,738	309,406	308,237	305,138
中山區	222,114	225,381	227,706	229,625	230,923	231,299	230,979	230,083	228,422	225,632
中正區	160,493	161,802	162,647	163,264	162,932	161,439	160,006	159,304	158,507	156,706
大同區	125,620	127,725	129,315	130,397	130,951	130,500	129,675	128,452	126,834	124,946
萬華區	189,977	191,742	193,054	194,098	194,527	193,939	192,695	190,727	188,340	185,082
文山區	264,375	267,876	270,326	272,631	274,644	275,299	274,828	274,093	272,784	269,968
南港區	115,077	117,311	119,121	120,505	121,751	122,381	122,336	121,913	120,984	119,528
內湖區	272,949	277,839	281,434	284,305	286,667	287,650	287,752	287,600	286,612	284,160
士林區	285,806	287,983	289,318	290,099	290,575	290,317	289,117	287,420	285,002	280,955
北投區	250,748	253,241	254,818	256,482	257,691	257,616	256,913	255,994	254,426	251,732

資料來源：本府民政局。

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

參、109 年死因統計

一、主要死因統計

表1·ICD-10 臺北市、全國主要死亡原因比較
中華民國109年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾病碼 ICD 10	死亡原因	臺北市					全國				
		順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
A00-Y98	所有死亡原因		17,196	655.40	289.57	100.00		173,067	733.89	390.77	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	5,146	196.13	92.94	29.93	1	50,161	212.71	117.30	28.98
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	2,809	107.06	44.40	16.34	2	20,457	86.75	43.77	11.82
J12-J18	肺炎	3	1,571	59.88	21.44	9.14	3	13,736	58.25	26.40	7.94
I60-I69	腦血管疾病	4	1,037	39.52	16.72	6.03	4	11,821	50.13	25.24	6.83
E10-E14	糖尿病	5	734	27.98	11.51	4.27	5	10,311	43.72	22.01	5.96
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	6	503	19.17	7.41	2.93	9	5,096	21.61	10.48	2.94
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	457	17.42	6.29	2.66	8	5,657	23.99	10.99	3.27
I10-I15	高血壓性疾病	8	414	15.78	5.85	2.41	7	6,706	28.44	13.44	3.87
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	367	13.99	8.39	2.13	6	6,767	28.70	20.25	3.91
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	315	12.01	9.14	1.83	11	3,656	15.50	11.83	2.11
	其他		3,843	146.47	65.47	22.35		38,699	164.10	89.07	22.36
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	11	309	11.78	3.61	1.80	12	2,885	12.23	5.04	1.67
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	232	8.84	4.47	1.35	10	3,964	16.81	10.32	2.29
A40-A41	敗血症	13	213	8.12	3.47	1.24	14	1,931	8.19	4.04	1.12
J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況 （塵肺症及肺炎除外）	14	163	6.21	2.36	0.95	19	724	3.07	1.42	0.42
G20-G21	帕金森病	15	161	6.14	2.34	0.94	16	1,321	5.60	2.61	0.76

資料來源：衛生福利部。

表2. ICD-10 全國縣市別死亡概況

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口

縣市別	總 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
總 計	173,067	733.89	390.77	101,385	867.32	510.96	71,682	602.74	284.27
新北市	24,535	609.59	361.52	14,414	733.16	469.44	10,121	491.59	269.70
臺北市	17,196	655.40	289.57	9,533	763.05	368.70	7,663	557.55	225.23
桃園市	13,127	581.12	378.85	8,048	718.45	494.36	5,079	446.02	275.24
臺中市	17,486	620.51	387.36	10,293	743.28	503.73	7,193	501.88	286.80
臺南市	15,362	818.04	413.08	8,820	942.71	535.88	6,542	694.25	302.89
高雄市	21,712	783.95	427.64	12,867	941.23	557.97	8,845	630.65	312.19
宜蘭縣	3,876	854.44	408.05	2,257	986.58	529.64	1,619	720.00	295.96
新竹縣	3,772	664.84	393.75	2,228	769.32	498.07	1,544	555.90	292.42
苗栗縣	5,011	921.10	438.53	2,934	1,046.12	561.19	2,077	788.05	316.44
彰化縣	10,441	822.30	402.46	6,074	940.77	537.46	4,367	699.73	276.91
南投縣	4,730	960.46	439.30	2,754	1,093.88	568.87	1,976	820.92	313.45
雲林縣	7,069	1,040.95	455.67	4,131	1,175.32	611.25	2,938	896.80	300.51
嘉義縣	5,402	1,077.60	437.34	3,103	1,192.60	575.42	2,299	953.51	297.01
屏東縣	8,363	1,024.98	506.79	5,090	1,223.82	671.33	3,273	818.23	349.34
臺東縣	2,301	1,065.17	545.25	1,410	1,269.21	730.12	891	849.15	364.88
花蓮縣	3,158	970.77	493.51	1,895	1,151.63	649.29	1,263	785.64	345.65
澎湖縣	957	906.43	402.36	559	1,027.58	524.66	398	777.65	285.78
基隆市	3,030	822.84	412.38	1,765	960.69	539.42	1,265	685.59	299.73
新竹市	2,611	580.08	358.58	1,516	682.91	469.37	1,095	480.02	265.69
嘉義市	2,094	784.72	406.40	1,226	948.68	550.99	868	630.74	288.60
金門縣	762	542.77	281.01	426	607.73	347.31	336	477.99	222.44
連江縣	72	546.12	344.76	42	553.76	433.22	30	535.76	214.24

資料來源：衛生福利部。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3·ICD-10 臺北市主要死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	17,196	655.40	289.57	100.00	所有死亡原因	9,533	763.05	368.70	100.00	所有死亡原因	7,663	557.55	225.23	100.00
1	惡性腫瘤	5,146	196.13	92.94	29.93	惡性腫瘤	2,837	227.08	113.41	29.76	惡性腫瘤	2,309	168.00	76.76	30.13
2	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	2,809	107.06	44.40	16.34	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	1,592	127.43	60.35	16.70	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	1,217	88.55	31.20	15.88
3	肺炎	1,571	59.88	21.44	9.14	肺炎	906	72.52	28.67	9.50	肺炎	665	48.38	15.86	8.68
4	腦血管疾病	1,037	39.52	16.72	6.03	腦血管疾病	610	48.83	22.96	6.40	腦血管疾病	427	31.07	11.67	5.57
5	糖尿病	734	27.98	11.51	4.27	糖尿病	362	28.98	13.67	3.80	糖尿病	372	27.07	9.71	4.85
6	腎炎、腎病症候群及腎 病變	503	19.17	7.41	2.93	慢性下呼吸道疾病	325	26.01	10.12	3.41	腎炎、腎病症候群及腎 病變	263	19.14	6.73	3.43
7	慢性下呼吸道疾病	457	17.42	6.29	2.66	腎炎、腎病症候群及腎 病變	240	19.21	8.22	2.52	高血壓性疾病	205	14.92	4.48	2.68
8	高血壓性疾病	414	15.78	5.85	2.41	事故傷害	238	19.05	12.39	2.50	血管性及未明示之癱瘓 症	164	11.93	3.42	2.14
9	事故傷害	367	13.99	8.39	2.13	高血壓性疾病	209	16.73	7.47	2.19	慢性下呼吸道疾病	132	9.60	3.30	1.72
10	蓄意自我傷害（自殺）	315	12.01	9.14	1.83	蓄意自我傷害（自殺）	187	14.97	11.29	1.96	事故傷害	129	9.39	4.85	1.68
	其他	3,843	146.47	65.47	22.35	其他	2,027	162.25	80.13	21.26	其他	1,780	129.51	57.23	23.23
11	血管性及未明示之癱瘓 症	309	11.78	3.61	1.80	血管性及未明示之癱瘓 症	145	11.61	3.87	1.52	蓄意自我傷害（自殺）	128	9.31	7.30	1.67
12	慢性肝病及肝硬化	232	8.84	4.47	1.35	慢性肝病及肝硬化	145	11.61	6.70	1.52	敗血症	100	7.28	2.77	1.30
13	敗血症	213	8.12	3.47	1.24	敗血症	113	9.04	4.31	1.19	慢性肝病及肝硬化	87	6.33	2.59	1.14
14	肇因於吸入外物之肺部病 況（塵肺症及肺炎除外）	163	6.21	2.36	0.95	帕金森病	98	7.84	3.43	1.03	骨骼肌肉系統及結締組 織之疾病	82	5.97	2.75	1.07
15	帕金森病	161	6.14	2.34	0.94	肇因於吸入外物之肺部病 況（塵肺症及肺炎除外）	97	7.76	3.28	1.02	肇因於吸入外物之肺部病 況（塵肺症及肺炎除外）	66	4.80	1.64	0.86

資料來源：衛生福利部。

附 註：109年年中人口數計 2,623,730人,男性 1,249,334人,女性 1,374,396人。

表4·ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
1	A00-Y98 C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	17,196	655.40	64	336.94	25	7.55	74	29.50	482	63.76	2,837	363.68	2,840	959.39	4,217	3,182.21	6,657	11,427.74		
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,809	107.06	3	15.79	3	0.91	2	0.80	70	9.26	418	53.58	412	139.18	660	498.05	1,241	2,130.36		
3	J12-J18	肺炎	1,571	59.88	2	10.53	-	-	3	1.20	14	1.85	77	9.87	126	42.56	368	277.70	981	1,684.03		
4	I60-I69	腦血管疾病	1,037	39.52	-	-	-	-	4	1.59	29	3.84	150	19.23	138	46.62	282	212.80	434	745.03		
5	E10-E14	糖尿病	734	27.98	-	-	-	-	1	0.40	6	0.79	94	12.05	122	41.21	225	169.79	286	490.96		
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	503	19.17	-	-	-	-	-	-	4	0.53	47	6.03	65	21.96	143	107.91	244	418.86		
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	457	17.42	-	-	-	-	1	0.40	2	0.26	20	2.56	49	16.55	117	88.29	268	460.06		
8	I10-I15	高血壓性 疾病	414	15.78	-	-	-	-	-	-	4	0.53	43	5.51	41	13.85	85	64.14	241	413.71		
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	367	13.99	-	-	3	0.91	19	7.57	40	5.29	90	11.54	61	20.61	80	60.37	74	127.03		
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺） 其他	315	12.01	-	-	7	2.11	21	8.37	68	8.99	113	14.49	57	19.26	25	18.87	24	41.20		
			3,843	146.47	59	310.62	7	2.11	16	6.38	109	14.42	481	61.66	507	171.27	875	660.29	1,789	3,071.09		
11	F01-F03	血管性及未明示之 癡呆症	309	11.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.70	54	40.75	247	424.01		
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	232	8.84	-	-	-	-	-	-	13	1.72	75	9.61	41	13.85	58	43.77	45	77.25		
13	A40-A41	敗血症	213	8.12	1	5.26	-	-	1	0.40	4	0.53	29	3.72	34	11.49	54	40.75	90	154.50		
14	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	163	6.21	-	-	-	-	-	-	1	0.13	9	1.15	20	6.76	51	38.49	82	140.77		
15	G20-G21	帕金森病	161	6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.26	27	9.12	63	47.54	69	118.45		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,623,730人。

表5·ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況

中華民國109年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上	
			死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
1	A00-Y98 C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	9,533	763.05	34	344.25	12	7.00	48	36.92	285	78.84	1,815	504.01	1,757	1,298.67	2,242	4,036.40	3,340	12,988.28
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,592	127.43	2	20.25	1	0.58	2	1.54	58	16.04	328	91.08	284	209.92	338	608.52	579	2,251.56
3	J12-J18	肺炎	906	72.52	1	10.13	-	-	2	1.54	5	1.38	56	15.55	84	62.09	218	392.48	540	2,099.90
4	I60-I69	腦血管疾病	610	48.83	-	-	-	-	2	1.54	14	3.87	116	32.21	98	72.44	159	286.26	221	859.40
5	E10-E14	糖尿病	362	28.98	-	-	-	-	1	0.77	4	1.11	68	18.88	72	53.22	102	183.64	115	447.20
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	325	26.01	-	-	-	-	-	-	1	0.28	16	4.44	36	26.61	75	135.03	197	766.07
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	240	19.21	-	-	-	-	-	-	3	0.83	25	6.94	37	27.35	65	117.02	110	427.76
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	238	19.05	-	-	-	-	17	13.08	29	8.02	66	18.33	42	31.04	46	82.82	38	147.77
9	I10-I15	高血壓性疾病	209	16.73	-	-	-	-	-	-	4	1.11	37	10.27	31	22.91	45	81.02	92	357.76
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	187	14.97	-	-	4	2.33	10	7.69	42	11.62	72	19.99	28	20.70	18	32.41	13	50.55
		其他	2,027	162.25	31	313.88	5	2.92	11	8.46	69	19.09	321	89.14	313	231.35	448	806.56	829	3,223.74
11	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	145	11.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.22	24	43.21	118	458.87
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	145	11.61	-	-	-	-	-	-	11	3.04	62	17.22	27	19.96	29	52.21	16	62.22
13	A40-A41	敗血症	113	9.04	1	10.13	-	-	-	-	3	0.83	19	5.28	19	14.04	28	50.41	43	167.21
14	G20-G21	帕金森病	98	7.84	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.56	18	13.30	42	75.62	36	139.99
15	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	97	7.76	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.22	12	8.87	31	55.81	46	178.88

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,249,334人。

表6·ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況

中華民國109年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上	
			死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
1	A00-Y98 C00-C97	所有死亡原因 惡性腫瘤	7,663	557.55	30	329.02	13	8.14	26	21.52	197	49.94	1,022	243.35	1,083	673.81	1,975	2,565.82	3,317	10,194.39
			2,309	168.00	-	-	3	1.88	4	3.31	80	20.28	594	141.44	530	329.75	629	817.16	469	1,441.41
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,217	88.55	1	10.97	2	1.25	-	-	12	3.04	90	21.43	128	79.64	322	418.33	662	2,034.58
3	J12-J18	肺炎	665	48.38	1	10.97	-	-	1	0.83	9	2.28	21	5.00	42	26.13	150	194.87	441	1,355.36
4	I60-I69	腦血管疾病	427	31.07	-	-	-	-	2	1.66	15	3.80	34	8.10	40	24.89	123	159.80	213	654.63
5	E10-E14	糖尿病	372	27.07	-	-	-	-	-	-	2	0.51	26	6.19	50	31.11	123	159.80	171	525.55
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	263	19.14	-	-	-	-	-	-	1	0.25	22	5.24	28	17.42	78	101.33	134	411.83
7	I10-I15	高血壓性 疾病	205	14.92	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.43	10	6.22	40	51.97	149	457.93
8	F01-F03	血管性及未 明示之癡呆症	164	11.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.11	30	38.97	129	396.47
9	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	132	9.60	-	-	-	-	1	0.83	1	0.25	4	0.95	13	8.09	42	54.56	71	218.21
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	129	9.39	-	-	3	1.88	2	1.66	11	2.79	24	5.71	19	11.82	34	44.17	36	110.64
		其他	1,780	129.51	28	307.08	5	3.13	16	13.24	66	16.73	201	47.86	218	135.63	404	524.86	842	2,587.78
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害（自殺）	128	9.31	-	-	3	1.88	11	9.10	26	6.59	41	9.76	29	18.04	7	9.09	11	33.81
12	A40-A41	敗血症	100	7.28	-	-	-	-	1	0.83	1	0.25	10	2.38	15	9.33	26	33.78	47	144.45
13	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	87	6.33	-	-	-	-	-	-	2	0.51	13	3.10	14	8.71	29	37.68	29	89.13
14	M00-M99	骨骼肌肉系 統及結締組織之 疾病	82	5.97	1	10.97	-	-	-	-	4	1.01	12	2.86	12	7.47	31	40.27	22	67.61
15	J66, J68-J69	肇因於吸入 外物之肺部病 況（塵肺症及 肺炎除外）	66	4.80	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.24	8	4.98	20	25.98	36	110.64

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為 1,374,396 人。

表7·ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	64	347.84	100.00		所有死亡原因	34	352.70	100.00		所有死亡原因	30	342.50	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	37	201.10	57.81	P00-P96	源於周產期的特定病況	16	165.98	47.06	P00-P96	源於周產期的特定病況	21	239.75	70.00
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	13	70.66	20.31	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	8	82.99	23.53	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	5	57.08	16.67
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	16.31	4.69	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	3	31.12	8.82	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	11.42	3.33
4	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	3	16.31	4.69	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	20.75	5.88	J12-J18	肺炎	1	11.42	3.33
5	J12-J18	肺炎	2	10.87	3.13	J12-J18	肺炎	1	10.37	2.94	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	11.42	3.33
6	A40-A41	敗血症	1	5.44	1.56	A40-A41	敗血症	1	10.37	2.94					
7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.44	1.56										
		其他死因	4	21.74	6.25		其他死因	3	31.12	8.82		其他死因	1	11.42	3.33

資料來源：衛生福利部。

附註：出生發生數為18,399人，其中男性為9,640人，女性為8,759人。

表8·ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	64	336.94	100.00		所有死亡原因	34	344.25	100.00		所有死亡原因	30	329.02	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	37	194.79	57.81	P00-P96	源於周產期的特定病況	16	162.00	47.06	P00-P96	源於周產期的特定病況	21	230.31	70.00
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	13	68.44	20.31	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	8	81.00	23.53	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	5	54.84	16.67
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	15.79	4.69	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	3	30.38	8.82	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	10.97	3.33
4	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	3	15.79	4.69	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	20.25	5.88	J12-J18	肺炎	1	10.97	3.33
5	J12-J18	肺炎	2	10.53	3.13	J12-J18	肺炎	1	10.13	2.94	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	10.97	3.33
6	A40-A41	敗血症	1	5.26	1.56	A40-A41	敗血症	1	10.13	2.94					
7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.26	1.56										
		其他死因	4	21.06	6.25		其他死因	3	30.38	8.82		其他死因	1	10.97	3.33

資料來源：衛生福利部。

附註：0歲年中人口數為 18,995 人，其中男性為 9,877 人，女性為 9,118 人。

表9·ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男 性					女 性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	25	7.55	100.00		所有死亡原因	12	7.00	100.00		所有死亡原因	13	8.14	100.00
1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	2.11	28.00	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	2.33	33.33	C00-C97	惡性腫瘤	3	1.88	23.08
2	C00-C97	惡性腫瘤	5	1.51	20.00	C00-C97	惡性腫瘤	2	1.17	16.67	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	1.88	23.08
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	0.91	12.00	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.58	8.33	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	1.88	23.08
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	0.91	12.00	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.58	8.33	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1.25	15.38
5	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.60	8.00	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.58	8.33	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.63	7.69
6	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.30	4.00		其他死因	3	1.75	25.00		其他死因	1	0.63	7.69
		其他死因	4	1.21	16.00										

資料來源：衛生福利部。

附註：1-14歲年中人口數為331,018人，其中男性為171,307人，女性為159,711人。

表10·ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	74	29.50	100.00		所有死亡原因	48	36.92	100.00		所有死亡原因	26	21.52	100.00
1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	21	8.37	28.38	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	17	13.08	35.42	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	9.10	42.31
2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	19	7.57	25.68	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	7.69	20.83	C00-C97	惡性腫瘤	4	3.31	15.38
3	C00-C97	惡性腫瘤	7	2.79	9.46	C00-C97	惡性腫瘤	3	2.31	6.25	I60-I69	腦血管疾病	2	1.66	7.69
4	I60-I69	腦血管疾病	4	1.59	5.41	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1.54	4.17	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	1.66	7.69
5	J12-J18	肺炎	3	1.20	4.05	J12-J18	肺炎	2	1.54	4.17	J40-J47	敗血症	1	0.83	3.85
6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	0.80	2.70	I60-I69	腦血管疾病	2	1.54	4.17	A40-A41	肺炎	1	0.83	3.85
7	J40-J47	敗血症	1	0.40	1.35	E10-E14	糖尿病	1	0.77	2.08	J12-J18	慢性下呼吸道疾病	1	0.83	3.85
8	A40-A41	糖尿病	1	0.40	1.35	M00-M99	皮膚及皮下組織疾病	1	0.77	2.08	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.83	3.85
9	E10-E14	慢性下呼吸道疾病	1	0.40	1.35	L00-L99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.77	2.08					
10	M00-M99	皮膚及皮下組織疾病	1	0.40	1.35										
10	L00-L99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.40	1.35										
10	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.40	1.35										
		其他	12	4.78	16.22		其他	9	6.92	18.75		其他	3	2.48	11.54

資料來源：衛生福利部。

附註：15-24歲年中人口數為250,842人，其中男性為129,997人，女性為120,846人。

表11・ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	482	63.76	100.00		所有死亡原因	285	78.84	100.00		所有死亡原因	197	49.94	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	136	17.99	28.22	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	58	16.04	20.35	C00-C97	惡性腫瘤	80	20.28	40.61
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	70	9.26	14.52	C00-C97	惡性腫瘤	56	15.49	19.65	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	26	6.59	13.20
3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	68	8.99	14.11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	42	11.62	14.74	I60-I69	腦血管疾病	15	3.80	7.61
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	40	5.29	8.30	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	29	8.02	10.18	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	3.04	6.09
5	I60-I69	腦血管疾病	29	3.84	6.02	I60-I69	腦血管疾病	14	3.87	4.91	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	2.79	5.58
6	J12-J18	肺炎	14	1.85	2.90	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	3.04	3.86	J12-J18	肺炎	9	2.28	4.57
7	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	1.72	2.70	J12-J18	肺炎	5	1.38	1.75	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	1.01	2.03
8	I71	主動脈瘤及剝離	7	0.93	1.45	E10-E14	糖尿病	4	1.11	1.40	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	3	0.76	1.52
9	E10-E14	糖尿病	6	0.79	1.24	I10-I15	高血壓性疾病	4	1.11	1.40	O00-O99	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	3	0.76	1.52
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	0.79	1.24	I71	主動脈瘤及剝離	4	1.11	1.40	I71	主動脈瘤及剝離	3	0.76	1.52
		其他	93	12.30	19.29		其他	58	16.04	20.35		其他	31	7.86	15.74

資料來源：衛生福利部。

附註：25-44歲年中人口數為756,003人，其中男性為361,493人，女性為394,511人。

表12·ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	2,837	363.68	100.00		所有死亡原因	1,815	504.01	100.00		所有死亡原因	1,022	243.35	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,304	167.16	45.96	C00-C97	惡性腫瘤	710	197.16	39.12	C00-C97	惡性腫瘤	594	141.44	58.12
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	418	53.58	14.73	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	328	91.08	18.07	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	90	21.43	8.81
3	I60-I69	腦血管疾病	150	19.23	5.29	I60-I69	腦血管疾病	116	32.21	6.39	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	41	9.76	4.01
4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	113	14.49	3.98	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	72	19.99	3.97	I60-I69	腦血管疾病	34	8.10	3.33
5	E10-E14	糖尿病	94	12.05	3.31	E10-E14	糖尿病	68	18.88	3.75	E10-E14	糖尿病	26	6.19	2.54
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	90	11.54	3.17	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	66	18.33	3.64	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	5.71	2.35
7	J12-J18	肺炎	77	9.87	2.71	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	62	17.22	3.42	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	5.24	2.15
8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	75	9.61	2.64	J12-J18	肺炎	56	15.55	3.09	J12-J18	肺炎	21	5.00	2.05
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	47	6.03	1.66	I10-I15	高血壓性疾病	37	10.27	2.04	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	3.10	1.27
10	I10-I15	高血壓性疾病	43	5.51	1.52	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	6.94	1.38	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	2.86	1.17
		其他	426	54.61	15.02		其他	275	76.37	15.15		其他	145	34.53	14.19

資料來源：衛生福利部。

附註：45-64歲年中人口數為 780,081 人，其中男性為 360,109 人，女性為 419,972 人。

表13·ICD-10 臺北市老年(65-74歲)主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
1	C00-C97	所有死亡原因	2,840	959.39	100.00	C00-C97	所有死亡原因	1,757	1,298.67	100.00	C00-C97	所有死亡原因	1,083	673.81	100.00
		惡性腫瘤	1,262	426.32	44.44		惡性腫瘤	732	541.05	41.66		惡性腫瘤	530	329.75	48.94
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	412	139.18	14.51	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	284	209.92	16.16	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	128	79.64	11.82
3	I60-I69	腦血管疾病	138	46.62	4.86	I60-I69	腦血管疾病	98	72.44	5.58	E10-E14	糖尿病	50	31.11	4.62
4	J12-J18	肺炎	126	42.56	4.44	J12-J18	肺炎	84	62.09	4.78	J12-J18	肺炎	42	26.13	3.88
5	E10-E14	糖尿病	122	41.21	4.30	E10-E14	糖尿病	72	53.22	4.10	I60-I69	腦血管疾病	40	24.89	3.69
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	65	21.96	2.29	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	42	31.04	2.39	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	29	18.04	2.68
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	61	20.61	2.15	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	37	27.35	2.11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	28	17.42	2.59
8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	57	19.26	2.01	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	36	26.61	2.05	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	19	11.82	1.75
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	49	16.55	1.73	I10-I15	高血壓性疾病	31	22.91	1.76	A40-A41	敗血症	15	9.33	1.39
10	I10-I15	高血壓性疾病	41	13.85	1.44	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	28	20.70	1.59	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	8.71	1.29
		其他	507	171.27	17.85		其他	313	231.35	17.81		其他	188	116.97	17.36
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	41	13.85	1.44	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	27	19.96	1.54	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	13	8.09	1.20
12	A40-A41	敗血症	34	11.49	1.20	A40-A41	敗血症	19	14.04	1.08	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	12	7.47	1.11
13	G20-G21	帕金森病	27	9.12	0.95	G20-G21	帕金森病	18	13.30	1.02	I71	主動脈瘤及剝離	11	6.84	1.02
14	I71	主動脈瘤及剝離	26	8.78	0.92	I71	主動脈瘤及剝離	15	11.09	0.85	I10-I15	高血壓性疾病	10	6.22	0.92
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	21	7.09	0.74	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部 病況(塵肺症及肺炎除 外)	12	8.87	0.68	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	10	6.22	0.92

資料來源：衛生福利部。

附註：65-74歲年中人口數為296,021人，其中男性為135,292人，女性為160,729人。

表14·ICD-10 臺北市老年(75-84歲)主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	4,217	3,182.21	100.00		所有死亡原因	2,242	4,036.40	100.00		所有死亡原因	1,975	2,565.82	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,357	1,024.01	32.18	C00-C97	惡性腫瘤	728	1,310.66	32.47	C00-C97	惡性腫瘤	629	817.16	31.85
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	660	498.05	15.65	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	338	608.52	15.08	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	322	418.33	16.30
3	J12-J18	肺炎	368	277.70	8.73	J12-J18	肺炎	218	392.48	9.72	J12-J18	肺炎	150	194.87	7.59
4	I60-I69	腦血管疾病	282	212.80	6.69	I60-I69	腦血管疾病	159	286.26	7.09	I60-I69	腦血管疾病	123	159.80	6.23
5	E10-E14	糖尿病	225	169.79	5.34	E10-E14	糖尿病	102	183.64	4.55	E10-E14	糖尿病	123	159.80	6.23
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	143	107.91	3.39	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	75	135.03	3.35	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	78	101.33	3.95
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	117	88.29	2.77	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	65	117.02	2.90	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	42	54.56	2.13
8	I10-I15	高血壓性 疾病	85	64.14	2.02	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	46	82.82	2.05	I10-I15	高血壓性 疾病	40	51.97	2.03
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	80	60.37	1.90	I10-I15	高血壓性 疾病	45	81.02	2.01	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	34	44.17	1.72
10	G20-G21	帕金森病	63	47.54	1.49	G20-G21	帕金森病	42	75.62	1.87	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	31	40.27	1.57
		其他	837	631.61	19.85		其他	424	763.35	18.91		其他	403	523.56	20.41
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	58	43.77	1.38	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部 病況（塵肺症及肺炎除 外）	31	55.81	1.38	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	30	38.97	1.52
12	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	54	40.75	1.28	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	29	52.21	1.29	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	29	37.68	1.47
13	A40-A41	敗血症	54	40.75	1.28	A40-A41	敗血症	28	50.41	1.25	A40-A41	敗血症	26	33.78	1.32
14	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部 病況（塵肺症及肺炎除 外）	51	38.49	1.21	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	25	45.01	1.12	G20-G21	帕金森病	21	27.28	1.06
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	40	30.18	0.95	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	24	43.21	1.07	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部 病況（塵肺症及肺炎除 外）	20	25.98	1.01

資料來源：衛生福利部。

附註：75-84歲年中人口數為132,518人，其中男性為55,545人，女性為76,974人。

表15·ICD-10 臺北市老年(85歲以上)主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計					男性					女性				
	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	疾病碼	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
		所有死亡原因	6,657	11,427.74	100.00		所有死亡原因	3,340	12,988.28	100.00		所有死亡原因	3,317	10,194.39	100.00
1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,241	2,130.36	18.64	C00-C97	惡性腫瘤	606	2,356.56	18.14	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	662	2,034.58	19.96
2	C00-C97	惡性腫瘤	1,075	1,845.40	16.15	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	579	2,251.56	17.34	C00-C97	惡性腫瘤	469	1,441.41	14.14
3	J12-J18	肺炎	981	1,684.03	14.74	J12-J18	肺炎	540	2,099.90	16.17	J12-J18	肺炎	441	1,355.36	13.30
4	I60-I69	腦血管疾病	434	745.03	6.52	I60-I69	腦血管疾病	221	859.40	6.62	I60-I69	腦血管疾病	213	654.63	6.42
5	E10-E14	糖尿病	286	490.96	4.30	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	197	766.07	5.90	E10-E14	糖尿病	171	525.55	5.16
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	268	460.06	4.03	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	118	458.87	3.53	I10-I15	高血壓性疾病	149	457.93	4.49
7	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	247	424.01	3.71	E10-E14	糖尿病	115	447.20	3.44	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	134	411.83	4.04
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	244	418.86	3.67	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	110	427.76	3.29	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	129	396.47	3.89
9	I10-I15	高血壓性疾病	241	413.71	3.62	I10-I15	高血壓性疾病	92	357.76	2.75	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	71	218.21	2.14
10	A40-A41	敗血症	90	154.50	1.35	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	46	178.88	1.38	A40-A41	敗血症	47	144.45	1.42
		其他	1,550	2,660.81	23.28		其他	716	2,784.31	21.44		其他	831	2,553.98	25.05
11	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	82	140.77	1.23	A40-A41	敗血症	43	167.21	1.29	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	36	110.64	1.09
12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	74	127.03	1.11	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	41	159.44	1.23	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	36	110.64	1.09
13	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	71	121.88	1.07	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	38	147.77	1.14	G20-G21	帕金森病	33	101.42	0.99
14	G20-G21	帕金森病	69	118.45	1.04	G20-G21	帕金森病	36	139.99	1.08	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	30	92.20	0.90
15	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	45	77.25	0.68	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	16	62.22	0.48	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	29	89.13	0.87

資料來源：衛生福利部。

附註：85歲以上年中人口數為 58,253 人，其中男性為 25,716 人，女性為 32,538 人。

表16·ICD-10 臺北市事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
總計	367	13.99	122	4.65	97	3.70	20	0.76	16	0.61	9	0.34	19	0.72	84	3.20
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	3	0.91	2	0.60	-	-	1	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	19	7.57	14	5.58	1	0.40	1	0.40	-	-	-	-	2	0.80	1	0.40
25-44歲	40	5.29	16	2.12	7	0.93	4	0.53	-	-	2	0.26	7	0.93	4	0.53
45-64歲	90	11.54	27	3.46	26	3.33	6	0.77	6	0.77	2	0.26	7	0.90	16	2.05
65-79歲	104	27.84	37	9.91	28	7.50	6	1.61	5	1.34	3	0.80	2	0.54	23	6.16
80歲以上	111	98.00	26	22.96	35	30.90	2	1.77	5	4.41	2	1.77	1	0.88	40	35.32

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,623,730人。

表17·ICD-10 臺北市男性事故傷害死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	238	19.05	78	6.24	68	5.44	16	1.28	5	0.40	7	0.56	13	1.04	51	4.08
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	17	13.08	12	9.23	1	0.77	1	0.77	-	-	-	-	2	1.54	1	0.77
25-44歲	29	8.02	13	3.60	5	1.38	4	1.11	-	-	1	0.28	4	1.11	2	0.55
45-64歲	66	18.33	19	5.28	22	6.11	5	1.39	2	0.56	2	0.56	6	1.67	10	2.78
65-79歲	68	40.28	21	12.44	22	13.03	4	2.37	2	1.18	3	1.78	1	0.59	15	8.88
80歲以上	58	121.55	13	27.24	18	37.72	2	4.19	1	2.10	1	2.10	-	-	23	48.20

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,249,334人。

表18·ICD-10 臺北市女性事故傷害死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸事故傷害		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	129	9.39	44	3.20	29	2.11	4	0.29	11	0.80	2	0.15	6	0.44	33	2.40
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	3	1.88	2	1.25	-	-	1	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	2	1.66	2	1.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44歲	11	2.79	3	0.76	2	0.51	-	-	-	-	1	0.25	3	0.76	2	0.51
45-64歲	24	5.71	8	1.90	4	0.95	1	0.24	4	0.95	-	-	1	0.24	6	1.43
65-79歲	36	17.59	16	7.82	6	2.93	2	0.98	3	1.47	-	-	1	0.49	8	3.91
80歲以上	53	80.86	13	19.83	17	25.94	-	-	4	6.10	1	1.53	1	1.53	17	25.94

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,374,396人。

表19·ICD-10 臺北市運輸事故傷害死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
總計	122	4.65	29	1.11	8	0.30	21	0.80	7	0.27	-	-	56	2.13	1	0.04
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	2	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.60	-	-
15-24歲	14	5.58	-	-	1	0.40	3	1.20	1	0.40	-	-	9	3.59	-	-
25-44歲	16	2.12	1	0.13	-	-	7	0.93	2	0.26	-	-	6	0.79	-	-
45-64歲	27	3.46	6	0.77	3	0.38	5	0.64	2	0.26	-	-	10	1.28	1	0.13
65-79歲	37	9.91	12	3.21	3	0.80	6	1.61	1	0.27	-	-	15	4.02	-	-
80歲以上	26	22.96	10	8.83	1	0.88	-	-	1	0.88	-	-	14	12.36	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,623,730人。

表20·ICD-10 臺北市男性運輸事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	78	6.24	14	1.12	7	0.56	17	1.36	5	0.40	-	-	34	2.72	1	0.08
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	12	9.23	-	-	1	0.77	2	1.54	1	0.77	-	-	8	6.15	-	-
25-44歲	13	3.60	-	-	-	-	5	1.38	2	0.55	-	-	6	1.66	-	-
45-64歲	19	5.28	4	1.11	2	0.56	4	1.11	1	0.28	-	-	7	1.94	1	0.28
65-79歲	21	12.44	5	2.96	3	1.78	6	3.55	-	-	-	-	7	4.15	-	-
80歲以上	13	27.24	5	10.48	1	2.10	-	-	1	2.10	-	-	6	12.57	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,249,334人。

表21·ICD-10 臺北市女性運輸事故傷害死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		摩托車騎乘者在運輸事故傷害中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸事故傷害中受傷		小貨(卡)車或箱型車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸事故傷害		其他和未特定的運輸意外事故	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V50-V59		V80-V89		V98-V99	
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	44	3.20	15	1.09	1	0.07	4	0.29	2	0.15	-	-	22	1.60	-	-
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14歲	2	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.25	-	-
15-24歲	2	1.66	-	-	-	-	1	0.83	-	-	-	-	1	0.83	-	-
25-44歲	3	0.76	1	0.25	-	-	2	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-
45-64歲	8	1.90	2	0.48	1	0.24	1	0.24	1	0.24	-	-	3	0.71	-	-
65-79歲	16	7.82	7	3.42	-	-	-	-	1	0.49	-	-	8	3.91	-	-
80歲以上	13	19.83	5	7.63	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12.21	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,374,396人。

表22·ICD-10 臺北市自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	315	12.01	-	-	7	2.11	21	8.37	68	8.99	113	14.49	74	19.81	32	28.25
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.26	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.27	-	-	-	-	1	0.40	1	0.13	3	0.38	2	0.54	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	39	1.49	-	-	-	-	3	1.20	12	1.59	19	2.44	5	1.34	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.38	2	0.54	3	2.65
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.54	1	0.88	
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	109	4.15	-	-	1	0.30	4	1.59	28	3.70	33	4.23	30	8.03	13	11.48
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	35	1.33	-	-	-	-	2	0.80	6	0.79	9	1.15	13	3.48	5	4.41
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	3	0.11	-	-	-	-	-	-	2	0.26	1	0.13	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	1	0.27	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	-	-	-	-	-	-	2	0.26	4	0.51	3	0.80	1	0.88
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	93	3.54	-	-	6	1.81	11	4.39	17	2.25	35	4.49	16	4.28	8	7.06
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.26	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	1	0.88

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,623,730人。

表23·ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上			
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	187	14.97	-	-	4	2.33	10	7.69	42	11.62	72	19.99	41	24.28	18	37.72		
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.28	-	-	-	-		
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.28	1	0.59	-	-		
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	32	2.56	-	-	-	-	2	1.54	11	3.04	15	4.17	4	2.37	-	-		
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.83	2	1.18	2	4.19		
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.59	-	-		
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	67	5.36	-	-	1	0.58	1	0.77	17	4.70	22	6.11	20	11.85	6	12.57		
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	16	1.28	-	-	-	-	1	0.77	3	0.83	4	1.11	5	2.96	3	6.29		
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	3	0.24	-	-	-	-	-	-	2	0.55	1	0.28	-	-	-	-		
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.28	1	0.59	-	-		
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.64	-	-	-	-	-	-	2	0.55	3	0.83	2	1.18	1	2.10		
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	44	3.52	-	-	3	1.75	6	4.62	7	1.94	18	5.00	5	2.96	5	10.48		
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.56	-	-	-	-		
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.28	-	-	1	2.10		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,249,334人。

表24·ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	128	9.31	-	-	3	1.88	11	9.10	26	6.59	41	9.76	33	16.12	14	21.36
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.24	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	0.36	-	-	-	-	1	0.83	1	0.25	2	0.48	1	0.49	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	7	0.51	-	-	-	-	1	0.83	1	0.25	4	0.95	1	0.49	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.53
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.49	1	1.53	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	42	3.06	-	-	-	-	3	2.48	11	2.79	11	2.62	10	4.89	7	10.68
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	19	1.38	-	-	-	-	1	0.83	3	0.76	5	1.19	8	3.91	2	3.05
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.24	1	0.49	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	49	3.57	-	-	3	1.88	5	4.14	10	2.53	17	4.05	11	5.37	3	4.58
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,374,095人。

表25·ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	5,146	196.13	92.94	100.00	所有癌症死亡原因	2,837	227.08	113.41	100.00	所有癌症死亡原因	2,309	168.00	76.76	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	1,026	39.10	18.15	19.94	氣管、支氣管和肺癌	593	47.47	23.62	20.90	氣管、支氣管和肺癌	433	31.50	13.78	18.75
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	354	25.76	13.06	6.88	肝和肝內膽管癌	438	35.06	17.73	15.44	女性乳房癌	354	25.76	13.06	15.33
3	結腸、直腸和肛門癌	667	25.42	11.50	12.96	結腸、直腸和肛門癌	354	28.34	13.77	12.48	結腸、直腸和肛門癌	313	22.77	9.69	13.56
4	肝和肝內膽管癌	646	24.62	11.50	12.55	前列腺(攝護腺)癌	207	16.57	6.93	7.30	肝和肝內膽管癌	208	15.13	6.37	9.01
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	207	16.57	6.93	4.02	胰臟癌	174	13.93	7.13	6.13	胰臟癌	150	10.91	4.75	6.50
6	胰臟癌	324	12.35	5.83	6.30	口腔癌	172	13.77	7.79	6.06	胃癌	117	8.51	3.78	5.07
7	胃癌	277	10.56	4.64	5.38	胃癌	160	12.81	5.83	5.64	卵巢癌	106	7.71	4.28	4.59
8	卵巢癌 ⁽¹⁾	106	7.71	4.28	2.06	食道癌	108	8.64	4.62	3.81	非何杰金氏淋巴瘤	74	5.38	2.36	3.20
9	口腔癌	184	7.01	3.77	3.58	非何杰金氏淋巴瘤	94	7.52	3.60	3.31	子宮頸及部位未明示 子宮癌	68	4.95	2.50	2.94
10	非何杰金氏淋巴瘤	168	6.40	2.91	3.26	白血病	82	6.56	3.25	2.89	白血病	59	4.29	1.92	2.56
	其他	1,187	45.24	22.19	23.07	其他	455	36.42	19.14	16.04	其他	427	31.07	14.28	18.49
11	白血病	141	5.37	2.53	2.74	膀胱癌	62	4.96	2.32	2.19	子宮體癌	56	4.07	2.04	2.43
12	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	68	4.95	2.50	1.32	腎臟癌	47	3.76	1.88	1.66	膀胱癌	42	3.06	1.17	1.82
13	食道癌	121	4.61	2.36	2.35	腦癌	45	3.60	2.45	1.59	膽囊和其他膽道癌	38	2.76	1.10	1.65
14	子宮體癌 ⁽¹⁾	56	4.07	2.04	1.09	鼻咽癌	36	2.88	1.65	1.27	間皮和軟組織癌	26	1.89	1.17	1.13
15	膀胱癌	104	3.96	1.67	2.02	膽囊和其他膽道癌	32	2.56	1.30	1.13	腎臟癌	26	1.89	0.71	1.13

資料來源：衛生福利部。

附 註：1. 臺北市年中人口數為 2,623,730 人，其中男性 1,249,334 人，女性 1,374,396 人。

2. (1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表26·ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	5,146	196.13	-	-	5	1.51	7	2.79	136	17.99	1,304	167.16	1,262	426.32	1,357	1,024.01	1,075	1,845.40		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,026	39.10	-	-	-	-	-	-	18	2.38	233	29.87	275	92.90	293	221.10	207	355.35		
2	C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	354	25.76	-	-	-	-	-	22	5.58	145	34.53	81	50.40	64	83.15	42	129.08			
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	667	25.42	-	-	-	-	-	9	1.19	158	20.25	148	50.00	170	128.28	182	312.43			
4	C22	肝和肝內膽管癌	646	24.62	-	-	-	-	-	14	1.85	151	19.36	163	55.06	197	148.66	121	207.71			
5	C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	207	16.57	-	-	-	-	-	-	9	2.50	32	23.65	70	126.03	96	373.32				
6	C25	胰臟癌	324	12.35	-	-	-	-	-	1	0.13	76	9.74	106	35.81	91	68.67	50	85.83			
7	C16	胃癌	277	10.56	-	-	-	-	1	0.40	4	0.53	45	5.77	69	23.31	79	59.61	79	135.62		
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	106	7.71	-	-	-	-	1	0.83	9	2.28	48	11.43	21	13.07	17	22.09	10	30.73		
9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	184	7.01	-	-	-	-	-	7	0.93	90	11.54	53	17.90	19	14.34	15	25.75			
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	168	6.40	-	-	-	-	2	0.80	3	0.40	29	3.72	41	13.85	49	36.98	44	75.53		
		其他	1,187	45.24	-	-	5	1.51	3	1.20	49	6.48	320	41.02	273	92.22	308	232.42	229	393.11		
11	C91-C95	白血病	141	5.37	-	-	1	0.30	1	0.40	6	0.79	29	3.72	30	10.13	36	27.17	38	65.23		
12	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	68	4.95	-	-	-	-	-	7	1.77	26	6.19	10	6.22	14	18.19	11	33.81			
13	C15	食道癌	121	4.61	-	-	-	-	-	-	-	64	8.20	31	10.47	12	9.06	14	24.03			
14	C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	56	4.07	-	-	-	-	-	4	1.01	21	5.00	20	12.44	6	7.79	5	15.37			
15	C67	膀胱癌	104	3.96	-	-	-	-	-	1	0.13	13	1.67	21	7.09	37	27.92	32	54.93			

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市年中人口數為2,623,730人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表27·ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國109年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,837	227.08	-	-	2	1.17	3	2.31	56	15.49	710	197.16	732	541.05	728	1,310.66	606	2,356.56		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	593	47.47	-	-	-	-	-	-	9	2.49	140	38.88	168	124.18	160	288.06	116	451.09		
2	C22	肝和肝內膽管癌	438	35.06	-	-	-	-	-	-	10	2.77	125	34.71	119	87.96	106	190.84	78	303.32		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	354	28.34	-	-	-	-	-	-	4	1.11	89	24.71	80	59.13	90	162.03	91	353.87		
4	C61	前列腺(攝護腺)癌	207	16.57	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.50	32	23.65	70	126.03	96	373.32		
5	C25	胰臟癌	174	13.93	-	-	-	-	-	-	1	0.28	47	13.05	55	40.65	45	81.02	26	101.11		
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	172	13.77	-	-	-	-	-	-	6	1.66	87	24.16	49	36.22	18	32.41	12	46.66		
7	C16	胃癌	160	12.81	-	-	-	-	-	-	1	0.28	24	6.66	39	28.83	47	84.62	49	190.55		
8	C15	食道癌	108	8.64	-	-	-	-	-	-	-	-	57	15.83	28	20.70	11	19.80	12	46.66		
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	94	7.52	-	-	-	-	1	0.77	2	0.55	13	3.61	27	19.96	26	46.81	25	97.22		
10	C91-C95	白血病	82	6.56	-	-	-	-	1	0.77	4	1.11	14	3.89	21	15.52	17	30.61	25	97.22		
		其他	455	36.42	-	-	2	1.17	1	0.77	19	5.26	105	29.16	114	84.26	138	248.45	76	295.54		
11	C67	膀胱癌	62	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.94	17	12.57	23	41.41	15	58.33		
12	C64	腎臟癌	47	3.76	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.05	13	9.61	15	27.01	8	31.11		
13	C71	腦癌	45	3.60	-	-	2	1.17	1	0.77	5	1.38	14	3.89	8	5.91	12	21.60	3	11.67		
14	C11	鼻咽癌	36	2.88	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.89	11	8.13	11	19.80	-	-		
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	32	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.94	9	6.65	11	19.80	5	19.44		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市男性年中人口數為1,249,334人。

表28·ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國109年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-74歲		75-84歲		85歲以上			
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,309	168.00	-	-	3	1.88	4	3.31	80	20.28	594	141.44	530	329.75	629	817.16	469	1,441.41		
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	433	31.50	-	-	-	-	-	-	9	2.28	93	22.14	107	66.57	133	172.79	91	279.68		
2	C50	女性乳房癌	354	25.76	-	-	-	-	-	-	22	5.58	145	34.53	81	50.40	64	83.15	42	129.08		
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	313	22.77	-	-	-	-	-	-	5	1.27	69	16.43	68	42.31	80	103.93	91	279.68		
4	C22	肝和肝內膽管癌	208	15.13	-	-	-	-	-	-	4	1.01	26	6.19	44	27.38	91	118.22	43	132.16		
5	C25	胰臟癌	150	10.91	-	-	-	-	-	-	-	-	29	6.91	51	31.73	46	59.76	24	73.76		
6	C16	胃癌	117	8.51	-	-	-	-	1	0.83	3	0.76	21	5.00	30	18.67	32	41.57	30	92.20		
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	106	7.71	-	-	-	-	1	0.83	9	2.28	48	11.43	21	13.07	17	22.09	10	30.73		
8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	74	5.38	-	-	-	-	1	0.83	1	0.25	16	3.81	14	8.71	23	29.88	19	58.39		
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	68	4.95	-	-	-	-	-	-	7	1.77	26	6.19	10	6.22	14	18.19	11	33.81		
10	C91-C95	白血病	59	4.29	-	-	1	0.63	-	-	2	0.51	15	3.57	9	5.60	19	24.68	13	39.95		
		其他	427	31.07	-	-	2	1.25	1	0.83	18	4.56	106	25.24	95	59.11	110	142.91	95	291.97		
11	C54	子宮體癌	56	4.07	-	-	-	-	-	-	4	1.01	21	5.00	20	12.44	6	7.79	5	15.37		
12	C67	膀胱癌	42	3.06	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.43	4	2.49	14	18.19	17	52.25		
13	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	38	2.76	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.90	9	5.60	13	16.89	8	24.59		
14	C45-C49	間皮和軟組織癌	26	1.89	-	-	1	0.63	-	-	3	0.76	12	2.86	6	3.73	3	3.90	1	3.07		
15	C64	腎臟癌	26	1.89	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.19	3	1.87	6	7.79	12	36.88		

資料來源：衛生福利部。

附註：臺北市女性年中人口數為1,374,396人。

表29-1 · ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,253	619.52	247.81	100.00	所有死亡原因	677	716.16	310.12	100.00	所有死亡原因	576	534.71	197.72	100.00
1	惡性腫瘤	394	194.80	88.03	31.44	惡性腫瘤	214	226.38	105.38	31.61	惡性腫瘤	180	167.10	74.22	31.25
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	176	87.02	31.46	14.05	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	95	100.49	42.90	14.03	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	81	75.19	22.27	14.06
3	肺炎	118	58.34	19.75	9.42	肺炎	74	78.28	28.11	10.93	肺炎	44	40.85	13.40	7.64
4	腦血管疾病	80	39.55	13.49	6.38	腦血管疾病	42	44.43	16.41	6.20	腦血管疾病	38	35.28	11.04	6.60
5	糖尿病	43	21.26	7.72	3.43	慢性下呼吸道疾病	23	24.33	8.15	3.40	糖尿病	23	21.35	6.73	3.99
6	血管性及未明示之癡 呆症	36	17.80	4.38	2.87	糖尿病	20	21.16	8.93	2.95	血管性及未明示之癡 呆症	21	19.49	4.52	3.65
7	慢性下呼吸道疾病	35	17.30	5.65	2.79	高血壓性疾病	18	19.04	6.90	2.66	腎炎、腎病症候群及 腎病變	14	13.00	3.87	2.43
8	腎炎、腎病症候群及 腎病變	31	15.33	4.88	2.47	事故傷害	18	19.04	12.14	2.66	敗血症	13	12.07	3.33	2.26
9	高血壓性疾病	28	13.84	4.49	2.23	腎炎、腎病症候群及 腎病變	17	17.98	6.09	2.51	慢性下呼吸道疾病	12	11.14	3.65	2.08
10	事故傷害	27	13.35	7.19	2.15	血管性及未明示之癡 呆症	15	15.87	4.22	2.22	蓄意自我傷害（自 殺）	11	10.21	7.33	1.91
	其他	285	140.91	60.77	22.75	其他	141	149.16	70.90	20.83	其他	139	129.04	47.36	24.13
11	帕金森病	21	10.38	3.90	1.68	帕金森病	13	13.75	5.80	1.92	高血壓性疾病	10	9.28	2.53	1.74
12	蓄意自我傷害（自 殺）	21	10.38	7.80	1.68	慢性肝病及肝硬化	11	11.64	5.30	1.62	事故傷害	9	8.35	3.04	1.56
13	敗血症	19	9.39	2.93	1.52	蓄意自我傷害（自 殺）	10	10.58	8.32	1.48	帕金森病	8	7.43	2.60	1.39
14	慢性肝病及肝硬化	17	8.41	3.31	1.36	敗血症	6	6.35	2.36	0.89	慢性肝病及肝硬化	6	5.57	1.76	1.04
15	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	9	4.45	1.26	0.72	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	6	6.35	3.03	0.89	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	5	4.64	4.33	0.87

資料來源：衛生福利部。

附 註：總計：肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)及主動脈瘤及剝離之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、4.45人，每十萬人口標準化死亡率為1.73人、1.97人。

表29-2 · ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,500	689.24	283.30	100.00	所有死亡原因	909	879.20	394.00	100.00	所有死亡原因	591	517.33	191.57	100.00
1	惡性腫瘤	470	215.96	94.87	31.33	惡性腫瘤	268	259.21	119.69	29.48	惡性腫瘤	202	176.82	75.15	34.18
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	250	114.87	42.57	16.67	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	163	157.66	67.17	17.93	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	87	76.15	22.45	14.72
3	肺炎	139	63.87	20.70	9.27	肺炎	90	87.05	29.05	9.90	肺炎	49	42.89	13.84	8.29
4	腦血管疾病	78	35.84	14.36	5.20	腦血管疾病	51	49.33	21.64	5.61	糖尿病	28	24.51	7.75	4.74
5	糖尿病	66	30.33	11.30	4.40	糖尿病	38	36.75	15.78	4.18	腦血管疾病	27	23.63	8.19	4.57
6	高血壓性疾病	41	18.84	7.14	2.73	慢性下呼吸道疾病	30	29.02	9.41	3.30	腎炎、腎病症候群及 腎病變	21	18.38	6.02	3.55
7	慢性下呼吸道疾病	41	18.84	6.36	2.73	高血壓性疾病	25	24.18	10.52	2.75	高血壓性疾病	16	14.01	4.18	2.71
8	腎炎、腎病症候群及 腎病變	41	18.84	6.51	2.73	事故傷害	23	22.25	13.94	2.53	事故傷害	14	12.25	8.09	2.37
9	事故傷害	37	17.00	10.74	2.47	腎炎、腎病症候群及 腎病變	20	19.34	7.36	2.20	血管性及未明示之癱 瘓症	12	10.50	3.12	2.03
10	血管性及未明示之癱 瘓症	31	14.24	4.38	2.07	血管性及未明示之癱 瘓症	19	18.38	6.03	2.09	慢性下呼吸道疾病	11	9.63	3.91	1.86
	其他	306	140.61	64.37	20.40	其他	182	176.03	93.40	20.02	其他	124	108.54	38.87	20.98
11	蓄意自我傷害（自 殺）	21	9.65	7.61	1.40	慢性肝病及肝硬化	15	14.51	7.87	1.65	蓄意自我傷害（自 殺）	9	7.88	5.02	1.52
12	慢性肝病及肝硬化	20	9.19	4.64	1.33	蓄意自我傷害（自 殺）	12	11.61	10.15	1.32	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	8	7.00	2.17	1.35
13	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	17	7.81	2.92	1.13	帕金森病	11	10.64	4.20	1.21	敗血症	7	6.13	2.20	1.18
14	敗血症	16	7.35	2.93	1.07	敗血症	9	8.70	3.86	0.99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	7	6.13	2.41	1.18
15	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	14	6.43	3.49	0.93	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	9	8.70	3.99	0.99	慢性肝病及肝硬化	5	4.38	1.97	0.85

資料來源：衛生福利部。

表29-3 · ICD-10 臺北市大安區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,871	613.17	221.36	100.00	所有死亡原因	1,002	705.57	269.63	100.00	所有死亡原因	869	532.72	183.83	100.00
1	惡性腫瘤	546	178.94	74.43	29.18	惡性腫瘤	289	203.50	84.54	28.84	惡性腫瘤	257	157.55	66.87	29.57
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	322	105.53	34.31	17.21	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	171	120.41	42.94	17.07	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	151	92.57	27.86	17.38
3	肺炎	161	52.76	14.90	8.61	肺炎	97	68.30	21.19	9.68	肺炎	64	39.23	9.67	7.36
4	腦血管疾病	112	36.70	11.66	5.99	腦血管疾病	60	42.25	14.82	5.99	腦血管疾病	52	31.88	9.20	5.98
5	糖尿病	92	30.15	10.02	4.92	糖尿病	41	28.87	10.94	4.09	糖尿病	51	31.26	9.32	5.87
6	腎炎、腎病症候群及 腎病變	58	19.01	6.50	3.10	慢性下呼吸道疾病	36	25.35	7.48	3.59	腎炎、腎病症候群及 腎病變	28	17.16	5.49	3.22
7	慢性下呼吸道疾病	45	14.75	3.99	2.41	腎炎、腎病症候群及 腎病變	30	21.12	7.82	2.99	高血壓性疾病	21	12.87	3.17	2.42
8	事故傷害	44	14.42	7.66	2.35	事故傷害	29	20.42	11.85	2.89	血管性及未明示之癡 呆症	18	11.03	2.41	2.07
9	高血壓性疾病	43	14.09	4.73	2.30	高血壓性疾病	22	15.49	6.66	2.20	事故傷害	15	9.20	4.19	1.73
10	血管性及未明示之癡 呆症	35	11.47	2.55	1.87	血管性及未明示之癡 呆症	17	11.97	2.69	1.70	帕金森病	14	8.58	2.41	1.61
	其他	413	135.35	50.61	22.07	其他	210	147.87	58.69	20.96	其他	198	121.38	43.23	22.78
11	蓄意自我傷害（自 殺）	27	8.85	6.15	1.44	蓄意自我傷害（自 殺）	13	9.15	7.38	1.30	蓄意自我傷害（自 殺）	14	8.58	5.05	1.61
12	慢性肝病及肝硬化	25	8.19	2.98	1.34	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	12	8.45	2.78	1.20	慢性肝病及肝硬化	13	7.97	2.43	1.50
13	帕金森病	22	7.21	2.20	1.18	慢性肝病及肝硬化	12	8.45	3.69	1.20	慢性下呼吸道疾病	9	5.52	1.26	1.04
14	敗血症	18	5.90	1.78	0.96	敗血症	10	7.04	2.31	1.00	敗血症	8	4.90	1.39	0.92
15	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	15	4.92	1.56	0.80	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	10	7.04	2.50	1.00	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	8	4.90	1.60	0.92

資料來源：衛生福利部。

附註：總計：肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為15人、4.92人，每十萬人口標準化死亡率為1.64人。

表29-4 · ICD-10 臺北市中山區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,482	656.82	277.68	100.00	所有死亡原因	776	741.55	344.76	100.00	所有死亡原因	706	583.54	224.07	100.00
1	惡性腫瘤	483	214.07	98.28	32.59	惡性腫瘤	253	241.77	118.13	32.60	惡性腫瘤	230	190.10	82.37	32.58
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	239	105.92	40.45	16.13	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	135	129.01	55.96	17.40	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	104	85.96	28.31	14.73
3	肺炎	135	59.83	21.36	9.11	肺炎	80	76.45	28.43	10.31	肺炎	55	45.46	16.58	7.79
4	腦血管疾病	89	39.44	16.87	6.01	腦血管疾病	42	40.14	19.35	5.41	腦血管疾病	47	38.85	14.79	6.66
5	糖尿病	54	23.93	9.73	3.64	慢性下呼吸道疾病	31	29.62	11.40	3.99	糖尿病	30	24.80	8.72	4.25
6	腎炎、腎病症候群及 腎病變	41	18.17	6.96	2.77	糖尿病	24	22.93	10.86	3.09	腎炎、腎病症候群及 腎病變	24	19.84	7.08	3.40
7	慢性下呼吸道疾病	40	17.73	6.16	2.70	腎炎、腎病症候群及 腎病變	17	16.25	6.73	2.19	高血壓性疾病	20	16.53	5.07	2.83
8	高血壓性疾病	35	15.51	5.21	2.36	高血壓性疾病	15	14.33	5.37	1.93	血管性及未明示之癱 瘓症	13	10.75	3.04	1.84
9	蓄意自我傷害（自 殺）	26	11.52	7.71	1.75	蓄意自我傷害（自 殺）	15	14.33	10.62	1.93	蓄意自我傷害（自 殺）	11	9.09	5.29	1.56
10	事故傷害	23	10.19	5.24	1.55	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	14	13.38	4.68	1.80	事故傷害	10	8.27	3.14	1.42
	其他	317	140.49	59.71	21.39	其他	150	143.34	73.23	19.33	其他	162	133.90	49.69	22.95
11	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	22	9.75	3.17	1.48	事故傷害	13	12.42	7.57	1.68	慢性下呼吸道疾病	9	7.44	2.20	1.27
12	敗血症	19	8.42	3.40	1.28	敗血症	12	11.47	5.15	1.55	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	8	6.61	2.09	1.13
13	血管性及未明示之癱 瘓症	19	8.42	2.49	1.28	帕金森病	9	8.60	3.52	1.16	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	8	6.61	2.99	1.13
14	帕金森病	15	6.65	2.54	1.01	血管性及未明示之癱 瘓症	6	5.73	1.72	0.77	敗血症	7	5.79	2.15	0.99
15	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	12	5.32	1.99	0.81	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	5	4.78	2.24	0.64	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	7	5.79	1.78	0.99

資料來源：衛生福利部。

附 註：男性：皮膚及皮下組織疾病及慢性肝病及肝硬化死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.78人，每十萬人口標準化死亡率各為2.20人、2.93人。

表29-5 · ICD-10 臺北市中正區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有死亡原因	1,017	648.99	268.32	100.00	所有死亡原因	565	757.47	337.13	100.00	所有死亡原因	452	550.45	210.87	100.00
1	惡性腫瘤	280	178.68	82.22	27.53	惡性腫瘤	155	207.80	98.43	27.43	惡性腫瘤	125	152.23	68.75	27.65
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	154	98.27	38.96	15.14	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	93	124.68	56.24	16.46	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	61	74.29	24.60	13.50
3	肺炎	93	59.35	18.65	9.14	肺炎	49	65.69	22.67	8.67	肺炎	44	53.58	15.34	9.73
4	腦血管疾病	73	46.58	18.96	7.18	腦血管疾病	44	58.99	25.36	7.79	腦血管疾病	29	35.32	13.90	6.42
5	慢性下呼吸道疾病	35	22.33	7.15	3.44	慢性下呼吸道疾病	29	38.88	13.66	5.13	腎炎、腎病症候群及 腎病變	19	23.14	7.32	4.20
6	腎炎、腎病症候群及 腎病變	35	22.33	7.64	3.44	糖尿病	16	21.45	9.68	2.83	糖尿病	18	21.92	7.23	3.98
7	糖尿病	34	21.70	8.40	3.34	高血壓性疾病	16	21.45	9.72	2.83	高血壓性疾病	13	15.83	3.71	2.88
8	高血壓性疾病	29	18.51	6.47	2.85	腎炎、腎病症候群及 腎病變	16	21.45	7.92	2.83	血管性及未明示之癡 呆症	12	14.61	4.39	2.65
9	事故傷害	23	14.68	9.73	2.26	事故傷害	16	21.45	16.08	2.83	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	8	9.74	6.11	1.77
10	血管性及未明示之癡 呆症	22	14.04	4.32	2.16	敗血症	10	13.41	5.34	1.77	敗血症	7	8.52	2.36	1.55
	其他	239	152.52	65.82	23.50	其他	121	162.22	72.03	21.42	其他	116	141.27	57.15	25.66
11	敗血症	17	10.85	3.70	1.67	血管性及未明示之癡 呆症	10	13.41	4.22	1.77	事故傷害	7	8.52	3.61	1.55
12	蓄意自我傷害（自 殺）	16	10.21	10.77	1.57	蓄意自我傷害（自 殺）	10	13.41	12.90	1.77	帕金森病	6	7.31	2.56	1.33
13	帕金森病	15	9.57	3.44	1.47	帕金森病	9	12.07	4.59	1.59	慢性下呼吸道疾病	6	7.31	1.80	1.33
14	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	11	7.02	2.80	1.08	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	6	8.04	3.42	1.06	蓄意自我傷害（自 殺）	6	7.31	9.28	1.33
15	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	10	6.38	3.54	0.98	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	5	6.70	2.61	0.88	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	5	6.09	2.30	1.11

資料來源：衛生福利部。

附註：男性：慢性肝病及肝硬化死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、6.70人，每十萬人口標準化死亡率各為4.87人。

表29-6 · ICD-10 臺北市大同區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口		死 亡 百 分 比
			死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率				死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	
	所有死亡原因	966	773.13	348.98	100.00	所有死亡原因	540	891.10	448.85	100.00	所有死亡原因	426	662.04	263.41	100.00
1	惡性腫瘤	280	224.10	105.95	28.99	惡性腫瘤	160	264.03	133.62	29.63	惡性腫瘤	120	186.49	82.56	28.17
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	172	137.66	61.03	17.81	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	87	143.57	75.90	16.11	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	85	132.10	46.69	19.95
3	肺炎	89	71.23	24.91	9.21	肺炎	49	80.86	34.68	9.07	肺炎	40	62.16	17.23	9.39
4	腦血管疾病	55	44.02	18.19	5.69	腦血管疾病	36	59.41	27.89	6.67	腦血管疾病	19	29.53	10.49	4.46
5	糖尿病	34	27.21	11.06	3.52	糖尿病	18	29.70	13.95	3.33	腎炎、腎病症候群及 腎病變	19	29.53	9.95	4.46
6	腎炎、腎病症候群及 腎病變	32	25.61	10.07	3.31	事故傷害	14	23.10	13.07	2.59	糖尿病	16	24.87	8.31	3.76
7	高血壓性疾病	24	19.21	6.54	2.48	腎炎、腎病症候群及 腎病變	13	21.45	9.81	2.41	高血壓性疾病	16	24.87	6.38	3.76
8	事故傷害	20	16.01	9.23	2.07	蓄意自我傷害（自 殺）	12	19.80	14.68	2.22	慢性下呼吸道疾病	8	12.43	4.25	1.88
9	慢性下呼吸道疾病	19	15.21	5.65	1.97	慢性下呼吸道疾病	11	18.15	7.75	2.04	敗血症	7	10.88	3.93	1.64
10	蓄意自我傷害（自 殺）	18	14.41	11.22	1.86	敗血症	9	14.85	7.35	1.67	事故傷害	6	9.32	6.10	1.41
	其他	223	178.48	85.14	23.08	其他	131	216.17	110.15	24.26	其他	90	139.87	67.52	21.13
11	敗血症	16	12.81	5.56	1.66	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	9	14.85	6.77	1.67	蓄意自我傷害（自 殺）	6	9.32	8.09	1.41
12	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	14	11.20	4.44	1.45	高血壓性疾病	8	13.20	6.07	1.48	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	5	7.77	2.45	1.17
13	慢性肝病及肝硬化	12	9.60	5.26	1.24	慢性肝病及肝硬化	8	13.20	7.58	1.48	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	5	7.77	2.13	1.17
14	主動脈瘤及剝離	10	8.00	3.72	1.04	主動脈瘤及剝離	6	9.90	4.88	1.11	主動脈瘤及剝離	4	6.22	2.66	0.94
15	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	9	7.20	2.72	0.93	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	4	6.60	3.24	0.74	慢性肝病及肝硬化	4	6.22	3.02	0.94

資料來源：衛生福利部。

附註：男性：血管性及未明示之癡呆症及骨骼肌肉系統及結締組織之疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為4人、6.60人，每十萬人口標準化死亡率為3.02人、3.12人。

表29-7·ICD-10 臺北市萬華區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,708	922.83	382.07	100.00	所有死亡原因	1,024	1,130.19	506.79	100.00	所有死亡原因	684	723.98	275.42	100.00
1	惡性腫瘤	486	262.59	114.25	28.45	惡性腫瘤	292	322.28	148.56	28.52	惡性腫瘤	194	205.34	86.37	28.36
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	266	143.72	60.83	15.57	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	173	190.94	88.99	16.89	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	93	98.44	35.27	13.60
3	肺炎	164	88.61	28.28	9.60	肺炎	101	111.47	39.78	9.86	肺炎	63	66.68	19.28	9.21
4	腦血管疾病	103	55.65	23.00	6.03	腦血管疾病	73	80.57	36.49	7.13	糖尿病	48	50.81	18.15	7.02
5	糖尿病	82	44.30	19.05	4.80	糖尿病	34	37.53	19.35	3.32	腦血管疾病	30	31.75	11.44	4.39
6	高血壓性疾病	51	27.56	9.37	2.99	慢性肝病及肝硬化	29	32.01	18.08	2.83	高血壓性疾病	25	26.46	8.15	3.65
7	腎炎、腎病症候群及 腎病變	47	25.39	8.96	2.75	慢性下呼吸道疾病	27	29.80	9.90	2.64	腎炎、腎病症候群及 腎病變	21	22.23	6.87	3.07
8	慢性下呼吸道疾病	42	22.69	7.07	2.46	高血壓性疾病	26	28.70	11.05	2.54	蓄意自我傷害（自 殺）	17	17.99	12.35	2.49
9	事故傷害	38	20.53	9.97	2.22	腎炎、腎病症候群及 腎病變	26	28.70	11.35	2.54	慢性下呼吸道疾病	15	15.88	4.73	2.19
10	蓄意自我傷害（自 殺）	35	18.91	12.56	2.05	事故傷害	24	26.49	14.00	2.34	事故傷害	14	14.82	6.23	2.05
	其他	394	212.88	88.73	23.07	其他	219	241.71	109.24	21.39	其他	164	173.59	66.58	23.98
11	慢性肝病及肝硬化	34	18.37	9.89	1.99	蓄意自我傷害（自 殺）	18	19.87	12.59	1.76	血管性及未明示之癡 呆症	12	12.70	3.07	1.75
12	血管性及未明示之癡 呆症	25	13.51	3.34	1.46	血管性及未明示之癡 呆症	13	14.35	3.64	1.27	敗血症	9	9.53	3.09	1.32
13	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	18	9.73	3.43	1.05	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	11	12.14	5.10	1.07	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	7	7.41	2.00	1.02
14	敗血症	17	9.19	3.40	1.00	敗血症	8	8.83	3.78	0.78	帕金森病	6	6.35	1.77	0.88
15	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	13	7.02	2.34	0.76	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	8	8.83	2.97	0.78	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	5	5.29	1.79	0.73

資料來源：衛生福利部。

附 註：女性：慢性肝病及肝硬化及骨骼肌肉系統及結締組織之疾病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、5.29人，每十萬人口標準化死亡率為2.59人、1.77人。

表29-8 · ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,676	620.81	294.08	100.00	所有死亡原因	906	701.95	361.92	100.00	所有死亡原因	770	546.49	241.24	100.00
1	惡性腫瘤	466	172.61	87.24	27.80	惡性腫瘤	251	194.47	105.92	27.70	惡性腫瘤	215	152.59	73.03	27.92
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	276	102.23	44.31	16.47	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	145	112.34	54.48	16.00	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	131	92.97	36.17	17.01
3	肺炎	145	53.71	22.59	8.65	肺炎	78	60.43	28.05	8.61	肺炎	67	47.55	18.50	8.70
4	腦血管疾病	99	36.67	16.35	5.91	腦血管疾病	58	44.94	22.49	6.40	腦血管疾病	41	29.10	11.16	5.32
5	糖尿病	74	27.41	12.18	4.42	糖尿病	49	37.96	19.21	5.41	糖尿病	25	17.74	6.65	3.25
6	高血壓性 疾病	48	17.78	7.52	2.86	慢性下呼吸道 疾病	31	24.02	9.97	3.42	腎炎、腎病症候群及 腎病變	24	17.03	6.77	3.12
7	慢性下呼吸 道疾病	47	17.41	6.79	2.80	高血壓性 疾病	27	20.92	10.14	2.98	血管性及未明示之癱 呆症	21	14.90	4.54	2.73
8	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	45	16.67	7.01	2.68	事故傷害	25	19.37	11.25	2.76	高血壓性 疾病	21	14.90	5.41	2.73
9	血管性及未 明示之癱 呆症	44	16.30	5.27	2.63	血管性及未 明示之癱 呆症	23	17.82	6.38	2.54	慢性下呼吸 道疾病	16	11.36	4.10	2.08
10	事故傷害	37	13.71	7.93	2.21	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	21	16.27	7.20	2.32	蓄意自我傷 害（自殺）	13	9.23	9.48	1.69
	其他	395	146.31	76.90	23.57	其他	198	153.41	86.83	21.85	其他	196	139.11	65.42	25.45
11	敗血症	25	9.26	4.96	1.49	敗血症	13	10.07	6.13	1.43	敗血症	12	8.52	3.76	1.56
12	蓄意自我傷 害（自殺）	25	9.26	8.15	1.49	慢性肝病及 肝硬化	13	10.07	5.55	1.43	事故傷害	12	8.52	5.49	1.56
13	慢性肝病及 肝硬化	24	8.89	4.43	1.43	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	12	9.30	4.65	1.32	慢性肝病及 肝硬化	11	7.81	3.31	1.43
14	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	21	7.78	3.65	1.25	帕金森病	12	9.30	4.33	1.32	骨骼肌肉系 統及結締 組織之疾 病	11	7.81	3.50	1.43
15	肇因於吸入 外物之肺 部病況（塵 肺症及肺 炎除外）	18	6.67	3.01	1.07	蓄意自我傷 害（自殺）	12	9.30	7.16	1.32	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	9	6.39	2.84	1.17

資料來源：衛生福利部。

附註：女性：肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為9人、6.39人，每十萬人口標準化死亡率為2.25人。

表29-9 · ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	778	650.90	336.34	100.00	所有死亡原因	453	776.56	438.99	100.00	所有死亡原因	325	531.10	251.16	100.00
1	惡性腫瘤	250	209.16	114.52	32.13	惡性腫瘤	153	262.28	150.52	33.77	惡性腫瘤	97	158.51	86.71	29.85
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	117	97.89	48.44	15.04	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	75	128.57	72.00	16.56	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	42	68.63	28.10	12.92
3	肺炎	69	57.73	25.55	8.87	肺炎	40	68.57	32.87	8.83	肺炎	29	47.39	19.86	8.92
4	腦血管疾病	49	40.99	20.76	6.30	腦血管疾病	34	58.29	31.27	7.51	糖尿病	15	24.51	10.25	4.62
5	糖尿病	29	24.26	11.25	3.73	慢性下呼吸道疾病	18	30.86	14.58	3.97	腦血管疾病	15	24.51	12.21	4.62
6	慢性下呼吸道疾病	28	23.43	9.85	3.60	糖尿病	14	24.00	12.51	3.09	血管性及未明示之癱 呆症	14	22.88	7.99	4.31
7	腎炎、腎病症候群及 腎病變	24	20.08	8.85	3.08	腎炎、腎病症候群及 腎病變	10	17.14	8.32	2.21	腎炎、腎病症候群及 腎病變	14	22.88	9.25	4.31
8	血管性及未明示之癱 呆症	20	16.73	6.37	2.57	蓄意自我傷害（自 殺）	9	15.43	19.34	1.99	慢性下呼吸道疾病	10	16.34	6.24	3.08
9	蓄意自我傷害（自 殺）	15	12.55	14.93	1.93	血管性及未明示之癱 呆症	6	10.29	4.32	1.32	事故傷害	7	11.44	5.98	2.15
10	事故傷害	12	10.04	5.54	1.54	慢性肝病及肝硬化	6	10.29	6.44	1.32	蓄意自我傷害（自 殺）	6	9.80	10.22	1.85
	其他	165	138.04	70.28	21.21	其他	88	150.86	86.81	19.43	其他	76	124.20	54.33	23.38
11	慢性肝病及肝硬化	11	9.20	4.91	1.41	敗血症	5	8.57	5.81	1.10	慢性肝病及肝硬化	5	8.17	3.53	1.54
12	高血壓性疾病	9	7.53	3.43	1.16	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	5	8.57	4.08	1.10	高血壓性疾病	4	6.54	2.11	1.23
13	敗血症	8	6.69	4.06	1.03	高血壓性疾病	5	8.57	5.05	1.10	敗血症	3	4.90	2.49	0.92
14	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	8	6.69	2.95	1.03	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	5	8.57	4.30	1.10	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	3	4.90	2.01	0.92
15	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	7	5.86	2.66	0.90	事故傷害	5	8.57	4.85	1.10	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	4.90	2.29	0.92

資料來源：衛生福利部。

表29-10·ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,424	501.13	291.39	100.00	所有死亡原因	768	567.14	366.85	100.00	所有死亡原因	656	441.03	232.39	100.00
1	惡性腫瘤	447	157.31	91.14	31.39	惡性腫瘤	237	175.01	107.41	30.86	惡性腫瘤	210	141.18	78.52	32.01
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	238	83.76	47.73	16.71	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	132	97.48	64.45	17.19	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	106	71.26	34.83	16.16
3	肺炎	110	38.71	19.98	7.72	肺炎	57	42.09	25.41	7.42	肺炎	53	35.63	15.75	8.08
4	腦血管疾病	92	32.38	18.50	6.46	腦血管疾病	52	38.40	24.82	6.77	腦血管疾病	40	26.89	13.39	6.10
5	糖尿病	50	17.60	9.81	3.51	蓄意自我傷害（自 殺）	33	24.37	18.77	4.30	糖尿病	34	22.86	11.45	5.18
6	蓄意自我傷害（自 殺）	45	15.84	12.00	3.16	事故傷害	29	21.42	16.80	3.78	腎炎、腎病症候群及 腎病變	16	10.76	4.99	2.44
7	事故傷害	42	14.78	10.71	2.95	慢性下呼吸道疾病	20	14.77	9.56	2.60	高血壓性疾病	13	8.74	3.86	1.98
8	腎炎、腎病症候群及 腎病變	33	11.61	6.11	2.32	高血壓性疾病	18	13.29	7.79	2.34	事故傷害	13	8.74	5.65	1.98
9	高血壓性疾病	31	10.91	5.76	2.18	腎炎、腎病症候群及 腎病變	17	12.55	8.03	2.21	蓄意自我傷害（自 殺）	12	8.07	6.48	1.83
10	慢性下呼吸道疾病	29	10.21	5.59	2.04	糖尿病	16	11.82	7.29	2.08	血管性及未明示之癡 呆症	9	6.05	3.04	1.37
	其他	307	108.04	64.07	21.56	其他	157	115.94	76.53	20.44	其他	150	100.85	54.42	22.87
11	血管性及未明示之癡 呆症	21	7.39	4.13	1.47	血管性及未明示之癡 呆症	12	8.86	5.91	1.56	慢性下呼吸道疾病	9	6.05	2.59	1.37
12	主動脈瘤及剝離	15	5.28	3.07	1.05	主動脈瘤及剝離	9	6.65	4.70	1.17	敗血症	7	4.71	2.59	1.07
13	敗血症	14	4.93	2.85	0.98	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	8	5.91	3.42	1.04	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	7	4.71	3.03	1.07
14	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	12	4.22	2.33	0.84	敗血症	7	5.17	3.06	0.91	主動脈瘤及剝離	6	4.03	2.00	0.91
15	慢性肝病及肝硬化	12	4.22	2.35	0.84	慢性肝病及肝硬化	7	5.17	3.15	0.91	帕金森病	5	3.36	1.50	0.76

資料來源：衛生福利部。

附 註：女性：慢性肝病及肝硬化及肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、3.36人，每十萬人口標準化死亡率為1.62人、2.02人。

表29-11·ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,832	652.06	289.20	100.00	所有死亡原因	1,006	743.60	362.81	100.00	所有死亡原因	826	567.05	228.76	100.00
1	惡性腫瘤	531	189.00	88.09	28.98	惡性腫瘤	289	213.62	105.57	28.73	惡性腫瘤	242	166.13	74.13	29.30
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	334	118.88	48.60	18.23	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	181	133.79	62.46	17.99	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	153	105.03	36.75	18.52
3	肺炎	166	59.08	20.21	9.06	肺炎	92	68.00	27.48	9.15	肺炎	74	50.80	14.66	8.96
4	腦血管疾病	105	37.37	16.28	5.73	腦血管疾病	64	47.31	23.10	6.36	糖尿病	44	30.21	11.16	5.33
5	糖尿病	87	30.97	12.93	4.75	糖尿病	43	31.78	14.98	4.27	腦血管疾病	41	28.15	10.66	4.96
6	腎炎、腎病症候群及 腎病變	65	23.14	8.68	3.55	慢性下呼吸道疾病	36	26.61	10.80	3.58	腎炎、腎病症候群及 腎病變	36	24.71	8.38	4.36
7	慢性下呼吸道疾病	47	16.73	6.37	2.57	腎炎、腎病症候群及 腎病變	29	21.44	8.88	2.88	高血壓性疾病	18	12.36	3.19	2.18
8	事故傷害	43	15.30	9.89	2.35	事故傷害	26	19.22	13.74	2.58	事故傷害	17	11.67	6.13	2.06
9	蓄意自我傷害（自 殺）	33	11.75	8.26	1.80	蓄意自我傷害（自 殺）	23	17.00	11.95	2.29	血管性及未明示之癡 呆症	14	9.61	2.85	1.69
10	敗血症	27	9.61	4.04	1.47	慢性肝病及肝硬化	20	14.78	8.73	1.99	帕金森病	11	7.55	2.08	1.33
	其他	394	140.24	65.84	21.51	其他	203	150.05	75.12	20.18	其他	176	120.82	58.77	21.31
11	高血壓性疾病	27	9.61	2.99	1.47	敗血症	18	13.30	6.02	1.79	慢性下呼吸道疾病	11	7.55	3.26	1.33
12	慢性肝病及肝硬化	26	9.25	5.04	1.42	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	12	8.87	3.56	1.19	蓄意自我傷害（自 殺）	10	6.86	5.06	1.21
13	血管性及未明示之癡 呆症	22	7.83	2.41	1.20	帕金森病	9	6.65	2.72	0.89	敗血症	9	6.18	2.37	1.09
14	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	21	7.47	2.76	1.15	高血壓性疾病	9	6.65	2.64	0.89	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	9	6.18	2.11	1.09
15	帕金森病	20	7.12	2.37	1.09	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	8	5.91	2.65	0.80	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	8	5.49	2.17	0.97

資料來源：衛生福利部。

附 註：男性：血管性及未明示之癡呆症及主動脈瘤及剝離死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、5.91人，每十萬人口標準化死亡率為1.84人、3.21人。

表29-12·ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因

中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有死亡原因	1,689	670.95	318.46	100.00	所有死亡原因	907	750.50	393.13	100.00	所有死亡原因	782	597.50	256.64	100.00
1	惡性腫瘤	513	203.79	101.13	30.37	惡性腫瘤	276	228.38	120.61	30.43	惡性腫瘤	237	181.08	86.01	30.31
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	265	105.27	48.29	15.69	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	142	117.50	62.39	15.66	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	123	93.98	36.16	15.73
3	肺炎	182	72.30	27.71	10.78	肺炎	99	81.92	34.54	10.92	肺炎	83	63.42	22.45	10.61
4	腦血管疾病	102	40.52	18.50	6.04	腦血管疾病	54	44.68	22.44	5.95	腦血管疾病	48	36.67	15.38	6.14
5	糖尿病	89	35.36	14.46	5.27	糖尿病	49	40.55	18.64	5.40	糖尿病	40	30.56	11.35	5.12
6	腎炎、腎病症候群及 腎病變	51	20.26	8.83	3.02	慢性下呼吸道疾病	33	27.31	11.84	3.64	高血壓性疾病	28	21.39	6.65	3.58
7	慢性下呼吸道疾病	49	19.47	7.85	2.90	腎炎、腎病症候群及 腎病變	24	19.86	9.95	2.65	腎炎、腎病症候群及 腎病變	27	20.63	7.90	3.45
8	高血壓性疾病	48	19.07	7.27	2.84	高血壓性疾病	20	16.55	7.98	2.21	慢性肝病及肝硬化	17	12.99	5.81	2.17
9	蓄意自我傷害（自 殺）	33	13.11	9.28	1.95	蓄意自我傷害（自 殺）	20	16.55	11.05	2.21	慢性下呼吸道疾病	16	12.22	4.57	2.05
10	慢性肝病及肝硬化	31	12.31	6.82	1.84	事故傷害	16	13.24	10.64	1.76	血管性及未明示之癱 呆症	15	11.46	3.49	1.92
	其他	326	129.50	68.32	19.30	其他	174	143.98	83.04	19.18	其他	148	113.08	56.86	18.93
11	血管性及未明示之癱 呆症	27	10.73	3.61	1.60	慢性肝病及肝硬化	14	11.58	7.74	1.54	蓄意自我傷害（自 殺）	13	9.93	7.92	1.66
12	事故傷害	21	8.34	6.03	1.24	血管性及未明示之癱 呆症	12	9.93	3.72	1.32	敗血症	11	8.40	4.24	1.41
13	敗血症	17	6.75	3.35	1.01	帕金森病	10	8.27	3.85	1.10	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	7	5.35	2.09	0.90
14	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	14	5.56	2.06	0.83	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	8	6.62	3.07	0.88	肇因於吸入外物之肺 部病況（塵肺症及肺 炎除外）	6	4.58	1.29	0.77
15	帕金森病	13	5.16	2.24	0.77	敗血症	6	4.96	2.37	0.66	皮膚及皮下組織疾病	6	4.58	1.38	0.77

資料來源：衛生福利部。

附註：男性：原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為6人、4.96人，每十萬人口標準化死亡率為2.42人。

表30-1·ICD-10 臺北市松山區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	27	13.35	100.00	18	19.04	100.00	9	8.35	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	10	4.94	37.04	9	9.52	50.00	1	0.93	11.11
W00-W19	跌倒(落)	8	3.96	29.63	5	5.29	27.78	3	2.78	33.33
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.48	11.11	3	3.17	16.67	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	6	2.97	22.22	1	1.06	5.56	5	4.64	55.56

資料來源：衛生福利部。

表30-2 · ICD-10 臺北市信義區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	37	17.00	100.00	23	22.25	100.00	14	12.25	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	13	5.97	35.14	8	7.74	34.78	5	4.38	35.71
W00-W19	跌倒(落)	8	3.68	21.62	5	4.84	21.74	3	2.63	21.43
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.92	5.41	-	-	-	2	1.75	14.29
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.46	2.70	1	0.97	4.35	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.92	5.41	2	1.93	8.70	-	-	-
	其他	11	5.05	29.73	7	6.77	30.43	4	3.50	28.57

資料來源：衛生福利部。

表30-3 · ICD-10 臺北市大安區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	44	14.42	100.00	29	20.42	100.00	15	9.20	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	9	2.95	20.45	5	3.52	17.24	4	2.45	26.67
W00-W19	跌倒(落)	9	2.95	20.45	7	4.93	24.14	2	1.23	13.33
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.66	4.55	2	1.41	6.90	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.66	4.55	-	-	-	2	1.23	13.33
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	0.98	6.82	1	0.70	3.45	2	1.23	13.33
	其他	19	6.23	43.18	14	9.86	48.28	5	3.07	33.33

資料來源：衛生福利部。

表30-4 · ICD-10 臺北市中山區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	23	10.19	100.00	13	12.42	100.00	10	8.27	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	7	3.10	30.43	3	2.87	23.08	4	3.31	40.00
W00-W19	跌倒(落)	8	3.55	34.78	7	6.69	53.85	1	0.83	10.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.44	4.35	-	-	-	1	0.83	10.00
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.89	8.70	1	0.96	7.69	1	0.83	10.00
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.89	8.70	1	0.96	7.69	1	0.83	10.00
	其他	3	1.33	13.04	1	0.96	7.69	2	1.65	20.00

資料來源：衛生福利部。

表30-5·ICD-10 臺北市中正區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	23	14.68	100.00	16	21.45	100.00	7	8.52	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	11	7.02	47.83	9	12.07	56.25	2	2.44	28.57
W00-W19	跌倒(落)	6	3.83	26.09	3	4.02	18.75	3	3.65	42.86
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	1.28	8.70	1	1.34	6.25	1	1.22	14.29
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.64	4.35	1	1.34	6.25	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	3	1.91	13.04	2	2.68	12.50	1	1.22	14.29

資料來源：衛生福利部。

表30-6·ICD-10 臺北市大同區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	20	16.01	100.00	14	23.10	100.00	6	9.32	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	6	4.80	30.00	3	4.95	21.43	3	4.66	50.00
W00-W19	跌倒(落)	7	5.60	35.00	5	8.25	35.71	2	3.11	33.33
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.80	5.00	1	1.65	7.14	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	1.60	10.00	2	3.30	14.29	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.60	10.00	2	3.30	14.29	-	-	-
	其他	2	1.60	10.00	1	1.65	7.14	1	1.55	16.67

資料來源：衛生福利部。

表30-7·ICD-10 臺北市萬華區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	38	20.53	100.00	24	26.49	100.00	14	14.82	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	15	8.10	39.47	8	8.83	33.33	7	7.41	50.00
W00-W19	跌倒(落)	9	4.86	23.68	6	6.62	25.00	3	3.18	21.43
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.54	2.63	1	1.10	4.17	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	1.08	5.26	1	1.10	4.17	1	1.06	7.14
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.08	5.26	2	2.21	8.33	-	-	-
	其他	9	4.86	23.68	6	6.62	25.00	3	3.18	21.43

資料來源：衛生福利部。

表30-8 · ICD-10 臺北市文山區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	37	13.71	100.00	25	19.37	100.00	12	8.52	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	9	3.33	24.32	4	3.10	16.00	5	3.55	41.67
W00-W19	跌倒(落)	10	3.70	27.03	7	5.42	28.00	3	2.13	25.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.74	5.41	2	1.55	8.00	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.37	2.70	1	0.77	4.00	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.11	8.11	2	1.55	8.00	1	0.71	8.33
	其他	12	4.44	32.43	9	6.97	36.00	3	2.13	25.00

資料來源：衛生福利部。

表30-9 · ICD-10 臺北市南港區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	12	10.04	100.00	5	8.57	100.00	7	11.44	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	4	3.35	33.33	-	-	-	4	6.54	57.14
W00-W19	跌倒(落)	4	3.35	33.33	2	3.43	40.00	2	3.27	28.57
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.84	8.33	-	-	-	1	1.63	14.29
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.84	8.33	1	1.71	20.00	-	-	-
	其他	2	1.67	16.67	2	3.43	40.00	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表30-10 · ICD-10 臺北市內湖區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	42	14.78	100.00	29	21.42	100.00	13	8.74	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	18	6.33	42.86	15	11.08	51.72	3	2.02	23.08
W00-W19	跌倒(落)	10	3.52	23.81	6	4.43	20.69	4	2.69	30.77
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	1.41	9.52	2	1.48	6.90	2	1.34	15.38
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.70	4.76	1	0.74	3.45	1	0.67	7.69
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.35	2.38	1	0.74	3.45	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.35	2.38	1	0.74	3.45	-	-	-
	其他	6	2.11	14.29	3	2.22	10.34	3	2.02	23.08

資料來源：衛生福利部。

表30-11 · ICD-10 臺北市士林區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	43	15.30	100.00	26	19.22	100.00	17	11.67	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	13	4.63	30.23	10	7.39	38.46	3	2.06	17.65
W00-W19	跌倒(落)	11	3.92	25.58	9	6.65	34.62	2	1.37	11.76
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.71	4.65	1	0.74	3.85	1	0.69	5.88
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.07	6.98	-	-	-	3	2.06	17.65
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.71	4.65	1	0.74	3.85	1	0.69	5.88
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	1.07	6.98	1	0.74	3.85	2	1.37	11.76
	其他	9	3.20	20.93	4	2.96	15.38	5	3.43	29.41

資料來源：衛生福利部。

表30-12 · ICD-10 臺北市北投區事故傷害死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡原因	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
V01- X59,Y85-Y86	事故傷害總計	21	8.34	100.00	16	13.24	100.00	5	3.82	100.00
V01-V99	運輸事故傷害	7	2.78	33.33	4	3.31	25.00	3	2.29	60.00
W00-W19	跌倒(落)	7	2.78	33.33	6	4.96	37.50	1	0.76	20.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.19	14.29	3	2.48	18.75	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	2	0.79	9.52	2	1.65	12.50	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	2	0.79	9.52	1	0.83	6.25	1	0.76	20.00

資料來源：衛生福利部。

表31-1 · ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	21	10.38	100.00	10	10.58	100.00	11	10.21	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.49	4.76	1	1.06	10.00	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	3.46	33.33	4	4.23	40.00	3	2.78	27.27
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.98	19.05	1	1.06	10.00	3	2.78	27.27
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.49	4.76	1	1.06	10.00	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	3.96	38.10	3	3.17	30.00	5	4.64	45.45
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-2 · ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	21	9.65	100.00	12	11.61	100.00	9	7.88	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.46	4.76	1	0.97	8.33	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.46	4.76	-	-	-	1	0.88	11.11
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	2.30	23.81	3	2.90	25.00	2	1.75	22.22
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.84	19.05	2	1.93	16.67	2	1.75	22.22
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.92	9.52	2	1.93	16.67	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	3.22	33.33	3	2.90	25.00	4	3.50	44.44
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.46	4.76	1	0.97	8.33	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-3 · ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	27	8.85	100.00	13	9.15	100.00	14	8.58	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.98	11.11	3	2.11	23.08	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.33	3.70	-	-	-	1	0.61	7.14
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	10	3.28	37.04	3	2.11	23.08	7	4.29	50.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.66	7.41	1	0.70	7.69	1	0.61	7.14
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.33	3.70	1	0.70	7.69	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.33	3.70	1	0.70	7.69	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	2.62	29.63	3	2.11	23.08	5	3.07	35.71
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.33	3.70	1	0.70	7.69	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-4 · ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	26	11.52	100.00	15	14.33	100.00	11	9.09	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	3.85	-	-	-	1	0.83	9.09
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.77	15.38	3	2.87	20.00	1	0.83	9.09
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	14	6.20	53.85	10	9.56	66.67	4	3.31	36.36
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.77	15.38	1	0.96	6.67	3	2.48	27.27
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	1.33	11.54	1	0.96	6.67	2	1.65	18.18
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-5 · ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	16	10.21	100.00	10	13.41	100.00	6	7.31	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	1.28	12.50	2	2.68	20.00	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	3.19	31.25	4	5.36	40.00	1	1.22	16.67
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.64	6.25	-	-	-	1	1.22	16.67
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	5.11	50.00	4	5.36	40.00	4	4.87	66.67
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-6 · ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	18	14.41	100.00	12	19.80	100.00	6	9.32	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	6	4.80	33.33	5	8.25	41.67	1	1.55	16.67
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	5	4.00	27.78	3	4.95	25.00	2	3.11	33.33
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	1.60	11.11	1	1.65	8.33	1	1.55	16.67
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.80	5.56	1	1.65	8.33	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.80	5.56	1	1.65	8.33	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	2.40	16.67	1	1.65	8.33	2	3.11	33.33
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-7 · ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	35	18.91	100.00	18	19.87	100.00	17	17.99	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.54	2.86	-	-	-	1	1.06	5.88
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	1.62	8.57	1	1.10	5.56	2	2.12	11.76
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	2.16	11.43	2	2.21	11.11	2	2.12	11.76
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.54	2.86	1	1.10	5.56	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	10	5.40	28.57	4	4.41	22.22	6	6.35	35.29
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	2.16	11.43	1	1.10	5.56	3	3.18	17.65
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	11	5.94	31.43	8	8.83	44.44	3	3.18	17.65
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.54	2.86	1	1.10	5.56	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-8 · ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	25	9.26	100.00	12	9.30	100.00	13	9.23	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.37	4.00	1	0.77	8.33	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.74	8.00	2	1.55	16.67	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.37	4.00	1	0.77	8.33	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	10	3.70	40.00	4	3.10	33.33	6	4.26	46.15
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.74	8.00	-	-	-	2	1.42	15.38
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.37	4.00	1	0.77	8.33	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	2.96	32.00	3	2.32	25.00	5	3.55	38.46
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-9 · ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	15	12.55	100.00	9	15.43	100.00	6	9.80	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.84	6.67	-	-	-	1	1.63	16.67
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	2.51	20.00	3	5.14	33.33	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	7	5.86	46.67	4	6.86	44.44	3	4.90	50.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	3.35	26.67	2	3.43	22.22	2	3.27	33.33
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-10 · ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	45	15.84	100.00	33	24.37	100.00	12	8.07	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.41	8.89	3	2.22	9.09	1	0.67	8.33
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.35	2.22	1	0.74	3.03	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.35	2.22	1	0.74	3.03	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	17	5.98	37.78	12	8.86	36.36	5	3.36	41.67
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.35	2.22	1	0.74	3.03	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.35	2.22	1	0.74	3.03	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.70	4.44	2	1.48	6.06	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	17	5.98	37.78	11	8.12	33.33	6	4.03	50.00
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.35	2.22	1	0.74	3.03	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-11 · ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	33	11.75	100.00	23	17.00	100.00	10	6.86	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	1.78	15.15	4	2.96	17.39	1	0.69	10.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.71	6.06	2	1.48	8.70	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	8	2.85	24.24	7	5.17	30.43	1	0.69	10.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	8	2.85	24.24	5	3.70	21.74	3	2.06	30.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.36	3.03	1	0.74	4.35	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	9	3.20	27.27	4	2.96	17.39	5	3.43	50.00
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表31-12 · ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死亡方式	總計			男性			女性		
		死亡人數	每十萬人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	百分比	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	百分比
X60-X84, Y87.0	自殺總計	33	13.11	100.00	20	16.55	100.00	13	9.93	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.79	6.06	1	0.83	5.00	1	0.76	7.69
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	1.59	12.12	3	2.48	15.00	1	0.76	7.69
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	1.19	9.09	2	1.65	10.00	1	0.76	7.69
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	11	4.37	33.33	9	7.45	45.00	2	1.53	15.38
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	4	1.59	12.12	3	2.48	15.00	1	0.76	7.69
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.40	3.03	1	0.83	5.00	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.40	3.03	-	-	-	1	0.76	7.69
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	2.78	21.21	1	0.83	5.00	6	4.58	46.15
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

表32-1·ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	394	194.80	88.03	100.00	所有癌症死亡原因	214	226.38	105.38	100.00	所有癌症死亡原因	180	167.10	74.22	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	74	36.59	17.48	18.78	氣管、支氣管和肺癌	38	40.20	20.35	17.76	氣管、支氣管和肺癌	36	33.42	15.29	20.00
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	31	28.78	13.38	7.87	肝和肝內膽管癌	32	33.85	16.40	14.95	女性乳房癌	31	28.78	13.38	17.22
3	結腸、直腸和肛門癌	49	24.23	9.89	12.44	結腸、直腸和肛門癌	25	26.45	10.99	11.68	結腸、直腸和肛門癌	24	22.28	8.96	13.33
4	肝和肝內膽管癌	45	22.25	9.74	11.42	胰臟癌	17	17.98	8.70	7.94	肝和肝內膽管癌	13	12.07	4.36	7.22
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	16	16.93	5.59	4.06	前列腺(攝護腺)癌	16	16.93	5.59	7.48	胃癌	12	11.14	4.99	6.67
6	胰臟癌	25	12.36	5.58	6.35	非何杰金氏淋巴瘤	15	15.87	7.75	7.01	卵巢癌	12	11.14	5.06	6.67
7	胃癌	24	11.87	4.86	6.09	胃癌	12	12.69	4.66	5.61	胰臟癌	8	7.43	3.13	4.44
8	卵巢癌 ⁽¹⁾	12	11.14	5.06	3.05	膀胱癌	10	10.58	4.19	4.67	膽囊和其他膽道癌	7	6.50	2.60	3.89
9	非何杰金氏淋巴瘤	19	9.39	4.26	4.82	白血病	7	7.40	4.25	3.27	白血病	7	6.50	2.49	3.89
10	白血病	14	6.92	3.29	3.55	口腔癌	5	5.29	3.34	2.34	子宮頸及部位未明示 子宮癌	4	3.71	2.35	2.22
	其他	85	42.03	20.25	21.57	其他	37	39.14	19.16	17.29	其他	26	24.14	11.62	14.44
11	膀胱癌	12	5.93	2.33	3.05	鼻咽癌	5	5.29	3.48	2.34	子宮體癌	4	3.71	2.25	2.22
12	膽囊和其他膽道癌	11	5.44	2.32	2.79	食道癌	5	5.29	2.58	2.34	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.71	1.46	2.22
13	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	4	3.71	2.35	1.02	膽囊和其他膽道癌	4	4.23	1.95	1.87	主唾液腺癌	2	1.86	1.52	1.11
14	子宮體癌 ⁽¹⁾	4	3.71	2.25	1.02	腎臟癌	4	4.23	2.05	1.87	腎臟癌	2	1.86	0.55	1.11
15	腎臟癌	6	2.97	1.21	1.52	喉癌	3	3.17	1.27	1.40	膀胱癌	2	1.86	0.87	1.11

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

表32-2 · ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	470	215.96	94.87	100.00	所有癌症死亡原因	268	259.21	119.69	100.00	所有癌症死亡原因	202	176.82	75.15	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	94	43.19	18.00	20.00	氣管、支氣管和肺癌	63	60.93	25.98	23.51	女性乳房癌	39	34.14	17.38	19.31
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	39	34.14	17.38	8.30	肝和肝內膽管癌	40	38.69	17.71	14.93	結腸、直腸和肛門癌	32	28.01	9.41	15.84
3	結腸、直腸和肛門癌	64	29.41	11.83	13.62	結腸、直腸和肛門癌	32	30.95	14.84	11.94	氣管、支氣管和肺癌	31	27.14	11.50	15.35
4	肝和肝內膽管癌	54	24.81	10.24	11.49	前列腺(攝護腺)癌	22	21.28	8.09	8.21	肝和肝內膽管癌	14	12.25	4.24	6.93
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	22	21.28	8.09	4.68	口腔癌	19	18.38	9.66	7.09	胰臟癌	11	9.63	4.38	5.45
6	胃癌	27	12.41	4.39	5.74	胃癌	19	18.38	7.27	7.09	子宮頸及部位未明示 子宮癌	9	7.88	3.77	4.46
7	胰臟癌	24	11.03	5.47	5.11	胰臟癌	13	12.57	6.64	4.85	胃癌	8	7.00	2.18	3.96
8	口腔癌	20	9.19	4.50	4.26	白血病	10	9.67	3.36	3.73	卵巢癌	8	7.00	3.37	3.96
9	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	9	7.88	3.77	1.91	食道癌	9	8.70	5.53	3.36	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.13	2.86	3.47
10	卵巢癌 ⁽¹⁾	8	7.00	3.37	1.70	膽囊和其他膽道癌	5	4.84	2.73	1.87	子宮體癌	5	4.38	1.93	2.48
	其他	109	50.08	23.60	23.19	其他	36	34.82	17.88	13.43	其他	38	33.26	14.14	18.81
11	白血病	15	6.89	2.45	3.19	腎臟癌	5	4.84	2.67	1.87	白血病	5	4.38	1.62	2.48
12	食道癌	11	5.05	2.98	2.34	腦癌	4	3.87	3.09	1.49	間皮和軟組織癌	4	3.50	1.54	1.98
13	非何杰金氏淋巴瘤	11	5.05	2.23	2.34	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.87	1.45	1.49	膀胱癌	3	2.63	1.09	1.49
14	子宮體癌 ⁽¹⁾	5	4.38	1.93	1.06	膀胱癌	3	2.90	1.45	1.12	食道癌	2	1.75	0.86	0.99
15	膽囊和其他膽道癌	7	3.22	1.60	1.49	喉癌	2	1.93	0.49	0.75	膽囊和其他膽道癌	2	1.75	0.76	0.99

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)女性：腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.75人，每十萬人口標準化死亡率分1.33人。

表32-3 · ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	546	178.94	74.43	100.00	所有癌症死亡原因	289	203.50	84.54	100.00	所有癌症死亡原因	257	157.55	66.87	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	93	30.48	12.34	17.03	氣管、支氣管和肺癌	51	35.91	16.34	17.65	氣管、支氣管和肺癌	42	25.75	9.18	16.34
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	39	23.91	12.26	7.14	肝和肝內膽管癌	43	30.28	12.62	14.88	女性乳房癌	39	23.91	12.26	15.18
3	結腸、直腸和肛門癌	72	23.60	9.09	13.19	結腸、直腸和肛門癌	36	25.35	9.69	12.46	結腸、直腸和肛門癌	36	22.07	8.72	14.01
4	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	32	22.53	8.11	5.86	前列腺(攝護腺)癌	32	22.53	8.11	11.07	卵巢癌	19	11.65	6.63	7.39
5	肝和肝內膽管癌	60	19.66	7.93	10.99	胰臟癌	17	11.97	6.03	5.88	胰臟癌	18	11.03	4.74	7.00
6	卵巢癌 ⁽¹⁾	19	11.65	6.63	3.48	非何杰金氏淋巴瘤	15	10.56	4.11	5.19	肝和肝內膽管癌	17	10.42	4.26	6.61
7	胰臟癌	35	11.47	5.30	6.41	胃癌	12	8.45	3.40	4.15	胃癌	12	7.36	2.73	4.67
8	非何杰金氏淋巴瘤	27	8.85	3.49	4.95	口腔癌	11	7.75	3.13	3.81	非何杰金氏淋巴瘤	12	7.36	3.13	4.67
9	胃癌	24	7.87	3.00	4.40	白血病	11	7.75	2.77	3.81	子宮體癌	11	6.74	3.44	4.28
10	子宮體癌 ⁽¹⁾	11	6.74	3.44	2.01	腎臟癌	9	6.34	2.62	3.11	子宮頸及部位未明示 子宮癌	5	3.07	0.96	1.95
	其他	134	43.91	17.30	24.54	其他	52	36.62	15.70	17.99	其他	46	28.20	10.82	17.90
11	白血病	15	4.92	1.90	2.75	膀胱癌	9	6.34	2.43	3.11	膀胱癌	5	3.07	0.78	1.95
12	膀胱癌	14	4.59	1.50	2.56	食道癌	7	4.93	1.79	2.42	腎臟癌	4	2.45	0.50	1.56
13	腎臟癌	13	4.26	1.44	2.38	腦癌	5	3.52	1.98	1.73	白血病	4	2.45	1.21	1.56
14	口腔癌	12	3.93	1.45	2.20	鼻咽癌	4	2.82	1.57	1.38	黑色素瘤和其他皮膚 癌	3	1.84	0.92	1.17
15	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	5	3.07	0.96	0.92	黑色素瘤和其他皮膚 癌	3	2.11	0.47	1.04	間皮和軟組織癌	3	1.84	1.14	1.17

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表32-4·ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	483	214.07	98.28	100.00	所有癌症死亡原因	253	241.77	118.13	100.00	所有癌症死亡原因	230	190.10	82.37	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	92	40.77	18.62	19.05	氣管、支氣管和肺癌	46	43.96	21.11	18.18	氣管、支氣管和肺癌	46	38.02	16.60	20.00
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	37	30.58	15.20	7.66	肝和肝內膽管癌	42	40.14	20.33	16.60	女性乳房癌	37	30.58	15.20	16.09
3	肝和肝內膽管癌	65	28.81	13.24	13.46	結腸、直腸和肛門癌	30	28.67	12.75	11.86	結腸、直腸和肛門癌	24	19.84	7.85	10.43
4	結腸、直腸和肛門癌	54	23.93	10.00	11.18	口腔癌	23	21.98	11.64	9.09	肝和肝內膽管癌	23	19.01	7.58	10.00
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	18	17.20	7.43	3.73	前列腺(攝護腺)癌	18	17.20	7.43	7.11	胰臟癌	15	12.40	5.00	6.52
6	胰臟癌	30	13.30	5.82	6.21	胃癌	17	16.25	6.80	6.72	卵巢癌	11	9.09	4.79	4.78
7	胃癌	26	11.52	4.87	5.38	胰臟癌	15	14.33	6.75	5.93	胃癌	9	7.44	3.50	3.91
8	口腔癌	24	10.64	5.31	4.97	食道癌	9	8.60	4.26	3.56	膀胱癌	7	5.79	2.00	3.04
9	卵巢癌	11	9.09	4.79	2.28	非何杰金氏淋巴瘤	9	8.60	4.33	3.56	子宮頸及部位未明示 子宮癌	6	4.96	2.06	2.61
10	非何杰金氏淋巴瘤	15	6.65	3.03	3.11	白血病	9	8.60	4.03	3.56	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.96	2.01	2.61
	其他	111	49.20	23.01	22.98	其他	35	33.45	18.71	13.83	其他	46	38.02	15.77	20.00
11	白血病	15	6.65	2.94	3.11	腦癌	8	7.64	5.79	3.16	白血病	6	4.96	2.04	2.61
12	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	6	4.96	2.06	1.24	鼻咽癌	6	5.73	2.79	2.37	子宮體癌	5	4.13	1.93	2.17
13	食道癌	11	4.88	2.28	2.28	腎臟癌	4	3.82	1.89	1.58	腎臟癌	3	2.48	0.94	1.30
14	腦癌	11	4.88	3.23	2.28	膽囊和其他膽道癌	2	1.91	1.04	0.79	腦癌	3	2.48	0.90	1.30
15	子宮體癌 ⁽¹⁾	5	4.13	1.93	1.04	間皮和軟組織癌	2	1.91	1.29	0.79	食道癌	2	1.65	0.74	0.87

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.91人，每十萬人口標準化死亡率分1.02人。

(4)女性：膽囊和其他膽道癌及胸腺癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.65人，每十萬人口標準化死亡率分0.57人、0.93人。

表32-5·ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	280	178.68	82.22	100.00	所有癌症死亡原因	155	207.80	98.43	100.00	所有癌症死亡原因	125	152.23	68.75	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	63	40.20	19.19	22.50	氣管、支氣管和肺癌	34	45.58	22.10	21.94	氣管、支氣管和肺癌	29	35.32	16.87	23.20
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	26	31.66	13.72	9.29	肝和肝內膽管癌	31	41.56	19.88	20.00	女性乳房癌	26	31.66	13.72	20.80
3	肝和肝內膽管癌	44	28.08	12.33	15.71	結腸、直腸和肛門癌	14	18.77	8.55	9.03	結腸、直腸和肛門癌	15	18.27	7.55	12.00
4	結腸、直腸和肛門癌	29	18.51	8.04	10.36	口腔癌	13	17.43	10.01	8.39	肝和肝內膽管癌	13	15.83	5.90	10.40
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	10	13.41	4.47	3.57	前列腺(攝護腺)癌	10	13.41	4.47	6.45	胃癌	6	7.31	5.30	4.80
6	胃癌	14	8.93	4.64	5.00	胃癌	8	10.73	4.21	5.16	胰臟癌	6	7.31	2.62	4.80
7	胰臟癌	14	8.93	3.39	5.00	胰臟癌	8	10.73	4.40	5.16	子宮頸及部位未明示 子宮癌	4	4.87	2.83	3.20
8	口腔癌	13	8.30	4.61	4.64	白血病	8	10.73	4.45	5.16	子宮體癌	3	3.65	1.76	2.40
9	白血病	9	5.74	2.35	3.21	食道癌	4	5.36	3.10	2.58	腎臟癌	3	3.65	0.98	2.40
10	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	4	4.87	2.83	1.43	喉癌	4	5.36	2.44	2.58	食道癌	2	2.44	0.93	1.60
	其他	54	34.46	16.69	19.29	其他	21	28.15	14.82	13.55	其他	18	21.92	10.29	14.40
11	食道癌	6	3.83	1.94	2.14	胸腺癌	4	5.36	2.80	2.58	甲狀腺癌	2	2.44	0.84	1.60
12	子宮體癌 ⁽¹⁾	3	3.65	1.76	1.07	腦癌	4	5.36	3.68	2.58	小腸癌	1	1.22	0.66	0.80
13	胸腺癌	5	3.19	1.58	1.79	腎臟癌	2	2.68	1.09	1.29	膽囊和其他膽道癌	1	1.22	0.56	0.80
14	腎臟癌	5	3.19	1.06	1.79	非何杰金氏淋巴瘤	2	2.68	0.98	1.29	胸腺癌	1	1.22	0.56	0.80
15	腦癌	5	3.19	2.11	1.79	鼻咽癌	1	1.34	0.73	0.65	間皮和軟組織癌	1	1.22	1.04	0.80

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：心臟、縱隔和胸(肋)膜癌、骨和關節軟骨癌及膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.34人，每十萬人口標準化死亡率分0.64人、1.26人及0.34人。

(4)女性：腦癌、白血病及非何杰金氏淋巴瘤之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.22人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.56人、0.66人及0.43人。

表32-6·ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	280	224.10	105.95	100.00	所有癌症死亡原因	160	264.03	133.62	100.00	所有癌症死亡原因	120	186.49	82.56	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	59	47.22	21.67	21.07	氣管、支氣管和肺癌	40	66.01	32.71	25.00	結腸、直腸和肛門癌	21	32.64	15.50	17.50
2	結腸、直腸和肛門癌	45	36.02	18.74	16.07	結腸、直腸和肛門癌	24	39.60	22.30	15.00	氣管、支氣管和肺癌	19	29.53	12.20	15.83
3	肝和肝內膽管癌	36	28.81	14.23	12.86	肝和肝內膽管癌	20	33.00	17.38	12.50	肝和肝內膽管癌	16	24.87	11.55	13.33
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	13	20.20	9.12	4.64	口腔癌	10	16.50	7.98	6.25	女性乳房癌	13	20.20	9.12	10.83
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	9	14.85	5.77	3.21	胃癌	10	16.50	8.57	6.25	胰臟癌	7	10.88	4.07	5.83
6	胰臟癌	15	12.01	5.06	5.36	前列腺(攝護腺)癌	9	14.85	5.77	5.63	卵巢癌	6	9.32	5.10	5.00
7	胃癌	14	11.20	5.23	5.00	食道癌	8	13.20	7.52	5.00	子宮體癌	5	7.77	3.98	4.17
8	卵巢癌 ⁽¹⁾	6	9.32	5.10	2.14	胰臟癌	8	13.20	6.14	5.00	胃癌	4	6.22	2.27	3.33
9	口腔癌	11	8.80	4.23	3.93	非何杰金氏淋巴瘤	7	11.55	5.52	4.38	腎臟癌	4	6.22	2.30	3.33
10	非何杰金氏淋巴瘤	10	8.00	3.58	3.57	膀胱癌	6	9.90	5.09	3.75	白血病	4	6.22	2.32	3.33
	其他	62	49.62	23.30	22.14	其他	18	29.70	14.64	11.25	其他	21	32.64	14.16	17.50
11	子宮體癌 ⁽¹⁾	5	7.77	3.98	1.79	膽囊和其他膽道癌	3	4.95	2.32	1.88	甲狀腺癌	3	4.66	2.32	2.50
12	食道癌	8	6.40	3.57	2.86	鼻咽癌	2	3.30	2.07	1.25	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.66	1.90	2.50
13	膀胱癌	7	5.60	2.54	2.50	喉癌	2	3.30	1.33	1.25	膽囊和其他膽道癌	2	3.11	1.28	1.67
14	腎臟癌	6	4.80	2.04	2.14	腎臟癌	2	3.30	1.77	1.25	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	3.11	1.20	1.67
15	膽囊和其他膽道癌	5	4.00	1.72	1.79	胸腺癌	1	1.65	0.84	0.63	口腔癌	1	1.55	1.15	0.83

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：白血病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.00人，每十萬人口標準化死亡率為1.66人。

(4)男性：白血病及甲狀腺癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.65人，每十萬人口標準化死亡率為0.88人、0.84人。

(5)女性：膀胱癌、喉癌、胸腺癌、小腸癌及間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.55人，每十萬人口標準化死亡率分別為0.37人、0.96人、0.50人、0.78人、0.78人。

表32-7·ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	486	262.59	114.25	100.00	所有癌症死亡原因	292	322.28	148.56	100.00	所有癌症死亡原因	194	205.34	86.37	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	98	52.95	21.79	20.16	氣管、支氣管和肺癌	58	64.01	28.02	19.86	氣管、支氣管和肺癌	40	42.34	16.68	20.62
2	結腸、直腸和肛門癌	70	37.82	16.48	14.40	肝和肝內膽管癌	50	55.19	26.99	17.12	結腸、直腸和肛門癌	28	29.64	12.65	14.43
3	肝和肝內膽管癌	67	36.20	15.83	13.79	結腸、直腸和肛門癌	42	46.36	21.34	14.38	女性乳房癌	26	27.52	13.07	13.40
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	26	27.52	13.07	5.35	口腔癌	20	22.07	12.73	6.85	肝和肝內膽管癌	17	17.99	6.39	8.76
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	19	20.97	7.51	3.91	前列腺(攝護腺)癌	19	20.97	7.51	6.51	胃癌	13	13.76	4.89	6.70
6	胃癌	29	15.67	6.18	5.97	食道癌	18	19.87	9.39	6.16	胰臟癌	10	10.58	3.89	5.15
7	口腔癌	22	11.89	6.68	4.53	胃癌	16	17.66	7.64	5.48	子宮體癌	6	6.35	2.97	3.09
8	胰臟癌	21	11.35	4.28	4.32	胰臟癌	11	12.14	4.80	3.77	膀胱癌	6	6.35	2.04	3.09
9	食道癌	19	10.27	4.56	3.91	非何杰金氏淋巴瘤	8	8.83	3.25	2.74	非何杰金氏淋巴瘤	6	6.35	2.76	3.09
10	非何杰金氏淋巴瘤	14	7.56	2.96	2.88	間皮和軟組織癌	5	5.52	2.57	1.71	子宮頸及部位未明示 子宮癌	5	5.29	2.57	2.58
	其他	101	54.57	25.28	20.78	其他	45	49.67	24.33	15.41	其他	37	39.16	18.47	19.07
11	子宮體癌 ⁽¹⁾	6	6.35	2.97	1.23	腦癌	5	5.52	3.46	1.71	卵巢癌	5	5.29	2.91	2.58
12	白血病	10	5.40	2.41	2.06	白血病	5	5.52	2.98	1.71	白血病	5	5.29	1.92	2.58
13	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	5	5.29	2.57	1.03	腎臟癌	4	4.41	2.08	1.37	鼻咽癌	3	3.18	1.54	1.55
14	卵巢癌 ⁽¹⁾	5	5.29	2.91	1.03	鼻咽癌	3	3.31	1.61	1.03	膽囊和其他膽道癌	3	3.18	1.12	1.55
15	膀胱癌	9	4.86	1.72	1.85	膽囊和其他膽道癌	3	3.31	1.58	1.03	口腔癌	2	2.12	1.21	1.03

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：膀胱癌及黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、3.31人，每十萬人口標準化死亡率分別為1.30人、2.17人。

(4)女性：間皮和軟組織癌、腦癌及黑色素瘤和其他皮膚癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、2.12人，每十萬人口標準化死亡率為1.34人、1.21人、0.85人。

表32-8·ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	466	172.61	87.24	100.00	所有癌症死亡原因	251	194.47	105.92	100.00	所有癌症死亡原因	215	152.59	73.03	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	99	36.67	18.58	21.24	氣管、支氣管和肺癌	53	41.06	22.96	21.12	氣管、支氣管和肺癌	46	32.65	15.47	21.40
2	結腸、直腸和肛門癌	72	26.67	13.68	15.45	結腸、直腸和肛門癌	32	24.79	13.74	12.75	結腸、直腸和肛門癌	40	28.39	13.45	18.60
3	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	25	19.37	9.66	5.36	肝和肝內膽管癌	30	23.24	13.67	11.95	女性乳房癌	25	17.74	8.83	11.63
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	25	17.74	8.83	5.36	前列腺(攝護腺)癌	25	19.37	9.66	9.96	肝和肝內膽管癌	17	12.07	5.11	7.91
5	肝和肝內膽管癌	47	17.41	8.96	10.09	胃癌	19	14.72	7.00	7.57	胰臟癌	17	12.07	5.53	7.91
6	胰臟癌	33	12.22	6.29	7.08	胰臟癌	16	12.40	7.13	6.37	胃癌	12	8.52	3.87	5.58
7	胃癌	31	11.48	5.21	6.65	食道癌	14	10.85	5.45	5.58	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.68	2.35	3.72
8	食道癌	14	5.19	2.53	3.00	口腔癌	8	6.20	3.62	3.19	卵巢癌	7	4.97	2.44	3.26
9	非何杰金氏淋巴瘤	14	5.19	2.39	3.00	白血病	8	6.20	4.02	3.19	白血病	6	4.26	3.15	2.79
10	白血病	14	5.19	3.50	3.00	腎臟癌	7	5.42	2.47	2.79	膽囊和其他膽道癌	5	3.55	1.35	2.33
	其他	92	34.08	17.15	19.74	其他	39	30.22	16.21	15.54	其他	32	22.71	11.48	14.88
11	卵巢癌 ⁽¹⁾	7	4.97	2.44	1.50	膀胱癌	6	4.65	2.48	2.39	子宮頸及部位未明示 子宮癌	5	3.55	1.62	2.33
12	腎臟癌	10	3.70	1.57	2.15	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.65	2.46	2.39	子宮體癌	3	2.13	1.02	1.40
13	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	5	3.55	1.62	1.07	腦癌	4	3.10	1.66	1.59	腎臟癌	3	2.13	0.89	1.40
14	口腔癌	9	3.33	1.97	1.93	喉癌	3	2.32	1.57	1.20	腦癌	3	2.13	1.98	1.40
15	膀胱癌	8	2.96	1.41	1.72	主唾液腺癌	2	1.55	0.74	0.80	膀胱癌	2	1.42	0.49	0.93

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：鼻咽癌及骨和關節軟骨癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.55人，每十萬人口標準化死亡率為0.96人、1.05人。

表32-9 · ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	250	209.16	114.52	100.00	所有癌症死亡原因	153	262.28	150.52	100.00	所有癌症死亡原因	97	158.51	86.71	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	52	43.50	22.12	20.80	氣管、支氣管和肺癌	32	54.86	29.70	20.92	氣管、支氣管和肺癌	20	32.68	16.24	20.62
2	肝和肝內膽管癌	39	32.63	17.64	15.60	肝和肝內膽管癌	27	46.29	26.48	17.65	女性乳房癌	13	21.24	14.13	13.40
3	結腸、直腸和肛門癌	28	23.43	11.96	11.20	結腸、直腸和肛門癌	19	32.57	18.23	12.42	肝和肝內膽管癌	12	19.61	10.13	12.37
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	13	21.24	14.13	5.20	胰臟癌	14	24.00	14.14	9.15	結腸、直腸和肛門癌	9	14.71	7.44	9.28
5	胰臟癌	19	15.90	8.25	7.60	前列腺(攝護腺)癌	8	13.71	7.42	5.23	間皮和軟組織癌	6	9.80	8.55	6.19
6	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	8	13.71	7.42	3.20	口腔癌	7	12.00	7.43	4.58	胰臟癌	5	8.17	3.34	5.15
7	胃癌	11	9.20	5.28	4.40	胃癌	7	12.00	7.22	4.58	胃癌	4	6.54	3.54	4.12
8	非何杰金氏淋巴瘤	10	8.37	4.55	4.00	非何杰金氏淋巴瘤	6	10.29	5.90	3.92	非何杰金氏淋巴瘤	4	6.54	3.39	4.12
9	口腔癌	9	7.53	4.12	3.60	食道癌	5	8.57	4.89	3.27	子宮頸及部位未明示 子宮癌	3	4.90	2.49	3.09
10	間皮和軟組織癌	7	5.86	4.74	2.80	腦癌	4	6.86	4.40	2.61	卵巢癌	3	4.90	4.69	3.09
	其他	54	45.18	25.22	21.60	其他	24	41.14	24.73	15.69	其他	18	29.41	12.80	18.56
11	食道癌	6	5.02	2.75	2.40	膽囊和其他膽道癌	3	5.14	2.97	1.96	口腔癌	2	3.27	1.29	2.06
12	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	3	4.90	2.49	1.20	膀胱癌	3	5.14	2.97	1.96	膽囊和其他膽道癌	2	3.27	1.36	2.06
13	卵巢癌 ⁽¹⁾	3	4.90	4.69	1.20	白血病	3	5.14	2.19	1.96	膀胱癌	2	3.27	1.37	2.06
14	膽囊和其他膽道癌	5	4.18	2.15	2.00	腎臟癌	2	3.43	1.98	1.31	甲狀腺癌	2	3.27	1.21	2.06
15	膀胱癌	5	4.18	2.07	2.00	喉癌	1	1.71	1.06	0.65	白血病	2	3.27	1.48	2.06

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：白血病之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為5人、4.18人，每十萬人口標準化死亡率為1.86人。

(4)男性：黑色素瘤和其他皮膚癌、男性生殖器官癌(攝護腺除外)、間皮和軟組織癌、甲狀腺癌及胸腺癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為1人、1.71人，每十萬人口標準化死亡率為1.88人、1.04人、0.87人、0.94人、1.23人。

表32-10 · ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死 亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死 亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死 亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有癌症死亡原因	447	157.31	91.14	100.00	所有癌症死亡原因	237	175.01	107.41	100.00	所有癌症死亡原因	210	141.18	78.52	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	85	29.91	16.68	19.02	氣管、支氣管和肺癌	50	36.92	21.50	21.10	女性乳房癌	40	26.89	15.34	19.05
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	40	26.89	15.34	8.95	肝和肝內膽管癌	41	30.28	19.37	17.30	氣管、支氣管和肺癌	35	23.53	12.68	16.67
3	肝和肝內膽管癌	55	19.36	11.37	12.30	結腸、直腸和肛門癌	25	18.46	10.71	10.55	結腸、直腸和肛門癌	24	16.14	8.95	11.43
4	結腸、直腸和肛門癌	49	17.24	9.71	10.96	口腔癌	19	14.03	8.57	8.02	肝和肝內膽管癌	14	9.41	5.22	6.67
5	胰臟癌	29	10.21	6.39	6.49	胰臟癌	15	11.08	7.40	6.33	胰臟癌	14	9.41	5.42	6.67
6	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	10	7.38	4.43	2.24	胃癌	11	8.12	5.09	4.64	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	6.72	3.98	4.76
7	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	10	6.72	3.98	2.24	前列腺(攝護腺)癌	10	7.38	4.43	4.22	卵巢癌	9	6.05	3.51	4.29
8	口腔癌	19	6.69	3.94	4.25	食道癌	8	5.91	3.65	3.38	白血病	9	6.05	3.32	4.29
9	胃癌	19	6.69	3.45	4.25	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.91	4.20	3.38	胃癌	8	5.38	2.55	3.81
10	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	6.05	3.51	2.01	膀胱癌	6	4.43	2.64	2.53	膀胱癌	7	4.71	2.54	3.33
	其他	122	42.93	24.95	27.29	其他	44	32.49	19.83	18.57	其他	40	26.89	15.02	19.05
11	非何杰金氏淋巴瘤	15	5.28	3.40	3.36	白血病	6	4.43	2.77	2.53	非何杰金氏淋巴瘤	7	4.71	2.62	3.33
12	白血病	15	5.28	3.13	3.36	膽囊和其他膽道癌	4	2.95	1.86	1.69	膽囊和其他膽道癌	6	4.03	2.26	2.86
13	膀胱癌	13	4.57	2.56	2.91	鼻咽癌	3	2.22	1.47	1.27	子宮體癌	5	3.36	1.78	2.38
14	膽囊和其他膽道癌	10	3.52	2.03	2.24	小腸癌	3	2.22	1.30	1.27	腦癌	4	2.69	2.00	1.90
15	子宮體癌 ⁽¹⁾	5	3.36	1.78	1.12	間皮和軟組織癌	3	2.22	1.07	1.27	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	1.34	0.87	0.95

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：腦癌及腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.22人，每十萬人口標準化死亡率為1.34人、1.53人。

(4)女性：腎臟癌及間皮和軟組織癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.34人，每十萬人口標準化死亡率為0.63人、0.86人。

表32-11 · ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	531	189.00	88.09	100.00	所有癌症死亡原因	289	213.62	105.57	100.00	所有癌症死亡原因	242	166.13	74.13	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	116	41.29	18.56	21.85	氣管、支氣管和肺癌	69	51.00	25.00	23.88	氣管、支氣管和肺癌	47	32.27	13.40	19.42
2	女性乳房癌 ⁽¹⁾	38	26.09	12.66	7.16	肝和肝內膽管癌	44	32.52	15.10	15.22	女性乳房癌	38	26.09	12.66	15.70
3	肝和肝內膽管癌	70	24.92	10.89	13.18	結腸、直腸和肛門癌	42	31.04	14.67	14.53	結腸、直腸和肛門癌	27	18.54	7.74	11.16
4	結腸、直腸和肛門癌	69	24.56	10.84	12.99	胃癌	17	12.57	5.90	5.88	肝和肝內膽管癌	26	17.85	7.38	10.74
5	胰臟癌	39	13.88	6.64	7.34	胰臟癌	17	12.57	6.33	5.88	胰臟癌	22	15.10	6.92	9.09
6	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	15	11.09	4.05	2.82	口腔癌	16	11.83	6.89	5.54	非何杰金氏淋巴瘤	12	8.24	3.23	4.96
7	胃癌	27	9.61	4.45	5.08	前列腺(攝護腺)癌	15	11.09	4.05	5.19	卵巢癌	11	7.55	4.33	4.55
8	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	7.55	4.33	2.07	食道癌	10	7.39	4.47	3.46	胃癌	10	6.86	3.35	4.13
9	口腔癌	19	6.76	3.62	3.58	膀胱癌	9	6.65	3.04	3.11	子宮頸及部位未明示 子宮癌	7	4.81	2.68	2.89
10	非何杰金氏淋巴瘤	17	6.05	2.47	3.20	白血病	6	4.43	2.22	2.08	白血病	5	3.43	1.11	2.07
	其他	110	39.15	19.72	20.72	其他	44	32.52	17.89	15.22	其他	37	25.40	11.33	15.29
11	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	7	4.81	2.68	1.32	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.70	1.59	1.73	膽囊和其他膽道癌	4	2.75	0.91	1.65
12	食道癌	12	4.27	2.54	2.26	鼻咽癌	4	2.96	1.71	1.38	口腔癌	3	2.06	0.80	1.24
13	膀胱癌	12	4.27	1.87	2.26	膽囊和其他膽道癌	4	2.96	1.57	1.38	間皮和軟組織癌	3	2.06	1.21	1.24
14	白血病	11	3.92	1.64	2.07	喉癌	4	2.96	1.32	1.38	子宮體癌	3	2.06	0.91	1.24
15	膽囊和其他膽道癌	8	2.85	1.26	1.51	腎臟癌	3	2.22	1.05	1.04	膀胱癌	3	2.06	1.00	1.24

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)男性：腦癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為3人、2.22人，每十萬人口標準化死亡率為2.52人。

表32-12 · ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因
中華民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計					男 性					女 性				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死 亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
	所有癌症死亡原因	513	203.79	101.13	100.00	所有癌症死亡原因	276	228.38	120.61	100.00	所有癌症死亡原因	237	181.08	86.01	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	101	40.12	19.34	19.69	氣管、支氣管和肺癌	59	48.82	26.05	21.38	氣管、支氣管和肺癌	42	32.09	13.75	17.72
2	結腸、直腸和肛門癌	66	26.22	11.74	12.87	肝和肝內膽管癌	38	31.44	16.12	13.77	結腸、直腸和肛門癌	33	25.21	10.62	13.92
3	肝和肝內膽管癌	64	25.42	12.35	12.48	結腸、直腸和肛門癌	33	27.31	13.33	11.96	女性乳房癌	27	20.63	11.48	11.39
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	27	20.63	11.48	5.26	胰臟癌	23	19.03	9.81	8.33	肝和肝內膽管癌	26	19.87	9.25	10.97
5	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	23	19.03	8.79	4.48	前列腺(攝護腺)癌	23	19.03	8.79	8.33	胃癌	19	14.52	6.52	8.02
6	胰臟癌	40	15.89	7.46	7.80	口腔癌	21	17.38	10.34	7.61	胰臟癌	17	12.99	5.52	7.17
7	胃癌	31	12.31	5.62	6.04	胃癌	12	9.93	4.82	4.35	卵巢癌	15	11.46	7.05	6.33
8	卵巢癌 ⁽¹⁾	15	11.46	7.05	2.92	食道癌	11	9.10	5.01	3.99	子宮頸及部位未明示 子宮癌	8	6.11	3.24	3.38
9	口腔癌	21	8.34	4.75	4.09	非何杰金氏淋巴瘤	9	7.45	3.50	3.26	子宮體癌	5	3.82	1.81	2.11
10	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	8	6.11	3.24	1.56	白血病	8	6.62	3.57	2.90	白血病	5	3.82	1.41	2.11
	其他	117	46.48	24.33	22.81	其他	39	32.27	19.28	14.13	其他	40	30.56	15.36	16.88
11	食道癌	13	5.16	2.88	2.53	鼻咽癌	5	4.14	2.49	1.81	膀胱癌	4	3.06	1.08	1.69
12	非何杰金氏淋巴瘤	13	5.16	2.47	2.53	膀胱癌	4	3.31	1.94	1.45	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.06	1.69	1.69
13	白血病	13	5.16	2.44	2.53	腦癌	4	3.31	2.05	1.45	鼻咽癌	3	2.29	1.14	1.27
14	子宮體癌 ⁽¹⁾	5	3.82	1.81	0.97	喉癌	3	2.48	1.22	1.09	腦癌	3	2.29	1.56	1.27
15	鼻咽癌	8	3.18	1.76	1.56	黑色素瘤和其他皮膚 癌	3	2.48	1.63	1.09	食道癌	2	1.53	1.11	0.84

資料來源：衛生福利部。

附 註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)總計：膀胱癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為8人、3.18人，每十萬人口標準化死亡率為1.42人。

(4)女性：膽囊和其他膽道癌、甲狀腺癌、鼻腔、中耳和副鼻竇癌、骨和關節軟骨癌及腎臟癌之死亡人數、每十萬人口死亡率亦為2人、1.53人，每十萬人口標準化死亡率為0.74人、0.58人、1.01人、0.92人、0.74人。

表33·臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		11,551	437.00	473.41		13,733	523.20	392.14		14,339	547.41	392.62		13,875	528.71	364.83		14,486	550.64	363.48
08-14	惡性腫瘤	1	3,180	120.31	126.30	1	4,202	160.09	122.12	1	4,290	163.78	120.21	1	4,423	168.54	118.90	1	4,566	173.56	118.18
25-27-28*	心臟疾病	3	1,257	47.56	52.39	2	1,732	65.99	46.85	2	1,665	63.56	42.87	2	1,527	58.19	38.38	2	1,642	62.42	39.41
29	腦血管疾病	2	1,306	49.41	53.45	3	1,240	47.24	33.77	3	1,367	52.19	35.74	3	1,182	45.04	29.23	3	1,289	49.00	30.31
181	糖尿病	5	620	23.46	25.12	4	893	34.02	24.96	4	988	37.72	26.19	4	946	36.05	23.79	4	958	36.42	23.27
321	肺炎	7	372	14.07	16.31	7	447	17.03	11.49	5	572	21.84	13.82	5	575	21.91	13.32	5	688	26.15	14.96
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	358	13.54	14.96	5	503	19.16	13.77	6	544	20.77	13.94	6	485	18.48	12.19	6	549	20.87	12.78
E47-E53	事故傷害	4	752	28.45	28.41	6	463	17.64	15.78	8	415	15.84	14.03	8	379	14.44	12.68	7	372	14.14	11.97
E54	自殺	10	206	7.79	7.56	8	346	13.18	10.93	7	467	17.83	14.79	7	454	17.30	14.12	8	364	13.84	11.27
347	慢性肝病及肝硬化	6	380	14.38	14.81	9	333	12.69	9.96	9	323	12.33	9.20	9	317	12.08	8.86	9	331	12.58	8.92
038	敗血症	13	96	3.63	4.04	12	94	3.58	2.52	11	150	5.73	3.78	11	145	5.53	3.48	10	188	7.15	4.07
26	高血壓性疾病	9	292	11.05	12.14	10	167	6.36	4.43	10	162	6.18	4.14	10	176	6.71	4.30	11	141	5.36	3.17
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	190	7.19	7.76	11	113	4.31	2.92	12	109	4.16	2.79	12	92	3.51	2.26	12	97	3.69	2.23
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	76	2.88	3.05	14	70	2.67	1.89	13	77	2.94	2.06	13	79	3.01	1.89	13	80	3.04	1.87
02	結核病	15	80	3.03	3.20	13	74	2.82	2.01	14	60	2.29	1.62	14	68	2.59	1.63	14	57	2.17	1.32
44	先天性畸形	12	99	3.75	5.51	15	48	1.83	3.32	16	39	1.49	2.66	15	42	1.60	2.92	15	48	1.82	3.51
	其他		2,287	86.52	98.40		3,008	114.60	85.42		3,111	118.77	84.77		2,985	113.74	76.88		3,116	118.45	76.24

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表33·臺北市歷年主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		15,119	575.72	366.18		16,397	615.94	344.34		16,100	600.78	326.27		16,951	629.12	332.35		17,160	634.72	325.57
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10	112.87	1	4,981	187.11	111.52	1	4,919	183.55	106.98	1	4,902	181.93	103.64	1	5,025	185.87	102.84
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2,014	76.69	46.14	2	2,028	76.18	40.21	2	2,075	77.43	39.81	2	2,489	92.38	46.23	2	2,381	88.07	42.60
J12-J18	肺炎	4	950	36.18	20.14	4	905	34.00	15.54	4	883	32.95	14.46	4	1,060	39.34	17.10	4	1,125	41.61	17.37
I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66	27.26	3	1,186	44.55	22.94	3	1,210	45.15	22.34	3	1,212	44.98	22.40	3	1,153	42.65	20.08
E10-E14	糖尿病	5	716	27.26	16.89	5	817	30.69	16.63	5	860	32.09	16.84	5	855	31.73	16.17	5	773	28.59	13.87
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	491	18.70	11.20	9	531	19.95	10.62	8	488	18.21	9.13	7	556	20.64	9.89	7	565	20.90	9.68
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98	9.27	6	591	22.20	10.31	6	573	21.38	9.73	6	656	24.35	10.22	6	636	23.52	9.54
I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24	8.21	8	536	20.13	9.74	7	493	18.40	8.66	8	461	17.11	7.55	8	463	17.13	7.65
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	389	14.81	11.94	10	430	16.15	11.31	10	406	15.15	10.47	9	458	17.00	11.23	10	435	16.09	11.05
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	370	14.09	11.40	11	333	12.51	9.82	12	261	9.74	7.40	11	311	11.54	9.06	11	318	11.76	8.72
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	17	69	2.63	1.29	15	129	4.85	1.94	15	142	5.30	2.11	14	198	7.35	2.78	12	299	11.06	3.97
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27	7.69	12	286	10.74	6.77	11	310	11.57	6.99	13	284	10.54	6.29	14	278	10.28	5.96
A40-A41	敗血症	6	513	19.53	11.27	7	559	21.00	10.47	9	466	17.39	8.18	10	445	16.52	7.62	9	462	17.09	7.49
J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	16	76	2.89	1.59	17	108	4.06	1.83	18	94	3.51	1.53	18	86	3.19	1.42	17	111	4.11	1.61
G20-G21	帕金森病	15	93	3.54	1.88	14	158	5.94	2.92	14	155	5.78	2.71	15	135	5.01	2.23	15	180	6.66	2.95
	其他		2,656	101.14	67.13		2,819	105.89	61.79		2,765	103.18	58.91		2,843	105.51	58.54		2,956	109.34	60.20

表33·臺北市歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		18,039	668.05	332.75		17,634	655.67	316.47		18,050	674.54	317.59		18,024	678.41	309.90		17,196	655.40	289.57
C00-C97	惡性腫瘤	1	5,219	193.28	105.00	1	5,062	188.21	98.69	1	5,238	195.75	100.48	1	5,326	200.47	99.46	1	5,146	196.13	92.94
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,631	97.44	45.78	2	2,750	102.25	45.83	2	3,000	112.11	47.98	2	2,793	105.13	44.13	2	2,809	107.06	44.40
J12-J18	肺炎	3	1,274	47.18	19.36	3	1,423	52.91	20.75	3	1,619	60.50	22.32	3	1,981	74.56	26.91	3	1,571	59.88	21.44
I60-I69	腦血管疾病	4	1,206	44.66	20.76	4	1,197	44.51	20.28	4	1,152	43.05	18.57	4	1,146	43.13	18.55	4	1,037	39.52	16.72
E10-E14	糖尿病	5	829	30.70	14.50	5	728	27.07	12.43	5	692	25.86	11.34	5	721	27.14	11.64	5	734	27.98	11.51
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	611	22.63	10.24	6	592	22.01	9.55	6	621	23.21	9.73	6	519	19.53	7.83	6	503	19.17	7.41
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	626	23.18	9.64	7	590	21.94	8.54	7	514	19.21	7.38	7	505	19.01	7.01	7	457	17.42	6.29
I10-I15	高血壓性疾病	10	386	14.29	6.37	10	369	13.72	5.80	10	386	14.42	5.97	10	339	12.76	4.90	8	414	15.78	5.85
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	457	16.92	11.14	9	443	16.47	11.09	8	455	17.00	10.85	8	387	14.57	9.90	9	367	13.99	8.39
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13	308	11.41	8.38	11	317	11.79	8.89	11	349	13.04	9.84	10	339	12.76	10.05	10	315	12.01	9.14
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	11	344	12.74	4.40	12	310	11.53	3.88	13	169	6.32	2.10	12	297	11.18	3.56	11	309	11.78	3.61
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	279	10.33	5.97	13	269	10.00	5.58	12	238	8.89	4.97	13	240	9.03	4.99	12	232	8.84	4.47
A40-A41	敗血症	8	529	19.59	8.15	8	463	17.22	7.20	9	449	16.78	7.00	9	348	13.10	5.11	13	213	8.12	3.47
J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	17	103	3.81	1.50	18	89	3.31	1.21	18	95	3.55	1.31	18	66	2.48	0.89	14	163	6.21	2.36
G20-G21	帕金森病	15	206	7.63	3.29	15	189	7.03	2.87	14	147	5.49	2.15	14	182	6.85	2.66	15	161	6.14	2.34
	其他		3,031	112.25	58.29		2,843	105.71	53.87		2,926	109.35	55.60		2,835	106.71	52.32		2,765	105.38	49.21

表34·臺北市歷年男性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
01-56	所有死亡原因		7,172	541.89	552.47		8,352	647.93	474.26		8,763	683.06	480.28		8,387	654.67	445.74		8,633	674.39	445.81
08-14	惡性腫瘤	1	1,977	149.38	148.48	1	2,594	201.24	149.63	1	2,630	205.00	148.15	1	2,695	210.37	146.09	1	2,757	215.37	146.53
25-27-28*	心臟疾病	3	791	59.77	61.02	2	1,107	85.88	59.64	2	1,060	82.62	54.25	2	971	75.79	49.62	2	1,026	80.15	51.54
29	腦血管疾病	2	800	60.45	60.80	3	725	56.24	39.19	3	822	64.07	43.39	3	680	53.08	34.17	3	768	59.99	37.36
181	糖尿病	5	328	24.78	25.13	4	440	34.13	24.46	4	521	40.61	27.75	4	473	36.92	24.11	4	495	38.67	25.11
321	肺炎	7	245	18.51	20.24	6	300	23.27	14.96	5	370	28.84	17.20	5	373	29.12	17.22	5	446	34.84	19.16
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	185	13.98	14.57	7	278	21.57	14.97	6	324	25.26	16.55	8	261	20.37	13.06	6	272	21.25	12.61
E47-E53	事故傷害	4	535	40.42	39.71	5	342	26.53	23.74	8	312	24.32	21.46	7	281	21.93	19.32	7	265	20.70	17.90
E54	自殺	11	123	9.29	8.97	8	225	17.46	14.81	7	313	24.40	20.52	6	309	24.12	20.00	8	228	17.81	14.72
347	慢性肝病及肝硬化	6	273	20.63	20.35	9	222	17.22	13.87	9	192	14.97	11.51	9	210	16.39	12.38	9	222	17.34	12.80
038	敗血症	14	50	3.78	3.89	13	54	4.19	2.83	11	73	5.69	3.62	11	73	5.70	3.34	10	82	6.41	3.70
26	高血壓性疾病	9	167	12.62	12.56	10	82	6.36	4.29	10	106	8.26	5.49	10	94	7.34	4.78	11	69	5.39	3.04
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	131	9.90	10.03	11	73	5.66	3.64	12	71	5.53	3.57	12	58	4.53	2.83	12	61	4.77	2.83
02	胃及十二指腸之潰瘍	13	58	4.38	4.31	14	43	3.34	2.25	13	52	4.05	2.78	14	43	3.36	2.06	13	48	3.75	2.30
02	結核病	12	71	5.36	5.31	12	59	4.58	3.14	14	50	3.90	2.70	13	53	4.14	2.46	14	40	3.12	1.84
44	先天性畸形	16	48	3.63	5.11	16	25	1.94	3.25	17	17	1.33	2.20	16	16	1.25	2.40	15	23	1.80	3.55
	其他		1,390	105.02	111.99		1,783	138.32	99.59		1,850	144.20	99.15		1,797	140.27	91.90		1,831	143.03	90.82

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表34·臺北市歷年男性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		8,992	705.67	449.24		9,628	751.69	429.77		9,436	732.81	409.56		9,907	766.33	422.54		9,932	766.62	414.33
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,698	211.73	140.18	1	2,937	229.30	138.02	1	2,854	221.64	130.87	1	2,824	218.44	127.74	1	2,855	220.37	127.13
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1,278	100.29	60.74	2	1,246	97.28	54.52	2	1,252	97.23	53.17	2	1,480	114.48	61.76	2	1,415	109.22	56.98
J12-J18	肺炎	4	619	48.58	26.32	4	563	43.96	20.08	4	575	44.65	19.94	4	638	49.35	22.19	3	685	52.87	22.79
I60-I69	腦血管疾病	3	677	53.13	32.56	3	679	53.01	28.56	3	699	54.28	28.22	3	722	55.85	29.48	4	667	51.48	26.11
E10-E14	糖尿病	5	352	27.62	17.36	6	414	32.32	18.20	6	428	33.24	18.44	6	434	33.57	18.30	6	413	31.88	16.92
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	337	26.45	13.76	5	430	33.57	15.24	5	431	33.47	15.30	5	475	36.74	15.80	5	470	36.28	15.00
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	240	18.83	11.24	10	255	19.91	11.13	10	242	18.79	9.69	8	284	21.97	10.97	9	282	21.77	10.57
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	269	21.11	17.19	8	285	22.25	16.23	8	271	21.05	15.04	7	318	24.60	16.98	7	303	23.39	16.86
I10-I15	高血壓性疾病	11	204	16.01	9.43	9	274	21.39	10.76	9	255	19.80	9.82	10	241	18.64	8.72	10	237	18.29	9.34
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	231	18.13	15.00	11	207	16.16	12.59	12	166	12.89	9.96	12	181	14.00	10.85	11	205	15.82	11.73
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	19	31	2.43	1.15	16	64	5.00	2.00	17	63	4.89	1.88	15	84	6.50	2.52	13	128	9.88	3.60
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	197	15.46	10.94	12	187	14.60	9.70	11	198	15.38	10.12	11	188	14.54	9.34	12	173	13.35	8.46
A40-A41	敗血症	8	263	20.64	11.78	7	308	24.05	11.78	7	274	21.28	10.03	9	269	20.81	10.00	8	285	22.00	10.05
G20-G21	帕金森病	15	56	4.39	2.24	13	96	7.50	3.72	13	94	7.30	3.49	14	91	7.04	3.16	14	116	8.95	4.19
J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	18	38	2.98	1.68	15	65	5.07	2.24	18	58	4.50	2.07	18	55	4.25	1.90	17	61	4.71	1.87
	其他		1,502	117.87	77.67		1,618	126.32	75.00		1,576	122.39	71.51		1,623	125.54	72.83		1,637	126.36	72.74

表34·臺北市歷年男性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		10,369	802.25	424.60		9,974	775.76	399.58		10,160	795.21	403.72		10,066	794.66	394.80		9,533	763.05	368.70
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,920	225.92	127.78	1	2,774	215.76	117.67	1	2,926	229.01	123.42	1	2,946	232.57	121.16	1	2,837	227.08	113.41
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,580	122.25	63.29	2	1,619	125.92	62.84	2	1,715	134.23	63.69	2	1,544	121.89	57.98	2	1,592	127.43	60.35
J12-J18	肺炎	3	780	60.35	26.06	3	868	67.51	28.54	3	924	72.32	29.18	3	1,125	88.81	35.52	3	906	72.52	28.67
I60-I69	腦血管疾病	4	692	53.54	27.20	4	695	54.06	26.70	4	667	52.21	24.20	4	654	51.63	25.03	4	610	48.83	22.96
E10-E14	糖尿病	6	398	30.79	15.92	6	341	26.52	13.49	6	341	26.69	13.21	5	370	29.21	14.08	5	362	28.98	13.67
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	456	35.28	15.27	5	432	33.60	13.73	5	397	31.07	12.71	6	368	29.05	11.61	6	325	26.01	10.12
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	334	25.84	12.57	8	289	22.48	10.61	8	294	23.01	10.52	7	265	20.92	8.96	7	240	19.21	8.22
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	304	23.52	16.38	7	303	23.57	16.53	7	294	23.01	15.59	8	249	19.66	13.86	8	238	19.05	12.39
I10-I15	高血壓性疾病	10	208	16.09	8.07	11	190	14.78	6.95	11	185	14.48	6.65	12	160	12.63	5.63	9	209	16.73	7.47
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	197	15.24	11.07	10	193	15.01	11.45	10	219	17.14	12.86	9	212	16.74	13.35	10	187	14.97	11.29
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	13	148	11.45	4.06	13	141	10.97	3.91	15	67	5.24	1.93	13	148	11.68	4.07	11	145	11.61	3.87
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	190	14.70	9.09	12	169	13.14	8.18	12	158	12.37	7.66	11	170	13.42	8.32	11	145	11.61	6.70
A40-A41	敗血症	9	290	22.44	9.62	9	278	21.62	9.65	9	252	19.72	8.96	10	199	15.71	6.71	13	113	9.04	4.31
G20-G21	帕金森病	15	130	10.06	4.51	14	106	8.24	3.54	13	88	6.89	2.93	14	111	8.76	3.73	14	98	7.84	3.43
J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	18	58	4.49	1.90	18	49	3.81	1.51	17	52	4.07	1.60	21	31	2.45	0.90	15	97	7.76	3.28
	其他		1,684	130.29	71.81		1,527	118.77	64.27		1,581	123.74	68.62		1,514	119.52	63.89		1,429	114.38	58.53

表35·臺北市歷年女性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
01-56	所有死亡原因		4,379	331.81	385.49		5,381	402.84	312.67		5,576	417.20	309.11		5,488	408.57	288.49		5,853	433.35	288.22
08-14	惡性腫瘤	1	1,203	91.16	101.11	1	1,608	120.38	94.63	1	1,660	124.20	93.11	1	1,728	128.65	92.46	1	1,809	133.94	91.74
25-27-28	心臟疾病	3	466	35.31	42.12	2	625	46.79	34.35	2	605	45.27	31.66	2	556	41.39	27.76	2	616	45.61	28.56
29	腦血管疾病	2	506	38.34	45.36	3	515	38.55	28.72	3	545	40.78	28.68	3	502	37.37	24.78	3	521	38.57	24.01
181	糖尿病	4	292	22.13	25.80	4	453	33.91	26.02	4	467	34.94	25.11	4	473	35.21	23.87	4	463	34.28	22.06
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	173	13.11	15.50	5	225	16.84	12.63	5	220	16.46	11.53	5	224	16.68	11.39	5	277	20.51	13.06
321	肺炎	7	127	9.62	11.80	6	147	11.00	7.84	6	202	15.11	10.25	6	202	15.04	9.47	6	242	17.92	10.74
E54	自殺	10	83	6.29	6.04	7	121	9.06	7.40	7	154	11.52	9.63	7	145	10.80	8.87	7	136	10.07	8.15
347	慢性肝病及肝硬化	9	107	8.11	9.33	9	111	8.31	6.60	8	131	9.80	7.32	8	107	7.97	5.79	8	109	8.07	5.54
E47-E53	事故傷害	5	217	16.44	17.14	7	121	9.06	8.26	9	103	7.71	7.05	9	98	7.30	6.30	9	107	7.92	6.42
038	敗血症	13	46	3.49	4.19	11	40	2.99	2.15	10	77	5.76	4.00	11	72	5.36	3.59	10	106	7.85	4.59
26	高血壓性疾病	8	125	9.47	11.43	10	85	6.36	4.65	11	56	4.19	2.87	10	82	6.10	3.95	11	72	5.33	3.29
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	59	4.47	5.14	11	40	2.99	2.20	12	38	2.84	1.97	13	34	2.53	1.69	12	36	2.67	1.66
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	18	1.36	1.60	13	27	2.02	1.51	13	25	1.87	1.36	12	36	2.68	1.74	13	32	2.37	1.45
44	先天性畸形	12	51	3.86	5.94	14	23	1.72	3.40	14	22	1.65	3.15	14	26	1.94	3.45	14	25	1.85	3.44
200	貧血	17	10	0.76	0.82	16	17	1.27	0.99	16	13	0.97	0.76	15	21	1.56	1.06	15	20	1.48	0.96
	其他		896	67.89	82.17		1,223	91.56	71.32		1,258	94.13	70.66		1,182	88.00	62.32		1,282	94.92	62.55

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表35·臺北市歷年女性主要死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		6,127	453.23	291.00		6,769	490.07	269.77		6,664	478.66	253.90		7,044	502.56	254.29		7,228	513.35	250.23
C00-C97	惡性腫瘤	1	1,769	130.86	87.54	1	2,044	147.98	88.40	1	2,065	148.32	86.24	1	2,078	148.26	83.07	1	2,170	154.12	82.57
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	736	54.44	32.75	2	782	56.62	28.04	2	823	59.11	28.39	2	1,009	71.99	33.14	2	966	68.61	30.53
J12-J18	肺炎	5	331	24.49	14.14	5	342	24.76	11.42	5	308	22.12	9.54	4	422	30.11	12.67	4	440	31.25	12.64
I60-I69	腦血管疾病	3	522	38.61	22.90	3	507	36.71	18.18	3	511	36.70	17.36	3	490	34.96	16.33	3	486	34.52	15.13
E10-E14	糖尿病	4	364	26.93	16.79	4	403	29.18	15.39	4	432	31.03	15.60	5	421	30.04	14.40	5	360	25.57	11.32
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	251	18.57	11.35	6	276	19.98	10.28	6	246	17.67	8.67	6	272	19.41	9.01	6	283	20.10	8.92
I10-I15	高血壓性疾病	8	170	12.58	7.27	7	262	18.97	8.90	7	238	17.10	7.74	7	220	15.70	6.59	7	226	16.05	6.33
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	15	38	2.81	1.48	14	65	4.71	1.91	14	79	5.67	2.33	13	114	8.13	3.08	9	177	12.57	5.31
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	109	8.06	4.57	9	161	11.66	5.67	9	142	10.20	4.64	8	181	12.91	5.21	10	171	12.14	4.37
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	120	8.88	6.98	10	145	10.50	6.82	10	135	9.70	6.34	11	140	9.99	6.00	12	132	9.37	5.72
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	139	10.28	8.19	11	126	9.12	7.31	13	95	6.82	5.17	12	130	9.27	7.58	11	166	11.79	4.75
A40-A41	敗血症	7	250	18.49	10.99	8	251	18.17	9.22	8	192	13.79	6.53	9	176	12.56	5.61	13	113	8.03	6.07
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	99	7.32	4.87	12	99	7.17	4.18	11	112	8.04	4.28	14	96	6.85	3.62	16	64	4.55	1.92
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	149	11.02	6.25	13	94	6.81	3.86	12	103	7.40	3.88	10	161	11.49	5.03	8	185	13.14	5.53
J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	15	38	2.81	1.57	17	43	3.11	1.43	17	36	2.59	1.06	17	31	2.21	0.96	14	105	7.46	3.83
	其他		1,042	77.08	53.37		1,169	84.63	48.76		1,147	82.39	46.13		1,103	78.69	41.99		1,184	84.09	45.31

表35·臺北市歷年女性主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		7,670	544.83	255.48		7,660	545.67	247.47		7,890	564.27	246.23		7,958	572.48	239.93		7,663	557.55	225.23
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,299	163.31	85.94	1	2,288	162.99	83.14	1	2,312	165.35	81.96	1	2,380	171.21	82.22	1	2,309	168.00	76.76
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,051	74.66	31.13	2	1,131	80.57	31.74	2	1,285	91.90	34.91	2	1,249	89.85	32.65	2	1,217	88.55	31.20
J12-J18	肺炎	4	494	35.09	13.78	3	555	39.54	14.43	3	695	49.70	16.80	3	856	61.58	20.12	3	665	48.38	15.86
I60-I69	腦血管疾病	3	514	36.51	15.42	4	502	35.76	15.09	4	485	34.69	13.97	4	492	35.39	13.15	4	427	31.07	11.67
E10-E14	糖尿病	5	431	30.62	13.33	5	387	27.57	11.57	5	351	25.10	9.76	5	351	25.25	9.56	5	372	27.07	9.71
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	277	19.68	8.33	6	303	21.58	8.69	6	327	23.39	9.09	6	254	18.27	6.85	6	263	19.14	6.73
I10-I15	高血壓性疾病	10	178	12.64	4.98	8	179	12.75	4.82	7	201	14.37	5.41	7	179	12.88	4.27	7	205	14.92	4.48
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	8	196	13.92	4.73	9	169	12.04	3.89	12	102	7.29	2.26	8	149	10.72	3.18	8	164	11.93	3.42
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	11	170	12.08	4.96	10	158	11.26	4.25	11	117	8.37	3.06	11	137	9.86	3.39	9	132	9.60	3.30
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	153	10.87	6.37	11	140	9.97	6.29	9	161	11.51	6.71	10	138	9.93	6.33	10	129	9.39	4.85
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13	111	7.88	6.09	12	124	8.83	6.59	10	130	9.30	7.21	12	127	9.14	7.07	11	128	9.31	7.30
A40-A41	敗血症	7	239	16.98	6.93	7	185	13.18	5.22	8	197	14.09	5.42	8	149	10.72	3.88	12	100	7.28	2.77
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	89	6.32	3.25	14	100	7.12	3.34	13	80	5.72	2.68	15	70	5.04	2.13	13	87	6.33	2.59
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	182	12.93	5.01	13	101	7.19	3.00	15	66	4.72	2.49	13	71	5.11	2.65	14	82	5.97	2.75
J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	17	45	3.20	1.17	17	40	2.85	0.96	17	43	3.08	1.06	18	35	2.52	0.87	15	66	4.80	1.64
	其他		1,241	88.15	44.05		1,298	92.47	44.46		1,338	95.69	43.44		1,321	95.03	41.60		1,317	95.82	40.16

表36·臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數(人)			死亡率 (‰)	死亡人數 (人)	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 84年	111	63	48	3.26	202	112	90	5.93	-	-
民國 98年	32	18	14	1.64	69	34	35	3.54	-	-
民國 99年	52	30	22	2.78	71	41	30	3.80	1	5.35
民國 100年	63	30	33	2.48	96	50	46	3.77	-	-
民國 101年	71	43	28	2.35	105	62	43	3.47	3	9.92
民國 102年	67	41	26	2.56	100	55	45	3.82	2	7.64
民國 103年	71	40	31	2.43	109	69	40	3.74	-	-
民國 104年	94	55	39	3.26	137	78	59	4.75	3	10.39
民國 105年	68	42	26	2.45	106	61	45	3.82	1	3.60
民國 106年	62	38	24	2.48	90	51	39	3.60	1	4.00
民國 107年	60	37	23	2.65	101	60	41	4.46	3	13.24
民國 108年	44	26	18	2.10	72	45	27	3.43	1	4.77
民國 109年	47	22	25	2.55	64	34	30	3.48	3	16.31

資料來源：衛生福利部。

附註：1.新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000。

2.嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000。

3.孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數/活產嬰兒數)×100,000。

表37·臺北市歷年年齡結構別死亡率

單位：人/每十萬人口

年別	總計	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
84年	437.00	682.71	32.62	18.42	27.06	60.57	77.17	65.05	90.99	113.30	160.75	261.74	386.95	681.57	1,081.85	1,676.13	2,664.91	4,267.21	7,274.45	11,039.79
98年	568.60	357.61	21.38	13.08	5.53	26.88	36.77	40.38	63.46	85.57	148.62	225.80	314.22	467.69	638.77	1,116.63	1,912.70	3,080.41	5,353.26	10,468.26
99年	575.83	379.01	17.92	10.66	10.08	23.18	29.30	45.38	63.43	87.69	135.15	207.88	295.07	466.23	627.12	1,073.08	1,722.41	3,119.39	5,172.92	10,733.81
100年	600.94	439.53	17.38	6.91	9.11	23.22	31.96	38.62	61.99	82.84	147.77	212.79	323.21	449.50	647.50	1,009.22	1,742.48	3,149.19	5,256.75	11,145.17
101年	615.94	384.89	30.01	10.62	13.00	22.57	31.22	54.76	55.70	92.04	135.16	209.92	316.51	450.09	642.50	1,046.14	1,634.99	3,111.78	5,368.53	11,362.42
102年	600.78	362.67	15.23	15.26	10.77	27.43	32.79	32.30	39.45	71.26	120.77	221.67	333.36	461.62	598.90	951.72	1,608.36	2,787.57	5,146.12	10,998.33
103年	629.12	403.28	15.98	14.45	12.05	19.73	44.92	33.31	45.32	90.65	131.91	210.82	299.40	453.63	634.57	930.83	1,612.32	2,781.10	5,270.99	11,549.10
104年	634.72	487.52	14.36	4.55	5.65	22.23	33.75	45.47	49.56	68.93	119.14	188.47	315.60	438.19	653.41	919.01	1,564.10	2,713.61	5,014.33	11,595.10
105年	668.05	388.34	17.17	11.82	11.14	22.39	35.94	39.52	46.02	74.97	133.69	202.29	324.95	449.88	643.65	943.09	1,522.98	2,776.81	5,148.48	12,150.42
106年	655.67	353.45	8.30	5.29	14.15	19.30	26.73	42.95	54.93	68.11	116.90	204.11	305.11	432.66	596.45	892.78	1,488.40	2,510.13	4,889.05	11,993.12
107年	674.54	442.23	17.12	6.88	8.12	22.67	32.72	31.86	56.89	65.42	104.18	205.45	302.94	430.33	603.23	909.56	1,393.66	2,612.04	4,791.46	12,173.79
108年	678.41	345.15	19.86	4.24	12.73	30.37	29.61	36.24	48.49	70.03	108.89	203.02	298.29	462.83	607.35	874.82	1,282.62	2,434.72	4,511.41	12,235.88
109年	655.40	336.94	8.95	4.11	10.11	14.13	42.15	35.37	39.67	66.93	97.90	185.99	277.03	404.62	586.54	810.20	1,186.30	2,375.18	4,319.37	11,427.74

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表38·臺北市歷年事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率
E47-E53		752	28.45	463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14
E47	運輸事故	393	14.87	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54
E48	意外中毒	39	1.48	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	97	3.67	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31
E51	火及火焰所致之事故傷害	30	1.13	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27
E52	其他事故傷害，包括後期影響	191	7.23	140	5.33	83	3.17	90	3.43	82	3.12
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	1	0.04	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表38·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬口 死亡 率
V01-X59, Y85-Y86		389	14.81	359	13.74	402	15.26	430	16.15	406	15.15	458	17.00
V01-V99	運輸事故傷害	153	5.83	154	5.89	147	5.58	152	5.71	150	5.60	142	5.27
W00-W19	跌倒(落)	91	3.47	83	3.18	100	3.80	96	3.61	88	3.28	118	4.38
W65-W74	意外溺死和淹沒	26	0.99	16	0.61	27	1.02	14	0.53	15	0.56	16	0.59
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	19	0.72	26	0.99	26	0.99	24	0.90	21	0.78	23	0.85
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	6	0.23	6	0.23	5	0.19	16	0.60	9	0.34	6	0.22
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	25	0.95	20	0.77	16	0.61	19	0.71	28	1.04	31	1.15
	其他	69	2.63	54	2.07	81	3.07	109	4.09	95	3.54	122	4.53

表38·臺北市歷年事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	104年		105年		106年		107年		108年		109年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
		V01-X59, Y85-Y86		435	16.09	457	16.92	443	16.47	455	17.00	386	14.53
V01-V99	運輸事故傷害	131	4.85	159	5.89	153	5.69	135	5.05	127	4.78	122	4.65
W00-W19	跌倒(落)	99	3.66	122	4.52	107	3.98	117	4.37	105	3.95	97	3.70
W65-W74	意外溺死和淹沒	22	0.81	25	0.93	24	0.89	20	0.75	20	0.75	20	0.76
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	34	1.26	32	1.19	20	0.74	29	1.08	27	1.02	16	0.61
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	8	0.30	12	0.44	12	0.45	12	0.45	8	0.30	9	0.34
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	35	1.29	28	1.04	46	1.71	42	1.57	28	1.05	19	0.72
	其他	106	3.92	79	2.93	81	3.01	100	3.74	71	2.67	84	3.20

表39·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男性人口 死亡 率
E47-E53		535	40.42	342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70
E47	運輸事故	278	21.00	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06
E48	意外中毒	32	2.42	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	69	5.21	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16
E51	火及火焰所致之事故傷害	21	1.59	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31
E52	其他事故傷害，包括後期影響	134	10.12	110	8.53	68	5.30	70	5.46	63	4.92
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	1	0.08	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表39·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		269	21.11	258	20.45	267	21.03	285	22.25	271	21.05	318	24.60
V01-V99	運輸事故傷害	104	8.16	113	8.96	97	7.64	108	8.43	102	7.92	99	7.66
W00-W19	跌倒(落)	66	5.18	64	5.07	67	5.28	72	5.62	66	5.13	86	6.65
W65-W74	意外溺死和淹沒	21	1.65	11	0.87	19	1.50	10	0.78	10	0.78	14	1.08
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	13	1.02	18	1.43	15	1.18	12	0.94	12	0.93	14	1.08
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	5	0.39	3	0.24	5	0.39	6	0.47	6	0.47	5	0.39
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	17	1.33	14	1.11	14	1.10	12	0.94	22	1.71	27	2.09
	其他	43	3.37	35	2.77	50	3.94	65	5.07	53	4.12	73	5.65

表39·臺北市歷年男性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	104年		105年		106年		107年		108年		109年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率
V01-X59, Y85-Y86		303	23.39	304	23.52	303	23.57	294	23.01	249	19.66	238	19.05
V01-V99	運輸事故傷害	83	6.41	105	8.12	103	8.01	91	7.12	85	6.71	78	6.24
W00-W19	跌倒(落)	71	5.48	88	6.81	76	5.91	78	6.10	73	5.76	68	5.44
W65-W74	意外溺死和淹沒	20	1.54	18	1.39	19	1.48	16	1.25	15	1.18	16	1.28
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	26	2.01	16	1.24	10	0.78	15	1.17	16	1.26	5	0.40
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	4	0.31	6	0.46	8	0.62	6	0.47	3	0.24	7	0.56
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	28	2.16	22	1.70	35	2.72	30	2.35	19	1.50	13	1.04
	其他	71	5.48	49	3.79	52	4.04	58	4.54	38	3.00	51	4.08

表40·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
E47-E53		217	16.44	121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92
E47	運輸事故	115	8.71	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15
E48	意外中毒	7	0.53	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59
E49	內科醫療之事故傷害，異常反應及後期併發症	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	28	2.12	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55
E51	火及火焰所致之事故傷害	9	0.68	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22
E52	其他事故傷害，包括後期影響	57	4.32	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41
E53	治療用之藥品，藥物所致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表40·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
V01-X59, Y85-Y86		120	8.88	101	7.47	135	9.89	145	10.50	135	9.70	140	9.99
V01-V99	運輸事故傷害	49	3.62	41	3.03	50	3.66	44	3.19	48	3.45	43	3.07
W00-W19	跌倒(落)	25	1.85	19	1.41	33	2.42	24	1.74	22	1.58	32	2.28
W65-W74	意外溺死和淹沒	5	0.37	5	0.37	8	0.59	4	0.29	5	0.36	2	0.14
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	0.44	8	0.59	11	0.81	12	0.87	9	0.65	9	0.64
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.07	3	0.22	-	-	10	0.72	3	0.22	1	0.07
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	8	0.59	6	0.44	2	0.15	7	0.51	6	0.43	4	0.29
	其他	26	1.92	19	1.41	31	2.27	44	3.19	42	3.02	49	3.50

表40·臺北市歷年女性事故傷害死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	104年		105年		106年		107年		108年		109年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率
V01-X59, Y85-Y86		132	9.37	153	10.87	140	9.97	161	11.51	137	9.86	129	9.39
V01-V99	運輸事故傷害	48	3.41	54	3.84	50	3.56	44	3.15	42	3.02	44	3.20
W00-W19	跌倒(落)	28	1.99	34	2.42	31	2.21	39	2.79	32	2.30	29	2.11
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.14	7	0.50	5	0.36	4	0.29	5	0.36	4	0.29
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	8	0.57	16	1.14	10	0.71	14	1.00	11	0.79	11	0.80
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	4	0.28	6	0.43	4	0.28	6	0.43	5	0.36	2	0.15
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	7	0.50	6	0.43	11	0.78	12	0.86	9	0.65	6	0.44
	其他	35	2.49	30	2.13	29	2.07	42	3.00	33	2.37	33	2.40

表41·臺北市歷年自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率
E54	自殺總計	206	7.79	346	13.18	467	17.83	454	17.30	364	13.84
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	25	0.95	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	109	4.12	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	18	0.68	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.11	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	1.51	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	9	0.34	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表41·臺北市歷年自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
		X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	370	14.09	329	12.59	306	11.61	333	12.51	261	9.74
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	-	-	1	0.04	3	0.11	2	0.07	7	0.26
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.07	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	5	0.19	9	0.34	7	0.26	4	0.15	2	0.07
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	2	0.08	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	124	4.72	100	3.83	72	2.73	82	3.08	55	2.05	76	2.82
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	9	0.34	11	0.42	6	0.23	4	0.15	7	0.26
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	2	0.08	1	0.04	1	0.04	2	0.07	1	0.04
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	113	4.32	126	4.78	103	3.87	77	2.87	104	3.86
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	24	0.92	25	0.95	34	1.28	28	1.04	32	1.19
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	1	0.04	2	0.08	4	0.15	2	0.07
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	4	0.15	1	0.04	4	0.15	5	0.19	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	10	0.38	6	0.23	8	0.30	3	0.11	6	0.22
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	55	2.10	52	1.97	71	2.67	67	2.50	70	2.60
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	3	0.11	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	4	0.15	1	0.04	2	0.08	-	-	2	0.07
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	2	0.07	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	1	0.04	-	-	4	0.15	6	0.22	2	0.07

表41·臺北市歷年自殺死亡方式（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	104年		105年		106年		107年		108年		109年	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	318	11.76	308	11.41	317	11.79	349	13.04	339	12.76	315	12.01
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.18	4	0.15	6	0.22	3	0.11	1	0.04	2	0.08
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	3	0.11	11	0.41	5	0.19	5	0.19	7	0.27
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.04	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	3.00	67	2.48	68	2.53	73	2.73	48	1.81	39	1.49
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.30	4	0.15	4	0.15	8	0.30	2	0.08	8	0.30
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.07	3	0.11	1	0.04	3	0.11	5	0.19	3	0.11
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	105	3.88	104	3.85	105	3.90	136	5.08	128	4.82	109	4.15
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	20	0.74	38	1.41	33	1.23	26	0.97	29	1.09	35	1.33
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	5	0.18	1	0.04	4	0.15	4	0.15	5	0.19	3	0.11
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	3	0.11	1	0.04	5	0.19	3	0.11	6	0.23	2	0.08
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	9	0.33	8	0.30	10	0.37	10	0.37	15	0.56	10	0.38
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	69	2.55	68	2.52	67	2.49	0	-	91	3.43	93	3.54
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	75	2.80	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	5	0.18	5	0.19	1	0.04	-	-	2	0.08	2	0.08

表42·臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死亡 人數	每十 萬 男性 人口 死亡 率	死亡 人數	每十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死亡 人數	每十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
E54	自殺總計	123	9.29	225	17.46	313	24.40	309	24.12	228	17.81
E950	以固體或液體物質自殺及自 為中毒	11	0.83	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自 為中毒	-	-	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及 自傷	71	5.36	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	8	0.60	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	2	0.15	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16
E957	由高處跳下自殺及自傷	24	1.81	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89
E958	其他及未明示之方式自殺及 自傷	7	0.53	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表42·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡 率
		X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	231	18.13	212	16.81	188	14.81	207	16.16	166	12.89
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	-	-	1	0.08	1	0.08	2	0.16	1	0.08
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	2	0.16	6	0.47	3	0.23	-	-	1	0.08
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	6.36	70	5.55	43	3.39	59	4.61	40	3.11	52	4.02
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	7	0.55	8	0.63	5	0.39	3	0.23	7	0.54
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	80	6.34	83	6.54	62	4.84	56	4.35	67	5.18
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	13	1.03	17	1.34	21	1.64	17	1.32	14	1.08
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	2	0.16	4	0.31	2	0.15
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	1	0.08	1	0.08	2	0.16	5	0.39	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	7	0.55	3	0.24	5	0.39	-	-	4	0.31
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	26	2.06	25	1.97	40	3.12	32	2.49	32	2.48
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	2	0.16	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	3	0.24	-	-	1	0.08	-	-	1	0.08
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	1	0.08	-	-	2.00	0.16	4	0.31	-	-

表42·臺北市歷年男性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	104年		105年		106年		107年		108年		109年	
		死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
		人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	205	15.82	197	15.24	193	15.01	219	17.14	212	16.74	187	14.97
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	2	0.15	3	0.23	-	-	-	-	1	0.08
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	1	0.08	3	0.23	4	0.31	3	0.24	2	0.16
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	56	4.32	42	3.25	46	3.58	53	4.15	35	2.76	32	2.56
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.31	4	0.31	2	0.16	7	0.55	1	0.08	7	0.56
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	3	0.23	-	-	3	0.23	4	0.32	1	0.08
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	72	5.56	67	5.18	66	5.13	80	6.26	86	6.79	67	5.36
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	12	0.93	25	1.93	18	1.40	14	1.10	8	0.63	16	1.28
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	5	0.39	-	-	3	0.23	4	0.31	5	0.39	3	0.24
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.15	1	0.08	4	0.31	3	0.23	5	0.39	2	0.16
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	7	0.54	7	0.54	5	0.39	8	0.63	9	0.71	8	0.64
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	38	2.93	39	3.02	40	3.11	41	3.21	53	4.18	44	3.52
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.16
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.15	4	0.31	1	0.08	-	-	2	0.16	2	0.16

表43·臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	84年		93年		94年		95年		96年	
		死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
E54	自殺總計	83	6.29	121	9.06	154	11.52	145	10.80	136	10.07
E950	以固體或液體物質自殺及自 為中毒	14	1.06	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自 為中毒	1	0.08	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及 自傷	38	2.88	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	10	0.76	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44
E958	其他及未明示之方式自殺及 自傷	2	0.15	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表43·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續1)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	97年		99年		100年		101年		102年		103年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率
		X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28	117	8.66	118	8.64	126	9.12	95	6.82
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	2	0.14	-	-	6	0.43
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	3	0.22	3	0.22	4	0.29	4	0.29	1	0.07
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	2	0.14	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	43	3.18	30	2.22	29	2.12	23	1.67	15	1.08	24	1.71
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	2	0.15	3	0.22	1	0.07	1	0.07	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	1	0.07	-	-	-	-	1	0.07	1	0.07
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	33	2.44	43	3.15	41	2.97	21	1.51	37	2.64
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	11	0.81	8	0.59	13	0.94	11	0.79	18	1.28
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	3	0.22	-	-	2	0.14	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	3	0.22	3	0.22	3	0.22	3	0.22	2	0.14
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	29	2.15	27	1.98	31	2.24	35	2.51	38	2.71
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	1	0.07	1	0.07	-	-	1	0.07
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	2	0.14	2	0.14	2	0.14

表43·臺北市歷年女性自殺死亡方式(續2完)

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡方式	104年		105年		106年		107年		108年		109年	
		死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡 率
		X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	113	8.03	111	7.88	124	8.83	130	9.30	127	9.14
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.21	2	0.14	3	0.21	3	0.21	1	0.07	1	0.07
X62	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	2	0.14	8	0.57	1	0.07	2	0.14	5	0.36
X65	酒精(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	有機溶劑及鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	25	1.78	25	1.78	22	1.57	20	1.43	13	0.94	7	0.51
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	4	0.28	-	-	2	0.14	1	0.07	1	0.07	1	0.07
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-	1	0.07	2	0.15
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	33	2.34	37	2.63	39	2.78	56	4.00	42	3.02	42	3.06
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	8	0.57	13	0.92	15	1.07	12	0.86	21	1.51	19	1.38
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-	-	-
X75	利用爆炸物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.14	1	0.07	5	0.36	2	0.14	6	0.43	2	0.15
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	31	2.20	29	2.06	27	1.92	34	2.43	38	2.73	49	3.57
X81	利用跳入或躺於移動物件前蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.21	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-

表44·臺北市歷年主要死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
96年	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎病微候群 及腎病變		慢性下呼吸道疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	36.18	20.14	45.66	27.26	27.26	16.89	18.70	11.20	16.98	9.27
98年	568.60	347.27	174.48	111.24	67.61	39.98	32.12	16.59	43.13	24.61	31.55	18.86	17.25	9.72	18.97	9.85
99年	575.83	338.78	177.26	110.14	65.94	36.69	34.40	16.89	40.07	21.91	29.43	16.78	18.14	10.07	17.79	8.87
100年	600.94	343.47	179.59	109.78	72.30	38.51	35.75	16.96	43.15	23.13	29.41	16.39	17.00	8.89	22.09	10.48
101年	615.94	344.34	187.11	111.52	76.18	40.21	34.00	15.54	44.55	22.94	30.69	16.63	19.95	10.62	22.20	10.31
102年	600.78	326.27	183.55	106.98	77.43	39.81	32.95	14.46	45.15	22.34	32.09	16.84	18.21	9.13	21.38	9.73
103年	629.12	332.35	181.93	103.64	92.38	46.23	39.34	17.10	44.98	22.40	31.73	16.17	20.64	9.89	24.35	10.22
104年	634.72	325.57	185.87	102.84	88.07	42.60	41.61	17.37	42.65	20.08	28.59	13.87	20.90	9.68	23.52	9.54
105年	668.05	332.75	193.28	105.00	97.44	45.78	47.18	19.36	44.66	20.76	30.70	14.50	22.63	10.24	23.18	9.64
106年	655.67	316.47	188.21	98.69	102.25	45.83	52.91	20.75	44.51	20.28	27.07	12.43	22.01	9.55	21.94	8.54
107年	674.54	317.59	195.75	100.48	112.11	47.98	60.50	22.32	43.05	18.57	25.86	11.34	23.21	9.73	19.21	7.38
108年	678.41	309.90	200.47	99.46	105.13	44.13	74.56	26.91	43.13	18.55	27.14	11.64	19.53	7.83	19.01	7.01
109年	655.40	289.57	196.13	92.94	107.06	44.40	59.88	21.44	39.52	16.72	27.98	11.51	19.17	7.41	17.42	6.29

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表44·臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
96年	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年別	高血壓性疾病		事故傷害		蓄意自我傷害(自殺)		血管性及未明示之癱瘓症		慢性肝病及肝硬化		敗血症		肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	14.24	8.21	14.81	11.94	14.09	11.40	2.63	1.29	11.27	7.69	19.53	11.27	2.89	1.59	3.54	1.88
98年	14.72	8.17	14.42	11.20	13.04	10.39	4.28	2.06	13.35	8.79	16.86	9.44	2.98	1.64	3.52	1.89
99年	16.15	8.49	13.74	10.71	12.59	9.67	4.44	2.00	12.17	7.90	17.18	9.25	3.14	1.45	4.25	2.10
100年	16.93	8.47	15.26	10.92	11.61	8.98	5.16	2.18	11.96	7.65	21.48	10.81	3.04	1.43	4.59	2.33
101年	20.13	9.74	16.15	11.31	12.51	9.82	4.85	1.94	10.74	6.77	21.00	10.47	4.06	1.83	5.94	2.92
102年	18.40	8.66	15.15	10.47	9.74	7.40	5.30	2.11	11.57	6.99	17.39	8.18	3.51	1.53	5.78	2.71
103年	17.11	7.55	17.00	11.23	11.54	9.06	7.35	2.78	10.54	6.29	16.52	7.62	3.19	1.42	5.01	2.23
104年	17.13	7.65	16.09	11.05	11.76	8.72	11.06	3.97	10.28	5.96	17.09	7.49	4.11	1.61	6.66	2.95
105年	14.29	6.37	16.92	11.14	11.41	8.38	12.74	4.40	10.33	5.97	19.59	8.15	3.81	1.50	7.63	3.29
106年	13.72	5.80	16.47	11.09	11.79	8.89	11.53	3.88	10.00	5.58	17.22	7.20	3.31	1.21	7.03	2.87
107年	14.42	5.97	17.00	10.85	13.04	9.84	6.32	2.10	8.89	4.97	16.78	7.00	3.55	1.31	5.49	2.15
108年	12.76	4.90	14.57	9.90	12.76	10.05	11.18	3.56	9.03	4.99	13.10	5.11	2.48	0.89	6.85	2.66
109年	15.78	5.85	13.99	8.39	12.01	9.14	11.78	3.61	8.84	4.47	8.12	3.47	6.21	2.36	6.14	2.34

表45·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
96年	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		糖尿病		慢性下呼吸道疾病		腎炎、腎病微候群及腎病變	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	48.58	26.32	53.13	32.56	27.62	17.36	26.45	13.76	18.83	11.24
98年	693.85	425.20	211.03	134.11	86.99	52.89	41.72	21.04	51.12	29.05	33.42	20.41	29.79	15.11	19.67	10.79
99年	704.08	421.30	219.66	137.29	82.36	47.58	43.44	21.00	47.72	26.99	30.44	17.70	26.56	12.91	18.55	10.57
100年	737.25	426.54	216.55	132.95	90.98	50.79	47.66	22.21	54.91	29.93	30.96	18.33	35.05	16.00	18.59	9.68
101年	751.69	429.77	229.30	138.02	97.28	54.52	43.96	20.08	53.01	28.56	32.32	18.20	33.57	15.24	19.91	11.13
102年	732.81	409.56	221.64	130.87	97.23	53.17	44.65	19.94	54.28	28.22	33.24	18.44	33.47	15.30	18.79	9.69
103年	766.33	422.54	218.44	127.74	114.48	61.76	49.35	22.19	55.85	29.48	33.57	18.30	36.74	15.80	21.97	10.97
104年	766.62	414.33	220.37	127.13	109.22	56.98	52.87	22.79	51.48	26.11	31.88	16.92	36.28	15.00	21.77	10.57
105年	802.25	424.60	225.92	127.78	122.25	63.29	60.35	26.06	53.54	27.20	30.79	15.92	35.28	15.27	25.84	12.57
106年	775.76	399.58	215.76	117.67	125.92	62.84	67.51	28.54	54.06	26.70	26.52	13.49	33.60	13.73	22.48	10.61
107年	795.21	403.72	229.01	123.42	134.23	63.69	72.32	29.18	52.21	24.20	26.69	13.21	31.07	12.71	23.01	10.52
108年	794.66	394.80	232.57	121.16	121.89	57.98	88.81	35.52	51.63	25.03	29.21	14.08	29.05	11.61	20.92	8.96
109年	763.05	368.70	227.08	113.41	127.43	60.35	72.52	28.67	48.83	22.96	28.98	13.67	26.01	10.12	19.21	8.22

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表45·臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
96年	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年別	事故傷害		高血壓性疾病		蓄意自我傷害(自殺)		血管性及未明示之癱瘓症		慢性肝病及肝硬化		敗血症		帕金森病		肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	21.11	17.19	16.01	9.43	18.13	15.00	2.43	1.15	15.46	10.94	20.64	11.78	4.39	2.24	2.98	1.68
98年	20.54	16.29	16.28	9.25	18.49	14.83	3.48	1.58	18.33	12.76	18.41	10.28	4.90	2.56	3.56	1.83
99年	20.45	16.18	18.31	9.74	16.81	13.01	4.36	1.97	15.70	10.91	18.23	9.72	5.07	2.28	3.49	1.49
100年	21.03	15.84	18.12	9.32	14.81	11.63	4.96	2.10	16.62	11.40	26.55	13.53	5.51	2.83	4.49	2.07
101年	22.25	16.23	21.39	10.76	16.16	12.59	5.00	2.00	14.60	9.70	24.05	11.78	7.50	3.72	5.07	2.24
102年	21.05	15.04	19.80	9.82	12.89	9.96	4.89	1.88	15.38	10.12	21.28	10.03	7.30	3.49	4.50	2.07
103年	24.60	16.98	18.64	8.72	14.00	10.85	6.50	2.52	14.54	9.34	20.81	10.00	7.04	3.16	4.25	1.90
104年	23.39	16.86	18.29	9.34	15.82	11.73	9.88	3.60	13.35	8.46	22.00	10.05	8.95	4.19	4.71	1.87
105年	23.52	16.38	16.09	8.07	15.24	11.07	11.45	4.06	14.70	9.09	22.44	9.62	10.06	4.51	4.49	1.90
106年	23.57	16.53	14.78	6.95	15.01	11.45	10.97	3.91	13.14	8.18	21.62	9.65	8.24	3.54	3.81	1.51
107年	23.01	15.59	14.48	6.65	17.14	12.86	5.24	1.93	12.37	7.66	19.72	8.96	6.89	2.93	4.07	1.60
108年	19.66	13.86	12.63	5.63	16.74	13.35	11.68	4.07	13.42	8.32	15.71	6.71	8.76	3.73	2.45	0.90
109年	19.05	12.39	16.73	7.47	14.97	11.29	11.61	3.87	11.61	6.70	9.04	4.31	7.84	3.43	7.76	3.28

表46·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎徵候群及腎性病變		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
96年	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年別	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性疾病除外)		肺炎		腦血管疾病		糖尿病		腎炎、腎病徵候群及腎病變		高血壓性疾病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	24.49	14.14	38.61	22.90	26.93	16.79	18.57	11.35	12.58	7.27
98年	451.14	276.88	140.20	90.07	49.43	28.58	23.12	12.35	35.64	20.63	29.79	17.72	14.97	8.70	13.26	7.33
99年	456.13	265.58	137.69	85.62	50.61	27.23	25.97	12.95	32.92	17.61	28.48	16.12	17.76	9.80	14.13	7.43
100年	474.21	270.05	145.23	89.19	54.93	27.89	24.68	12.06	32.22	17.12	27.98	14.97	15.53	8.19	15.82	7.81
101年	490.07	269.77	147.98	88.40	56.62	28.04	24.76	11.42	36.71	18.18	29.18	15.39	19.98	10.28	18.97	8.90
102年	478.66	253.90	148.32	86.24	59.11	28.39	22.12	9.54	36.70	17.36	31.03	15.60	17.67	8.67	17.10	7.74
103年	502.56	254.29	148.26	83.07	71.99	33.14	30.11	12.67	34.96	16.33	30.04	14.40	19.41	9.01	15.70	6.59
104年	513.35	250.23	154.12	82.57	68.61	30.53	31.25	12.64	34.52	15.13	25.57	11.32	20.10	8.92	16.05	6.33
105年	544.83	255.48	163.31	85.94	74.66	31.13	35.09	13.78	36.51	15.42	30.62	13.33	19.68	8.33	12.64	4.98
106年	545.67	247.47	162.99	83.14	80.57	31.74	39.54	14.43	35.76	15.09	27.57	11.57	21.58	8.69	12.75	4.82
107年	564.27	246.23	165.35	81.96	91.90	34.91	49.70	16.80	34.69	13.97	25.10	9.76	23.39	9.09	14.37	5.41
108年	572.48	239.93	171.21	82.22	89.85	32.65	61.58	20.12	35.39	13.15	25.25	9.56	18.27	6.85	12.88	4.27
109年	557.55	225.23	168.00	76.76	88.55	31.20	48.38	15.86	31.07	11.67	27.07	9.71	19.14	6.73	14.92	4.48

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表46·臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
96年	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年別	血管性及未明示之癱瘓症		慢性下呼吸道疾病		事故傷害		蓄意自我傷害(自殺)		敗血症		慢性肝病及肝硬化		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	2.81	1.48	8.06	4.57	8.88	6.98	10.28	8.19	18.49	10.99	7.32	4.87	11.02	6.25	2.81	1.57
98年	5.04	2.57	8.82	4.61	8.67	6.49	7.93	6.48	15.41	8.77	8.67	5.38	14.67	7.76	2.45	1.46
99年	4.51	2.11	9.62	4.94	7.47	5.74	8.66	6.70	16.20	8.98	8.88	5.36	15.54	7.61	2.81	1.39
100年	5.35	2.32	10.03	5.06	9.89	6.49	8.64	6.65	16.77	8.39	7.62	4.44	9.89	5.54	1.68	0.82
101年	4.71	1.91	11.66	5.67	10.50	6.82	9.12	7.31	18.17	9.22	7.17	4.18	6.81	3.86	3.11	1.43
102年	5.67	2.33	10.20	4.64	9.70	6.34	6.82	5.17	13.79	6.53	8.04	4.28	7.40	3.88	2.59	1.06
103年	8.13	3.08	12.91	5.21	9.99	6.00	9.27	7.58	12.56	5.61	6.85	3.62	11.49	5.03	2.21	0.96
104年	12.14	4.37	11.79	4.75	9.37	5.72	8.03	6.07	12.57	5.31	7.46	3.83	13.14	5.53	3.55	1.36
105年	13.92	4.73	12.08	4.96	10.87	6.37	7.88	6.09	16.98	6.93	6.32	3.25	12.93	5.01	3.20	1.17
106年	12.04	3.89	11.26	4.25	9.97	6.29	8.83	6.59	13.18	5.22	7.12	3.34	7.19	3.00	2.85	0.96
107年	7.29	2.26	8.37	3.06	11.51	6.71	9.30	7.21	14.09	5.42	5.72	2.68	4.72	2.49	3.08	1.06
108年	10.72	3.18	9.86	3.39	9.93	6.33	9.14	7.07	10.72	3.88	5.04	2.13	5.11	2.65	2.52	0.87
109年	11.93	3.42	9.60	3.30	9.39	4.85	9.31	7.30	7.28	2.77	6.33	2.59	5.97	2.75	4.80	1.64

表47· 臺北市歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		3,180	120.31		4,202	160.09		4,290	163.78		4,423	168.54		4,566	173.56
162	肺癌	1	615	23.27	1	880	33.53	1	870	33.21	1	910	34.68	1	987	37.52
155	肝癌	2	570	21.56	2	677	25.79	2	607	23.17	2	702	26.75	2	666	25.32
153 154	結腸直腸癌	3	329	12.45	3	518	19.73	3	542	20.69	3	532	20.27	3	557	21.17
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	5	135	10.23	4	203	15.20	4	224	16.76	4	209	15.56	4	203	15.03
151	胃癌	4	328	12.41	5	311	11.85	5	354	13.51	5	363	13.83	5	329	12.51
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	7	51	3.85	6	122	9.46	6	133	10.37	6	129	10.07	6	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	92	3.48	9	148	5.64	7	181	6.91	8	175	6.67	7	217	8.25
157	胰臟癌	9	97	3.67	8	164	6.25	9	168	6.41	7	178	6.78	8	178	6.77
179 180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	108	8.18	7	87	6.51	8	86	6.43	10	81	6.03	9	89	6.59
156	膽囊癌	15	64	2.42	11	125	4.76	12	120	4.58	12	116	4.42	10	149	5.66
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	44	3.33	12	58	4.34	14	50	3.74	11	73	5.43	11	74	5.48
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	78	2.95	10	138	5.26	10	146	5.57	9	166	6.33	12	134	5.09
150	食道癌	14	75	2.84	14	106	4.04	11	126	4.81	14	97	3.70	13	126	4.79
204-208	白血病	8	100	3.78	13	108	4.11	13	100	3.82	13	98	3.73	14	107	4.07
188	膀胱癌	17	57	2.16	15	92	3.51	16	66	2.52	16	82	3.12	15	91	3.46
	其他		437	16.53		465	17.72		517	19.74		512	19.51		523	19.88

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表47· 臺北市歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年		99年		100年		101年		102年		103年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		4,467	170.10		4,632	177.26		4,732	179.59		4,981	187.11		4,919	183.55		4,902	181.93
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34	1	990	37.89	1	1,014	38.48	1	1,018	38.24	1	988	36.87	1	992	36.82
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	228	16.87	4	266	19.68	4	283	20.73	4	243	17.59	4	264	18.96	4	289	20.62
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59	3	570	21.81	3	609	23.11	3	648	24.34	3	631	23.55	2	666	24.72
C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69	2	644	24.65	2	672	25.50	2	697	26.18	2	700	26.12	2	666	24.72
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	124	9.73	6	144	11.41	6	132	10.40	5	176	13.74	5	155	12.04	5	151	11.68
C25	胰臟癌	7	192	7.31	7	211	8.07	7	231	8.77	7	232	8.71	7	231	8.62	7	257	9.54
C16	胃癌	5	312	11.88	5	307	11.75	5	285	10.82	6	329	12.36	6	315	11.75	6	312	11.58
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	13	58	4.29	12	66	4.88	11	65	4.76	8	88	6.37	9	85	6.11	9	84	5.99
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	9	131	4.99	9	151	5.78	8	153	5.81	9	169	6.35	8	203	7.57	8	174	6.46
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	131	4.99	8	152	5.82	9	149	5.65	10	147	5.52	10	154	5.75	10	155	5.75
C91-C95	白血病	11	121	4.61	13	107	4.09	13	112	4.25	13	110	4.13	13	113	4.22	13	98	3.64
C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	8	75	5.55	10	71	5.25	10	74	5.42	12	63	4.56	11	80	5.75	12	58	4.14
C15	食道癌	12	120	4.57	11	137	5.24	12	115	4.36	11	133	5.00	12	121	4.52	11	134	4.97
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	17	28	2.07	18	29	2.15	18	34	2.49	18	35	2.53	15	39	2.80	17	35	2.50
C67	膀胱癌	15	80	3.05	14	95	3.64	14	78	2.96	14	85	3.19	14	84	3.13	14	93	3.45
	其他		671	25.55		692	26.48		726	27.55		808	30.35		756	28.21		738	27.39

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表47· 臺北市歷年主要癌症死亡原因 (續2完)

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	104年		105年		106年		107年		108年		109年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		5,025	185.87		5,219	193.28		5,062	188.21		5,238	195.75		5,326	200.47		5,146	196.13
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	984	36.40	1	1,070	39.63	1	1,034	38.45	1	1,053	39.35	1	1,040	39.14	1	1,026	39.10
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	288	20.45	4	302	21.45	4	323	23.01	4	321	22.96	2	378	27.19	2	354	25.76
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	686	25.37	2	675	25.00	2	670	24.91	2	705	26.35	3	721	27.14	3	667	25.42
C22	肝和肝內膽管癌	3	667	24.67	3	672	24.89	3	658	24.47	3	679	25.37	4	661	24.88	4	646	24.62
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	163	12.58	5	167	12.92	5	177	13.77	5	160	12.52	5	177	13.97	5	207	16.57
C25	胰臟癌	7	273	10.10	7	260	9.63	6	294	10.93	6	308	11.51	6	314	11.82	6	324	12.35
C16	胃癌	6	295	10.91	6	311	11.52	7	278	10.34	7	288	10.76	7	295	11.10	7	277	10.56
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	10	77	5.47	9	107	7.60	8	89	6.34	10	79	5.65	10	86	6.19	8	106	7.71
C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	8	183	6.77	8	208	7.70	9	166	6.17	8	176	6.58	8	200	7.53	9	184	7.01
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	153	5.66	10	174	6.44	11	133	4.95	9	159	5.94	9	186	7.00	10	168	6.40
C91-C95	白血病	14	108	3.99	12	133	4.93	14	115	4.28	13	124	4.63	12	141	5.31	11	141	5.37
C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌 ⁽¹⁾	11	70	4.97	11	72	5.11	10	76	5.41	12	66	4.72	14	62	4.46	12	68	4.95
C15	食道癌	12	133	4.92	13	123	4.56	12	119	4.42	11	140	5.23	11	150	5.65	13	121	4.61
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	15	42	2.98	15	47	3.34	15	59	4.20	15	54	3.86	13	65	4.68	14	56	4.07
C67	膀胱癌	13	117	4.33	14	108	4.00	13	116	4.31	14	109	4.07	15	100	3.76	15	104	3.96
	其他		786	29.07		790	29.26		755	28.07		817	30.53		750	28.23		697	26.57

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表48·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		1,977	149.38		2,594	201.24		2,630	205.00		2,695	210.37		2,757	215.37
162	肺癌	2	414	31.28	1	599	46.47	1	562	43.81	1	608	47.46	1	635	49.60
155	肝癌	1	436	32.94	2	495	38.40	2	445	34.69	2	518	40.43	2	488	38.12
153 154	結腸直腸癌	4	191	14.43	3	306	23.74	3	306	23.85	3	316	24.67	3	308	24.06
151	胃癌	3	212	16.02	4	198	15.36	4	236	18.40	4	240	18.73	4	214	16.72
185	攝護腺癌	11	51	3.85	5	122	9.46	5	133	10.37	6	129	10.07	5	136	10.62
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	66	4.99	7	91	7.06	8	115	8.96	7	112	8.74	6	129	10.08
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	73	5.52	5	122	9.46	6	133	10.37	5	147	11.47	7	117	9.14
150	食道癌	8	64	4.84	7	91	7.06	7	116	9.04	9	87	6.79	8	107	8.36
157	胰臟癌	9	63	4.76	9	89	6.90	9	103	8.03	8	96	7.49	9	91	7.11
156	膽囊癌	16	27	2.04	11	65	5.04	10	70	5.46	11	60	4.68	10	89	6.95
204-208	白血病	7	65	4.91	10	68	5.28	11	59	4.60	12	54	4.22	11	68	5.31
188	膀胱癌	12	42	3.17	12	62	4.81	13	45	3.51	13	50	3.90	12	65	5.08
147	鼻咽癌	9	63	4.76	13	55	4.27	12	59	4.60	10	65	5.07	13	63	4.92
191	腦癌	14	29	2.19	15	26	2.02	14	32	2.49	14	33	2.58	14	26	2.03
161	喉癌	15	28	2.12	16	18	1.40	15	20	1.56	16	20	1.56	15	19	1.48
	其他		153	11.56		187	14.51		196	15.28		160	12.49		202	15.78

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表48·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73		2,771	219.66		2,749	216.55		2,937	229.30		2,854	221.64		2,824	218.44
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54	1	617	48.91	1	639	50.34	1	633	49.42	1	610	47.37	1	588	45.48
C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30	2	443	35.12	2	474	37.34	2	475	37.08	2	485	37.67	2	447	34.58
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13	3	331	26.24	3	325	25.60	3	371	28.97	3	358	27.80	3	364	28.16
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73	5	144	11.41	5	132	10.40	5	176	13.74	6	155	12.04	6	151	11.68
C25	胰臟癌	7	114	8.95	7	126	9.99	7	111	8.74	8	123	9.60	7	123	9.55	7	133	10.29
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02	6	139	11.02	5	132	10.40	6	146	11.40	5	175	13.59	5	152	11.76
C16	胃癌	4	218	17.11	4	197	15.62	4	191	15.05	4	203	15.85	4	189	14.68	4	199	15.39
C15	食道癌	8	107	8.40	8	115	9.12	8	104	8.19	7	127	9.92	8	110	8.54	8	124	9.59
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96	9	102	8.09	9	94	7.40	9	86	6.71	9	80	6.21	9	92	7.12
C91-C95	白血病	9	76	5.96	10	65	5.15	10	63	4.96	10	71	5.54	10	70	5.44	12	55	4.25
C67	膀胱癌	12	57	4.47	11	63	4.99	11	53	4.18	12	55	4.29	11	57	4.43	10	66	5.11
C64	腎臟癌	14	26	2.04	14	39	3.09	12	48	3.78	15	37	2.89	14	39	3.03	14	32	2.48
C71	腦癌	14	26	2.04	13	41	3.25	13	42	3.31	13	44	3.44	13	46	3.57	15	30	2.32
C11	鼻咽癌	11	61	4.79	12	56	4.44	13	42	3.31	11	56	4.37	12	56	4.35	11	62	4.80
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43	15	30	2.38	15	32	2.52	14	40	3.12	15	28	2.17	13	45	3.48
	其他		253	19.85		263	20.85		267	21.03		294	22.95		273	21.20		284	21.97

表48·臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,855	220.37		2,920	225.92		2,774	215.76		2,926	229.01		2,946	232.57		2,837	227.08
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	589	45.46	1	626	48.43	1	605	47.06	1	629	49.23	1	615	48.55	1	593	47.47
C22	肝和肝內膽管癌	2	429	33.11	2	430	33.27	2	437	33.99	2	432	33.81	2	421	33.24	2	438	35.06
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	361	27.86	3	376	29.09	3	348	27.07	3	391	30.60	3	405	31.97	3	354	28.34
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	163	12.58	6	167	12.92	5	177	13.77	6	160	12.52	6	177	13.97	4	207	16.57
C25	胰臟癌	7	140	10.81	7	147	11.37	6	152	11.82	8	158	12.37	7	160	12.63	5	174	13.93
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	161	12.43	5	180	13.93	7	146	11.36	5	161	12.60	5	181	14.29	6	172	13.77
C16	胃癌	4	185	14.28	4	197	15.24	4	180	14.00	6	160	12.52	4	182	14.37	7	160	12.81
C15	食道癌	8	124	9.57	8	108	8.36	8	104	8.09	9	128	10.02	8	133	10.50	8	108	8.64
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	88	6.79	9	98	7.58	10	72	5.60	10	96	7.51	9	95	7.50	9	94	7.52
C91-C95	白血病	11	68	5.25	11	70	5.42	11	66	5.13	12	65	5.09	10	78	6.16	10	82	6.56
C67	膀胱癌	10	86	6.64	10	76	5.88	9	79	6.14	11	71	5.56	11	67	5.29	11	62	4.96
C64	腎臟癌	13	43	3.32	13	36	2.79	15	32	2.49	13	53	4.15	12	56	4.42	12	47	3.76
C71	腦癌	15	31	2.39	15	35	2.71	12	39	3.03	15	41	3.21	14	48	3.79	13	45	3.60
C11	鼻咽癌	12	61	4.71	12	45	3.48	13	38	2.96	14	44	3.44	13	49	3.87	14	36	2.88
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	14	37	2.86	13	36	2.79	14	33	2.57	16	29	2.27	15	33	2.61	15	32	2.56
	其他		289	22.31		293	22.67		266	20.69		308	24.11		246	19.42		233	18.65

表49·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		1,203	91.16		1,608	120.38		1,660	124.20		1,728	128.65		1,809	133.94
162	肺癌	1	201	15.23	1	281	21.04	1	308	23.05	1	302	22.48	1	352	26.06
153 154	結腸直腸癌	2	138	10.46	2	212	15.87	2	236	17.66	2	216	16.08	2	249	18.44
174	女性乳癌	3	135	10.23	3	203	15.20	3	224	16.76	3	209	15.56	3	203	15.03
155	肝癌	4	134	10.15	4	182	13.62	4	162	12.12	4	184	13.70	4	178	13.18
151	胃癌	5	116	8.79	5	113	8.46	5	118	8.83	5	123	9.16	5	115	8.51
179 180	子宮頸癌	6	108	8.18	6	87	6.51	6	86	6.43	7	81	6.03	6	89	6.59
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	11	26	1.97	10	57	4.27	7	66	4.94	9	63	4.69	7	88	6.52
157	胰臟癌	10	34	2.58	7	75	5.61	8	65	4.86	6	82	6.10	8	87	6.44
183	卵巢癌	7	44	3.33	9	58	4.34	10	50	3.74	8	73	5.43	9	74	5.48
156	膽囊癌	8	37	2.80	8	60	4.49	9	50	3.74	10	56	4.17	10	60	4.44
204-208	白血病	9	35	2.65	11	40	2.99	11	41	3.07	11	44	3.28	11	39	2.89
182	子宮體癌	19	8	0.61	14	22	1.65	13	22	1.65	13	25	1.86	12	26	1.93
188	膀胱癌	15	15	1.14	12	30	2.25	14	21	1.57	15	32	2.38	13	26	1.93
191	腦癌	12	23	1.74	13	24	1.80	12	25	1.87	16	22	1.64	14	20	1.48
150	食道癌	16	11	0.83	18	15	1.12	18	10	0.75	19	10	0.74	15	19	1.41
	其他		138	10.46		149	11.15		176	13.17		206	15.34		184	13.62

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表49·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		1,769	130.86		1,861	137.69		1,983	145.23		2,044	147.98		2,065	148.32		2,078	148.26
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78	1	373	27.60	1	375	27.46	1	385	27.87	1	378	27.15	1	404	28.82
C50	女性乳房癌	3	228	16.87	2	266	19.68	3	283	20.73	3	243	17.59	3	264	18.96	3	289	20.62
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31	3	239	17.68	2	284	20.80	2	277	20.05	2	273	19.61	2	302	21.55
C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76	4	201	14.87	4	198	14.50	4	222	16.07	4	215	15.44	4	219	15.62
C25	胰臟癌	6	78	5.77	6	85	6.29	5	120	8.79	6	109	7.89	6	108	7.76	5	124	8.85
C16	胃癌	5	94	6.95	5	110	8.14	6	94	6.88	5	126	9.12	5	126	9.05	6	113	8.06
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	8	58	4.29	8	66	4.88	8	65	4.76	7	88	6.37	7	85	6.11	7	84	5.99
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07	9	50	3.70	9	55	4.03	9	61	4.42	9	74	5.32	8	63	4.49
C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	7	75	5.55	7	71	5.25	7	74	5.42	8	63	4.56	8	80	5.75	9	58	4.14
C91-C95	白血病	10	45	3.33	10	42	3.11	10	49	3.59	10	39	2.82	10	43	3.09	10	43	3.07
C54	子宮體癌	12	28	2.07	12	29	2.15	11	34	2.49	12	35	2.53	11	39	2.80	11	35	2.50
C67	膀胱癌	14	23	1.70	11	32	2.37	15	25	1.83	13	30	2.17	14	27	1.94	14	27	1.93
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	11	35	2.59	15	22	1.63	11	34	2.49	11	37	2.68	15	25	1.80	13	31	2.21
C45-C49	間皮和軟組織癌	13	26	1.92	20	9	0.67	18	20	1.46	14	29	2.10	16	23	1.65	12	33	2.35
C64	腎臟癌	17	22	1.63	14	25	1.85	14	27	1.98	17	22	1.59	16	23	1.65	15	25	1.78
	其他		220	16.27		241	17.83		246	18.02		278	20.13		282	20.26		228	16.38

表49·臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		2,170	154.12		2,299	163.31		2,288	162.99		2,312	165.35		2,380	171.21		2,309	168.00
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	395	28.05	1	444	31.54	1	429	30.56	1	424	30.32	1	425	30.57	1	433	31.50
C50	女性乳房癌	3	288	20.45	2	302	21.45	2	323	23.01	2	321	22.96	2	378	27.19	2	354	25.76
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	325	23.08	3	299	21.24	3	322	22.94	3	314	22.46	3	316	22.73	3	313	22.77
C22	肝和肝內膽管癌	4	238	16.90	4	242	17.19	4	221	15.74	4	247	17.66	4	240	17.27	4	208	15.13
C25	胰臟癌	5	133	9.45	6	113	8.03	5	142	10.12	5	150	10.73	5	154	11.08	5	150	10.91
C16	胃癌	6	110	7.81	5	114	8.10	6	98	6.98	6	128	9.15	6	113	8.13	6	117	8.51
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	7	77	5.47	7	107	7.60	7	89	6.34	7	79	5.65	8	86	6.19	7	106	7.71
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	65	4.62	8	76	5.40	9	61	4.35	9	63	4.51	7	91	6.55	8	74	5.38
C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	8	70	4.97	9	72	5.11	8	76	5.41	8	66	4.72	11	62	4.46	9	68	4.95
C91-C95	白血病	11	40	2.84	10	63	4.48	11	49	3.49	10	59	4.22	10	63	4.53	10	59	4.29
C54	子宮體癌	10	42	2.98	11	47	3.34	10	59	4.20	11	54	3.86	9	65	4.68	11	56	4.07
C67	膀胱癌	13	31	2.20	13	32	2.27	12	37	2.64	13	38	2.72	14	33	2.37	12	42	3.06
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	12	36	2.56	15	27	1.92	16	27	1.92	16	32	2.29	15	29	2.09	13	38	2.76
C45-C49	間皮和軟組織癌	17	20	1.42	17	26	1.85	12	37	2.64	14	34	2.43	12	42	3.02	14	26	1.89
C64	腎臟癌	14	30	2.13	12	33	2.34	15	31	2.21	15	33	2.36	19	16	1.15	14	26	1.89
	其他		270	19.18		302	21.45		287	20.44		270	19.31		267	19.10		239	17.39

表50·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
96年	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		女性乳房癌		結腸、直腸和肛門癌		肝和肝內膽管癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌		胃癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	170.10	112.87	35.34	22.90	16.87	11.66	21.59	13.90	26.69	18.47	9.73	5.35	7.31	4.85	11.88	7.51
98年	174.48	111.24	36.98	22.87	17.49	11.55	22.64	14.01	25.43	16.63	11.22	5.88	9.06	5.74	12.20	7.31
99年	177.26	110.14	37.89	22.60	19.68	12.87	21.81	13.10	24.65	15.83	11.41	5.86	8.07	5.06	11.75	6.67
100年	179.59	109.78	38.48	22.83	20.73	13.50	23.11	13.85	25.50	15.95	10.40	5.12	8.77	5.30	10.82	6.21
101年	187.11	111.52	38.24	22.23	17.59	10.88	24.34	13.77	26.18	16.07	13.74	6.72	8.71	5.19	12.36	6.83
102年	183.55	106.98	36.87	20.72	18.96	11.90	23.55	13.36	26.12	15.44	12.04	5.87	8.62	4.89	11.75	6.27
103年	181.97	103.66	36.82	20.34	20.62	12.73	24.72	13.54	24.72	14.18	11.68	5.14	9.54	5.48	11.58	6.07
104年	185.87	102.84	36.40	19.68	20.45	12.15	25.37	13.41	24.67	13.72	12.58	5.97	10.10	5.60	10.91	5.80
105年	193.28	105.00	39.63	20.84	21.45	12.52	25.00	12.92	24.89	13.63	12.92	5.76	9.63	5.14	11.52	5.83
106年	188.21	98.69	38.45	19.62	23.01	13.39	24.91	12.56	24.47	12.91	13.77	6.11	10.93	5.72	10.34	4.98
107年	195.75	100.48	39.35	19.52	22.96	12.92	26.35	13.03	25.37	12.82	12.52	5.57	11.51	5.81	10.76	5.24
108年	200.47	99.46	39.14	18.55	27.19	14.81	27.14	12.95	24.88	12.14	13.97	6.02	11.82	5.73	11.10	5.14
109年	196.13	92.94	39.10	18.15	25.76	13.06	25.42	11.50	24.62	11.50	16.57	6.93	12.35	5.83	10.56	4.64

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表50·臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬人口

年別	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
96年	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年別	卵巢癌		口腔癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		子宮頸及部位未 明示子宮癌		食道癌		子宮體癌		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	4.29	2.96	4.99	3.43	4.99	3.18	4.61	3.42	5.55	3.62	4.57	3.16	2.07	1.42	3.05	1.83
98年	4.82	3.36	5.66	3.78	4.55	2.85	4.05	2.92	5.11	3.31	4.93	3.23	1.70	1.15	3.06	1.72
99年	4.88	3.21	5.78	3.90	5.82	3.39	4.09	2.78	5.25	3.39	5.24	3.43	2.15	1.46	3.64	1.97
100年	4.76	3.25	5.81	3.86	5.65	3.30	4.25	2.95	5.42	3.23	4.36	2.71	2.49	1.67	2.96	1.57
101年	6.37	4.09	6.35	3.97	5.52	3.30	4.13	2.87	4.56	2.87	5.00	3.13	2.53	1.53	3.19	1.57
102年	6.11	3.79	7.57	4.88	5.75	3.24	4.22	2.89	5.75	3.25	4.52	2.76	2.80	1.73	3.13	1.59
103年	5.99	3.60	6.46	3.97	5.75	3.29	3.64	2.35	4.14	2.27	5.01	3.04	2.50	1.48	3.45	1.72
104年	5.47	3.40	6.77	4.24	5.66	3.09	3.99	2.24	4.97	2.73	4.92	2.88	2.98	1.76	4.33	1.95
105年	7.60	4.52	7.70	4.65	6.44	3.29	4.93	3.01	5.11	3.07	4.56	2.68	3.34	1.85	4.00	1.96
106年	6.34	3.59	6.17	3.51	4.95	2.51	4.28	2.57	5.41	3.00	4.42	2.47	4.20	2.35	4.31	1.88
107年	5.65	3.30	6.58	3.65	5.94	2.89	4.63	2.76	4.72	2.53	5.23	2.92	3.86	2.03	4.07	1.69
108年	6.19	3.37	7.53	4.15	7.00	3.21	5.31	2.96	4.46	2.42	5.65	3.00	4.68	2.47	3.76	1.56
109年	7.71	4.28	7.01	3.77	6.40	2.91	5.37	2.53	4.95	2.50	4.61	2.36	4.07	2.04	3.96	1.67

表51·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤		口腔癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
96年	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌		口腔癌		胃癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	9.73	5.35	8.95	6.11	9.02	6.44	17.11	10.69
98年	211.03	134.11	47.09	28.32	35.47	24.25	24.57	15.19	11.22	5.88	10.82	6.77	10.75	7.48	16.04	9.38
99年	219.66	137.29	48.91	29.60	35.12	23.28	26.24	15.97	11.41	5.86	9.99	6.41	11.02	7.70	15.62	8.91
100年	216.55	132.95	50.34	30.02	37.34	24.12	25.60	15.83	10.40	5.12	8.74	5.44	10.40	7.26	15.05	8.67
101年	229.30	138.02	49.42	28.92	37.08	24.29	28.97	16.89	13.74	6.72	9.60	5.89	11.40	7.44	15.85	8.46
102年	221.64	130.87	47.37	26.87	37.67	23.37	27.80	16.17	12.04	5.87	9.55	5.59	13.59	9.10	14.68	7.83
103年	218.44	127.74	45.48	25.78	34.58	21.20	28.16	16.21	11.68	5.14	10.29	6.30	11.76	7.72	15.39	8.16
104年	220.37	127.13	45.46	25.93	33.11	19.76	27.86	15.56	12.58	5.97	10.81	6.52	12.43	8.20	14.28	7.92
105年	225.92	127.78	48.43	26.77	33.27	19.73	29.09	15.98	12.92	5.76	11.37	6.38	13.93	8.91	15.24	7.96
106年	215.76	117.67	47.06	25.64	33.99	19.44	27.07	14.86	13.77	6.11	11.82	6.62	11.36	6.86	14.00	6.91
107年	229.01	123.42	49.23	25.77	33.81	18.59	30.60	16.16	12.52	5.57	12.37	6.92	12.60	7.36	12.52	6.40
108年	232.57	121.16	48.55	24.65	33.24	18.07	31.97	16.38	13.97	6.02	12.63	6.35	14.29	8.37	14.37	7.08
109年	227.08	113.41	47.47	23.62	35.06	17.73	28.34	13.77	16.57	6.93	13.93	7.13	13.77	7.79	12.81	5.83

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表51·臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬男性人口

年別	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
96年	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99
年別	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		膀胱癌		腎臟癌		腦癌		鼻咽癌		膽囊和其他 膽道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	8.40	5.90	5.96	3.65	5.96	4.28	4.47	2.62	2.04	1.37	2.04	1.86	4.79	3.61	2.43	1.62
98年	8.61	5.89	6.08	3.83	5.06	3.61	4.42	2.44	3.00	2.05	2.77	2.07	3.87	2.83	3.00	1.81
99年	9.12	6.19	8.09	4.61	5.15	3.38	4.99	2.63	3.09	1.93	3.25	2.40	4.44	2.99	2.38	1.64
100年	8.19	5.30	7.40	4.35	4.96	3.26	4.18	2.13	3.78	2.13	3.31	2.45	3.31	2.41	2.52	1.41
101年	9.92	6.46	6.71	4.13	5.54	3.72	4.29	1.98	2.89	1.69	3.44	2.54	4.37	2.97	3.12	1.97
102年	8.54	5.40	6.21	3.43	5.44	3.73	4.43	2.33	3.03	1.89	3.57	2.43	4.35	3.02	2.17	1.15
103年	9.59	6.04	7.12	4.12	4.25	2.91	5.11	2.60	2.48	1.44	2.32	1.78	4.80	3.28	3.48	2.09
104年	9.57	5.93	6.79	3.90	5.25	3.07	6.64	3.08	3.32	1.95	2.39	1.56	4.71	3.19	2.86	1.64
105年	8.36	5.13	7.58	4.09	5.42	3.38	5.88	3.11	2.79	1.52	2.71	2.10	3.48	2.28	2.79	1.49
106年	8.09	4.81	5.60	2.88	5.13	3.02	6.14	2.72	2.49	1.25	3.03	1.77	2.96	1.94	2.57	1.29
107年	10.02	5.87	7.51	4.01	5.09	3.20	5.56	2.53	5.56	2.53	3.21	2.14	3.44	2.27	2.27	1.08
108年	10.50	5.97	7.50	3.75	6.16	3.48	5.29	2.40	5.29	2.40	3.79	2.33	3.87	2.52	2.61	1.22
109年	8.64	4.62	7.52	3.60	6.56	3.25	4.96	2.32	3.76	1.88	3.60	2.45	2.88	1.65	2.56	1.30

表52·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
96年	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63
年別	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		女性乳房癌		結腸、直腸和肛門癌		肝和肝內膽管癌		胰臟癌		胃癌		卵巢癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	130.86	87.54	24.78	16.27	16.87	11.66	17.31	11.20	15.76	10.79	5.77	3.76	6.95	4.47	4.29	2.96
98年	140.20	90.07	27.49	17.54	17.49	11.55	20.82	12.92	16.01	9.98	7.41	4.75	8.60	5.30	4.82	3.36
99年	137.69	85.62	27.60	16.36	19.68	12.87	17.68	10.57	14.87	9.27	6.29	3.86	8.14	4.62	4.88	3.21
100年	145.23	89.19	27.46	16.41	20.73	13.50	20.80	12.16	14.50	8.92	8.79	5.20	6.88	3.97	4.76	3.25
101年	147.98	88.40	27.87	16.31	17.59	10.88	20.05	11.11	16.07	9.11	7.89	4.57	9.12	5.32	6.37	4.09
102年	148.32	86.24	27.15	15.36	18.96	11.90	19.61	10.93	15.44	8.66	7.76	4.29	9.05	4.87	6.11	3.79
103年	148.33	83.07	28.82	15.72	20.62	12.73	21.55	11.34	15.62	8.23	8.85	4.80	8.06	4.26	5.99	3.60
104年	154.12	82.57	28.05	14.50	20.45	12.15	23.08	11.66	16.90	8.63	9.45	4.82	7.81	4.04	5.47	3.40
105年	163.31	85.94	31.54	15.98	21.45	12.52	21.24	10.44	17.19	8.52	8.03	4.09	8.10	4.05	7.60	4.52
106年	162.99	83.14	30.56	14.70	23.01	13.39	22.94	10.72	15.74	7.43	10.12	4.97	6.98	3.37	6.34	3.59
107年	165.35	81.96	30.32	14.52	22.96	12.92	22.46	10.47	17.66	8.01	10.73	4.87	9.15	4.27	5.65	3.30
108年	171.21	82.22	30.57	13.65	27.19	14.81	22.73	10.28	17.27	7.25	11.08	5.21	8.13	3.59	6.19	3.37
109年	168.00	76.76	31.50	13.78	25.76	13.06	22.77	9.69	15.13	6.37	10.91	4.75	8.51	3.78	7.71	4.28

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表52·臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人/每十萬女性人口

年別	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
84年	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
96年	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94
年別	非何杰金氏淋巴瘤		子宮頸及部位未明示子宮癌		白血病		子宮體癌		膀胱癌		膽囊和其他膽道癌		間皮和軟組織癌		腎臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97年	4.07	2.73	5.55	3.62	3.33	2.61	2.07	1.42	1.70	1.05	2.59	1.68	1.92	1.35	1.63	1.05
98年	3.11	1.96	5.11	3.31	3.11	2.22	1.70	1.15	1.78	1.03	2.59	1.67	1.19	0.81	1.85	1.14
99年	3.70	2.25	5.25	3.39	3.11	2.19	2.15	1.46	2.37	1.32	1.63	1.02	0.67	0.39	1.85	1.12
100年	4.03	2.32	5.42	3.23	3.59	2.67	2.49	1.67	1.83	1.03	2.49	1.52	1.46	1.02	1.98	1.11
101年	4.42	2.61	4.56	2.87	2.82	2.11	2.53	1.53	2.17	1.16	2.68	1.48	2.10	1.72	1.59	0.90
102年	5.32	3.09	5.75	3.25	3.09	2.15	2.80	1.73	1.94	0.96	1.80	0.98	1.65	0.97	1.65	0.92
103年	4.49	2.57	4.14	2.27	3.07	1.81	2.50	1.48	1.93	0.95	2.21	1.15	2.35	1.53	1.78	1.00
104年	4.62	2.40	4.97	2.73	2.84	1.50	2.98	1.76	2.20	0.98	2.56	1.24	1.42	0.77	2.13	1.08
105年	5.40	2.59	5.11	3.07	4.48	2.69	3.34	1.85	2.27	1.02	1.92	0.88	1.85	1.05	2.34	1.20
106年	4.35	2.20	5.41	3.00	3.49	2.23	4.20	2.35	2.64	1.17	1.92	0.92	2.64	1.58	2.21	1.05
107年	4.51	1.96	4.72	2.53	4.22	2.39	3.86	2.03	2.72	1.03	2.29	1.04	2.43	1.33	2.36	1.06
108年	6.55	2.75	4.46	2.42	4.53	2.55	4.68	2.47	2.37	0.89	2.09	0.92	3.02	1.68	1.15	0.49
109年	5.38	2.36	4.95	2.50	4.29	1.92	4.07	2.04	3.06	1.17	2.76	1.10	1.89	1.17	1.89	0.71

表53-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		797	375.45	416.72		960	466.52	338.51		1,024	494.61	338.43		963	461.29	311.91		1,011	480.96	304.56
08-14	惡性腫瘤	1	224	105.52	113.20	1	304	147.73	109.05	1	313	151.18	108.08	1	345	165.26	112.76	1	332	157.94	103.23
25-27-28*	心臟疾病	3	91	42.87	49.51	2	101	49.08	33.77	2	134	64.72	42.17	2	104	49.82	31.91	2	108	51.38	31.42
29	腦血管疾病	2	103	48.52	52.72	3	81	39.36	27.79	3	91	43.95	28.56	3	73	34.97	21.58	3	86	40.91	24.13
181	糖尿病	4	42	19.79	21.41	4	62	30.13	20.77	4	67	32.36	21.59	4	65	31.14	18.86	4	79	37.58	22.53
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	26	12.25	14.34	7	27	13.12	13.86	7	33	15.94	10.849	8	26	12.45	7.48	5	41	19.50	10.66
321	肺炎	6	27	12.72	14.99	5	42	20.41	12.21	5	41	19.80	12.18	7	28	13.41	7.73	6	37	17.60	8.94
E54	自殺	10	17	8.01	7.75	9	18	8.75	7.03	9	20	9.66	8.07	6	30	14.37	12.01	7	29	13.80	11.28
E47-E53	事故傷害	5	30	14.13	14.38	6	38	18.47	12.94	6	35	16.91	14.15	5	34	16.29	14.98	8	26	12.37	12.27
347	慢性肝病及肝硬化	8	21	9.89	10.64	8	20	9.72	7.26	8	22	10.63	7.03	8	26	12.45	8.54	9	17	8.09	5.56
038	敗血症	12	7	3.30	3.52	12	9	4.37	3.10	11	10	4.83	3.01	15	3	1.44	0.92	10	14	6.66	3.41
	其他		209	98.45	114.26		258	125.38	90.73		258	124.62	82.74		229	109.69	75.15		242	115.13	71.13

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,057	502.04	305.11		1,189	565.04	287.52		1,239	588.25	288.15		1,237	587.91	282.34		1,357	649.22	294.60
C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34	90.74	1	369	175.36	96.84	1	389	184.69	101.25	1	380	180.60	94.62	1	414	198.07	103.45
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	140	66.50	37.91	2	160	76.04	34.94	2	139	65.99	32.19	2	195	92.68	43.14	2	183	87.55	38.28
J12-J18	肺炎	4	63	29.92	17.22	4	53	25.19	10.11	5	68	32.29	13.00	4	70	33.27	14.19	3	108	51.67	17.81
I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32	24.08	3	92	43.72	20.30	3	95	45.10	20.54	3	91	43.25	18.27	4	93	44.49	18.64
E10-E14	糖尿病	5	49	23.27	13.53	5	47	22.34	11.00	4	70	33.23	15.94	5	62	29.47	13.07	5	55	26.31	9.98
F01-F03	血管性及未明示 之癡呆症	27	1	0.47	0.20	15	10	4.75	1.67	12	15	7.12	2.37	13	17	8.08	2.64	10	29	13.87	3.98
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	27	12.82	6.32	8	33	15.68	5.89	8	39	18.52	7.34	8	35	16.63	5.68	7	43	20.57	7.57
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	31	14.72	8.71	10	29	13.78	6.51	6	50	23.74	11.25	7	39	18.54	7.65	8	36	17.22	6.87
I10-I15	高血壓性疾病	7	37	17.57	9.93	7	37	17.58	6.60	7	46	21.84	8.35	6	43	20.44	8.33	11	27	12.92	4.48
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	22	10.45	8.37	9	32	15.21	11.52	10	25	11.87	6.10	9	26	12.36	7.73	9	35	16.74	12.31
	其他		294	139.64	88.10		327	155.40	82.14		303	143.86	69.82		279	132.60	67.02		334	158.98	71.23

表53-1·臺北市松山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,357	649.22	294.60		1,315	633.26	277.91		1,351	654.73	281.89		1,296	632.36	263.45		1,253	619.52	247.81
C00-C97	惡性腫瘤	1	414	198.07	103.45	1	396	190.70	93.31	1	408	197.73	94.36	1	360	175.65	79.85	1	394	194.80	88.03
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	183	87.55	38.28	2	193	92.94	37.14	2	198	95.96	35.58	2	220	107.34	39.20	2	176	87.02	31.46
J12-J18	肺炎	3	108	51.67	17.81	3	115	55.38	18.76	3	147	71.24	22.28	3	140	68.31	22.04	3	118	58.34	19.75
I60-I69	腦血管疾病	4	93	44.49	18.64	4	82	39.49	16.03	4	95	46.04	19.58	4	70	34.16	12.91	4	80	39.55	13.49
E10-E14	糖尿病	5	55	26.31	9.98	5	52	25.04	10.70	5	52	25.20	8.33	5	52	25.37	9.71	5	43	21.26	7.72
F01-F03	血管性及未明示 之癡呆症	10	29	13.87	3.98	9	30	14.45	4.28	14	15	7.27	2.19	11	22	10.73	2.99	6	36	17.80	4.38
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	43	20.57	7.57	8	36	17.34	5.59	7	30	14.54	4.88	7	33	16.10	5.29	7	35	17.30	5.65
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	36	17.22	6.87	7	40	19.26	7.41	6	33	15.99	5.48	8	31	15.13	5.44	8	31	15.33	4.88
I10-I15	高血壓性疾病	11	27	12.92	4.48	10	29	13.97	4.80	11	20	9.69	3.63	10	28	13.66	5.00	9	28	13.84	4.49
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	35	16.74	12.31	11	24	11.56	6.83	9	22	10.66	6.83	8	31	15.13	10.40	10	27	13.35	7.19
	其他		334	159.79	71.23		318	153.14	73.06		331	160.41	78.75		309	150.77	70.63		285	140.91	60.77

表53-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,176	479.31	492.27		1,331	569.90	390.54		1,366	589.70	386.92		1,271	549.91	341.85		1,363	592.17	355.26
08-14	惡性腫瘤	1	303	123.50	121.50	1	373	159.71	112.37	1	430	185.63	126.68	1	401	173.50	113.16	1	427	185.51	116.31
25-27-28*	心臟疾病	2	121	49.32	50.71	2	178	76.22	47.58	3	159	68.64	40.03	2	134	57.98	33.71	2	167	72.55	41.68
29	腦血管疾病	3	120	48.91	48.82	3	115	49.24	32.06	2	163	70.37	43.54	3	105	45.43	27.28	3	133	57.78	30.89
181	糖尿病	5	59	24.05	23.40	4	74	31.69	21.30	4	80	34.54	21.74	3	105	45.43	28.66	4	76	33.02	19.69
321	肺炎	6	48	19.56	20.44	6	52	22.27	13.10	5	51	22.02	12.46	5	61	26.39	13.52	5	65	28.24	14.85
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	33	13.45	13.33	5	59	25.26	16.94	6	50	21.58	13.21	6	45	19.47	11.14	6	40	17.38	10.28
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.67	14.26	9	32	13.70	10.13	8	31	13.38	19.42	9	23	9.95	7.05	7	29	12.60	8.38
E54	自殺	11	16	6.52	5.99	8	35	14.99	11.81	7	45	19.43	15.35	7	40	17.31	13.73	8	27	11.73	8.86
E47-E53	事故傷害	4	81	33.01	31.34	7	39	16.70	12.87	9	27	11.66	9.75	8	28	12.11	8.83	9	24	10.43	7.17
26	高血壓性疾病	8	34	13.86	14.56	10	21	8.99	5.56	10	18	7.77	5.02	10	17	7.36	3.49	10	15	6.52	3.79
	其他		325	132.46	147.92		353	151.15	106.82		312	134.69	79.72		312	134.99	81.28		360	156.40	93.36

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77	350.41		1,513	666.11	345.11		1,425	624.68	320.26		1,475	643.89	316.23		1,476	643.32	319.90
C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88	110.89	1	455	200.32	109.20	1	447	195.95	107.17	1	433	189.02	104.37	1	436	190.03	102.25
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	181	79.28	43.10	2	184	81.01	39.29	2	172	75.40	34.24	2	191	83.38	39.14	2	191	83.38	39.14
J12-J18	肺炎	4	87	38.10	19.25	4	94	41.38	17.44	4	76	33.32	13.20	3	127	55.44	20.93	3	127	55.44	20.93
I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37	27.10	3	99	43.59	21.34	3	103	45.15	19.20	4	101	44.09	20.21	4	101	44.09	20.21
E10-E14	糖尿病	5	51	22.34	12.74	5	63	27.74	15.04	5	70	30.69	14.99	5	69	30.12	15.06	5	69	30.12	15.06
I10-I15	高血壓性疾病	9	41	17.96	9.81	9	47	20.69	9.14	10	29	12.71	5.83	10	31	13.53	6.04	10	31	13.53	6.04
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	45	19.71	9.97	6	59	25.98	11.23	6	49	21.48	8.64	7	54	23.57	8.62	7	54	23.57	8.62
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	47	20.59	11.95	8	52	22.89	11.17	6	49	21.48	10.04	6	62	27.07	12.10	6	62	27.07	12.10
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	34	14.89	11.03	10	33	14.53	10.92	9	33	14.47	9.82	9	39	17.02	12.21	9	39	17.02	12.21
F01-F03	血管性及未明示 之癡呆症	19	6	2.63	1.10	14	9	3.96	1.46	19	7	3.07	0.99	14	15	6.55	2.18	14	15	6.55	2.18
	其他		338	148.04	93.47		418	184.03	98.88		390	170.97	96.14		353	154.10	75.37		351	152.99	81.16

表53-2·臺北市信義區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,635	715.48	333.55		1,567	690.95	308.54		1,592	708.88	308.17		1,618	729.77	316.75		1,500	689.24	283.30
C00-C97	惡性腫瘤	1	488	213.55	109.72	1	445	196.22	95.89	1	464	206.61	98.29	1	497	224.16	105.50	1	470	215.96	94.87
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	224	98.02	44.76	2	237	104.50	43.78	2	266	118.44	47.69	2	249	112.31	44.28	2	250	114.87	42.57
J12-J18	肺炎	3	125	54.70	21.82	3	126	55.56	19.90	3	142	63.23	20.95	3	157	70.81	22.33	3	139	63.87	20.70
I60-I69	腦血管疾病	4	90	39.38	17.52	4	110	48.50	20.81	4	99	44.08	16.73	4	104	46.91	19.60	4	78	35.84	14.36
E10-E14	糖尿病	5	72	31.51	13.81	5	74	32.63	14.03	6	53	23.60	9.64	6	60	27.06	11.79	5	66	30.33	11.30
I10-I15	高血壓性 疾病	9	38	16.63	7.06	9	36	15.87	6.10	9	31	13.80	5.32	13	24	10.82	3.68	6	41	18.84	7.14
J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	8	54	23.63	8.83	6	53	23.37	7.94	8	42	18.70	6.17	7	42	18.94	7.08	6	41	18.84	6.36
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	6	60	26.26	11.10	7	48	21.17	8.53	5	71	31.61	12.24	5	65	29.32	10.73	6	41	18.84	6.51
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	28	12.25	8.44	10	34	14.99	10.24	9	31	13.80	8.34	8	34	15.34	8.84	9	37	17.00	10.74
F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	11	32	14.00	4.09	8	38	16.76	5.07	13	17	7.57	2.52	11	27	12.18	3.72	10	31	14.24	4.38
	其他		424	185.54	86.41		366	161.38	76.26		376	167.42	80.30		359	161.92	79.21		306	140.60	64.37

表53-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,416	424.70	386.23		1,584	506.42	319.61		1,638	524.39	311.95		1,546	493.66	282.16		1,598	508.03	276.93
08-14	惡性腫瘤	1	410	122.97	110.66	1	527	168.49	111.30	1	501	160.39	99.34	1	495	158.06	94.53	1	473	150.37	90.00
25-27-28*	心臟疾病	2	184	55.19	49.75	2	210	67.14	37.16	2	225	72.03	38.67	2	174	55.56	29.16	2	194	61.68	29.86
29	腦血管疾病	3	169	50.69	44.05	3	126	40.28	24.35	3	142	45.46	25.58	3	121	38.64	19.87	3	145	46.10	21.44
181	糖尿病	5	74	22.19	19.74	4	107	34.21	20.70	4	106	33.94	18.87	4	105	33.53	17.42	4	118	37.51	20.00
321	肺炎	6	49	14.70	13.12	6	51	16.31	8.49	5	89	28.49	13.64	6	46	14.69	6.57	5	78	24.80	10.89
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	45	13.50	12.67	5	63	20.14	11.99	6	78	24.97	13.24	5	58	18.52	10.25	6	61	19.39	9.48
E47-E53	事故傷害	4	80	23.99	22.73	7	43	13.75	12.35	7	44	14.09	11.96	8	37	11.81	10.00	7	37	11.76	8.98
E54	自殺	9	24	7.20	6.30	8	35	11.19	8.30	8	40	12.81	9.30	7	40	12.77	10.22	8	36	11.45	8.61
038	敗血症	12	10	3.00	2.79	12	11	3.52	2.03	14	6	1.92	0.86	11	22	7.02	3.41	9	25	7.95	3.58
347	慢性肝病及肝硬化	10	22	6.60	5.76	9	25	7.99	5.42	9	30	9.60	6.77	8	37	11.81	7.33	10	22	6.99	3.78
	其他		349	104.68	98.66		386	123.41	77.52		377	120.69	73.73		411	131.24	73.39		409	130.03	70.31

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51	288.84		1,818	579.65	270.29		1,846	589.03	265.06		2,054	655.12	289.90		1,962	626.09	259.39
C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36	90.51	1	580	184.93	94.20	1	582	185.71	94.86	1	593	189.14	93.05	1	565	180.29	83.82
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	237	75.39	36.28	2	210	66.96	29.84	2	269	85.83	35.58	2	317	101.11	41.22	2	275	87.75	32.15
J12-J18	肺炎	4	92	29.26	11.80	4	96	30.61	10.66	4	89	28.40	8.98	4	120	38.27	13.38	4	128	40.85	13.41
I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67	20.32	3	153	48.78	20.61	3	136	43.40	16.86	3	148	47.20	19.41	3	139	44.36	16.37
E10-E14	糖尿病	5	74	23.54	12.29	6	70	22.32	9.47	5	87	27.76	11.66	5	96	30.62	12.21	5	80	25.53	9.71
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	55	17.49	8.53	9	60	19.13	7.70	10	43	13.72	5.16	8	58	18.50	6.53	6	72	22.98	8.81
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6	63	20.04	8.79	7	68	21.68	7.68	6	72	22.97	8.55	6	85	27.11	9.44	7	71	22.66	7.81
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	45	14.31	10.65	10	46	14.67	8.01	9	44	14.04	9.85	9	44	14.03	9.46	10	45	14.36	8.07
I10-I15	高血壓性疾病	9	45	14.31	6.48	8	67	21.36	7.81	8	46	14.68	5.13	7	67	21.37	7.27	8	56	17.87	6.33
F01-F03	血管性及未明示 之癡呆症	17	12	3.82	1.41	16	14	4.46	1.41	11	24	7.66	2.48	12	28	8.93	2.74	11	35	11.17	3.09
	其他		460	146.32	81.78		454	144.75	72.90		454	144.87	65.95		498	158.84	75.19		496	158.28	69.82

表53-3·臺北市大安區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		2,090	669.27	275.35		2,060	662.94	263.06		2,092	676.13	266.08		2,139	693.95	269.04		1,871	613.17	221.36
C00-C97	惡性腫瘤	1	616	197.26	91.83	1	601	193.41	87.90	1	580	187.46	84.68	1	656	212.82	96.05	1	546	178.94	74.43
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	323	103.43	37.90	2	337	108.45	39.88	2	388	125.40	42.38	2	339	109.98	37.48	2	322	105.53	34.31
J12-J18	肺炎	3	128	40.99	12.73	3	157	50.52	15.29	3	170	54.94	15.72	3	215	69.75	20.03	3	161	52.76	14.90
I60-I69	腦血管疾病	4	120	38.43	14.57	4	144	46.34	16.19	4	147	47.51	15.87	4	129	41.85	14.33	4	112	36.70	11.66
E10-E14	糖尿病	5	90	28.82	11.05	5	81	26.07	9.27	5	65	21.01	7.11	5	83	26.93	9.49	5	92	30.15	10.02
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	78	24.98	8.92	6	64	20.60	6.77	7	54	17.45	6.51	6	66	21.41	7.26	6	58	19.01	6.50
J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	7	59	18.89	6.29	9	46	14.80	4.22	6	63	20.36	6.06	9	45	14.60	3.96	7	45	14.75	3.99
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	47	15.05	8.34	9	46	14.80	7.13	9	49	15.84	8.76	10	38	12.33	7.38	8	44	14.42	7.66
I10-I15	高血壓性 疾病	12	35	11.21	3.57	7	52	16.73	6.21	11	34	10.99	3.62	8	51	16.55	5.86	9	43	14.09	4.73
F01-F03	血管性及未明 示之癡呆症	12	35	11.21	2.91	11	38	12.23	3.07	12	24	7.76	1.91	7	53	17.19	4.33	10	35	11.47	2.55
	其他		559	179.00	77.23		494	158.98	67.13		518	167.42	73.46		464	150.53	62.88		413	135.35	50.61

表53-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		987	440.48	464.15		1,123	517.67	383.52		1,178	543.14	389.31		1,106	506.77	348.65		1,230	561.56	369.71
08-14	惡性腫瘤	1	289	128.97	131.63	1	370	170.56	126.90	1	374	172.44	123.37	1	351	160.83	110.34	1	384	175.32	114.11
25-27-28*	心臟疾病	2	124	55.34	58.98	2	154	70.99	50.46	2	146	67.32	45.60	2	138	63.23	42.24	2	147	67.11	42.14
29	腦血管疾病	3	106	47.31	50.82	3	83	38.26	27.41	3	102	47.03	31.46	3	105	48.11	30.71	3	109	49.76	32.01
181	糖尿病	5	47	20.98	21.96	4	71	32.73	23.36	4	91	41.96	28.41	4	71	32.53	21.35	4	86	39.26	24.71
321	肺炎	7	32	14.28	16.79	5	35	16.13	11.39	5	49	22.59	15.23	6	48	21.99	13.75	5	67	30.59	19.15
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	25	11.16	12.71	7	31	14.29	10.64	7	36	16.60	11.06	7	27	12.37	8.36	6	44	20.09	12.40
E47-E53	事故傷害	4	64	28.56	27.70	9	27	12.45	10.51	8	33	15.22	13.40	8	23	10.54	10.43	7	31	14.15	12.47
E54	自殺	10	20	8.93	7.81	5	35	16.13	12.80	6	44	20.29	17.34	5	49	22.45	18.01	8	29	13.24	10.66
347	慢性肝病及肝硬化	6	37	16.51	16.04	8	30	13.83	10.25	9	27	12.45	9.08	9	22	10.08	7.12	9	23	10.50	7.34
038	敗血症	15	4	1.79	2.11	12	5	2.30	1.58	10	15	6.92	4.44	11	11	5.04	3.61	10	21	9.59	6.23
	其他		239	106.66	117.60		282	129.99	98.22		261	120.34	89.92		261	119.59	82.73		289	131.94	88.49

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,264	578.06	365.58		1,412	626.49	346.62		1,350	592.87	320.24		1,431	623.19	331.74		1,416	613.19	316.50
C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70	114.39	1	430	190.79	112.43	1	412	180.94	103.00	1	427	185.96	103.84	1	424	183.61	101.41
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	167	76.37	45.89	2	153	67.89	36.01	2	173	75.98	40.31	2	208	90.58	47.38	2	179	77.52	39.13
J12-J18	肺炎	4	70	32.01	18.02	4	78	34.61	15.94	4	76	33.38	15.08	4	74	32.23	14.80	4	83	35.94	15.37
I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22	31.21	3	96	42.59	21.64	3	88	38.65	19.42	3	101	43.98	22.72	3	94	40.71	19.04
E10-E14	糖尿病	5	69	31.56	19.49	5	75	33.28	18.00	5	65	28.55	15.01	5	68	29.61	15.11	5	58	25.12	11.55
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	36	16.46	9.55	6	59	26.18	14.46	10	33	14.49	7.41	7	47	20.47	9.35	6	50	21.65	9.96
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	30	13.72	7.78	9	46	20.41	9.97	7	52	22.84	10.29	6	53	23.08	10.20	7	49	21.22	8.48
I10-I15	高血壓性疾病	11	25	11.43	6.27	7	54	23.96	11.71	6	57	25.03	12.51	8	42	18.29	8.27	9	39	16.89	7.40
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	32	14.63	10.88	11	37	16.42	12.07	11	21	9.22	6.62	10	30	13.06	10.14	12	29	12.56	9.44
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	18	8.23	6.75	10	38	16.86	11.08	7	52	22.84	14.73	12	27	11.76	7.11	8	42	18.19	13.30
	其他		323	147.72	95.35		346	153.52	83.31		321	140.97	75.86		354	154.16	82.82		369	159.79	81.42

表53-4·臺北市中山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,527	660.19	318.27		1,542	667.59	322.93		1,595	693.23	321.10		1,563	684.26	301.12		1,482	656.82	277.68
C00-C97	惡性腫瘤	1	486	210.12	110.82	1	467	202.18	103.96	1	464	201.67	100.03	1	464	203.13	94.85	1	483	214.07	98.28
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	220	95.12	43.09	2	250	108.24	46.02	2	265	115.18	49.75	2	244	106.82	43.37	2	239	105.92	40.45
J12-J18	肺炎	3	119	51.45	21.68	3	131	56.72	22.13	3	148	64.32	25.02	3	184	80.55	29.61	3	135	59.83	21.36
I60-I69	腦血管疾病	4	90	38.91	16.02	4	106	45.89	21.22	4	90	39.12	17.20	4	87	38.09	15.29	4	89	39.44	16.87
E10-E14	糖尿病	5	68	29.40	12.97	5	52	22.51	9.71	6	63	27.38	12.79	5	51	22.33	9.83	5	54	23.93	9.73
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	43	18.59	8.27	6	49	21.21	9.25	5	70	30.42	12.67	6	49	21.45	8.79	6	41	18.17	6.96
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	39	16.86	7.03	6	49	21.21	8.13	9	37	16.08	6.06	8	36	15.76	5.43	7	40	17.73	6.16
I10-I15	高血壓性疾病	11	33	14.27	6.77	10	32	13.85	6.45	8	38	16.52	7.19	10	32	14.01	5.09	8	35	15.51	5.21
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	35	15.13	9.75	14	18	7.79	5.84	11	28	12.17	8.92	10	32	14.01	10.15	9	26	11.52	7.71
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	38	16.43	9.16	8	42	18.18	12.50	7	49	21.30	12.47	7	47	20.58	12.55	10	23	10.19	5.24
	其他		356	153.91	72.72		346	149.80	77.72		343	149.08	69.00		337	147.53	66.17		317	140.49	59.71

表53-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		786	454.91	404.71		858	539.48	342.76		892	564.88	349.02		843	533.65	316.60		874	549.53	305.47
08-14	惡性腫瘤	1	244	141.22	125.31	1	245	154.05	101.80	1	282	178.58	117.47	1	267	169.02	105.69	1	258	162.22	96.45
25-27-28*	心臟疾病	3	77	44.57	38.37	2	113	71.05	41.02	2	102	64.59	37.30	2	80	50.64	26.31	2	86	54.07	27.11
29	腦血管疾病	2	86	49.77	43.48	3	89	55.96	32.15	3	88	55.73	34.22	3	62	39.25	21.31	3	75	47.16	23.89
181	糖尿病	4	39	22.57	19.47	4	59	37.10	23.32	4	58	36.73	21.53	4	53	33.55	18.87	4	58	36.47	19.78
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	20	11.58	10.08	5	34	21.38	12.02	7	23	14.57	7.59	6	31	19.62	11.00	5	52	32.70	16.17
321	肺炎	7	27	15.63	14.22	6	24	15.09	7.71	5	30	19.00	10.17	5	51	32.28	15.33	6	38	23.89	11.51
E47-E53	事故傷害	5	32	18.52	17.29	8	21	13.20	9.44	6	24	15.20	13.39	8	25	15.83	13.12	7	25	15.72	12.26
E54	自殺	11	8	4.63	4.35	7	22	13.83	11.94	8	19	12.03	9.39	9	24	15.19	14.32	8	22	13.83	11.16
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	15.63	14.81	8	21	13.20	9.72	9	18	11.40	7.39	7	26	16.46	8.94	9	17	10.69	7.29
26	高血壓性疾病	6	30	17.36	15.38	10	11	6.92	3.65	10	10	6.33	3.06	10	14	8.86	4.73	10	10	6.29	2.79
	其他		196	113.44	101.95		219	137.70	89.99		238	150.72	87.49		210	132.94	76.99		233	146.50	77.06

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		957	600.33	331.54		999	617.42	308.90		892	548.43	264.45		1,093	669.47	321.84		1,097	673.29	314.63
C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07	111.73	1	305	188.50	106.54	1	248	152.48	79.50	1	291	178.24	95.13	1	317	194.56	100.26
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	127	79.67	42.36	2	129	79.73	35.84	2	121	74.39	35.70	2	179	109.64	49.31	2	148	90.84	39.66
J12-J18	肺炎	4	70	43.91	19.59	4	71	43.88	17.63	3	76	46.73	16.61	4	78	47.78	17.15	3	77	47.26	17.86
I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54	21.19	3	73	45.12	19.35	4	57	35.05	15.18	3	94	57.58	25.41	4	67	41.12	18.43
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	22	13.80	6.08	8	32	19.78	7.95	6	31	19.06	8.15	6	33	20.21	8.31	6	48	29.46	10.52
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	35	21.96	10.66	8	32	19.78	9.49	6	31	19.06	8.02	6	33	20.21	8.65	9	29	17.80	7.34
E10-E14	糖尿病	7	30	18.82	10.26	7	39	24.10	10.72	5	47	28.90	13.51	5	45	27.56	12.75	5	51	31.30	14.19
I10-I15	高血壓性疾病	10	19	11.92	5.90	5	42	25.96	11.46	9	23	14.14	6.39	10	28	17.15	6.58	8	31	19.03	6.93
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	13.17	11.18	10	24	14.83	10.38	8	24	14.76	9.22	9	29	17.76	10.02	10	28	17.19	12.65
F01-F03	血管性及未明示 之癡呆症	23	2	1.25	0.48	14	9	5.56	1.81	15	9	5.53	1.68	13	16	9.80	3.21	11	25	15.34	4.48
	其他		257	161.22	92.11		243	150.18	77.73		225	138.34	70.49		267	163.54	85.32		276	169.40	82.31

表53-5·臺北市中正區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,088	673.94	307.29		1,052	657.48	285.57		1,043	654.72	291.54		1,068	673.79	283.86		1,017	648.99	268.32
C00-C97	惡性腫瘤	1	314	194.50	102.13	1	295	184.37	91.80	1	298	187.06	92.71	1	301	189.90	91.27	1	280	178.68	82.22
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	151	93.53	37.73	2	167	104.37	41.79	2	157	98.55	37.03	2	156	98.42	38.30	2	154	98.27	38.96
J12-J18	肺炎	4	67	41.50	14.43	3	77	48.12	16.72	3	91	57.12	19.50	3	135	85.17	27.42	3	93	59.35	18.65
I60-I69	腦血管疾病	3	79	48.93	19.99	3	77	48.12	19.73	4	70	43.94	16.30	4	79	49.84	20.23	4	73	46.58	18.96
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	40	24.78	9.15	7	38	23.75	7.41	6	32	20.09	6.66	8	27	17.03	4.85	5	35	22.33	7.15
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	36	22.30	8.62	6	41	25.62	9.50	5	44	27.62	10.16	6	30	18.93	6.80	5	35	22.33	7.64
E10-E14	糖尿病	5	54	33.45	14.41	5	46	28.75	12.03	8	26	16.32	6.97	5	33	20.82	8.32	7	34	21.70	8.40
I10-I15	高血壓性疾病	12	18	11.15	5.51	9	25	15.62	5.97	7	29	18.20	7.70	7	28	17.66	6.36	8	29	18.51	6.47
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	30	18.58	14.16	12	16	10.00	6.69	8	26	16.32	8.91	11	19	11.99	8.09	9	23	14.68	9.73
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	10	27	16.72	4.67	10	20	12.50	4.28	12	15	9.42	2.30	8	27	17.03	4.80	10	22	14.04	4.32
	其他		272	168.48	76.50		250	156.24	69.66		255	160.07	83.31		233	147.00	67.42		239	152.51	65.82

表53-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		733	536.47	552.72		766	593.91	430.17		867	679.14	490.25		802	632.16	431.17		810	640.19	415.86
08-14	惡性腫瘤	1	230	168.33	172.79	1	205	158.94	119.59	1	228	178.60	130.70	1	273	215.19	148.40	1	259	204.70	136.29
25-27-28*	心臟疾病	2	73	53.43	55.15	2	89	69.01	47.71	2	95	74.42	46.89	2	96	75.67	49.95	2	94	74.29	48.80
29	腦血管疾病	3	72	52.70	53.79	3	73	56.60	39.88	3	89	69.72	50.44	4	55	43.35	27.79	3	68	53.74	34.48
181	糖尿病	4	48	35.13	36.22	4	60	46.52	33.65	4	63	49.35	34.45	3	56	44.14	29.38	4	50	39.52	24.78
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	30	21.96	22.93	5	33	25.59	18.87	5	42	32.90	23.19	6	25	19.71	13.26	5	35	27.66	17.33
321	肺炎	8	22	16.10	16.94	6	32	24.81	16.63	7	25	19.58	12.88	5	29	22.86	14.12	6	29	22.92	13.40
E47-E53	事故傷害	5	47	34.40	33.69	8	20	15.51	11.96	8	24	18.80	17.98	8	20	15.76	13.61	7	24	18.97	14.65
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.30	18.40	7	21	16.28	12.64	9	22	17.23	12.65	10	10	7.88	5.50	7	24	18.97	12.70
E54	自殺	11	10	7.32	7.33	9	19	14.73	12.08	6	30	23.50	19.84	7	22	17.34	14.17	9	18	14.23	11.77
038	敗血症	10	12	8.78	9.53	12	6	4.65	3.16	10	18	14.10	8.75	9	11	8.67	5.50	10	13	10.27	5.58
	其他		164	120.03	125.95		208	161.27	114.00		231	180.95	132.47		205	161.59	109.48		196	154.91	96.08

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		893	712.17	452.82		926	725.00	414.81		889	687.47	383.25		843	646.49	350.58		986	752.95	400.99
C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93	139.52	1	288	225.48	133.64	1	282	218.07	124.15	1	236	180.99	102.39	1	300	229.09	127.23
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	118	94.11	58.79	2	142	111.18	60.86	2	125	96.66	53.92	2	139	106.60	54.84	2	151	115.31	60.97
J12-J18	肺炎	4	61	48.65	27.90	5	40	31.32	14.99	5	47	36.35	18.59	4	53	40.65	19.56	4	57	43.53	21.09
I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84	30.62	3	65	50.89	27.40	3	59	45.63	23.66	3	55	42.18	22.03	3	75	57.27	27.91
E10-E14	糖尿病	5	55	43.86	28.02	4	41	32.10	17.49	4	49	37.89	20.13	5	45	34.51	18.52	5	43	32.84	16.08
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	23	18.34	11.73	8	25	19.57	10.32	8	25	19.33	9.79	7	25	19.17	9.23	5	43	32.84	16.42
I10-I15	高血壓性疾病	9	21	16.75	10.00	12	15	11.74	6.33	9	20	15.47	8.31	8	23	17.64	8.04	11	18	13.75	6.03
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	21	16.75	11.45	10	21	16.44	12.21	10	16	12.37	10.28	9	20	15.34	8.96	9	25	19.09	11.90
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	26	20.74	11.40	7	30	23.49	11.44	6	32	24.75	11.79	6	41	31.44	14.75	7	29	22.15	9.40
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	12	16	12.76	11.14	9	22	17.22	13.03	12	11	8.51	7.44	11	18	13.80	9.61	14	15	11.45	7.29
	其他		220	175.45	112.25		237	185.56	107.10		223	172.45	95.19		188	144.18	82.65		230	175.64	96.67

表53-6·臺北市大同區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		963	737.93	393.81		998	769.62	382.60		987	768.38	375.54		1,011	797.10	369.92		966	773.13	348.98
C00-C97	惡性腫瘤	1	270	206.90	111.16	1	298	229.81	120.04	1	303	235.89	121.22	1	304	239.68	117.10	1	280	224.10	105.95
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	150	114.94	59.19	2	155	119.53	56.46	2	169	131.57	59.36	2	156	123.00	51.40	2	172	137.66	61.03
J12-J18	肺炎	4	68	52.11	25.44	3	88	67.86	29.21	3	80	62.28	24.92	3	107	84.36	32.93	3	89	71.23	24.91
I60-I69	腦血管疾病	3	72	55.17	27.93	4	68	52.44	25.41	4	55	42.82	20.66	4	66	52.04	22.18	4	55	44.02	18.19
E10-E14	糖尿病	5	43	32.95	16.85	7	33	25.45	12.42	7	31	24.13	10.27	6	35	27.60	13.33	5	34	27.21	11.06
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	30	22.99	10.70	5	43	33.16	15.35	5	35	27.25	11.70	5	37	29.17	11.45	6	32	25.61	10.07
I10-I15	高血壓性疾病	10	21	16.09	7.66	14	10	7.71	3.38	10	20	15.57	6.49	9	17	13.40	5.75	7	24	19.21	6.54
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	27	20.69	13.33	8	24	18.51	14.79	5	35	27.25	17.60	8	28	22.08	12.93	8	20	16.01	9.23
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	30	22.99	10.29	6	34	26.22	11.38	8	26	20.24	10.07	7	31	24.44	9.44	9	19	15.21	5.65
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	18	13.79	10.65	10	20	15.42	13.19	12	16	12.46	9.40	9	17	13.40	12.12	10	18	14.41	11.22
	其他		234	179.31	100.62		225	173.51	80.97		217	136.22	83.85		213	167.94	81.29		223	178.48	85.14

表53-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,094	506.93	512.04		1,391	699.50	473.22		1,454	741.48	472.87		1,428	733.02	451.74		1,493	770.88	449.83
08-14	惡性腫瘤	1	270	125.11	121.67	1	414	208.19	142.34	1	431	219.79	142.95	1	427	219.19	140.31	1	458	236.48	142.80
25-27-28*	心臟疾病	2	136	63.02	66.08	2	160	80.46	52.18	2	142	72.41	43.14	2	149	76.48	44.31	2	160	82.61	48.02
29	腦血管疾病	3	127	58.85	59.62	3	125	62.86	39.07	3	139	70.88	43.19	3	138	70.84	41.15	3	126	65.06	37.54
181	糖尿病	5	57	26.41	26.00	4	92	46.26	30.19	4	113	57.63	36.08	4	119	61.08	36.71	4	109	56.28	31.57
321	肺炎	8	30	13.90	15.91	8	43	21.62	12.59	5	60	30.60	16.82	6	49	25.15	12.86	5	87	44.92	21.89
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	35	16.22	16.24	6	54	27.16	17.23	7	45	22.95	13.06	5	58	29.77	17.75	6	63	32.53	16.74
347	慢性肝病及肝硬化	6	43	19.93	19.40	7	53	26.65	20.28	9	28	14.28	9.28	8	35	17.97	12.60	7	42	21.69	13.72
E54	自殺	11	19	8.80	8.27	9	33	16.59	13.23	6	58	29.58	23.44	6	49	25.15	19.60	8	37	19.10	14.47
E47-E53	事故傷害	4	73	33.83	32.04	5	60	30.17	25.38	8	37	18.87	15.47	9	32	16.43	13.17	9	34	17.56	13.70
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	9	24	11.12	10.43	13	11	5.53	3.69	11	16	8.16	4.86	13	7	3.59	1.92	10	14	7.23	3.76
	其他		280	129.74	136.38		346	174.00	117.04		385	196.33	124.58		365	187.36	111.37		363	187.43	105.62

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68	450.30		1,616	842.80	427.68		1,604	830.86	409.75		1,651	850.60	405.16		1,716	882.14	412.09
C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83	122.62	1	448	233.65	127.77	1	464	240.35	128.59	1	458	235.96	121.04	1	459	235.96	120.66
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	203	106.05	56.99	2	207	107.96	50.58	2	215	111.37	49.65	2	253	130.35	59.90	2	268	137.77	60.94
J12-J18	肺炎	3	111	57.99	28.01	4	102	53.20	21.15	5	85	44.03	17.24	3	108	55.64	21.57	3	126	64.77	23.98
I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29	28.82	3	121	63.11	30.02	3	123	63.71	28.28	3	108	55.64	23.79	4	119	61.17	25.82
E10-E14	糖尿病	5	88	45.97	24.11	5	90	46.94	22.73	4	88	45.58	21.54	5	100	51.52	24.77	5	92	47.29	21.97
I10-I15	高血壓性疾病	11	39	20.37	9.94	7	61	31.81	15.24	6	60	31.08	13.48	9	49	25.25	10.47	10	49	25.19	10.62
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	61	31.87	16.89	9	43	22.43	11.20	8	45	23.31	10.51	6	66	34.00	14.98	7	54	27.76	11.30
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	7	50	26.12	12.13	6	66	34.42	14.17	7	57	29.53	11.93	7	61	31.43	10.63	6	67	34.44	11.34
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	45	23.51	17.52	9	43	22.43	15.38	10	42	21.76	13.41	8	52	26.79	16.86	8	52	26.73	17.56
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	8	47	24.55	19.96	##	31	16.17	11.09	12	28	14.50	10.12	12	29	14.94	10.10	12	31	15.94	12.64
	其他		362	189.12	113.31		404	210.70	108.35		397	205.64	105.00		367	189.08	91.05		399	205.11	95.26

表53-7·臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	順位	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
A00-Y98	所有死亡原因		1,743	898.74	413.96		1,666	864.58	383.17		1,768	926.98	394.23		1,651	876.61	372.28		1,708	922.83	382.07
C00-C97	惡性腫瘤	1	456	235.13	117.14	1	438	227.30	113.66	1	468	245.38	114.65	1	461	244.77	111.97	1	486	262.59	114.25
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	277	142.83	62.50	2	289	149.98	60.40	2	315	165.16	64.63	2	253	134.33	53.89	2	266	143.72	60.83
J12-J18	肺炎	3	137	70.64	27.55	3	128	66.43	22.44	3	165	86.51	28.44	3	185	98.23	32.63	3	164	88.61	28.28
I60-I69	腦血管疾病	4	129	66.52	28.18	4	113	58.64	24.06	4	110	57.67	22.37	4	131	69.56	28.52	4	103	55.65	23.00
E10-E14	糖尿病	5	96	49.50	21.90	5	80	41.52	18.36	5	87	45.62	20.01	5	68	36.11	13.82	5	82	44.30	19.05
I10-I15	高血壓性疾病	8	42	21.66	9.51	10	38	19.72	7.43	7	49	25.69	10.13	9	36	19.11	6.52	6	51	27.56	9.37
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	68	35.06	15.06	7	63	32.69	13.08	9	48	25.17	9.45	8	37	19.65	6.86	7	47	25.39	8.96
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	66	34.03	14.30	6	67	34.77	12.41	6	51	26.74	8.60	6	52	27.61	9.67	8	42	22.69	7.07
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	37	19.08	11.76	8	53	27.50	17.49	10	40	20.97	10.10	7	39	20.71	12.76	9	38	20.53	9.97
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	34	17.53	12.39	11	26	13.49	9.85	12	30	15.73	10.16	10	35	18.58	13.32	10	35	18.91	12.56
	其他		401	206.77	93.67		371	192.53	84.01		405	212.35	95.69		354	187.96	82.31		394	212.88	88.73

表53-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,041	461.94	512.44		1,277	496.35	392.35		1,297	501.74	377.83		1,301	500.03	360.44		1,402	536.05	368.85
08-14	惡性腫瘤	1	274	121.59	129.12	1	406	157.81	128.43	1	384	148.55	113.36	1	411	157.96	117.84	1	411	157.15	113.05
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.16	47.41	2	165	64.13	48.62	2	148	57.25	40.41	2	133	51.12	33.87	2	168	64.23	42.38
29	腦血管疾病	2	121	53.69	58.88	3	133	51.70	39.73	3	113	43.71	31.45	3	119	45.74	31.14	3	116	44.35	29.52
181	糖尿病	5	70	31.06	33.39	4	79	30.71	22.83	4	79	30.56	23.60	4	71	27.29	19.76	4	84	32.12	20.84
321	肺炎	8	30	13.31	16.05	6	41	15.94	10.85	5	57	22.05	14.27	5	59	22.68	14.74	5	74	28.29	16.39
E54	自殺	12	11	4.88	4.77	7	35	13.60	12.05	7	44	17.02	14.99	7	42	16.14	13.27	6	51	19.50	15.91
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	43	19.08	20.79	5	42	16.32	12.41	6	51	19.73	13.80	6	49	18.83	13.21	7	47	17.97	12.11
E47-E53	事故傷害	4	88	39.05	40.11	9	27	10.49	9.97	8	42	16.25	14.70	8	33	12.68	10.79	8	35	13.38	11.25
347	慢性肝病及肝硬化	9	29	12.87	13.43	8	30	11.66	9.72	9	29	11.22	8.88	9	27	10.38	8.25	9	29	11.09	8.64
038	敗血症	14	9	3.99	4.61	13	7	2.72	1.96	11	15	5.80	4.05	11	17	6.53	4.51	10	20	7.65	4.55
	其他		271	120.25	143.88		312	121.27	95.78		335	129.59	98.32		340	130.68	93.04		367	140.32	94.21

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39	355.06		1,619	604.38	349.18		1,514	560.07	319.09		1,678	615.48	342.44		1,617	588.76	307.80
C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79	118.80	1	486	181.43	114.23	1	403	149.08	93.22	1	462	169.46	102.13	1	453	164.94	95.06
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	188	71.84	44.69	2	171	63.84	34.40	2	201	74.35	38.66	2	236	86.56	45.71	2	229	83.38	40.74
J12-J18	肺炎	4	86	32.86	19.04	4	103	38.45	18.42	4	96	35.51	17.02	3	117	42.92	19.61	3	119	43.33	18.06
I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98	24.05	3	125	46.66	25.55	3	122	45.13	24.50	4	109	39.98	21.44	4	95	34.59	17.82
E10-E14	糖尿病	5	60	22.93	14.47	5	81	30.24	17.29	5	91	33.66	18.89	5	82	30.08	16.46	5	70	25.49	12.39
I10-I15	高血壓性 疾病	10	35	13.37	8.59	7	61	22.77	11.71	6	61	22.57	10.82	10	39	14.31	6.01	9	45	16.38	8.71
J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	9	38	14.52	8.46	6	66	24.64	11.30	9	45	16.65	8.41	7	65	23.84	10.14	7	62	22.57	9.79
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	6	46	17.58	11.13	8	58	21.65	11.96	8	54	19.98	10.97	6	66	24.21	12.28	6	63	22.94	11.38
F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	16	8	3.06	1.52	14	18	6.72	2.52	15	13	4.81	1.90	14	20	7.34	2.82	13	26	9.47	3.31
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	41	15.67	13.19	10	41	15.31	9.21	10	39	14.43	9.53	9	52	19.07	12.02	10	38	13.84	8.47
	其他		358	136.80	91.12		409	152.68	92.59		389	143.90	85.17		430	157.72	93.82		417	151.83	82.07

表53-8·臺北市文山區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,809	657.10	338.63		1,654	601.83	303.54		1,675	611.11	300.33		1,790	656.20	313.37		1,676	620.81	294.08
C00-C97	惡性腫瘤	1	485	176.17	99.56	1	427	155.37	86.51	1	452	164.91	90.69	1	509	186.59	99.03	1	466	172.61	87.24
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	283	102.80	49.25	2	246	89.51	42.65	2	297	108.36	47.97	2	287	105.21	44.53	2	276	102.23	44.31
J12-J18	肺炎	3	133	48.31	20.79	3	153	55.67	22.62	3	155	56.55	22.15	3	215	78.82	29.05	3	145	53.71	22.59
I60-I69	腦血管疾病	4	128	46.49	22.26	4	104	37.84	17.85	4	97	35.39	16.54	4	117	42.89	19.79	4	99	36.67	16.35
E10-E14	糖尿病	6	73	26.52	13.65	5	65	23.65	11.52	5	79	28.82	13.25	6	59	21.63	9.75	5	74	27.41	12.18
I10-I15	高血壓性疾病	9	52	18.89	8.85	10	45	16.37	7.71	9	45	16.42	7.14	10	32	11.73	4.57	6	48	17.78	7.52
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	74	26.88	12.17	6	61	22.20	8.61	8	47	17.15	6.85	7	55	20.16	7.96	7	47	17.41	6.79
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	67	24.34	12.55	9	47	17.10	8.49	7	55	20.07	9.36	5	62	22.73	10.42	8	45	16.67	7.01
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	12	44	15.98	5.62	12	33	12.01	4.54	13	14	5.11	1.90	11	29	10.63	3.95	9	44	16.30	5.27
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	48	17.44	10.89	8	50	18.19	12.74	10	38	13.86	8.57	8	41	15.03	11.16	10	37	13.71	7.93
	其他		422	153.29	83.05		423	153.91	80.28		396	144.48	75.92		384	140.77	73.15		395	146.31	76.90

表53-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		469	415.37	546.64		567	501.54	440.30		587	519.39	432.63		649	573.55	463.19		596	525.17	407.61
08-14	惡性腫瘤	1	139	123.11	156.95	1	193	170.72	146.42	1	186	164.58	138.32	1	206	182.05	149.20	1	195	171.83	132.30
25-27-28*	心臟疾病	3	43	38.08	53.74	2	78	68.99	60.74	2	66	58.40	48.04	2	68	60.09	47.94	2	64	56.39	41.90
29	腦血管疾病	2	49	43.40	59.01	3	48	42.46	36.54	3	55	48.67	38.94	3	61	53.91	41.50	3	60	52.87	39.39
181	糖尿病	5	27	23.91	30.41	4	34	30.07	26.64	4	44	38.93	32.92	4	41	36.23	28.65	4	27	23.79	17.44
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	8	7.09	9.02	6	22	19.46	16.67	7	23	20.35	16.87	8	17	15.02	11.78	5	25	22.03	15.92
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	20.37	24.52	7	17	15.04	13.32	9	10	8.85	7.83	9	15	13.26	10.66	6	22	19.39	14.95
E47-E53	事故傷害	4	32	28.34	30.47	5	30	26.54	24.59	5	25	22.12	20.42	5	30	26.51	23.81	7	19	16.74	17.59
E54	自殺	8	11	9.74	10.82	8	13	11.50	10.27	6	24	21.24	17.91	5	30	26.51	21.67	8	14	12.34	10.40
321	肺炎	13	7	6.20	9.81	9	10	8.85	7.46	8	11	9.73	7.74	7	28	24.74	18.57	8	14	12.34	8.60
038	敗血症	14	5	4.43	6.19	11	3	2.65	2.41	12	5	4.42	3.87	11	7	6.19	5.30	10	10	8.81	6.31
	其他		125	110.71	155.70		119	105.26	95.24		138	122.11	99.76		146	129.03	104.10		146	128.65	102.81

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24	404.97		703	599.26	389.06		689	578.40	365.11		744	617.40	379.17		722	593.01	361.83
C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60	121.11	1	222	189.24	127.96	1	226	189.72	128.04	1	228	189.20	122.64	1	231	189.73	120.52
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	75	65.97	44.97	2	83	70.75	45.08	2	85	71.36	42.12	2	94	78.01	44.88	2	108	88.71	53.42
J12-J18	肺炎	3	58	51.01	35.70	4	48	40.92	22.37	4	43	36.10	19.21	4	46	38.17	20.77	4	43	35.32	17.58
I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74	32.00	3	52	44.33	27.32	3	62	52.05	29.15	3	70	58.09	34.78	3	51	41.89	23.28
E10-E14	糖尿病	5	31	27.27	20.03	5	39	33.24	20.86	5	32	26.86	17.24	5	39	32.36	19.71	6	28	23.00	14.16
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	8	20	17.59	11.63	7	28	23.87	15.04	7	20	16.79	8.93	6	25	20.75	10.06	11	14	11.50	5.37
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	9	19	16.71	12.35	12	17	14.49	9.71	11	13	10.91	6.96	7	23	19.09	11.18	5	35	28.75	15.47
F01-F03	血管性及未明示 之癡呆症	14	3	2.64	1.68	18	3	2.56	1.57	13	8	6.72	3.15	15	5	4.15	1.85	15	5	4.11	1.61
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	7	21	18.47	15.08	8	21	17.90	13.47	17	5	4.20	2.93	11	16	13.28	9.77	8	18	14.78	10.50
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	24	21.11	17.83	11	18	15.34	10.17	10	14	11.75	10.07	8	20	16.60	11.72	11	14	11.50	10.77
	其他		140	123.14	92.59		172	146.62	95.51		181	151.95	97.31		178	147.71	91.81		175	143.74	89.15

表53-9·臺北市南港區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		780	637.36	373.37		721	589.36	327.93		821	673.43	375.89		787	650.50	347.36		778	650.90	336.34
C00-C97	惡性腫瘤	1	213	174.05	107.15	1	204	166.75	97.93	1	280	229.67	132.46	1	246	203.33	114.94	1	250	209.16	114.52
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	122	99.69	55.93	2	116	94.82	50.79	2	108	88.59	43.28	2	109	90.09	45.89	2	117	97.89	48.44
J12-J18	肺炎	3	55	44.94	22.80	3	54	44.14	23.35	3	58	47.58	21.66	3	79	65.30	28.27	3	69	57.73	25.55
I60-I69	腦血管疾病	3	55	44.94	24.21	3	54	44.14	23.43	4	57	46.75	24.57	4	46	38.02	19.77	4	49	40.99	20.76
E10-E14	糖尿病	5	35	28.60	16.50	5	27	22.07	11.20	6	28	22.97	11.34	5	30	24.80	12.44	5	29	24.26	11.25
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	33	26.97	13.81	8	20	16.35	8.36	7	27	22.15	11.56	6	26	21.49	9.59	6	28	23.43	9.85
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	25	20.43	11.47	7	21	17.17	8.69	5	29	23.79	12.56	7	19	15.70	7.87	7	24	20.08	8.85
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	10	19	15.53	6.93	13	11	8.99	3.86	13	11	9.02	3.42	10	15	12.40	5.10	8	20	16.73	6.37
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	16	13.07	9.82	9	19	15.53	11.45	11	13	10.66	8.01	11	14	11.57	8.82	9	15	12.55	14.93
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	24	19.61	13.60	6	23	18.80	13.24	8	21	17.23	14.93	8	17	14.05	11.77	10	12	10.04	5.54
	其他		183	149.53	91.16		172	140.60	75.62		189	155.03	92.10		186	153.74	82.90		165	138.04	70.28

表53-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		782	350.67	533.92		1,097	421.12	440.93		1,048	400.74	403.33		1,044	396.61	378.76		1,107	417.62	378.58
08-14	惡性腫瘤	1	198	88.79	126.68	1	314	120.54	128.00	1	306	117.01	117.36	1	357	135.62	126.93	1	373	140.72	127.74
25-27-28*	心臟疾病	2	84	37.67	61.13	2	160	61.42	62.42	2	115	43.97	44.19	2	105	39.89	39.44	2	134	50.55	45.09
29	腦血管疾病	3	71	31.84	53.36	3	90	34.55	35.90	3	107	40.91	41.26	3	104	39.51	38.27	3	96	36.22	33.17
181	糖尿病	5	41	18.39	31.21	4	65	24.95	27.88	4	74	28.30	27.85	4	60	22.79	21.50	4	73	27.54	25.69
321	肺炎	8	24	10.76	20.36	8	31	11.90	12.28	9	35	13.38	12.80	7	37	14.06	13.51	5	51	19.24	17.07
E54	自殺	7	26	11.66	13.75	6	39	14.97	12.99	6	39	14.91	13.18	5	43	16.34	16.08	6	34	12.83	11.20
E47-E53	事故傷害	4	56	25.11	27.25	5	52	19.96	19.36	8	36	13.77	13.82	8	35	13.30	12.36	6	34	12.83	12.42
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	20	8.97	14.06	7	33	12.67	13.66	7	39	14.91	14.97	6	42	15.96	15.46	8	33	12.45	10.91
347	慢性肝病及肝硬化	6	30	13.45	17.26	9	28	10.75	11.17	5	41	15.68	15.55	9	34	12.92	12.24	9	30	11.32	9.99
26	高血壓性疾病	11	16	7.17	12.08	11	11	4.22	4.96	10	23	8.79	8.94	10	14	5.32	4.77	10	15	5.66	5.15
	其他		216	96.86	156.78		274	105.18	112.31		233	89.09	93.41		213	80.92	78.20		234	88.28	80.15

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,183	444.46	378.30		1,382	497.41	376.04		1,322	469.74	340.25		1,364	479.77	338.86		1,423	496.40	340.19
C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51	118.35	1	418	150.45	118.25	1	403	143.20	105.15	1	398	139.99	103.82	1	458	159.77	112.15
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血 壓性疾病除外）	2	153	57.48	49.08	2	152	54.71	39.03	2	161	57.21	41.46	2	209	73.51	50.04	2	176	61.40	40.23
J12-J18	肺炎	5	63	23.67	19.12	5	65	23.39	15.99	5	58	20.61	11.98	6	59	20.75	12.93	4	68	23.72	13.65
I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95	31.77	3	105	37.79	27.47	3	109	38.73	26.89	3	105	36.93	25.50	3	105	36.63	23.64
E10-E14	糖尿病	4	68	25.55	22.23	4	77	27.71	21.25	4	66	23.45	17.63	4	61	21.46	14.81	8	42	14.65	9.89
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	7	38	14.28	12.89	11	31	11.16	9.17	12	26	9.24	7.39	8	36	12.66	10.99	9	36	12.56	10.04
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	33	12.40	11.36	9	43	15.48	12.77	9	34	12.08	8.83	7	43	15.12	11.56	6	48	16.74	13.73
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	8	33	12.40	10.01	7	45	16.20	12.62	7	38	13.50	10.23	10	30	10.55	7.45	10	33	11.51	7.14
I10-I15	高血壓性疾病	10	28	10.52	8.17	10	32	11.52	7.89	11	31	11.02	7.75	9	32	11.26	6.92	12	31	10.81	6.68
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	10	28	10.52	8.83	6	47	16.92	12.06	6	56	19.90	13.19	4	61	21.46	13.37	5	58	20.23	12.38
	其他		272	102.19	86.49		367	132.09	99.54		340	120.81	89.75		330	116.07	81.47		368	128.37	90.66

表53-10·臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,491	518.34	345.19		1,409	489.66	311.64		1,412	490.96	305.05		1,435	500.68	303.27		1,424	501.13	291.39
C00-C97	惡性腫瘤	1	461	160.26	109.90	1	409	142.14	94.43	1	416	144.65	94.29	1	450	157.01	97.23	1	447	157.31	91.14
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	200	69.53	45.98	2	215	74.72	45.19	2	218	75.80	46.38	2	226	78.85	47.08	2	238	83.76	47.73
J12-J18	肺炎	4	82	28.51	16.12	3	123	42.75	24.69	3	128	44.51	23.37	3	152	53.03	27.28	3	110	38.71	19.98
I60-I69	腦血管疾病	3	114	39.63	26.16	4	100	34.75	21.49	4	98	34.08	18.90	4	84	29.31	17.02	4	92	32.38	18.50
E10-E14	糖尿病	5	69	23.99	16.59	6	50	17.38	11.65	5	54	18.78	11.96	5	70	24.42	13.70	5	50	17.60	9.81
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	13	23	8.00	6.35	10	27	9.38	7.39	10	36	12.52	9.39	10	24	8.37	6.95	6	45	15.84	12.00
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	47	16.34	11.84	9	34	11.82	9.08	7	42	14.60	11.44	9	27	9.42	8.54	7	42	14.78	10.71
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	39	13.56	9.20	6	50	17.38	11.31	7	42	14.60	8.30	8	30	10.47	5.68	8	33	11.61	6.11
I10-I15	高血壓性疾病	11	31	10.78	6.47	14	15	5.21	2.72	11	23	8.00	4.01	11	18	6.28	3.67	9	31	10.91	5.76
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	44	15.30	8.75	8	45	15.64	8.79	9	38	13.21	7.40	6	46	16.05	8.90	10	29	10.21	5.59
	其他		381	132.45	87.82		341	118.55	74.91		317	110.16	69.61		308	107.46	67.21		307	108.04	64.07

表53-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,192	399.07	480.62		1,462	505.78	409.93		1,588	550.74	424.34		1,527	530.24	389.46		1,569	545.49	385.22
08-14	惡性腫瘤	1	322	107.80	123.59	1	476	164.67	131.52	1	456	158.15	122.44	1	489	169.80	126.48	1	533	185.31	133.51
25-27-28*	心臟疾病	3	129	43.19	53.54	2	161	55.70	43.66	2	171	59.31	44.17	2	171	59.38	41.99	2	162	56.32	37.83
29	腦血管疾病	2	163	54.57	66.78	3	150	51.89	40.14	3	135	46.82	34.83	3	107	37.16	25.87	3	137	47.63	31.29
181	糖尿病	5	65	21.76	27.61	4	107	37.02	28.91	4	105	36.42	26.71	4	105	36.46	25.84	4	107	37.20	25.08
321	肺炎	7	40	13.39	18.36	7	42	14.53	11.00	5	77	26.70	19.19	5	71	24.65	17.35	5	76	26.42	16.12
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	37	12.39	15.15	6	44	15.22	11.71	6	61	21.16	15.58	6	53	18.40	12.71	6	60	20.86	13.84
E47-E53	事故傷害	4	85	28.46	29.23	5	63	21.79	19.64	8	43	14.91	13.56	7	45	15.63	14.32	7	43	14.95	12.86
E54	自殺	9	26	8.70	9.29	8	30	10.38	9.03	7	49	16.99	14.16	8	43	14.93	11.86	8	38	13.21	11.18
347	慢性肝病及肝硬化	6	41	13.73	15.18	9	24	8.30	6.69	9	36	12.49	9.64	9	30	10.42	8.23	9	31	10.78	8.03
038	敗血症	13	8	2.68	3.16	10	13	4.50	3.51	10	19	6.59	4.92	11	18	6.25	4.20	10	19	6.61	4.00
	其他		276	92.40	118.73		352	121.77	104.12		436	151.21	119.15		395	137.16	100.60		363	126.20	91.48

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50	389.90		1,708	593.09	347.26		1,809	625.26	351.82		1,805	622.20	335.93		1,800	619.46	320.83
C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76	113.15	1	498	172.93	105.87	1	600	207.38	122.24	1	537	185.11	106.70	1	509	175.17	98.15
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	231	80.61	51.65	2	227	78.82	43.55	2	208	71.89	38.91	2	252	86.87	44.38	2	250	86.04	43.50
J12-J18	肺炎	4	97	33.85	20.06	5	96	33.34	16.86	5	90	31.11	14.00	4	104	35.85	15.74	4	109	37.51	16.20
I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02	28.91	3	110	38.20	20.21	3	147	50.81	26.94	3	124	42.74	21.62	3	114	39.23	17.91
E10-E14	糖尿病	5	75	26.17	17.02	4	102	35.42	19.33	4	106	36.64	20.04	5	91	31.37	16.27	5	106	36.48	17.28
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	7	53	18.50	11.53	7	58	20.14	10.77	6	62	21.43	10.53	8	53	18.27	8.99	7	73	25.12	12.06
J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	9	46	16.05	9.28	6	60	20.83	10.04	7	58	20.05	9.68	6	76	26.20	11.36	6	85	29.25	12.53
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	49	17.10	15.45	9	48	16.67	12.83	9	46	15.90	12.37	7	59	20.34	13.42	9	42	14.45	10.14
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	46	16.05	13.39	11	38	13.20	11.17	12	30	10.37	7.25	12	39	13.44	10.10	14	32	11.01	7.69
A40-A41	敗血症	6	59	20.59	12.75	10	47	16.32	8.74	10	41	14.17	7.08	9	49	16.89	8.30	10	39	13.42	5.99
	其他		392	136.80	96.71		424	147.23	87.89		421	145.51	82.78		421	145.12	79.05		441	151.77	79.38

表53-11·臺北市士林區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,861	641.02	324.26		1,963	678.96	333.19		1,958	681.23	322.71		1,890	663.15	302.25		1,832	652.06	289.20
C00-C97	惡性腫瘤	1	566	194.96	105.59	1	576	199.23	105.14	1	578	201.10	100.78	1	561	196.84	98.25	1	531	189.00	88.09
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	236	81.29	38.26	2	276	95.46	44.21	2	333	115.86	50.54	2	293	102.81	43.20	2	334	118.88	48.60
J12-J18	肺炎	3	124	42.71	18.10	3	161	55.69	21.44	3	166	57.76	21.65	3	220	77.19	28.28	3	166	59.08	20.21
I60-I69	腦血管疾病	4	111	38.23	18.62	4	125	43.24	20.48	4	119	41.40	19.17	4	117	41.05	17.53	4	105	37.37	16.28
E10-E14	糖尿病	5	90	31.00	14.37	6	84	29.05	13.17	5	89	30.97	13.83	5	86	30.18	12.69	5	87	30.97	12.93
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	68	23.42	10.08	7	71	24.56	10.61	6	81	28.18	11.34	6	50	17.54	6.70	6	65	23.14	8.68
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	75	25.83	10.76	5	89	30.78	12.28	8	50	17.40	6.87	7	45	15.79	5.70	7	47	16.73	6.37
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	58	19.98	13.41	8	55	19.02	13.14	7	56	19.48	13.48	10	33	11.58	7.84	8	43	15.30	9.89
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	14	26	8.96	6.83	10	41	14.18	10.93	10	42	14.61	10.32	8	36	12.63	9.13	9	33	11.75	8.26
A40-A41	敗血症	9	48	16.53	7.13	9	46	15.91	7.01	9	48	16.70	6.71	9	35	12.28	4.87	10	27	9.61	4.04
	其他		459	158.10	81.09		439	151.84	74.80		396	137.78	68.04		414	145.26	68.06		394	140.24	65.84

表53-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年				93年				94年				95年				96年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,078	443.77	525.00		1,317	528.90	428.42		1,400	563.46	441.02		1,395	560.68	423.62		1,433	573.60	424.32
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.03	129.94	1	375	150.60	123.14	1	399	160.59	127.39	1	401	161.17	121.33	1	463	185.33	138.24
25-27-28*	心臟疾病	3	100	41.17	50.55	2	163	65.46	50.99	2	168	67.62	51.55	2	175	70.34	52.55	2	158	63.24	45.28
29	腦血管疾病	2	119	48.99	58.76	3	127	51.00	39.93	3	137	55.14	40.95	3	132	53.05	38.66	3	138	55.24	37.42
181	糖尿病	5	51	20.99	24.62	4	83	33.33	27.29	4	108	43.47	32.61	4	95	38.18	26.50	4	91	36.43	26.67
321	肺炎	7	36	14.82	18.81	6	48	19.28	15.08	7	47	18.92	13.31	5	68	27.33	18.90	5	72	28.82	18.74
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.82	17.49	7	46	18.47	14.65	5	63	25.36	18.55	6	54	21.70	16.30	6	48	19.21	13.04
347	慢性肝病及肝硬化	6	46	18.94	20.87	8	32	12.85	9.94	9	29	11.67	9.24	9	32	12.86	10.28	7	45	18.01	13.82
E47-E53	事故傷害	4	84	34.58	35.77	5	54	21.69	20.71	8	45	18.11	15.40	8	37	14.87	13.44	8	40	16.01	12.86
E54	自殺	10	18	7.41	7.68	8	32	12.85	10.80	6	55	22.14	18.94	7	42	16.88	13.32	9	29	11.61	10.02
038	敗血症	14	12	4.94	6.09	12	9	3.61	2.97	10	15	6.04	4.56	10	18	7.23	4.51	10	18	7.21	4.62
	其他		299	123.09	154.42		348	139.75	112.92		334	134.43	108.52		341	137.05	107.83		331	132.49	103.61

資料來源：衛生福利部。

附註：84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表53-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年				101年				102年				103年				104年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13	426.24		1,512	597.06	367.35		1,521	596.90	352.92		1,578	615.25	355.76		1,631	632.93	354.18
C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70	131.99	1	482	190.33	120.29	1	463	181.70	113.59	1	460	179.35	110.46	1	487	188.99	111.14
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	194	77.64	51.94	2	210	82.92	50.01	2	206	80.84	45.47	2	216	84.22	45.56	2	222	86.15	44.42
J12-J18	肺炎	4	92	36.82	22.98	5	59	23.30	11.23	5	79	31.00	16.15	4	104	40.55	18.88	4	103	39.97	18.40
I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83	34.85	3	95	37.51	20.93	3	109	42.78	22.80	3	106	41.33	22.59	3	109	42.30	22.12
E10-E14	糖尿病	5	66	26.41	17.15	4	93	36.72	22.15	4	89	34.93	19.01	5	96	37.43	20.21	5	87	33.76	18.67
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候 群及腎病變	6	52	20.81	13.80	7	53	20.93	12.27	8	45	17.66	9.93	7	54	21.05	11.79	11	37	14.36	7.29
J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	7	51	20.41	12.66	6	56	22.11	11.29	6	62	24.33	12.49	6	68	26.51	13.19	6	62	24.06	10.15
I10-I15	高血壓性 疾病	10	38	15.21	10.01	8	43	16.98	9.10	7	51	20.01	10.36	8	51	19.88	9.95	7	43	16.69	8.20
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（ 自殺）	9	43	17.21	14.33	11	28	11.06	9.28	12	26	10.20	7.72	11	37	14.43	11.22	9	39	15.13	10.61
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	13	28	11.21	8.11	12	26	10.27	6.96	9	41	16.09	10.56	13	24	9.36	5.50	13	24	9.31	5.47
	其他		377	150.88	108.42		367	144.92	93.84		350	137.35	84.84		362	141.14	86.41		418	162.21	97.71

表53-12·臺北市北投區歷年主要死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	105年				106年				107年				108年				109年			
		順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	順位	死 人 數	死 亡 率	標 準 化 死 亡 率
A00-Y98	所有死亡原因		1,695	657.96	352.36		1,687	656.64	353.11		1,756	685.95	349.35		1,776	698.04	346.73		1,689	670.95	318.46
C00-C97	惡性腫瘤	1	450	174.68	100.96	1	506	196.95	109.09	1	527	205.86	112.17	1	517	203.20	105.41	1	513	203.79	101.13
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	262	101.70	52.30	2	269	104.70	51.09	2	286	111.72	53.88	2	261	102.58	47.58	2	265	105.27	48.29
J12-J18	肺炎	3	128	49.69	21.07	4	110	42.82	19.31	3	169	66.02	27.06	3	192	75.46	30.93	3	182	72.30	27.71
I60-I69	腦血管疾病	4	125	48.52	24.26	3	114	44.37	22.59	4	115	44.92	20.91	4	116	45.59	21.95	4	102	40.52	18.50
E10-E14	糖尿病	5	84	32.61	16.28	5	84	32.70	16.43	6	65	25.39	12.13	5	94	36.95	16.71	5	89	35.36	14.46
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	61	23.68	11.31	6	55	21.41	9.76	7	59	23.05	10.60	8	43	16.90	7.07	6	51	20.26	8.83
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	69	26.78	11.38	7	52	20.24	9.49	5	71	27.74	11.22	6	67	26.33	10.11	7	49	19.47	7.85
I10-I15	高血壓性疾病	9	41	15.92	8.02	10	35	13.62	6.36	9	43	16.80	6.91	9	42	16.51	6.51	8	48	19.07	7.27
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	8	43	16.69	13.26	11	34	13.23	10.02	11	32	12.50	10.02	7	47	18.47	15.62	9	33	13.11	9.28
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	27	10.48	6.62	12	33	12.84	7.19	12	19	7.42	4.07	13	21	8.25	5.50	10	31	12.31	6.82
	其他		405	157.21	86.91		395	153.75	91.78		370	144.53	80.39		376	147.78	79.36		326	129.50	68.32

表54-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		224	105.52		304	147.73		313	151.18		345	165.26		332	157.94
162	肺癌	1	38	17.90	1	76	36.93	1	66	31.88	1	61	29.22	1	86	40.91
155	肝癌	2	34	16.02	4	37	17.98	2	51	24.63	2	50	23.95	2	44	20.93
153,154	結腸直腸癌	2	34	16.02	3	40	19.44	3	42	20.29	3	43	20.60	3	40	19.03
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	4	9	8.30	2	21	19.65	4	17	15.77	4	20	18.34	4	18	16.34
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	11	3	2.89	7	8	8.09	5	10	10.08	6	14	14.04	5	11	11.00
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	7	6	5.53	22	1	0.94	15	3	2.78	14	4	3.67	6	12	10.89
151	胃癌	5	16	7.54	5	19	9.23	7	15	7.25	5	34	16.29	7	21	9.99
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	7	3.30	5	19	9.23	6	15	7.25	8	17	8.14	8	20	9.51
157	胰臟癌	9	8	3.77	9	10	4.86	8	12	5.80	8	17	8.14	9	16	7.61
204-208	白血病	14	5	2.36	13	6	2.92	18	2	0.97	12	9	4.31	10	12	5.71
	其他		64	30.15		67	32.56		80	38.64		76	36.41		52	24.74

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		306	145.34		352	169.06		386	184.52		369	175.36		389	184.69		380	180.60
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92	1	77	36.98	1	81	38.72	1	82	38.97	1	65	30.86	1	73	34.69
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	16	14.47	2	25	22.85	4	22	19.99	4	25	22.57	3	26	23.44	4	27	24.34
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10	3	46	22.09	3	54	25.81	2	49	23.29	2	52	24.69	2	57	27.09
C22	肝和肝內膽管癌	2	44	20.90	4	35	16.81	2	57	27.25	3	48	22.81	4	47	22.31	3	52	24.71
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	14	14.00	10	7	7.09	5	14	14.12	5	16	16.06	6	15	15.05	5	19	19.10
C25	胰臟癌	7	20	9.50	12	11	5.28	7	17	8.13	6	18	8.55	7	19	9.02	7	18	8.55
C16	胃癌	6	22	10.45	5	21	10.09	6	26	12.43	6	18	8.55	5	35	16.62	6	23	10.93
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	13	4	3.62	6	11	10.05	14	4	3.63	17	2	1.81	8	9	8.11	8	9	8.11
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	12	5.70	8	15	7.20	8	13	6.21	9	10	4.75	10	14	6.65	14	7	3.33
C91-C95	白血病	10	9	4.27	8	15	7.20	11	9	4.30	12	9	4.28	15	9	4.27	10	10	4.75
	其他		66	31.35		89	42.74		89	42.54		92	43.72		98	46.53		85	40.40

表54-1·臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		386	183.73		414	198.07		396	190.70		408	197.73		360	175.65		394	194.80
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	82	39.03	1	73	34.92	1	74	35.64	1	89	43.13	1	65	31.72	1	74	36.59
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	3	26	23.43	3	29	26.22	3	26	23.61	4	28	25.55	3	27	24.77	2	31	28.78
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	52	24.75	4	49	23.44	4	48	23.12	2	64	31.02	2	54	26.35	3	49	24.23
C22	肝和肝內膽管癌	4	46	21.90	2	62	29.66	2	52	25.04	3	55	26.65	4	34	16.59	4	45	22.25
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	21	21.18	5	17	17.28	5	20	20.51	5	17	17.57	5	14	14.59	5	16	16.93
C25	胰臟癌	6	24	11.42	6	27	12.92	6	23	11.08	7	19	9.21	7	22	10.73	6	25	12.36
C16	胃癌	7	21	10.00	7	20	9.57	7	20	9.63	6	28	13.57	6	24	11.71	7	24	11.87
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	6	5.41	9	9	8.14	8	9	8.17	19	2	1.82	16	3	2.75	8	12	11.14
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	11	5	8	19	9.09	12	11	5.30	8	14	6.78	8	15	7.32	9	19	9.39
C91-C95	白血病	15	5	2.38	18	5	2.39	13	8	3.85	12	8	3.88	10	9	4.39	10	14	6.92
	其他		92	43.79		104	49.76		105	50.56		84	40.71		93	45.38		85	42.03

表54-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		303	123.50		373	159.71		430	185.63		401	173.50		427	185.51
162	肺癌	1	65	26.49	1	71	30.40	1	81	34.97	1	84	36.34	1	103	44.75
155	肝癌	2	56	22.82	2	66	28.26	2	63	27.20	2	55	23.80	2	54	23.46
153,154	結腸直腸癌	3	30	12.23	3	41	17.56	5	51	22.02	3	50	21.63	3	48	20.85
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	6	8	6.62	7	9	7.62	3	28	23.80	4	21	17.81	4	24	20.35
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	15	3	2.41	5	12	10.40	6	12	10.53	6	11	9.71	5	17	15.14
151	胃癌	4	25	10.19	4	29	12.42	4	52	22.45	5	38	16.44	6	30	13.03
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	7	10	4.08	6	19	8.14	7	24	10.36	10	14	6.06	7	21	9.12
156	膽囊癌	9	9	3.67	12	10	4.28	15	7	3.02	9	15	6.49	8	18	7.82
157	胰臟癌	7	10	4.08	9	15	6.42	8	17	7.34	7	18	7.79	9	16	6.95
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	8	3.26	10	12	5.14	9	14	6.04	7	18	7.79	10	12	5.21
	其他		79	32.20		89	38.11		81	34.97		77	33.31		84	36.49

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		99年		100年		101年		102年		103年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		397	173.88		424	188.25		441	195.29		455	200.32		447	195.95		433	189.02
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60	1	84	37.30	1	85	37.64	1	108	47.55	1	87	38.14	1	82	35.80
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	23	19.59	4	22	18.87	2	38	32.44	5	23	19.50	3	29	24.46	4	25	20.98
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02	3	43	19.09	4	54	23.91	3	55	24.21	4	43	18.85	2	57	24.88
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15	2	61	27.08	3	61	27.01	2	58	25.54	2	60	26.30	3	54	23.57
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	11	9.92	6	12	11.04	9	9	8.28	4	24	21.98	5	17	15.52	7	10	9.10
C16	胃癌	5	27	11.83	7	23	10.21	7	26	11.51	6	29	12.77	6	34	14.90	5	32	13.97
C25	胰臟癌	7	22	9.64	5	30	13.32	5	28	12.40	8	18	7.92	10	17	7.45	8	20	8.73
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	15	6.57	9	12	5.33	11	13	5.76	10	14	6.16	8	20	8.77	10	13	5.67
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	8	10	8.52	8	7	6.01	8	10	8.54	15	4	3.39	9	10	8.43	9	7	5.87
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	15	4	3.41	16	4	3.43	6	14	11.95	7	14	11.87	7	11	9.28	13	6	5.04
	其他		96	42.05		126	55.94		103	45.61		108	47.55		119	52.17		127	55.44

表54-2·臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		436	190.03		488	213.55		445	196.22		464	206.61		497	224.16		470	215.96
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	82	35.74	1	103	45.07	1	91	40.13	1	103	45.86	1	100	45.10	1	94	43.19
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	2	32	26.79	3	33	27.70	4	28	23.64	4	22	18.73	2	40	34.43	2	39	34.14
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	50	21.79	2	70	30.63	2	66	29.10	2	62	27.61	3	73	32.93	3	64	29.41
C22	肝和肝內膽管癌	3	56	24.41	4	45	19.69	3	59	26.02	3	59	26.27	5	47	21.20	4	54	24.81
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	9	8	7.27	7	10	9.14	5	16	14.77	5	18	16.80	4	26	24.64	5	22	21.28
C16	胃癌	5	26	11.33	6	30	13.13	6	25	11.02	6	27	12.02	7	28	12.63	6	27	12.41
C25	胰臟癌	6	22	9.59	5	32	14.00	7	20	8.82	7	21	9.35	6	34	15.34	7	24	11.03
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	13	5.67	8	20	8.75	8	16	7.06	14	9	4.01	9	17	7.67	8	20	9.19
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	8	9	7.54	11	8	6.71	11	6	5.07	8	8	6.81	15	5	4.30	9	9	7.88
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	10	8	6.70	9	10	8.39	11	6	5.07	11	7	5.96	8	9	7.75	10	8	7.00
	其他		130	56.66		127	55.58		112	49.39		128	57.00		118	53.22		109	50.08

表54-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		410	122.97		527	168.49		501	160.39		495	158.06		473	150.37
162	肺癌	1	85	25.49	1	113	36.13	1	105	33.62	1	110	35.12	1	96	30.52
153,154	結腸直腸癌	4	45	13.50	2	77	24.62	3	64	20.49	3	58	18.52	2	66	20.98
155	肝癌	2	72	21.59	3	69	22.06	2	73	23.37	2	84	26.82	3	64	20.35
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	3	24	14.17	4	26	15.96	4	30	18.39	6	19	11.59	4	20	12.11
151	胃癌	5	34	10.20	6	39	12.47	5	46	14.73	4	42	13.41	5	37	11.76
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	7	10	6.09	5	22	14.67	6	18	12.06	5	19	12.74	6	16	10.71
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	8	8	4.72	7	11	6.75	12	7	4.29	7	12	7.32	7	14	8.48
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	9	13	3.90	13	13	4.16	9	17	5.44	8	20	6.39	8	26	8.27
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	11	6.50	8	10	6.14	8	9	5.52	10	8	4.88	9	12	7.27
156	膽囊癌	20	3	0.90	11	15	4.80	10	15	4.80	11	12	3.83	10	22	6.99
	其他		105	31.49		132	42.20		117	37.46		111	35.44		100	31.79

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		501	159.36		572	183.58		544	173.97		580	184.93		582	185.71		593	189.14
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40	1	119	38.19	1	107	34.22	1	116	36.99	1	124	39.57	1	122	38.91
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	24	14.50	3	36	21.84	3	37	22.34	5	31	18.64	4	36	21.64	3	41	24.61
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86	2	70	22.47	2	83	26.54	4	65	20.72	2	91	29.04	2	78	24.88
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	18	12.10	4	28	19.08	5	23	15.64	3	31	21.04	6	16	10.88	6	17	11.57
C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63	5	58	18.61	4	68	21.75	2	83	26.46	3	69	22.02	4	76	24.24
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	6	3.62	14	6	3.64	11	7	4.23	9	9	5.41	8	11	6.61	9	13	7.80
C25	胰臟癌	7	23	7.32	6	40	12.84	6	23	7.36	7	37	11.80	7	33	10.53	5	44	14.03
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45	8	32	10.27	9	18	5.76	8	19	6.06	10	17	5.42	8	26	8.29
C16	胃癌	6	30	9.54	6	40	12.84	7	22	7.04	6	46	14.67	5	41	13.08	7	31	9.89
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	15	5	3.02	16	5	3.03	21	2	1.21	25	1	0.60	16	4	2.40	17	4	2.40
	其他		133	42.30		138	44.29		154	49.25		142	45.28		140	44.67		141	44.97

表54-3·臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年		105年		106年		107年		108年		109年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率						
C00-C97	所有癌症死亡原因		565	180.29		616	197.26		601	193.41		580	187.46		656	212.82		546	178.94
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	126	40.21	1	134	42.91	1	116	37.33	1	111	35.88	1	127	41.20	1	93	30.48
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	2	40	24.00	4	34	20.45	2	54	32.62	4	34	20.60	4	43	26.11	2	39	23.91
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	68	21.70	2	80	25.62	3	85	27.35	2	82	26.50	2	88	28.55	3	72	23.60
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	7	14	9.54	5	21	14.38	6	19	13.09	6	20	13.85	5	24	16.72	4	32	22.53
C22	肝和肝內膽管癌	3	74	23.61	3	71	22.74	4	75	24.14	3	68	21.98	3	86	27.90	5	60	19.66
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	8	4.80	10	11	6.62	8	13	7.85	7	16	9.70	11	11	6.68	6	19	11.65
C25	胰臟癌	5	31	9.89	7	31	9.93	7	33	10.62	5	50	16.16	6	38	12.33	7	35	11.47
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	5	31	9.89	8	25	8.01	11	14	4.51	10	14	4.52	8	25	8.11	8	27	8.85
C16	胃癌	8	25	7.98	6	41	13.13	5	43	13.84	8	29	9.37	7	32	10.38	9	24	7.87
C54	子宮體癌 ⁽¹⁾	10	9	5.40	14	6	3.61	9	8	4.83	12	6	3.64	9	13	7.89	10	11	6.74
	其他		139	44.36		162	51.88		141	45.38		150	48.48		169	54.83		134	43.91

表54-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		289	128.97		370	170.56		374	172.44		351	160.83		384	175.32
162	肺癌	1	50	22.31	1	70	32.27	1	80	36.89	1	62	28.41	1	84	38.35
155	肝癌	2	42	18.74	2	64	29.50	3	46	21.21	2	61	27.95	2	64	29.22
153,154	結腸直腸癌	4	37	16.51	4	45	20.74	2	56	25.82	3	43	19.70	3	41	18.72
151	胃癌	5	26	11.60	5	24	11.06	5	29	13.37	5	26	11.91	4	37	16.89
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	6	11	9.68	3	29	25.77	4	21	18.63	4	19	16.70	5	14	12.21
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	10	4.46	13	7	3.23	7	19	8.76	6	21	9.62	6	20	9.13
157	胰臟癌	11	9	4.02	6	19	8.76	9	14	6.45	7	16	7.33	7	18	8.22
150	食道癌	12	6	2.68	10	12	5.53	10	12	5.53	10	13	5.96	8	15	6.85
156	膽囊癌	12	6	2.68	10	12	5.53	12	7	3.23	12	10	4.58	9	14	6.39
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	8	6	5.43	8	7	6.71	6	11	10.56	9	7	6.70	10	5	4.79
	其他		86	38.38		81	37.34		79	36.42		73	33.45		72	32.87

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		382	174.70		402	183.41		418	188.19		430	190.79		412	180.94		427	185.96
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47	1	85	38.78	1	84	37.82	1	85	37.71	1	91	39.96	1	78	33.97
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	5	14	12.19	4	26	22.44	4	23	19.54	4	22	18.38	4	18	14.86	4	23	18.81
C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35	2	63	28.74	2	68	30.61	3	54	23.96	2	59	25.91	2	65	28.31
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78	3	54	24.64	3	52	23.41	2	58	25.73	3	54	23.71	3	60	26.13
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	7	8	7.71	5	17	16.45	5	13	12.45	5	16	15.14	5	13	12.20	5	14	13.04
C25	胰臟癌	8	14	6.40	7	14	6.39	6	25	11.26	6	22	9.76	8	19	8.34	7	21	9.15
C16	胃癌	4	33	15.09	6	20	9.12	7	24	10.81	7	21	9.32	6	26	11.42	6	22	9.58
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	12	5.49	12	11	5.02	8	21	9.45	8	16	7.10	7	21	9.22	9	16	6.97
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	10	6	5.22	9	7	6.04	12	5	4.25	12	6	5.01	10	7	5.78	8	9	7.36
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	11	5.03	10	12	5.47	10	12	5.40	9	15	6.66	9	15	6.59	10	14	6.10
	其他		99	45.28		93	42.43		91	40.97		115	51.02		89	39.09		105	45.73

表54-4·臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		424	183.61		486	210.12		467	202.18		464	201.67		464	203.13		483	214.07
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	84	36.38	1	101	43.67	1	80	34.64	1	104	45.20	1	92	40.28	1	92	40.77
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	5	17	13.81	4	23	18.64	2	34	27.55	4	32	25.99	3	33	26.98	2	37	30.58
C22	肝和肝內膽管癌	3	56	24.25	3	65	28.10	4	58	25.11	3	62	26.95	2	64	28.02	3	65	28.81
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	69	29.88	2	68	29.40	3	60	25.98	2	63	27.38	4	51	22.33	4	54	23.93
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	4	18	16.69	11	6	5.56	7	14	13.02	6	12	11.22	5	20	18.85	5	18	17.20
C25	胰臟癌	8	17	7.36	6	24	10.38	6	32	13.85	5	31	13.47	6	25	10.94	6	30	13.30
C16	胃癌	6	19	8.23	5	31	13.40	5	33	14.29	7	23	10.00	6	25	10.94	7	26	11.52
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	19	8.23	8	19	8.21	8	16	6.93	10	12	5.22	9	16	7.00	8	24	10.64
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	7	5.69	7	12	9.73	12	6	4.86	11	6	4.87	15	5	4.09	9	11	9.09
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	16	6.93	8	19	8.21	10	14	6.06	8	16	6.95	8	17	7.44	10	15	6.65
	其他		102	44.17		118	51.02		120	51.95		103	44.77		116	50.78		111	49.20

表54-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		244	141.22		245	154.05		282	178.58		267	169.02		258	162.22
162	肺癌	1	48	27.78	1	53	33.32	1	53	33.56	1	57	36.08	1	64	40.24
153,154	結腸直腸癌	4	30	17.36	2	41	25.78	4	32	20.26	3	31	19.62	2	39	24.52
155	肝癌	2	41	23.73	3	34	21.38	3	34	21.53	2	41	25.95	3	32	20.12
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	5	7	8.17	9	5	6.17	18	2	2.48	8	6	7.41	4	9	11.01
151	胃癌	3	34	19.68	4	21	13.20	5	25	15.83	5	20	12.66	5	12	7.55
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	17	3	1.74	8	10	6.29	6	20	12.67	7	13	8.23	6	11	6.92
150	食道癌	11	6	3.47	12	6	3.77	10	9	5.70	12	6	3.80	6	11	6.92
157	胰臟癌	9	8	4.63	7	12	7.55	7	11	6.97	9	9	5.70	8	10	6.29
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	6	6	7.00	6	9	11.11	2	19	23.55	4	14	17.28	9	5	6.12
204-208	白血病	12	5	2.89	14	5	3.14	13	8	5.07	11	7	4.43	10	9	5.66
	其他		56	32.41		49	30.81		69	43.70		63	39.88		56	35.21

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		303	190.07		278	174.68		263	163.87		305	188.50		248	152.48		291	178.24
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64	1	64	40.22	1	56	34.89	1	62	38.32	1	51	31.36	1	45	27.56
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	16	19.48	4	14	17.01	4	15	18.04	5	11	13.10	3	19	22.46	4	14	16.45
C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70	2	41	25.76	3	32	19.94	3	45	27.81	4	30	18.44	2	43	26.34
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48	3	37	23.25	2	38	23.68	2	51	31.52	2	42	25.82	3	42	25.73
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	9	11.65	7	5	6.51	5	9	11.63	4	13	16.70	6	7	8.97	6	11	14.07
C16	胃癌	5	29	18.19	5	19	11.94	7	11	6.85	6	18	11.12	5	15	9.22	7	21	12.86
C25	胰臟癌	9	9	5.65	6	16	10.05	6	16	9.97	7	13	8.03	7	14	8.61	5	24	14.70
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	8	5.02	9	8	5.03	15	5	3.12	8	11	6.80	14	4	2.46	11	8	4.90
C91-C95	白血病	8	11	6.90	9	8	5.03	7	11	6.85	10	7	4.33	17	3	1.84	14	5	3.06
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	13	4	4.87	17	2	2.43	13	3	3.61	12	3	3.57	21	1	1.18	13	3	3.53
	其他		77	48.30		64	40.22		67	41.75		71	43.88		62	38.12		75	45.94

表54-5·臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		317	194.56		314	194.50		295	184.37		298	187.06		301	189.90		280	178.68
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	59	36.21	1	54	33.45	1	55	34.37	1	43	26.99	1	52	32.81	1	63	40.20
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	2	22	25.87	2	27	32.02	3	17	20.33	4	17	20.42	4	17	20.50	2	26	31.66
C22	肝和肝內膽管癌	4	40	24.55	3	43	26.64	5	25	15.62	3	36	22.60	3	36	22.71	3	44	28.08
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	42	25.78	4	42	26.02	2	40	25.00	2	39	24.48	2	45	28.39	4	29	18.51
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	11	14.12	5	10	12.97	4	13	17.02	7	10	13.15	5	13	17.20	5	10	13.41
C16	胃癌	7	19	11.66	6	16	9.91	7	18	11.25	5	23	14.44	6	21	13.25	6	14	8.93
C25	胰臟癌	6	21	12.89	9	13	8.05	6	20	12.50	6	21	13.18	8	15	9.46	6	14	8.93
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	12	7	4.30	7	15	9.29	15	6	3.75	8	12	7.53	12	11	6.94	8	13	8.30
C91-C95	白血病	14	6	3.68	11	9	5.57	11	8	5.00	8	12	7.53	10	13	8.20	9	9	5.74
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	16	3	3.53	14	3	3.56	8	8	9.57	14	3	3.60	13	5	6.03	10	4	4.87
	其他		87	53.40		82	50.79		85	52.65		82	50.79		73	46.05		54	34.46

表54-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		230	168.33		205	158.94		228	178.60		273	215.19		259	204.70
162	肺癌	1	45	32.93	1	40	31.01	1	41	32.12	2	51	40.20	1	54	42.68
155	肝癌	2	39	28.54	1	40	31.01	3	34	26.63	1	57	44.93	2	40	31.61
153,154	結腸直腸癌	4	22	16.10	3	26	20.16	4	29	22.72	3	30	23.65	3	35	27.66
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	5	10	14.75	5	7	10.87	2	18	28.19	4	13	20.44	4	14	22.02
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	12	3	4.36	13	3	4.64	10	4	6.27	7	6	9.48	5	10	15.89
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	11	3	4.43	9	3	4.66	11	3	4.70	10	5	7.86	6	8	12.58
151	胃癌	3	30	21.96	4	15	11.63	5	14	10.97	8	12	9.46	7	14	11.06
157	胰臟癌	6	9	6.59	7	8	6.20	13	5	3.92	6	13	10.25	8	12	9.48
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	6	9	6.59	7	8	6.20	7	11	8.62	11	9	7.09	9	9	7.11
150	食道癌	9	8	5.86	14	3	2.33	6	14	10.97	9	11	8.67	10	8	6.32
	其他		52	38.06		52	40.32		55	43.08		66	52.02		55	43.47

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		267	212.93		255	205.65		244	194.24		288	225.49		282	218.07		236	180.99
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66	1	56	45.16	1	60	47.76	1	56	43.84	1	59	45.63	1	57	43.71
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91	3	35	28.23	3	26	20.70	2	48	37.58	3	33	25.52	2	37	28.37
C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47	2	47	37.90	2	36	28.66	3	39	30.53	2	53	40.99	3	36	27.61
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	16	25.32	4	9	14.33	4	12	18.81	4	11	16.93	4	9	13.65	4	11	16.51
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	13	3	4.82	7	5	8.17	9	4	6.47	8	6	9.56	12	3	4.73	6	6	9.41
C25	胰臟癌	15	5	3.99	9	7	5.65	7	10	7.96	6	14	10.96	5	14	10.83	8	6	4.60
C16	胃癌	5	14	11.17	6	14	11.29	5	16	12.74	5	16	12.53	5	14	10.83	5	15	11.50
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	4	6.33	8	4	6.37	10	4	6.27	10	4	6.16	14	3	4.55	15	2	3.00
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	8	6.38	9	7	6	6	14	11	6	14	11	7	11	8.51	7	11	8.44
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	7	5.58	13	5	4.03	12	5	3.98	16	4	3.13	11	7	5.41	8	6	4.60
	其他		67	53.43		66	53.23		57	45.37		76	59.50		76	58.77		49	37.58

表54-6·臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		300	229.09		270	206.90		298	229.81		303	235.89		304	239.68		280	224.10
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	48	36.65	1	66	50.57	1	65	50.13	3	38	29.58	1	62	48.88	1	59	47.22
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	51	38.95	3	33	25.29	3	39	30.08	4	34	26.47	2	44	34.69	2	45	36.02
C22	肝和肝內膽管癌	3	45	34.36	4	32	24.52	2	45	34.70	1	54	42.04	3	34	26.81	3	36	28.81
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	12	17.92	6	9	13.48	4	17	25.60	2	22	33.41	4	17	26.08	4	13	20.20
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	7	8	12.50	2	17	26.67	8	5	7.90	5	14	22.36	8	7	11.35	5	9	14.85
C25	胰臟癌	6	19	14.51	7	15	11.49	5	21	16.19	7	16	12.46	6	17	13.40	6	15	12.01
C16	胃癌	5	22	16.80	5	20	15.33	7	13	10.03	8	14	10.90	5	19	14.98	7	14	11.20
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	8	8	11.95	14	2	3.00	18	2	3.01	12	5	7.59	20	2	3.07	8	6	9.32
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	8	6.11	8	10	8	11	7	5	9	12	9	7	16	12.61	9	11	8.80
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	13	7	5.35	16	3	2.30	10	9	6.94	6	19	14.79	12	8	6.31	10	10	8.00
	其他		72	54.98		63	48.28		75	57.84		75	58.39		78	61.50		62	49.62

表54-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		270	125.11		414	208.19		431	219.79		427	219.19		458	236.48
155	肝癌	1	50	23.17	2	71	35.70	2	55	28.05	2	72	36.96	1	94	48.54
162	肺癌	2	48	22.24	1	75	37.72	1	88	44.88	1	84	43.12	2	84	43.37
153,154	結腸直腸癌	4	26	12.05	3	47	23.64	3	42	21.42	3	67	34.39	3	55	28.40
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	6	8	7.60	5	15	15.35	4	19	19.68	5	15	15.60	4	18	18.77
151	胃癌	3	42	19.46	4	36	18.10	5	37	18.87	4	32	16.43	5	35	18.07
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	9	9	4.17	12	13	6.54	13	10	5.10	11	10	5.13	6	24	12.39
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	8	5	4.52	8	10	9.89	7	12	12.05	6	14	14.19	7	9	9.21
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	12	5.56	7	20	10.06	6	27	13.77	8	22	11.29	8	16	8.26
150	食道癌	16	4	1.85	10	14	7.04	11	18	9.18	15	6	3.08	9	16	8.26
156	膽囊癌	10	6	2.78	15	7	3.52	9	22	11.22	17	5	2.57	10	15	7.74
	其他		60	27.80		106	53.30		101	51.51		100	51.33		92	47.50

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		394	205.83		446	236.27		426	224.24		448	233.65		464	240.35		458	235.96
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54	1	86	45.56	1	91	47.90	1	90	46.94	1	101	52.32	1	100	51.52
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08	3	50	26.49	3	52	27.37	2	64	33.38	3	59	30.56	3	60	30.91
C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70	2	77	40.79	2	61	32.11	3	60	31.29	2	82	42.48	2	65	33.49
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	7	9	9.47	4	24	25.41	4	24	25.15	5	14	14.50	4	23	23.63	4	25	25.49
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	10	10.37	13	4	4.24	6	16	16.92	8	10	10.50	7	13	13.58	5	16	16.66
C16	胃癌	4	25	13.06	5	38	20.13	5	34	17.90	4	33	17.21	5	27	13.99	6	29	14.94
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75	7	23	12.18	7	17	8.95	6	23	12.00	5	27	13.99	7	28	14.43
C25	胰臟癌	5	20	10.45	8	21	11.12	7	17	8.95	7	22	11.47	8	17	8.81	8	20	10.30
C15	食道癌	16	6	3.13	14	8	4.24	11	10	5.26	9	16	8.34	10	15	7.77	9	15	7.73
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	9	4.70	10	11	5.83	9	14	7.37	11	13	6.78	11	10	5.18	10	14	7.21
	其他		89	46.50		104	55.09		90	47.37		103	53.72		90	46.62		86	44.31

表54-7·臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		459	235.96		456	235.13		438	227.30		468	245.38		461	244.77		486	262.59
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	46.78	1	84	43.31	1	99	51.38	1	95	49.81	1	106	56.28	1	98	52.95
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	65	33.41	3	57	29.39	3	59	30.62	4	47	24.64	3	66	35.04	2	70	37.82
C22	肝和肝內膽管癌	2	65	33.41	2	63	32.48	2	66	34.25	2	70	36.70	4	53	28.14	3	67	36.20
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	29	29.45	4	26	26.43	5	19	19.39	3	26	26.77	2	35	36.44	4	26	27.52
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	15	15.62	6	12	12.56	4	19	20.06	5	18	19.23	9	9	9.75	5	19	20.97
C16	胃癌	6	26	13.37	5	34	17.53	6	23	11.94	7	22	11.53	8	19	10.09	6	29	15.67
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	21	10.80	8	20	10.31	7	19	9.86	9	20	10.49	6	23	12.21	7	22	11.89
C25	胰臟癌	9	17	8.74	7	23	11.86	7	19	9.86	6	24	12.58	5	24	12.74	8	21	11.35
C15	食道癌	8	19	9.77	9	15	7.73	14	8	4.15	8	21	11.01	6	23	12.21	9	19	10.27
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	14	7.20	10	13	6.70	10	14	7.27	14	10	5.24	10	18	9.56	10	14	7.56
	其他		97	49.86		109	56.20		93	48.26		115	60.30		85	45.13		101	54.57

表54-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		274	121.59		406	157.81		384	148.55		411	157.96		411	157.15
162	肺癌	1	53	23.52	1	90	34.98	1	84	32.50	1	88	33.82	1	85	32.50
155	肝癌	2	51	22.63	2	63	24.49	3	43	16.63	3	45	17.30	2	53	20.26
153,154	結腸直腸癌	5	28	12.42	4	45	17.49	2	44	17.02	2	53	20.37	3	43	16.44
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	3	16	14.36	3	25	19.18	4	19	14.47	4	21	15.83	4	19	14.20
151	胃癌	4	29	12.87	6	24	9.33	5	36	13.93	5	34	13.07	5	33	12.62
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	8	5	4.39	5	12	9.45	6	14	11.01	6	16	12.55	6	13	10.18
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	9	8.08	9	8	6.14	10	7	5.33	12	6	4.52	7	11	8.22
157	胰臟癌	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	7	24	9.22	8	16	6.12
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	4	3.59	15	4	3.07	16	3	2.28	8	9	6.78	9	8	5.98
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	7	3.11	10	14	5.44	7	16	6.19	9	16	6.15	10	15	5.74
	其他		65	28.84		211	82.01		202	78.14		203	78.02		215	82.20

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		426	162.79		417	159.41		449	169.83		486	181.43		403	149.08		462	169.46
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83	1	95	36.32	1	104	39.34	1	96	35.84	1	69	25.52	1	93	34.11
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34	2	58	22.17	2	68	25.72	3	57	21.28	3	53	19.61	4	63	23.11
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	9	7.06	6	17	13.41	6	11	8.60	6	14	10.81	5	16	12.26	6	10	7.61
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	3	28	20.87	3	27	20.03	4	27	19.79	4	26	18.79	6	17	12.16	2	41	29.03
C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46	4	49	18.73	3	56	21.18	2	70	26.13	2	57	21.09	3	69	25.31
C25	胰臟癌	7	18	6.88	8	15	5.73	10	17	6.43	7	23	8.59	7	24	8.88	7	19	6.97
C16	胃癌	5	21	8.02	5	43	16.44	5	30	11.35	5	46	17.17	4	35	12.95	5	33	12.10
C15	食道癌	8	16	6.11	17	3	1.15	13	9	3.40	17	7	2.61	16	5	1.85	17	7	2.57
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	12	4.59	7	17	6.50	9	19	7.19	8	17	6.35	9	15	5.55	9	13	4.77
C91-C95	白血病	13	11	4.20	14	7	2.68	12	10	3.78	12	11	4.11	8	16	5.92	12	8	2.93
	其他		100	38.21		86	32.88		98	37.07		119	44.42		96	35.51		106	38.88

表54-8·臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		453	164.94		485	176.17		427	155.37		452	164.91		509	186.59		466	172.61
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	85	30.95	1	85	30.88	1	92	33.48	1	93	33.93	1	103	37.76	1	99	36.67
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	60	21.85	3	62	22.52	2	51	18.56	3	60	21.89	3	65	23.83	2	72	26.67
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	23	17.40	5	20	15.12	5	17	12.89	7	8	6.09	6	13	9.95	3	25	19.37
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	28	19.66	2	36	25.18	4	24	16.80	2	34	23.83	2	45	31.65	4	25	17.74
C22	肝和肝內膽管癌	3	56	20.39	4	50	18.16	3	48	17.47	4	50	18.24	4	61	22.36	5	47	17.41
C25	胰臟癌	10	16	5.83	8	27	9.81	6	28	10.19	6	22	8.03	5	38	13.93	6	33	12.22
C16	胃癌	6	32	11.65	6	30	10.90	7	24	8.73	5	34	12.40	8	24	8.80	7	31	11.48
C15	食道癌	12	10	3.64	12	11	4.00	9	15	5.46	8	15	5.47	10	16	5.87	8	14	5.19
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	10	3.64	10	20	7.26	13	7	2.55	10	12	4.38	7	27	9.90	8	14	5.19
C91-C95	白血病	15	8	2.91	15	9	3.27	15	6	2.18	13	10	3.65	13	13	4.77	8	14	5.19
	其他		125	45.51		135	49.04		115	41.84		114	41.59		104	38.13		92	34.08

表54-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		139	123.11		193	170.72		186	164.58		206	182.05		195	171.83
162	肺癌	1	28	24.80	2	36	31.84	2	34	30.08	2	33	29.16	1	41	36.13
155	肝癌	2	23	20.37	1	37	32.73	1	39	34.51	1	38	33.58	2	30	26.43
153,154	結腸直腸癌	5	12	10.63	6	17	15.04	3	22	19.47	3	24	21.21	3	24	21.15
151	胃癌	3	16	14.17	4	19	16.81	6	12	10.62	4	19	16.79	4	15	13.22
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	4	6	10.80	3	10	17.73	4	9	15.96	5	8	14.14	5	7	12.30
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	6	5.31	15	4	3.54	9	6	5.31	7	8	7.07	6	11	9.69
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	14	1	1.74	11	3	5.30	7	4	7.07	7	4	7.07	7	5	8.84
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	10	8.86	8	8	7.08	12	5	4.42	6	10	8.84	8	8	7.05
156	膽囊癌	10	4	3.54	8	8	7.08	9	6	5.31	11	5	4.42	8	8	7.05
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	5	9.00	5	9	15.96	5	7	12.41	17	1	1.77	10	4	7.03
	其他		28	24.80		42	37.15		42	37.16		56	49.49		42	37.01

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-9 · 臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		186	163.60		215	189.28		195	169.45		222	189.24		226	189.72		228	189.20
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66	1	51	44.90	1	44	38.24	1	48	40.92	1	43	36.10	1	45	37.34
C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87	2	37	32.57	2	30	26.07	2	36	30.69	2	32	26.86	2	36	29.87
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47	4	25	22.01	3	23	19.99	4	30	25.57	4	22	18.47	3	24	19.92
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	2	14	24.46	3	15	26.05	4	10	17.09	3	18	30.12	3	13	21.38	5	10	16.23
C25	胰臟癌	7	8	7.04	9	7	6.16	6	10	8.69	8	8	6.82	9	9	7.56	8	8	6.64
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	4	7.09	8	4	7.14	9	3	5.30	5	8	13.90	7	6	10.29	4	10	16.98
C16	胃癌	3	26	22.87	6	13	11.45	5	12	10.43	6	11	9.38	6	13	10.91	6	19	15.77
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	5	4.40	11	5	4	12	4	3.48	12	4	3.41	12	5	4.20	12	5	4.15
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	5	4.40	5	15	13.21	6	10	8.69	8	8	6.82	5	15	12.59	9	7	5.81
C45-C49	間皮和軟組織癌	13	3	2.64	15	3	2.64	20	1	0.87	19	1	0.85	18	2	1.68	17	3	2.49
	其他		38	33.42		40	35.22		48	41.71		50	42.62		66	55.41		61	50.62

表54-9·臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		231	189.73		213	174.05		204	166.75		280	229.67		246	203.33		250	209.16
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	45	36.96	1	44	35.95	1	44	35.97	1	63	51.68	1	47	38.85	1	52	43.50
C22	肝和肝內膽管癌	2	33	27.10	2	35	28.60	3	31	25.34	3	34	27.89	2	32	26.45	2	39	32.63
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	30	24.64	4	29	23.70	4	29	23.71	2	36	29.53	3	30	24.80	3	28	23.43
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	10	16.05	3	15	23.97	2	18	28.79	4	14	22.46	4	14	22.62	4	13	21.24
C25	胰臟癌	6	14	11.50	7	6	4.90	9	7	5.72	5	14	11.48	6	17	14.05	5	19	15.90
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	10	3	5.05	6	4	6.69	5	7	11.70	10	5	8.39	7	7	11.85	6	8	13.71
C16	胃癌	5	19	15.61	7	6	4.90	6	11	8.99	12	8	6.56	5	19	15.70	7	11	9.20
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	7	5.75	15	4	3	18	1	0.82	12	8	6.56	15	4	3.31	8	10	8.37
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	8	6.57	7	6	4.90	9	7	5.72	7	13	10.66	8	10	8.27	9	9	7.53
C45-C49	間皮和軟組織癌	18	2	1.64	18	1	0.82	11	6	4.90	22	2	1.64	22	1	0.83	10	7	5.86
	其他		60	49.28		63	51.48		43	35.15		83	68.08		65	53.73		54	45.18

表54-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		198	88.79		314	120.54		306	117.01		357	135.62		373	140.72
162	肺癌	2	29	13.00	2	55	21.11	1	56	21.41	1	87	33.05	1	71	26.79
153,154	結腸直腸癌	4	19	8.52	3	41	15.74	3	41	15.68	4	33	12.54	2	52	19.62
155	肝癌	1	42	18.83	1	58	22.27	2	43	16.44	2	53	20.13	3	47	17.73
151	胃癌	3	25	11.21	6	19	7.29	7	24	9.18	4	33	12.54	4	33	12.45
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	5	8	7.20	4	13	9.80	4	15	11.22	3	19	14.08	5	16	11.74
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	18	2	1.79	5	12	9.39	6	12	9.39	9	7	5.46	6	15	11.65
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.79	9	13	4.99	15	5	1.91	10	10	3.80	7	16	6.04
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	8	3	2.70	15	4	3.01	10	6	4.49	11	5	3.70	8	8	5.87
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	9	6	2.69	10	11	4.22	9	12	4.59	8	16	6.08	9	15	5.66
157	胰臟癌	11	5	2.24	8	14	5.37	12	9	3.44	6	19	7.22	9	15	5.66
	其他		55	24.66		74	28.41		83	31.74		75	28.49		85	32.07

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		366	137.51		364	135.33		376	137.75		418	150.45		403	143.20		398	139.99
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55	1	77	28.63	1	85	31.14	1	71	25.55	1	89	31.62	1	88	30.95
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	3	21	15.32	4	20	14.37	4	19	13.43	4	23	15.95	4	20	13.67	4	19	12.84
C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80	3	46	17.10	2	56	20.52	2	63	22.68	2	69	24.52	3	46	16.18
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28	2	48	17.85	3	37	13.56	3	56	20.16	3	55	19.54	2	48	16.88
C25	胰臟癌	7	16	6.01	9	12	4.46	7	20	7.33	9	18	6.48	10	14	4.97	14	10	3.52
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	9	6.97	5	11	8.48	5	16	12.17	7	10	7.48	5	15	11.10	6	13	9.54
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	8	8	5.83	10	6	4.31	9	6	4.24	6	11	7.63	8	8	5.47	10	6	4.05
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	11	4.13	11	10	3.72	11	8	2.93	9	18	6.48	10	14	4.97	7	17	5.98
C16	胃癌	5	25	9.39	6	21	7.81	6	21	7.69	8	20	7.20	7	21	7.46	5	28	9.85
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	-	-	-	8	8	5.75	13	4	2.83	5	17	11.79	6	11	7.52	10	6	4.05
	其他		96	36.07		105	39.04		104	38.10		111	39.95		87	30.91		117	41.15

表54-10·臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年		105年		106年		107年		108年		109年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		458	159.77		461	160.26		409	142.14		416	144.65		450	157.01		447	157.31
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	84	29.30	1	85	29.55	1	83	28.84	1	87	30.25	1	83	28.96	1	85	29.91
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	26	17.41	4	24	16.00	3	27	17.98	2	34	22.63	2	38	25.35	2	40	26.89
C22	肝和肝內膽管癌	2	63	21.98	3	61	21.21	2	65	22.59	3	53	18.43	4	53	18.49	3	55	19.36
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	54	18.84	2	62	21.55	4	43	14.94	4	43	14.95	3	59	20.59	4	49	17.24
C25	胰臟癌	6	26	9.07	11	17	5.91	6	25	8.69	5	28	9.74	5	27	9.42	5	29	10.21
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	7	10	7.28	5	14	10.17	5	15	10.90	10	6	4.37	7	12	8.78	6	10	7.38
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	13	6	4.02	10	10	6.67	15	4	2.66	8	9	5.99	17	4	2.67	7	10	6.72
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	18	6.28	6	24	8.34	9	18	6.26	6	19	6.61	8	20	6.98	8	19	6.69
C16	胃癌	5	30	10.47	6	24	8.34	8	19	6.60	9	17	5.91	5	27	9.42	8	19	6.69
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	20	2	1.34	8	12	8.00	7	10	6.66	15	4	2.66	13	5	3.34	10	9	6.05
	其他		139	48.49		128	44.50		100	34.75		116	40.33		122	42.57		122	42.93

表54-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		322	107.80		476	164.67		456	158.15		489	169.80		533	185.31
162	肺癌	1	74	24.77	1	120	41.51	1	99	34.33	1	101	35.07	1	113	39.29
155	肝癌	2	62	20.76	2	66	22.83	2	67	23.24	2	83	28.82	2	83	28.86
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	5	10	6.67	4	26	17.74	6	13	8.87	3	28	19.09	3	29	19.75
153,154	結腸直腸癌	4	28	9.37	3	56	19.37	2	67	23.24	4	54	18.75	4	55	19.12
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	7	7	4.70	6	15	10.53	4	18	12.69	6	15	10.62	5	16	11.36
151	胃癌	3	29	9.71	5	32	11.07	5	32	11.10	5	39	13.54	6	29	10.08
183	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	6	4.00	8	9	6.14	15	4	2.73	8	9	6.14	7	14	9.53
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	11	9	3.01	12	14	4.84	9	16	5.55	10	16	5.56	8	22	7.65
157	胰臟癌	10	11	3.68	11	15	5.19	7	22	7.63	12	15	5.21	9	21	7.30
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	14	6	2.01	7	24	8.30	9	16	5.55	7	19	6.60	10	19	6.61
	其他		80	26.78		99	34.25		102	35.38		110	38.20		132	45.89

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年			99年			100年			101年			102年			103年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		475	165.76		483	169.95		546	191.04		498	172.93		600	207.38		537	185.11
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15	1	99	34.83	1	125	43.74	1	107	37.15	1	114	39.40	1	125	43.09
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	27	18.43	4	20	13.71	4	27	18.36	4	22	14.84	4	30	20.12	4	31	20.71
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82	2	71	24.98	2	74	25.89	2	71	24.65	3	70	24.19	3	66	22.75
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38	3	59	20.76	3	67	23.44	3	54	18.75	2	73	25.23	2	75	25.85
C25	胰臟癌	8	18	6.28	7	21	7.39	6	31	10.85	7	18	6.25	6	33	11.41	5	35	12.06
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	15	10.71	6	11	7.96	12	6	4.32	5	14	10.02	5	19	13.55	7	11	7.83
C16	胃癌	5	33	11.52	5	32	11.26	5	34	11.90	6	27	9.38	6	33	11.41	6	29	10.00
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	11	8	5.46	10	7	4.80	18	4	2.72	8	9	6.07	9	12	8.05	11	7	4.68
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93	9	17	5.98	7	20	7.00	12	13	4.51	8	31	10.71	8	21	7.24
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	15	5.23	12	13	4.57	9	16	5.60	9	17	5.90	10	23	7.95	14	9	3.10
	其他		106	36.99		133	46.80		142	49.68		146	50.70		162	55.99		128	44.12

表54-11·臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		509	175.17		566	194.96		576	199.23		578	201.10		561	196.84		531	189.00
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	36.14	1	134	46.16	1	142	49.12	1	112	38.97	1	108	37.89	1	116	41.29
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	22	14.66	4	26	17.32	4	31	20.73	3	39	26.20	4	34	23.02	2	38	26.09
C22	肝和肝內膽管癌	3	65	22.37	2	83	28.59	3	70	24.21	4	74	25.75	2	86	30.18	3	70	24.92
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	81	27.88	3	69	23.77	2	74	25.60	2	98	34.10	3	67	23.51	4	69	24.56
C25	胰臟癌	6	34	11.70	7	24	8.27	5	38	13.14	5	44	15.31	8	28	9.82	5	39	13.88
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	17	12.10	5	23	16.40	6	16	11.47	6	18	12.99	5	20	14.56	6	15	11.09
C16	胃癌	7	30	10.32	6	35	12.06	7	26	8.99	7	26	9.05	6	37	12.98	7	27	9.61
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	9	7	4.66	8	12	8.00	9	10	6.69	11	7	4.70	7	17	11.51	8	11	7.55
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	20	6.88	9	18	6.20	8	22	7.61	8	20	6.96	9	21	7.37	9	19	6.76
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	14	9	3.10	13	11	3.79	13	15	5.19	12	13	4.52	13	15	5.26	10	17	6.05
	其他		119	40.95		131	45.12		132	45.66		127	44.19		128	44.91		110	39.15

表54-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	84年			93年			94年			95年			96年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		277	114.03		375	150.60		399	160.59		401	161.17		463	185.33
162	肺癌	2	52	21.41	1	81	32.53	1	78	31.39	1	92	36.98	1	106	42.43
155	肝癌	1	58	23.88	2	72	28.91	2	64	25.76	2	63	25.32	2	61	24.42
153,154	結腸直腸癌	5	18	7.41	3	42	16.87	3	52	20.93	3	46	18.49	3	59	23.62
174	女性乳癌 ⁽¹⁾	3	19	15.73	5	13	10.30	5	16	12.67	6	12	9.47	4	19	14.89
151	胃癌	4	22	9.06	4	34	13.65	4	32	12.88	4	34	13.67	5	33	13.21
185	攝護腺癌 ⁽²⁾	18	2	1.64	6	9	7.33	6	13	10.64	7	8	6.56	6	15	12.28
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	11	6	2.47	11	11	4.42	8	16	6.44	8	15	6.03	7	26	10.41
179,180	子宮頸癌 ⁽¹⁾	6	8	6.62	7	8	6.34	9	8	6.34	5	13	10.25	8	9	7.05
157	胰臟癌	7	10	4.12	9	13	5.22	11	12	4.83	10	13	5.22	9	17	6.80
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	4	1.65	10	12	4.82	7	17	6.84	10	13	5.22	10	16	6.40
	其他		78	32.11		80	32.13		91	36.63		92	36.98		102	40.83

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)84-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9)，97年起配合衛生署改採第十版(ICD-10)，108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」。

表54-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		99年		100年		101年		102年		103年							
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			
C00-C97	所有癌症死亡原因		464	185.70		424	170.54		444	177.07		482	190.33		463	181.70		460	179.35
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82	1	97	39.01	1	92	36.69	1	97	38.30	1	95	37.28	1	84	32.75
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81	5	45	18.10	4	55	21.93	3	61	24.09	3	54	21.19	2	65	25.34
C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62	2	59	23.73	2	73	29.11	2	70	27.64	2	72	28.26	3	58	22.61
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	20	15.62	3	28	21.90	3	29	22.46	5	17	13.03	4	24	18.27	4	22	16.62
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	5	14	11.49	4	23	19.04	7	8	6.58	6	14	11.40	5	15	12.15	7	14	11.28
C25	胰臟癌	8	19	7.60	8	17	6.84	6	17	6.78	7	21	8.29	8	18	7.06	5	32	12.48
C16	胃癌	6	27	10.81	6	23	9.25	5	29	11.57	4	44	17.37	7	21	8.24	6	30	11.70
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	12	6	4.69	12	5	3.91	12	5	3.87	10	7	5.37	11	7	5.33	10	8	6.04
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.20	9	15	6.03	8	16	6.38	8	16	6.32	6	28	10.99	8	19	7.41
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	7	10	7.81	7	9	7.04	10	8	6.19	9	8	6.13	13	5	3.81	13	5	3.78
	其他		132	52.83		103	41.43		112	44.67		127	50.15		124	48.66		123	47.96

表54-12·臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續2完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-10	死亡原因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
C00-C97	所有癌症死亡原因		487	188.99		450	174.68		506	196.95		527	205.86		517	203.20		513	203.79
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	93	36.09	1	107	41.53	1	93	36.20	1	115	44.92	1	95	37.34	1	101	40.12
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	64	24.84	3	54	20.96	2	76	29.58	2	77	30.08	2	79	31.05	2	66	26.22
C22	肝和肝內膽管癌	2	68	26.39	2	62	24.07	3	64	24.91	3	64	25.00	3	75	29.48	3	64	25.42
C50	女性乳房癌 ⁽¹⁾	4	24	18.02	4	20	15.01	4	28	21.04	5	19	14.31	4	35	26.49	4	27	20.63
C61	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	6	15	12.05	5	13	10.46	5	16	12.92	6	14	11.36	6	12	9.81	5	23	19.03
C25	胰臟癌	5	32	12.42	7	21	8.15	6	28	10.90	8	18	7.03	5	29	11.40	6	40	15.89
C16	胃癌	7	26	10.09	6	24	9.32	8	23	8.95	4	37	14.45	7	20	7.86	7	31	12.31
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌 ⁽¹⁾	12	5	3.75	8	10	7.50	7	13	9.77	9	9	6.78	12	6	4.54	8	15	11.46
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	25	9.70	12	12	4.66	8	23	8.95	7	23	8.98	7	20	7.86	9	21	8.34
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌 ⁽¹⁾	14	4	3.00	11	7	5.25	10	8	6.01	12	6	4.52	15	5	3.78	10	8	6.11
	其他		131	50.84		120	46.58		134	52.16		145	56.64		141	55.42		117	46.48

表55·臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人／每十萬男性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	247.37	216.08	34.38	28.83	38.69	35.97	34.08	29.37	26.82	22.51	16.02	12.04	12.32	11.68	4.68	4.05
89年	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90年	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91年	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92年	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93年	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94年	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95年	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26
96年	378.22	269.92	52.91	35.29	50.72	37.87	59.72	41.30	25.13	16.59	43.60	29.51	25.05	19.30	9.16	6.40
97年	419.14	290.36	57.04	37.19	53.42	38.00	70.42	48.07	26.67	16.95	55.16	34.93	28.80	21.56	9.99	6.85
98年	433.34	291.45	62.83	39.86	52.76	36.30	72.20	47.48	26.10	15.81	57.60	36.28	30.62	22.30	10.23	6.38
99年	456.61	303.85	61.07	38.75	54.41	37.43	80.47	53.22	26.61	15.61	58.37	36.42	28.59	20.26	9.82	6.30
100年	451.05	299.70	63.31	39.63	53.90	36.30	79.13	52.15	25.62	15.72	59.08	37.28	31.10	21.88	11.20	7.18
101年	459.72	298.65	61.77	37.67	52.36	34.50	83.56	53.18	24.66	14.53	57.65	35.21	30.89	21.68	10.97	6.89
102年	451.49	289.90	62.33	38.00	51.48	33.25	76.59	48.40	23.49	13.85	57.99	35.00	35.27	24.12	11.32	6.88
103年	450.13	284.34	61.75	37.69	49.63	31.14	82.04	51.02	23.15	13.21	52.25	31.00	32.26	21.93	11.35	6.95
104年	456.98	285.34	68.70	40.69	43.85	27.77	81.05	49.39	23.47	13.03	57.35	33.43	33.50	22.41	14.28	8.64
105年	460.64	280.31	68.01	39.96	44.28	27.28	79.02	46.85	22.57	12.09	58.32	32.88	30.86	20.37	11.09	6.75
106年	476.01	282.54	72.08	41.47	47.98	27.79	79.57	46.31	20.67	11.67	66.38	36.16	31.59	20.41	13.89	7.97
107年	492.71	288.32	70.13	39.54	50.34	28.48	74.84	42.80	24.58	13.25	76.88	40.69	33.85	21.08	13.98	7.63

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表55·臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人/每十萬男性人口

年別	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.48	6.53	5.97	6.05	9.14	8.38	9.67	7.64	2.57	2.08	5.89	5.38	2.80	2.48	4.16	3.54
89年	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90年	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91年	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92年	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93年	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94年	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95年	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69
96年	10.96	7.94	9.78	8.19	10.02	7.85	11.19	7.32	4.07	2.78	6.18	4.67	3.13	2.59	4.07	2.97
97年	12.75	9.08	9.13	7.31	8.81	7.04	13.06	8.79	3.86	2.54	7.55	5.34	3.78	3.51	4.48	3.04
98年	11.19	7.77	9.84	7.76	10.00	7.84	13.41	8.28	3.57	2.21	6.51	4.63	3.25	2.95	4.60	3.33
99年	12.59	8.33	12.83	9.34	9.82	7.59	13.15	8.02	4.75	3.15	9.43	6.48	4.59	3.50	5.54	3.49
100年	10.89	7.25	11.83	9.23	9.25	7.21	14.10	8.70	4.39	2.49	7.99	5.77	2.90	2.25	4.54	2.94
101年	12.37	8.03	11.20	8.01	9.96	7.35	12.91	7.80	4.59	2.75	10.43	7.03	3.73	3.17	3.97	2.60
102年	11.55	7.43	11.40	8.32	8.06	6.00	13.95	8.19	4.34	2.59	9.77	6.54	3.57	2.86	4.42	2.83
103年	14.20	9.03	10.65	7.25	9.34	6.89	13.20	7.60	5.71	3.24	11.65	7.80	3.16	2.49	4.17	2.70
104年	11.58	7.18	10.11	7.12	7.56	5.59	13.05	7.48	4.79	2.70	10.34	6.87	3.94	3.15	4.32	2.53
105年	11.48	7.22	11.17	7.73	7.06	5.13	13.96	7.55	6.20	3.50	9.62	6.03	3.10	2.27	5.12	3.18
106年	13.50	8.20	13.26	8.93	7.41	5.38	15.52	8.11	4.45	2.30	12.17	7.64	3.04	2.08	5.54	3.33
107年	13.74	8.02	12.09	8.30	8.48	6.10	12.25	6.38	3.61	1.87	11.07	6.74	3.46	2.60	4.95	2.76

表56·臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人/每十萬女性人口

年別	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	213.99	200.47	18.64	18.77	23.72	23.42	42.81	38.25	12.81	12.62	12.58	12.11	3.33	3.20	23.26	21.95
89年	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90年	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91年	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92年	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93年	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94年	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95年	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21
96年	328.84	236.19	32.11	22.18	48.16	33.66	92.48	66.76	19.53	13.51	14.06	9.49	5.62	3.78	12.06	8.53
97年	351.41	244.08	34.99	23.40	49.63	32.68	96.16	67.67	22.56	15.27	14.20	9.24	6.51	4.29	12.94	8.79
98年	396.37	269.25	43.95	28.41	54.34	35.37	109.65	76.05	21.68	13.79	15.29	9.64	8.54	5.54	14.11	9.59
99年	394.55	262.64	43.06	26.78	55.96	35.31	110.60	75.15	21.90	14.11	13.49	8.15	7.23	4.39	13.12	8.74
100年	408.04	269.40	41.47	25.97	60.89	37.26	113.70	76.63	23.13	14.31	15.06	9.29	9.89	6.18	13.53	9.05
101年	413.08	268.08	46.83	28.44	60.31	36.11	115.93	78.19	21.04	12.94	15.20	8.71	9.08	5.43	12.54	8.44
102年	418.53	266.57	46.69	27.57	58.07	33.93	121.15	80.63	21.27	12.16	13.82	8.11	9.17	5.18	10.88	6.94
103年	443.53	278.02	50.97	29.83	61.78	35.23	125.26	82.07	21.47	12.00	15.21	8.62	9.31	5.07	10.45	6.77
104年	467.02	286.23	56.34	31.79	61.59	34.27	134.96	87.46	21.64	11.66	14.40	8.20	10.71	5.49	11.85	7.70
105年	458.26	278.50	59.45	33.22	61.66	33.61	133.13	85.84	21.55	11.24	10.74	5.69	9.96	5.28	10.03	6.34
106年	490.32	290.06	70.93	38.10	59.80	31.72	144.29	90.97	20.98	10.38	14.27	7.32	11.49	6.18	10.42	6.28
107年	504.23	293.13	70.10	37.31	60.13	30.28	153.67	95.61	21.50	10.43	17.06	8.38	13.12	6.49	11.18	6.81

資料來源：國民健康署。

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88年起係採2000年世界標準人口為基準計算。

表56·臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人 / 每十萬女性人口

年別	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎臟癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84年	7.20	6.62	2.88	3.04	1.89	1.99	4.24	4.19	4.32	4.50	2.88	2.27	2.05	2.09	3.11	3.03
89年	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90年	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91年	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92年	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93年	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94年	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95年	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67
96年	11.61	8.93	5.03	4.55	3.18	2.09	13.76	10.11	2.44	1.79	2.89	2.15	2.22	2.04	5.40	3.52
97年	12.35	9.00	5.25	4.19	3.85	2.48	16.79	11.52	3.55	2.64	3.40	2.60	2.96	2.61	5.18	3.21
98年	12.62	9.16	7.28	5.54	3.49	2.15	16.26	11.06	3.86	2.61	2.08	1.53	1.71	1.50	5.57	3.38
99年	13.79	9.96	6.19	4.66	4.20	2.58	19.76	13.57	3.83	2.44	3.02	2.13	2.51	2.17	4.65	2.88
100年	14.11	10.06	6.47	5.33	4.00	2.33	18.77	12.58	3.49	2.31	2.69	2.02	3.27	2.62	5.24	3.05
101年	11.89	8.56	7.49	5.79	3.75	2.21	19.81	13.16	3.82	2.48	2.52	1.80	2.52	1.94	4.76	2.73
102年	13.25	9.12	7.80	5.91	3.08	1.65	20.69	13.61	4.15	2.74	2.94	2.04	2.65	2.38	4.08	2.34
103年	15.21	10.91	8.67	6.37	3.55	1.90	24.38	15.79	4.27	2.71	3.34	2.37	2.27	1.70	5.19	2.79
104年	14.26	9.60	6.74	4.44	4.54	2.36	23.56	14.93	6.31	3.95	1.99	1.34	2.98	2.25	5.11	2.60
105年	14.86	10.06	8.82	7.11	4.41	2.14	25.96	16.24	4.05	2.36	1.49	1.00	3.63	2.76	6.12	3.05
106年	15.49	11.14	8.35	5.95	3.78	1.72	24.41	15.17	5.85	3.29	2.43	1.68	3.35	2.61	5.28	2.46
107年	13.83	9.05	10.39	7.06	4.95	2.33	28.53	17.78	4.30	2.75	2.51	1.79	2.08	1.62	4.95	2.25

【附錄 1】109 年臺北市十大死因統計結果 慢性疾病囊括 7 項，癌症續居首席

109 年臺北市十大死因統計結果，以慢性疾病囊括 7 項，使得每 100 人中約有 64.5 人死於慢性疾病，而惡性腫瘤續居首席，其中十大死因排名順序與上(108)年相較，僅高血壓性疾病上升 2 名與蓄意自我傷害(自殺)上升 1 名，事故傷害則退居 1 名。至於十大癌症死因仍以肺癌連續 35 年蟬聯首席，而女性乳癌列居次席。

109 年臺北市民死亡人數為 1 萬 7,196 人，較上年減 4.6% (或減 828 人)，近 10 年平均年增率 1.3%；死亡率則為每十萬人口 655.4 人，較上年減 3.4%(或減 23 人)，近 10 年平均年增率 1.3%，死亡者年齡中位數為 80 歲，較全國 77 歲為高。如依世界衛生組織(WHO)公布 2000 年世界標準人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 289.6 人，較上年減 6.6%(或減 20.3 人)，近 10 年則平均年降 1.6%，並低於全國標準化死亡率 390.8 人，是全國 22 縣市中除金門縣之外，標準化死亡率最低的縣市。

109 年十大主要死因死亡人數占總死亡人數的 7 成 8，其中包括慢性疾病 7 項(占 64.5%)，而惡性腫瘤(占 29.9%)仍居首位，其餘依序為心臟疾病(占 16.3%)；肺炎(占 9.1%)；腦血管疾病(占 6.0%)；糖尿病(占 4.3%)；腎炎、腎病症候群及腎病變(占 2.9%)；慢性下呼吸道疾病(占 2.7%)；高血壓性疾病(占 2.4%)；事故傷害(占 2.1%)；蓄意自我傷害(自殺)(占 1.8%)。若與 108 年死因統計比較，僅高血壓性疾病上升 2 名為第 8 名，以及蓄意自我傷害(自殺)上升 1 名為第 10 名，至於事故傷害則退居 1 名為第 9 名，其餘與上年相同。

109 年臺北市十大主要死因標準化死亡率較上年增加者計 2 項，分別為高血壓性疾病(增 19.3%)、心臟疾病(高血壓性疾病除外)(增 0.6%)；而減少者有 8 項，為肺炎(減 20.3%)、事故傷害(減 15.2%)、慢性下呼吸道疾病(減 10.3%)、腦血管疾病(減 9.9%)、蓄意自我傷害(自殺)(減 9.0%)、惡性腫瘤(減 6.6%)、腎炎、腎病症候群及腎病變(減 5.4%)及糖尿病(減 1.1%)。

依性別觀察，死亡人數、死亡率與標準化死亡率結果呈現男高於女，分別是女性的 1.2 倍、1.4 倍與 1.6 倍。109 年兩性死因前五名皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病，若與上年相較，男性十大死因部分以高血壓性疾病上升 3 名，為第 9 名，而蓄意自我傷害(自殺)退後 1 名，為第 10 名，其餘與上年相同；女性死因部分，僅血管性及未明示之癡呆症上升 1 名為第 8 名，慢性下呼吸道疾病則上升 2 名為第 9 名，其餘與上年相同。男、女性標準化死亡率分別較上年減 6.6%及減 6.1%，其中增幅最顯著分別為男性高血壓性疾病增 32.7%，女性血管性及未明示之癡呆症增 7.8%，而減幅最大為男性肺炎減 19.3%，女性事故傷害減 23.3%。

依年齡層觀察，109 年臺北市 15-24 歲青少年死因前三名分別為自殺(占 28.4%)、事故傷害(占 25.7%)及惡性腫瘤(占 9.5%)；25-44 歲壯年則以惡性腫瘤(占 28.2%)為首、心臟疾病(占 14.5%)及自殺(占 14.1%)次之；45-64 歲中年仍以惡性腫瘤(占 46.0%)居首、心臟疾病(占 14.7%)及腦血管疾病(占 5.3%)次之；65 歲以上老年則以惡性腫瘤(占 26.9%)、心臟疾病(占 16.9%)及肺炎(占 10.8%)分列前三名。

109 年臺北市民因自殺死亡人數為 315 人，較上年減 7.1%(或減 24 人)，其死亡人數依年齡層分以 45-64 歲最多占 35.9%，65 歲以上次之占 33.7%。109 年自殺死亡率為每十萬人口 12.0 人，相較上年減 5.9%，為全國自殺死亡率，除澎湖縣(10.4 人)、金門縣(10.7 人)與新竹市(10.9 人)外之最低縣市。

109年臺北市民癌症死亡人數為5,146人，較上年減180人，平均每日死於癌症人數約有14.1位市民；死亡率為每十萬人口196.1人，死亡者平均年齡為72.4歲；若經標準化後之死亡率為每十萬人口92.9人，較上年減6.6%，且低於全國標準化死亡率117.3人，在全國22縣市中除金門縣(82.8人)之外，為標準化死亡率的最低縣市。

十大癌症死因仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為2.女性乳癌、3.結腸、直腸和肛門癌、4.肝和肝內膽管癌、5.前列腺(攝護腺)癌、6.胰臟癌、7.胃癌、8.卵巢癌、9.口腔癌、10.非何杰金氏淋巴瘤；與上年相較，僅卵巢癌前進2名，為第8名，而口腔癌與非何杰金氏淋巴瘤分別退後1名，為第9名與第10名。其中十大癌症死因標準化死亡率較上年增加者有3項，增幅較多者為卵巢癌(增27.1%)、前列腺(攝護腺)癌(增15.1%)；減少者有7項，減幅較多者為女性乳癌(減11.8%)、結腸、直腸和肛門癌(減11.2%)。

依性別觀察，109年臺北市男性十大癌症死因，以前列腺(攝護腺)癌與胰臟癌上升2名，分別為第4名與第5名，而口腔癌退後1名，為第6名，以及胃癌退後3名，為第7名，其餘死因及順位與上年相同；而男性標準化死亡率較上年減6.4%，其中以食道癌減幅22.7%最顯著，而增幅則以前列腺(攝護腺)癌15.1%最多。109年女性十大癌症死因排名變化，以卵巢癌上升1名，為第7名，以及子宮頸及部位未明示子宮癌上升2名，為第9名，而非何杰金氏淋巴瘤退後1名為第8名，其餘死因順位與上年相同；而女性標準化死亡率較上年減6.6%，其中以白血病減幅24.7%最顯著，增幅以卵巢癌增27.1%最多。

臺北市政府衛生局呼籲，癌症已分別蟬聯39年國人死因第1名與49年臺北市十大死因之首，落實健康飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳的健康生活型態，可預防癌症的發生。為了照護女性市民健康，自107年6月1日起提供設籍臺北市30歲以下有性生活史之女性市民，每年1次免費子宮頸抹片檢查服務，並同時提供篩檢疑似陽性個案追蹤及轉介服務，相關資訊請至臺北市政府衛生局網站(<https://health.gov.taipei/Default.aspx>)查詢。

四項癌症篩檢資格一覽表

篩檢項目	篩檢資格
乳房 X 光攝影檢查	45-69 歲婦女、40-44 歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每 2 年 1 次
子宮頸抹片檢查	30 歲以上婦女，建議每 3 年進行 1 次
糞便潛血檢查	50 至未滿 75 歲民眾，每 2 年 1 次
口腔黏膜檢查	30 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18 歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每 2 年 1 次

資料來源：衛生福利部國民健康署

表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因

民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	死亡原因	總計			男性			女性				
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比%	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數百分比%	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數百分比%	
	所有死亡原因	17,196	655.4	100.0	所有死亡原因	9,533	763.0	100.0	所有死亡原因	7,663	557.6	100.0
1	惡性腫瘤	5,146	196.1	29.9	惡性腫瘤	2,837	227.1	29.8	惡性腫瘤	2,309	168.0	30.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,809	107.1	16.3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,592	127.4	16.7	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,217	88.5	15.9
3	肺炎	1,571	59.9	9.1	肺炎	906	72.5	9.5	肺炎	665	48.4	8.7
4	腦血管疾病	1,037	39.5	6.0	腦血管疾病	610	48.8	6.4	腦血管疾病	427	31.1	5.6
5	糖尿病	734	28.0	4.3	糖尿病	362	29.0	3.8	糖尿病	372	27.1	4.9
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	503	19.2	2.9	慢性下呼吸道疾病	325	26.0	3.4	腎炎、腎病症候群及腎病變	263	19.1	3.4
7	慢性下呼吸道疾病	457	17.4	2.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	240	19.2	2.5	高血壓性疾病	205	14.9	2.7
8	高血壓性疾病	414	15.8	2.4	事故傷害	238	19.1	2.5	血管性及未明示之癡呆症	164	11.9	2.1
9	事故傷害	367	14.0	2.1	高血壓性疾病	209	16.7	2.2	慢性下呼吸道疾病	132	9.6	1.7
10	蓄意自我傷害(自殺)	315	12.0	1.8	蓄意自我傷害(自殺)	187	15.0	2.0	事故傷害	129	9.4	1.7
	其他	3,843	146.5	22.3	其他	2,027	162.2	21.3	其他	1,780	129.5	23.2

資料來源：衛生福利部。

表2 ICD-10 臺北市10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	108年		109年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	309.9	所有死亡原因	289.6	-6.6
1	惡性腫瘤	99.5	惡性腫瘤	92.9	-6.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44.1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44.4	0.6
3	肺炎	26.9	肺炎	21.4	-20.3
4	腦血管疾病	18.5	腦血管疾病	16.7	-9.9
5	糖尿病	11.6	糖尿病	11.5	-1.1
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7.8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7.4	-5.4
7	慢性下呼吸道疾病	7.0	慢性下呼吸道疾病	6.3	-10.3
8	事故傷害	9.9	高血壓性疾病	5.8	19.3
9	敗血症	5.1	事故傷害	8.4	-15.2
10	高血壓性疾病	4.9	蓄意自我傷害(自殺)	9.1	-9.0

資料來源：衛生福利部。

表3 ICD-10 臺北市男性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	108年		109年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	394.8	所有死亡原因	368.7	-6.6
1	惡性腫瘤	121.2	惡性腫瘤	113.4	-6.4
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	58.0	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	60.4	4.1
3	肺炎	35.5	肺炎	28.7	-19.3
4	腦血管疾病	25.0	腦血管疾病	23.0	-8.3
5	糖尿病	14.1	糖尿病	13.7	-2.9
6	慢性下呼吸道疾病	11.6	慢性下呼吸道疾病	10.1	-12.9
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	8.2	-8.3
8	事故傷害	13.9	事故傷害	12.4	-10.6
9	蓄意自我傷害（自殺）	13.4	高血壓性疾病	7.5	32.7
10	敗血症	6.7	蓄意自我傷害(自殺)	11.3	-15.4

資料來源：衛生福利部。

表4 ICD-10 臺北市女性10大主要死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	108年		109年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有死亡原因	239.9	所有死亡原因	225.2	-6.1
1	惡性腫瘤	82.2	惡性腫瘤	76.8	-6.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32.7	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31.2	-4.4
3	肺炎	20.1	肺炎	15.9	-21.2
4	腦血管疾病	13.2	腦血管疾病	11.7	-11.3
5	糖尿病	9.6	糖尿病	9.7	1.5
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	6.9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6.7	-1.8
7	高血壓性疾病	4.3	高血壓性疾病	4.5	5.0
8	敗血症	3.9	血管性及未明示之癱呆症	3.4	7.8
9	血管性及未明示之癱呆症	3.2	慢性下呼吸道疾病	3.3	-2.4
10	事故傷害	6.3	事故傷害	4.9	-23.3

資料來源：衛生福利部。

表5 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因

民國109年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總計				男性				女性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數百分比
	所有癌症死亡原因	5,146	196.1	100.0	所有癌症死亡原因	2,837	227.1	100.0	所有癌症死亡原因	2,309	168.0	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	1,026	39.1	19.9	氣管、支氣管和肺癌	593	47.5	20.9	氣管、支氣管和肺癌	433	31.5	18.8
2	女性乳癌①	354	25.8	6.9	肝和肝內膽管癌	438	35.1	15.4	女性乳癌	354	25.8	15.3
3	結腸、直腸和肛門癌	667	25.4	13.0	結腸、直腸和肛門癌	354	28.3	12.5	結腸、直腸和肛門癌	313	22.8	13.6
4	肝和肝內膽管癌	646	24.6	12.6	前列腺(攝護腺)癌	207	16.6	7.3	肝和肝內膽管癌	208	15.1	9.0
5	前列腺(攝護腺)癌②	207	16.6	4.0	胰臟癌	174	13.9	6.1	胰臟癌	150	10.9	6.5
6	胰臟癌	324	12.3	6.3	口腔癌	172	13.8	6.1	胃癌	117	8.5	5.1
7	胃癌	277	10.6	5.4	胃癌	160	12.8	5.6	卵巢癌	106	7.7	4.6
8	卵巢癌①	106	7.7	2.1	食道癌	108	8.6	3.8	非何杰金氏淋巴瘤	74	5.4	3.2
9	口腔癌	184	7.0	3.6	非何杰金氏淋巴瘤	94	7.5	3.3	子宮頸及部位未明示子宮癌	68	4.9	2.9
10	非何杰金氏淋巴瘤	168	6.4	3.3	白血病	82	6.6	2.9	白血病	59	4.3	2.6
	其他	1,187	45.2	23.1	其他	455	36.4	16.0	其他	427	31.1	18.5

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表6 ICD-10 臺北市10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	108年		109年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死因	99.5	所有癌症死因	92.9	-6.6
1	氣管、支氣管和肺癌	18.6	氣管、支氣管和肺癌	18.2	-2.2
2	女性乳癌①	14.8	女性乳癌①	13.1	-11.8
3	結腸、直腸和肛門癌	12.9	結腸、直腸和肛門癌	11.5	-11.2
4	肝和肝內膽管癌	12.1	肝和肝內膽管癌	11.5	-5.3
5	前列腺(攝護腺)癌②	6.0	前列腺(攝護腺)癌②	6.9	15.1
6	胰臟癌	5.7	胰臟癌	5.8	1.7
7	胃癌	5.1	胃癌	4.6	-9.6
8	口腔癌	4.2	卵巢癌①	4.3	27.1
9	非何杰金氏淋巴瘤	3.2	口腔癌	3.8	-9.2
10	卵巢癌①	3.4	非何杰金氏淋巴瘤	2.9	-9.5

資料來源：衛生福利部。

附註：①每十萬女性人口死亡率。

②每十萬男性人口死亡率。

表7 ICD-10 臺北市男性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	108年		109年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	121.2	所有癌症死亡原因	113.4	-6.4
1	氣管、支氣管和肺癌	24.7	氣管、支氣管和肺癌	23.6	-4.2
2	肝和肝內膽管癌	18.1	肝和肝內膽管癌	17.7	-1.9
3	結腸、直腸和肛門癌	16.4	結腸、直腸和肛門癌	13.8	-15.9
4	胃癌	7.1	前列腺(攝護腺)癌	6.9	15.1
5	口腔癌	8.4	胰臟癌	7.1	12.3
6	前列腺(攝護腺)癌	6.0	口腔癌	7.8	-6.9
7	胰臟癌	6.3	胃癌	5.8	-17.6
8	食道癌	6.0	食道癌	4.6	-22.7
9	非何杰金氏淋巴瘤	3.7	非何杰金氏淋巴瘤	3.6	-3.9
10	白血病	3.5	白血病	3.3	-6.6

資料來源：衛生福利部。

表8 ICD-10 臺北市女性10大主要癌症死因標準化死亡率比較

單位：人/每十萬人口，%

順位	108年		109年		
	死亡原因	標準化死亡率	死亡原因	標準化死亡率	較上年增減率(%)
	所有癌症死亡原因	82.2	所有癌症死亡原因	76.8	-6.6
1	氣管、支氣管和肺癌	13.7	氣管、支氣管和肺癌	13.8	0.9
2	女性乳癌	14.8	女性乳房癌	13.1	-11.8
3	結腸、直腸和肛門癌	10.3	結腸、直腸和肛門癌	9.7	-5.8
4	肝和肝內膽管癌	7.3	肝和肝內膽管癌	6.4	-12.1
5	胰臟癌	5.2	胰臟癌	4.8	-8.8
6	胃癌	3.6	胃癌	3.8	5.3
7	非何杰金氏淋巴瘤	2.7	卵巢癌	4.3	27.1
8	卵巢癌	3.4	非何杰金氏淋巴瘤	2.4	-14.2
9	子宮體癌	2.5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2.5	3.2
10	白血病	2.6	白血病	1.9	-24.7

資料來源：衛生福利部。

【附錄2】ICD-10 新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因及主要癌症死亡原因比較

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較

順位	臺北市 109					新北市 109					桃園市 109				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有死亡原因	17,196	655.40	289.57	100.00	所有死亡原因	24,535	609.59	361.52	100.00	所有死亡原因	13,127	581.12	378.85	100.00
1	惡性腫瘤	5,146	196.13	92.94	29.93	惡性腫瘤	7,347	182.54	106.54	29.94	惡性腫瘤	3,510	155.38	103.12	26.74
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2,809	107.06	44.40	16.34	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	3,743	93.00	53.04	15.26	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	1,356	60.03	38.38	10.33
3	肺炎	1,571	59.88	21.44	9.14	肺炎	2,172	53.97	29.31	8.85	腦血管疾病	1,042	46.13	29.56	7.94
4	腦血管疾病	1,037	39.52	16.72	6.03	腦血管疾病	1,505	37.39	21.41	6.13	高血壓性 疾病	979	43.34	25.92	7.46
5	糖尿病	734	27.98	11.51	4.27	糖尿病	1,332	33.09	18.72	5.43	肺炎	800	35.42	20.64	6.09
6	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	503	19.17	7.41	2.93	慢性下呼吸 道疾病	728	18.09	9.89	2.97	糖尿病	759	33.60	21.32	5.78
7	慢性下呼吸 道疾病	457	17.42	6.29	2.66	事故傷害	728	18.09	13.96	2.97	事故傷害	558	24.70	19.83	4.25
8	高血壓性 疾病	414	15.78	5.85	2.41	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	660	16.40	9.19	2.69	慢性下呼吸 道疾病	454	20.10	12.05	3.46
9	事故傷害	367	13.99	8.39	2.13	蓄意自我傷 害（自殺）	635	15.78	12.27	2.59	慢性肝病及 肝硬化	333	14.74	10.28	2.54
10	蓄意自我傷 害（自殺）	315	12.01	9.14	1.83	高血壓性 疾病	531	13.19	7.31	2.16	蓄意自我傷 害（自殺）	330	14.61	12.14	2.51
	其他	3,843	146.47	65.47	22.35	其他	5,154	128.06	79.86	21.01	其他	3,006	133.07	85.60	22.90
11	血管性及未 明示之失 智症	309	11.78	3.61	1.80	慢性肝病及 肝硬化	491	12.20	7.54	2.00	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	293	12.97	8.09	2.23
12	慢性肝病及 肝硬化	232	8.84	4.47	1.35	敗血症	300	7.45	4.19	1.22	血管性及未 明示之失 智症	277	12.26	6.68	2.11
13	敗血症	213	8.12	3.47	1.24	血管性及未 明示之失 智症	246	6.11	3.14	1.00	衰老/老邁	190	8.41	4.43	1.45
14	肇因於吸入 外物之肺 部病況（塵 肺症及肺 炎除外）	163	6.21	2.36	0.95	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	194	4.82	2.71	0.79	敗血症	130	5.75	3.61	0.99
15	帕金森病	161	6.14	2.34	0.94	肇因於吸入 外物之肺 部病況（塵 肺症及肺 炎除外）	170	4.22	2.32	0.69	帕金森病	116	5.14	3.06	0.88

資料來源：衛生福利部。

表1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要死亡原因比較(續)

順位	臺中市 109					臺南市 109					高雄市 109				
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口		死亡百分比
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率	
	所有死亡原因	17,486	620.51	387.36	100.00	所有死亡原因	15,362	818.04	413.08	100.00	所有死亡原因	21,712	783.95	427.64	100.00
1	惡性腫瘤	5,429	192.65	122.15	31.05	惡性腫瘤	4,674	248.89	130.88	30.43	惡性腫瘤	6,645	239.93	131.44	30.61
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1,521	53.97	32.39	8.70	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	1,701	90.58	44.55	11.07	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	2,051	74.05	38.54	9.45
3	肺炎	1,317	46.73	26.47	7.53	肺炎	1,186	63.16	26.47	7.72	肺炎	1,624	58.64	28.36	7.48
4	糖尿病	1,219	43.26	26.09	6.97	腦血管疾病	1,096	58.36	27.79	7.13	腦血管疾病	1,497	54.05	27.82	6.89
5	腦血管疾病	1,145	40.63	24.50	6.55	糖尿病	964	51.33	24.74	6.28	糖尿病	1,380	49.83	25.69	6.36
6	事故傷害	792	28.10	20.58	4.53	事故傷害	645	34.35	22.04	4.20	高血壓性 疾病	886	31.99	15.78	4.08
7	高血壓性 疾病	771	27.36	16.05	4.41	高血壓性 疾病	481	25.61	11.55	3.13	事故傷害	831	30.00	21.27	3.83
8	腎炎、腎病症候群 及腎病變	623	22.11	12.98	3.56	腎炎、腎病症候群 及腎病變	459	24.44	11.56	2.99	腎炎、腎病症候群 及腎病變	643	23.22	11.66	2.96
9	慢性下呼吸 道疾病	584	20.72	11.69	3.34	慢性下呼吸 道疾病	414	22.05	9.61	2.69	慢性下呼吸 道疾病	612	22.10	10.79	2.82
10	蓄意自我傷 害（自殺）	438	15.54	12.30	2.50	衰老/老邁	408	21.73	8.11	2.66	衰老/老邁	560	20.22	9.03	2.58
	其他	3,647	129.42	82.14	20.86	其他	3,334	177.54	95.79	21.70	其他	4,983	179.92	107.26	22.95
11	慢性肝病及 肝硬化	378	13.41	8.90	2.16	血管性及未明 示之失智症	351	18.69	7.07	2.28	慢性肝病及 肝硬化	474	17.11	10.28	2.18
12	血管性及未明 示之失智症	246	8.73	4.60	1.41	慢性肝病及 肝硬化	336	17.89	10.42	2.19	蓄意自我傷 害（自殺）	453	16.36	12.25	2.09
13	衰老/老邁	240	8.52	4.29	1.37	蓄意自我傷 害（自殺）	288	15.34	11.14	1.87	血管性及未明 示之失智症	262	9.46	4.39	1.21
14	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	143	5.07	3.38	0.82	原位與良性 腫瘤（惡性 腫瘤除外）	131	6.98	3.27	0.85	敗血症	248	8.95	4.66	1.14
15	帕金森病	140	4.97	2.90	0.80	敗血症	130	6.92	3.16	0.85	原位與良性 腫瘤（惡性 腫瘤除外）	210	7.58	3.79	0.97

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較

順位	臺北市 109					新北市 109					桃園市 109				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	惡性腫瘤	5,146	196.13	92.94	100.00	惡性腫瘤	7,347	182.54	106.54	100.00	惡性腫瘤	3,510	155.38	103.12	100.00
2	氣管、支氣管和肺 癌	1,026	39.10	18.15	19.94	氣管、支氣管和肺 癌	1,481	36.80	20.99	20.16	氣管、支氣管和肺 癌	680	30.10	19.82	19.37
3	女性乳房癌 ⁽¹⁾	354	25.76	13.06	6.88	肝和肝內膽管癌	1,015	25.22	14.51	13.82	肝和肝內膽管癌	495	21.91	14.46	14.10
4	結腸、直腸和肛門 癌	667	25.42	11.50	12.96	女性乳房癌 ⁽¹⁾	460	22.34	12.71	6.26	結腸、直腸和肛門 癌	474	20.98	13.60	13.50
5	肝和肝內膽管癌	646	24.62	11.50	12.55	結腸、直腸和肛門 癌	893	22.19	12.67	12.15	女性乳房癌 ⁽¹⁾	188	16.51	10.85	5.36
6	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	207	16.57	6.93	4.02	口腔癌	490	12.17	7.32	6.67	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	114	10.18	6.38	3.25
7	胰臟癌	324	12.35	5.83	6.30	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	215	10.94	6.68	2.93	口腔癌	212	9.39	6.33	6.04
8	胃癌	277	10.56	4.64	5.38	胰臟癌	372	9.24	5.22	5.06	胰臟癌	190	8.41	5.53	5.41
9	卵巢癌 ⁽¹⁾	106	7.71	4.28	2.06	胃癌	364	9.04	5.15	4.95	胃癌	172	7.61	4.90	4.90
10	口腔癌	184	7.01	3.77	3.58	食道癌	289	7.18	4.17	3.93	食道癌	68	5.97	4.05	1.94
11	非何杰金氏淋巴瘤	168	6.40	2.91	3.26	卵巢癌 ⁽¹⁾	127	6.17	3.60	1.73	非何杰金氏淋巴瘤	124	5.49	3.64	3.53
12	其他	1,187	45.24	22.19	23.07	其他	1,641	40.77	24.82	22.34	其他	793	35.11	24.06	22.59
13	白血病	141	5.37	2.53	2.74	非何杰金氏淋巴瘤	194	4.82	2.91	2.64	子宮頸及部位未明 示子宮癌 ⁽¹⁾	54	4.74	3.08	1.54
14	子宮頸及部位未明 示子宮癌 ⁽¹⁾	68	4.95	2.50	1.32	子宮頸及部位未明 示子宮癌 ⁽¹⁾	95	4.61	2.73	1.29	非何杰金氏淋巴瘤	94	4.16	2.78	2.68
15	食道癌	121	4.61	2.36	2.35	膀胱癌	153	3.80	2.12	2.08	白血病	93	4.12	2.88	2.65
16	子宮體癌 ⁽¹⁾	56	4.07	2.04	1.09	子宮體癌 ⁽¹⁾	77	3.74	2.15	1.05	膀胱癌	74	3.28	2.12	2.11
17	膀胱癌	104	3.96	1.67	2.02	白血病	150	3.73	2.44	2.04	子宮體癌 ⁽¹⁾	32	2.81	1.87	0.91

資料來源：衛生福利部。

附註：(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率(2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表2.新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市主要癌症死亡原因比較(續)

順位	臺中市 109					臺南市 109					高雄市 109				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
			死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
1	惡性腫瘤	5,429	192.65	122.15	100.00	惡性腫瘤	4,674	248.89	130.88	100.00	惡性腫瘤	6,645	239.93	131.44	100.00
1	氣管、支氣管和肺 癌	979	34.74	21.73	18.03	氣管、支氣管和肺 癌	911	48.51	24.84	19.49	氣管、支氣管和肺 癌	1,217	43.94	23.37	18.31
2	肝和肝內膽管癌	858	30.45	19.19	15.80	肝和肝內膽管癌	757	40.31	21.17	16.20	肝和肝內膽管癌	1,133	40.91	22.08	17.05
3	結腸、直腸和肛門 癌	705	25.02	15.51	12.99	結腸、直腸和肛門 癌	686	36.53	18.52	14.68	結腸、直腸和肛門 癌	927	33.47	17.82	13.95
4	女性乳房癌 ⁽¹⁾	344	24.00	15.08	6.34	女性乳房癌 ⁽¹⁾	211	22.39	12.58	4.51	女性乳房癌 ⁽¹⁾	332	23.67	13.30	5.00
5	口腔癌	387	13.73	8.98	7.13	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	171	18.28	9.30	3.66	口腔癌	458	16.54	9.58	6.89
6	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	157	11.34	7.40	2.89	口腔癌	259	13.79	8.26	5.54	前列腺(攝護腺)癌 ⁽²⁾	225	16.46	8.85	3.39
7	胰臟癌	272	9.65	6.17	5.01	胰臟癌	228	12.14	6.55	4.88	胰臟癌	296	10.69	5.84	4.45
8	胃癌	261	9.26	5.71	4.81	胃癌	185	9.85	4.95	3.96	胃癌	258	9.32	5.02	3.88
9	食道癌	239	8.48	5.46	4.40	食道癌	144	7.67	4.32	3.08	食道癌	247	8.92	5.10	3.72
10	子宮頸及部位未明 示子宮癌 ⁽¹⁾	80	5.58	3.44	1.47	膀胱癌	143	7.61	3.49	3.06	子宮頸及部位未明 示子宮癌 ⁽¹⁾	102	7.27	3.96	1.53
	其他	1,147	40.70	26.28	21.13	其他	979	52.13	28.22	20.95	其他	1,450	52.35	29.60	21.82
11	卵巢癌 ⁽¹⁾	69	4.81	2.99	1.27	卵巢癌 ⁽¹⁾	64	6.79	4.08	1.37	非何杰金氏淋巴瘤	172	6.21	3.44	2.59
12	白血病	134	4.76	3.30	2.47	白血病	107	5.70	3.06	2.29	卵巢癌 ⁽¹⁾	87	6.20	3.60	1.31
13	非何杰金氏淋巴瘤	129	4.58	2.92	2.38	子宮頸及部位未明 示子宮癌 ⁽¹⁾	53	5.62	2.77	1.13	膀胱癌	153	5.52	2.76	2.30
14	子宮體癌 ⁽¹⁾	61	4.26	2.70	1.12	非何杰金氏淋巴瘤	105	5.59	2.89	2.25	白血病	134	4.84	2.90	2.02
15	膀胱癌	117	4.15	2.44	2.16	子宮體癌 ⁽¹⁾	39	4.14	2.36	0.83	子宮體癌 ⁽¹⁾	63	4.49	2.55	0.95

【附錄3】ICD-10 臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

表1.臺北市、全國及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2020				全國 2020				日本 2019(令和元年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	17,196	655.40	100.00	所有死亡原因	173,067	733.89	100.00	所有死亡原因	1,381,093	1116.20	100.00
1	惡性腫瘤	5,146	196.13	29.93	惡性腫瘤	50,161	212.71	28.98	惡性腫瘤	376,425	304.23	27.26
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,809	107.06	16.34	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	20,457	86.75	11.82	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	207,714	167.88	15.04
3	肺炎	1,571	59.88	9.14	肺炎	13,736	58.25	7.94	老邁	121,863	98.49	8.82
4	腦血管疾病	1,037	39.52	6.03	腦血管疾病	11,821	50.13	6.83	腦血管疾病	106,552	86.12	7.72
5	糖尿病	734	27.98	4.27	糖尿病	10,311	43.72	5.96	肺炎	95,518	77.20	6.92
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	503	19.17	2.93	事故傷害	6,767	28.70	3.91	事故傷害	39,184	31.67	2.84
7	慢性下呼吸道疾病	457	17.42	2.66	高血壓性疾病	6,706	28.44	3.87	腎衰竭	26,644	21.53	1.93
8	高血壓性疾病	414	15.78	2.41	慢性下呼吸道疾病	5,657	23.99	3.27	血管性及未明示之癡呆症	21,394	17.29	1.55
9	事故傷害	367	13.99	2.13	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,096	21.61	2.94	阿茲海默病	20,730	16.75	1.50
10	蓄意自我傷害（自殺）	315	12.01	1.83	慢性肝病及肝硬化	3,964	16.81	2.29	自殺	19,425	15.70	1.41
	其他	3,843	146.47	22.35	其他	38,391	162.80	22.18	其他	345,644	279.35	25.03
11	血管性及未明示之癡呆症	309	11.78	1.80	蓄意自我傷害（自殺）	3,656	15.50	2.11	主動脈瘤及剝離	18,830	15.22	1.36
12	慢性肝病及肝硬化	232	8.84	1.35	血管性及未明示之癡呆症	2,885	12.23	1.67	慢性阻塞性肺病	18,803	15.20	1.36
13	敗血症	213	8.12	1.24	衰老/老邁	2,385	10.11	1.38	肝臟疾病	17,273	13.96	1.25
14	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	163	6.21	0.95	敗血症	1,931	8.19	1.12	糖尿病	13,846	11.19	1.00
15	帕金森病	161	6.14	0.94	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,514	6.42	0.87	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	13,442	10.86	0.97

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2020				全國 2020				日本 2019(令和元年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	64	347.84	100.00	所有死亡原因	586	363.33	100.00	所有死亡原因	1,654	191.16	100.00
1	源於周產期的特定病況	37	201.10	57.81	先天性畸形、變形及染色體異常	105	65.10	17.92	先天性畸形變形及染色體異常	580	67.03	35.07
2	先天性畸形變形及染色體異常	13	70.66	20.31	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	79	48.98	13.48	源於周產期的特定病況	429	49.58	25.94
3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	16.31	4.69	源於周產期的呼吸性疾患	76	47.12	12.97	事故傷害	78	9.01	4.72
4	嬰兒猝死症候群（SIDS）	3	16.31	4.69	事故傷害	39	24.18	6.66	嬰兒猝死症候群（SIDS）	75	8.67	4.53
5	肺炎	2	10.87	3.13	特發於周產期的感染	29	17.98	4.95	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	45	5.20	2.72
6	敗血症	1	5.44	1.56	嬰兒猝死症候群（SIDS）	23	14.26	3.92	敗血症	32	3.70	1.93
7	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.44	1.56	母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	19	11.78	3.24	肺炎	27	3.12	1.63
8					胎兒及新生兒出血及血液疾患	18	11.16	3.07	他殺	11	1.27	0.67
9					心臟疾病（高血壓性心臟病除外）	11	6.82	1.88	腸道感染症	10	1.16	0.60
10					肺炎	11	6.82	1.88	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	9	1.04	0.54
	其他	4	21.74	6.25	其他	176	109.12	30.03	其他	358	41.38	21.64

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

附註：(1)源於周產期的特定病況包含胎兒及新生兒受母體因素和妊娠、產程[臨產]及分娩併發症的影響、妊娠期長短和胎兒生長有關的疾患、生產創傷、特發於周產期的呼吸和心臟血管疾患、特發於周產期的感染(症)、胎兒及新生兒出血和血液疾患、特發於胎兒及新生兒的短暫性內分泌和(新陳)代謝(性)疾患、胎兒和新生兒消化系統疾患、侵及(侵犯、涉及)胎兒及新生兒體被[被膜、皮膚]和體溫調節的病況。

表3. 少年（1-14歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2020				全國 2020				日本 2019(令和元年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
1	所有死亡原因	25	7.55	100.00	所有死亡原因	327	11.58	100.00	所有死亡原因	1,470	10.41	100.00
2	蓄意自我傷害（自殺）	7	2.11	28.00	事故傷害	74	2.62	22.63	惡性腫瘤	249	1.76	16.94
3	惡性腫瘤	5	1.51	20.00	惡性腫瘤	54	1.91	16.51	先天性畸形變形及染色體異常	206	1.46	14.01
4	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	3	0.91	12.00	先天性畸形變形及 染色體異常	31	1.10	9.48	事故傷害	181	1.28	12.31
5	事故傷害	3	0.91	12.00	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	26	0.92	7.95	自殺	90	0.64	6.12
6	先天性畸形變形及 染色體異常	2	0.60	8.00	蓄意自我傷害（自 殺）	21	0.74	6.42	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	78	0.55	5.31
7	加害（他殺）	1	0.30	4.00	加害（他殺）	17	0.60	5.20	流行性感 冒	54	0.38	3.67
8					腦血管疾 病	8	0.28	2.45	原位與良 性腫瘤（ 惡性腫瘤 除外）	37	0.26	2.52
9					肺炎	6	0.21	1.83	腦血管疾 病	29	0.21	1.97
10					源於周產 期的特定 病況	5	0.18	1.53	敗血症	29	0.21	1.97
					流感	3	0.11	0.92	腸道感 染症	24	0.17	1.63
	其他	4	1.21	16.00	其他	82	2.90	25.08	其他	493	3.49	33.54

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2020				全國 2020				日本 2019(令和元年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	74	29.50	100.00	所有死亡原因	1,121	41.38	100.00	所有死亡原因	3,219	27.59	100.00
1	蓄意自我傷害（自殺）	21	8.37	28.38	事故傷害	529	19.53	47.19	自殺	1,603	13.74	49.80
2	事故傷害	19	7.57	25.68	蓄意自我傷害（自殺）	239	8.82	21.32	事故傷害	515	4.41	16.00
3	惡性腫瘤	7	2.79	9.46	惡性腫瘤	100	3.69	8.92	惡性腫瘤	284	2.43	8.82
4	腦血管疾病	4	1.59	5.41	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	33	1.22	2.94	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	133	1.14	4.13
5	肺炎	3	1.20	4.05	腦血管疾病	16	0.59	1.43	先天性畸形變形及 染色體異常	65	0.56	2.02
6	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	0.80	2.70	先天性畸形變形及 染色體異常	15	0.55	1.34	腦血管疾病	37	0.32	1.15
7	敗血症	1	0.40	1.35	加害（他殺）	15	0.55	1.34	敗血症	25	0.21	0.78
8	糖尿病	1	0.40	1.35	肺炎	14	0.52	1.25	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	21	0.18	0.65
9	慢性下呼吸道疾病	1	0.40	1.35	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	9	0.33	0.80	他殺	19	0.16	0.59
10	皮膚及皮下組織疾 病	1	0.40	1.35	腎炎、腎病症候群 及腎病變	6	0.22	0.54	肺炎	13	0.11	0.40
	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	1	0.40	1.35								
	先天性畸形變形及 染色體異常	1	0.40	1.35								
	其他	12	4.78	16.22	其他	145	5.35	12.93	其他	504	4.32	15.66

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2020				全國 2020				日本 2019(令和元年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比
	所有死亡原因	482	63.76	100.00	所有死亡原因	7,383	103.73	100.00	所有死亡原因	17,323	61.42	100.00
1	惡性腫瘤	136	17.99	28.22	惡性腫瘤	1,837	25.81	24.88	自殺	4,919	17.44	28.40
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	70	9.26	14.52	蓄意自我傷害（自 殺）	1,068	15.00	14.47	惡性腫瘤	4,087	14.49	23.59
3	蓄意自我傷害（自 殺）	68	8.99	14.11	事故傷害	1,017	14.29	13.77	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	1,571	5.57	9.07
4	事故傷害	40	5.29	8.30	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	729	10.24	9.87	事故傷害	1,265	4.48	7.30
5	腦血管疾病	29	3.84	6.02	慢性肝病及肝硬化	490	6.88	6.64	腦血管疾病	1,104	3.91	6.37
6	肺炎	14	1.85	2.90	腦血管疾病	308	4.33	4.17	肝臟疾病	581	2.06	3.35
7	慢性肝病及肝硬化	13	1.72	2.70	糖尿病	171	2.40	2.32	原位與良性腫瘤（ 惡性腫瘤除外）	181	0.64	1.04
8	主動脈瘤及剝離	7	0.93	1.45	高血壓性疾病	135	1.90	1.83	肺炎	177	0.63	1.02
9	糖尿病	6	0.79	1.24	肺炎	127	1.78	1.72	主動脈瘤及剝離	168	0.60	0.97
10	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	6	0.79	1.24	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	88	1.24	1.19	先天性畸形變形及 染色體異常	157	0.56	0.91
	其他	93	12.30	19.29	其他	1,413	19.85	19.14	其他	3,113	11.04	17.97

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2020				全國 2020				日本 2019(令和元年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	2,837	363.68	100.00	所有死亡原因	36,769	519.95	100.00	所有死亡原因	103,104	311.25	100.00
1	惡性腫瘤	1,304	167.16	45.96	惡性腫瘤	15,779	223.13	42.91	惡性腫瘤	43,019	129.86	41.72
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	418	53.58	14.73	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	3,853	54.48	10.48	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)	13,061	39.43	12.67
3	腦血管疾病	150	19.23	5.29	腦血管疾病	2,098	29.67	5.71	腦血管疾病	7,955	24.01	7.72
4	蓄意自我傷害(自 殺)	113	14.49	3.98	事故傷害	1,839	26.01	5.00	自殺	6,487	19.58	6.29
5	糖尿病	94	12.05	3.31	慢性肝病及肝硬化	1,799	25.44	4.89	肝臟疾病	4,530	13.67	4.39
6	事故傷害	90	11.54	3.17	糖尿病	1,764	24.94	4.80	事故傷害	3,768	11.37	3.65
7	肺炎	77	9.87	2.71	蓄意自我傷害(自 殺)	1,343	18.99	3.65	肺炎	1,884	5.69	1.83
8	慢性肝病及肝硬化	75	9.61	2.64	肺炎	1,023	14.47	2.78	主動脈瘤及剝離	1,708	5.16	1.66
9	腎炎、腎病症候群 及腎病變	47	6.03	1.66	高血壓性疾病	946	13.38	2.57	糖尿病	1,307	3.95	1.27
10	高血壓性疾病	43	5.51	1.52	腎炎、腎病症候群 及腎病變	665	9.40	1.81	腎衰竭	837	2.53	0.81
	其他	426	54.61	15.02	其他	5,660	80.04	15.39	其他	18,548	55.99	17.99

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

表7.老年人口 (65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2020				全國 2020				日本 2019(令和元年)			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比
	所有死亡原因	13,714	2,817.22	100.00	所有死亡原因	126,881	3,431.79	100.00	所有死亡原因	1,253,839	3,509.36	100.00
1	惡性腫瘤	3,694	758.85	26.94	惡性腫瘤	32,388	876.01	25.53	惡性腫瘤	328,764	920.17	26.22
2	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	2,313	475.15	16.87	心臟疾病 (高血壓 性 疾病除外)	15,805	427.48	12.46	心臟疾病 (高血 壓 性 疾病除外)	192,786	539.59	15.38
3	肺炎	1,475	303.00	10.76	肺炎	12,555	339.58	9.90	老邁	121,830	340.99	9.72
4	腦血管疾病	854	175.43	6.23	腦血管疾病	9,388	253.92	7.40	腦血管疾病	97,419	272.66	7.77
5	糖尿病	633	130.04	4.62	糖尿病	8,372	226.44	6.60	肺炎	93,383	261.37	7.45
6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	452	92.85	3.30	高血壓性 疾病	5,624	152.11	4.43	事故傷害	33,347	93.33	2.66
7	慢性下呼吸道 疾病	434	89.16	3.16	慢性下呼吸 道 疾病	5,239	141.70	4.13	腎衰竭	25,743	72.05	2.05
8	高血壓性 疾病	367	75.39	2.68	腎炎、腎病 症 候 群 及 腎 病 變	4,359	117.90	3.44	血管性及未明 示 之 癡 呆 症	21,323	59.68	1.70
9	血管性及未明 示 之 癡 呆 症	309	63.48	2.25	事故傷害	3,269	88.42	2.58	阿茲海默病	20,613	57.69	1.64
10	事故傷害	215	44.17	1.57	血管性及未明 示 之 癡 呆 症	2,842	76.87	2.24	慢性下呼吸 道 疾 病	17,453	48.85	1.39
	其他	2,968	609.71	21.64	其他	27,040	731.36	21.31	其他	301,178	842.96	24.02

資料來源：衛生福利部、日本厚生勞動省 <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>

【附錄4】臺北市行政區別衛生統計指標

表1.臺北市行政區別衛生統計指標—人口統計

中華民國109年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km ²	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km ²	9,575	21,568	19,205	26,638	16,363	20,428	21,799	20,683	8,510	5,437	8,947	4,465	4,402
年底人口數	總計		2,602,418	200,316	215,240	302,644	223,876	155,397	123,849	183,088	268,130	118,758	282,525	278,451	250,144
	男性	人	1,238,618	93,573	102,171	140,899	103,720	73,952	60,026	89,578	128,096	57,916	134,624	134,007	120,056
	女性		1,363,800	106,743	113,069	161,745	120,156	81,445	63,823	93,510	140,034	60,842	147,901	144,444	130,088
	性比例		91.27	88.18	91.03	87.36	86.87	91.33	94.92	96.21	91.96	95.51	91.32	93.00	92.78
人口變動	出生數	人	19,029	1,312	1,670	2,021	1,686	1,058	958	1,333	1,848	942	2,267	2,009	1,925
	死亡數	人	17,212	1,246	1,516	1,869	1,476	1,007	971	1,701	1,681	783	1,431	1,822	1,709
	粗出生率	%	7.25	6.49	7.67	6.62	7.47	6.75	7.67	7.20	6.85	7.88	7.98	7.15	7.65
	粗死亡率	%	6.56	6.16	6.97	6.13	6.54	6.43	7.77	9.19	6.23	6.55	5.04	6.49	6.79
	人口增加率	%	-16.11	-18.99	-21.73	-16.21	-15.44	-16.56	-17.41	-21.32	-13.52	-12.79	-11.44	-17.67	-12.53
	自然增加率	%	0.69	0.33	0.71	0.50	0.93	0.33	-0.10	-1.99	0.62	1.33	2.94	0.67	0.86
	社會增加率	%	-16.94	-19.50	-22.68	-16.84	-16.49	-17.03	-17.46	-19.56	-14.24	-14.21	-14.45	-18.49	-13.47
生育率	一般生育率		30	27	32	28	30	28	31	30	28	31	31	30	31
	總生育率		985	940	1,005	985	985	970	1,010	985	950	1,020	985	970	1,035
	15-19歲		1	0	1	1	1	0	1	2	1	3	2	2	1
	20-24歲		9	4	7	5	11	6	13	16	9	12	8	8	13
	25-29歲	%	36	31	37	29	34	35	40	40	38	40	33	36	42
	30-34歲		82	83	82	87	81	83	81	78	77	78	84	78	85
	35-39歲		55	58	58	61	55	56	52	50	51	54	57	56	54
	40-44歲		13	11	15	14	13	13	14	10	13	16	12	13	11
	45-49歲		1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	
人口組成 (年底)	14歲以下 (a)		344,525	29,199	24,823	45,971	26,877	25,252	15,840	18,636	35,530	14,942	40,186	34,132	33,137
	15-64歲 (b)	人	1,762,254	130,064	145,978	191,640	152,157	100,312	84,018	125,972	186,575	83,787	201,264	189,189	171,298
	65歲以上 (c)		495,639	41,053	44,439	65,033	44,842	29,833	23,991	38,480	46,025	20,029	41,075	55,130	45,709
人口組成結 構比(年底)	14歲以下		13.24	14.58	11.53	15.19	12.01	16.25	12.79	10.18	13.25	12.58	14.22	12.26	13.25
	15-64歲	%	67.72	64.93	67.82	63.32	67.96	64.55	67.84	68.80	69.58	70.55	71.24	67.94	68.48
	65歲以上		19.05	20.49	20.65	21.49	20.03	19.20	19.37	21.02	17.17	16.87	14.54	19.80	18.27
	扶養比(a+c)/b	%	47.68	54.01	47.45	57.92	47.13	54.91	47.41	45.34	43.71	41.74	40.38	47.18	46.03
	老化指數c/a		143.86	140.60	179.02	141.47	166.84	118.14	151.46	206.48	129.54	134.04	102.21	161.52	137.94

表2.臺北市行政區別衛生統計指標—醫療資源

中華民國109年

項目		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家	36	5	1	6	4	3	1	4	2	-	3	1	6
	診所		3,663	302	300	869	496	292	163	177	198	84	260	320	202
	護產機構		144	17	9	19	19	16	10	6	10	4	11	12	11
	精神復建機構		51	3	1	4	12	4	3	1	5	1	3	6	8
	其他醫療及醫事機構		687	62	68	114	109	57	31	37	36	25	53	63	32
	非醫事機構		1,291	91	123	115	152	121	67	82	106	72	132	120	110
	藥商		13,234	1,271	1,322	2,074	2,227	1,199	929	606	503	407	1,369	796	531
	總計		25,526	1,778	1,594	4,016	2,229	3,686	654	626	1,024	490	2,669	1,558	5,202
病床數	醫院病床	床	19,742	1,276	1,259	2,279	1,138	3,200	432	409	868	411	2,298	1,287	4,885
	一般急性病床		13,905	730	896	1,653	805	2,282	320	166	592	281	1,642	876	3,662
	一般慢性病床		619	103	133	-	20	-	-	79	-	-	-	-	284
	特殊病床		5,218	443	230	626	313	918	112	164	276	130	656	411	939
	診所病床		5,784	502	335	1,737	1,091	486	222	217	156	79	371	271	317
醫事人力 (醫療及醫事機構)	總計	人	61,169	4,219	3,934	9,084	6,772	9,051	1,553	1,662	2,987	1,298	5,865	4,485	10,259
	醫師		15,764	1,009	1,050	2,505	1,937	2,373	384	449	860	263	1,470	1,145	2,319
	西醫師		11,330	599	685	1,627	1,402	1,942	206	262	579	165	1,100	764	1,999
	中醫師		1,051	86	85	203	167	97	67	55	60	21	53	87	70
	牙醫師		3,383	324	280	675	368	334	111	132	221	77	317	294	250
	藥事人員		5,776	500	482	796	790	624	242	276	297	175	558	425	611
	護產人員		30,127	2,021	1,761	4,098	3,000	4,766	616	658	1,384	631	3,028	2,160	6,004
	醫檢人員		3,803	256	184	622	341	721	102	67	152	74	355	203	726
其他	5,699	433	457	1,063	704	567	209	212	294	155	454	552	599		
平均 每萬人 醫療資源	醫院	家	0.14	0.25	0.05	0.20	0.18	0.19	0.08	0.22	0.07	0.00	0.11	0.04	0.24
	診所	家	14.08	15.08	13.94	28.71	22.16	18.79	13.16	9.67	7.38	7.07	9.20	11.49	7.94
	病床數	床	98.09	88.76	74.06	132.70	99.56	237.20	52.81	34.19	38.19	41.26	94.47	55.95	204.46
	醫事人員數	人	235.05	210.62	182.77	300.15	302.49	582.44	125.39	90.78	111.40	109.30	207.59	161.07	403.22
	醫師	人	60.57	50.37	48.78	82.77	86.52	152.71	31.01	24.52	32.07	22.15	52.03	41.12	91.15
	西醫師	人	43.54	29.90	31.82	53.76	62.62	124.97	16.63	14.31	21.59	13.89	38.93	27.44	78.57
	中醫師	人	4.04	4.29	3.95	6.71	7.46	6.24	5.41	3.00	2.24	1.77	1.88	3.12	2.75
	牙醫師	人	13.00	16.17	13.01	22.30	16.44	21.49	8.96	7.21	8.24	6.48	11.22	10.56	9.83
	藥事人員	人	22.19	24.96	22.39	26.30	35.29	40.16	19.54	15.07	11.08	14.74	19.75	15.26	24.01
	護產人員	人	115.77	100.89	81.82	135.41	134.00	306.70	49.74	35.94	51.62	53.13	107.18	77.57	235.98
醫檢人員	人	14.61	12.78	8.55	20.55	15.23	46.40	8.24	3.66	5.67	6.23	12.57	7.29	28.53	
其他	人	21.90	21.62	21.23	35.12	31.45	36.49	16.88	11.58	10.96	13.05	16.07	19.82	23.54	

表3.臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計

中華民國109年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	肺炎		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	腦血管疾病		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	糖尿病		5	5	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5
	腎炎、腎病症候群及腎病變		6	8	6	6	6	5	6	7	8	7	8	6	6
	慢性下呼吸道疾病		7	7	6	7	7	5	9	8	7	6	10	7	7
	高血壓性疾病		8	9	6	9	8	8	7	6	6	12	9	10	8
	事故傷害		9	10	9	8	10	9	8	9	10	10	7	8	12
	蓄意自我傷害（自殺）		10	12	11	11	9	12	10	10	11	9	6	9	9
十大死因 死亡率	所有死亡原因	人/每十 萬人口	655.40	619.52	689.24	613.17	656.82	648.99	773.13	922.83	620.81	650.90	501.13	652.06	670.95
	惡性腫瘤		196.13	194.80	215.96	178.94	214.07	178.68	224.10	262.59	172.61	209.16	157.31	189.00	203.79
	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		107.06	87.02	114.87	105.53	105.92	98.27	137.66	143.72	102.23	97.89	83.76	118.88	105.27
	肺炎		59.88	58.34	63.87	52.76	59.83	59.35	71.23	88.61	53.71	57.73	38.71	59.08	72.30
	腦血管疾病		39.52	39.55	35.84	36.70	39.44	46.58	44.02	55.65	36.67	40.99	32.38	37.37	40.52
	糖尿病		27.98	21.26	30.33	30.15	23.93	21.70	27.21	44.30	27.41	24.26	17.60	30.97	35.36
	腎炎、腎病症候群及腎病變		19.17	15.33	18.84	19.01	18.17	22.33	25.61	25.39	16.67	20.08	11.61	23.14	20.26
	慢性下呼吸道疾病		17.42	17.30	18.84	14.75	17.73	22.33	15.21	22.69	17.41	23.43	10.21	16.73	19.47
	高血壓性疾病		15.78	13.84	18.84	14.09	15.51	18.51	19.21	27.56	17.78	7.53	10.91	9.61	19.07
	事故傷害		13.99	13.35	17.00	14.42	10.19	14.68	16.01	20.53	13.71	10.04	14.78	15.30	8.34
蓄意自我傷害（自殺）	12.01	10.38	9.65	8.85	11.52	10.21	14.41	18.91	9.26	12.55	15.84	11.75	13.11		

表3.臺北市行政區別衛生統計指標—ICD-10死因統計(續1)

中華民國109年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世 界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	289.57	247.81	283.30	221.36	277.68	268.32	348.98	382.07	294.08	336.34	291.39	289.20	318.46
	惡性腫瘤		92.94	88.03	94.87	74.43	98.28	82.22	105.95	114.25	87.24	114.52	91.14	88.09	101.13
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)		44.40	31.46	42.57	34.31	40.45	38.96	61.03	60.83	44.31	48.44	47.73	48.60	48.29
	肺炎		21.44	19.75	20.70	14.90	21.36	18.65	24.91	28.28	22.59	25.55	19.98	20.21	27.71
	腦血管疾病		16.72	13.49	14.36	11.66	16.87	18.96	18.19	23.00	16.35	20.76	18.50	16.28	18.50
	糖尿病		11.51	7.72	11.30	10.02	9.73	8.40	11.06	19.05	12.18	11.25	9.81	12.93	14.46
	腎炎、腎病症候 群及腎病變		7.41	4.88	6.51	6.50	6.96	7.64	10.07	8.96	7.01	8.85	6.11	8.68	8.83
	慢性下呼吸道疾 病		6.29	5.65	6.36	3.99	6.16	7.15	5.65	7.07	6.79	9.85	5.59	6.37	7.85
	高血壓性疾病		5.85	4.49	7.14	4.73	5.21	6.47	6.54	9.37	7.52	3.43	5.76	2.99	7.27
	事故傷害		8.39	7.19	10.74	7.66	5.24	9.73	9.23	9.97	7.93	5.54	10.71	9.89	6.03
	蓄意自我傷害(自 殺)		9.14	7.80	7.61	6.15	7.71	10.77	11.22	12.56	8.15	14.93	12.00	8.26	9.28
十大死因 標準化 死亡率 區排名	所有死亡原因	區排名		11	8	12	9	10	2	1	5	3	6	7	4
	惡性腫瘤			9	6	12	5	11	3	2	10	1	7	8	4
	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)			12	8	11	9	10	1	2	7	4	6	3	5
	肺炎			10	7	12	6	11	4	1	5	3	9	8	2
	腦血管疾病			11	10	12	7	3	6	1	8	2	4	9	5
	糖尿病			12	5	8	10	11	7	1	4	6	9	3	2
	腎炎、腎病症候 群及腎病變			12	9	10	8	6	1	2	7	3	11	5	4
	慢性下呼吸道疾 病			10	7	12	8	3	9	4	5	1	11	6	2
	高血壓性疾病			10	4	9	8	6	5	1	2	11	7	12	3
	事故傷害			9	1	8	12	5	6	3	7	11	2	4	10
	蓄意自我傷害(自 殺)			9	11	12	10	5	4	2	8	1	3	7	6

表3.臺北市行政區別衛生統計指標—ICD-10死因統計(續2完)

中華民國109年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	全部	人/每十 萬人口	655.40	619.52	689.24	613.17	656.82	648.99	773.13	922.83	620.81	650.90	501.13	652.06	670.95
	0歲		336.94	223.13	311.14	245.52	359.93	-	419.29	148.53	479.11	305.50	353.90	557.24	430.22
	1-4歲		8.95	-	24.86	-	-	-	20.27	29.94	9.96	-	8.41	9.60	10.52
	5-14歲		6.94	-	6.33	-	-	5.60	9.81	8.89	8.24	21.72	7.54	13.35	13.54
	15-24歲		29.50	10.58	20.16	24.77	15.29	55.79	43.69	29.94	31.31	49.99	30.60	22.14	40.87
	25-44歲		63.76	58.94	74.11	40.94	55.24	52.99	72.24	122.29	56.99	88.23	63.43	47.63	61.65
	45-64歲		363.68	300.34	363.66	225.15	362.20	349.75	507.57	575.41	355.29	408.72	325.56	370.72	380.23
	65歲以上		2,817.22	2,563.47	2,750.99	2,527.80	2,695.76	2,818.14	3,148.37	3,452.06	2,921.93	3,009.74	2,685.85	2,709.56	2,993.12
年齡別 死亡率 區排名	全部	區排名		10	3	11	5	8	2	1	9	7	12	6	4
	0歲			10	7	9	5	12	4	11	2	8	6	1	3
	1-4歲			8	2	8	8	8	3	1	5	8	7	6	4
	5-14歲			10	8	10	10	9	4	5	6	1	7	3	2
	15-24歲			12	10	8	11	1	3	7	5	2	6	9	4
	25-44歲			7	3	12	9	10	4	1	8	2	5	11	6
	45-64歲			11	6	12	7	9	2	1	8	3	10	5	4
	65歲以上			11	7	12	9	6	2	1	5	3	10	8	4

【附錄 5】主要名詞解釋與公式

本死因統計摘要係依據世界衛生組織所公告之「國際疾病與死因分類標準第十版 (ICD-10)」加註死因碼，所統計之死因為原死因 (Underlying causes of death)。

一、原 (肇始) 死因

死亡證明書上所填之死因係指所有導致死亡或與死亡相關的疾病、罹病狀況、或是造成這些傷害的意外或暴力環境等。

原死因係指(a)可引起一連串病症而導致直接死亡之疾病或傷害；(b)造成致命傷害之事故或暴力之環境。

二、孕產婦死亡

孕產婦死亡係指在懷孕期間或懷孕終止後 42 天內之婦女死亡，而不論其懷孕期長短或懷孕的位置為何；或任何與懷孕有關或因懷孕而加重之原因所導致之死亡。但不包括因事故或偶發原因所致之死亡。

孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數 * 100,000。

三、嬰兒死亡

嬰兒死亡係指嬰兒出生後未滿一歲之死亡數。

嬰兒死亡率 = 嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數 * 1,000。

四、新生兒死亡

新生兒死亡係指係指嬰兒出生後，在未滿四週（28天）內之死亡數。

新生兒死亡率 = 新生兒死亡數 / 活產嬰兒數 * 1,000。

五、年齡別死亡率

年齡別死亡率 = 年齡別死亡數 / 該年齡別年中人口數 * 100,000。

六、標準化死亡率

標準化死亡率是將兩國或兩地不同性別、年齡、城鄉、所得、職業、婚姻、種族等項組合，化成為同一的基礎，用以剔除其人口在組合上之差異，俾可受到純正而客觀的比較。本書刊所用的標準化死亡率是指去除年齡組成影響、以 WHO 2000 年世界人口結構為基準的死亡率。

標準化死亡率 = $\left[\sum (\text{年齡別死亡率} * \text{標準組年齡別人口數}) \right] / \text{標準組總人口數}$ 。

【Attachment 5】 Explanation of main terms and formulas

This cause of death statistical abstract notes cause of death code according to The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) of the WHO. The causes of death included are all “Underlying causes of death.”

1. Underlying cause of death

The cause of death filled in on a death certificate means all diseases that caused or were related to death, the morbidity situation and the accident or violent environment that caused the injuries. The underlying cause of death means (a) disease or injury giving rise to a series of symptoms and causing direct death (b) an accident or violent environment that caused injury.

2. Maternal mortality

Maternal mortality means death of a pregnant women during pregnancy or within 42 days of termination of pregnancy (excluding accidental or incidental causes), regardless of the length of pregnancy or the location of pregnancy; or any death related to pregnancy or of a cause exacerbated by pregnancy..

Maternal death rate = number of maternal deaths/ number of live births * 100,000

3. Infant mortality

Infant mortality means the number of infants who die before one year of age.

Infant mortality rate = number of infant deaths/ number of live births * 1,000

4. Neonatal mortality

Neonatal mortality means the number of newborn babies who die within four weeks (28 days) after birth.

Neonatal mortality rate = number of newborn deaths / number of live births * 1,000

5. Age-specific mortality rate

Age-specific mortality rate = age-specific number of deaths / mid-year population of that age * 100,000

6. Standardized mortality rate

The standardized mortality rate combines items such as sex, age, rural-urban, income, occupation, marriage and race of two countries or two places and converts them to a common base to eliminate population difference in assembly to allow pure and objective comparison. The standardized mortality rate used in this book means it is the standardized mortality rate based on the WHO's world population structure that has had the effect of age composition removed.

Standardized mortality rate = $\frac{\sum (\text{Age-specific mortality rate} * \text{Standard group age-specific population})}{\text{Standard group total population}}$