

# COVID-19疫苗介紹

疫苗	莫德納XBB.1.5	Novavax XBB.1.5
外觀		
包裝	多劑型 2.5 mL/瓶 · 10瓶/盒	多劑型 2.5 mL/瓶 · 2瓶/盒
稀釋	X	X
開瓶時間	2~25°C 12-19小時	2°C ~25°C 6小時內
劑量	0.25 mL/劑(25微克XBB.1.5)	0.5 mL/劑 (5微克XBB.1.5)
	0.5 mL/劑(50微克XBB.1.5)	
年齡劑次	<b>6個月-4歲</b> 依接種史接種1-2劑(0.25 mL) <b>5-11歲</b> 接種1劑(0.25 mL) <b>12歲以上</b> 接種1劑(0.5 mL)	<b>12歲以上</b> 依接種史接種1-2劑

註1：莫德納XBB.1.5疫苗開放6個月以上全民接種；113/1/9起Novavax XBB.1.5疫苗開放12歲以上民眾接種

註2：113/4/9起「65歲以上民眾(含55-64歲原住民)」及「滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下患者」可再接種1劑新冠XBB疫苗(莫德納和Novavax擇一廠牌接種，可與第1劑不同廠牌)·與前1劑間隔至少12週(84天)。



# COVID-19疫苗開放對象及接種方式

疫苗種類/對象		幼兒 6m-4歲				兒童 5-11歲		青少年及成人 12歲以上	
疫苗種類/ 接種劑數	接種史	未曾接種新冠疫苗	曾接種1劑單價或雙價莫德納疫苗基礎劑	曾接種1-2劑單價BNT疫苗基礎劑	已完成基礎劑接種	未曾接種新冠疫苗	曾接種新冠疫苗	未曾接種新冠疫苗	曾接種新冠疫苗
	莫德納XBB.1.5 (6個月以上)	2劑	1劑	1-2劑	1劑	1劑	1劑		
	Novavax XBB.1.5 (12歲以上)						2劑	1劑	
接種間隔	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 未曾接種者：2劑間隔4週(28天)以上</li> <li>▶ 曾接種1劑單價或雙價莫德納疫苗基礎劑：與前1劑間隔4週(28天)以上</li> <li>▶ 曾接種1-2劑單價BNT疫苗基礎劑：依時程接續完成3劑疫苗接種(第1-2劑間隔4週以上，第2-3劑間隔8週以上)</li> <li>▶ 已完成基礎劑接種：與前1劑間隔3個月(12週；84天)以上</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 與前1劑間隔3個月(12週；84天)以上</li> </ul>		Novavax：2劑間隔4週(28天)以上

註1：莫德納XBB.1.5疫苗開放6個月以上全民接種；113/1/9起Novavax XBB.1.5疫苗開放12歲以上民眾接種

註2：113/4/9起「65歲以上民眾(含55-64歲原住民)」及「滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下患者」可再接種1劑新冠XBB疫苗(莫德納和Novavax擇一廠牌接種，可與第1劑不同廠牌)，與前1劑間隔至少12週(84天)。