

■ 要如何知道發生核子事故?

如果電廠發生放射性物質外釋的核子事故時，將從下列管道得到通知：

- 警察局等滅及應變單位的核能警報與廣播車的巡迴廣播
- 廣播電台及電視台。



■ 認識事故警報，解除警報

事故警報~ (試聽 )

響一秒，停一秒，重覆 90 次，時間為 180 秒。並以國語、台語廣播各兩次：「這是核能發電廠事故警報，請不要慌張，並依照政府機關或電視、電台播報的指示行動。」

解除警報~ (試聽 )

連續 180 秒長音。並以國語台語廣播各兩次：「剛才是核能發電廠事故解除警報。」

■ 如何「掩蔽」?

核能警報發佈後，保護自己最好的方法，就是減少輻射接觸的機會。所以聽到事故警報或巡迴車廣播，必須採取下列「掩蔽」行動。



如果您正在室內，請不要外出。



打開電視或收音機瞭解最新的狀況。

關緊門、窗，減少室外空氣流到室內。



電話掛好，以便隨時接聽緊急通知。



暴露在外的事物和飲水不要食用。
室內的飲水和食物，未受到污染，可以安全食用。



如果您正在室外，請回到家裡或進入附近的建築物內。



如果您正在車上，請立刻關上車窗、
打開收音機收聽廣播，瞭解最新的情況，
離開事故地區或進入室內。



學校的學生，聽到事故的警報或廣播，
要迅速進入教室內，將教室的門窗關閉，
聽從老師的指示。

■ 碘片服用

自我防護掩蔽時，中央災害應變中心會根據事故的情況下達服用碘片命令。服用碘片的目的，是要讓人體先吸收這種穩定、安全的碘，就能避免放射性碘在體內聚積，達到保護身體的效果。

■ 服用時機

為達到有效保護功能，碘片服用最恰當時機為放射性碘外釋之前至放射性碘外釋後 6 小時內，超過 6 小時其保護功能將遞減，核子事故中央災害應變中心會適時透過電視、收音機、廣播系統指示民眾服用。

■ 發放範圍

緊急應變計畫區涵蓋之行政村里。

■ 發放數量

每人兩日份預先發予民眾保管。

另兩日份集中保管，於事故發生時，視需要再發予民眾。

■ 集中保管地點

北部：三芝鄉衛生所、石門鄉衛生所、金山鄉衛生所、萬里鄉衛生所。

南部：恆春鎮衛生所、滿州鄉衛生所、南門醫院、恆春基督教醫院、恆春旅遊醫院。

■ 碘片服用方法

- | | |
|--------------|-----------------|
| • 成人 | 130 毫克／每日一錠 |
| • 孕婦和 3~12 歲 | 65 毫克／每日半錠 |
| • 3 歲以下 | 32.5 毫克／每日四分之一錠 |



■ 服用注意事項

- (一)：碘過敏者不可服用此藥。
- (二)：最長持續服用時間不得超過十日。
- (三)：應存放於兒童觸摸不到的地點。
- (四)：兒童服用方法之建議：可磨成粉末，拌合橘子汁、糖汁、果醬服用。
- (五)：甲狀腺患者、孕婦及新生兒服用時，請遵照醫師指示。